

MEDICI ANTIQVI

Græci, Lâtini, atque Arabes.

QVI DE FEBRIBVS SCRIPSERVNT.

SVMMO STUDIO, ATQVE LABORE

Ab Excellentissimo D. IOANNE FERNELIO, Ambiano,
Medico, ac Philosopho olim in vnum collecti, nunc verò omni
diligentia in hac Impressione, in lucem editi.

Cc. 61.

OPVS PRAECLARVM, ET TAM MEDICIS,
quàm rem Medicam profitentibus, ad cognoscendas qualitates, differentias
Februm, remediaq; & curationes earum perutile, ac necessarium.


Nomina Auctorum, versa pagina indicabit.

Cum Indice, tum capitum, tum Rerum locupletissimo.

CVM PRIVILEGIIS.



Venetijs, Apud Robertum Meietum, 1594.



ALCEM

1900

3. C. R. 2

2V410 T2 ON 14V2

[illegible]

1950

0-7-68

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains.

100

[Faint, illegible handwritten text]

1925

1990



6-17-77



Enclos 2



SENIOR CHAVIS

A V T O R V M



G R A E C I.

Hippocrates,

Galenus,

Paulus Aegineta,

Alexander Tralianus,

Aetius,

Oribasius,

Nonius Medicus,

A R A B E S.

Auicenna,

Rasis,

Abimeron Auenzoar,

Auerrois,

Isaac,

Serapion,

Haly abatis,

Actuarius,

L A T I N I.

Cornelius Celsus,

Q. Serenus,

Plinius Secundus,

Gariopontus,

Costantinus Aphricanus,

Bernardinus Gordonius,

Petrus de Abano,

Arnaldus de Villanoua,

Philonius,

Nicolaus Nicolus.

CLARISSIMIS
ATQVE
PRAESTANTISSIMIS
MEDICIS VENETIS

Gaspar Bindonus.



VLLA est egritudo, quæ nostra magis affligat corpora, quam febris, ac præterea quæ Medicorum animos maiori sollicitudine exerceat, & quæ præ manibus eorum frequentius habeatur: quod cum viderim; Medicorum tum Græca volumina, tum Arabica, tum Latina vetustiora, illustriora quæ, quæ de febribus agant in vnum imprimenda curavi. In hoc præfecto compertis, Clarissimi Doctores Medici, quidquid de Febribus scriptum est ab antiquioribus, & artis medicæ peritis viris Græcis: quidquid à celeberrima Arabum familia: & quæcunque ad prius Latini tradita sunt ad febres attinentia, intelligetis: nam si quid sit nominis febris, quid rei, in his declarant libris: quæ causæ, quæ notæ, quæ curationes expositæ sunt, ac tandem si quid inter se conueniant, dissentiant quæ, ab ipsis patefit. Hanc igitur, quæ de febribus tractat, materiam, quemadmodum per opportunam esse sentio; sic vestris Excellentijs dono do libentissimè: & si quid excudendum post hac mihi delatum fuerit, quod commodum fore esse videar; hilari animo, libenter quàm dicabo.

INDEX CAPITVM,

QVAE IN HOC OPERE

CONTINENTVR.

A



ANHEMITVS constrictionis cura, ex Auic. 80

Animi defectio ex Alex. 49. ex copia humorum animi defectio Alex. 49. ex vtero Alex. 49. ex imbecillitate

stomachi ex Alex. 49. ex pituita, ex frigidityte, vel caliditate, vel ignea inflammatione ex Alex. 49. ex sectione abscessus ex Alex. 50. ex gaudio, vel dolore ex Alex. 50. ex virium imbecillitate ex Alex. 50.

Aluus in febribus adstricta. 44

B

De Bilis vomitu ex Pau. Egin. 43

C

Capitis dolor in feb. ex Nou. pa. 14. ex Pau. 42. ex Auic. 79. ex Gariop. 196. 197.

Cardiaca pulsio ex Gariop. 191. cura ibidem.

Causi differentie, cause, signa, & curatio ex Hip. pag. 45. signa & cura ex Alex. 47. cause signa, & cura ex Auic. 82. signa, & cura ex

Ras. 103. cura ex Auer. 114. causi signa, & cura ex Isa. 124. cognitio, & cura ex Gario. 190. signa, & cura ex Const. 202. cura ex

Const. 205. causa signa, & cura ex Gord. 209. causa, signa, & cura ex Arizal. 244. 245.

quid sit, causa, iudicia, an cura ex Arnal. 267. causa, & signa, cura ex Nico. 304.

Cibi fastidium in febribus 43. cibi febricitatum in generali ex Auic. 76. cura ex Gariop. 198.

Colliquatio in febribus ex Orib. pag. 12

Corpora ad febrem parata ex Nicol. 285

D

Deglutiendi difficultas in feb. ex Auic. 80

Diariarum febrium curatio ex Aer. 59. notia et curatio ex Alex. 45. ex obstructione ex Alex. 46. quomodo diaria ab hectica discerni

queat ex Ale. 50. diaria febris ex Aer. 57. ex lassitudine Aer. 58. dicta ex Aer. 58. ex cruditate oborta ex Aer. 58. lege Ephemera.

Dysenteria curatio. 33

Diurna febris medela ex Haly. 165. ex cibis, & potibus ibidem. ex labore, ex ira, ex tristitia, ex vigilijs, ex apostemate curat. ex Haly.

165. 166.

E

Ephemera species ex Auic. 69. ex angustia facta signis, & cura 69. ex cogitatione, & ex ira

69. ex vigilijs ex Auic. 70. ex somno & quie

te signa, & cura ex Auic. 70. ex viribus, ex

timore, ex Auic. 70. ex labore signa, & cura ex Auic. 70. ex curatua de causis, & cura ex Auic. 70. ex dolore signa, & cura ex Auic. 70. ex syncopi signa, & cura ex Auic. 70.

ex fame, & sui, & ex opilatione ex Auic. 70. 71. ex nausearum, & ieiunio causa, & cura ex Auic. 71. ex apostemate, siccitate, calore ex Auic. 72. ex soliditate, & condensatione cutis signa, & cura ex Auic. 72. ex vino cura ex Auic. 73. ex sole cura ex Auic. 73. causa, signa & curationes ex Ras. 99. 100. quid sit, & causa, & signa ex Auenz. 105. 106. signa ex Auer. 108. cura ex Auer. 110. in speciali 110. cura cum fluxu de tris ex Auer. 110. causa, & signific. ex Is. 118. cura ex Is. 121. propter aeris frigiditatem cura ex Is. 121. propter balneum cura, propter ieiunium, propter laborem, propter bubones, & vigilias, ira & angustiam curationes ex Isa. 121. 122. causa, signa ex Isa. 133. propter calorem solis cura ex Isa. 134. causa frigid. ex Isa. 134. propter balnea ex Isa. 134. propter cibos, & potus calidos 135. propter labores, ieiunium, bubones in inguine, & vigilias, iram, angustiam, tristitiam curationes ex Is. 135. 136. causa ex Ser. 153. propter solis calorem, frigus, balneum, cibum calidum, ex labore corpo. ex ira & cogitatione, vigilias, dolore in inguine curationes ex Isa. 151. 154. causa, signa, & cura ex Constan. 201. causa signa, & cura ex Gord. 207. 208. causa signa, & cura ex Arizal. 240. 241. causa signa, cura ex Phil. 255. cura ephemera in speciali ex Phil. 255. species de ex tristitia, somno, & c. & eorum curatio ex ex Phil. 256. propter dispositionem corporis v. est labor, causa, & curationes ex Phil. 256. 257. causa signa & cura ex Nico. 206. ab ira a sole, opilatione pororum, a balneo, a vigilias, a somno, a quiete, nimio matu, calore solis, fame siti, cibis calidis signa, & cura ex Nico. 286. 287.

Ephemera a dolore, catarrho, inflammatione, opilatione, materia in stomacho contenta, a phle. fluxu ventris, sudore, coitu, & mediana solutione signa, & cura ex Nicol. 288. 289.

Epipla signa, & causa ex Gal. 14. cura ex Aetio. 63. ex Auic. 84. ex Isa. 128. & 149. & 150.

Erysipelacea inflammatio 47. signa ex Alex. 47. erysipelaceus affectus viscerum ex Aet. 57.

Extrac-

Extremitatum frigus ex Auic.	80	Febris ex femp. ex Aet.	58
F		Febris ex grauedine, & deſtillatione ex Aet.	58
Fames ingens ex Orib. pag. 12. ex Paul. 42. ex Auic.	80	Febris ex frigore ex Aet.	58
Febris quid nominis ex Hip.	pag. 1	Februm omnium in genere curatio ex Hip.	pag. 3
Febris quid ſit ex Alex. 45. ex Auic. 67. ex Iſa. 171. ex Aſſua. 176. ex Gariopon. 187. quid ſit ex Gordo. 207. ex Petro de Abb. 217. 218. ex Arnal. de ril. no. 240. ex Phil. 254. ex Nicol.	285	Febris diuturna, ſive longa ex Hip.	pag. 6
Februm differentia ex Hip.	pag. 1	Febris ex cholera vitellina.	
Februm differentia ex Nonio 13. ex Gal. pag. 7. differentia, & indicationes ex Gal. pa. 20. & differentia ex Nicol.	286	Febris hiberna ex Hip.	pag. 6
Februm natura ex Gariop.	186	Febris ephemera cauſa, ſigna & curatio ex Non. pag. 13. cauſa, ſigna ex Gal. 7. ex bubo ne à Gal. pag. 9. ſigna pag. 9. & 10. quomodo inter ſe diſcrepent ex Gal. 12. viſtus ratio ex Gal. 20. ex cruditate, & ventriculi dolentis curatio ex Gal. 21. acceſſio tranſit in putrida & heſtica ex Gal. 22. quando ſiant diuturniores, & effectus harum multiplex, atque differentia, curatio ex Gal. 34. cauſa, & ſigna, ex Aui. 68. permutatio, & ſigna permutationis ex Aui. 69. curatio.	ibi.
Febris quibus de cauſis fiat ex Hip. p. 1. ex Gal. pag. 8. quibus de cauſis ex Iſaac. 117. cauſa quot ſint ex Nicol.	285	februm hora ex Aui. 67. horarum vniuerſaliū cognitio ex Aui.	68
Febris quamobrem interdum repetant per circuitionem interdū continuę ſunt ex Gal. p. 19		febris erratica cauſa & cura ex Arnal.	251
Februm acceſſiones quam ob cauſam deſināt ad integritatem ex Gal.	19	febris erronea ex Hip.	pag. 6
Februm ſpecies ex Gariop.	188	februm compositarum diſpoſitio ex Aui. 96. cauſa ex Raf. 103. ſigna, & cura ex Raf. 105. coſpoſitio ex Auer. 109. cauſa, & ſigna ex Iſa. 120. de compoſitione feb. ex Iſa. 152. medela ex Haly. 172. composita febres ex Gor. 214. ſpecies, cauſa, ſigna, iudicia, & cura ex Phil. 278 279.	
Febris quam corporis partem primum corripit ex Hip.	pag. 1	februm intermittentium tres differentie ex Gal. p. 13. ſigna ex Gal. 35. diſpoſitio. ex Iſa. 128.	
Febrilis calor quomodo conſideratur.	285	febris inflatiue cura ex Iſa.	125
Febris quomodo fiat ex Hip.	pag. 1.	febris periodica ex Gariop.	175
Februm implexus ex Gal.	14	febris lipiria ex Hip. pag. 6. ex Aui. 85. ex Iſa. 128. 150. ex Ser. 163. ex Haly. 132. ex Arnal.	283
Febris que in calidis, & ſecis temperaturis ſunt ex Aet.	64	febris lenis ex Hip. pag. cura. ex Corn.	182
Februm ſigna, prognostica, & indicantia, quada in genere ex Hip.	2	febris melancholice cauſa ſigna ex Nico.	310
Februm ſigna que ab urina ſumuntur ex Orib. pag.	8	febris nocturna ex Hip.	pag. 6
Februm ſignificationes ex Aue. Iſaac. 117. ſigna generalia ex Nicol.	286.	febris nocturna, et diurna ſigna ex Aui. 85. regimen ex Aui.	87
Febris ardentis differentie, cauſa, ſigna, & curatio ex Hip. pag. 5. ardentium agnitio & curatio ex Pau. Aegin. 40. cura ex Aet.	61	febris nonana, ſeptimana & c. ex Hip. pag. 6. cauſa, & cura ex Aui. 90. medela ex Haly. 173. cauſa, ſigna, & cura ex Nicol.	312
Febris cholerice cauſa, ſigna & cura ex Nico. 302.		febris peſtilens ex Hip. pag. 6. cauſa, ſigna, & curatio ex Non. 14. cauſa ex Gal. pag. 8. cauſa ſigna ex Aui. 93. curatio ex Aui. 93. ſigna, & curatio ex Raf. 104. cā ex Iſa. 142. cura ex Corn. 181. cauſa, & ſigna, & cura ex Gor. 215. cauſa ſigna, et cura ex Arnal. 252. 253.	
Febris choleric ex Auic. 80. cauſa, & ſigna ex Auer.	109	febris phlegmatica cauſa, ſigna period. ex Aui. 84. ſigna phleg. inſeparab. ex Aui. 84. cura phleg. period. ex Aui. 86. cura continua ex Aui. 87. cauſa & ſigna ex Auer. 109. cura ex Auer. 114. cauſa, ſigna, et cura ex Serap. 160. medela ex Haly. 171. cauſa, ſigna, & cura ex Gordo. 213. ſpecies, cauſa, ſigna, & cura ex Arnal. 248. nota cauſa, ſigna, & cura	
Febris continentis, & continue ſpecies, cauſa, ſigna, & curatio ex Non. p. 12. ſigna ex Aet. 39. diata, ex Aet. 60. ſigna ex Aui. 74. continua febris putride cauſa.	243		
Febris ex cruditate ex Alex.	45-46		
Febris apoſtematum ex Auic. 96. ſignis, & eorum iudicijs ex Auic. 96. cura ibidem. ſigna, & cura ex Raf.	104		
Febris à bile, & ſigna, & curatio ex Hip. pag. 4. accenditur ex ſang. putref. à Gal.	16		
Febris ex obſtructione pag. 8. ex Gal. 20. ſpecies, & curatio 20. curatio ex Gal.	21		
Febris ex cutis denſitate ex Aet.	58		
Febris ex ing. inflammatione ex Aet.	58		

INDEX

- cura, ex Arnal. 249. ex phleg. acetoso. 249.
ex phleg. vitreo 249. causa, signa ex Nic. 306
febris putride signa ex Ori. p. 9. ex Gal. p. 8. signa
ex Gal. p. 10. differentia ex humorum putredine
ex Gal. 13. differentia ex Gal. 28. causa ex A-
lex. 46. signa ex Alex. 47. causa signa.
februm putridarum curatio ex Ori. pag. 9. quando
et quomodo mittendus est sanguis ex Gal. 30
febris putrida 35. putridarum februm agnitio ex
Paul. Aegi. 38. curatio 38. causa ex 60. diata
ex Ale. 60. causa ex Aui. 73. signa ex Aui. 74
curatio ex Aui. 75. causa, et signa ex Auer.
108. cura in generali ex Auer. 112. causa, ex
Isa. 118. signa ex Aue. 119. cura ex Isa. 126.
causa ex Isa. 144. cura ex Haly. 166. curatio
ex Nic. 295. et signa ex Nic. 291. 292. etc.
febris semitertiana ex Hip. pag. 6. signa, et cura-
tio ex Nonio p. 14. consideratio ex Gal. 15. dif-
ferentia ex Gal. 15. quid sit ex Gal. 16. semiter-
tiana quomodo fiat ex Pau. Aegi. 40. curatio
ex Cornel. 181.
febris syncopalis humorosa causa et signa ex Aui.
85. syncopalis minutæ ex Aui. 85. cura ex A-
ui. 87. cura minutæ ex Aui. 87. signa, et cura
syncopalis malitia humorum, et eorum acuitate
ex Raf. 104. signa, et cura ex cruditate hum.
ex Raf. 104.
febris vertiginosa ex Hip. pag. 6
febris vehemens ex Hip. pag. 6
frigus ex quo non calefit patient ex Ar. Raf. 103
cura ex Cornel. 182
- H**
- Hæctica nota in Marasmonem transeuntis Alex.
50. cura. Ale. 50. causa ex cura ex Aet. 65.
causa, signa ex Aui. 90. signa marasmi ex A-
ui. 91. cura hæctica ex Aui. 91. causa hec. sene-
ctutis ex Aui. 92. signa, et cura ex Aui. 93.
signa, et cura ex Raf. 101. 103. signa, et cura
ex Auenz. 107. signa ex Auer. 110. cura ex
Auer. 115. febris ex ardore ex Aet. 58
Hæctica signa, et curationes ex Isa. 120. causa, et
cura ex Isa. 122. hæctica diuisio ex Is. 122. hæ-
ctica simplic. cura ex Isa. 122. cura ex Isa. 136
137. hæctica composita cura cum febre putrida
ex Isa. 138. causa, et signa ex Ser. 154. cura,
155. medela ex Haly. 174. cura ex Aui. 178
cura ex Const. 207. quid sit. causa, signa, et cura
ex Gord. 214. 215. causa, species, signa, et cura
ex Arnal. 242. 243. quid sit causa, signa iudi-
cia, et curatio ex Phil. 280. 281. quid sit cau-
sa, signa, et cura ex Nicol. 288. 289. hæctice
senectutis causa, signa, et cura ex Nicol. 290
Hæctice febris differentie, et curatio ex Non. p. 14
signa ex Gal. p. 11. 12. 13. quando sit ex Pellan-
di, ac victus ratio ex Gale. 26. victus ratio ex
Gal. 27. hæct. cognitio, et curatio ex Pau. Ae-
gin. 40. signa ex Alex. 50. quomodo hæctica d
putridis discernat ex Ale. 50. notæ hec. Ale. 50
- Hemitritei causa, signa, et cura ex Aui. 98. 99.
Hemitritei cura ex Isa. 127. causa, et cura ex Is.
147. causa et signa ex Sera. 163. cura ibid. cu-
ra 183. et ex Plinio. 184. cura ex Haly. 163.
causa, et cura ex Const. 206. signa, causa, et
cura ex Arnal. 245. 246
Horror quid sit 25. cura ex Cornel. 182
- I**
- Ignis sacri affectio ex Aet. 62
- L**
- Lingua aspera in febribus curatio ex Ori. pag. 12.
cura ex Aui. 79. cura ex Gario. 197. 198
Lingua scabrities 43. cura ex Cornel. 182
- M**
- Marasmon quid sit, causa, signa, iudicia, et cura
ex Phil. 282
Morbilli causa, ex Aui. 94. signa et cura ex A-
ui. 94. signa, et cura ex Raf. 105. causa, signa,
et cura ex Gord. 216. 217
- N**
- Nausea in febribus ex Ori. p. 12. nausea ex Pau.
Aegin. 43
- O**
- Obstructio non est aperienda nisi evacuata plenitu-
dine. obstruct. notæ ex Alex. 50
- P**
- Parotidarum signa, et cura ex Gario. 197
Pestilentia ex commentarijs Ruffi Pau. Aegi. 41.
signa ex Aui. 93. preservatio ex Aui. 94
Phthisis cura sine febre ex Isa. 123
Phthisis calida cura. 123
Pulmonis vlcus cura ex Isaac. 123
Putredini quæ requirantur. 22
Putredo quid sit, et quo modo sananda 29. quo
modo vacuanda. 29. causa ex Isa. 141
- Q**
- Quartana signa ex Auenz. 107. signa ex Auerro.
109. cura ex Auer. 115. cura ex Isa. 127. cura
ex Isaac 129. duplicis quartana ibid. cura ex
Isa. 148. causa, et signa ex Sera. 161. cura ibi.
medela ex Haly. 170. cura ex Corn. 182
Quartana febris ex Plin. 186. vere quartanæ si-
gna, et cura ex Gario. 195. causa, signa et cura
ex Cost. 204. causa, et cura ex Cost. 206. causa
signa, et cura ex Gord. 212. vere quart. causa si-
gna, et cura 250. non vere causa, signa, et cu-
ra ex Arnal. 251. causa signa, et cura ex Ar-
nal. 251. 252. quid sit causa, signa iudicia, et cu-
ra ex Phil. 275. 276. notæ signa ex Nic. 311.
pure curatio ex Nic. 311. notæ curatio ex Ni-
313. quartana cōtinua, signa, et cura ex N. 313
Quotidianæ signa ex Gal. 35. cura ex Gal. 36. agni-
tio, et curatio ex Pau. Aegi. 39. dinotio et cu-
ratio ex Aet. 63. cura ex Isa. 127. cura ex Isa.
129. cura ex Aui. 178. curatio ex Corn. 182
cura ex Corn. 183. ad tipum quotidianæ 183. cu-
ra ex Phil. 186. causa signa, et cura ex Gario.
191. signa, et cura ex Gario. 194. causa, signa,

INDEX

Et cura ex Const. 204
Quotidiana febris signa ex Ori. pag. 9. causa, signa, et curatio ex Nonio. pag. 14. signa, et cura ex Alex. 53. signa, et cura ex Ras. 104. causa, signa, et cura ex Auenz. 106. continua causa, signa et cura ex Arnal. 251. quid sit causa signa iudicia, et cura 273. 274. quotid. Period. cura. ex Nicol. 307

R

Quotidiana causa, et cura ex Const. 205
Rigor quomodo fiat ex Gal. 13. sine febre efficitur ex Gal. 14. de immodico rigore in febribus Pau. Aegin. 42
Rigor quid sit. 25
Rigoris regimen ex Auic. 78

S

Sanguinis e naribus profluvium ex Pau. Aegi. 44
Sanguinis destillationis curatio in febribus ex Orib. pag. 13
Sanguinis navium fluxus regimen ex Auic. 79
Singultus in febribus ex Orib. pag. 12. ex Pau. 44. et Gariop. 148
Sinocha inflatiua causa, signa et cura ex Ar. 244
Sinochę putrida causa, signa et cura ex Arn. 244
quid sit, causa, signa, iudicia ex Phil. 270. sino chus quid sit causa signa, et cura ex Philon. 271. 272
Sitis ingens ex Orib. 12. ex Paul. 43. ex Auic. 79. ex Haly. 173
Sopor gravis in febribus ex Orib. pag. 12. ex Non. 14. curatio ex Pau. Aegin. 42
Sternutatio in febribus. 43. cura sternutationis frequentius ex Auic. 79. medela ex Haly. 173
Stomachi quomodo curam habere conveniat ex Paul. Aegin. 42
Sudorem in feb. mouentia ex Non. 14. ex Pau. 42. sudor superflus ex Aui. 79. ex Haly. 174. ex Gari. 198. iudiciu 199. cura ex Phi. 283. 284
Sudores si stentia ex Non. 14. ex Gor. 216
Syncopis ex imanitione in febribus, vel plenitudine ex Orib. pag. 13. quale vinum exhibendum ex Gal. 32
Syncopis quomodo cognoscatur 32. quibus succedere re causis soleat. 33
Syncopis in febribus accedens ex Alex. 48. notę ex copia humorum crudorum ex Al. 48. nota ex bilioso 48. curatio syncopis ex Ale. Tra. 48
Syncopis accidens marasmo Alex. 51. causa, et cura ex Auic. 80. signa ex Auer. 109. cura ex Auer. 116. ex causa stomachi cura ex Auer.

116. causa doloris ex Auer. 116. ex superflua euacuatione ex Auer. 117. ex superflua fluxu sang. cura ex Auer. 117
Syncopis ex Serap. 164
Synocha febres quę vocantur, et quid sit harum genus ex Gal. 22. 31. tres differentia, et in quibus corporibus non possint gigni ex Gal. 22. pręsidium maximum est sang. missio ex Galen. 23. quando oriantur ex Gal. 23
Synochis febris quę dicatur, et eius curatio ex Gal. 28. nutrimenti quantitas 28. signa, et cura ex Ras. 104. cura ex Isa. 126. causa, et signa ex Isa. 141. cura ex Isa. 143. cause, et signa ex Sera. 156. cura ibid. causa, signa, et cura ex Const. 203. causa, signa, et cura ex Cost. 205. cause, signa, et cura ex Gord. 211. causa ex Petro. 222

T

Tertiana cura ex Plin. 186. cognitio, et cura vera tert. ex Gario. 192. non vera cognitio. 192.
Tertiana simplicis curatio ex Gor. 194
Tertiana non vera signa ex Gariop. 194. vere signa, et cura ex Gariop. 194. causa signa, et cura ex Const. 202. 203
tertiana cura ex Const. 205. causa, signa, et cura ex Gordo. 210. species, causa, signa et cura ex Arnal. 246. 247. nota, causa, signa, et cura ex Arnal. 247
tertiana continuę causa, et cura ex Arnal. 248. cause signa, iudicia, et cura ex Phi. 264. 265. nothę causa, signa, iudicia ex Philo. 266. cura ex Nicol. 302
tremor in acutis febribus ex Gariop. 199
tussis in febribus 42. cura ex Auic. 80
typica febris ex Gariop. 186

V

Varioli cause et signa ex Auic. 94. signa, et cura ex Ras. 105. causa, et signa ex Isa. 143. cura ex Serap. 157
Ventriculi os offensus in febre quomodo sit curandus. 32
Ventris fluxus in febribus ex Auic. 79
Vigilię in febribus ex Orib. pag. 17. ex Non. p. 14
Vigilię ex Pau. Aegin. 42. cura ex Auic. 79. medela ex Haly. 174. signa, et cura ex Gari. 199
Visceribus quę imponi solent in feb. ex Non. p. 14
Vomitus regimen ex Auic. 9

F I N I S.

HIPPOCRATIS

DE FEBRIBVS



liber

Ex commentarijs Ioan. Marinelli
in Lib. Hip.

De febris nominibus.



FEBRIS sæpe ab Hip-
po. appellatur calor,
& ignis, qui calor nō
est naturalis, nec in-
ter res non natura-
les commemoratur,
sed præternaturalis,
hoc est, cōtrarius na-
turæ, quemadmodū
sunt morbi omnes

ac eorū causæ, & symptomata: quæ tria sunt om-
nino naturæ humanæ contrarijssima: & pro-
pterea multoties reperies in lib. de mor. pop.
calorem, ardorem, & ignem pro febre scriptos
quin & aliquando, cum dicit febrem, signifi-
cat calorem febrilem, quemadmodum in libr.
5. de morb. pop. nu. 8. ubi inquit. vigesima tu-
mor cœpit circa aurem, & febris, & rigor. &
nu. 10. eiusdem lib. cum rigor subrepens dimi-
ssisset, febris venit. at verò, vt diximus, appellat
quandoq; febrem, calorem, vt in li. 7. de mor.
pop. nu. 28. cum ait. ad noctem calores. & n.
27. ex fomentis, vt videtur, calores nullo tem-
pore relinquebant, magis tum ad vespèram
augescebant, sudores fiebant per totū corpus.

*Febris quam corporis partem primum cor-
ripiat, eamque morbum vniuersalem
minime semper esse asserit.*

Verū quam partē primum corripiat febris
nostri corporis, videamus. proditū est in lib. 6.
de mor. pop. sect. 5. par. 3. rigor à superiori
ventre, ignis verò magis ab inferiori. Et Gal.
in com. ait. ex partibus ventris superior. rigo-

rem magis, inferior verò febrem facit, aut sen-
tit, aut inchoat. Et morbum vniuersalem nō
esse affirmat, in lib. de Nat. mul. pag. 94. n. 13.
si vteri præter naturam hient febris, rigor, &
dolor inum ventrem, & lumbos corripit. Et
in lib. de loc. in hom. pag. 32. nu. 39. hunc me-
dicamentum potare oportet, quod educat, qua-
parte magis hæret, siue superne, siue inferne.
& in lib. 7. de mor. pop. nu. 1. febris adeo lenis
facta est, vt obscura consisteret, præterquam
in temporibus.

Febris quomodo fiat, & quibus de causis.

Ceterum transeamus ad illam partem, qua
nobis declarat, quoniam modo fiat febris, &
quibus de causis. scriptum est in lib. 4. de mor.
pag. 76. nu. 17. si cibi maneant in ventricu-
lo ampliore tempore, quàm opportunum est,
& alij ad ipsos incidant, corpus vtiq; replea-
tur, & dum premuntur à plenitudine venæ,
calor, ac dolor corpori accedent, venis scilicet
calescentibus, ac stantibus, estate quidem
citius, hyeme verò posterius: estate enim cali-
dus est aer ambiens, & calidiorem corpus in
seipsum trahit, & si calido adhuc existente
ventriculo calidior, quàm opportunus est, pi-
ritus homini accedat, nihil miri est hominem
ex tali febrile: hyeme verò, cum frigidum
spiritum trahat in se ipsum, multo magis
poterit corpus repletionem ferre, homine
modicè ventrem exonerante. Et in lib. 1. de
loc. in homi. nūme. 38. febres propterea fiunt,
cum corpore superinflāmato carnes intumue-
rint, & pituita, ac bilis conclusa quieuerint,
& neque refrigeretur quicquam, neque exeat.

neque moveatur, neque aliud quid subeat. hec duo loca Hip. non solum modum exponunt, quo fiat febris, sed causas materiales, quæ sunt cibi multæ, vel pituita, ac bilis, deinde obstructio, quæ est causa secundaria à primis producta. Et in dicto lib. 4. de mor. n. 25. cum homines laborarint, quibus sanè maxime sanguinis afflictio contigerit, illic firmatur, ac calefit, & ex hoc dolor oboritur. Si autem alius, ac vesica non breui copiam expulerint, febris ex hoc icruit. & siquidem prior humor equalis fuerit, nequaquam, si verò in labore ipsorum plurimus in corpore permaneat, superat ille, at nu. 23. ait febris hoc modo oboriens non periculosa, neque fortis est. Et subditur si calefcente sanguine exhalat maxime per hunc humor aquosus, qui febri est infestissimus, remanet pinguis, ac levis, quia est biliosus, & febris maxime nutrimentum, & attenuatus hic biliosus humor, corpus magis calere facit, quæ verba nobis indicant non solum humoris quantitatem producere febrem, sed etiam qualitatem. Et propterea in lib. de vet. Med. pag. 5. nume. 30. ego hoc maximum signum esse puto, quod non propter calidum simpliciter homines febricitant, neque hoc sit simpliciter afflictio, nisi causa, sed est amarum, ac calidum idem, & calidum ac acidum, & salum ac calidum, & alia infinita: & rursus frigidum cum alijs facultatibus coniunctum, propterea quod qui ardenti febre febricitant, & alijs fortibus morbis, non cito ex calore liberantur, neque adest hic frigidum aduersus calidum. hæc itaque sunt, quæ lædunt: simul adest autem & calidum robore participans, nimirum ducens, & exacerbans, & augens simul cum illis, verum nullam potentiam maiorem, quam conuenit, habens, vidimus igitur, quomodo fiat febris, & causas febrium primarias esse multitudinem, siue repletionem ciborum, secundariam vero pituitam, & bilem vtranque, tertiam has consequentem obstructiones. has porro causas inuāt, ut plurimum locus, tempus, & res non naturales, quæ à medicis sex numerantur, & hæc ex se ipsis febres efficere possunt, sed simplicissimas: illas verò minime. Causæ porro sunt ætas, sexus, cognatio, temperatura, atque habitudo corporis totius, vel partis, consuetudo in rebus, pauca, vel multa, studia, negocia, fortunæ, modus viuendi, & huiusmodi. & causæ hæc omnes appellantur primariæ, siue externæ à Ga. & ab alijs, qui eū secuti sunt: sed humor, & obstructio, internæ. Ab his igitur causis febres fiunt,

De febrium differentijs.

HAS porro plures suscipiunt diuisiones, quas nonnulli species nominant, siquidem aliæ di-

uiduntur secundum substantiam, aliæ secundum accidens, quæ substantiales appellantur, aliæ tales sunt à forma, aliæ à materia, aliæ ab utrisque. Febres autem, quæ à forma dicuntur, diuisionem habent, prout magna fuerit, vel parua forme vis, propterea quod alia febris dicitur vehemens, ut apparet in lib. 7. de morb. pop. n. 15. & in cō. 4. de vict. ratione. in mor. acut. par. 46. & com. 3. prog. par. 13. & in lib. 4. aph. 33. aliæ tenuēs, ut cō. 2. prog. par. 80. aliæ simplicissimæ, ut com. 3. prog. par. 2. aliæ mediocres, ut in l. 2. prog. par. 49. Quæ verò febres denominationem accipiunt à materia, aliæ dicuntur siccæ, ut legitur in lib. 4. de mor. pop. n. 12. aliæ saluginosæ, ut in lib. 6. sec. 1. aliæ acutæ, ut lib. 1. aph. 14. & lib. 3. aph. 7. atque alijs plurimis in locis, aliæ ardentes, ut 7. de morb. pop. nu. 54. & 55. & lib. 4. aph. 54. & 58. & alibi, aliæ statim ambulantes ad manum, ut lib. 6. de mor. pop. sec. 7. & aliæ acutæ ad manum submordentes, ut eodem lib. 6. sect. 6. Quæ vero denominantur à materia, ac forma simul, aliæ dicuntur implacide, ut scriptum est in 4. de vict. ratione. par. 46. aliæ pessimæ, ut com. 2. prog. par. 2. aliæ horridæ, ut in lib. 1. de mor. pop. sec. 1. & lib. 2. sec. 3. aliæ malignæ, ut in lib. 7. nume. 40. & in lib. 2. prot. par. 41. & hæc est diuisio febrium secundum substantiam.

Diuiduntur præterea per accidens, quoniam aliæ denominantur à quantitate, aliæ à qualitate, aliæ à tempore, aliæ à loco. A quantitate verò aliæ dicuntur continuæ, ut in com. 3. prog. par. 13. & in lib. 1. de mor. pop. sect. 1. aliæ non continuæ, & hæc dicuntur intermittentes, quarum aliæ appellantur ephemeræ, siue diariæ, ut in lib. 4. aph. 55. aliæ quotidianæ, ut in lib. 1. de mor. pop. sec. 2. aliæ tertianæ, ut in eadem sect. aliæ quartanæ, ut ibidem, aliæ quintanæ, septimanæ, nouanæ, ut in eodem lib. sec. 3. aliæ longæ, ut in lib. 4. aph. 44. & 45. aliæ magnæ, ut in lib. 2. de morb. mul. Quæ diuiduntur à qualitate, denominantur ab actionibus, vel à passionibus, quæ originem ducunt à qualitatibus. Et propterea aliæ dicuntur laboriosæ, quia laboris ac doloris inferunt, ut in lib. 4. aph. 74. aliæ sudorosæ, siue sudorificæ, ut in lib. 7. de mor. pop. n. 1. aliæ inflatæ, & liuidæ, ut in lib. 6. sec. 1. aliæ anxiosæ, horridæ, ut in lib. 2. sect. 3. aliæ tremulæ, singultuosæ, mentis contingentes, ut in lib. de Fract. n. 12. & 38. aliæ lethales maxime ut nu. 44. eiusdem lib. Quæ autem diuiduntur secundum locum aliæ videntur intra, & frigefaciunt extra, vel contra, ut febris Epialos, & febris lipiria, de quibus legitur in lib. de super. n. 24. & in lib. 2. de mor. n. 16. & 149. & lib. de affect. n. 14. aliæ dicuntur à splene ortæ, ut in lib. 4. de mor. pop. nu. 20. aliæ à capite, aliæ ab alia corporis parte, veluti ab utero, ut in lib. de mor. mul.

Quæ autem diuiduntur secundum tempus aliæ sunt diurnæ, ut in lib. p. de morb. populi sect. 3. aliæ nocturnæ, ut ibidem, aliæ erronæ, ut in eodem lib. sect. 2. Et in com. 2. prog. par. 60. aliæ diurnæ, ut in lib. de inter. affectu. 3. Et tales sunt diuisiones febrium, quæ reperiuntur in lib. Hip. quæ omnes cum principium habeant, & finem quoque habent, igitur & medium. quod vigor, & status appellatur. inter principium, & statum est augmentum febris. inter statum, & finem est declinatio. quapropter quatuor, vel quinque describuntur singulorum febrium partes, quæ à medicis temporibus febrium nuncupantur.

Nunc tempus est, ut aliam aggrediamur diuisionem legitur in l. de Flat. nu. 7. sunt febrium genera duo, quorum alterum propter malam dietam priuatiū his contingit, qui ea utuntur. communis febris propterea omnibus accedit, quod eandem spiritum omnes attrahant, sitque, ut simili corpori, similes spiritus, similiter permixti similes gignant febres. Et au. 10. propter malam dietam sit febris, cum corpus cibis expletum est, ac spiritus quoque multum do vehemēter excelsit, dum cibi, & ventri diu immorantur, & inferior venter sit obturatus, per vniuersum corpus permeant status, sanguineque plenas corporis partes maxime petentes eas frigefaciunt, frigefactis his locis, unde fontes, & radices sanguinis prodeunt, per vniuersum corpus horror consequitur, & tremor & hiatus, de quibus legem. 1. 1. & 12. & de sudore. n. 13. harum igitur febrium aliæ sunt simplicissimæ, aliæ acutæ, & aliæ longæ. Simplicissimæ febres, ut legitur in com. 3. prog. part. 2. ac signis firmatæ securissimis, quarto die aut citius desinunt, deterrimæ verò, ac signis affligentes difficillimis, quarto die, aut citius interimunt. acutæ verò febres sic appellantur, vel quia sunt breues, & deterrimæ, vel quia sunt à causis acutis, veluti à bile meraca, ut legitur in l. de Pract. nu. 44. in constipatione sicca, ut in lib. 3. apho. 7. vel quia habent grana symptomata, ut legitur in l. 7. de mor. populi. 38. & omnis febris aut est continua, ut intermittens, nam & acuta ratione symptomatum est intermittens, & ratione febris est continua, ut eodem nume. 38. videre possumus. præterea inter continuas est febris ardens. primum de continua in genere, deinde de acutis, tertio de ardentibus agemus. sed primum varia febrium in vniuersum signa tum prognostica, tum indicantia sunt recitanda; postea ad particulares febrium species veniemus.

Febrium signa, & prognostica, & indicantia quædam in genere.

Al. Hip. in l. de Coact. priuati. pag. 175. col. 2. rigores, veluti in febre tertiana si in media inordinata febre exacerbantur, valde maligni sunt: si vero contrario conuellentibus modo exacerbentur cum rigore, & febre perniciosum est. Et febres ex præordiorum dolore malignæ sent, sopor in his pessimus est. Et, in febre vocis interceptiones malignæ sunt. Et, qui in super exudant in febre, malignæ habent. Et in febribus inflata aluo status non erumpere malum. Et subdit, in febre tractus veluti vomitus, in creatione desinens malum. Et in febribus mentis emotiones taciturnæ, in eo, qui voce priuatus non est, perniciosæ sunt. Et, in febre liuores fientes breui morte affore significant. Et, quibus in febre dolore lateris hære, alius multa aquosa, ac biliosa egerit, hi alleuantur. Et, febrienti si atra bilis in principio sursum, aut deorsum prodierit lethale. Et, qui cum perfrigerationibus, non sine febre superne exudant, moleste ferentes, & phrenitici in acuto morbo perniciosæ habent. Et subdit, pag. 176. in febribus inguinis dolor, morbum diurnum significat. Et, in febribus iudicationes impeditæ, ac sublatæ temporis quidem diurnitatem inducunt, non autem perniciosæ sunt. Et, febres ex doloribus vehementibus diurnæ. Et quibus desinunt febres, non in diebus iudicatorijs, his recidiunt. Et febres vertiginosæ cum voluulis, vel sine voluulis, perniciosæ, & quibus in febre dolores circa lumbos, & infernas partes fientes, septum transuersum contingunt, infernas partes relinquentes, perniciosæ sunt, tum alijs, tum si aliquod quoddam signum præuam accedat, si verò alia signa non fuerint præua, suppuratum forte timor est. & quibus febribus aliquando intermittere periculo vacat, & in febribus longis aut tubercula, aut dolores, in articulis sunt, & si facti fuerint, non sunt inutiles. & in febribus secundum venam, quæ in collo, pulsus, ac dolor in dysenteriam desinit. Et, quibus in febribus uenæ in temporibus pullant, & facies sana est, & præcordium non molle, diurnum morbum significat, & non desinentem circa multum sanguinis ex nasibus fluxum, aut singulrum, aut conuulsionem, aut coxendicium dolorem. Et quibuscunque in febribus tremores circa iudicationem cessant, his temporis progressu abscessus dolorosus suppuratus in articulo fit, & vesica dolorosa. Et, febrientibus, quibus rubores sunt in facie, & dolor capitis fortis, & venarum pulsus, his sanguinis fluxio plerumque contingit. Et, quæcunque signa febris se opponunt, & non abscessus.

significationem habent maligna sunt. Et, febres quæ neque in diebus indicatorijs, neque post solutorium signum decesserunt, reciduant. Et, quibus febre incipientibus, sanguis de naribus sternutatione siccæ destillat, & urina subsidentiam albam in quarta die habet, his, in septima die solutionem significat. Et septima die, aut nona, aut decimaquarta fluxiones sanguinis à naribus sientes, plerumque febres soluant, similiter, & alui fluxio, biliosa, & qualis in dysenteria fieri solet, & genuum, ac coxendicum dolor, & urina concocta ad indicationem in muliere verò etiam menstruæ purgationis fluxus. Et, qui in febribus exudat, caput dolentes alio suppressa, conuulsi sunt. Et, conuulsio in febre siens in eadem die desinens bona est. Et conuulsio in febre siens sedat febrem eadem die, aut postera, aut tertia, si verò tempus in quo incepit, transgrediatur, & non desinat, malum est. Et, febres, intermittentes, verum inæqualiter, calæscentes alio, inflata, pauca egerente, in his, post indicationem lumborum dolore consequturo, alui erumpunt, at amburentes ad manum, torpidæ, siuculosæ, anxiosæ, in his alio suppressa grauati, exoluantur, quandoq; verò, & rubicundæ in pedibus embustiones, eadem significant. Et subdit, capitis dolor moderatus cum si cibum capiente, aut cū sudore non solvente febrem, abicessus in gingiuis, aut circa aurem significat alio non exurbata. Et pa. 176. in febribus surditas alium sistit. Et, rubores in febribus sientes circa aurem, ex pregresso dolore signum quidem sunt erysipelatis in facie futuri, sed & conuulsiones ex alibus fiunt cum vocis interceptione, ac exolutione. Et, ex febribus surditatem, sanguinis è naribus fluxio soluit, item alui turbatio. Et, subdit, oculorū rubor in febre siens alui diurnam affectionem significat. Et, in oculorum distortionem febrienti lassato, rigor perniciosus, & soporosi in his male habet. Et, viro lippienti febre superueniente solutio, si minus, periculum est, necesse fiat, aut pereat, aut utrumque. Et qui febres ad rectum non adurgetes habet, phrenitici fiunt, & magis si sanguis fluxerit. Et linguā circa hūidā sui partē, velut salina alba obducit, febris remissionis signum est, cetera verò ibi lege. Et ex dentis corruptio ne vehemens febris superaccedens, & delirium lethale est, si verò seruentur, vlcera suppurabunt, & ossa discedunt. Et, sputi excreationes in febre liuidæ, nigræ, biliosæ si quidem supprimantur malæ sunt, secedentes verò pro ratione viles. Et, quibus vox cum febre deficit, & cum indicatione intercepta, tremuli moriuntur. Et, vocis interceptiones in febre conuulsorio modo sientes, ad mentis emotionem cū silentio deueniunt, perniciosum. Et, lethalis

est spiritus febriculofus, & fuliginofus. Et subdit, colli dolor malum, quidem in omni febre, pessimum autem his, quibus timor est, ut etiam infaniant. Et in pectoris dolore febriculoso, alius turbata, torpida nigratum egestionum signa sunt. Et, fauces exulceratæ in febre cum alio signo ex his, quæ difficilia sunt, periculosæ sunt. Et, in febribus de repente suffocari, & deglutire non posse, citra timorem malum est. Et, oris ventriculi dolor, & pulsus præcordiorum, & febre perfrigerata malum, tum alias, tum si in super exudarint. Et subdit, quibus de repente dum sine febre sunt præcordij, & oris ventriculi dolor, & circa crura, & infernas partes, & alius in tumorem eleuata est, soluit venæ sectio. & alui fluxio his febre nocuum est, longe enim, & vehementes salubres fiunt, & tysses, & singultus, & spiritus fiunt. Et, dolores ad præcordia in febre, voce intercepta sine sudore soluti malum est, his ad coxendices dolores fiunt. Et, iuxta ventrem in febre palpitaciones, mentis emotiones inducunt. Et dolores in febre ad præcordia exilientes, si sine sudore soluti maligni sunt. Et durities circa vētrē cū dolore, in febrientibus cū horrore, cū bū auersantibus, si alio in super parū humectata purgationem non faciunt, ad suppurationem perueniunt. Et subdit, dolor in pectus firmatus corpore, malus in febre est. hi repente pereunt, ex lumborum dolore recursiones ad os ventriculi febriculofæ horrorem inducentes, alia verò ibi lege. Et in 1.4. aph. 27. quibus in febribus sanguinis multitudo alicunde eruperit, his dum reficiuntur, alui humectantur. Et apho. 29. quibus in febribus sextum diem agentibus rigores fiunt, difficilis sunt iudicij. Et apho. 30. quibus febris accessiones fiunt quacunque hora eas febris dimiserit, postero die eadem hora si inuaserit, difficilis sunt iudicij. Et apho. 34. si febricitanti tumore non exsistente in faucibus, strangulatio statim superuenit lethale. Et aph. 35. si febricitanti collum repente peruertitur, & vix deglutire possit, timore in collo non apparente, lethale est. Et m. 36. sudores febricitantibus si inceperint boniterio die, & quinto, & septimo, & nono, & vndecimo, & quatuordecimo, & decimo septimo, & vigesimo primo, & vigesimo septimo, & trigesimo primo, & trigesimo quarto. hi enim sudores morbum iudicant, qui autem non sic eueniunt, laborē significant, & longitudinē morbi, & recidiuam. & aph. 46. si rigor incidit febre non desinente ægro iam imbecillo, lethale. & aph. 51. in febribus abscessus si non soluantur in primis indicationibus longitudinē morbi significant. & aph. 52. qui in febribus, aut alijs morbis ex voluntate lacrymant, nihil absurdum est, qui uerò non ex voluntate,

absurdus. Et aph. 67. ei qui convulsione, aut distentione vexatus, si febris successerit, soluit morbum. Et aph. 61. febricitatem nisi imparibus diebus febris dimiserit, ea redire solet. Et apho. 62. quibus in febribus morbus regius ante septimum diem succedit, malum. Et aph. 63. Quibus in febribus quotidie rigores eveniunt, ijs quotidie febres solvuntur. Et aph. 64. quibus in febribus septimo, vel nono, vel undecimo, vel quartodecimo morbus regius successerit, bonum est, nisi dextrum hypochondrium durum fuerit, si verò non malum est, non bonum. Et aph. 65. in febribus circa ventriculum estus vehemens, & cordis morsus, malum. Et aph. 67. in febribus ex somnis pavores, aut convulsiones, malum. Et apho. 68. in febribus spiratio ostendens, malum: convulsionem. n. significat. Et aph. 69. Quibus sunt urinae crassae, grumosae, paucae, non sine febre existentibus, si multitudo ex eis advenierit tenuis, iuvat, praecipue autem tales ab initio exeunt, aut brevi sedime obtinent. Et aph. 70. quibus in febribus urinae perturbatae sunt, veluti iumentis alicuius, ijs capitis dolores, vel adsunt, vel aderunt. Et aph. 71. quibus in febribus die septimo iudicium fit, ijs nubeculam obtinet urina quarto die rubram, & alia, secundum rationem. Et aph. 72. quibus in febribus urinae perspicuae, & albae, malae, praecipue autem si in phreniticis appareant. Et aph. 73. quibus hypochondria elevata a lumborum dolore succedente, alui ijs humectant, nisi si status erumpant, aut urinae multitudo exeat, in febribus autem haec accidunt. Et in l. 6. aph. 40. Quibus circa hypochondria dolor fit sine inflammatione, ijs febris succedens dolorem solvit. & aph. 44. eiusdem lib. Quibus post straguriam ileos succedit, in septem diebus moriuntur, nisi febre subsecuta, satis urina fluxerit. & aph. 50. Quibuscumque cerebrum discissum fuerit, ijs necesse est febrem, & bilis vomitum succedere. & aph. 51. quibus sanis dolores fiunt repente in capite, & statim obmutescunt, & stertunt, moriuntur in septem diebus, nisi eos febris apprehenderit. & aph. 54. in acutis morbis qui cum febre existunt, luctuosae respirationes, malum. & in lib. 7. aph. 31. Quibuscumque febricitantibus in urinis veluti fagine crassae, subsidentiae fiunt longam egritudinem fore significant, & aph. 37. eiusdem lib. quicunque sanguinem vomunt, si sine febre salubre est, si verò cum febre malum. & aph. 52. Quibus hepar vehementer dolet, ijs si febris super venerit, solvit dolorem. Et in l. 1. de mor. n. 6. Febrienti, ac bilioso in tempore foras bilis bonum, diffusa verò, ac dispersa, & ad unam aliquam corporis partem allapsa malum. Et in l. prog. com. 3. par. 2. quibus febres cessant, neque signis solutorijs apparentibus, neque in

diebus indicatorijs, his reuersuras esse expectandum. quaecunque febris longiorem moram traxerit, homine alioqui ad salutem disposito, ita ut, neque dolor teneat ob inflammationem, aut ob aliquam aliam manifestam causam, hinc abcessum expectare oportet cum timore, ac dolore ad aliquam articulum, vel maxime infernum. Et in l. 4. aph. 53. quibus in febribus circa dentes viscosa adherent, his fortiores febres fiunt. & in l. 2. praedict. n. 23. in febrium principiis siue delirium accesserit, siue alicuius membri syderatio periturum hominem sciedum est, si non omnino, aut ex optimis signis aliquid accedat, aut corporis vires adsint. & in l. de Coac. præn. n. 4. cum febre, & sine febre egestio alui nigra velut sanguis, mala est. malae item omnes variae, abunde ex bile coloratae, & in l. prog. com. 3. quicunque in febre non laethali splendores ob oculos versari, cum praecordiorum in dextra, aut sinistra parte tensione sanguinis de naribus fluxionem significat, & in l. de Coa. præn. n. 4. in febre tenuis, ac mollis egestio mala est, mala quoque sicca friabilis decolor, tum aliàs, tum si aluum humectet. nigris verò antea egressis occidit. Et ibidem febres his exacerbatur, quibus ardor fit, & ad egressas egestiones alui insuper exudat. Et in l. 2. de mor. pop. sec. 5. si febre tenente partes circa faciem graciles fuerint in die impari, sequenti die solvuntur, sed ad curationem transeundum est.

Februm omnium curatio in genere.

Curatio vero omnium febrium fit coctione humoris, ut percipitur in l. de Vet. med. n. 32. & 33. concoctio autem fit, ut ibidem scriptum est, ex permixtione, temperaturaque mutua, & quasi coctura. Et in l. de lo. in ho. n. 36. Cum lassitudo occuparit, & febris, ac repletio, lavare multa aqua oportet, & oleo illinere, & maxime calfacere, ut caliditas, aperto corpore, praesudore egrediatur. consequenter autem haec facienda sunt per tres, aut quatuor dies, & si non sedetur, ac cesset, pharmacum in portu exhibendum est, quod bilem educat, & febris perfrigeranda est praeterquam quartana, medicamentum tamen, donec corpus floridum est, ne propinato: non enim vacuantur nisi parum, utpote corpore turgente. cum autem gracile fuerit, ac macilentum, tunc bibendum exhibe, & enacuabitur. Et sic patet in morbi principio lotiones faciendas esse, & medicamentum purgans minime exhibendum, & in eodem l. n. 30. In pleuritide autem febris scdanda non est per septem dies. septima lavandus est, aeger, si febris dimittere non velit, quod praebalneo sudor contingat. si verò neque septima dimiserit, nona cessat, si non aliud quod peri-

eulolum accedat, si dimiserit; triticeis sorbitio-
nibus vraris. In l. autem de Vict. ra. comm. 4.
par. 36. si febris hominem corripit, vetere ex
cremento descendente, vel nuper cibatum, siue
cum lateris dolore, siue nō, is quieti tantisper
permittendus, donec cibus ad ventrem immo
descenderit, & par. 39. obserua febrim accel-
siones, vt nunquam cum ad sunt, neq; cum fu-
turae sunt, sorbitiones exhibeas; sed vel cum
cessant, vel quieuerunt, & maxime à principio
recesserunt. frigentibus ergo pedibus, neq; po-
tū, neque sorbitionem, neque aliud quip-
piam huiusmodi dabis, donec valde in-
caluerint, deinde id, quod confert, exhibe. cau-
sam horum ibi lege. sic in li. 1. aph. 12. in accel-
sionibus abstinere oportet, nam cibum dare
noctuum est, & quibus per circuitum sunt ac-
cessiones, & aph. 19. His qui per circuitum ac-
cessionem habent, nihil dare oportet, neque
cogere, sed subtrahere adiectioni ante iudica-
tiones, & aph. 4. victus tenuis, & exquisitus in
morbis quidem longis semper, in acutis vero,
in quibus non cōuenit, periculosus. & aph. 7.
vbi morbus est peracutus, extreme tenuissimo
victu vtendum est, vbi nōn, sed pleniorē vi-
ctum contingit adhibere, tantum cibi indul-
gendum est, quanto morbus extremis est mol-
lior. & aph. 8. cum morbus in suo vigore con-
stiterit, victu tenuissimo vtendum est. & aph.
9. coniectare oportet, an æger cum victu suffi-
ciat perdurare, donec morbus consistat & c. &
aph. 17. & quibus semel, aut bis, & quibus plu-
ra ne, an pauciora particulatim oportet offer-
re, considerandum est, & aph. 10. In ipso con-
sistendi tempore, & parū ante illud cibus sub-
trahendus, prius verō vberius alendum, vt æ-
ger possit perdurare. Et sic habemus quo mor-
bi tempore sit cibandus æger. at illud aduer-
tendū est, quod legitur in lib. 7. aph. 63. si quis,
ait, cibum febricitanti dederit, vt sano robur,
sic laborati morbus. & in l. de lo. in hom. n. 39.
Febrienti cibum ne offeras, neque sorbitioni-
bus subtus aluum ducas. in potu dabis aquam
calidam, & aquam mullam, & acetum cum a-
qua, hæc autem quamplurima bibat, si enim
non frigidus ingressus fuerit potus calidus exi-
stens, ac manens, ex corpore ægroto detrahet,
& vel per vrinam deijciat, vel exudabit. vnde
quaque autem apertum, & respirans, & mo-
tum corpus, id, quod conducibile est, faciet.
Hinc fortasse ille apho. qui scriptus est in l. 1.
aph. 16. Victus humidus febricitantibus om-
nibus confert, maxime verō pueris, & alijs, qui
tali victu uti consueuerunt. sed & id notandū
est, fac dare his, quos caput dolet malum, item
febricitantibus, vt legitur in li. 5. aph. 63. præ-
terea inquit in com. 4. de Vict. ra. par. 44. cor-
pus quieti, permittere, vngere, & equaliter cō-

regere oportet, mullamque aquosam biben-
dam, & ptisanæ cremorem vesperi sorbendum
dabis, ventrem ab initio clystere duces, sed me-
dicamenta purgantia non admoueabis, nempe
si ventrem moueris, vrinā non maturabitur, fe-
brisque citra tum. sudorem, tum iudicationē
in longam protrahetur tempus. & par. 43.
quibus principio vrinæ, & nebulosæ, & crassæ
existunt, hos annuentibus cæteris purgare cō-
uenit, q; si vrinæ inter initia rennes fuerint, ta-
les autem ita curare confert. & in li. 7. aph. 49.
si febris non à bile habeat, aqua multa calida
in caput affusa, febris solutio sit, sed in l. de
mor. mul. nu. 58. cum mulieri partus purga-
menta non fuerint purgata, aut menses non
prodierint, aut vterus durus fuerit, si sine fe-
bre fuerit, balneis curato. ex talibus autem fe-
bres sunt acutæ. Et in l. de Coa. præ. n. 1. fe-
brem sedat conuulsio in ipsa, siens eadem die,
aut postera, aut tertia.

De febre continua.

Legitur in l. 1. de morb. popu. sect. 3. febres
quædam continuæ sunt, quædam interdū re-
nunt, noctu intermittunt, vel contra sunt au-
tem acutissimi, & maximi, ac grauissimi mor-
bi, ac maxime lethales in continua febre.
Prognostica sunt hæc. legitur in li. de Coa-
pre pag. 176. col. 2. in febre continua. quicun-
que voce destituti iacentes, oculis conuulsi
nisiāt, hi si postquam sanguis ipsis ex naribus
fluxit, & vbi vomuerunt, loquantur, & ad se
ipsos redeant, seruatur. & quibus in febribus
continuis, pustule per totum corpus erumpunt,
lethale, si non purulentus abscessus fiat, maxi-
me autem circa aurem his fieri solet. & febres
continue per tertiam diem augescentes peri-
culose. & subdit, qui diutius secure ex febre cō-
tinua laborant circa dolorem, aut inflamma-
tionem, aut aliam causam, his abscessus expe-
ctandus est cum dolore, & tumore, & magis
infernis partibus. expectare autem oportet ab-
scessus, his magis qui vigesimum annum egres-
si sunt, & tunc expectare abscessus oportet, vbi
viginti dies febris transierit, senioribus au-
tem minus sunt. & vbi multo tempore febres
durant, & n. 3. cum febre continua vesica du-
re, & dolentes, pessime sunt. Et in l. 3. aph. 21.
estate febres continue, & ardentes, & tertianæ,
plurimæ, & quartanæ. & in l. 1. de morb. popu.
sect. 2. in febre continua acutissimi, & maximi
ac grauissimi morbi maxime lethales, & in l.
de iudicatio. pag. 160. n. 9. in febre continua si
quis quarta die, & septima affligatur, & vnde-
cima non iudicatus fuerit, plerumque perit. &
in lib. 4. aph. 46. si rigor incidat febre non de-
ficiente, ægro iam debili, lethale est, & aph. 47.

Excretiones in febribus non intermittuntur
huide, cruentæ, fetide, & biliosæ omnes malæ,
& si bene exeunt, sine per alii excretionem, si
ne per urinas bonæ, si verò non aliquid eorū,
quæ iuuant, per hæc loca excernitur, malum.
& aph. 48. in febribus non intermittentibus,
si partes exteriores frigide, interiores uran-
tur, & si rim habeat, lethale est. & aph. 49. in fe-
bre non intermittente, si labrum, vel oculus,
vel nasus, vel supercilium peruertatur, vel nō
videat, vel non audiat, iā debili existente cor-
pore, quicquid horum euenerit, mors proxi-
ma est. & aph. 50. ubi in febre non intermit-
tente difficultas spirandi, & delirium accide-
rit, lethale.

At verò de continua febre curāda hæc pau-
ca scribuntur in l. 3. de mor. pag. 67. n. 36. si
febris neq; noctu, neq; interdū remittat, &
ad contactum supernas partes habeat calidas,
venter autem, & pedes frigidi sint, & lingua
aspera, huic medicamentum ne dederis, sed
molli infuso per clysterem soluto, & psillanæ
succum bis in die frigidum sorbendum dato,
& uinum aquosum insuper bibendum, reliquo
verò tempore aquam frigidissimam bibat. &
hic si quidem septima die exudarit, & febris
ipsum dimiserit, bene est, sin minus, decima
quarta die plerumque moritur. sic ait. & pro-
pterea quod supra dixit, si bile infestatur ho-
mo, hæc febris scilicet continua fit à bile.

De febre acuta.

Febris porro acuta, ut diximus, & sic appella-
tur, propterea quod sit continuo calida, uel
causa eius sit acuta, ut bilis, uel q̃a symptoma-
ta sint sæua. quapropter mirum non est, cum
tot modis dicatur acuta, si quādoque ex causa
extrinseca fiat, nā legitur in l. 2. de mor. po-
pul. sect. 2. Zoilo iuxta murum ex russi matu-
ra febris acuta. & in l. 3. de mor. pop. sect. 3.
Aegro. 3. ex laboribus, & lassitudinibus, & ne-
glecta mictus ratione, rigor magnus, & febris
acuta corripit, siticulosus, biliosus non dormi-
uit. reliqua ibi l. Et Aegro. 1. eiusdem lib. fe-
bris corripuit acuta, ab initio cōtinua, ardens
siticulosa, & c. sed in l. 1. eiusdem lib. sect. 3.
Aegro. 1. calefactus cepauit, & bibit amplius,
vomuit omnia noctu, febris acuta. & in l. 1.
sect. 3. Aegro. 9. Pedis dolor fortis à magno di-
gito cepit, & subdit, secunda die pustula nigre
febris acuta, insanit. Et Aegro. 10. Febris vehe-
mens corripuit, dolebat caput, collum, lum-
bos ab initio, subditque Febris acuta inuasit,
præcordium eleuabatur cum tumore, disten-
tio non valde, lingua sicca. Et Aegro. 11. Vxo-
rem, quæ filiam peperat, secunda die rigor cor-
ripuit. febris acuta, ac sympto. lege, & l. 7. n. 7.

Cœpit febris acuta, robur faciei ex nulla causa
manifesta, paulò post in die rigore habuit. &
Hos recitauimus acute febrientes, ut causa,
& symptomata innotescerēt, quæ ibi lege, &
in pluribus locis in l. de mor. pop. nā & in l. 1.
sc. 3. Aegro. 1. febre acuta primo die correptus
est, & Aegro. 2. secundo die febris acuta. Et Ae-
gro. 3. febris acuta. & Aegro. 4. octaua superri-
guis febris acuta. & Aegro. 5. postridie à partu
febris acuta, cordis dolor, & muliebriū par-
tum ubi verò glandem subdidisset, hæc quidē
leuiora facta sunt, & subdit, decima quarta su-
perriguis febris acuta.

Quibus verò fiant acute febres, & quo anni
tempore, scribit Hip. in l. 1. aph. 14. febres seni-
bus non similiter acute fiunt, sicut scilicet cre-
scentibus, frigidum enim eorum corpus. & in
l. 3. aph. 29. iuuenibus sanguinis spiritiones, fa-
bes, febres acutæ. & aph. 11. si hyems sicca, &
aquilonia fuerit, verum autem pluuosum, & æ-
strale, necesse est cōstare febres acutas fieri. &
aph. 14. si autumnus aquilonius fuerit, & sic-
cus, his qui naturam habent humidiores, &
mulieribus conferet, reliquis autem erunt lip-
pitudines sicce, & febres acute. & aph. 71. si
siccitatibus febres acute fiunt. & in lib. de æ-
aq. & loc. n. 25. lege quando hominibus, & qua
de causa febres acutissimæ maxime pituitosæ
accidant.

Prognostica verò sint hæc, si febris fuerit, &
venter non egresserit, conuulsiones pueris fiunt,
ut legitur in com. 3. prog. & febris acuta super-
ueniens conuulsionem soluit, ut legitur nati-
de Coac. præn. n. 3. sed n. 2. febris acuta, & bi-
liosis spiritus magnus post præcordiorum tu-
morem, abscessus circa aurem attollit. & in l.
de Dent. nu. 2. febris acuta, pueris in denti-
tione accedens conuulsionem quandam indu-
cit, & in l. de iudica. nu. 8. cum febre acuta su-
dores frigidi lethales, cum mitiore verò mor-
bi longitudinem, & in l. de præf. n. 2. cum fe-
bre acuta conuulsiones perniciose. & in l. 1.
præd. in morbis acutis biliosis valde albæ spu-
mosæ circumbiliosæ egestionem malæ. malæ itē
& vtiq; eiusmodi, nūm his hepar dolorosum
est. Et subdit, sitis, præter rationem soluta in
acutis morbis mala est, sudor multus cum fe-
bribus acutis, oborients malus est, & vtiq; do-
lorosæ malæ sunt. & in l. prog. com. 1. Qui febre
acuta manus subinde ob os fert aut frustra ve-
natur, muscas, aut colligit festucas, aut de ve-
ste euellit pilos, aut de pariete stipulas capit,
lethale est, & in l. de Coa. præno. pag. 177. col. 2.
cum febre acuta auris dolor pertinax, & aliis
quodam signo aliquantulum maligno, ite-
nes quidem septima die occidit, & cetera ibi
lege. Et in febre acuta aures obsurdescere fu-
riosum, & cum febre acuta tumores circa au-
rem

sem ex plurimis graueolentibus; & cum præcordio intecto tardius excitati occidunt & in febre acuta uocis intercepciones cum exolutione sine sudore sunt quidem lethales; minus uero quam cum sudore merum diuturnitatem temporis significat. fortassis autem; & qui ex recidua tale quid patiuntur, tutissimi sunt, perniciosissima autem ex talibus habent quibus sanguis ex naribus fluit, & quibus alui humectantur. Et bona autem spiratio in omnibus morbis, qui cum febre acuta sunt, & in quadraginta diebus iudicantur, magnum momentum ad salutem habet. & pag. 179. antehæsis febris postea acuta. Et ibidem pueris febris acuta & aluus suppressa cum uigilijs, & calcitrare, & colorem mutare, & ruborem habere conuulsorium est. & pag. 176. capitis dolor pertinax cum febre acuta, & alio signo maligno lethale. vii. d. 11. d. q. 3. 207451, 204

Febrium quidē acutarum curationē si desideras lege in l. de Affect. pag. 80. n. 12. & 13. & 14. sed hæc pauca nos addemus. scriptū est in lib. de Coacis præno. nume. 4. febrem acutam ex sudore soluit alui egestio pura superueniens. Et, ibidem, n. 3. febres acutas turbulento, non bilioso infanti os uentriculi dolenti solunt. & in l. 4. de mor. popu. n. 30. curatus hæmorrhoidibus insanuit, febre acuta succedente cessauit in febribus acutis siticulosi, à medicis potu interdicto, aut etiam à seipso abstinentes, in ultum sibi bibere posse uidentur, his aqua frigida data, ut renouant, prodest biliosa enim aderunt. lib. 1. d. 11. d. q. 3. 207451, 204

Febbris à bile.

SCRIBITUR in l. 2. de morbis pag. 67. si à bile infestatur homo; febris ipsum corripit quotidie ac dimittit. & in l. de Natu. hom. pag. 17. n. 27. Febres plurimæ à bile fiunt. species ipsarum quatuor sunt; præter eas quæ ab occultis doloribus generantur. nomina ipsarum sunt, continens, quotidiana, tertiana, quartana. Continens a plurima, ac meracissima bile prouenit, & iudicationes quàm breuissimo tempore facit corpus enim tempore perfrigeratū cito colliquescit, nimirum à multa caliditate calfactum. de Quotidiana, Tertiana, & Quartana suis dicemus locis. sed in lib. 2. de morbo. cito loco subdit. detinet autem febris à bile maxime in meridie; & os amarum est. & cum sine cibo manet, offendit ipsum. ubi uero ededit; strangulatur, & a modicis quibusquam cibis impletur, & abominatus; & nominationes ipsorum inuadunt, & ad lumbos, ac crura grauitas incumbit, & malum dormit. hic si post febrem exudarit frigidum, ac multum sudorē, & febre non liberetur, morbum diuturnum

sentiet. si uero non sudarit, citius iudicatur, cum sic habuerit, & ad nonum diem deuenierit, pharmacum dato; nam si statim a febris initio dederit, postquam purgatus est, febris reaperit, & rursus medicamento opus habet. ut si os non afficiatur, nerum ad imum uentrem tormen irruiat, pharmacum deorsum purgans bibendum dato, & postea lac asininum, aut serum, aut aliquem succum. si uero debilis fuerit, per clysterem eluito. ante medicamentum uero potionem si quis febricit, danda est ipsi aqua multa aquosa, altera autem die, qua febris detinet, aquam frigidam, quantum bibere uolet dabis. ubi uero remiserit febris, prileanē succo, aut milium tenue sorbeat, & uinum album, odoratum, aquosum bibat. si uero febris neque noctu, neque interdiu remittat, quid faciendum sit. supra de Febre continua. ceterum illud non est omittendum, quod legitur in l. 4. de mor. pag. 77. n. 25. & id est. si in homine fuerit aliquid morboſi, & ea quæ ex cælo obueniunt, in cōmoda fuerint, & caleſcat homo; turbatur humor omnis in corpore caleſcens; hoc autem uolentia facit, & si purgetur hoc, humore illo turbato, ſecernitur quantum eius plusquam commodum est; redundat; & quemadmodum lac conſuſum, ac turbatum ſpumefcit; ac ſecernitur, & butyrum in ſuperficie conſiſtit, cum leue ſit. graue uero; & craſſum deorſum. ſerum lactis medium locum tenet, ſic in homine dum turbatur humor, id quod leuiſſimum eſt in ſuperficie conſiſtit, & eſt bilis, ſecundo loco ſanguis, tertio pituita, grauiſſima autem horum humorum eſt aqua. his uero ita ſe habentibus, quiſquis plurius fuerit, in principio contingente turbatione, deuenit ad locum, ubi plurimus eſſe poſſit. in turbatione uero, ſpaciola capacitate euzdente, ſecreſus diſtrahitur, & calefacit corpus aut aliqua corporis parte firmatus, una cum alio humore cum quo eſt in alio loco, doloſrem, ac calorem exhibet. ille uero, qui calefactus eſt locus, reliquum quidem corpus calefacit, & ex hoc febris oboritur; & oboritur magis à bile, & pituita & ſanguine, calidiſſimi enim hi humores exiſtunt. ab aqua uero non ualde febris oboritur, neque diuturna, nam igni non bonum alimentum aqua præbet. ſic ſcriptum eſt de bile, & ſanguine, ſed poſſimum de bile, ut pote quæ ſit febrium cauſa materialis poſſima.

Cauſus.

CAUſus eſt febris ardens, & eſt duplex alter exquiſitus, alter nothus. ſic, ut ſcribit Hip. l. 2. de uict. ratione comm. 4. par. 1. cum uenula tempore æſtuo exſiccate acceſcit, & bilioſos, quæ

tenues sint trahunt ad se humiditates, quas ichoras vocant. sic in lib. 1. de mor. scribit. nu. 27. cum bilis commota fuerit per corpus, & contigerit, ut uenæ, & sanguis attrahant bile, eamque plurimam ex carnibus & uentriculo ad eum, que prius inest, utpote cum esiam natura calidissimus sanguis in corpore existat. cum itaque percaluerit ex carnibus, & uentriculo supra eum, quia inest adhuc magis à bile percalfacit etiam reliquum corpus, & quædā sanæ partes præ multa humiditate penitus resiccati nō possunt. si uero resiccate fuerint, homo moritur. extremæ uero corporis partes ut porē natura sicca resiccantur, & plurima humiditas ex ipsis oritur, & si ipsas contingere uelis, frigiditas comperies, ac siccas, quapropter hi, qui à febre ardente corripuntur, inter his quidem partibus à febre exurgunt, exterius autem frigidi sunt, & lingua, & fauces ab interio spiritus ac caliditate exasperantur, & ardescunt quantum autem in uentriculo, & in uesica inest bilis, quod quidem in uentriculo est, aliquando deorsum extrahatur, plerumque uero in primis diebus uomitur, aut in quatuor, aut quinque uomitur autem hæc de causa cum supernus uentriculus supercalefactus fuerit, attrahit in se ipsum, & sic uomitus, & ob hoc etiam ex febre ardente, & ex pleuritide, ad peripneumoniam maxime morbi trāsmutantur: ubi enim supernus uentriculus supercalefactus fuerit, trahit in se ipsum, & suscipit pulmo, & sit peripneumonia, & plerumque pereunt, nimirum debiles iam existentes, morbo alio nouo in super generato, dies transigere nequeunt, donec sputum in pulmone concoquatur. uerum ut plurimum pereunt præ debilitate. aliqui tamen euadunt, at quibus in uesica confluit quid bilis, his crassa yrina mingitur, crassa autem à pituita, biliosa uero alui egestio prodit, eo quod combusta sint ea, quæ sunt in uentre.

Causam autē recenset Hip. in loco dicto de morbis acutis par. 3. & inquit, sit ex magna parte oblongam sitim, & in lib. de aere, & ex. nu. 12. senioribus sunt febres ardentes ob uentris duritiem, humor autem, ut dictum est, bilis, & pituita, nam scribit Hippoc. in libro de mor. nu. 27. febris ardens corripit item pituitosos, hi.

Signa porro demonstrantia febrem acutam exquisitam explicat Hip. in li. de Vict. ratione dicto, par. 4. comitens. 4. his uerbis, sit & lingua aspera, sicca, & ualde nigra, utriusque morbus doler, deiectionesque liquidæ & palidæ sunt, urgetque sitis uehemens, & uigilie, atque interdum mentis alienatio, & par. 2. febris uehemens habet, hoc est, quæ multam, & acerrimam habet qualitatē propter naturam

tenuam, tenuium humiditatum, corpusque uelut ab ossentia lassitudine habitum laboris doletque propter tenuium acrimoniam, ut ibi ait Gal. & propterea exquisita febris ardens fieri uidetur à bile, natura uero à bile, & pituita, quoniam accidentia sunt remissiora, nam in prædicto com. 4. par. 13. inquit Hippoc. causi genus aliud, hoc est notum aliud solutio, sit magna, aspera, sicca, sitis, uigilie, defæctus, uigilie, & refrigerata extremata, & inquit signa prognostica habentur in libro aphor. 58. cuius uerba sunt, si febre ardente habet rigore superueniente solutio, & in lib. prors. par. 18. si in ardente febre aurium sonitus tum caligine fuerit, proneritque in partibus grauitas mēte ex melancholia aberrant, & in lib. 2. par. 35. dolor pectoris firmatus, & ægre auferibilis eum torpore malus, super febrientes, hi si acute ardent, moriuntur, & par. 48. in ardentibus febribus cum aliquantula perfictione & deiectionibus aquosæ bilis multæ, oculorum peruersio, signum malum tum aliis, tum si carochi fiant, & lib. 1. par. 7. qui in hypochondrio refrigerata febre ardentes reliquuntur tum aliis, tum in sudoribus mali sunt, & in lib. de Coacis, prænot. nu. 2. in febre ardente si alui eruperit mortale, ex alui dolore laboriose febris ardens perniciofa, tremores in febribus ardentibus, mentis percussio soluit in febre ardente, fluxio sanguinis ex naribus, quarta die mala est, si non aliud quid boni contiderit, uerum quinta minus periculosa, qui ex febribus ardentibus aliquantulum perfrigerantibus cum egestionibus alui aquosis, ac biliosis laborant oculis malum est, tum aliis, tum si stupidi fiant, febris ardens rigore super accedente soluitur, febres ardentes recidiuare solent, & ubi per dies quatuor significationem de se præbuerunt, postea exadant, si non septima die, febres ardentes, quatuordecim dies diiudicant, aut alligantes, aut perimētes, ex febre ardente abscessu purulento circa aurem non fiēte, non ualde seruantur, & postea inquit, soporosi ab initio exadantes, urinis concoctis ardentes, uerum citra iudicationem per perfrigescētes, & breui rursus ardentes torpidi soporosi, conuulsi perniciofi habent, & in lib. 4. aphor. 54. quibus plurimū sicca riles leuiter irritantes in febribus ardentibus sunt, non multum siti infestantur, eam sam uero cur si moriantur qui febre ardenti laborant, moriantur, narrat Hippoc. in lib. 1. de mor. nume. 30. & inquit, quicumque ex febre ardente moriuntur, oēs præ siccitate moriuntur, & resiccantur, primum quidem extremæ ipsorum partes, manus, ac pedes, deinde partes sicciores, ubi autem humiditas ex corpore penitus exiit, & resiccata fuerit, san-

sanguis quidem congelatur penitus, ac perfrigeratur: reliquum uero corpus exsiccatur; ac sic homo moritur. Quorum autem tempore anni magis febres ardentes fiant, declarat Hipp. in lib. 2. de mor. populi. scilicet in his uerbis: febres ardentes in aestiuis magis fiant, & in aliis temporibus sed resiccantur magis aestate. *et man.*
Sed etiam agrediamur febrem ardentem exquisitam hoc pacto curat Hipp. in lib. de Vict. ratione in mor. acu. com. 4. par. 5. huic aquae multaeque coctae, & aquosae quantum uoluerit bibendum dabis; quod si os amarum fuerit; uomere confert, & uentrem subluere; uerum si ad haec non aperiatur, lacte asine cocto purgabis. salum autem nihil, neque acre exhibendum; non enim descendet. sorbitionem uero nisi diuies indicatorij transierint non dabis, & si e naribus fluxerit sanguis; soluitur aegritudo; atque si sudores superuenerint indicatorij illegitimi cum urinis albis crassisque, & leuibus subsidentibus, & si abscessus aliquis factus fuerit; uerum si absque his soluitur reuertetur aegritudo, uel coxae uel cruris dolebit; expueritque crassa, si sanus est futurus. febrem uero ardentem non exquisitam, sed notham sic curat par. 17. causus hic, nisi sanguis e naribus fluxerit, uel circa collum abscessus fiat, uel cruris doluerit, & aeger sputa crassa excreauerit, haec autem adstricta alio fiunt, uel coxae dolor, uel pudendi liuor superuenerit non indicatur, testis quoque intensus indicatorius existit sorbitiones dato attractorias; hoc tandem curetur febris ardens huiusdem instrumentis cum quibus curantur morbi acuti; propterea quod & ipsa est morbus acutus.

Febris ardens.

DE febre ardenti, quamuis antea scriptum sit in cap. de Causo, tamen illi parti haec pauca addemus, quae ex libro. 2. de morb. pag. 70. n. 1. traduximus. uerba autem haec sunt. febris tenet, & sitis uehemens, & lingua aspera, & nigra; & cum uisore pallida, & sicca uehementer rubicunda; & oculi cum uisore pallidi sunt, & excrementum egerit rubicundum, & cum uisore pallidum, talem quoque urinam ingit, & multum. spiritus sepe transmutatur uelut ad peripneumoniam, & deliratur ex qua re cognoueris, quod peripneumonia sit. hic si quidem peripneumonicus fiat, & quatuordecim dies transgrediatur, sanus fit. si uero in decem, & octo diebus peripneumonicus fiat, quomodo sit curandus ibi L. Et in l. de Affect. pag. 80. nu. 1. febris ardens, siue causos cum habuerit, febris detinet, & sitis fortis, & lingua aspera, ac nigra fit a spiritus caliditate, & color subbiliosus fit, & sputa biliosa, aeger ex-

trinsecus frigidus fit. intrinsecus uero ualde calidus.
Prognostica autem sunt haec, leguntur in l. de Coac. preno. pag. 157. col. 2. quibus cum febre ardente tumores, somnolenti torpida sunt, his dolor in lateribus superueniens, & syderationis, & resolutionis modo occidit. & pag. 170. in febre ardente si alius eruperit, mortale est. Et, febris ardens ex alui dolore laborioso perniciofa. Et, in febribus ardentibus si aurium sonitus accedat cum uisus hebetudine, & grauitate secundum nares melancholico modo ab arrabile mente moentur sanguine ipsis non erumpente. Et tremores in febribus ardentibus mentis percussio soluit. Et in febribus ardentibus fluxio sanguinis ex naribus quarta die malum, mala est si non aliud quid boni eoinciderit, uerum quinta minus periculosa, & qui ex febribus ardentibus alui aquosus, ac biliosus laborant, oculis malum est, tum alia, tum si stupidi fiant, & febris ardens rigore superaccedente soluitur. & ibidem, febres ardentes recidiuare solent, & ubi per dies quatuor significationem de se praebuerunt, postea exudant. si in minus septima die, & subdit. febres ardentes quatuordecim dies diiudicant aut alienantes, aut perimentes, & ex febre ardente abscessu purulento circa aurem non fieri non ualde seruantur. pag. 177. abscessus iuxta aurem ex acutis morbis maxime in febribus ardentibus fiunt, & si non indicationem fecerint, & murescant, aut sanguis ex naribus fluxerit, aut urinae subsidentia crassam habuerint, aegri pereunt alia uero ibi leg. Huic conducit frige fatientia adhibere, & ad alnum, & forinsecus ad corpus cauendo ne inhorrescat, poriones quoque ac sorbitiones danda sunt frequentes, & paulatim, quam frigidissime, uenter autem curetur, & si quidem non tibeant quae insunt, infusa frigidissima per clysterem immittantur, aut quotidie, aut alternis diebus hic autem morbus fit a bile commota si intra corpus firmata fuerit, solet etiam in peripneumoniam transire, indicatur autem breuissimus quidem nona, aut decima die, longissimus autem decimaquarta, & si quidem transierit in peripneumoniam, pauci effugiunt, atque hi morbi acuti uocantur.

Et oportet hoc sic curare. in lib. de loc. homin. pag. 39. cum uero gracilem existentem febris uratur, manifestum est, quod non propter corporis tumorem febris occupat, & si non cesset, nutrire oportet, ac tumidum facere, & si neque sic conducatur, palam est quod non oportueris febre inducere. huc itaque medicamentum potare oportet, quod educat, qua febris parte magis haeret, siue superne siue inferne, & si quidem superne haereat, superne

fin inferne inferne. nihil autem minus oportet etiam debiles fortia medicamenta potare, sed similiter, aut solum sic, ut fortibus quidē forte, debilibus verō debile exhibeas. ardores verō potionibus, & sorbitionibus, quemadmodum febrem frigefactorio medicamento, exolvere oportet, camaro, s. aut alio quopiam huiusmodi, & si nauseam contrahat a frigefactorio, calfactorijs utere consequenter ubi verō non cesset, frigefactorijs rursus utere, at verō quæ frigefactorie potiones in febre ardē si conveniant, describuntur in lib. 3. de morb. pag. 74. nu. 29. atque ibi plures conficiendi eas leguntur modi de febre ardēti cum variis symptomatibus, si cupis, lege in lib. 7. de mor. po. n. 9. febris ardens acuta post capitis dolore legitur in lib. 3. Aegro. 9. & ibi quoque Aegro. 5. legitur alia febris acuta ardens. & Aegro. 7. aha. & Aegro. 12. alia cum plurimis symptomatibus, atque aliis in locis, quos diligenter lege: nam sparsim & causas, & signa, & symptomata reperies. sed l. Causus.

Febris erronea.

Febris corripuit erroneo modo, & quo modo, lege in lib. 1. de morb. popu. sect. 3. Aegro. 6. verum in lib. de Coac. præno. nu. 4. In febribus erroneis nigre in urina nubeculae quartanam indicant, & nume. 1. eiusdem lib. Febres intermittentes, & erroneo modo invadentes autumno maxime in quartanam leniter transseunt: & hoc magis his, qui triginta annos excefferint.

Febris lenis.

Febris lenis epialos. Græcis dicta legitur in lib. de superfc. nu. 24.

Febris lypirica.

Febris lypirica huius est naturæ. prodictum est in lib. 2. de morb. pag. 67. foris ad contactū febris debilis est, intrinsicus autem ardet, & lingua ipsius aspera est, & per nares, & per os spirat calidum: quinta die præcordia dura sunt, & dolor inest, calor qualis in morbo regio apparet, & crassam ac biliosam urinam ejicit, hunc si septima die rigor, & febris uehemens apprehenderit, & exudarit, bene est. sin minus, moritur septima, aut nona, corripit maxime hic morbus, & si non annus squallidus fuerit, cū sic habuerit, quotidie calida lauto, & aquam mulsam aquosam multam bibendam dato, & prisanæ succum frigidum bis in die sorbendum, a sorbitione verō uinum bibat aquosum, album modicum. Si verō aliis

non egerat, clysterem adhibeto, aut glandulā subdito. cibum autem ne exhibeas, donec febris remittat, ubi verō sedata fuerit, pharmacum deorsum purgans bibat: reuertitur enim quandoque morbus, si impurgatus permanse-rit, & amplius morbus hic rursus corripit, si sanguis nimium biliosus factus fuerit. at verō in lib. de Coac. præno. nume. 1. febres lypiricæ bilis fursum ac deorsum effusione non accedente non solvuntur. Fit morbus in capite quidam, ut legitur in lib. 2. de morb. nume. 16. cum quis liberatus fuerit a febre lypirica. Et nume. 49. eiusdem lib. in tabe dorsali teporis progressu, ut febres fortes ipsum corripuerint, perdunt febres lypiricæ. & in lib. de affect. pag. 80. nume. 14. si externæ partes non ualde feruide fuerint, verū internæ, & lingua aspera ac nigra sit, huic pharmacum ne dede-ris. curato autem frigefacientia adhibendo, & ad aluum, & ad reliqua corpus uocatur autem hæc febris est uosa. indicatur maxime undecima die, & decima quarta.

Febris nonana, septimana etc.

Febris nonana septimana, adhuc longior est & non lethalis, ut legitur in lib. 1. de morb. popu. sect. 3. harum curationes in l. Hip. nondū legimus.

Febris nocturna.

Febris nocturna non admodum lethalis est, verum longa, ut legitur in eodem lib. sed febris diurna, nocturna longior: quibusdam aut & ad tabem uergit, sicut est in lib. 1. de mor. popu. sect. 3.

Febris semitertiana.

Febris semitertianæ cōtingit, & acutos morbos fieri, & est hæc præ ceteris maxime lethalis, sed & tabidi, & quicunque ex aliis longis morbis ægrotant ex hac maxime ægrotant: sic obseruatum est in lib. 1. de mor. popu. sect. 3. at uerō in semitertiana anxietas, & nomitus, & simul horror, febre incipiente, ut legimus in lib. 7. de morb. popu. nu. 47.

Febris singultientis.

Febris singultientis signa, & curationem lege in lib. 2. de morb. num. 62. Et in lib. de Vict. ratio. in morb. acu. com. 4. & recitat medicamentum: postea subdit. Talis effugere non potest si non sudores iudicatorij, & somni æquales acceperint: & urinæ crassæ, & acres, aut ad abscessum morbus decubuerit.

Febris pestilens.

Febres pestilentes, ut placet Gale: uocantur ab Hip. pemphingodes, aspectu terribiles: manui mordaces, ut in lib. 6. mor. pop. sec. 1. hanc dat Hip. febriū diuisionē. febres alię mordaces sunt manui, alię mites, alię nō mordaces, sed post insurgentes, alię uerō acutę, sed quę à manu uincuntur, alię statim perurentes, alię in totum debiles, aridę, alię lalfuginosę, alię pemphingodes, aspectu terribiles; alię tactui humectę, alię ualde rubrę, alię ualde pallidę alię ualde liuidę, & id genus alię.

Febres diuturnę siue longę.

Febres diuturnę pueris, senioribus, & ad pubertatem accedentibus fiunt, ut scribitur in liaph. sect. 3. par. 27. Et in lib. de Indica. n. 8. febres diuturnę signa sunt in manibus palpitaciones, aut breues iudicationes in deterius. & in lib. de Coac. pręno. nume. 4. febrem diuturnam urina cruentā in principio micta significat turbata, cum sudore recidiuam. & nume. 1. Eiusdem lib. in febribus iudicationes impedite, ac sublata temporis quidem diuturnitatem inducunt, non autem perniciose fiunt, & in libr. aphor. sect. 3. part. 16. febres longę in pluiiarum multitudine plerunque fiunt. & in libr. prę. nume. 24. quęcunque febris longiorem morā traxerit, homine alioquin ad salutem disposito, ita ut neque dolor ob inflammationem aut ob aliquam aliam manifestam causam; huic abscessum expectare oportet cum tumore & dolore ad aliquem articulum, uel maxime infernum. & in lib. de Victus ratio. in morb. acu. solent autem longę hęc fieri febres; & impetuosos humorum de loco, ad locum illapsus habere, si quidem infernę partes frigida fuerint circa aures, & collum: cetera uerō ibi lege. & in lib. de Coac. pręno. nume. 4. in febribus longis tenuibus erroneis, urinam tenuium mictiones splenice fiūt. Et in lib. aphor. sect. 4. par. 44. quibus febres longę his tubercula ad articulos, aut dolores fiūt. Et in eodem lib. sec. 7. par. 63. etiam patet illud. & in lib. de Coa. pręn. n. 1. in febribus longis, aut tubercula, aut dolores in articulis fiunt. & si facti fuerint, non sunt inutiles. & in lib. aph. sect. 5. par. 64. lac in febribus longis conuenit.

Febris uehemens.

Legitur in lib. 7. de morb. popu. nu. 15. Theodori uxori in febre uehementi sanguinis erupcio facta est hyeme: reliqua ibi lege. & in 3.

sect. 1. Aegro. 2. Hemocratem, qui ad Notium murum: decumbeat febris uehemens corripuit. cępit autem dolere caput, & lumbos. & in 1. sectio. 3. Aegro. 7. Metonem febris uehemens corripuit, lumborum grauitas dolorosa alia uerō ibi lege. & in lib. de Coac. pręno. num. 2. febris uehemens, & delirium ex dentis corruptione lethale est. Scribitur in lib. aphor. sect. 4. par. 54. febres fortiores fiunt, quibus circa dentes in febribus uiscosa adherent. Et in lib. de Medi. purg. pa. 41. nume. 4. in febribus fortioribus bile à medicamento cōmota, æger neque bibens, neque sorbens plerunque perit. & ibidem, febre correptus, si prima die qua medicamentum sumpsit superstes maneat, & unā cum purgatione remittat febris sanus fit. & ibidem nume. 5. à febre forti correptus, si detinet medicamentum, ante meridiem nihil purgatur, à meridie uerō nimium purgatur, & perit. Et in lib. 2. de morb. nume. 37. foris ad contactum febris debilis est, intrinsecē autem ardet, & lingua ipsius aspera fit, & per os, & per nares calida spirat. reliqua ibi lege. Et lib. de Afectio. nu. 13. in febre fortis bilis per superiora, aut inferiora purgatio. & in li. de Medi. purg. pag. 41. nume. 4. febribus fortibus correptis, medicamenta purgatoria dare non oportet, donec remiserit febris: carnes enim ipsorum & uentres cum sint calidi, medicamentum adsumunt, & nihil depurgantur.

Febris hyberna.

Febres ex hyeme austrina, uere, & æstate siccis lege in lib. 2. de morb. pop. sect. 3. & in lib. 7. de morb. popu. nume. 10. Hermoptolomi uxori hyemis tempore febris; & capitis dolores, alia ibi leg. & in lib. de Victus ratione in morb. acu. nume. 48. si in febre hyberna lingua aspera fiat, & animi deliquia adsint, tali remissio febris contingere solet. & in lib. de Afectio. nu. 11. febrium hyemalium in acutis trāsitus fit, cum duo humores, bilis uidelicet, & pituita commoti ac inter se coacti partialicui ubicunque tamen contigerit allabuntur. Et ibidem febrium hyemalium siue ex uino, siue ex lassitudine, siue ex aliqua fiant causa obseruatio, & tutela quam ibi lege.

Febris vertiginosa.

Febres uertiginosę cum uoluntis, & sine uoluntis perniciose, ut pater in lib. de Coacis pręno num. 3. & in lib. de Victus ratione in morb. acutis, nume. 44. quibus in febribus vertiginis ab initio, & capitis pulsus fiunt, & urinae tenues, in his expectare oportet, ut ad iudicationes

siones febris febris exacerbetur, nec verò admirarer, si delirarent.

Tertiana febris.

Scriptum est in lib. de Affect. pag. 81. n. 17. & 18. morbi, qui in estate fiunt, sic fieri solent. cum corpus à sole fuerit calefactum; humectatur. humectatum autem egrotat, aut torè, aut ea parte, in quam pituita, & bilis incumbuerunt. si quidem igitur quis ipsos incipientes, curet; neque longi fiunt, neque periculosi. si verò non curet, aut male curet, & longiores fiunt, & sepe quoque occidunt. sed & tertianæ, & quartanæ febres ex talibus fieri solent. hæc morborum constitutio maximè quidem estate fit, aliquibus verò etiam hyeme. tertiana febris cum apprehenderit, si quidem videbitur tibi non purgatus esse; quarta die pharmacum dato. si verò pharmacum non videbitur opus habere; medicamenta in potu exhibeto, quibus febris aut transmutetur, aut desiciat. exhibeto autem velut scriptum est in medicamentis. & in apprehensione quidè. sorbitione, & potu nutritio; interposito verò tempore, cibus per aluum secedentibus. apprehendit autem plerumque non ita sepe. si verò non curetur; in quartanam transire solet, & diurnam fieri. at verò tertiana exquisita cito iudicatur, & non est lethalis, ut scribit Hip. in l. 1. de mor. po. sec. 3. Et in l. 4. aph. 59. tertiana exquisita in septem circuitibus, quod tempus longissimū est, iudicatur. Et in l. de Coac. præ. n. 3. tertiana exquisita in quinque, aut septem circuitibus, aut ad summum in nouem iudicatur. Et in li. 6. de mor. po. sect. 2. quæcunque tertianæ naturam habent, his nox molesta ante exacerbationem: quæ verò sequitur, tolerabilius plerumque est. Et in lib. de Coac. præ. n. 3. si tertia die cohibiti in febre, quarta exacerbentur, malū est, nū tales exacerbationes phreniticæ sunt. Et in lib. 4. aph. 43. febresq; non intermittunt si tertia die fortiores fiant, magisq; periculosa. quocunque autem modo intermiserint, periculum abesse significatur.

Quartana febris.

Quartanæ febres tertianis diuturniores sunt, quāto pauciore bilis parte participant, unde caliditas augetur: & propterea quod corpus in ipsis plus perfrigidescit id quod ab atra bile ipsis contingit. superflua adeo ut ægre frigus depelli possit: atra enim bilis inter omnes corporis humores viscosissima, & sedes diuturnissimas facit, quod autem quartanæ febres atra bilis participes sunt, vel hinc condiscere licet: autumno enim maxime homines a quartanis

corripiuntur, & in ætate a quinque, & viginti annis usque ad quadragesimum quintum. hæc, n. ætas præ omnibus alijs maxime a bile atra infestatur, & autumnī tempus omnium anni temporum ad eandem aprissimum est: quicunque autem extra hoc tempus, & ætatem a quartana corripiuntur, pro certo scire oportet eam febrem non fore diuturnam nisi quid aliud grauioris mali hominē infestauerit, hæc Hip. in lib. de natura hom. pag. 1. n. 28. & 29. in quibus probat febrium quartanarū esse atrā bilem materiā. in li. aut. prog. ait. Quartanæ magis fiūt his, qui triginta sunt annorum, & senioribus. signum autē quartanarū habetur in l. de Coa. præ. n. 4. hoc est in febris. nigre vrina nubeculæ quartanā indicat.

Quid verò prælagiendum sit de quartanis; scriptum est in lib. 2. de mor. po. sec. 3. his verbis. quartana securissima omnium, & facilissima, ac longissima est: non enim solum ipsa a se ipsa talis est, sed etiam ab alijs magnis morbis liberat. unde in lib. 6. de mor. pop. sect. 6. quartanā correpti a magno morbo non corripiuntur: si verò corripiatur prius, & accedat quartana; liberantur. & propterea in li. 5. aph. 70. a quartanis capti non admodum a conuulsionibus capiuntur. si verò prius capiantur, & quartana superuenerit, liberantur. Sed in li. 7. aph. 23. quartanæ effluunt plerumq; sunt breues, autūnales verò longæ, & maxime quæ ad hyemē pertingunt. Et in li. de Coa. præ. n. 1. quartanæ hybernæ leniter in acutos morbos transeunt. Et in lib. 6. de mor. pop. sec. 2. quartanæ sanguinis è naribus eruptiones egrè iudicant. Et in lib. de Coa. præ. n. 4. in quartanis male sunt egestionēs valde rubræ, & ruginosæ. & tales sanguinis fluxiones soporosæ sunt: ex his conuulsione moriuntur, nigris antea egressis.

Curatio verò legitur in lib. 2. de mor. pag. 67. n. 39. & est hæc. cum febris quartana ex alio morbo non purgatus apprehenderit; pharmacum deorsum purgans bibendum dato. de inde caput purgato. postea rursus infra purgato. si verò his factis non cesserit interpositis duabus inuasionibus: post purgationem infernā, multa calida ipsum lauato; & seminis hyoscyami milij magnitudinē, & mādragoræ tantundē, & succi sulphij triū sasarū magnitudinē & trifolij tantundem in vino meraco bibat. at, si firmum & sanum se esse putans ex lassitudine; aut profectione febre correptus ad quartanam deueniat, fomentis ipsis adhibitis aliū dato, in melle tinctū. deinde lenticulæ decoctū bibat, melle, & aceto mixtis. postquā autem repletus fuerit; vomat, postea calida: ipse ubi frigidus factus fuerit, cyceonē ex aqua bibat. vespere cibis mollibus, & non multis vritur, altera verò exacerbatiōe, ubi multa calida

laueris, & stragula ipsi integeris, donec exudet, statim veratri albi radices trium digitorum, longitudine, & trifolij drachmam, & succi silphij duarum fabarum magnitudinem in vino meraco bibat. & si vomitiones ipsum vrferint, vomat: sin minus; similiter post caput purgatum. cibus autem vtatur quam molissimis, & acerrimis. cum vero exacerbatio ipsum inuaserit; ieiunus medicamentum ne bibat. Et in lib. de affect. n. 19. si vero quartana apprehenderit, si quidem impurgatus fuerit; primum caput purgato; & interpositis tribus, vel quatuor diebus pharmacum sursum versus purgans dato in ipsa apprehensione. si vero ex his non sedetur: rursus interpositis diebus, multa calida lauato, & pharmaca, quę scripta sunt dato. potibus autem, & sorbitionibus, & reliqua dięta vtendum est velut in tertiana apprehendit autem hæc febris pluri mos multo tempore, alios vero pauco. & sit eum tertiana, tum quartana a bile, & pituita. Cur autē tertiana, & quartana alibi à me scriptum est, vim porro habet medicamēta in his febribus, vt potis his corpus in loco sit, in consueta caliditate, & frigiditate: & neque præter naturam calefiat, neque frigefiat. danda sunt aut velut scriptum est in medicamentario libro. Sed in lib. de loc. in ho. pag. 32. nu. 38. Febris perfrigeranda est; præter quam si quartana existat. In l. autem 7. de mor. po. pa. 149. nume. 24. Ouesianacti circa autumnum lippitudo: postea vero febris quartana. Incipiente quartana cibos valde auersabatur: in progressu vero libenter accipiebat. Et in libr. 6. de morb. popul. sect. 6. post pilorum defluuium quartana febris non vltra annum. & in li. 4. pag. 137. n. 5. post pleiadum occasum seruus Attici à quartana correptus stupidus sedatus est. Et in lib. 3. sec. 3. pag. 134. autumno, & sub pleiada rursus multi moriebantur quartanarij, at vero in lib. prog. comm. 3. par. 7. quartanę conditio ex eodem ordine est scilicet tertianarum: nam vt exponit Gal. in com. quartanę febris indicationes ex numero circuituum accidunt, & non dierum, quemadmodum tertianę.

De febribus, quas varia comitantur symptomata.

Febbris, quę post capitis affectum fiat, vel an recedat, vel comitetur, mentio fit his in locis. scribitur in lib. 1. de mor. pop. sect. 3. agro. 10. Febris vehemens corripuit. dolebat autem caput, collum, lumbos ab initio. & in lib. de iudica. nume. 2. Quibus in febre capitis dolor, & alia signa circulant, in his bilis dominatur. Et in lib. 1. de morb. pop. sect. 3. Agro. 14.

Melidię, quę decumbebat iuxta Iunonis templum, capitis, & colli, & pectoris dolor fortis cepit, statim autem febris acuta corripuit. Et in lib. 3. eiusdem lib. sect. 1. Agro. 2. Hermodoratem qui ad Nouum murum decumbebat febris vehemens corripuit, cepit autem dolere caput, & lumbos. Et in lib. sect. 7. par. 5. 1. quibuscunque sanis derepente dolores fiunt in capite, & statim voce intercepta iacent, astertunt, & in septem diebus pereunt, si non febris apprehendat. Et ibidem par. 50. quibus cerebrum dissectum fuerit his necesse est febrem, & bilis vomitum accedere. Et in lib. 2. prædic. nu. 23. febrem in capitis vulnere intercipere quarta die, aut septima, aut vndecima lethale est. alia vero ibi lege. Et lib. de cap. vulner. nu. 28. febre inuadente ex capitis vlcere, quid faciendum ibi lege. & in lib. de loc. in hom. nu. 44. febricitanti caput ne purgato; vt ne furiosus fiat. reliqua ibi lege.

Febris cum affectibus aurium. ait Hipp. in lib. 7. de mor. pop. nu. 5. Cydij filio circa solstitium hybernū rigor, & febris, & auris dextrę dolor, & capitis dolor. reliqua ibi lege. Et in lib. de Iudi. nu. 11. Quibus in febribus aures obsurdauerunt, his non soluta febre insani re necesse est. soluit autem sanguis è naribus erumpens, aut aluus biliola egerens, aut dysenteria accedens, aut coxarum, aut genium dolor. Et in lib. aphor. sect. 4. part. 60. quibus in febribus aures obsurdauerunt, his sanguis è naribus effusus, aut aluus exturbata morbum soluit.

Febris in affectionibus colli. scribitur in li. de Coac. præno. nu. 2. in omni febre malum est colli dolor, pessimum autem in his, quibus timor est, vt etiam insant. Et in libr. aphor. sect. 4. par. 35. si à febre occupato collo repente obuersum fuerit, & vix deglutire poterit, tumorem non existente, lethale est. Et in lib. 1. prædic. nu. 9. colli dolor malum quidem in omni febre, pessimum autem his, quibus timor est, ut insant.

Febris cum affectibus præcordiorum. Scribitur in li. de Coac. præno. nu. 1. febris ex præcordiorum dolore maligna sunt, sopor in his pessimus. Et in eodem lib. 4. febris dolores circa præcordia absque inflammatione soluit. Et nu. 3. in febre malus est dolor in pectus firmatus torpore. & nu. 2. in febre dolores ad præcordia exilientes, sine sudore soluti maligni. his ad coxendices dolores fiunt. & ipsis vna cum febre ardente aluus deorsum erumpens perniciosum est. Et ibidem. in febre ad præcordia dolores voce intercepta, sine sudore soluti, malum est; quibus derepente dum sine febre sunt, præcordij, & oris ventriculi dolor, & circa crura, ac infer-

nas partes, & alius in tumorem eleuata est. longe enim & vehementes febres fiunt, & tussis, & spiritus, & singultus fiunt &c. Et in lib. prædic. nu. 7. febres ex præcordiorum dolore maligne sunt. Et in lib. de Victus ratione in morbo. acut. nu. 45. Quibuscunque febres anxiosæ sunt, & quæ præcordia intendunt, & decumbentes in eodem loco decubitus non sustinent, & extremæ partes perfrigerantur, hi plurima omnino diligentia, & custodia opus habent.

Febris cum affectibus vocis. Inquit Hip. in lib. I. prædict. nu. 12. quibus voces cum febribus deficientes post iudicationem, hi tremantes, ac soporosi moriuntur. Et lib. de Vict. ratione in morbo. acut. nu. 50. cum febricitanti decima quarta die vocis interceptio accesserit, non cito solutio contingere solet, neque liberatio à morbo fieri, sed temporis diuturnitatem tali significat. Et in lib. de Coac. præno. nu. 2. in febre vocis interceptiones conuulsorio modo fientes ad mentis emotionem cum silentio deueniunt. Et ibidem. cum febre vox deficiens, & cum iudicatione intercepta, hi tremuli moriuntur.

Febris cum alio affectu scribitur in lib. de Coac. præno. nu. 1. in febribus inflata alio flatu non erumpere malum. Et in lib. I. de morbo. nu. 6. febrienti aut vulnerato alius resiccata malum. Et in lib. de Coac. præno. nu. 4. vna cum febre alius turbata sanguinosa modo, soporosos, torpidos non valde comitatur. Et in eodem lib. nu. 1. febres amburentes ad manum torpidæ, siticulosæ, anxiosæ, in his al-

no suppressa grauati exoluntur.

Febris cum affectionibus lateris. legitur in lib. de Coac. præno. nu. 3. cum febre diuturna lateris dolor, puris educationem fore significat. Et in lib. 7. de morbo. pop. nu. 47. Metoni circa pleiadum occasum febris, lateris sinistri dolor vsque ad claviculam. cætera ibi lege. Et in lib. de Coac. præno. nu. 3. in febribus iuxta lateris dolores consistentes citra notas, venæ sectio læsetur, siue cibum auerteretur eger siue præcordium sublime habuerit, &c.

Febres cum affectibus glandularum coniunctæ. febres omnes ex glandularum tumoribus male sunt. & febris ex glandularum copiosa fluxione legitur in lib. de Glan. num. 2.

Febris cum iactantia. quibus in febribus morbus regius fit ante septimum diem malum, ut patet in lib. 4. aph. 62. at verò aph. 64. quibus in febribus septimo, vel nono, vel undecimo, vel quartodecimo morbus regius succedit, bonum, nisi dextrum hypochondrium durum fuerit: si verò non, malum, i. non bonum. Et in lib. de Iudi. n. 3. desinente febre ardente si accedat morbus regius, non solet amplius exudare, neque vsquam alibi abscessum facere, sed sanus fit.

Febris in affectibus crurium. Scribitur in lib. de Vict. ratione in morbo. acut. nu. 49. quibus in febribus crura sunt tuberculosa, & hæc tubercula moram trahentia non maturantur, febribus persenerantibus, &c. talibus sanguis è naribus fluere solet. si quidem multus fluxerit, solutionem morbi significat: sin minus, morbum longum.

FINIS.

ORIBASII SYNOPSIS

AD EVSTACHIVM
FILIVM,

De Febris Liber.



De signis, quæ ab urina sumuntur.

Cap. Primum.



FEBRIVM diarium proprium, & inseparabile signum est urinarum in primo die concoctio, & caloris suavitas: post primam vero febris solutionem, certio rem earum cognitionem habebis: in hac enim

motus arteriarum ei motui, qui fuit in secunda valetudine, est omnino similis: cum nulla ex alijs febribus ad naturalem statum reuertatur: maximum quoque inditium est, cum æger facile fert. His febribus opportuni sunt, in quorum corpore quod transpirat, non halituosum, sed acre, ac veluti fumosum est: huiusmodi sunt, quorum calida est natura, atque sicca, & ad summam, biliosi. Qui igitur ex lassitudine in febrem inciderunt, pingui ter, & molliter sunt perfricandi, & ad balneum ducendi. Qui ex siccitate, minus fricandi sunt illi quidem, sed lauandi sunt liberalius. Qui ex curis, mororibus, vigiliis, atque ira febricitant, non sæpe lauandi, sed multo oleo repido, cui minime adstringens vis insit, fricandi paululum, & ex consuetudine lauandi. Qui vero ex unctione febricitant, protinus ab initio refrigerantibus curandi sunt, & cre-

brius lauandi, minime tamen eis largo oleo, & frictione est opus: sint autem refrigerantia rosaceum, & omphacinum salis expers: eadem vero refrigerantia si incipit vehementer oportet infundere, & cum febris inclinauerit, lauare: si quis vero ex frigore febrim contraxerit, is etiam in declinatione lauandus erit, si vero febris, & destillatione, grauedineque vexetur, prius quam hæc concocta sint, lauandus non est: at qui propter unctionem febricitant, ij vel cum hæc adsint, lauari debebunt. A balneo vero amborum capita ijsdem madefacienda sunt, atque eorum quidem quibus ictio febrim attulit, refrigerantibus, ijs vero, quibus frigus, calefacientibus, quæ sint mediocria, quale est irinum, & nardium unguentum. Quibus vero mearum constipatio febrem excitaui t, ijs balnea dulcium aquarum, temperatarum conueniunt: tum frictio rarefaciens, & exercitationes, & victus succis dulcibus procreandis idoneus. Qui vero ob inedia m febri correpti sunt, eos ubi prima accessio remisierit, in balneum perducas, & plurimo oleo repente perfundes, tum mitissime fricabis, & diutissime in calida solij aqua detinebis: simulatque exierint, seque recollegerint, in balneum introducendi sunt deinde aqua calida potui danda; mox ptisanæ cremor offerendus, quandoque etiam lactuca, & pisces, qui molli carne sunt, ex albo iure. omnium autem communis victus species esto, quæ boni succi sit, & quæ facile concoquatur, & quæ nusquam meatibus inhereat. Vinum dandum quod

rum.

tum aspectu, tum viribus sit aquosum. In primo autem accessionis insultu nonnulla horum quandoque mutanda sunt in ijs, in quibus corporis intemperies ad calidum, siccumque conuersa febres gignit. Qui vero ex bubonibus febricitant, ij ne medicum quidem interrogant, quid facto opus sit, sed vlceri, a quo excitatus est bubo, prospicientes, vbi accessio declinauerit, lauantur; ijs vinum circumcidendum est, donec bubo fuerit solutus: suntque tenuiore victu nutriendi.

Ex Galeno de putridarum febrium notis.

Cap. II.

Putridarum febrium notę sunt hæ: vt nulla causa euidentis præcesserit, vt neque a rigore febris inceperit, neque ab æstu, neque frigore vehementi præcedenti, id quod non secus est putridarum febrium proprium quam etiam pulsuum depressio: sic enim nominant, cum incipiente accessione pulsus admodum exigui, & inæquales sunt: quod quidem est, huiusmodi febrium proprium vel maxime: porro caloris qualitas maxima est putridarum febrium nota: ita enim fuliginosa est, vt vel tactum erodet: maxime vero proprium harum febrium est vrine cruditas, & obscura concoctio: magnum vero, & notabile concoctionis inditum in vrinis nūquam in hisce febribus apparet.

Curatio febrium putridarum.

Cap. III.

Ergo si vires eius, qui ex putredine febricitat, valentes sint, mittendus statim sanguis est, si cruditas ventris non sit, sin vires sint infirmę, etasvè prohibeat, non erit incidenda vena: corpore euacuato putrida per vrinas, aluum, & sudores expurganda sunt: sin autem sponte sua nonnunquam ad ventriculum impetu ferantur, etiam per vomitum: alioqui non sunt præter naturam irritanda. Materię autem deligi debent huiusmodi, quę non valde calefaciendo, & siccando predictas euacuationes perficiant: cuiusmodi sunt prissanę cremor, aqua mulsa, oxymel, apomel, & apij radix: si alius non deijcit, clystere ex aqua mulsa cum oleo ciebitur. Totum vero corpus, prius quam vacuatum sit, rarefacere non oportet: vbi fuerit euacuatum, licebit rarefacere medicamento, quod tepidum calorem ha-

beat, quale est, quod ex chamemelo conficitur. Hoc etiam tempore vinum aquosum potui datum omnes excretiones mouet: itemque balneum aque dulcis temperatum. Verum cum febris magnitudo obstet, tum neque vino, neque lauacro, neque vnctione rarefaciente vtendum erit: sed aqua frigida in his febribus potui data est accommodatissima, nisi etiam aliquid huius vsus impediatur: ergo si omnes vires robustę sint, febrisque ardentissima, & euidentia signa concoctionis appareant, frigidam cum fiducia dabis: adhuc vero si bonę habitudinis homo sit, calidaque, & sicca sit constitutio, etiam si in frigidam nationem hunc dimiseris, nihil ledes: sin autem mediocris sit febris, viresque inualidę, vnā cum signis concoctionis, & balneum, & vini potio, & omnes vnctiones rarefacientes ijs profunt.

Signa tertiana.

Cap. IIII.

Tertiana febris cum ex motu flauę bilis exoritur, statim ab initio rigorem non paruum infert: differr autem a rigore quartanę, quod pungere, & conuulserare cutim videatur: in quartanis autem accessionis ingressio uehementiorem perfrictionem habet: quotidianas vero non rigor præcedit, sed corpus modo perfrigeratur. In tertiana autem est etiam exquisitus ordo pulsuum: eaque in statu sitim vehementem affert, atque hominem exurit, & paulo post consistit, calorque per omnes partes equabiliter diffunditur: si manum iniicias, primo contactu calor copiosus, & acer, ac veluti cum vapore quodam elatus, occurrit: sed paulo post a manu vincitur. Cum vero eger biberit, statim copia vaporis calidi ex cute prodit, quę sudores fuitros nunciat, vomitus flauę bilis apparet, aluus soluitur, biliosa per vrinam excernuntur: præterea ad integritatem febris peruenit, vbi tempus accessionis non plurimum, quam duodecim horarum compleuerit: ergo quę duodecim horis terminatur, exquiritam tertianam nominamus: quę nero diuturniorem accessionem habet, eam simplici uocabulo tertianam appellamus, atque accessionem habet longissime productam, & exiguum interuallum intercedit: ea tertiana extensa nuncupatur.

Tertiana curatio. Cap. V.

TERTIANA febris exquisita; utpote quæ à flaua bili procreetur, humectanda, & refrigeranda est. quodque in ventrem influit, vomitibus; quod ad inferiora vergit, alui excretionibus euacuandum. & item per vrinas, atque sudorem educendum. alius igitur mollioribus clysteribus cienda est, vrina vero potionibus, in quibus apium, & anethum maduerint prouocanda. Si que signa concoctionis appareant, cōfidenter absinthium dabis. Balnea profunt ex aqua calida potabili, in quibus neque nitrum, neque sal, neque sinapi, sint inspersa, sed oleo maxime calido infuso æger est in balneum ducendus. Qui balneis valde oblectantur, eos etiam si bis laueris, non errabis. Si vero signa concoctionis morbi se se ostendant, etiam si sæpius laueris, nihil delinques. A vino autem, prius quam morbus concoquatur, omnino abstinendum. ubi vero concoqui cœperit, tenue, dilutum, & modicum ab initio dandum, cibi, quicunque humectant, & refrigerant, accommodati sunt. porro à melle, sinapi, fassamentis atque acris omnibus, & à vinis natura calidis abstineri ægrum oportet.

Tertiana notha curatio.

Cap. VI.

IN nothis hisce febribus in initio lauare non expedit: sed cum iam coctionis signa se nobis offerant, neque cibis est quotidie dandus, sed alternis diebus satis est. Quies & forus præcordiorum, & sorbitiones concoctu faciles, & clysteres non admodum molles iuuant. Si vero sanguinis mifione opus sit, ne hac quidem erit omittenda. Sit autem tota victus ratio, non quæ refrigeret, humectetque, sed etiam modus aliquis qui magis calefaciat, atque incidat, adhibeatur. maxime vero conueniet pistanae cremor iniecto pipere, vel hyssopum, vel origanum, vel spicam nardi multa aqua infundens, & decoquens potui dabis: itemque alia omnia, quibus vrina cieri potest, præter ea quæ vehementer calefaciunt, & exsiccant. Maxime vero post septimum diem absinthij coma danda est. iam oxymel quoque eorum multos iuuat; & nonnulla etiam ex ijs, quæ alium leniter subducunt. Vomitus autem à cibo iis, in quibus hæc febris inueterarit, vtilissimus est.

Quartana cognitio. Cap. VII.

QUARTANA febris cum magna refrigeratione inuadit, ut quæ ex frigido humore atræ bilis originem ducat. Calorem vero, atque feruorem, sicut tertiana, non habet: immo vero neque bilis vomitus eam comitatur. Si præterea vrinae albæ tenuisque sint, quartana febris erit. eximium vero quartanæ inditium fuerit pulsus tardus, atque rarus.

Quartana curatio.

Cap. VIII.

QVI febrem quartanam habent, leuiter tractandi sunt, eisque neque medicamentum vllum vehemens dandum, neque tentanda vacuatio; si non vtrique sanguis redundare videatur: quo casu secunda vena est. Victus optimus, & minime inflans instituendus. & venter emolliiri consuetis rebus debet. si nihil hæc proficiant, mollioribus clysteribus in principio, deinde vero acrioribus agetur. Suilla caro ipsi est circuncidenda, itemque omnes cibi glutinosi, quique tarde permeant: & denique omnes, quicunque refrigerant, atque humectant. Vinum conuenit, quod tenue, albumque, & modice calidum est. Salis & sinapi vit expedit: tum aliquot diebus interpositis medicamentum ex tribus piperibus, aut quod diospoliticum dicitur, sumere. piper quoque solum ex aqua quotidie recte capitur. Si æger in morbi principio sit, tenuiore victu alendus est: statim vero etiam diuturna quies imperanda: visceribusque prospiciendum est per ea, quæ molliunt, atque relaxant. post vero vtendum erit medicamenti, quæ vrinam cient: sique signa coctionis appareant, tum melancholici humores purgandi sunt: ijque non semel tantum, sed etiam per sæpe. post validam vero purgationem, medicamentum quod ex viperis constar, dandum erit. & item alia, quæcunque ad huiusmodi febres commendantur, inter quæ est etiam nobis familiare, quod ex cyneraico succo conficitur.

Quotidiana febris signa.

Cap. IX.

QUOTIDIANA vero febris non statim primo die cum rigore inuadit, sed temporis progressu perfrigeratio potius, quam rigor exoritur. ægre vero inualefcit, & incrementum diuturnum habet.

agrotantes tamen non exurit; neque multum, & crebro trahere spiritum, neque ex ore exsufflare, neque frigidam bibere compellit. Pituitosi vomitus fiunt. quæ uero aluo excernuntur, frigidiora, crudiora, & dilutiora in hisce febris inuenies. sudores primis diebus non emittuntur, neque ad integritatem veniunt. Calor est ex pallido, & albo mistus. urinae tenues, & albæ, vel crassæ, & turbulentiæ, & rubræ sunt.

Quotidianæ curationis. Cap. X.

Quotidianam curantes oxymelite primis diebus utimur. itemque iis, quæ mouere ualenter urinam possunt. tota uero ratio victus ad incidendum dirigatur, circa statum est habenda ventriculi, & præsertim oris ipsius ratio. deinde ægris iubendum, ut radícula, & cibus assumptis vomant. & ijs, quæ vacuant pituitam; utantur.

Febris continuarum inditia.

Cap. XI.

Continuæ febres singulis intermittentibus finitimæ dicuntur. ac tertianæ quidem exquisitæ ea quæ exquisita ardens est, quotidianæ ea, quæ singulis diebus habet accessiones, neque ad integritatem redit. sic etiam quartanæ ea, quæ quarto accedit die. Exquisita enim ardens cum alia omnia exquisitæ tertianæ febris inditia seruet, in hoc solum ab illa differt, quod neque cum rigore inuadit, neque ad integritatem redit. Ea quoque quæ singulis diebus accenditur, omnia signa quotidianarum habet, nisi quod ad integritatem non peruenit: quæ in re ab ipsa quotidiana, quæ specie consimilis est, discrepat. Præterea quæ quarto quoque die accedit, neque ad integritatem cessat, eiusdem generis est cum quartana. Est ergo febris continua, quæ non prius ad integritatem finitur, quam omnino fuerit soluta. Cum autem nulla inclinatio appareat, hæc quoque ex ardentium est genere: sed ex eo quod illa acuta est differt.

Continuarum febris curationis.

Cap. XII.

Continuarum febris curationis est missio sanguinis usque ad animi defectionem, qui si non fuerit missus, qui eam febrem habent, ad extremum periculum deducuntur. Si quid

autem euacuare per venæ sectionem prohibuerit, alijs utendum est remedijs, quæ aperiant, materiæ copiam vacuent, & febrium feruorem leniant. Cum uero signa coctionis humorum perspicias, neque in principe particula inflammatio aliqua, aut tumor cedematis, aut scirrhii speciem præ se ferens fuerit, neque particula aliqua adeo frigida, ut noxam ipsa contrahat, audacter aquam frigidam bibendam propinabis, præsertim uero sieger eius assuerus potioni sit.

Ardentium febris cognitio.

Cap. XIII.

Ardentes febres hæc comitantur, lingua arida, scissa, & nigra, ventriculi morbus, deiectiones pallide, sitis vehemens, vigiliæ, & nunquam delirium.

Ardentium curationis. Cap. XIV.

In febris ardentibus, si perfecte morbus solui debet, horum alterutrum faciendum est, aut biliosos humores excerni, aut extinguere. excernuntur autem aut sudoribus, aut vomitibus, aut per aluum. extinguuntur uero frigide potione, quæ nos febres ardentes ex toto curauimus. Victus autem ardentibus laborantibus conueniens non ex aqua sola, neque ex sola multa, sed ex diluta multa coctato nam qui hoc morbo conficiuntur, sola potione non alendi. Balneum uero ardentem febrem habentibus solum conuenit ijs, qui tumorem inflammationis, aut erysipelatis speciem referentem nullum habent, ac tum maxime conueniens, si coctionis signa appareant. ijs uero qui propter salsum succum ardente febre sunt correpti, minime accommodatum est. Sed eos cremore etiam pituitæ nutrire conueniet.

Febris, quæ ex affectione erysipelas refert, uerente originem trahunt, curationis.

Cap. XV.

In febris, quæ ex affectione, quæ erysipelas refert, exoritur, a balneo est omnino abstinendum. aqua frigida per morbi statum vehementi, hoc est frigidissima utendum est, in principio non item. Sed refrigerantia foris imponuntur, si quæ nihil hæc inuerint, etiam intra corpus sumere cogentur. ijs autem humide lactucæ præcipue conueniunt. extrinsecus uero ipse lactucæ succus est accommodatus, itemque semperuium, & reliquæ refrigerantia.

tia. hoc autem ut præstantissimo vitur, vel maxime humorem alicuius refrigerantis expressum in pilam cum portulaca iniicimus, deinde his contulis exprimimus, vasque in aqua gelida statuentes cum usus exigit, parum polentæ tenuis admiscemus: tum linteum conduplicatum hoc medicamēto intrinsecum extrinsecus præcordijs admouemus. idque diu adhærere nō sinimus, sed aliud frigidum subinde adhibemus. ceterum huic medicamēto quandoque omphacium, aut rosaceum oleum admiscemus.

Hæcticarum febrium cognitio.

Cap. XVI.

Hæctica febris non solum in humoribus, spirituque, sed etiam in solidis partibus consistit. hæc dolore vacat: quique ea derinentur, se omnino non febricitare existimant. calorem enim non sentiunt, cum particulæ omnes corporis sint in eis æqualiter calefactæ. Hæcticarum sunt duo genera: quorum alterum ardentibus febribus magna ex parte supervenit. quod usque adeo protrahitur, ut tractu temporis madorem corporis cordis, etiam si copiosus adhuc sit, consumat. alterum genus est, quod manens adhuc humore cordis corpus occupans inde accenditur. hæcque est una febrium hæcticarum origo nobis exposita: reliqua est, cum ab initio protinus inuadit, primam originem diarijs similem sortita ex mœnore, ira, & lassitudine nimia una cum exultatione contracta. Atque has febres haud difficiliter curabimus. Quæ verò ex ipsis ad marcorem perueniunt, sanescere nullo pacto possunt. facillime autem cognoscuntur, nam eorum oculos cauos præter modum videbis, crassiorem pituitam siccam ipsis inherentem: squalidam affectionem quandam. vitalis flos coloris evanuit. frons sicca est, atque intenta. conniuentque plerumque ut dormituri entes. verum affectio non somnus est, sed quia vigilare non possunt. præterea collapsa sunt tempora. nam quid porro aliud præter ossa, cutemque solam habent? hos si nudaveris, & partes ventris inspexeris, profecto in eis neque intestinum, neque viscera vlla tibi superesse videbuntur. præcordia verò sursum vehementer conualluntur, cutisque ipsa est ad summum resiccata. pulsus gracilis, durus, & crebor, calor vero primo contactu, languidus, paulo postacer, & erodens ostenditur. Ita fit, ut usquedum aliquid humiditatis superest, hæctica sola febris sit, cum vero periclitatur, ne quid præterea huiusce humiditatis reli-

quum sit, tum exquisitus marcor iam effectus est.

Hæcticarum febrium curatio.

Cap. XVII.

Qui febrem hæcticam habent, statim ab initio nutrirī propter humores erodentes desiderant, maximum vero remedium est victus humidus. oportet igitur cremore prissanæ, & alicę sorbitione egrum nutrire, & panis aliquid adde, eumque porione, non vehementer, sed moderate frigide, curare; cum neque inflammatio aliqua, neque humorum subest putrefactio. Si vero magnam fore noxam coniectura consequeris, à frigide porione abstinendum est, utendumque ijs remedijs, extrinsecus imposita refrigerandi vim habent. Balnea vero huiusmodi egroris in quocunque tempore conueniunt.

De semitertianis, quæ hemitritæ dicuntur.

Cap. XVIII.

Cum tertiana cum rigore, quotidiana vero citra rigorem inuadat, quæ ex his utrisque constat, horrorem affert, qui rigore quidem est minor, & perfrictione certè maior: quæ res coniunctis inter se extremis efficitur, ex quo fit, ut non immerito huic febrī semitertianæ nomen sit impositum. Duplici autem modo gignitur, vel enim due accessiones in idem tempus concurrunt, vel statim ab initio ambæ inter se commiscuntur. Cum igitur tertiana superat, plus horroris accidit, eidemque in accessione non nihil rigoris adiungitur: protinus vero hæc calidior est, atque ardentior: & aliquem bilis vomitum, vel excretionem, vel madorem inducit cum vero altera pituitosa superior est, tunc frigus partes extremas exercet, exiguique horrores sunt, quin ne siticulosi quidem sunt, neque æstu conflantur. ac cum patres sunt tertiana intermittens, & quotidiana continua; tum accessionis ingressus cum horrore accidit, cumque febris orta ex pituita excellit, contractiones pulsum, horroresque fiunt; cū vero calidior præstat, subito incalescunt, atque ea quidem ex exquisita semitertiana, quæ ex pari mixtione duarum febrium, tertianæ intermittens, & quotidianæ continuæ exoritur, non exquisita uero maiorem biliosi, aut pituitosi humoris habet copiam.

De morbis publicis. Cap. X. I. X.

Morbus publicos, communesque nominat, qui multis simul accidunt: quorum ut origo, ita etiam est causa communis. Cibi igitur communes prauis, communes morbos pariunt: potio item aquae uiciata, nimiae ærumnae, consueti labores omitti, inedia, repletio dum fames uagatur, aut cum summa est annonae uilitas: regionum quoque naturae communes morbos inferunt, quæ interdum palustres sunt, nonnunquam barathrum uicinum habent, quod exitiosum, prauumque vaporem exhalat, atque hæc quidem accidere continenter consueuerunt. Aer uero nos circumstans, qui tum calidior, quam par est, tum siccior, tum frigidior, tum humidior effectus naturas nostras continuo mutat: in alias namque causas neque omnes simul incidimus, neque in eis totos dies versamur: at aer nos ambiens, & omnibus est foris circumfusum, & per inspirationem attrahitur: ergo necesse est corpora animantium pro aeris temperaturæ commutationibus affici. Hæc qui norit, non solum qui morbi in quaque constitutione futuri sint, prælagiet: sed etiam contrarium immoderati circumflui aeris temperaturis uictum instituens, ne fiant prohibebit. Corpora autem quæ morbo alicui ex propria intemperie uicina sunt, ea à simili circumdantis nos aeris temperatura deprehenduntur: quæ uero temperaturam cælo contrariam sortita sunt, ea præterquam quod ab aere non afficiuntur, fiunt meliora, cum temperatura contraria immoderationem corrigit: quod qui cognoscit, secundum ualitudinem rubeatur, contraria corporibus inducens, partim refrigerantibus, aquæ perfusionibus refrigerans, itemque ocio, & alimentorum penuria, & portione largiore: calefaciens autem operimento, laboribus, cibo liberaliore, & quandoque parcior. Iam uero si quis pyram incendat, is non mediocriter aëre prius humidum, ad calidum, siccumque; permutauerit: quemadmodum aiunt Acronem Agrigentium fecisse.

De pestilentia ex Ruffo. Cap. XX.

In pestilentia terribilissima sunt omnia, neque quicquam, ut in singulis morbis, occurratur: nam & deliria, & bilis uomitiones fiunt, & multi sudores erumpunt, & extrema algent, alui profluentia biliosa, tenuia, flatibus plena urgent, urinae excernuntur aquosæ, tenues, biliosæ, nigrae, quæ mala habent subsidencia, quæque in eis innatant, pessima; sanguinis è naribus destillationes fiunt, pectus æstuat, lin-

gua torrida, siticulosaque, tristitia oboritur, itemque uigiliae, conuulsionesque uiolentæ, & alia permulta praua, & exulcerantia: atque in pestilentia quidem aliquid quod terribile non sit, terribile, contraque quod alioqui terribile est, non terribile fiet. Si quis uero futuram pestem prospiciat, animum attendens ad anni tempora, quæ mala sunt, ad uitæ studia bonæ ualitudini minus conferentia, & ad ceterorum animalium interitum, cum hæc diligenter animo uoluerit, illud etiam debet perpendere, qualis sit præsens temporis constitutio, qualis denique totus sit annus, quibus ex rebus uictus rationem optime sciet instituere: ueluti cum tempus siccum esse deberet, siquidem recte processisset, nunc humidum factum sit, uictus ratione exficcare necesse est, ut superuacaneus humor absumatur. Ventris quoque cura habenda est: quibus autem superior uenter piruitam continet, eos uomitibus euacuare: quibus sanguis redundat, uenam secare oportet: itemque purgatio per uiam, & ceteræ omnes ex toto corpore factæ utiles sunt: si uero agrotus ardore æstuet, flammaque ad pectus usque pertineat non ab re fuerit super pectus imponere refrigerantia, & frigidam offerre potionem, eamque non paulatim, siquidem magis incenderet, sed affatim, ut flammam restinguat: si uero ardor interiora occupat, extremaque algent, & summa cutis est frigida, præcordia tēduntur, ueter colliquationes partim sursum, partim deorsum mittit, uigiliae urgent, deliria fiunt, lingua est aspera, iis calefacientibus opus est, ut calor per totum corpus distundatur: & ut ab interioribus partibus ad exteriores trahatur, quacunque fieri ratione poterit enitendum.

De ijs, qui ob crudorum humorum copiam in syncopen cadunt. Cap. XX.

Febriticare quidam incipiunt, cum magnâ crudorum humorum copiam ore uentriculi simul offenso congesterunt. His præcordia intumescunt, & os uentriculi in maiorem molem, quam secundum naturam sit, attollitur, colorque ad albidius, aquosiusque mutatur. quibusdam etiam nigrior efficitur. Nemini ex ijs sanguis mitti sine magna noxa solet, atqui uacuatione indiget, sed neque uenæ sectionem, neque purgationem feruat ut potest qui etiam sine his in syncopen derepente cadant: ergo frictione sunt curandi: per initia uero morbi incipiendum est, ac primum quidem à cruribus superne deorsum linreis modice asperioribus: deinde uero tota brachia superne deorsum fricare conuenit: ubi autem ar-

rus satis calidi videntur, & metus est, ne lassitudinis sensus aliquis inuehatur, tum oleo relaxante utendum est, ab adstringentibus uerò abstinendum; si hyems sit, etiam digerentibus, quale est sicyonium, & chamæmelinum utemur: cum uero artus diu, multumque fricuerimus, oleum erit deinde abstergendum, tum ad totam spinam accedendum, eaque simili modo perfricanda: deinde rursus ad crura redeundum, ab iis accedendum iterum ad brachia, tum ad spinam, ita ut per totum diem ad hunc modum æger tractetur. Commodissima est his aqua mulsa, in qua coctum hyssopum sit: uerū neque cibus, neque sorbitio, neque aqua eis danda est, neque permittendum, ut large bibant, sed contenti sint mulsæ tribus primis diebus, ita deinceps fricando. Quod si robur mediocre sit, neque recte sit affecta aluus, andacter clystere utitor: si uero imperius excrementorum maior, quàm oporteat, ad aluum feratur, principio mulsæ magis coquenda est, quoniā ita minus subducit; si autem sit citior, ne tum quidē sistatur, sed aquæ mulsæ loco, ptisanæ cremor detur: si uero fluere pergat, sorbitio ex alicâ nutries: si uero propter imbecillitatem uires collapsas esse ex pulsu cognouerimus, par erit panem ex uino diluto dare: si neque nentriculus, neque iecur inflammatione teneatur, quæ quidem si inflammatione urgeantur, cum plenum crudorum humorū corpus sit, desperatus ægrotus est: si uero crassos esse humores uideas, pro mulsæ perpetuo oxymel dabis, si quæ estas sit, ægrotusque frigida potioni sit assuetus, oxymel frigidum dabis, hyeme uero calidum. Balneum est his aduersissimum: si uero quis te uocet ad eos, qui in syncopam iam inciderunt, cū partes, de quibus mentionem modo feci, nō sint inflammatae, panem exhibere modicum ex uino poteris, statimque ad frictionem erit ueniendum, eaque, ut dictum est, utendum. At quibus propter flauam bilem os nentriculi ledentem syncope accidit, eis potio frigida offerri debet; hæcque uinum tenue, antiquum, atque fuluum esto.

De ijs, qui ob humores tenues syncopa tentantur. Cap. XXII.

Qui ob tenues humores in syncopen cadūt cōtra atque ii, de quibus supra diximus, curandi sunt: hos paulatim continuo nutrimus, si quæ iecur, aut uentriculus inflammatione vexetur, uiribus iam languentibus, hi nulla curatione possunt releuari. In hisce affectionibus cadaueris facies statim apparet: eos igitur nutrire necesse est, eorumque cutē den-

fare non secus, quàm in superioribus erat rarefaciēda: frigidus aer est iis comparandus; unguentis adstringentibus unguendi; alimenta danda, quæ non admodum facile defluant: ergo panis, & sorbitiones ex alicâ conueniēt, itemque fugaces fructus austeri, & qui difficiliter corrumpuntur: hi quæ & per se, & uero etiam cum pane; danda etiam sunt oua, & præsertim eorum vitelli, & cerebrum porcelorum; uinum autem dilutum statim sub initio post cibum sumptum est eis necessarium.

De alijs causis, ex quibus syncopa oriuntur.

Cap. XXIII.

Aliæ porro causæ quatuor sunt, ex quibus syncopa fiunt, dolor vehemens, uigilie, immo dica euacuatio, & interdum morio delirantiū, si vis tu quintam adde, principiorum intemperiem, ac celerissima quidem pernicies subsequitur affecto corde, deinde cerebro, tū breui, iecore.

De dolore. Cap. XXIII.

Dolor igitur, qui stuporē affert, ex affectione frigida oritur, pulsans uero dolor magnæ inflammationis est proprius: si uero tanquam ab aculeo infixio, aut tanquam à terebro perforari putes, doloris species est crassi intestini: pungens dolor in membranis versatur, pertūdus uero ueremētissimis non heterocraniis solum, sed etiam cephalais accidit. Est hic dolor, cum à parte quæ primo loco affecta est, ceu à radice, statim in uicinas partes perferatur. Distendentes ex utraque parte neruorum dolores sunt, quia ad utraque extrema nerui tenduntur; carent autem nerui doloribus in latum tendentibus; at membrana sub cutē ex porrecta tendētes, stupefaciētesque dolores inducit, quæ uero inter carnē inhiere scūt earū dolores. ueluti dilaniātes sunt; multæ. n. sunt, & inæqualiter insertæ, quæ carnem amplectuntur; at earum quæ ossibus adiacent, profundī sunt dolores, & ipsorum ossium dolentium imaginem referunt. Cum igitur nulla doloris causa extrinsecus orta uideatur, anteccedens uictus ratio perpendenda est: utrū in maiore oēio quis uixerit, quàm consueueret, an plus cibi ingesserit, idque ex ualenti materia, an uero excretio aliqua consueta retineatur, si quid horum, aut hæc omnia subesse uideatur, doloris in causa est repletio. quo casu hominem quam celerissime euacuabis. hac enim ratione tibi licebit, cum summa turela remediis, in particulis dolore affectis uti, quæ fluxionē repellūt. Ergo si copia sanguinis sit, quæ distēdat, protinus incidēda est magna uena, quæ parti

parti affecte propinqua sit. Si vitiosi humores solum uexent, est adhibenda purgatio: si utrumque adsit, utroque vacuationis genere utendum ita, ut primum vena seceretur. His peractis, si dolor perseveret, planum est id quod dolorem inuehit, in affecta particula impactum esse: constatque curationem ipsam in digerentibus medicamentis esse positam. Dolores quoque quos spiritus flatuosus excitauit, curabimus: sed in ijs magis extenuantibus cibis, portionibusque utemur, & per sedem iniectionibus, & irrorationibus, atque fomentis ipsum corpus ambiens rarefaciemus. Si vero tumor aliquis aut grauius, aut contundens dolorem, creet, tumor ipse curandus est. Sin humor erodens affligat, aduersissima ei sunt extenuantia, & calefacientia. anethum uero oleo incotum dolorem lenit, somnumque conciliat. id quod viride potius, quam succum facit.

De colliquatione. Cap. XXV.

Cum excernitur aliquid per ventrem, quod non ab esculentis, & poculentis, sed ex corpore procedit, humore in aluum confluente, qui similis est ei flauæ bili, quæ continuo eomitur, & per secessum deicitur, ab eaque differt tum feditate odoris, tum quod deiectum excrementum magis rufum est, & habet crassitudinem strigmenti, & quandoque etiam olei; tunc caro pinguis, & recens compacta ab ardenti febre resoluitur, & colliquatur. Si malum inueterarit, etiam aliquid ex solidis partibus liquefit. In hac perniciosissima febre vitilis est potio frigida, quæ a fonte frigidissimo hauriatur. Eiusmodi quoque esse debent cataplasmata, & epithemata refrigerantia quæ super thoracem, & præcordia imponantur. cibi etiam refrigerantes dandi sunt.

De vigilijs in febris, ex Galeno.

Cap. XXVI.

Cum nimis vigilijs egri torquentur, iis crura & brachia vinciri quo tempore somno se tradere consueuerunt, & item excitari iubemus. eosque palpebras aperire & conuiuere cogimus, donec abunde fatigati sint. tum de repente vincula soluimus, lucernam auferimus, multamque quietem imperamus.

De iisdem ex Herodoto. Cap. XXVII.

Si vero vehementius vigiliae vrgeant, in accessione remissione ablunda facies est nigro rum papauerum decocto. naribus autem admoveatur papaueris albi cortex tostus & tritus, & mandragore radice tantundem laui-

gabis, & cum vino ac rosaceo malagma conficies. Frontique imponendum est serpillum cum meliloto in passo decoctum: hoc in accessionibus etiam utendum est. Vel trita papauera panis cum rosaceo, vel cerato excipimus, & adhibemus. Victus esto quodammodo plenior. Sorbitionibus autem imponatur feminis papauerum alborum quantum tria impleat cochlearia. oleribus vero admisceatur papaueris nigri, si folia sint, quantum tribus digitis possis comprehendere, si ea non adsint, tria, quatuorve papauera sicca simul in coquantur. Si ne ita quidem somno corripiantur, liquore papaueris, aut succo mandragore illinantur.

De graui sopore qui cataphora dicitur ex Herodoto. Cap. XXVIII.

Facies posca, in qua lactis parum sit adiectum, abstergenda est, extremaque sunt ualidis excipienda ligamentis. naribus quæ vim incidendi habeant, admoveantur. in remissionibus quæ sternutamenta excitant, adhibeatur ciborum vero materia sit, quæ incidendi, diuidendique uim habeat.

De canina appetentia. Cap. XXIX.

Qui appetitu, qui caninus appellatur, laborant, iis pro summo remedio uinum dandum est ex eorum numero, quæ abunde calefaciunt. eiusmodi sunt quæ colore fulua, tenebraque sunt, & minime adstringentia. ijs porro cum ad prandium accedunt, primum pinguis, mox alia omnia ex veteri oleo præparata, in quo nihil austeri vel adstringentis ex se infit, offerenda sunt. post hæc vinum, quod dixi, licet illi non sitiant, dari iubeo, cum enim id diutius fecerint, ipse morbus ita sedabitur.

De cibi fastidio. Cap. XXX.

Si vitiosi humores cibi fastidium induxerint, iis cibos & potiones dare conuenit, qui ad eiusmodi succos vel per vomitum, vel per aluum excernendos, vel ad reddendos sint accommodati. In quibus uero virium imbecillitas cibi fastidium peperit, in ijs quoniam omnes vires ex particulari intemperie sunt infirmæ, species intemperiei ipsius est curanda contrariis.

De fame ingenti, quam bulimon nominant.

Cap. XXXI.

Qui in itineribus aut alijs, magna fame corripuntur, reficiendi sunt cum iis quæ naribus

Oribasij liber

naribus admoventur, tum etiam carnibus suis illis assatis, atque hœdinis: & ad summam, omnibus, quæ nidorosum odorem referunt. Extremæ eorum partes deligandæ sunt, ipsique erigendi, maxillæ item pungendæ, & capilli, aut aures uellicandæ. Cum refecti fuerint, panem ex diluta uini portione, aut aliquid aliud, quod facile distribuatur, eis dabimus.

De siti immodica. Cap. XXXII.

Sitim admodum longam ex siccitate, aut caliditate particularum, per quas humor ex ore in ventriculum importatur, oriri existimandum est. Siccitatis autem remedium est somnus, vigilie vero caliditatis. Nonnulli vero ex uini portione sitibundi fiunt, & ex caliditate esculentorum. his remedio est frigida portio, sed qui siti quæ extinguī non potest, enecti sunt, quemadmodum cibos vitiosos expectant pro portione humoris vitiosi qui exuperat, ita etiam prauas portiones desiderant, ex quibus etiam mortui sunt. noui ego, qui viperas dipladas comedissent, itemque alios, qui uino veteri se inebriassent, & item nauigantes quicumque ob aquæ potabilis inopiā, marinam bibere ausi essent, omnes interiisse.

De siti, Pilumen. Cap. XXXIII.

Sitim, quæ in febribus oritur, lenire cōsuevit capitis irrigatio ex oleo frigidissimo, aut rosaceo desuper irrorato. Optime vero ad sitim facit nigra lactuæ semen commanducatum, & radix quæ dulcis appellatur, & cucumeris semen etiam commanducatum, & in ore retentum.

Dioscoride catapotium adipson ad sitim leniendum. Cap. XXXIV.

Habet hoc catapotium, seminis cucumeris satui drachmas octo, tragacanthæ drach. quatuor. tragacantha dissoluitur albō ouorū crūdorum recentium. cum dissoluta fuerit, contritam ceteris adiunge. cumque emollieris catapotia conficito, atque in umbra exsiccato. ex ijs vnum sub lingua tenendum præbetur, ut dissolutus humor deglutiatur. iam vero dilutum malorum cydoniorum, aut pirorū, aut mespilorum, aut pāpinorū vitis, aut malignati liquorem, aut omphacii succum sorbeat.

De nausea. Cap. XXXV.

Cum eger absque cibi sumptione nausea tentatur, possumus, arbitror, ratione facile comprehendere, ventriculum prauis humoribus

vexari. nonnulli quidem vellicantur, sed cum humor in tunicis impactus sit, nihil vomūt, ergo pituitosi humores concoquendi sunt, seruando ægrum in quiete, inedia, & somno. tenuiores vero humores reicit vomitus, qui nōnunquam ex prillanæ cremore, nōnunquā vero ex aqua mulsa sit excirus. Quicumque autem glutinosi & crassi sunt, attenuantia desiderant.

Ex Philumeno, quæ sit vomitioni bilis adhibenda curatio. Cap. XXXVI.

Bilem vomentibus applicandum est cataplasma ex palmulis, aut malicorio, aut galla uino incoctis, vel posca, pane simul dissoluto. Acacia itidem, hypocythis, balaustrū, & rhus cataplasmati adiungantur. Cucurbitula quoque cum largiore flamma affixa, magnopere adiuuat. Cibum sepe & paulatim dabimus. iis vero, qui atram bilem vomunt, & stomachus flatu est plenus, spongiās, accerrimo madefactas aceto imposito. vel hederæ folia in uino cocta adhibero.

De singultu ex Galeno. Cap. XXXVII.

Singultus oritur ex repletionē, aut inanitione, aut acris humoribus stomachum erodētib. quibus vomitu reiectis singultus sedatur. Plerique autem sumpto medicamento, quod ex tribus piperis generibus constat, si statim uinum superbiberint, singultiunt. nonnulli vero cibo intus corrupto à singultu corripuntur. Gompertum ergo est, vomitum satis esse ad curandum eum singultum, quem repletio, aut morsus excitauit: cum vero, qui à frigore ortum ducat, calore finiri. Cum autē ex humorum repletionē singultus oritur, uolenta euacuatione indiget, quæ sternutamento præstatur, at singultus ab inanitione obortos sternutamentum non sanat. si ngulcientibus autem ruta cum uino, vel calamintha, vel nardum celticam datur.

Quæ curatio sit lingue asperæ adhibenda.

Cap. XXXVIII.

Lingue asperitas humectanda est decocto seminis lini in os laborantis dato. melius autē facit si mixta cum lini semine coquamus, ac digito in hunc succum intincto linguam confricatam, aqua pura abluamus. vel spongia abstergamus, deinde rosaceo illinamus. Atque etiam ipsum rosaceum melli admixtum in id vehementer efficax est. itemque portulacæ succus in ore retentus, & rhu obsoniorum mulse commixtum. Egregie quoque faciunt dama

scenorum, & mixarum ossa in ore detenta necnon & lactuce cauliculus.

Curatio exulcerationis, quæ circa os sacrum exoritur. Cap. XXXIX.

Cum locus incipit rubescere, circulum inflatæ magnitudinis ex lana eidem subiciemus: deinde rosaceum, aut myrtinum ceratū conficiemus, quod argenti spumam, aut cerussam habeat, & imponemus. Exorta vero inflammatione cataplasma ex pane cum solano, aut herba sanguinali, aut plantagine, aut tenera brassica admoventur: si ulceratio pascendo serpat, lentacula cum malicorio illinenda erit.

De animæ defectione ex inanitionibus.

Cap. XL.

Cum propter euacuationes anima deficit, iis, aqua aspergenda est, nares apprehendendæ, os ventriculi confricandum, vomitus imperandus, quin etiam brachia, & crura liganda sunt: ligamenta que plura, & uehementiora esse debent, atque à superioribus partibus ad inferiores, & ab inferioribus ad superiores pertinere. Dissolutiones porro ex subitis euacuationibus ortas vinum frigida temperatum curat, si nihil, ipsum dari, vetet. Balnea ad defluxiones in ventriculum sunt accommodata vel maxime: sed sanguinis profluvia vehementer proritant: iis præterea qui pro-

pter nimiam sudoris copiam resoluntur, insensibilissima sunt: quandoquidem eorum cutis non laxanda, sed refrigeranda, atque adstringenda est: iisque præcipue frigidum vinum dare conuenit.

Si anima deficiat ob plenitudinem.

Cap. XLI.

Qui ob plenitudinem animo destituuntur, iis confricandi sunt artus, calefaciendique, ac vinciendi a vino ciboque abstinendi; itemque à balneo, si febrem habeant. iis satis est potio mulse, in qua uel thymum, vel origanum: eisdem quoque oxymel est idoneum.

Curatio ad sanguinis destillationem.

Cap. XLII.

Quia destillatio, quæ ex contusione, vel destitute euenit, totius corporis, aut capitis redundantiam indicat, largior autem excretio potest redundantiam minuere, atque laxare, consentaneum est, ipsam inde moliri, unde hatura initium mouendi sumpserit: accommodatius enim inde, quam aliunde ducitur. Cum hæc mecum ipse reputarem, non veritus sum in quartanarum destillationibus scalpello, ut est in more positum, vasa quæ in naribus sunt uulnerare: quæ quidem in re non exiguo sanguinis fluore contentum esse, sed detrahere pro viribus oportet.

N O N I I

De febribus liber.

De febrium differentia. Cap. I.



QUOD dicitur febris permutatio quāda calorū natū in corde sit, omnibus incōfesso est, ob hoc itaque illius affectibus quoque annumerari debet. Sed dicamus prius, quid sit febris. Febris est calor præter naturam, quæ à corde ad singulas corporis partes fertur. Eius autem differentia sunt multæ.

De febribus diarijs & multorum dierum. Cap. II.

Diarīa febris facile soluitur. Diem enim tantū durat, sit ex ira, mœstitia, lassitudine, curis, folijs æstu, & id genus alijs. Vnde & vrina illorum secundum naturam habent. Curantur cum à tertio die in balneum ducuntur, & oleo inunguntur, & à lotionibus cibum capiunt, & ad operationes consuetas ablegantur. Fit interdum, ut non vnum tantū die, sed ad tertium & quartum duret, & tunc dicitur multorum dierum febris. Causam vero & curandi rationem eandem habet.

De febre continenti & continua. Cap. II.

Febri continē est, quæ nullū hēt calorū intervallū, sed remissionē tantū & inclinationē in vigore accessionū. Continua vero quæ nullam prorsus habet quietem. Huius tres sunt species. Alias n. calor par, suiq; similis toto febris decursu manet, & synochus agmastica dicitur, vel calor continuo incremento inualefcit, & epagmastica, id est, increfcēs vocatur vel statim à summo vigore incipit, & sensim minuitur, dum finem integrum habet, & fit synochus paragmastica. In vniuersum vero & continuæ & continentes febres fiunt, cum materia intra vasa vel putrescit, vel effertur, & in singulis ferē. maximē vero continuis sanguinem mittere oportet, & cibis frigidis & humidis nutrire, ut lactuca, itybo, & similibus, & frigidam offerre, nisi præcordia malē fuerint affecta. Extrinsecus vero inunge

re aliquo ex medicamentis, quæ febrem cessare faciunt, ut Amaranthi succo, vel solani, vel cucurbitæ sylvestris, & similibus. Præcordiis vero cataplasmata adhibere, ex semine lini, psyllio, althea, chamæmelo, senecione, portulaca & solano, aut lenticula aquæ cum ovo, & quæcunque his sunt similia.

De febre tertiana. Cap. III.

Tertiana febris est intermittens, quæ altero die accedit. Fit ex flaua bile, extra vasa putrescente, & cū rigore inuadit, terminatur uero sudore. Hanc quoque subsequuntur bilis vomitio, deiectiones ventris cum impetu biliofa & vrina acres: spacium vero maximum accessionis duodecim horarum est, & tunc definit. His victus humidus & frigidus salubris est, & aquæ potio, & quod in ventriculum cōfluit biliosum, id uomitionibus, vel infra clysteriis mollioribus euocari dēt. Vrina verò porcionibus, in quibus apium, & anethū maduerunt, exhibitis, & absinthio etiam, sunt etiā in balneum aquarum potabilium ducēdi. Et si qui balneis admodum gaudent, eos etiam si bis die laueris, hand peccabis.

De tertiana spuria. Cap. V.

In febre porro tertiana spuria non interinitia, sed cum signa coctionis apparuerint, lauari debent, & si sanguinis mittēdi necessitas inciderit, neq; illud prætermitti. Victu vero vti oportet non refrigerante, tantum, ut in tertiana exquisita dictum fuit, sed qui magis incidat, quemadmodum cremore ptisanæ pipere iniecto, vel hyssopo, vel origano, vel spicanardi. Dare item quæ vrinas mouent, ut decoctum apii vel foeniculi, vel capilli veneris, & post septimum acetum mulsum etiam, & absinthium. Moram vero trahentibus conducit à cibo vomitus & per aluum purgatio.

De quartana. Cap. VI.

Quartana febris intermittens est, & singulo quoque biduo inuadit. Fit ex humore melancholico, extra vasa putrescente. Accessio rigorem obtinet, pulsus rari sunt, vrina tenues, & albæ vel nigræ, subsidētia crassa, præterea lien quoque in his malē habet, & inter initia nec medicamentum trahens exhibendum,

dū, nec euacuatio tētanda est. Quod si sanguis exuperat, tum venam incidere, & optimū cibum offerre oportet, & aluum emollire Epirhymi & pulegii decocto, & triduo integro medicamentum, quod ex triplici pipere constat, & quod Diospolites appellatur, vel piper solum ex aqua tepida sumere, ante accessionē Vri præterea medicamentis quæ vrinam mouēt, quale est apium, asarum, capillus veneris. Visceri vero prospiciendum malagmate, quale est copron, & quod aureū dicitur, & polyarchiō. Vbi vero coctionis notē apparuerint, eam quæ ex sulphure constat, & musc antidotum, prius tamen per sedē atra bile euacuata, & theriacam nouissimē, & medicamentum ex liquore cyrenaico, exhibere, & salsamentis ac sinapi in cibo vti oportet. Est enim hic morbus longus quidem, sed neminem iungulat.

De febre quotidiana. Cap. VII.

Quotidiana febris & ipsa intermittens est, quæ quotidie innadit, sed accessio ultra horarum octodecim spācium non extēditur. Fit ex pituita putrescente extra vasa, sed maximē cum ventriculus non ritē suo munere fungitur. In accessione porrō extrema frigus occupat, sine horrore tamen, cum pituitæ vomitu, vrinis renuibis, albis crassis & turbidis pueris & mulieribus, ut plurimum accidere solet. His intēr initia acetum mulsum dandū, & medicamentis quæ vrinam eliciunt, quale est apium, asarum, capillus veneris, vtendum erit. Acetum mulsum deinde cum radicula in cibo offerendum, & vomitus imperandus erit. Denique purgatio molienda per colocynthidem & agaricum, seu ea quæ pituita ē corpore educunt. Victus ratio ex extenuantibus quale est cyminum, piper, & id genus alia confer. ventriculi quoque orificii curā habere oportet, & cataplasmaris & emplastris, & reliquis ducentibus.

De semitertiana. Cap. VIII.

Semitertiana febris cōposita est tertiana intermittente & quotidiana cōtinua, putrescentibus & bile & pituita. Itaq; curādī rōnē quoque compositam esse oportet. Si n. pituita sit superior, præfidiis maximē vtēmur, quæ in quotidiana exposuimus, sināptem flaua bilis, is quæ in tertiana comprehensa sunt, in totum ei quod viger incumbentes.

De peste seu pestilente febre. Cap. IX.

Huius febris origo ex prauis, & vitiosis succi alimentis est, vel aquis eiusmodi, quando-

que etiam ex euaporatione pestifera, ut ē locis paludosis, & quæ barathrum vicinū hēnt, nonnunquam ex aere, vt cum intemperie præter naturam acquirit, vel frigidiorē, vel sicciōrē, vel calidiorē, vel humidiorē, & in ipso ratu ad cor desertur, & ita pestē excitat, in his ventris per clysteres habēda rō est. si superior ventriculus pituitam continet, vomitū euacuare, sin vero, sanguis exuperat, venā incidere oportet. Quæ per vrinam quoque fit purgatio, salubris est. In perurentibus autē febribus, frigidam quoque offerre, non per interualla, sed confertim & copiosē, vt feruor exstinguatur oportet. Mulsam denique in potu dare, vel ptisanæ cremorem cum cnici semine, vel bolum armenam, uel laxuli lapidem.

De febribus besticis. Cap. X.

Tres harum sunt differentię, vna, n. a marcore marasmus græcis appellatur, altera in totum consumpta & torrefacta dicitur. Hoc at proprium hēnt hæ febres, vt a cibo caloris incrementum habeant, perinde ac in calce videre est, iniecta. n. in eā aqua, calor in ea reconditur, seu delitescens ebullit, seu effervesceat. Hos itaque lauare, & in frigida immergere, & hanc ipsam quandoque in potu dare oportet, cum uidelicet nullā pars, imbecilla est, uel corpus admodum extenuatum. Lac præterea muliebre, vel asininū sumere, corpus vero inungere & rosaceo, & id genus alis.

De uigijs in febribus. Cap. XI.

At vero corū, qui immodicis torquētur uigiliis, crura & manus deligare oportet, eo potissimū tēpore, cū ad somnū conuerti solent, & pedes fricare, incipiēdo sursum ab humeris, & descendēdo deorsum. Inde subito vincula soluimus, lucernamq; tollimus, & silētiū summum imperamus. Perseuerantibus uero uigijs & modum ferē excedentibus faciē decocto papaueris calicum irrigamus, uel aqua & pedes & manus & faciē perfundimus. Vel mādragorē succo faciem illinimus, uel opio, uel pastillo panchresto, uel qui ex seminibus constat. Huc facit & papaueris semen & ocymi, uel caput oleo quod ex mandragora, constat, inungimus, vel oxyrhodino. Aquam præterea sorbendam damus, & quod ex papaueris calicibus cōstat, decoctam. Aliud, quod somnum prouocat unguentum. Ladani, opii, singulorum pares portiones, tritæ & fronti inductæ. Aliud. Apii semen, opium, mandragoræ succum terito, & cum eo inungito.

De graui sopore, qui cataphora Græcis dicitur.
Cap. XII.

Eorum vero qui in graue somnum sunt delapsi, faciem posca tepida cum spongia fouere, & summas corporis partes valide ligare, & pulegium cum aceto, vel hyssopum vel origanum odorari oportet. Cucurbitulas denique præcordiis & spinæ admouere, & in accessionum remissione, ea quæ sternutamenta mouent, & cibum incidendi facultate præditum offerre.

Curatio doloris capitis in febribus. *Cap. XIII.*

Si capitis dolor in febribus affligit, post conuenientem febrium uacuationem, in accessio num declinationibus, caput inungi debet oleo acerbato, uel rosa cum aceto, æstate quidem & cum febris ardens est, frigidis, hyeme uero calidis. incoquatur etiam oleo serpyllum, uel papaueris capita, uel peucedanum. Aestate et in oleum iniiciatur sanguinalis herba, quam polygonon Græci uocant, succus, uel cucurbitæ syluestris. Fronti uero conueniunt cataplasmata ex pane, polygono, ocymo, scorpio ides, papaueris capitibus, rosas, farina hordeacea, cum psyllio uel liquore cyrenaico.

De his quæ uisceribus imponi solent. *Cap. XIII.*

Quod si itaque stomachus imbecillis fuerit,

is, quæ robur ipsi addere possunt, oblineatur, è quorum numero sunt, palmulæ, rosæ, crocus, cenanthe, absynthium, melilotus, mastice, aloë, cyperus, uinum & polenta. Irrigabitur autem & inungetur oleis ex absynthio, melino, masticino. Quod si ardorem quoque patiantur uiscera, aliquod ex refrigerantibus miscere oportet, cucurbitæ nimirum succum uel lactucæ, uel portulacæ, uel solani, uel cichorii. Si uero inflammationi aliquid uel scyrho simile apparuerit, asperfusionibus oleum chamæmelinum, cyprinum, anethinum, gallinæ item seu anseris adipem, adiungendi sunt. Cataplasmatibus autem, lini semen, scænu græci, altheæ, chamæmelorum flos, melilotus, psyllium, palmulæ, rosæ, absynthium.

Quæ sudorem mouent. *Cap. XV.*

Nitrum cum oleo chamæmelino illitum, uel pastillus Heliacus eodem modo adhibitus

Ad intempestiuos sudores coercendos.
Cap. XVI.

Aer frigidior & euentilatio Totum uero corpus myrtheo oleo perungitur, uel acerbato, uel lentiscino. Inspergatur præterea myrrhus in pollynem redacta, uel galla, uel picæ cortex, cortex, uel posca frigida per spongiam adhibeatur.

F I N I S

CL. GALENI PERGAMENI

DE DIFFERENTIIS FEBRIVM

LIBER PRIMVS,

INTERPRETE LAVRENTIO LAVRENTIANO

FLORENTINO.



Quenam sint febrium differentia principales, & quod essentia febrium sit in genere caloris præter naturam. Cap. 1.



DIFFERENTIAE febrium, maximè quidem propriæ, ac principales, secundum earum substantiã sunt: aliæ verò secundum aliquod accidenſ.

Quoniam verò & ipsorum accidentium non una est natura,

sed alia quidem propinquiora, magisq; propria diuidendæ substantiæ sunt: alia verò remotiora, ac magis aliena; idcirco & earum, quæ hinc sumuntur differentiarum minimè vnum genus est. Itaque maximè quidem peccant, quicumque differentias proprias, ac maximè principales omittunt. Deinde verò, quicumque mentione harum facta permittunt cum eis differentias accidentales æqualiter omnes, minimè discernentes viles ab inutilibus. Non solum autem peccarunt plerique medicorum in ipsis differentiarum generibus, aut plures quàm oporteret tradendo, vt inutilium quoque meminerint: aut pauciores, vt nonnullas etiam viles omiserint: sed etiam diuidendo genera ipsa in proprias differentias, similiter errarunt. Ne longius abeas, cū primum, ac maximè proprium differentiarum genus, ab ipsa diuidendæ rei substantia sumatur, videas tamen nonnullos medicos prætermisſisse vniuersum hoc genus, alios verò diuidendo plura, quàm opus esset statuisse, aut in primis substituſſe: tamen Hippocrates optimè faceret diuisionem libro sexto Epidemion. Diſtio autem habet in hunc modum: Febres, hæc quidem manu sunt mordaces, illæ verò mites: quædam autem non mordaces, sed increscentes: nonnullæ acutæ, sed ab ipsa manu deuictæ: quædam statim ardentes: quædam verò semper debiles, siccæ: aliæ salæ, aliæ inflatæ, aspectu graues, aliæ ad manum humidæ, aliæ rubicundæ valde, aliæ liuidæ, aliæ præpallidæ, & aliæ

istiusmodi. Apertissimè etiam hoc loco ab ipsa rei substantia, simulque ab ipsa dignotione in proprias differentias fecit diuisionem: nam essentia quidem febrium est in genere caloris præter naturam. Differentiæ uerò caloris, & ex eo quod maioris minorisque rationem admittat, sumuntur, & ab ipsa materia, in qua calor ille præter naturam existit, & ab ipso mouendi modo: quas omnes complicans, cum dignoscendarum earum ratione scripsit, quemadmodum procedente sermone docebimus. Porro autem quæ à maioris, minorisque ratione ducuntur, sunt manifestæ: & in hoc genere differentiarum medicis mos est magnam, ac paruam febrem nominare: verum improprie quidem de rei qualitate quantitatis vocabulum enunciant: sed ita facere consueuerunt, non in febre solum, sed in alijs sexcentis, quæ in qualitate quidem ipsa essentiam habent, cæterum magna, paruaq; nominantur. Quæ uerò differentia à materia sumuntur, in qua calor ille præter naturam consistit, maximè propriæ caloris præter naturam differentiæ sunt: siue corpus ipsum cordis præhenderit, siue humores conditos in ipsius ventriculis. Reliqua autem ac tertia differentia est, ubi aerea substantia sola admodum incaluit, humida verò ac solida corpora adhuc quidem incallescunt, sed nondum incaluerunt. Non enim parum differt, incallescere aliquid dicas, an incaluisse. Sed discas evidentissimè id quod dicitur, ex his exemplis. Finge aquam calidam inditam leberi frigido, deinde ab ea ipsa aqua caleſci contactu ipsius lebetis corpus, nondum autem totum exquisitè incaluisse. & rursus finge in calidum atque ignitum lebetem frigidam aquam inditam, deinde caleſci quidem adhuc, nondum aut incaluisse. Ex his exemplis, cum secundo quidè prima febrium differentia similitudinem habet, quas corpus ipsum cordis præhendisse docuimus: cum primo autem, secunda, quas conditos in ventriculis hu-

mores occupasse diximus. Reliqua autem ac ter-
tia differentia exemplum omnino simile nō ha-
bet: sed claritatis causa, finge fabrilem follem
trahere ad se aerem admodum calidum: dein-
de calefieri adhuc ab eo, nondum autem inca-
luisse. Sed exemplum magis indicabit rei decla-
randæ naturam, si finxeris, in folle contineri hu-
morem: atq; adhuc magis, si foramina folli per
quæ trahit atq; emittit aerem, ita angusta effe-
ceris, ut humori quidem inuia, aeri uero peruia
sint. Qua sanè in re potissimum dissident natu-
ræ opera ab his quæ homines ipsi efficiunt. Et
enim substantia aerea permixta cum sanguine
est in omnibus arterijs, per multa foramina pa-
riter spirantibus: ac nihilominus in ipso corde,
ut quæ per eas omnes confluat.

*Calorem accendi interdum in spiritibus, interdum
in humoribus, interdum in partibus animalis so-
lidis, qui Hippocrates continentia nominavit.*
Cap. 11.

HIC ergo calor præter naturam, quem ap-
pellamus febrem: aliàs ex alio de prædi-
ctis incipit. Occupat autem ac simul affi-
cit cum eo quod affectum est, reliqua duo gene-
ra. Facillimè ergo calor ex humoribus ad spiri-
tum transmeat: humores autem tardius ignem
conciipiunt à succenso spiritu: atque etiam soli-
dum corpus promptius tribuit calorem humo-
ribus aeris quæ substantiæ, quàm ipsum ab illis
accipiat: omnis enim substantia tenuis facilius
quàm crassa alteratur. Tenuissimus autem aer,
crassissima autem corpora solida sunt: humo-
res medio genere ambigunt. Nec quicquàm re-
fert præfenti loco, spiritum vel aerem appellare:
nam de his alibi fufius diffinitum iam est. Nunc
verò sufficiet illud tantummodo scire, quod (pu-
to) Hippocrates indicans dixit, Continentia, ac
contenta, & impetum facientia. Continentia
quidem appellas, ipsas corporis partes solidas:
cōtenta autem, humores: impetum verò facien-
tia, spiritus. Febrilis n. dispositio aliàs ex alio
de prædictis incipit: uerum in eo genere quod
primum affectum est, minimè permanet, sed oc-
cupat reliqua duos: ac nisi prius soluatur, pro-
cessu temporis illa similiter afficit, atq; hæc sum-
ma sermonis est. Sed oportet ea quæ dicta sunt,
demonstrare, notasque vniuscuiusq; generis fe-
briū percurrere. Statim itaq; de generatione ea-
rum dicere aliquid opus est.

*Quonam modo febris ephemera, id est, diaria ex can-
sis primitiuis atque euidentibus præhendat, qualis
empiricorum qualis rationalium via sit ad inuen-
tionem, qua quoniam partim experientia partim
ratione perficiatur, sine methodis logicis esse non
potest. Ex suppositione paulatim ad genus fe-*

brium descendit, & hoc ex materia diuidit.
Cap. 111.

EX lassitudine ergo, ira, mœrore, uisione,
frigore, insomnio, cruditate, temulentia,
ac satietate, quosdam febricitare cunctis
hominibus perspicuum est, ab ipsa rei euidentia
edoctis. Quinetiam pestilentem aeris conditio-
nem asferre febrem, minimè ignorant; quicūq;
intellectu participant: quemadmodum & uer-
sari cum his qui peste laborant, periculosum es-
se. Affici enim periculum est, quasi à scabie qua-
dam aut ophthalmia. Periculosum præterea est,
consuescere his qui tæbe tenentur, atq; in totum
cum omnibus qui putridum ad eò expirant, ut
domicilia in quibus decumbunt, grauiter ole-
ant. Constat præterea ex longo rerum usu, ut
qui consuetudinem exercitationis omiserint,
ut alijs multis morbis, ita nihilominus febrili-
bus corripiantur. Et item, ut quæ uocatur
plethora generet febres, atque etiam prauis ci-
bi, ac medicamentis, & æstus circa Canis syde-
ris ortum: & alia huiusmodi cunctis homini-
bus (ut ita dixerim) perspicuum est. Quæ uerò
ab ipsis in corporibus nostris fiat affectio ex qua
febricitamus, minimè sciunt, neque pleriq; ho-
minum, neque quidem medicorum. Duplex
autem genus ignorantium talia est: alterum qui-
dem, quod ipsa experientia tantummodò niti-
tur, tanquàm nulla rei cuiusquàm natura, ra-
tione possit inuestigari. Alterum autem genus
est eorum qui sapientes quidem videntur, sed
cum ignorent æquè quàm priores, scientiæ ta-
men habent existimationem. Ignorare autem
eo contingit, quia nullam habent in methodis
logicis exercitationem, ex quibus cognoscun-
tur ac discernuntur à demonstratiuis sumptio-
nibus uerisimilia quidem, sed quæ nihil veri aut
inuenire aut demonstrare possunt. Huic autem
inscitiæ insolentia accessit, ob quam nonnulli ex
eis in tantam audaciam atque amentiam deue-
nerunt, ut nec ea quæ omnes homines cogno-
scunt, experientia ipsa edocti, febrium causas es-
se concedant. De quibus cū libro de causis pro-
catarcticis abundè docuerim, nihil opus est hoc
loco mentionem facere temerariæ loquacitatis
eorum. Neque enim contradicere, neque solu-
re sophismata hoc libro instituit: sed institueret
ac docere, subiiciendo ea quæ alibi à nobis sunt
demonstrata, ac docendo differentias febrium.
Subiiciunt ergo, caliditatem, frigiditatem, siccita-
tem, atq; humiditatem esse elementa corpo-
rum, ac fieri primas ægritudines ex intemperie
horum, è quibus una febris existit, quoties calor
quidam præter naturam in corde extiterit. Differen-
tiæ aut secundum genus caloris, de quibus præ-
sens sermo tractat, ab ipsa materierum genere
triplicium differentia ducuntur, suscipientium
igneam caliditatem. Aut. n. in ipso corpore cordis,
aut

aut in humoribus prima ipsa accenditur, ut dice-
bamus, aut in spiritu. Præueniunt autem omniū
febrium constitutionem nonnullæ causæ om-
nibus manifestæ, de quibus paulo ante docui-
mus, ex quarum observatione empiricus quidē
medicus ad curationem nonnihil iuuatur. Ra-
tionalis verò ad ipsam rei naturam accedens,
per indicationes ab illa in futurorum præsen-
sionem atque inuentionem curationis, iuuatur:
utens omnibus quidem experientiā ipsa inuen-
tis, adiiciens autem ipsis multa ex docendi via
rationali. Quæ ergo sint per utrāq; partem in-
uenta (experimentum intelligo ac rationem) alio
loco docuimus. Quæ uerò dispositio ab una
qua; causa procatacica in corpore consistat
accendens febrem, nunc docere instituiamus.

*Multas esse causas caloris præter naturam, ex quibus
gignitur febris; quoties suscipientia corpora prom-
ptè se habeant ad continendam diutius calidita-
tem.* *Cap. III.*

CVM ergo videamus non unum modum,
neque generationis, neque auctoris cali-
ditatis (quando ne ipsius quidem ignis
modus unus est) sed gignitur aut propter mo-
tum, aut propter putrefactionem, aut quia alte-
ri caliditati consuecit, aut propter suppressio-
nem calidi effluuii, aut propter permutationem
calidæ substantiæ, tanquam de fonte quodam
ebullientis, aut genitæ, scilicet ad nostrum sen-
sum, aut augmentis caliditatem: necesse est om-
nes febrium causas in prædictos modos reuo-
cari: qualis si lubet æstus est, siue ex ipso sole
actio talem habeat appellationem, siue affectio-
næ in corpore efficitur, siue ea quæ iam effe-
cta est. Nam & ea ipsa calor est præter naturā:
nondum tamen febris, nisi cor ipsum concale-
fecerit. Sanè totum hoc genus causæ ex consue-
tudinē efficitur rei calefacientis, siue sol, siue
ignis, siue medicamentum fuerit id quod cale-
facit, extrinsecus quum aut attingit, aut propius
accedit aut consuecit, uel quouis alio modo li-
beat appellare. At uero ita quasi ebullitio quæ-
dam ac motus vehemens est irascibilis faculta-
tis quæ in ipso corpore cordis sedē habet. Con-
calefcit autem interdum cum ea spiritus, atque
interdum sanguis. & si. promptè se habeant su-
sipientia corpora ad continendum diutius ca-
liditatem: quamuis ipsius cordis motus desti-
terit, hæc permanent calida præter naturam,
tuncq; febricitare hominem necesse est. Hæc er-
go febris principium habet, motum atque ebul-
litionem natiuæ caliditatis. Febris autem quæ
ex mœrore consistit, non etiam ebullitionem,
sed motum tantummodò principium habet. Si
autem ex lassitudine efficiatur, principium qui-
dem habet motum ampliorē masculorum, ac

neruorum, & ligamentorum, & articulorum;
quæ quidem prima calefiunt: calor autem con-
tinenter cordi distribuitur, ac tunc febricitant.
Vbi uerò febris propter densitatem cutis accen-
ditur, qualis maximè astrictis refrigeratisque
fieri solet: collecto in corpore mordaci efflu-
uio consistit. Diffillantur enim semper anima-
liū corpora duobus modis, emissis foras quo-
tidie vaporosis, fumosisque excrementis: attra-
cta autem intrò acra substantia refrigerante,
atque ventilante naturalem caliditatem. Vbi
igitur fortis causa condensando cutem prædi-
ctos meatus astringat, sæpe plethoram inducit,
quoties uaporosa ac benigna materia affluit: in-
terdū febrem committit, quoties acris ac mor-
dax fuerit. Idque maximè quum ex eo augetur
calor, quia refrigerans aer intra corpus non tra-
hitur. Excernitur autem excrementum acre
mordax aut ijs qui sunt naturā malis humori-
bus pleni, aut ijs qui malos cibos ingesserūt, aut
sæpe non bene cōcoxerunt, præsertimq; ijs qui
præterquam q̃ cibis dictis vescuntur, etiam li-
mosam, aut lutosam, aut cenosam, aut palustre;
aut stagnantem, aut alio quouis modo corru-
ptam & putrefactam aquam bibunt. Eodē mo-
dò euenit, ubi immoderatè laborent, aut uigi-
lent, aut angore afficiantur, aut acria medica-
menta frequenter ingesserint. Cibos autem ma-
los intelligo, & qui ex natura tales sunt, ut allia,
cepe, nasturtium, porrum, brassica, ocymum, ur-
tica: & alij quicunque nominantur agrestes, ut
lapsanz apud nos: atq; etiam qui boni sunt ex
natura; sed ob putredinem quandam prædictis
æquale, aut maius sæpenumerò vitium acceper-
unt, ut ordeū ac triticum, & alię oēs fruges: par-
tim ob temporis longitudinem ad putridam de-
spolitionē deductæ: partim situ quodam reple-
tæ, quia præuē repositæ sunt: partim ex prima ge-
neratione ab ipsa rubigine vitiatæ. Tales igitur
cibos etiam nunc pleriq; comedere coacti præ-
fame, uel febribus putridis ac pestilētib; mor-
tui sunt, uel pustulis scabiosis aut leprosis cor-
repti. Vbi igitur corpus fuerit plenum talibus hu-
moribus; nulla autem obstructio in visceribus
fuerit, atque animal in cute tota libere diffle-
tur ac refrigeretur, sanum quidem existit: sed
breuem, lubricamque obtinet sanitatem. Vbi ve-
rò exterior terminus aut astringatur, aut in pro-
fundo meatus obstruatur: si adstringatur, nunc
dictum febrium genus, si oppiletur, id quod pau-
lò post dicendum est, consistit. Nihil igitur mi-
rum videri debet, si ex cruditate, hi quidē febrici-
tent: illi nihil eiusmodi patiantur. Etenim ijs
qui malis iā humoribus pleni sunt, ac male dif-
flantur, aut intēpestiuē laborant, aut lauātur re-
merè, promptū est febricitare. Ijs aut qui bonis
sunt pleni humoribus, ac probè diffilātur, & quie-
scunt, ac fouent ad iecur & uētriculū attinentes

partes, impossibile est febricitare (in iecore. n. ac ventre manet quicquid corruptum est, ac teporis spacio paulatim cōcoquitur atq; efficitur benignum.) Quemadmodum & ijs qui motus fortiores sustinuerint, aut in sole æstiuo steterint, aut in balneum calidum dulcium aquarum descenderint, cibi corrupti in vniuersum corporis habitū transfumuntur: sic eos quibus corrupta cibaria deorsum deferuntur, febris minimè sequitur nisi propter aliquam aliā causam: ut si sæpenumero surgēdo in laesitudine inciderint, aut ventrem ipsum inflammatio tentauerit.

*Ex putredine accendi febrem, cuius causa est obstru-
ctio: ac potissimum putrescere, quæcunque calida
atque humida sunt.* Cap. V.

CAETERVM si meatus obstruantur atque humores stipentur (nam de ea re docetur re distuli) animalia putridis febribus tenentur. Promptissimè enim putrescunt, quæcunque calida & humida, & multa sunt in locis calidis, nisi diffentur ac refrigerentur. Ergo neq; mirum uideri debet, quamobrem febres sequantur plethoram: quoniam per eiusmodi dispositiones multæ obstructions efficiuntur, ac totū corpus difficulter diffatur. Igitur ex plenitudine quæ est ad ipsas vires, humore ipsi citò corrumpuntur, neq; euicti, nec concocti, probe: quippe quæ vires cōficiētes eos, debiliores existant. Quo circa quæcunque cibaria glutinosa crassaq; sunt, morbos committere magis possunt. obstruere enim atq; stipare humorem ex illis facilius est. Sed nonne contrarias. scilicet extenuantia & acria, morbos committere possunt? Videntur. n. qui alterutro victus genere frequentius viuunt, sebre similiter præhendi: quia hæc omnia (ut antè diximus) malos humores gignere assolent. Hæc ergo, ratione ea quod malos humores gignūt, febrium causa sunt: alia verò ratione putredinis, quæcunque glutinosa, crassaq; existūt. Nec secus partes inflammatione affectæ ratione putredinis accendunt febrem. Impactus. n. in eas quæ influxit humor, vbi fuerit natura calidus, quia nō benè diffatur, putrescit. Vbi igitur decurrens humor fuerit planè biliosus, caliditas sãerò igni sublimilis occupat partem. vbi sanguineus inflammationi sublimilis, ex ambobus uerò mistus, uel erysipelas sit phlegmonodes, uel phlegmone erysipelatodes: nomen quidem fumentis ab humore dominante, denominationem uerò accipiens ab altero. At uerò ex his omnibus acceditur febris, ratione societatis. Semper enim simul cum eo quod incaluit, pars cōtinua calefit, quousque affectio ad cor ipsum peruenit. Nam & continuè carbunculis partes cum eis simul calefiunt, genitis ex sanguine, per quam calido, sed magis melancholico propter adustionem.

Pestilentis febris causam esse inspirationem, potissimum quoties corpus in eam dispositionē sit præparatum, quoniam maxima pars generationis morborum est corporis preparatio. Cap. VI.

CAETERIORES præterea ambientis nos aeris conditiones (quales sunt circa Canis syderis ortum) potissimum per inspirationem perspicuè cor ipsum calefaciunt: extrinsecus uerò circumfusæ corpori, totum ipsum calidum reddunt, maximeq; arterias: ut quæ non nihil substantiæ ipsius ambientis aeris attrahant ex quibus omnibus simul afficiatur cor necesse est, atque ipsum in primis immodicè calefiat, maximeque febrili dispositione tentetur, atque toti subindè corpori immittat oportet. Vbi uerò pestilentes subeant conditiones, inspiratio potissimum causa est. Interdum enim efficitur febris propter humores in corpore aptos in putredinem, quoties animal breuem quandam occasionem ab aere circumfluente susceperit: sed magna ex parte incipit ex aeris circumfluentis respiratione, quem putrida exhalatio inficit. Principium autem putredinis, aut multitudo mortuorum est. minimè crematorum, quemadmodum in bello fieri solet: aut exhalatio paludis cuiusdam, aut stagni tempore æstiuo atque interdum immoderatus calor circumfluentis aeris est principium, quemadmodum in pestilentia quæ Athenienses inuasit (ut Thucydides ait) viuentes homines in suffocatis nec ita perflatis tugurijs estate corruptio afficiebat. Est autem initium pestilentis febris, eo quod humores corporis ex prauo victu sint in putrefactionem parati. Forsitan autem accidit id propter continuiratem, quod ex Aethiopia fluxerunt quædam mala inquinamenta: quæ ijs qui habebant corpora læsioni parata, causæ febris extiterunt. Huius enim semper meminisse oportet toto hoc sermone, ut nulla causa sine corporis aptitudine efficere possit: alioquin omnes qui in solē diuersantur æstiuo, in febrem inciderent, & qui plus æquo mouentur, aut bibunt, aut irascuntur, aut merent. Nec secus omnes ægrotarent circa Canis syderis ortum, atque in pestilentia perirent. Sed (ut est dictum) maxima pars generationis morborum est, afficiendi corporis preparatio. Subijcitur ergo pro exemplo in ipso aere inuehi quædam pestilentia semina: atque eorum corporum quæ uersantur in eo, hæc esse uariorum excrementorum plena, paratorum quidem ex seipsis putrefieri, illa sine excrementis ac pura, atque addatur prioribus inesse obstructionem meatuum undique, ac plethoram appellatam, ac vitam otiosam in multis epulis & ebrietatibus & Venæri usu immodico & cruditatibus, quæ omnia prædicta necessariò consequuntur. Alijs autem omnibus corpo-

corporibus puris ac sine excrementis insit ultra ea quæ diximus commoda, quod omnibus spiraculis corporis neque obstructis neque pressis angustia bene transpirat: exercitatio uero prudenter instituta, ac victus ratio moderata. deinde his ita subiectis, cogitabis num sit uerisimile utraque corpora conspiratione putridi aeris affici. Nonne consonum est hæc statim à primâ inspiratione initium putredinis accipere, unde in maiorem noxam prolatur, quæcunque uero uacua excrementis & pura sunt, ea uel nullo modo uel exigua labe infici, ut facile ad habitum naturæ recurrant? Itidem quoties aeris temperamentum ab ipso naturæ habitu immoderate recessit ad humiditatem & caliditatem, pestilentes fore morbos necesse est: affici autem his maxime eos, qui iam prius pleni fuerint humiditate excrementosa: quemadmodum qui laboribus moderatis ac victus ratione temperata usi sunt, penitus impatibiles permanent per omnes eiusmodi affectiones. Hic sermo super uno exemplo dictus est, sed in omni genere causæ uerus est. Ac cui libeat integrè in eo exerceri, legat librum de causis procataceticis, id est, externis. Ego uero præsentî libro parcens longitudini uno capite omnem eum comprehendens, finem faciam. Oportet enim in unoquoque causarum genere scrutantem qua potissimum facultate morbos committere soleat, deinde considerare congruentes & repugnantes ei dispositiones corporum: scientem ut congruentibus quidem prompta læsio est, aduersus autem ac repugnantibus, quantam uim habeat & magnitudinem contrarietas, tantum inuicti permanebunt. Ipse namque uidi nonnunquam eueniente tali conditione qualem Hippocrates in oppido Cranone fieri dixit, carbunculos grassa non paucos, quorum generatio & alia omnia eo quo ille scripsit modo, planè fuerunt. Quinetiam quæcunque tertio libro Epidemion pestilenti scripsit conditione, ea etiam omnia per aliam similem illi conditionem extiterunt. Summa eorum (ut ipse Hippocrates dixit) putredo fuit, atque id ipsi cognoscentes, statim incipiente conditione quæcunque corpora uidimus humida, statim quouis modo exicare tentauimus: quæcunque uero sicciora, pristinam naturam in his custodiimus: quæcunque uero excrementis plena, purgationibus sanauimus: quasque uero obstructiones meatuum, soluimus atque aperuimus. Sed hæc quidem iam quodam modo ad medendi methodum pertinent, & scilicet in eo opere finissime dicuntur. Nunc autem eorum mentionem feci, sequutus sermonem docentem quonam modo ab una causa exuperante quidam præhenduntur febre, alij impatibiles permanet. Dispositiones enim corporum dissimiles, multiformesque sunt: & idcirco quidam facile uincuntur, ac

promptissime patiuntur à causa agente: alij inuicti penitus & impatibiles sunt, aut difficulter patiuntur. Ad eius rei demonstrationem contacti sumus mentionem fecisse etiam curationis, perinde ut Hippocrates facientes, qui alicubi eodem quodam modo celebre illud uerbum adscripsit. Id autem sanatio ipsa indicat.

De præcautione, & quonam modo diaria febris ex bubone consistat. Cap. XII.

Precautio igitur secundum talem quendam modum sanatio est. Quando & ipsa nomina sæpenuerò confunduntur apud medicos. Ut enim alio libro diximus, omnis medici operatio corporis ipsius uitia corrigit. Sed nihil ad proposita, huiusmodi nominum subtilitate egemus. Siue enim feces in duobus nomina totum id, sanationem ac præcautionem, siue in unum ambo colligas, sanationem appellans: non paruo argumento est, non omnes ab eiusmodi causa similiter affici, dispositio corporum quæ prohibita sunt corripitur epidemijs ac pestilentibus morbis. Vnum enim primumque consiliū in omnibus commune est, ut corpus maxime uacet excrementis & ad transpiratum habile sit, secundum uero post hoc, ut exuperati causæ repugnes, quoad fieri potest. Quibus uero contraria horum insunt, ocysime patiuntur, maximeque egrotant. Sed quoniam febrium pestilentium mentionem feci, ex putredine omnium ortum habentium, par est incumbens animo ad hunc sermonem explicandum hoc loco scrutari de antiqua opinione, omnem febrem consistere ex humorum putredine dicente. Videntur enim ita sentire ij, qui ab Athenæo fluxerunt non obscuri quidem uiri in hac arte, præsertim in ea quæ est de febribus scientia: in quibus ego plurimum cum illis sentio, ueruntamen unum excipio diarias nominatas febres. Non enim mihi uidentur hæc subsequi putredinem humorum: sed qui ob æstum febricitat, ab ipso efficientis causæ calore alterari solet. Ob iram uero febricitanti, & ei quidem ebullitionem quandam fieri sanguinis in corde necesse est, non tamen putredinem. Necnon per exercitationem, caliditatem ampliorem præter naturam sine humorum putredine accendi. & quisquis cutem habuerit adstrictam, per quam acria excrementa euacuabantur, illis collectis febricitauit sine putredine humorum. Quinetiam febris ex bubone omnis, mala est, excepta ephemera, ut Hippocrates dixit: licet etiam bubo ipse inflammationum genere contineatur. Atque assentio in hoc sermone putredinis, nam ob eam rem ex inflammatione febricitant, non quemadmodum Erasistratus existimauit. At tamen nonnullæ sunt ex bubone febres in ge-

nerē diariarum, quemadmodum aliæ quædam nunciant non faciles curatu morbos, ex inflammatione, aut ulcere, aut abscessu, aut altero quopiam tali in viscere affectu ortum habentes. Cæterum dissident febres ex bubone ab ijs quæ ex putredine humorum consistunt, quæ sit aut in aliquo viscere, aut in cauis ac maximis uasis: quoniam ubi febris ex bubone consistit, pars continua semper calefit, ac calor quidem vsque ad ipsum cor distribuitur: cæterum putrida fuligo vsque ad ipsum minimè peruenit, sed ibi manet circumscripta in bubonis loco, per alterationem solam continuarum partium ad cor perueniente calore. Quo potissimum modo, etiam per æstum ac per exercitationem ex partibus primò calefactis, distributio ad ipsū principium vitale fit. Vbi autem putredo fuerit in visceribus atque in magnis uasis, veluti fumus, ex putrescētibus humoribus ad ipsos cordis sinus peruenit. Accidit igitur ut humores in bubone quidē oēs cūctim putrescant, siue vno die, siue duobus continenter: utpote semper inuicē cōuersantes & inclusi vno loco: in visceribus autem conditi, & in magnis uasis, utpote transfluentes semper, ac simul putrefaciētes quos attigerint, tempore ampliori putridum accendunt calorē. Sed ut vno uerbo dicatur, quæadmodum in exteris omnibus, quæcūque calefiunt præter naturam à quauis causa, si nequeat putrescere id quod calefit, uelut lapis, aut lignū, aut aliquod aliud tale, eò vsque perseverat calidum quoad refrixerit paulatim. Id autem quod putrescere potest, depascentem semper secundum continuitatem habet calorem. Quemadmodum interdum vidi in agro stercus pecudum simul & columborum ex parte quapiam ab ipso sole calefactum ita vehemēter, ut multa exurgeret exhalatio, instar fumi ascendens, uehemēter mordens atque afficiens, & si quis propinquasset, oculos & nares lædens. Porro stercus tangentibus erat ita calidum, ut deureret diutius impositas ipsi manus, aut pedes. Non tamen semper id symptoma durabat: sed sequenti die refrigerabatur quidem quantum stercoris ad summum feruorem pridie peruenerat: quod autem continuum ipsi erat, tunc succendebatur, quādo primum stercus in summo feruoris uigore erat: illudq; ipsum (dum hoc inclinabat) rursus incalibat atque effervescebat, ac paulò post summū feruorem obtinebat, primo refrigerato: atque illud rursus inclinabat, dum id quod continuum erat, calorem concipiebat: & paulò post accendebatur quidē hoc & ad summum feruoris perueniebat, prius autem refrigerabatur. Erat autē hæc circuitio ferè tempus diei ac noctis: ita ut exemplum sit maximè conueniens febri quotidianæ. Si verò duobus diebus ac noctibus dicta circuitio fuisset, exemplum foret ita febris ter-

tianæ: & si tribus, quartanæ: & si quatuor, quintanæ, si modò febris vlla quintana est, ipse enim nondum perspicuè vidi, neq; eam circuitiōnem, neq; aliquam aliam ultra quartanam. Sed de febribus repetentibus per circuitiōnem, post dicetur. Putredo autem humorum quæ fit in uasis, similis putredini quæ in inflammationibus fit, & abscessibus, & alijs phymatis, duplex quidem genere est: ex permixtione autem duorum generum, alia tertia uaria specie existit. Si quidem & mixtionis modi, cum alterum genus maioris minorisq; ratione superet & superetur, facile numerari non possunt. sed ex duobus generibus alterum quidem fit superante natura, alterum uerò euicta. Superante quidem, ut per inflammationes & phymatosos tumores omnes, pus: in humoribus autem venarum & articularum, id quod subsidet in vrina proportionē puri respondens. Atque hæc putredo non simpliciter putredo censetur, sed etiam habet aliquid concoctionis. manente enim adhuc concoquendi facultate vasorum, putrescēs tunc humor ad talem alterationem deducitur. Porro alia est putredo concoquendi facultate adeò debili, ut nulla mutatio ad benignum putrescentis excrementi efficiatur. Quod fit interdum illa extreme debili: quamuis putrescens humor sit modicè prauus: interdum autem facultas ad extremam debilitatem minimè deducitur: sed humor extreme prauus existit. Huiusmodi excrementi putredo, neque consistentiam, neque colorem, neque odorem habet vnum: sed putrescens humor semper secundum substantiā permutatur ac uariatur. Altera verò putredo quæ & concoctionem esse diximus, in unam speciem puris semper mutatur, & colorem, & consistentiam, & odorem.

Quod pus optimum sit candidum & crassum & minimè fetidum, & quod optima vrina habeat sedimentū candidū, æquale ac minimè fetidū, & quibus indicijs febris diaria cognoscatur. Cap. VIII.

VBi igitur natura ipsa omnino superet pus optimum gignitur, visū candidum ac crassum, & sibi simile vndique: læue autem tangenti, ac minimè fetidum. Quod si velut semiputridum fuerit, tertium genus intalli mutatione (quod paulò supra diximus) consistit. Porro diximus tale genus maximè multiplex esse. Nam quod magis ac minus recipiat concoctionem, innumerabilis differentia est. Sæpe enim candidum effectum, aut fetidum est, aut tenue consistentia: quandoque verò non candidum, sed liuidum apparet, atque in omnibus his magis & minus est infinitū. Cæterū quot in abscessibus putredinis differentię sunt, tot in febribus ex putredine accensis vinarum formæ

ma existunt. Optima enim quæ putrido humore ea virtute quæ continetibus valis insita est, candidum, læue, æquale, ac minimè fœtidum sedimentum habet. Pessima verò, maximè contraria huic est. Ea verò quæ media est, quò magis alteri earum propinquet, tantò melior aut deterior est. Sed de vrinarum differentia libro de iudicationibus docuimus. Febres autem accensas ex putredine humorum, alias à diarijs esse existimare oportet. Atque harum agnitio nequaquam difficilis est: quamvis impossibilis quibusdam esse videatur, id quæ re ipsa milles indicauimus, prima accessione sedata, lotum ac modicè cibatum ad solitas operationes redire precipientes: ceu postea non febricitaturum, & ita accidit. Vnum igitur ac primum indicium febris diariæ, est ab aliqua causa prægressa incepisse recentè atque euidentè: quam consueverunt omnes medici iuniores appellare causam procatarcticam, id est, prægressam. Sed id quamvis inseparabile sit ab huiusmodi febribus, earum proprium minimè est: quonià & aliæ nonnullæ incipiunt causa quadam euidenti prægressa. Inseparabile verò & proprium est, vrinæ coctio statim primo die: & ad hæc, pulsus in magnitudinem ac celeritatem insignem auctio, ita vt frequentia per exteriorè quietem minimè seruet proportionē. Magis præterea proprium, atque inseparabile earum indicium est, quò contractio minimè crescat in celeritatem: vel si crescat interdum id minimium est, ac cognitu difficile, & paulum à pulsu naturali recedens. Quin etiam caloris suauitas proprium atque inseparabile est talium febrium. Inseparabile verò & æqualitas & ascensus liber tum in caliditate, tum in pulsibus, non tamen proprium est. Etenim quibusdam alijs inest: quemadmodum & status clemetia, neque enim id proprium est, quamvis his potissimum insit. Ac melius quidem fuerit hæc quæ communia sunt, quò per incrementum ac vigorem diarijs præcipue insint, inter propria reponere. Sit enim ita, quamvis non rei species, tamen optimum certissimumque talium febrium proprium simul atque inseparabile indicium: quemadmodum inclinatio quæ cum sudore aut madore, aut penitus vapore quodam suauis est, quam integritas perfecta excipiat. Atque his indicijs febres diariæ, promiscue cognoscuntur. Sed de singulis scortum secundum speciem agetur.

Quibus indicijs cognosci conueniat febrem putridam, ac de duritie pulsus nonnulla contra Archigenem.
Cap. IX.

AL. I. V. D. autem genus febrium, quò ex aduersum diarijs diductum est, nullum nomen commune omnium habet. Differentia autem primæ duz existunt, non obscuris

speciebus definitæ: quædam enim ex eis putredine humorum accenduntur, aliæ verò partes ipsas animalis solidas occupant: atque appellant eas hecticas febres, vel quia stabiles sunt ac solutu difficiles, quemadmodum habitus, vel quia ipsum corporis habitum occupant. Ita namque solent nominare solidas partes ex aduersum diductas humoribus. Febres igitur humoribus accensæ cognoscuntur ad hunc modum. Primum igitur indicium, proprium quidem, sed minimè inseparabile est, quò nulla prægressa causa tales præcessit febres: neutri enim aliorum generum hoc inest: eo quò omnis diariæ ex causa prægressa consistat. Hectica autem quoties sine ea existat, nunquam ab initio præhendit. quocirca quoties sine prægressa causa quis febricitare coeperit, causam huius esse in humoribus, sciendum est. Sed interdum causa quæpiam euidentis prægressa, diariam febrem, quantum est in seipsa, committens, febrem ex humorum putredine excitauit, quoties effectum corpus ita se habet, id est, quoties impurum, excrementosumque est. Vbi enim excrementa per diariam febrem plus æquo calefacta fuerint, deinde initium putredinis inde susceperint, alterum febrium genus accendunt, priore sedato. Sed internoscitur successio talis febris indicio proprio simul atque inseparabili: quò febris diariæ nequaquam desinat ad exquisitam integritatem. Accidit enim interdum, ut per consistendi vigorem diariæ transeat in putridam: ac multò magis per inclinationem, quoties (ut paulò ante diximus) maxima tranquillitas febris abest, quæ adesse deberet. Hæc sunt transitus indicia. At verò febrem ex rigore incepisse, nequaquam prægresso æstu vel frigore forti (quale maximè patiuntur, qui per niuem faciunt iter, vel alio modo in vehemèti frigore diuersantur diutius) proprium est & hoc febrium putridarum, sed haudquaquam inseparabile. Neque enim omnibus ipsis, quemadmodum nec horror, inest: is enim non solum non inseparabilis est ab huiusmodi febribus, sed nec villo pacto proprius est. Ceterum pulsus atque etiam calorem inæqualem esse, siue per initia accessionum, siue per incrementa, talium generi febrium proprium est, sed haudquaquam inseparabile (multæ enim etiam sine inæqualitate sensibili incipiunt, atque ad statum perueniunt.) Iam verò multò minus illud inseparabile est, quò accessio multas habeat inuasiones: quò repetere accessiōem appellamus. Quemadmodum quò pulsus arctior sit (ita verò dicunt, vbi incipiente accessiōe paruus admodum & inæqualis existat) neque id talium febrium inseparabile est: non tamen commune est alteri vlli generi febrium, sed harum proprium, quemadmodum ipsa inæqualitas, vbi alicuius symptomatis ratione non accidit.

dit. Sæpe enim in ipso ore ventriculi collecto quodam prauo humore, ac mordaci vel frigido, paruus simul inæqualisque existit. Sed ubi frigidus humor sit, paruitas: ubi mordax, inæqualitas ipsa exuperat. Sed vomentibus, hæc ambo statim desistunt. Vbi verò ventriculus nihil eius modi patitur, prædictarum generis febrium talis pulsus existit. At verò maximum indicium febrium putridarum, est caloris qualitas. Nihil enim suaue, neque moderatum, neque diarijs simile habet. Sed quemadmodum optimi ante nos medici dixerunt, mordax potius quodammodo est, ut offendant, mordeatq; tactum, veluti fumus oculos, ac nares. Verum inter initia accessionum (dum adhuc suffocatur calor, ac succenduntur intus excrementa) non statim immittentibus manum dignoscitur: sed diutius immorantibus prædictum caloris genus de profundo emergit. Ac (ut mihi videtur) quum tale aliquid vidisset Themison proprium atque inseparabile esse omnibus febribus existimauit. Sed de his suo loco rursus agetur. Prædictum autem genus caloris perpingens (ut ita dixerim) aut erodens (veluti medicamentum aliquod acre) impositam manum, putredinis humorum soboles est, perspicue per incrementa accessionum, atque vigores febrium apparens: non tamen statim per initia accessionum perspicue existit. Proprium præterea inseparabile est generi febrium ex humorum putredine infestantium, velocitas contractionis pulsus, euidentior quidem per incrementa, sed minimè obscura per ipsos vigores, atque initia accessionum. Comitatur autem has per initia, paruus simul ac velox pulsus: per vigorem autem, magnus simul ac velox. Nec secus frequentia ipsa per exteriorem quietem perspicua est in eiusmodi febribus, neque diarijs, neque hecticis similis. Maximè proprium præterea est talium febrium, vrinæ cruditas, atque obscura concoctio, proprium indicium est febrium ex humoribus consistentium. Neque enim cruda, neque obscure concocta in febribus diarijs existit. Atque alterutra quidem earum seorsum dicta proprium est febrium putridarum indicium: sed ambo simul dicta per ipsam enunciationis disunctionem, penitus inseparabilia sunt. Quoniam primæ vrinæ in tali febrium genere, vel penitus cruda, vel obscure concocta existunt. Magnum verò atque insigne indicium concoctionis in primis vrinis nunquam existit per huiusmodi febres, nisi à diarijs in has transeat: id quod paulò ante docuimus. Cæterum ab his quæ diximus indicijs propositarum febrium, id quoque existit, si per ipsum accessionis vigorem symptoma quoddam ardentis febris extiterit: quemadmodum si quod epialæ, ac lipyriæ, vel semitertianæ, vel typhodis, vel alterius talis febris symptoma fuerit: quæ pro-

pria quidem sunt generis febrium ex putredine humorum consistentium, non tamen inseparabilia, & ob eam rem, si quidem hæc minimè adfuerint, ex alijs indicium quærendum: si uerò adfuerint, non solum genus talium febrium, sed & species vna aliqua ex ipsis significatur. Quod si inclinatio minimè definit ad integritatem, siue per sudorem, siue etiam aliter fiat, alterum è duobus erit, aut indicium quod transeat in alienam febrem, si superiora omnia diariæ fuerint indicia: sin nullum ex his fuerit, febrem quandam ex humoribus consistentem statim ab initio præhendisse ostenditur. Vbi uerò pulsus prima die durus existat, considerandum num concretio quædam ex frigore, an siccitas, an tensio conuulsifica in corpore laborantis, an inflammatio quædam, an scirrhus sit: scientes quod ex his tantummodò pulsus durus efficiatur. Nam Archigenis errores circa notionem, cognitionemque duri pulsus, in opere de pulsibus abundè docuimus, in quo versatus sit oportet, qui ad hæc legenda accedet: ac potissimum in ea parte quæ de pulsum dignotione agit. Etenim pulsum ipsorum nomina ac significata ab eis omnia, omnemque numerum vno uolumine indicauimus: quod quidem inscripsimus de differencia pulsum. Sed quonam modo vnumque conueniat dignoscere, alio uolumine diximus in quatuor libros distincto, quod inscripsimus De dignotione pulsum. Quemadmodum alios deinceps quatuor libros de causis pulsum effecimus: & item quatuor ab ijs dictis de prænotione ex pulsibus: non solum uerbis, sed etiam re ipsa indicantes huius scientiæ utilitatem. Et si quis nobiscum unà accessit ad agros horum librorum speculationem re ipsa ostendentibus, cum cætera ei persuasa sunt, tum uerò etiam illud, non esse videlicet durum pulsum aut proprium talium febrium aut inseparabilem. Sed de hoc nunc non est dicendi locus: nam prædictis libris diximus, & alijs octo libris quibus expendimus librum de pulsibus Archigenis, abundè huiusmodi symptomata docuimus: hoc loco quod sit necessarium tantummodò indicabitur. Pulsus durus, neque proprius est, neque inseparabilis cuiuspiam generi febrium, neque diariæ, neque putridæ, neque hecticæ. Sed hecticæ inest magna ex parte, atque interdum in alijs duobus generibus ob symptoma quoddam existit in diaria quidem, quoties febris affligat ob refrigerationem fortem, uel tensio quædam nervosa inest: atque interdum efficitur ob æstum fortem, uel lassitudinem simul, uel inopiam alimenti, uel uigilias immodicas, uel euacuationem: quoties ob alimenti defectum hæc quoque constiterint. Per febres autem putridas pulsus quoque durus habetur, quoties in viscere inflammatio fatiget, uel scirrhus: & ob symptoma

ma aliquod coniunctum, nempe aut nervosam aliquam tensionem, aut siccitatem, durus quoque sic pulsus evadit, velut & ijs qui intempestive frigidam biberunt, aut eadem lauerunt, vel fructus quosdam largiter comederunt. Sed pulsus purus nunquam efficitur per ipsam febrem, quæ febris est: neque per ipsam diariam, neque per ipsam putridam, neque enim quoties ex inflammatione febris affligat, eodem modo febris ac pulsus durities comitatur: sed febris quidem sequitur putredinem humorum: durities autem tensionem ex repletionem vasorum. Nam (ut semel dicatur) durities tunicis arteriarum accedit, vel propter concretionem, vel tensionem, vel siccitatem. Concretionem igitur refrigeratio vehemens committit: tensionem vero inflammatio ac scirrhus, atque etiam nervorum proportionalis inflammationibus dispositio: siccitatem vero evacuationes diutina, vel ob alui fluorem, vel lævitatem intestinorum, vel difficultatem intestinorum, vel vomitum longum, vel aliud istiusmodi, & fames diutina, atque ardentes febres diutina, & (ut in totum dicatur) quæcunque vehementer exiccant ipsius animalis partes solidas, velut & hæctica: de quibus nunc dicere fuerit tempestivum, ab eorum generatione exorsis.

Quibus indicij febris hæctica cognoscatur, & quoniam modo consumpto admodum humore cordis dispositio efficiatur, quam Philippus nominat ex morbo senectam. Cap. XI.

FEBRIS igitur hæctica nomine efficitur duobus modis, magna ex parte ob febres ardentes, quæ prorogantur adeo, ut consumant spatio temporis humorem corporis cordis, vel etiam si adhuc multus permaneat. Illa igitur non solum hæctica, sed etiam marasmodies iam existit. Hæc vero quæ manente adhuc humore fit, corpus ipsum cordis præhendens, inde maxime accenditur: quemadmodum lucernarum flamma ex ellychnio. Atque vna quidem eius generatio est prodita. Reliqua autem est, quoties statim ab initio præhendat, primam generationem similem diarix ob mororem, iram, lassitudinem magnam cum vitione contractam. Hanc igitur febrem sanare nequaquam difficile est: quæ verò ex eis deuenit in marasum propter inscitiam eorum qui adhibiti sunt medicorum, eam sanare non solum non facile, sed etiam impossibile est, quoties planè iam confirmata fuerit, nec præterea incipiat. Natura enim eius calida ac sicca existit, ac cor similiter afficitur, ut ellychnium in lucerna, quoties plurimum crematum fuerit. Et enim ita exustum friabile fit, atque dissolvitur, perditurque continuitas præ ariditate: ut neque

si affundas abundè oleum, queas: rursus accendere flammam copiosam. Parua enim atque infirma flammula in ipso concutitur, ac semper minor efficitur, usquequo extinguatur. Atque exactè quidem marasmodies febris huiusmodi existit, nec eadem est, cum affectu marcore. Hic enim in ijs efficitur qui consenuerunt sine febre, extincto in illis nativo calore (quæ potissimum morore vacua mors est, ac secundum naturam ex siccitate consistens) velut & in ijs qui emarcent præter naturam, genus illud efficitur, quod Philippus nominat ex morbo senectam. In quam multos novimus non senes solum, sed etiam pueros incidisse. Febris autem marasmodies non solum sicca, sed & calida affectio est. Extinguitur autem per eam multò celerius calor in animali, atque tabescit totum corpus instar arboris in plenum arefactæ, vel ob temporis longitudinem, vel flammæ vicinitatem, vel fortem atque immoderatum squalorem. Sed de tota marcoris affectione, seorsum diximus. Hæctica autem febris, cum duplex eius genus sit, ut ante diximus, indicia deinceps explicabimus.

De febre hæctica, & quòd diaria sæpenuerò transmeet in hæcticam: cuius rei indicia multa existunt. Cap. XII.

FEBRIS igitur hæctica cum marcore coincidens, promptissimè ac facillimè cognoscibilis est. Prius enim quàm tangas pulsum atque calorem, oculos supra modum cautos videbis, quasi in foueâ quadam conditos, ob totius humidæ eorum substantiæ consumptionem: ita, ut ossa quibus palpebre annexæ sunt, prominent. Quinetiam siccitudines in eis visuntur aridæ, ac quædam squalida dispositio, qualis maxime inest eis, qui per pulverem multum tota die in sole calido fecerunt iter. Flos ipse præterea vividus coloris perijt, atque id toti faciei accidit, & immoderatus squalor habetur totius cutis circa faciem, maximeque circa frontem: ita, ut propter siccitatem, sicca atque intenta sit, non tamen queunt palpebras ipsas multum attollere, perinde affecti semper ut qui dormit viunt. Quinetiam conuiuent magna ex parte, quemadmodum qui dormitant. Est autem talis affectio nequaquam somnus, sed impotentia vigilandi. Carnes præterea consumptæ sunt circa tempora, ita ut ea loca collapsa, cauaque appareant. Nec quicquam aliud omnino quàm ossa, ac cutis sunt: ita, ut si eos nudos perspicias, in ventre nullum superesse intestinum, nec ulla viscera, atque hypochondria ipsa retracta esse ad thoracem admodum videantur. Quòd si libeat illos tangere, cutis quidem perquam sicca existit: & ubi attollas apprehendens digitis, quasi corium quoddam stat. Pulsus autem gracilis, durus,

durus, debilis, ac frequens habetur. Calor autem in primo quidem occurſu debilis, ſed paulo poſt acer, atque erodens apparet: maximeque ubi tangendo diutius immoreris. Sed minime conuenit reliqua indicia commemorare in re tam perſpicua. Itaque ſatius eſt, ut ad ipſum marcorem adhuc incipientem ueniamus. Marcor ergo incipit, quoties humor inſitus in unoquoque corpore diſperſus per loca media partium ſimilarium, ex quo membra primum aluntur, ſerè in ipſo corpore cordis nullus amplius ineſt. Quenſque enim aliquid ipſius ſeruat, heſtica febris tantummodò eſt, nondum tamen maraſmodes. Vbi uerò ſerè nihil in ſuper huius humoris exiſtit, exquiſitus iam marcor conſiſtit. Difficilis ergo cuiuſlibet heſtica febris diſpoſitio eſt, quoties ipſius principij tempus præterierit. Definio autem principium, non dierum uel horarum numero: quemadmodum neque in cæteris morbis, ſed ipſa qualitate diſpoſitionis, etenim dum corpus ipſum cordis diſcedit ab ipſa temperie naturali, non ſtatim inſitus humor perit, neque facultas debilitatur: ſed in primis uelut ebullitio quædam efficitur ipſius humoris: quo tempore talis febris facillimè curatur: quippe quod facultas nihil dum perpeſſa eſt. Deinceps autem conſumptio quædam ſi ob ebullitione, eaque ipſa amplius iam procedente, ipſa etiam corpora ſimilaria, quæ uelut elementa cordis exiſtunt, ſicciora euadunt, minusque alimentij ſentiunt: ac facultas debilis redditur tantum, quantum ſiccitas ac caliditas in eo exuperat. E quibus aliorum ſufficiens erat, ut exuperans infirmam redderet facultatem. Talis febris iam quodammodo medio genere ambigit, ac media eſt inſanabilis penitus illius maraſmodis, cuiusque quam paulò ante diximus, adhuc incipientem facillimè poſſe curari. Atque in ea perquam multa latitudo exiſtit, quoniam non parua affectionis ipſius permutatio maioris minorisque ratione eſt. Itaque quoties ab utraque febre diſcedit æqualiter, ab exquiſita ſcilicet maraſmode, eaque quæ nondum quippiam eiſmodi habet, media quodammodo eſt, & ad curationem ambiguum habens utroque uerſus momentum. Quæ autem maraſmodi propior eſt, ià periculo propinquat: quemadmodum prior alteri propinquior, ſpem obtinet non paruam ſanitatis. Sed tempus eſt ut ad earum indicia tranſeamus: & primum quidem illius quam poſſe facile curari docuimus, niſi in uulgarem quempiam medicum incidat. Eſt autem, ubi ſola conſiſtit, nequaquam difficilis cognitu: implexa autem cuipiam putridæ, depræhenſu difficilis iam exiſtit ob permixtionem. Sed primam ſubijciamus ipſam ſolam ex quadam cauſa prædicta conſiſtere, atque appareant in ea prima die cuncta indicia febris diariæ. Simul igi-

tur cum eis apparebit ſtatim cauſa prægreſſa genus, atque id indicabitur procedente oratione. Sed interrogando ægrotum ipſum ſicebit diſcas, ſi alijs in rebus non malè affectus, ex ira forti tantummodò, uel mœrore, febricitare incepit. Quod ſi uideantur hæc ita ſe habere, febrisque extendatur uſque in ſecundum diem, nequaquam deſinens ad integritatem: ſed neque uehementior euadens, ſi ſqualidior quidem appareat, ſuſpicari heſticam fore talem debes. Quod ſi tertio die ſine cibo tranſmittere uoluerit ſuſpectas horas acceſſionis, quæ tertio quoque die præhendere ſolet, ac neque additio ulla facta ſit, neque minutio inſignis: ſed primæ febris paruæ reliquæ extendantur, permancantque cum ſqualido corpore & calore, mitti quidem in primo occurſu manus apparente: moranti autem diutius acri, mordaci & ſqualido occurrente, talem febrem heſticam eſſe exiſtimare debes. At uerò maximum tibi atque certiffimum indicium erit naturæ eius nutritio homine quando certiffimè uidetur tranſuiſſe omnes horas ſuſpectas. Statim enim à cibo poſt unam horam uel alteram, omnibus tangentibus egrum, alterum incrementum febris ipſa habuiſſe uidebitur. Nec deerit qui increpet tantam in tempeſtiue dantes cibum, & ipſo potiſſimum tempore acceſſionis, & dicat diutius fuiſſe expectandum, & tardafſe acceſſionem. Sed res non ita ſe habet. Cuiuslibet heſtica febris proprium inſeparabile, id eſt, ut ingeſto cibo calor accendatur, pulſusque in magnitudinem ac uelocitatem increſcat: ita ut æqualis eſſe acceſſio uideatur. Aequalent autem acceſſionem uoce, in qua nec horror exiſtit, nec frigus extremorum, neque ſomnus, neque pigritia inſignis, uel inæqualitas quædam penitus, uel in calore, uel in pulſu, imò nec etiam paruitas, neque debilitas, neque aliud huiusmodi quicquam, ſed tantum alij cuipiam nutritio pulſu maior ſtatim ac uelocior redditur. Accidit autem interdum & in alijs quibuſdam febribus incrementum æquale: & quod quidem ex ipſo eſt, uidebitur minime eſſe heſtica febris ſymptoma proprium inſeparabile. Sed non parum differt, ſi ad uniuerſam dictorum indiciorum collectionem reſpexeris. In omnibus enim alijs febribus tales acceſſiones æquales exiſtunt, etiam citra alimentum ingeſtum. In heſtica autem penitus contrarium euenit, nullo enim tempore acceſſio præhendit, ſed una continua febris eſt, uelut ea quæ ſynochos, id eſt continua propriè nominatur. Sed hæc quidem quaſi flammam quandam permultam occurrentem habet imponentibus manum: præterea pulſus quoque velociſſimus, frequentiffimus, maximusque ei exiſtit. In febre autem heſtica, neque caloris multitudo occurrit, ac pulſus tantò minor, rarior, tardiorque

diorque est quam in synocho, idest, continua, quanto calor ipse minor habetur.

De indicij communibus cuique hectica febre, & quam ob causam post ingestum cibum calorem ipsum augeri contingat. Cap. XII.

COMMUNE igitur cuiusvis hecticae febris est, ut exigua sit atque aequalis semper, à primo initio vsque ad ultimum finem. Proprium autem eius quæ tabi affinis existit, siccitas est: quoniam hectica febris sæpe numero sine siccitate consistit, nequaquam transiens in marcorem, qualis etiam nunc multis in magna penuria contingit, febris igitur hectica dissidet à synocho, idest, continua: quemadmodum dictum iam est. Ab alijs autem habentibus accessiones æquales, eo ipso maxime dissidet, quod inæqualitatem quandam illę omnino habeant post alimentum sub ipsam accessions præhensionem: hectica autem post alimentum velut accessio quædam æqualis contingat: quæ ut paulo ante docui, minime accessio habetur, sed imperitos circa talia decipit ob caloris tum multitudinem, tum magnitudinē velocitatemque pulsus. Talis autem febris sequenti die planius cognoscetur, si diligentius obseruaris, quādiu permaneat post cibum ipsa pulsus calorisque alteratio. Inuenies enim tamdiu permanere omnium quæ manifeste apparent alterationem, donec distributio alimenti atque adiectio, squalorem cordis humefacit: deinde rursus ad pristinum redire statum, qui erat antequam sumeret alimentum. Si igitur alio tempore nutrias ipsum sequenti die, rursusque alio tempore sequenti die, inuenies ita fieri, ut dixi, augeri quidem calorem post cibum, pulsusque ipsum, ut dictum est, alterari. Constat enim illis id accidere, quod calci ac lapidi calefacto. Si enim eis affundas frigidissimam aquam, multo calidiores sentiuntur, tanquam calor squalidus in eis ab humida substantia nutriatur. Quæ autem causa sit ob quam ita eueniat, questio naturalis existit: sed quod ita efficiatur, cuius tentare volenti discere licet. Vbi enim manibus sumas glebulam calcis, contemnes eius caliditatem, ac minime senties. Vbi uero deponens ipsam humi, affundas illi aquam, perspicies statim admodum calefieri, atque adeo feruere ut lebetes, quoties in multa flamma versentur. Videbis præterea vaporem ab ea haud exiguum efferni: quod si audeas tangere, facile deureris. Ad hunc igitur modum ad ipsum sensum, humidus calor non paulo habet uim euidentiore quam siccus. Cæterum quod calor siccus existat per hecticam febrem cui succedit marcor, hinc discas licebit. Nemo statim ab initio præhensus est tali febre: qui corporis habitum habuerit

humidum: sed qui siccior naturā existit, maximeque ubi calidus quoque naturā sit, & qui vitam delegit in labore, uigilijs, curæ, ac victu tenui, is affolet statim ab initio præhendi hectica febre, ex ira, ac mœrore: ac multo magis, quoties æstas, & constitutio calida ac sicca, locusque eiusmodi fuerit. Principium autem eius terminatur, quoties eo tempore quo diaria per inclinationem mitiorem deducitur ad integritatem, adeo nihil huiusmodi ipsi accidit, ut siccitas per spicue intendatur: tunc enim primum succedens diarie, hectica iam efficitur. Definatur præterea aliter eius incrementum atque perfectæ generationis per accessionem tertie dici. Si enim (ut paulo ante diximus) eo die alia accessio minime præhendant, neque æger sine febre existat, sed siccitas ipsi constanter intendatur, talis febris haud dubie iam hectica est, ac processu temporis marasmodes sine mora euadet, nisi recte curetur. Definatur autem abitio eius in tabem, cum primum pulsus debilis simul ac durus est, continuoque paruus ac frequens is necessario est, non tamen propterea marasmodes existit, sed propter debilitatem ac duritiem. At uero debilitas accidit ob fortem cordis intemperie: durities autem, ob siccitatem: quod si tales affectus præhendant cor ipsum, marasmode febre detineri animal tunc necesse est. In eandem præterea febrem incidunt ex acuta atque ardenti plerique eorum qui male curantur: maximeque quicumque ubi frigidam aquam bibere postulerent, adeo nihil eiusmodi biberunt, ut nec ullum aliud in frigidans remedium thoraci atque hypochondrijs adhibuerint. Quod si adeo nihil eiusmodi adhibuerunt, ut insuper cataplas matis ex melle plurimum usi sint, quæ nunc frequenti in usu sunt amplius in marcorem incurere his promptus est, siue solum febricitent, siue ex iccoris aut uentris inflammatione. Maxime enim his inflammationibus haud recte curatis succedit marcor: ita, ut quidam existimant non aliter posse fieri huiusmodi affectionem, nequaquam scientes, quod neutrum horum, nec aliud quodquam viscus, aut membrum neque marcorem, neque penitus hecticam ullam febrem committat, priusquam (ut diximus) cor ipsum afficiatur. Talis igitur affectio eo incipit, interdum ex seipso, ut ex ira ac mœrore forti & longo: interdum ex febre ardenti: quandoque uero ex affectibus pulmonis ac thoracis, maximeque purulentis ac tabidis. Ut autem ex his, ita accidit ex uentre ac iccore: & ut summum dicatur, quauis diutina inflammatione in parte principe simul cum siccitate totius animalis, maximeque cordis. Ego nanque uidi inflammationi laxioris intestini diutius succedere marcorem, ac stomachi, ac vesicæ, ac renum. fuerunt autem nonnulli qui affecti erant difficultate

cultate intestinorum tali febre correpti, cum scilicet laborassent inflammatione intestinorum. Atque etiam leuitates intestinorum, & fluores intestinorum diutinos, quoties statim ab initio, aut tempore procedente febris exigua incidit, marcor ipse subsequitur, & ut in summa dicatur, quoties præexiccatum cordis ipsius corpus, febrilem calorem susceperit solutu difficilem.

Maximum indicium esse febris hectica, quoties arteria ipse sint quæ corpora quæ circiter sunt, calidiores: & quod non oporteat solū circuitionem, sed ipsum febrium genus considerare. Cap. XIII.

MAXIMUM itaque signum febris hectice est, quoties arteriæ ipsæ sentiuntur calidiores quàm corpora quæ circiter sunt: quod per alias febres illis minimè accidit. Fit autem symptoma adhuc euidentius ubi laueris, aut alio quouis modo rarefeceris, ita ut humor quidam profluat, atq; calor ipse perspiret. Calor enim moderatus in alijs partibus omnibus post talem perspirationem apparet: in ipsis autem arterijs nequaquàm minor est priore. Is uerò quàm maximè exquisitè sentitur per pulsū diastolas, qui minimè mutatur post dictam expirationem: sed similis penitus permanet. Sola ergo consistens hectica febris perspicua est, siue absolute sermone hectica, siue etiā marasmodè sit. Vbi uerò cum alia quapiā fuerit, difficilius iam cognoscitur: quemadmodum quæ nuper mulieri cuiusdam accidit, cui non solum die, sed etiā nocte non obscurè fiebat accessio. Latuit enim marasmodè febris omnes qui eam visitabant, Medicos, existimantes oportere, neque principium præhensionis sensibile esse hectica febre, neque incrementum, neque rigorem tanquàm minimè contingat hecticam febrem putridæ ali cui posse implicari: sed nobis statim primis diebus in hac muliere cognita est. Vtraque enim accessio quæ die ac nocte fiebat, breues efficiebat partes accessionis, ac sæpe cum madore quodā, aut perspiratione vaporosa soluebatur tam perspicuè, ut corpus ipsam bene temperatum tantis sentiretur. Indicia aut in arterijs paulò antè dicta semper extiterunt, nequaquam refrigeratis ipsis similiter alijs partibus, neq; velocitatem aut frequentiam motus amittentibus. Quæ ergo alio loco sæpè numero docuimus, etiā nunc dicimus: non oportere solum circuitiones, atq; proportionales accessionum considerare, sed multò prius ipsam speciem febris: ex eaq; cognoscere ipsam febrem, quemadmodum ipsum hominem ex propria forma. Sic ipsi sæpe primā die ad hunc modum speciem febris cognouimus, minimè expectantes tertianam, aut quartanam, aut quotidianam circuitionem. Sed de his secundo libro de iudicijs latius docuimus, atque eo ipso libro nihilominus diximus quomodo oporteat

diariæ febris cognoscere differentias. Promiscram autem (scio) me dicturum hoc loco de illis. Sed cum recordare pauca in eo libro desiderari, quo in plenum de omnibus præceptū esset, aliā quidem huc transcribere superuacuum dixi, adjiciam uerò eo tantummodò quæ intra modum sunt in eo prodita.

Quibus indicijs febres diariæ à se inuicem discrepant: quoniam interdum propter æstum, quandoque ex frigore ipso febris diaria consistit. Cap. XIII.

FEBRICITANTIBVS igitur propter æstum, cutis magis ad habitum calidiorem & solidiorem, quàm pulsus ad febrilem dispositionem mutatur: quocirca sitis minus hos infestat quàm ubi equalem habet caliditatem. Ac primo occurru maior calor in ipsis vigere uidetur, contra quàm in ægotantibus propter adstrictionem, in his enim increscit. Caput præterea perurum maximè uidetur ijs, qui propter æstum febriçant. Gaudentq; magis & iuuantur frigidis fomentis atq; ipsorum oculi calidiores & rubicundiores, uidentur, cum siccitate, antequàm sine grauedine & defluxione febriçant. Quibusdam enim propter æstum talia accidunt, caputque ipsis red dicitur non solum calidum, sed etiā plenum sanguine: ita ut omnes uenæ admodum contenduntur, quæ circa oculos & tempora & frontem & faciem totam habentur. Quod autem plenum sunt non minimum indicium est, unde discernantur ab ijs qui ex humorum refrigerio febriçant. Hi enim ubi caput male afficitur, promptèprehenduntur grauedine & defluxione, & febris ipsa interdum symptoma est solius in capite dispositionis. Sed magna ex parte tunc magis febriçant, cum corpus totum refrigeratū est, uel exustū. At uerò cutis minus calida refrigeratis, atq; in tumore maiori corpus existit, nec quisquam squalor circa faciem, qualis propter æstum febriçantibus euenit sine capitis repletionem. Sed magna ex parte caput solet talibus repleti ab æstu, nisi quis fuerit admodum purus, ac sine excrementis: ijs enim tantummodò contingit calefcens caput sine repletionem permanere. Verumtamen interdum sine repletionem multus calor phendit ipsi totum exustū. Hæc igitur affectio perspicuè desidet ab ea quæ frigus excitauit. Atque cum repletionem est, difficile distinguit: utpotè defluxionem inferens ac grauedinem, quæ et refrigeratis accidunt: sed (ut diximus) squalor & magnus calor cutis, & quæcumq; alia paulò antè dixi, propria uisitorum existunt: de quibus in plenū libro de curandi uia & ratione dicitur, cum alijs omnibus diariæ febris differentiis: quarum dignotiones quia secundo libro de iudicijs peritruimus, nō est hoc loco dicendū sunt: sed hunc quidē librum hic finiemus, deinceps uerò febrium ex humoribus accensarum omnes differentias indicabimus.

CL. GAL. PERGAMENI

DE DIFFERENTIIS FEBRIVM

LIBER SECVNDVS,

LAURENTIO LAURENTIANO

FLORENTINO INTERPRETE.



De differentiis febrium ex humorum putredine infestantium: ubi refellit opinionem ponentium omnem febrem puridam fieri ex abundantia bilis. Cap. I.



SEQVITVR vt de differentia febrium ex humorum putredine infestantium differamus id prius de eis admonentes, minimè sufficere (ut quidam voluerunt) ad generationem febrium augeri at-

que exuperare humorem biliosum, quem alij palidam, nonnulli flauam nominant bilem. Omnes enim arquati maxima sic afficerentur febre, quibus copia talis bilis in toto corpore continetur: sed haudquaquam febricitant prius, quàm alia quædã causa concurrat, de qua paulò post agetur. At verò absurdum est in quartana & quotidiana febre exquisita colligi amarã bilem existimare, quæ admodum in tertiana atque caussa. Etenim contra quàm in illis in quotidiana, & quartana febre, neque vomitus biliosus neque sudor, neque urina, neque defectiones videntur biliosæ: præterea nec quicquam aliud quod præcessit, aut simul adest eis, subscribit. Febris enim tertiana parte plurimã consistit in corpore naturæ bilioso, & in ætate vigoris, quæ est omnium ætatum maximè biliosa, & æstiuo tempore maximè quo talis humor exuperat. Eidem in regione calida & sicca temperamento & conditione ambientis aeristali, & vita non ociosa ac desidiosa plurimum, sed in labore, cura, uigilijs, æstu, & uictu parco, atque calido & sicco. Quin & immoderatus usus medicamentorum calefactientium & exiccantium committit febrem tertianam. Quotidiana verò e contrario penitus efficitur in naturâ pituitosiore, ac tempore hybernico, & conditione frigida & humida, sensibus & potius, in regione frigida & humida, & vita ociosa simul cum repletionem, maximèque quoties post cibum lauare, & multò magis, ubi ipse cibus pituitosior naturæ existit. Sed neque uoluntate tales biliosum humorem, neque deiciunt, neque sudant, quemadmodum in tertiana febre. Hæc enim ex flaua bile putrescente fieri solet: quotidiana verò pituitosum humorem subsequitur, quomodo quartana melancholicum. Sic namque natura corporis magis melancholica, & ætas inclinans, & autumnus tempus, necnon omnia his proportionalia in cibo potuque, & toto uictu, frigida & sicca temperamento, febrem gignit quæ

tanam. Et ob eam rem præcedens eas rigor nequaquam similis est: sed in tertiana quasi pungens ac vulnerans sensum, efficientem causam indicat: in quartana autem quasi refrigerans. Sed de forma rigoris libro de causis symptomatum diffinitum abundè iam est, ubi etiam de eiusdem generis febrium differentia est proditum: nempe ex eis intermittentes (ita appello eas, quæ ad integritatem sensibilem desinunt) ex humore moto ac in omnem corporis partem delato efficiente febrem, consistere: synochos verò ex condito & contento in venis, de quarum cognitione secundo libro de iudicijs docuimus.

Febrium intermittentium tres haberi differentias: quotidianam, tertianam, & quartanam, atque esse synochon, id est, continuam, quam flaua bilis committat. Cap. II.

FEBRIVM igitur intermittentium omnes differentiarum tres existunt: quotidiana, tertiana, & quartana. Ex pituita putri, quotidiana: ex utraque bile, flaua quidem, tertiana: atra autem, quartana efficitur. Continuarum verò quæ ex flaua bile consistunt duplex genus est: vnum quidem earum quæ synochi, id est, continentes appellantur, quarum omne tempus vna accessio est ab initio usque ad finem. Alterum, earum quæ comuni, sed ambiguo genere continuæ dicuntur, & multis particularibus circuitionibus continentur. Cæterum synochon differentiarum omnino tres existunt. Quædam enim earum ab initio usque ad finem æqualis persistit, quædam paulatim crescit, quædam paulatim decrescit. Ac nonnulli primam nominant homotonum, & acmasticam, id est, æqualiter affligentem ac vigentem: alteram anabaticam & epacmasticam, id est, ascendentem atque incrementem: tertiam verò paracmasticam, id est, inclinantem appellant. Synochon porro duarum differentiarum primæ existunt. Nam alia tertio quoque die tantummodò habet accessionem, alia die intermedio alteram inferunt accessionem. Atque hæc nullam nomen peculiare obtinent. Febrem autem tertio quoque die accedentem, ego quidem nomen tertianæ finitimam: non tamen prohibeo, si libeat, aliter appellare, modo serues in rebus ipsis differentiam. Alia enim est natura, quoties desinunt ad integritatem, alia quoties ad inclinationem febrilem finiuntur, febres continuæ alternis diebus accessionem habentes. Et ad hæc ubi in medio altera fuerit accessio, natura quædam diuersa est: sed nullam ex his semitertianam appello, non tamen prohibeo ita nominare volentes, si id vnum mihi caueatur ab eis, ut nulli febris genus omitteretur, sed vniquodque deinceps dicatur quæ admodum ego nunc in hoc libro facere institui. Ex continuis, nam quæ in die medio accedunt, quædã

in forma quotidiana procedit, duas accessiones simillimas inuicem efficiens: quædam verò dissimiles habens duas accessiones, primæ quidem tertiam simillimam obtinet, secundæ verò quartam; in forma duarum tertianarum procedens: sed hæc ex bile potius: illa singulis diebus similiter accedens, ex pituitoso humore consistit. Porro tertium aliud genus est febrium continuarum ratio eueniens, quoties accessio in forma quartanæ circuitiois procedit, nequaquam definens ad integritatem. Accidit autem, quæadmodum febris tertio quoque die accedens, interdum duplex ac triplex: ita etiam hæc non solum duplex, sed etiam triplex. Sed hi febrium implexus libro de typis commodius indicantur. Febrium autem simplicium ex humoribus infestantium simplices differentie tot numero sunt, quot proximè docuimus. Ex earum autem permixtione alia quædam efficiuntur, de quibus deinceps dicam, si prius de simplicibus quod deest, adiecerò: ut quæcunque fuerit omnino simplex febris, unam speciem quasi regulam quandam obtineat earum, quas proximè indicabimus. Quæcunque verò degenerat aliquatenus, eatenus ab ipsis febribus simplicibus abscedit.

Quoniam modo ex flaua bile delata in vniuersum corpus rigor existat: & ut ipsius tertianæ accessio, quod longissimum sit, horas duodecim occupet.
Cap. III.

FEBRIS igitur excitata ex flaua bile delata per corpora sentientia, præhendit cum rigore, atque causodes est: & vomitu bilis, vel deiectione, uel sudore, uel quibusdā horum, uel omnibus simul soluitur. Huius febris longitudo accessiois quæ maxima sit, horarum est æquinoctialium duodecim: atque appellamus eam exquisitam tertianam, ex temperamento ægri bilioso, ac tempore, & regione, & conditione, & uictu calido & sicco effectam. Sed omnia alia paulo antè docuimus, quæcunque conducunt ad eius generationem. Atque accessio breuior est magna ex parte, quàm quæ antè dicta est longitudo, per quàm multam maioris ac minoris obtinens differentiam: uel propter quantitatem & qualitatem ipsius bilis, uel propter ægri vires, uel propter præsentem tunc in ægro corpore dispositionem. Bilis enim copiosior, longiorem quàm paucior efficit accessionem: tenuis, breuiorem quàm crassa. Sic uerò & vires ualidiores, breuiorem: imbecilliores, longiorem. Et corporis dispositio ratio quidem, breuiorem: de sæ uerò longiorem. At uerò tempus intermissionis in tali febre, ex pulsa indicium putredinis humoris penitus obscurum habet, sequenti die ac nocte post accessione. Leuiter autem succensa egrè cognosci potest primis partibus posterioris diei: sed adhuc clarius

circa fines eiusdem diei aut noctis: atque adhuc clarius proxima die uel nocte, quæ præcedit scilicet diem aut noctem accessiois. Sanè in ea ipsa perspicuum iam est indicium: multoque magis, quoties accessio præhendatur ac multo magis, ubi ascendat ad ipsum consistendi vigorem. In eo uerò minus quàm per incrementum, rursusque multo minus per inclinationem. Hanc febrem si libeat nominare exquisitam tertianam, nomine ueteris antiquo: sin minus, at certè nobis dabis ita nominare gratia perspicuitatis doctrinæ.

Pituitam refrigerare partes extremas per initia accessiois, difficulterque accendi calorem minime purum, sed similem fumo quasi uiridioribus accensis lignis. Cap. IIII.

ALIA porro est simplex ac exquisita febris ex pituita putri, quæ per membra sentientia pellitur ab ipsa natura, consistens. Ea incipit ex frigore partium extremarum, atque horror potius, quàm rigore: difficulter accenditur, longumque obinet incrementum ad ipsum consistendi vigorem: quoniam humor ipse ex quo consistit, frigidus atque humidus est temperamento, ac glutinosus consistentia. Itaque difficulter accenditur, ac tardè mouetur sepe in ipsis meatibus hærens. Ac premit quidem interdum, grauaturque uires. Inæqualem autem ac magis debilem efficit partemque pulsam in principio ac primo incremento. Per febrem uerò biliosam existit inter initia accessiois unaquæque affectio ex dictis circa pulsam: sed ab illa quidè citò abeunt, tùm alia, tùm etiam inæqualitas, quæ magna ex parte nec cum talibus febribus accedit, nec tales febres comitatur. Calor autem ipse, non multo postquam destitit rigor, accenditur, luculentus, quemadmodum ignis quidam planè purus, in quo nulla fumosa caligo inuehitur. Calorem uerò pituitosi humoris assimilabis ignis fumoso lignorum uiridium accensorum. Euacuationes igitur in eo paucæ existunt, ac longitudo accessiois diuturnior: & tempus intermissionis non æquè ac primum putum est, sed semper seruans in calore & pulsu, putredinis humoris indicium. At uerò & in hac febre circa principia, atque incrementa accessiois indicium putredinis est manifestissimum. At tamen & hæc ubi exquisita fuerit, uideatur multis habere puram intermissionem: & nos ipsi ita etiam non raro dicimus, quoties impertuna sermonis curiositas uideretur. Accidit autem naturæ corporis, tempori, regioni, tempestati, studio, uictui, & alijs omnibus pituitosis. Accedit uerò singulis diebus, quauis minus calida sit, quàm biliosa, quæ tertio quoque die fatigat. Sed constat hanc quidem (quoniam & humorem habet accensum facilem, & propriè semper ob tenuitatem quicquid eius seruatum est per accessione, expurgatur)

ad integritatem quādam magis puram definere, & exiguum post accessiōem vestigiū putridi caloris. relinquere: eam. verò quæ ex pituita consistit, nec integrè purgari per inclinationes. accessiōnum, nec exiguum, quod. velut succendatur, relinquere. Inde ergo efficitur & intermissio multò deterior, & secundæ accessiōnis maturius principium.

De quartana quæ ex atra bile consistit, & quonam modo fieri possit, ut rigor sine febre efficiatur. Cap. V.

AT verò tertium genus intermittētium febrium, quartana scilicet exquisita, quoties ex humore melancholico solo efficitur frigidus siccoq; temperiē, paulatim quidem succenditur: quæadmodum lapis quidam, uel testa, uel es, uel aliud quodpiam sic frigidum & siccū corpus. Vbi verò flamma quædam ex eo accensa est, nihil relinquit fumosum, neque semiuustum post accessiōnem: & ob eam rem euacuatiōes plures ex tali humore quàm pituitoso; & intermissio planè pura esse uidetur, eo quòd hic omne id humoris melancholici quod est accensum euacuatur atque discutitur: Et ob eam rem accidit illis rigor, qualis potissimum in forti frigore refrigeratis: non qualis interdum existit per æstum uel lassitudinem, uel medicamentum calidum, ac mordax vlceri adhibitum. Cæterum necesse est hanc febrem antecessisse quicquid colligit atram bilem, ex vitæ genere, victu, cœli statu, tempore, regione, natura & ætate ægri melancholica. Accessio præterea huius febris longitudine temporis, tertianæ similis est: atque interdum accidit, ut sit longior, quamuis exquisita sit, quoniā ex humore frigidior consistit. Causa autem similis est in his febribus & alijs omnibus quæ differentiam longitudinis efficit accessiōnum, quæadmodum paulò antè diximus in exquisita tertiana: in multitudine & qualitate humoris, & robore & infirmitate virium, & ad hæc ipsa ægri dispositione differentiam habente. Nam & alia omnia proportionē respondent ijs quæ ex humore bilioso consistunt. Quocirca si humor melancholicus neque putrescat, neque uehementè feratur per corpora sentientia, nequaquam efficit melancholicam circumscriptionē exquisitam. Sanè argumentis affectibus proportionē respondent ex lie nemorbi diutini melancholici, corporisque totius colores foedi. Et erysipelatibus ac herpetibus qui ex flaua bile consistunt, cancri & phagedenæ proportionē respondent. Sed neque ex his neque ex melancholicis affectibus necessariò febricitant, nisi prius humor melancholicus & biliosus putrescant. Natura enim semper nititur, suis uiribus utens, assimilare partibus nutriendis quicquid fieri utile potest: excernere autem id quod minimè istiusmodi est. Quòd si inter-

dum præ crassitie, uel copia, uel lentore excrementi, uel stipatione quadam meatuum, uel sua ipsius debilitate nequaquam possit excernere humorem uniuersum prauum, immorantem diutius in ipso corpore animalis putrescere necesse est. Nullus enim alius humor permanere qualis existit ab initio, potest, nedum qui adeò uiciosus est ut ab ipsa natura cultum ampliùs suscipere non possit: sed aut concoctus apponitur atque assimilatur solidis animalis partibus, aut corrumpitur atque putrescit. Ad hunc modum argumentis ac melancholicis affectibus, quoties humor biliosus exuperans in corpore diutius immoratur, febris superuenit. Sæpe etiam dispositio in iecore & in splene attulit febrem, quoties aut inflammatio aliqua, aut obstructio committit prædictos affectus. Pari ratione nec ubi pituitolus humor exuperat, febris sequitur, nisi putrescat prius. Atque ob hunc quidem, quòd ab antiquis existimatum est esse impossibile, sæpenumero visum est: id autem est sine febre rigor, qui nonnullis quidem semel accidit, nonnullis autè etiam per circuitum pluribus diebus, uel continuus ab initio usque ad finem, uel omninò ita mediocris, ut nequaquam esse videatur, quoties quieuerint, sed ubi moueantur tantummodò efficiat sensum: uel etiā maior, ut etiam sine motu infestet. Sed quoties talis humor spacio temporis putrescat, non rigent solum: sed etiam febricitant. Et diuturna admodum & soluta, difficilis febris in quotidianæ forma tales affectus sequitur.

De febre epiala qua simul febricitant ac rigent, ac de humore quem Praxagoras vitreum appellauit, & quonam pituita genera sint. Cap. VI.

HOc genere continetur febris epiala propriè nominata, quoties simul febricitant ac rigent: & utrunque sentiunt, eodè tempore in quauis corporis parte. Sanè Archigenes existimat de nulla altera nomen epialon dici, quæ deyna hac febris. Sed constat Atticos quosdam viros rigorem ante febrem ita appellare. Enim uerò Praxagoras uidetur mihi appellare vitreum, humorem talem. Recentiores autem, e quibus Philippus est, crudum simpliciter, nulum adijcientes uocabulum ad exquisitam definitionem. Is profectò ex specie pituitosi humoris est: ut qui admodum frigidus atque humidus sit. Quisquis enim humor frigidus simul & humidus fuerit, sub ipsam phlegmatis, id est, pituitæ cadit appellationem, si quis Hippocraticè & ex omnium consuetudine non solum ueterum, sed etiam aliorum scriptorum nominare uoluerit. Prodicus enim libro de natura hominis præuè nominat, errans circa tale uocabulum ipsa de miranda etymologia adductus. Sed non est præsentis temporis ad talia deflectere orationē, cum

aliam dicarimus illis disputationē. Ergo rursus ad institutum veniamus. Quisquis in corpore humor fuerit frigidus & humidus, ipsi hunc nominamus pituitā: tu si libet appellabis scindapsum. Adeo sanē nulla mihi vocabulorum est cura. At uerō scias huius humoris plures esse differentias. Nam vna quidem species eius est admodum frigida: ita ut maximos dolores adferat, cum in locum calidum impacta est. Et sæpe numero multos dolores eorū qui colici dicuntur, ex acri clysmate tali humore euacuato, statim sedatos intueri licet. Hic autem humor videtur similis aspectu vitro fuso. Altera verō species pituitæ est, quam excreantes sæpe expuunt quidam sensibilem obtinens dulcedinem. Constatq; eam nequaquam posse esse omnino frigidam, si recordamur eorum quæ libro de simplicium medicamentorū viribus docuimus. Tertia præterea species alia pituitæ est, quæ ipsis expuentibus acida sentitur, ac minus quàm vitrea, magis quàm dulcis frigida est. quemadmodum altera salsa habetur, aut ob putrefactionem, aut ob permixtionem falsa serosa humiditatis: ex qua febricitantes minime rigent, sed horrent tantummodò, præhendente accessione. Acida aut ac vitrea si moueatur, per corpora sentientia permeans, infert rigorem sine febre. Quod si qua putredo moderata illis adfuerit, epialam committit febrem. Sin magis putrescat, rigor puenit: febris ipsa subsequitur, deincto frigore ab ipsa multitudine caliditatis, ita ut nullo modo existat per incrementa & vires accessionum. At verò vitrea pituita forsitan acidæ qualitatis particeps est: ita ut omnes eius differentie tres existant: acida, dulcis, salsa. atque ex pituita dulci putrescente, rigor minime antecedit febrem, forsitan uerò neque simpliciter, neque à simplici causa quis existimaret tales fieri febres. Siquidem quicquid pituitæ putrescit, accendit febrem: reliquum nondum putrescens, ex quo rigent non eiusdem est qualitatis, cum ea quæ putrescit. Si igitur ab hac quidem rigor, à putrefacta verò febris efficitur, duplex semper causa erit. Licet verò hic dicere febrem ab altero quidem fieri causæ genere, rigorem autem ab alio: ut qui non sit, quod febris. Per febrem tamen tertianam flaua bilis & rigorem efficit, & febrem. Sed hæc logicæ magis sunt cōsiderationis: nos ad institutum nostrum redeamus. Permista pituita putrescente, ex qua fieri quotidianam docuimus, cum bilioso humore efficiente tertianā, composita duplexq; causa & dispositio fuerit. Alter, n. humor vnoquoq; die, alter tertio quoque die committit accessiōem: ita ut unus dies duas habeat accessiones; alter uerò unam, cum tempora accessiōis in eisdem horas minime incidunt. Vbi enim incidunt, una erit confusa, neque tertianæ, neque quotidianæ exactam speciem seruans. Et quoniam vtræque febris duplex est, im-

plexus quatuor erunt. Vnus, in quo tertiana permiscetur quotidianæ: secundus, in quo tertiana permiscetur continuæ quotidianæ: tertius, in quo permiscetur quotidiana tertianæ continuæ: quartus autem, in quo permiscetur quotidiana continua tertianæ continuæ.

Quot modis fieri cōueniat implexus febrium, ex quibus æger minime deducitur ad integritatem.

Cap. VII.

CAETERVM vnicuiusque dictorum implexuum differentia duplex est. Interdum enim omnes accessiones eodem tempore simul inuadunt, quandoque diuersis temporibus accessiones præhendunt. Sed hi cognosci facili possunt, præterquàm quod sæpe intermittens minime cognoscitur à parum exercitatis; quoniam ægri nunquàm deducuntur ad integritatem, sed oportet speciem cōsiderare accessiōis, quemadmodum secundo libro de iudicio satis dictum iam est, & inde cognoscere, non ex ipsa circuituum proportionem. Subiciatur enim uenisse cuiuspiam circa horam primam, accessiōem simul cum frigore, qui uideatur uulnerare carnem laborantis, deinde omnia alia tertianæ febris indicia usq; ad uigorem processisse; cum uomitu bilis simul cum sudore benigno inclinaret, atq; esse iam diei horam nonam. Porro coniectare nos ex toto accessiōnis motu, circa vndecimam horam sine febre fore ægrotum, ea scilicet integritate quam in circuitibus nominare solemus. Ita uerò sperantibus statim subsistere sudorem, aut defata solum, aut etiam inhorrescente curæ. Deinde initium, atque incrementum, & ad hæc uigorem in genere continuæ febris pituitosæ sequi, duplicem profecto ita cognoscemus causam esse ac speciem febrium, mixta intermittente cum cōtinua, quamuis nulla inueniatur intermissio. Ac sequenti quidem die speramus præhensuram accessiōem hora nona, & si ut expectabamus res ipsa eueniat, penitus tertio die similiter sperabimus adhuc febricitante ægroto, iterum præhensuram eum tertianæ febris accessiōem hora prima. Quod si præueniat, aut cunctetur accessio, quam secunda die sperabamus fore hora nona, atque ea quam tertio die credebamus futuram prima hora: non etiam posthac sequentibus diebus, neque nonam horam, neque primam expectabimus, sed tantò prius aut posterius, quantò proportio primæ circuitiōis accessiōem præuenisse ab hora quæ initio cepit, aut tardasse, indicauit. Vtræ uerò earum defutura sit prius, tum ex febris specie coniectandum est, tum ex ipsa accessiōis longitudine, & magnitudine, & more, & motu, & item circuituum repetitione, & anticipatione & tardatione, & adhuc indicij quæ postea apparent cruditis & concoctionis totius morbi, quorum

quorum in vrina maxima cēsentur. Ac de his omnibus libro de iudicijs satis dictum est. Quod si pituitosa continua nequaquam ad nonam horā, sed quintam aut sextam excipiat intermittente biliosā, quæ prima hora inceptit, adhuc difficilior cognitū est vulgo isti medicorum, quibus talis consideratio minimè curæ est, an scilicet sit ynū febrīū genus quod infestat, an duo, & quodnam vtrunq; sit. Cæterum tanquā nihil horum cognoscentes, non solum nesciunt quonam modo oporteat curare eas quæ nequaquam cognoscuntur qualesnam sint, sed neque utrum secunda die suspectas habere conueniat vtraq; horas, quæ prima die accessiones attulerunt. Ego nanq; (scio) visus sum eis sæpenumerò variando potius quā præsentendo, ut medici solent coniecisse initium accessions.

Permiseri inuicem febres, scilicet tertianam exquisitam & quotidianam: & quonam modo Agathinus errauerit circa semitertianam. Cap. VIII.

PE hanc igitur mixtionem (de qua nunc agimus) tertianæ cum ea quæ quotidie accedit, vidi interdū circa primam horā præhendere accessiōem exquisitæ tertianæ, circa sextā autem existere accessiōem eius, quam recentiores medici propriè nomināt *καθυμερινον*, id est, quotidianam. Solent enim ita nominare febrem, quæ singulis diebus accedit, nequaquam definens ad integritatem. Ipse verò solitus sum talem nominare *ἀκαθυμερινον συνεχῆ*, id est, quotidianam continuam. nomen enim *καθυμερινον*, nequaquā licet inuenire apud quenquam Græcorū scriptum, sed *ἀκαθυμερινον* appellant rem oēm quæ singulis diebus similiter fit, sed vt Plato dixit, conuenire oportet nomina eos quibus tantarū ac talium rerum proposita est consideratio. Appellatur igitur, gratia caloris doctrinæ, ea quæ singulis diebus accedens definit ad integritatem, quotidiana simpliciter, nihil insuper addendo ei per orationē: ea uero quæ minimè definit, quotidiana continua: ac liceat tibi, si libeat, alteri adicere, intermittens. Pari ratione dicendum, & de ea quæ tertio quoque die accedit. Altera enim differentia tertiana simpliciter, uel etiam intermittens tertiana habetur, altera tertiana continua est. Licet uerò & continuā tertianā nominare, tertianā simpliciter, sine adiectione ulla: quemadmodum nonnulli appellant. Sed enim non opus est fusiū disputare de nominibus: sed redire ad institutum. Nam adolescens in quo dixi implexum extitisse tertianæ cum quotidiana continua, prima quidem die mane inceptit cum rigore tertianæ proprio febrī, alia omnia seruans exquisitæ tertianæ indicia: usque ad sextam horam, subitūque vomitū biliosū, ac paruum sudorem, à quo statim contractus est

atque inhorruit homo: deinde rursus præhendente accessione, pulsus erat paruus & inæqualis: post usque ad horam undecimā, succensa adhuc paulatim, pleraque ipsius accessiōis habebat propria: pauca uerò quæpiam ipsis quoque incrementi: deinde usque ad noctis horam quartā incrementum diligens erat, post in eadem magnitudine permanebat ad ipsum quidem sensum, usque ad horam noctis sextam. Vnde iam perspicue uidebatur inclinare usque ad quartam horā in secundo die. In ea enim contrahebatur, atque ipsius accessiōis indicia ostendebantur, partibus quidē ipsius extremis frigidioribus eudentibus, pulsu autem paruo: atque crescebat usque ad uesperam paulatim; neque horrorem quempiam, nec inæqualitatem aliam efficiens: deinde rursus uigebat circa horam quartam noctis, ac sensibilibiter inclinare incipiebat circa sextam. Ac quod quidem tertia die hora circiter secunda oportebat eius expectare accessiōem fore quotidianam, perspicuum erat: non tamen tertiana, an seruatura esset eandem horam, an non, perspicuum erat. Accessiō igitur horrida inceptit hora secunda, quæ citius quā pro accessiōne, in prima ac secunda die continuæ quotidianæ increfcens usque ad quintam horam, initium rursus alterum fecit post quintam horam, atque ei erant omnia symptomata similia ijs quæ secunda die extiterant. Deinde rursus increfcēs promptius usque ad octauam horam, rursus horruit in illa hora, ac paulò post accessiō propriè ascendeat increfcens: ita ut circa horam noctis quartā ad consistendi vigorem deduceretur. Ecquidnam aliud quā exquisitæ semitertianæ hæc accessiō extitit? Cum duæ febres eadem hora inciperent, eo quod quæ singulis diebus repetebat, duabus horis præuenisset; tertiana uerò duabus horis tardasset. Quocirca nitenti dignoscere speciem febris perspicue uideri potuissent temperata ac permixta tertianæ, ac continuæ quotidianæ symptomata. Cum enim tertiana cum rigore incipiat, quotidiana uerò sine rigore, permixta ex utrisque horrorem statim inferebat, rem quidem minorem rigore, maiorem uerò frigore: ac tantò maiorem frigore, quantò minor rigore est. Quapropter æqualiter distans ab extremis utriusque horror in medio amborum collocatur, rigoris scilicet atque frigoris: id quod temperatus inuicem extremis porissimum fieri solet. Ergo non ab re nomen tali febrī semitertianam indiderunt: Temperata enim ex quotidiana continua ac tertiana intermittente, totius suæ naturæ partem dimidiam utranque prædictarum febrīū habet. Vt igitur hemionus, id est, mulus est ac semideus dictus: eodem modo semitertiana. Mulus enim medietatem quidem equi conductis ei ad generationem, medietatē uerò asini habens, ab altero eorum tantummodò dictus est.

& semideus, indicatur quidē participare Dei medietatem: quōd autem homo sit altera ex parte, omittitur. Itidem semitertiana, medietatem alteram habet tertianam, medietatem alteram quotidianam continuam. Sed duplex modus generationis eius est, aut enim in vnum tempus duæ accessiones concurrunt, ut paulō antē dixi, quia altera præuenit, altera cunctatur: aut ambæ statim ab initio inuicem temperantur. Ac quæ quidē ambabus in unum tempus coeuntibus sit, vnam solam habet accessionem naturæ ipsius semitertianæ: altera uerò, omnes ab initio morbi vsque in finem, quæ maximè propriè semitertiana ab omnibus nominatur. Sed de hoc paulō post agetur, potissimum propter Agathinum & Archigenem. Adolescenti igitur quem nostrā narratio supposuit, tertio die tali veniente accessione, propterea quōd in unum tempus ambarum febrium accessiones incidissent, præueniente duabus horis quotidianæ ipsius accessione semper, tertiana autem cunctante semper duabus, accessio quarta die inceptit, orientē sole speciem seruans exactam febris pituitosæ. Futurum autē ex proportionē erat, ut quinta ab ea accessio inciperet circa decimam horam noctis quoniam semper præueniebat horis duabus ab initio: tertia autem accessio febris biliosæ habitura principiū erat quinta die, hora quarta, ita ut medium interstitium initij duarum accessionum foret sex horarum, quod ē factum est, circa decimam horam quartæ noctis incipiente accessione secundum speciem pituitosæ febris: atque ita procedente vsq; ad horam quartam diei, cōiūte uerò cum biliosā simul modico rigore, deinde rursus permixtā speciem habente accessione secundum biliosæ simul ac pituitosæ speciem. At uerò subsequenti nocte circa octauam horam pituitosā febris incipiens exquisita ac solā, totam obtinuit sequentem diē, quæ sexta fuit: tūc autem vsque ad mediam noctem inclinās, inde rursus inceptit eodem modo. Postea reliquam noctis medietatē, & tempus vsque ad meridiē septimæ diei obtinens, iam quodāmodo inclinauit. Sed tertiana ei successit cum rigore incipiens, quemadmodum solet incipere exquisita tertiana: atque alia omnia eodem modo exquisita afferens indicia, bilis vomitum effecit, & deiectionem biliosā, & urinam bonam, & quendam madorem crepusculo vespertino, indicans perspicuè ijs qui didicerunt cognoscere genera febrium, quæ remitteretur, atque inclinaret, & soluēda esset post vnam, vel (cum tardissimè) alteram circuitionem. Etenim inclinatio facilitatem habuit mirabilem quandam, & qualē nulla ex prioribus, vsque ad horam noctis quartam. In illa enim febris pituitosā singulis diebus accedens, horis autem duabus præueniens, inceptit, atque occupans totam noctem, & totum sequentem diem, rursus inceptit octaua nocte, secunda hora:

quam quidē noctem totam occupans inclinauit sequenti die nono. Accessio autem tertianæ erat futura in illa die circa octauam horam: quoniam duabus horis cunctabatur. Sed tunc circa horam nonam inceptit, indicans adhuc eam suā inclinationem. Solē autem occidente coiuuit cum ea accessio pituitosa, anticipando inuadens, quæ admodum solita erat: & noctem occupās illam, & sequentem diem, rursus inceptit decimo die, hora decima. Dein rursus vndecima die hora octaua exacte permanens pituitosa: deinde circa horam noctis primā, initium horrificum tertianæ febris quatuor horis tardantis extitit: tūc autē sexta hora noctis venter deiecit biliosa, & quidam in toto corpore sudor extitit: & post hæc tota inclinatio prope integritatem deuenit, atq; erat iam perspicuum tertianam destitisse integrè, pituitosam autem esse relictam solam iam & inclinantem. Hæc igitur ob res circa duodecimam diem, nec insuper accessio præuenit horis duabus, quemadmodum antea solita erat: sed septima hora inceptit, deinde circa decimā tertiam haudquaquam sexta: sed tardauit, ac septima hora inceptit, ostendens insignem facilitatem atq; inclinationem. Quartodecimo autem die inclinatio multo melior extitit, atque accessio inceptit hora nona, & in urina insignē cōcoctionis indicium apparuit, prænunciās fore solutionem futuro decretorio, sed de hoc nunc non est sermo, nisi obiter. Quod autem sæpenuerò permisceantur diuersi generis febres medicorum vulgus latentes biliosæ scilicet pituitosis, itemq; continuæ intermittentibus, præscriptus ægrotus abundè indicauit.

De differentia semitertianæ. Cap. IX.

SED cum de his satis dixerimus, ad id quod paulō antē promissimus, rursus veniamus. Composita enim ex tertiana & quotidiana continua (quam vocamus semitertianam) uel habet flauam bilem exuperantem, proindeque flauæ bilis symptomata vehementia: uel hanc pauciorē, pituitam uerò copiosiorē, proindeq; quotidianæ continuæ pathemata certiora: uel neutrum altero humore exuperantiore, sed ambos æquales, quæ sanè exquisita semitertiana est, talis specie qualem Hippocrates indicauit, scribēs libro primo Epidemion ad hunc modum. Pleriq; in hunc modum afficiebantur, Febris horriffica, continuā, acuta, in totum minime intermittens. Modus autem semitertianæ erat, diem quidē vnum habens leuiorem, altero autem grauius affligens, atque ad acutiorem dispositionem incremens. Horrificam autem dixit, non simpliciter febrem incipientem cum horrore (nā innumeris febribus id accidit, de quibus deinceps docebo) sed in qua bonā partem accessionis horror occupat altera durat die, in qua simul inuadunt tertiana

tiana ac quotidiana continua; Sequens enim dies quotidianam tantummodò habet. Quocirca prima dies magna ex parte permixtam ex utrisq; febrem committit; secunda autem continuam quotidianam. Interdum enim prima die incipere pituitosam; secunda autem utranq; contingit. Accessio igitur communis ex utrisque quoties æquales fuerint humores, talis est, qualem paulò antè descripsimus semitertianam. Vbi uerò tertiana exuperat, febris magis horrida est, & aliquid uigoris in accessione assumit. Statim itaque calidior talis est atque ardentior, ac celerius peruenit ad consistendi vigorem; & item quandam bilis vomitum, vel deiectionem, uel madorem infert. Vbi uerò humor pituitosus exuperet frigus extremarum partium exuperat, & horror paruus est, & pulsus contractio fortior ac diuturnior est, ac lentè accessio increfcit, & multo post tempore viget; non tamen sitim efficit, neque ardorem, neque uomitus, neq; deiectio biliosa, uel mador per eam existit. Atque huius mixtionis duarum febrium etiam Archigenes ipse in notitiam quandam deuenit, sed confusè & incertè, quemadmodum indicauimus septimo libro, quem contra ipsius commentarios de pulsibus effecimus. Estimatum enim in semitertianam quandoque exuperare tertianam febrem, quandoque quotidianam; non tamen mixtionem æqualem earum quæ sola semitertianam exquisitam committit, aut cognouit, aut indicauit, sed penitus omisit. Cum enim æquales magnitudine sunt intermittēs tertiana & quotidiana continua, initium accessionis cum horrore existit, id enim medium rigoris, per frictionisque existit, è quibus alterum tertianæ, alterum quotidianæ continuæ inest. Incrementum uerò post initium propter tertianam faciliè suscipit caliditatem, atque ad consistendi vigorem festinat; propter pituitosam autem tardum, quantum in ea est efficientem incrementum, inhibetur atque interruptitur. Atque est ueluti quædam pugna symptomatum, interdum incalescente ægro, quoties tertianæ calor vehementius agens ad curam humores effert, detinente autem interdum ac retrahente intrò huius motum pituita, quæ ociosa ac frigida est ex natura, ac difficilè mouetur, & tardè transmeat. At uerò in tali pugna, exuperante frigido humore, contractio efficitur, & horror ac frigus partium extremarum & cutis: ita ut altera accessio rursus incipere videatur. Quòd si calidior exuperet, uniuersum calefiunt, & propè ad vigorem peruenisse videntur. Dein paulò post exuperante pituitoso, ægri rursus contrahuntur, refrigerantur & horrent. Idque minimè desinit usque ad consistendi vigorem, qui maturius quàm pro pituitoso humore, tardius quàm pro bilioso existit; quoniam pituitosus detinet biliosi celeritatem, biliosus tamen tarditatem ac segnitiam pituitosi accelerat. Atque hu-

iusmodi quidem exquisita semitertiana est, ex æquali temperamento duarum febrium & duorum humorum effecta. Ea uerò quæ minimè exquisita est, uel humorem biliosum, uel pituitosum obtinet ampliozem.

Semitertianam esse febrem continuam, nec unquam deduci ad integritatem: sed errasse Agathinum, vocantem semitertianam omnem febrem diuturniorem, Cap. X.

AT uerò secunda implexio ac mixtio est duarum febrium tertianæ & quotidianæ, subtilem efficiens accessionem prædictæ, sed differentem eo: quòd hæc deducatur ad integritatem, & quòd secunda die, uel cum horrore uel rigore quotidiana sola effecta, incipiat. Quocirca talis febris non insuper semitertiana erit: siquidem semitertiana continua censetur. Si uerò in altero genere febrium eam annumeremus, non solum talis, sed etiam aliz quædam febres nominabuntur semitertianæ. Ob eam rem mihi uidetur Agathinus omnes productas tertianas, appellare semitertianas. Sed enim cum de nominibus potius quàm de rebus tales quæstiones sint, immorandum in eis minimè cenfeo. Nam alio libro seorsum de uocabulis medicinalibus dictum iam est: in quo id ostenditur ac definitur in plenum, quænam sint de rebus, & quænam de nominibus controversiæ. Quocirca rursus ad res ipsas redeamus, semitertianam ab Hippocrate nominatam horridam & continuam, quam tertiana quotidiana continua permixta committit: intermittenti autem, minimè efficit: propterea quòd febris ex utraque composita, necessariò & ipsa intermittens existit. Neque uerò ex duabus continuis, biliosa scilicet ac pituitosa, fieri potest semitertiana, neque enim mixtio horridam faciet febrem, neque multas ingeminationes habentem. Cum enim omnis continua febris suapte ratione, cum exquisita est, neque habeat horrorem, neque rigorem; neque etiam febris ex eis composita, horrida erit. Oportet ergo si eadem futura sit horrida simul ac continua, generationem habere eam ex duabus febribus: altera quidem intermittente, altera autem continua. Et ob eam rem tertiana permixta quotidianæ continuæ, committit semitertianam: neque ambæ intermittentes, neque ambæ continue possunt committere talem febrem. Restat igitur una mixtio quæ ex quotidiana intermittente, ac biliosa continua constans, potest continuam simul atque horridam committere febrem. Sed hæc contrà quàm prima, habebit continuitatem quidem ex biliosa, horrorem autem ex pituitosa, atque ingeminationes ex pugna mutua, maximeque quoties humores ipsi fuerint æquales. Vincens uerò eorum alterutrus ex symptomatis agnitio

agnitio in prima miffione declarata est. Hæc omnia de quatuor miffionibus biliofa febris ac pituitofa, magis propria sunt libro qui est de typis: sed hic neceffario dicta sunt propter semitertianam: cuius generationem Archigenes ad tertianam quotidianamque retulit: nequaquam videns se intermittentem efficere febrem. Agathinus verò perspicue confessus est eiusdem generis esse cum tertiana semitertianam, dissidentem tantummodò magnitudine accessions. Si igitur omnes febrium differentias accuratè persequuti, lapsi nominibus essent, fuisset id ferendum. Sed cum neque simplicium, neque compositarum omnes scripserint differentias, & ad hæc quasdam alias superuacuas adiecerint, nihil neque in præfensionem, neque in curationem iuuant, nos conati sumus pro viribus diligenter excolere omnem typum, longo tempore, ex usu simul ac ratione, utiles in eo differentias peruestigantes. Simples ergo ad præsentem attinent librum: implexæ autem ex his, attinent ad librum de typis, cuius penitus ignarus non eris, ubi hunc diligenter euolueris. Ex ijs enim quæ diximus de febre pituitosa ac biliosa inuicem permixtis, licebit hæc ad atram bilem transferentes, de implexu cum utraque earum ac temperamêto conijcere: implexum nominantes, ubi diuersis horis incipiant: temperamentum, ubi initium eodem tempore sit. Nec secus tres febres implicare ac temperare quis per se ipse poterit sumpta ratione de prædictis. Horum enim omnium initium, fons & elementum est, diligenter internoscere cuiusque simplicium febrium speciem. Neque enim magnus numerus earum est: sed omnes tres existunt, biliosa, melancholica, ac pituitosa, quarum cuiusque duplex differentia est, intermittens & continua, ita ut omnes simplices differentie febrium ex humoribus putridis consistentium sex numero sint. Quod si qua alia illis accesserit, in his particulatim differentia ex copia humoris, quantitate & qualitate putredinis, necnon modo motus, & parte in qua putrescit, generationem habebit.

Quo pacto erret Agathinus, appellans febrem omnem semitertianam, cuius accessio plurimum producatur. Cap. XI.

QUALE hoc sit quod iam proponatur ex ijs febribus intermittentibus quæ tertio quoque die infestant, cui quidem & accessions tempus breue est, & initium cum rigore, & solutio cum sudore ac uomitu bilis, uel etiâ inferna aluo deiciente biliosa: huic nomen inditum est exquisita tertiana: cui verò aliquid horum deest, non iam plus exquisita, sed simpliciter tertiana vocatur. Quod si & intermissionem minorem habuerit, producta scilicet accessione, ter-

tianam hanc nominant productam: tametsi hæc maioris minorisque ratione differentiam magnam obtineat. Ac licet hanc quidem absoluto sermone appellare productam, quæ cum quatuor & viginti horas accessions occupauerit, reliquas sine febre obtinet: hanc verò admodum productam, cum circiter triginta horas febris produci-
tur: & hanc præterea magis productam, cum ad sex & triginta procedit: & hanc aliam plurimum cum ad quadraginta & eo amplius produci-
tur. Sed hæc omnia definire certis terminis non licet ob accrualē dubitationem. Neque verò necesse est talem nominum subtilitatem querere, cum liceat nobis etiam sine ea indicare ijs qui ad sunt diligenter de vnoquoque ægro, & rectè curare, ac euentum morbi, præsentire. Subijciamus enim quempiam quindecim horis febricitare, esse autem sine febre tribus & triginta, atq; id deinceps ei accidere ex proportionē. Sanè cibandi tempus certa scientia sumere licebit tum ex accessions, tum intermissionis tempore, & quicquid ex eo sumi vtile potest ad præfensionem & curationē, id quoque abundè suppetet, etiam si non queratur tertianamne absoluto sermone oporteat nominare talem febrem, an cum quadam alia additione definiēte ipsam differentiam. Quin & volens indicare alia ratione febrem egri quendam, diligentius indicabit, accessions & intermissionis dicens longitudinem, quam querens nomen quod perspicue, ac definite indicare idem queat. Hæc igitur optima enarratio, atque doctrina est. Secunda autem est quam paulò antè dixi, exquisitam quandam tertianam nominans, aliam verò simpliciter tertianam, mox aliam paulum productam, deinde aliam admodum, aliam autem magis, postremò plurimum aliam. Sed ex omnibus obscurissima ac pessima est, quæ prima est prodita: ob quam recentiores medici quotidie inter se certant atque contendunt, ne id quidem cognoscentes se de nomine contendere. Sed de alijs quis fortasse minùs mirabitur: de Agathino verò magis mirandum, siquidem productam quandam nominans quotidianam & quartanam, in tertiana minimè seruauit proportionem: sed cuius amplius producta fuerit accessio: hanc nominat semitertianam. Sed de nominum ratione hætenus, nam & ipse plus quam par est temporis in ipsis contero, proinde tempus est, ut ad considerationem aliarum rerum redeamus.

Quonam modo ex sanguine putrefacto febris accendatur biliosa: & quod sanguinis pars tenuior vertatur in flauam bilem, crassior in atram. Cap. XII.

SERUENS est ut agitetur consideratio nihilominus, utrum quemadmodum ob utrangque bilem ac pituitam sunt genera quædam febrium, ita & ob sanguinem putrescentem eueniat.

Febris enim diaria, eo tantummodò calefacto (ut diximus) haudquaquam putrefacto consistit. Per ipsam verò putrefactionem (necesse est enim interdum sanguinem putrefieri) querendum febrium ipsarum genus. Id autem inuentum iri par est, si prius inuenerimus quonam modo sanguis putrescit. Constat enim Aristotelem rectè dixisse, fieri putrefactionem ab aliena caliditate, intelligit autem alienam, externam, non nativam, nec vnicuique rei propriam. Hæc enim concolligere, aliena verò corrumpere solet, quod est putrefacere. Extrinsecus autem caliditas superuenit sanguini per æstum, ac pestilentem constitutionem, & ut summatim dicam, per omnes febres ex quacunque causa in generationem deducantur. Quinetiam ubi in quapiam animalis parte sanguis copiosior collectus, supra vires eius fuerit, corrumpitur: maximeque quoties infarctus est ob crassitiam in parvis valis, aut impactus ob copiam. Quemadmodum accidit in bubone & phymatis, & ut in summa dicam, in omni inflammatione. Nam in tali dispositione sanguis duplici ex causa corrumpitur: tum quia minimè diffilatur, tum quia à natura minimè vincitur. Quod autem quæ minimè diffilantur, putrescere soleant, in cunctis exteris corporibus intueri licet, fructibus, seminibus, atque etiam vestibus: atque persuadere id quod dicimus, maxime potest pleuritis. Expuunt enim per eam alij spumofam, alij pallidam, alij rubram saniem, quæ nihil aliud est quàm humoris in inflammatione vincentis pars quæ non continetur, sed præ tenuitate foras refudat. Interdum etiam talis sanies nigra apparet, ac neque statim ab initio, sed processu temporis, præcedente magna ex parte pallido spuro, quod erat indicium flauæ bilis exuperantis: quemadmodum spumofum pituite, rubrum sanguinis. Quocirca ratione non caret interdum putrescere sanguinem ipsum in locis inflammatione affectis, febremque ex eo simpliciore esse quàm ex alijs humoribus. Proportionem autem accessionum tertianæ circuitiōnis potissimum sumit (ita enim fieri cernitur & in pleuriticis quoties rubrum expuunt) ubi uerò supra modum assatur, mutatur penitus. Pars enim tenuissima simul ac pinguis in pallidam bilem, crassior autem in atram uertitur, quemadmodum accidit in carbunculis. Et enim in his sanguis vehementer feruefactus mutatur in humorem melancholicum. Ad hunc uerò modum inaudire oportet humorem melancholicum, tanquam nondum effectus sit atra bilis, sed in confinio quodam collocatus. Febres igitur consistent pro specie humoris, in quem sanguis mutatur, tantummodò dissidentes malignitate & clementia. Simpliciores enim sunt ex mutatione sanguinis: tum cætera; tum caloris lenitate. Est enim quam maximè mulus manus occursum deprehendatur, prorsus tamen miris est: quemad-

modum is qui post balnea accidit. Copia enim caloris febrilis in ipsa effluuij copia semper posita est: molestia verò, si admoneas extrinsecus manum, in ipsa caliditatis acrimonia, idque erit tibi indicium maximum humoris committentis febrem: intelligo autem ipsius caloris qualitatem. Qui enim vaporosior est atque minus molestus, sanguis est: qui molestus, erodensque & mordax, ex bile consistit. Vbi verò in primo occursum vaporosus potius quàm mordax sentitur, diutius autem immorantibus paulatim ei acrimonia accedit, eaque maximè inæqualis, ita ut per eolum quoddam vel cribrum transmitti videatur talem febrem ex pituita putrescente consistere sciendum est.

Multa morborum genera repetere per circuitiōnem, ut ophthalmiam, capitis dolorem, podagram, dolorem articulare. Cap. XIII.

CAETERVM consideranti mihi querentiq; causam ob quam febres ex alijs humoribus calorem habent æqualiter occurrentem: quæ uerò ex pituita consistunt, dictam obtinent inæqualitatem: apparuit mihi potissimum causa esse lentor crassitiesque humoris, & dissolutionis difficultas. Huius enim, ut aliorum omnium, quicquid semper extenuatum est, per halitum digeritur: vix autem extenuatur, quicquid crassissimum: ac multò minus, si frigidum natura sit. Quocirca neque totum nec æqualiter, sed quicquid putredo occupauerit, id solum in status vertitur, ac extenuatum foras fertur, ac perinde euenit ut in glutinosis crassisque humoribus externis dum elixantur. Existunt enim ex eis bullæ, quibus ruptis spiritus vniuersè educitur, simul secum abducens humorem attenuatum. Vbi verò tenuis humor elixatur, neque bullæ efficiuntur, & qui ab eo attollitur uapor omnino similis ac conuinus sibi ipsi est, sed cum de his satis dictum sit, sequens est ut agamus de causa febrium synochorum. Mirum enim mihi esse videtur sæpe vsque ad quartum uel quintum, & interdum vsque ad septimum diem, unam fieri accessionem in eis ab initio vsque ad finem. Quanquam si quis consideret diligenter, magis mirum est quasdam febres repetere per circuitiōnem. Exemplum enim supradictum à nobis de stercore particulatim putrescente, non perinde potest accidere, cū in corpore animalis putrescentes humores cum his qui putredine nacent, facile misceri possint, utpote cū ex omnibus confluxus, conspiratioq; in omnia existat. Quocirca minimè fieri potest ut putredo in una aliqua parte, aliàs alia fiat, nisi inflammatio colligatum detineat incipientem putrescere humorem. Cū igitur ratio in contrarium cedat, difficiliusque sit inuenire causam febrium circuitiōne repetentium quàm synochorum,

rum, de utrisque nitemur differere, neq; hic producentes sermonem, neque contradicentes erratis aliorum, sed (ut in omnibus antè fecimus) veritatem ipsam tantummodò persequentes, quæ nixus possis deprehendere errata aliorum. Incipiendum igitur ab ijs quæ manifestissimè apparent, cuiusmodi sunt ophthalmiæ quædam, quarum hæ quidem singulis diebus, hæ autem tertio quoque die infestare cernuntur. Nec secus auris dolor & capitis, uel totius, uel dimidij, quem nominant hemicraniam. Nonnullis verò etiam podagra ac dolor articularis repetit per circuitionem. Ut igitur in his omnibus videre licet uenas ipsas in partibus quæ infestantur in tumorem attolli, & phlegmonem augescere, & dolores intendi, & fluxionem insignem foras procumbere, ita existimandum est in partibus internis, quæ minimè apparent seruari eandem proportionem. Verbi gratia per inflammationem pleuritides, ac peripneumoniam intumescere quidem inter initia accessionum, discuti uerò ac subsidere per inclinationem. Sed quonam modo id fiat fortasse inueniemus, si ea quæ de inflammationis generatione & rheumaticis affectionibus uocatis alibi demonstrata sunt, ad memoriam reuocauerimus. Si enim simul cum illis adiecerò quæcunque propria huic sermoni sunt, præsentibus quæstionibus sufficient.

Quam ob causam fluxiones certis temporibus decumbant, et quòd partes debiliores promptius suscipiant excrementa. Cap. XIII.

FLUXIONEM igitur decumbentem in oculos, omnes quidem concedunt ab ipso capite defluere, sed quænam causa sit ob quam præfinita circuitione sæpenuerò defluat, dicere minimè possunt: ut qui nequaquam commentati sunt in facultatibus naturalibus, de quibus ipsi tribus libris perscripsimus, indicantes omnes quatuor esse, à quibus plantæ & animalia gubernantur. Vna ergo est quæ attrahit proprium alimentum, altera id ipsum detinet: tertia autem ab his alterat: quarta ab his aliena expellit. Alienum autem in omnibus rebus duplex est: alterum qualitate, alterum quantitate. Id uerò propter situm in ipsis partibus facultatum fortitudinem atque imbecillitatem colligitur. Nam si quidem paribus sint viribus, & meatus deferentes excrementa se habuerint secundum naturam, partes ipsæ sanæ sunt: si uerò plus quam alterari queat assumptum sit, excrementum omne excerni à facultate expultrice pulsus, necesse est. Quòd si hæc imbecillis sit, eodem in loco manere necesse est. Atque si multum sit, grauat eum ipsum, atque distendit, si acrescit erodit & mordet, quemadmodum si calidum sit, calefacit: si frigidum, frigefacit, atque hæc perspicua sunt in ijs quæ in ventre

habentur. Quidam nanque ingerentes plus alimentum, interdum vomere coguntur nauseabundi: interdum alui fluore corripuntur. Quod igitur hic per maxima spacia excernitur eructantia foras excrementum, id in alijs partibus animalis per tenues meatus non foras, sed ex alijs in alias transiit partes: expellentibus quidem fortioribus, suscipientibus uerò debilioribus. Porro rursus expellitur ex his in alias, atque ex illis in alias defluit, quousque in debilissimas omnium decumbat. Id autem rursus recurrere inde in alias fortiores nequaquam possibile est. Atque ob eam rem per phlethoram ac uitium humorum partes omnium debilissimæ aliàs inflammatione, aliàs erysipelare, uel herpetibus, uel alia quapiam affectione præhenduntur, aut habent affectionem quam rheumaticam nominant, de qua seorsum scripsimus. Quocirca minimè mirum uideri debet, cerebrum uel etiam totum interdum caput ubi collegit aliquod excrementum, in aliquam partem debiliorem expellere, aut in aures, aut oculos, aut tempora, aut labrum, aut dentes, aut genas, aut palatum, aut gingiuas, & gurgulionem, & tonsillas, & adenas ibi contentos: atque ubi nullum ex his fuerit imbecille, in thoracem, pulmonem, fauces, gulam, uentriculum, fluxionem transmittit. Quemadmodum ergo caput sæpenuerò prædictorum cuique causa morbi est: ita inflammationis in iecore & liene, proximarum aliqua partium, aut etiam mehercle, una longius positarum, uel plures quæ excrementa gi gnunt, augent, transmittunt, & circuitione affligunt. Ac nihil mihi est his accidere affectum similem excretioni excrementorum uentriculi. Quemadmodum igitur si quis uideret quidem quatum quoridie excernitur, ignoraret autè causam excretionis, miraretur ordinem: ita qui nescit neque generationis in capite excrementorū, neque excretionis causam, ignorat autè & quam obrem hæc foras decumbant, illa in aliquam aliā partem transfluant: hæret atq; miratur influxus proportionem. Pari autem modo, & qui ignorat quæ partes excrementum iocinori transmittunt, miratur proportionem excitatarum ex iecore febrium. At qui nouit decumbentem in uiscus fluxionem & primum phlegmōnes initium dedisse, & sequentis accessionis ipsam partem affectam autorem esse, mirari desinit.

Quonam modo ex calore attrahantur excrementa: & quòd dolor omnis irriter fluxiones. Cap. XV.

CAETERVM duplex causa est huiusmodi influxus humorum, una quam proximè indicauimus, quoties ex alijs partibus in alias debiliores excrementa transmittuntur: altera uerò, quoties attrahuntur, de qua hoc loco agendum, initio sermonis petito ab ijs quæ omnibus prospici-

cua confessaque sunt. Si enim tapſiam illinas cui-
piam, videbis paruo tempore partem huic eſſe ca-
lidiorẽ, atque in tumorem non paruum attolli.
Nec ſecus ſi foucas partẽ quãpiam iuxta ignẽ,
aut fortiter frices, aut vngas reſina, aut pice mo-
dicẽ calida, deinde paulò poſt euellas vnũverſim,
aut ſi etiam vngas partem quopiam medicamen-
to calido, videbis enim ex his omnibus ipſam at-
tollĩ in molem: quia calor ipſe, uel ad ſe trahere,
uel ſuſcipere ſoleat fluxionem. Verũ neceſſe
non eſt in præsens talia definire, id quod vtile eſt
inſtituto iam habẽtes, etiam ſine huiuſmodi con-
templatione. Semper enim in partes yehemen-
tius caleſcentes decumbere fluxio videtur: ubi
corpora plena ſunt, atque abundant excrementis,
admodum larga: vbi uacant excrementis, pauca.
Decumbit præterea maximè & in dolentes. Sic
nanque ſæpe cui ſummus digitus manus minimã
acu punctus eſt, ſtatim dolet, & paulò poſt par-
tes quæ circiter ſunt inflammatione laborant,
atque in molem maximam tolluntur. Quibuſ-
dam verò etiam bubones ſub ipſis aliſ erumpunt,
vbi acceperint aliquid fluxionis rara & ſpongio-
ſa, quæ ibi habentur corpora, quos Græci nomi-
nant adenæ. Quibuſdam autem accidet id in me-
dio brachio ubi inſignis adeneæ parte extiterit.
Perſpicuè id quod dicimus uidere licet, quoties
viciuſ aliquod exiguum ſine inflammatione ac do-
lore prope vnguẽ fuerit. Si enim hoc contem-
natur, neque coeat, & ad cicatricem deducatur,
innata ipſi caro ab ungue preſſa primũ quidem
dolet, deinde totuſ digituſ, aliquando verò & eo-
rum corpus, & interdum manuſ uel peſ in maxi-
mam deducitur inflammationem. Ita igitur do-
lor attrahit in dolore affectas partes fluxionem,
non tamen cauſam huius hic dicere oportet. Ali-
bi enim commodiùſ eſt diſta, nec illuſ in præ-
ſens indigemus. Videntur ergo iam cauſæ flu-
xionum ex ipſis partibꝯ laborantibꝯ fluxione
ortæ eſſe duplices. Vna ex calore qui in eis ac-
cenditur: altera ex dolore qui ſuperuenit. Cauſa
autem cur aut pluſ, aut minꝯ, aut benigniꝯ, aut
deteriꝯ influat, eſt non in ipſis ſolum partibꝯ la-
borantibꝯ fluxione: ſed cur benigniꝯ deteriꝯ uẽ
influat, in ipſis partibꝯ mittentibꝯ cauſa eſt: cur
autem pluſ minus uẽ, in utriſque. Calor enim for-
tis ac dolor, pluſ debiliꝯ, minus attrahit. Itidem
corpora excrementis uacua exiguum quiddam
trahentibꝯ mittunt: excrementoſa autem ac ple-
thorica tantò pluſ mittunt, quantò ab ipſo natu-
ræ habitu longiꝯſ receſſerint. Atque hæc quidem
fluxionum differentia ſine debilitate partium flu-
xione laborantium exiſtunt. Aliæ uerò & ob hæ-
rum debilitatem, ac fortitudinem mittentium ex-
crementa, efficiuntur. Omnis enim inflammatio
ſine vulnere ac collisione præhendens partem,
excrementis quibuſdam decumbentibꝯ ex for-
tioribꝯ in debiliꝯſ exiſtit. Talis autem inflam-

matio ſtatim accendit febrem, quoties ob magni-
tudinẽ, aut uicinitatem calor ex ea ad cor per-
uenit. Decumbentia igitur excrementa in omni
inflammatione putreſcunt propter cauſas priuſ
diſtaſ. Nec ſimiliter omnia putreſcunt, eo quòd
quædam ſunt pituiſoſa, alia melancholica, non-
nulla biliſoſa. Ipſiſ autem putreſcentibꝯ accen-
ditur calor præter naturam in parte inflamma-
tione affecta: ſimul quidem calefaciens quæcun-
que primæ tangunt inflammatione obſeſſas par-
tes, deinde illiſ continuas, ex quibꝯ ruruſ alia
ratione uicinitatiſ calefactæ, ruruſque alia ab il-
liſ uſque ad ipſum cor deferunt interdum calidi-
ratẽ. Sed quænam ſit diſpoſitio in parte in-
flammatione affecta, diximus in libro de intem-
perie inæquali: & item in libro de tumoribꝯ præ-
ter naturam. Quòd autem neceſſe ſit contentum
in ea ſanguinem putrefieri ſæpenumero, ſimul cũ
materia quæ influxit, in hoc dicetur.

*Colligi excrementa diuerſis temporibꝯ, quæ ſæpe-
numero ordinem minimè ſeruent, atque eſſe quan-
doque breuem, quandoque longam acceſſionem.*
Cap. *XV*

EXCREMENTVM igitur quod decubuit ex
vna parte in aliam, interdum adeò multum
prauumque eſt, ut partiſ laborantiſ fluxio
ne lædat vires: interdum adeò mite ac exiguum,
ut ſuſcipiens corpus minimè offendant. Si igitur
adeò debilitet vires ut exoluantur, nec præterea
euineant ea quæ priuſ uincebãt, tunc ſanguinem
putrefieri neceſſe eſt duplici ratione: & quia hu-
mor minimè euictuſ à calore proprio reliquam
habet in putredinem mutationem: & quia ſimul-
cum excrementis putreſcentibꝯ putreſcit. Sin
non tantum lædat vires ut exolutæ penituſ quie-
ſcant, ſemiprauꝯ & tanquam ſemiputriſ, in tali
conſtitutione ſanguis efficitur: uicinitate qui-
dem putreſcentium excrementorum ſimul putre-
ſcens, perſiſtens tamen in ſua ipſiuſ natura quan-
tum eſt in ratione facultatiſ ipſum conſicientiſ.
Vtꝯunque autem ſe res habeat, accēſuſ calor per
primam putredinẽ penituſ acrior ac mordacior
eſt quàm foret dum per naturam haberet, atque
tantum creſcit, quantum natura ipſa excremen-
torum ſufficiat. Hæc enim talem habent propor-
tionem ad calorem ex eis accenſum, qualem li-
gna ad ignem obtinent. Hæc tamen minimè in
inſinitum tempuſ ſufficiunt ad alterationem: ſed
terminuſ alterationiſ ipſiſ eſt, humoris innati cõ-
ſumptio: nam eoſque cremari queunt, dum in-
natum habuerint humorem: atque eo conſum-
pto cremari deſinunt, ac reliquiæ eorum nomi-
nantur ciniſ. Quinetiam putreſcentium humo-
rum ſimiliter calor permanet dum proriꝯ ſint af-
ſati, par eſt autem reliquiæ humorum terreſtreſ
exiguas eſſe: nequaquam multas, quemadmodũ
lignorum:

lignorum: propterea quod in substantia eorum elementum humidum exuperat, non siccum. Simili modo si libeat coquere humorum externorum quempiam, ut oleum aut uinum, terrestre quidem eius qui minimū relinquetur, reliquum autem totum extenuatum, in uaporem atque aeternam discedet. Itaque tota substantia feruifactorum humorum ex putredine extenuatorum ab ipso calore in ambientem dispergitur per uigorem, inclinationemque febrium. Remanet autem iam excrementum omnino exiguum, uel nullum: in humoribus quidem crassioribus exiguum, in serosioribus autem nullum. Quod si nulla debilitas extiterit virium partis inflammatione laborantis, nec rursus mittantur excrementa: & morbus solutus est, & posthac haud iterum febricitauerit homo, neque sequenti die, neque tertio quoque die, neque quarto quoque. Quod si ob eandem causam mittantur excrementa ob quam ab initio parti mittebantur, aut si hæc quidem non amplius mittantur, sed permaneat uirium debilitas: denud febricitare hominem necesse est. Subijciatur enim primum, facultas partis robusta, tempore uero interueniente eisdem in partibus quæ prius transmiserant, collecta esse excrementa paria quantitate & qualitate hisquæ initio transmiserant. Hoc uero accidit his in quibus dispositio mittentium, & attracti ad ipsas alimentæ, quantitas & qualitas eadem permanet. Necesse enim est, æquale ac simile quod ab eadem alteratur facultate, æqualia ac similia facere excrementa. Quia etiam tempus collectionis eorum necessario æquale erit. Partes enim quæ aluntur quoad similem habuerint constitutionem ab eodem nutrita alimento, æqualia quantitate & similia qualitate, atque eodem temporis tractu colligent excrementa. Quia etiam eadem circuitione incitantur ad expellenda ea atque mittenda debilibus. Siquidem tunc primum expellendi facultas excitatur ad operationem suam, ubi grauatutur multitudo excrementorum, aut qualitate molestatutur. Sed de his omnibus in commentarijs de uiribus naturalibus definitum iam est in quibus exercitatum esse conuenit eum, qui quæ nunc dicuntur, sit cum demonstratione intellectus: magno quidem præmio ipsi proposito ex tali contemplatione ad curandi uiam & rationem. Nam ut alia omnia omittam quæ sum dicturus in eo libro unius tantummodo faciam mentionem, quod maximè quidem in promptu est, quodque ipsi sæpenumero fecimus, ophthalmia: scilicet per circuitionem repetentis. Spero enim id non paruum incitamentum fore lectoribus ad eam quam hoc loco tradimus condiscendam doctrinam. Contra enim quam qui se nominant ab oculorum curatione ophthalmicos, curauimus semper huiusmodi ophthalmiam. Nam cum illi semper oculis negotium facesserit, nos interdum

purgatione, interdum balneo, interdum meri potione (ut Hippocrates dicit) interdum sanguinis missione, interdum utrisque, uel clystere cum sanguinis missione uti sumus: atque interdum statim his adhibitis desinit, quandoque etiam ubi capiti fuisset prospectum. Omnes enim qui ita curati sunt, aut omnino accessiōnem non habuerunt, aut semel solum: sed multo leuiore quam prius. Sed de curatorijs discretionibus ac de indicijs, nequaquam est hoc loco agendum. Ceterum quod accidat interdum totum caput aut minimè affectum, sed sanguine prauo atque excrementoso nutritum, colligere excrementa plura ac uiciofiora quam antè, ita ut nequaquam is sufficiant naturales effluxus ac perspiratus, sed cogatur natura expellere excrementum ad aliquam partem debiliorem, aut si humores secundum naturam se habeant, ipsum autem affectum sit, aut etiam ambo concurrant, colligi excrementa, atque decumbere in aliquam partem, præsens sermo demonstrare studet. Etenim quoad decumbens humor similis fuerit, & capitis dispositio eadem, eoque excrementa æquali colligentur tempore similia & æqualia, & accessiones oculorum similes erunt. Simili modo & si non totus capitis, ac certè unius alicuius in eo partis, aut meningum, aut cerebri ipsius fuerit aliqua dispositio, ita ut ex tali nutrimento colligatur tantum taleque excrementum tantotempore: deinde expellat excrementum id tunc primum cum ab eo insigniter molestatutur: accidit & tunc per circuitiōnem infestari uel oculos, uel aures, uel aliquid aliud tale, in quod debilius expulsum fuerit excrementum. Ut igitur in oculis, uel auribus, ac pedibus, & alijs multis partibus talibus perspicue uidetur fieri accessio per circuitiōnem, quemadmodum ostensum est: quid mirum in pleuritide, & peripneumonia, & phrenitide, & alijs omnibus quorū non licet inueniri inflammationes, similiter fluere excrementum? non in alio ipsa parte inflammatione obfusa affectu laborante peculiariar propterea ad dictorum generationem, quam quod mittentibus excrementa eo tempore imbecillior est. Neque etiam illud mirum uideti debet, quod non eodem tempore colligantur omnia excrementa. Quod enim neque qui deferunt ratione alimentæ sanguis semper similis est, neque dispositio partium quæ aluntur eadem, uideireo aliud alij tempus satis est ad tantum excrementi collectionem. A quo primum natura partis molestatutur, cogiturque ueluti alienum a se id quod molestat, expellere. Neque porro mirandum est, ipsarum accessiōnum longitudinem inæqualem esse. Cum enim neque genus, neque multitudo excrementorum una sit, neque similiter accendi in omnibus, neque discuti conuenit. Nam plura quidem & frigidiore, & glutinosior, & crassa, longiores committunt accessiones: pauciora autem & calidiora & tenuiora breuiore:

mores: conducente ad id non parum totius corporis constitutione eo tempore & virium robore. Corpus enim rarius breuiore, quantum in se est, efficit accessiones: densius autem longiores. Et robur quidem virium, breuiore: debilitas autem, multo longiores. Facultas enim valida proprius à se expellit id quod est alienum: corporis autem raritas, minime detinet id quod effertur. Quocirca ita affectis cito euacuari excrementum necesse est: si etiam alia similia existant. Pari ratione quibus e contrario corpus afficitur, ijs necesse est esse longiorem excretionem excrementorum, debilitate expellente excrementa facultate: detinente autem ea quae effertur, angustia meatuum. Omnibus autem simul concurrentibus, aut breuissima aut longissima accessio fit. Longissima quidem, ob crassitatem, & multitudinem excrementi, ac virium imbecillitatem, meatuumque angustiam: breuissima autem, ob tenuitatem, & paucitatem excrementi, & robur virium, ac uiarum amplitudinem.

Quam ob causam accessiones desinant ad integritatem.
Cap. XVII.

Simili modo nec quae ob causam accessiones quaedam desinant, ad integritatem, quaedam verò non, difficile est inuenire. Quoties enim prioris accessionis tempus adeo breue fuerit, ut priusquam secunda incipiat, iam prima desierit: medium principij secundae, priorisque finis inter uallum totum sine febre existit. Sed ubi secunda prius incipiat, quam prior omnino soluat, nihil harum medium relinquitur. Hoc igitur (ut diximus) fit, quum facultas partis excrementa recipientis sui similis esse pergit, hoc est, adhuc, ut antea, sanguinem qui in ipsa habetur, vincit. Quod si quando debilis efficiatur, idque ei causa fit, cur non excrementa solum, sed ipse etiam sanguis corrumpatur ac putrescat, & febris accendatur: alterum inde quoque initium orietur circuitu repetentium accessionum. At si quidem praedictus adhuc seruetur calor, duplex erit genus febrium inter se implexarum. Si verò ille quidem desinat, dispositio verò suscipientis fluxionem permaneat, quae demittente sunt dicta prius, de hac intelliges. Haec enim pars efficiet in se quaedam excrementa duplici ratione, quemadmodum & illa, tum quia prauus est sanguis contentus in ea, tum quia facultas debilis est. Nec secus si ex quauis causa reddita sit interdum debilis partis dispositio: adeo ut onus ipsi potius quam alimentum sit sanguis adiectus. Corruptetur enim: & si calidus fuerit, facile putrescet. Si verò subrigidus ac pituitosus, non statim quidem: sed processu temporis is quoque eandem suscipiet dispositionem. Quinetiam ubi nequeat concoquere

quolibet pars genita in se excrementa, aut expellere ad aliam, tale sibi ipsi initium febricitandi, quale ea quae transmittit alteri, adfert. Cur autem nequeat alteri mittere excrementa, prima quidem causa est in viribus mittentis suscipientisque: altera autem in uiarum obstructione, quae à glutinosis, crasis, & multis fieri solet humoribus. Nihil igitur miri est, si etiam absque eo quod altera mittat alteri excrementum (quemadmodum caput oculis mittebat) ex excrementis in ipsa adhuc manentibus in eandem suscipienti aliena dispositionem deueniant. Quae enim obstruxerunt naturales effluxus, processu temporis ea quoque putrescant necesse est: & causa sunt oportet ob quam multitudo excrementorum in parte minime vacuetur, & ut solita erat differat: putrescunt igitur ut illa ea quoque quae postea colliguntur, & omnia simul accendunt statim in parte caliditate febrilem. Suprà autem indicauius ubi accenditur quaedam uel etiam augetur caliditas, in eam partem ab alijs sanguinem defluere. Itaque necesse est, ut tempore quo defluit, partes illae refrigerentur sanguine destitutae: pars autem affecta grauetur atque distendatur: & qui defluxit, sanguis alteretur, propter duas causas, & quia putrescentibus iam excrementis permiscetur, & quia impactus minime diffatur. Quocirca succeditur instar lignorum humidiorum: conferim in exiguam flammam coniectorum, atque id tempus omne initium accessionis appellatur. Ubi uero calor superat materiam, appellatur incrementum & ascensus, tale tempus. Atque eo tempore augetur calor tam multus, ut non solum deurat locum ipsum qui ueluti causa quaedam putredinis est, sed iam per continuitatem depascatur uniuersum corpus: & ubi ad summum perueniunt feruorem qui accenduntur humores: appellatur uigor talis pars accessionis. Uniuersum uero ignitum esse uidetur tunc aegroti corpus, calore in uniuerso animali aequaliter intenso: deinde si quidem humores tenues sint, ac facultas ualida, & corpus rari, pars plurima feruifactorum humorum fusa in sudore naeuatur. Quod si crassi fuerint, ac expultrix facultas debilis, & uiae angustae, nihil quidem sensibile effluit: sed solum id quod ita extenuatum est ut in habitus tenuius transierit naturam, appellatur autem id tempus inclinatio, quae perspiratio quaedam est humorum feruifactorum. Sed ubi in parte dispositio permaneat necesse est alterum in ea gigni excrementum: cum quod rursus in eam attrahitur alimentum, non plane totum uincatur. Quod rursus (ut ante docuimus) & ab excrementis putridis in parte ipsa relictis, & ab ipsa propria prauitate, initium putredinis suscipit: & ubi admodum incaluerit, rursus decumbit in ipsam, ut prius dictus ex alijs animalis partibus sanguis, rursusque eodem modo, initium, incrementum, uigor

& inclinatio accessionis fit. Atque hoc certo am-
bitu tantisper fit, dum affectus in parte primum
gignente excrementa feruatur.

*Quamobrem febres interdum repetant per circuitio-
nem, interdum continuæ sint. Cap. XVIII.*

AT uerò dispositio talis duplex est: altera
quidem partis debilitas, per quam gignū-
tur excrementa: altera uerò ex ipsis quo-
tidie genitis collecta. Caue enim putes in uasis ex-
ternis in quibus elixa cibaria nidorulenta euase-
runt, dispositionem quandam relinqui: in parti-
bus autem in quibus humores putrescunt, nullam
permanere. Quum sanè hæc affectio ægrè solua-
tur, quoties uniuersum corpus malis hum. oribus
abundet, ac plethoricum sit, multo quæ ægrius,
quoties in his fuerit angustia omnium meatuum
partis excrementa educentium. quemadmodum &
sanatio subsequetur, si & meatus expurgentur, ut
partis meatus fluxiles sint, & vires roborentur, &
dispositio corrigatur: & uniuersum corpus ne-
que malis humoribus scateat, neque plethoricū
sit. Quamdiu autem hæc permanent, circuitio-
nem accessionum permanere necesse est. Simili-
ter accidit in mulieribus. In eis enim quoad simi-
lis causa & æqualis permaneat menstruum, ea-
dem eorum circuitio retinetur. Sed de his omni-
bus in libro de rheumaticis dispositionibus latius
docuimus: & nunc immorari diutius in confirman-
dis ijs quæ antè demonstrata sunt, minimè con-
uenit: neque præterire capita rerum in præsens
utilium. Maximè autem utile est cognoscere,
quod aliquæ partes alijs transmittunt fluxiones,
quemadmodum caput oculis: quædam uerò ab
excrementis in se genitis initium febricitandi su-
scipiunt: & quod his omnibus commune excre-
mentorum putredo est. Proprium uerò singulis,
huic quidem infarctio ac stipatio vasorum, aut
ex humore glutinoso, uel crasso, uel multo: alteri
uero angustia meatuum uel sensibilem, uel mi-
nimè sensibilem: alij autem quod omnia spacia
vacua in toto ipsius corpore sunt oppleta, & ab
his plenitudo ad vires: quemadmodum in libro
de plenitudine docuimus. Februm igitur circui-
tione repetentium haud scio an vlla generationis
causa omissa sit. Earum autè quæ ordine earent,
nonnullæ ob humoris mutationem, nonnullæ ob
sationis uictus errorem, ad eiusmodi constitutio-
nem deueniunt. Sanguis igitur putrescens maxi-
mè mutatur, quoniam (ut ante diximus) partim
flaua bilis, partim atra efficitur. Quantum igitur

humores in corpore ægro mutantur, tantum &
circuitiones accessionum. Quocirca minimè mi-
rum uideri debet, per tales mutationes ordinem
quoque mutari. Mutantur uerò maxime, ubi qui
incepit putrefieri, in aliqua parte alius existit,
alius autem ex alijs defluit, qui aut in illis solista-
lis habebatur, aut in toto animalis corpore exu-
perabat. Nec secus quæcunque ægri in uictus ra-
tione delinquant, hæc quoque nihilò minus cor-
rumpunt circuitionis ordinem. Ut enim in sanis
prauus uictus morborum causa est: eodem modo
uel magis etiam in ægris, ex ijs quæ deliquerint,
accessiones inordinatæ existunt. Nec solum ad-
huc ægròtantes, sed etiam quo tempore à mor-
bis se recolligunt, promptè ex quouis delicto læ-
duntur. Quocirca per omnem insignem læsionem
uel præuenire multum circuitiones cogunt, aut
diuersi generis à prioribus quasdam gignunt, à
quibus accessionum ordo corrumpitur. Sæpe ue-
rò ob implexionem circuitionum incognitam
medicis, ægri uisi sunt pati inordinatas accessio-
nes. Sed tales ordinum permutationes reuera
non sunt: sed tantummodo uidentur. Quæcunque
autem reuera sunt, aut ob permutationem hu-
morum committentium febres, aut ob errorem in
uictus ratione efficiuntur. Reliquum porro syno-
chorum genus (quorum totum tempus una ac-
cessio est, aut semper equalis, aut decrescens, aut
increscens usque ad iudicium) ex tali causa fieri
solet, qualem omnium februm Praxagoras sta-
tuit, humorū in caua uena putredinem esse existi-
mans. sed absolutior sermo ac uerior hoc modo
euadet. Quicumque circuitionibus quibusdam re-
petunt morbi, partium superueniunt dispositioni-
bus, uel mittentium, uel suscipientium, uel gi-
gnentium, uel trahentium excrementa, eo quo-
paulo supra diximus modo. Qui uerò sine circui-
tione fatigant, in his nullus locus peculiaris affe-
ctus est: sed humores in uenis & arterijs omni-
bus, maximeque qui in maximis & talidissimis
sunt, aut ob aliquam aliam causam, ut in diarijs,
aut etiam ob putredinem seruè facti, accendunt
febrem unam continuam, ab initio usque ad finem
minimè intermittentem, eatenus durantem, ac
deurentem hominem, quoad gignentem eam hu-
mores sint consumpti, aut concocti, aut utrum-
que passi.

S E C V N D I E T V L T I M E

L I B R I G A L E N I D E D I F F E R E N T I J S F E B R I U M

finis.

CL. GALENI PERGAMENI

DE FEBRIBVS CVRANDIS LIBRI QVINQVE,

QVI IN HIS, QVI DE METHODO MEDENDI

inscribuntur, sunt VIII. IX. X. XI. & XII.

THOMA LINACRO INTERPRETE

De Febribus curandis Lib. I.

Febris quando gignuntur, eiusque prima differentia, & indicationes.

Cap. I.



Vò d. igitur ex calido, frigido, humido, & sic co, simularium particulam naturam constet: quodque ipsæ simplices atque primæ particulæ secundum tales temperaturas inter se dissideant, alibi à nobis est traditum: quem

admodum etiam duo esse morborum genera quæ simplicibus ipsis particulis accidunt: alterum, quod compositis est etiam commune, & dicitur unitatis solutio: alterum peculiare ipsarum, quod in calidi, frigidi, humidi, & sicci intemperie consistit. Quarum sanè intemperantiarum, quatuor diximus esse simplices: quatuor verò compositas. Simples quidem, quæ secundum unam qualitatem à naturæ ordine aberrant: compositas verò, in quibus secundum oppositionem utranque ipsa natura variatur. Febris autem, unus morborum est, quos intemperies gignit: utique quum adeò immodicè est auctus calor, ut & offendat hominem, & eius functiones lædat. Porro primam differentiarum febrium, una illa est, in qua causa adhuc adest febrem creans: aut febris excitata, iam desijt. Altera verò, quæ egrè solubiles, à solutu facilibus febribus distinguuntur: illas hæcticas, has Græci scheticas vocant. At verò prima indicatio omnis febris, veluti à morbo est, ablationem eius præscribens. Secunda autem, veluti à tali est morbo, quæ certam quandam sublationem indicat: nempe intemperiem febrilem, quæ sit caloris excessus, per occursum refrigerantium tollendam esse. Omnis quippe excessus per contrarium excessum sanatur. Ergo si febris ipsa sit genita, causa autem, quæ eam excitavit, iam desijt, huc tantum sanandæ eius dirigitur consiliū, ut refrigeretur. Si verò in generatione adhuc febris est, causa quæ accendit illam, est submouenda. Sin pars eius iam genita est, pars etiamnum gignitur, consulendum utrique fuerit: primum quidem submouendo, quæ eam accendit, causam: deinde extinguendo, quæ ab hac accessit, febrē.

Febris à constipatione meatuum producta curatio.

Cap. II.

EXcitare autem vel maximè febrem solet constipatio meatuum, in ijs corporibus, quibus quod transpirat, halituosum non est, sed mordax, acre, & fuligini simile. His igitur corporibus saluberrima est ex aqua dulci temperataque lauationum frictio quæ rarefaciat: & exercitationes mediocres, & victus qui dulces efficiat succos. Aduersissima verò sunt lautio frigida, & aluminosa, & lauationis abstinencia, & exercitatio acta, & frictio, vel planè nulla, vel dura, & victus mali succi, & uigilia, & ira, & tristitia, & cura, vitioque in sole, & fatigatio. Grauisimè autem peccare mihi videntur, à carnificibusque nihil differre, qui medici hominibus naturam biliosis, tenuissimam per morbos rationem victus iniungunt: eosque tridui inedia conficiunt. Quum nimirum tales naturæ, ex longiori abstinentia cibi, accerrimis acutissimisque febribus corripiantur: à quibus promptus est in hæctica transitus: atque ab his rursus in marasum torridum: aut si os ventriculi est iniurijs obnoxium, in eum qui syncope infert. Etenim in quorum temperie siccum præualet humido, & calidum frigido: his corporis habitus gracilis, hirsutus, & nigrior est: ac reliquis tribus intemperantibus, quæ hac minus calidæ sunt, tactu calidior aduertitur. Plurima quoque his stas est bilis, urinaque ac deiectio biliosa, & pulsus magni, & somni leues & pauci, & animi impetus vehemens. Quare his tum refrigerationem, tum aquæ potionem, atque adeò requiem & cibum largiorem congruere proficitur Hippocrates. Quum autem refrigeratio ipsa concilietur corporibus tum ex alijs quibusdam, tum non minimè ex ciborum exhibitione: conueniet utique, ubi corpus calidius sicciusque solito est redditum, frigidum humidumque nutrimentum ei exhibere: sed quod nec medicamentosam ullam sensu perceptibile facultatem obtineat: nec ipsum, quod nutrit, plurimum: quemadmodum neque minusque sit ex usu. Commodissimus itaque tali corpori

est pitfana cremor ad unguem coctus, in quo nulum sit condimentum superfluum: utpote qui & refrigerare, & humectare, ac sine siti seruare hominem potest, cum eo quod nec halituosum, nec humidum, nec siccum detinet excrementum: quum nec astringendi, nec obstruendi, aliquam vim fortatur. Ac quod non astringat quidem, vel gustus ipse docet: cuius vnus id iudicare est proprium. Quod verò nec obstruat meatus, hinc licet etiam conijcere, quod non secus quam aphronitrum, sordes cutis extergeat: vomituque à ventriculo mediocrem pituitam eliciat, nihilo in scilicet quam mulla: quæ sanè nec sitim restinguit, vt pitfana: & in naturis biliosis bile scit facile. At verò si multa & vehementer glutinosa, & crassa pituita ventriculo adhæreat, hanc radícula ex oxymelite, non mulla, aut pitfana detergere est habilis. Optimum itaque biliosis temperamentis nutrimentum est pitfana. Proximum huic, alica, cui paululum aceti ad faciliorem distributionem adiectum fuerit. Tertium, quæ sine aceto liquida existit. Inieciisse verò huic, dum coquitur, aliquid porri, satius est. Nam quod tum anethi, tum salis aliquid necessariò habebit, neminem laet. Quin etiam panis in furno coctus, est utilis: sicuti etiam omnes pisces saxatiles: nec ipsis minus aselli. Proximè asellos sunt solea, torpedo, lupus, mulusque: post, mugil è pelago. Omnis autem piscis deterior est, qui propè lacum qui mari iungitur, aut magni fluminis ostium, pascit. Ex volatilibus optimi sunt perdices, ac montanæ omnes auiculæ. Ab his, galinacæ, & phasiani, & colubæ iuuenes. Sed nec hæc tamè intus claudendæ: cum excrementosa sint omnia, quæ exercitatione carent. Excrementosa verò non minus sunt, tum lacustria, tum palustria omnia. Quo fit, vt ex ipsis etiam suillis carnibus, optima sit montana. Ab his deinceps sunt hædi. In omnibus autem fugienda tum vetula, tum recens ædita sunt. Illa namque duriora, concoctuque difficiliora sunt: hæc immodicè humida, & excrementosa.

Febris à constipatione orta species, atque curatio: deinde de diariarum febrium in bilioso temperamento, tum communis omnium, tum cuiusque propria vitæ ratio. Cap. III.

Igitur quibus acre aliquid quotidie transpirat (reuertamur enim rursus ad institutum) ijs, si cutis eis constipetur, facile corripuntur febri. Stipant verò ipsam, tum quæ astringunt omnia: tum quæ lentitia, crassitudineque sua, in exiguis hærent meatibus. Aliquando etiam ipsius cutis immoderatio siccatas, exiguos meatus densat. Qui ergo ex stipata cute febri laborant, ijs, inclinante prima accessione, ducendi omnes ad balneum sunt: tum pinguius, molliterque fricandi: si quidem ex aliquo, quod astrinxit cutim, labo-

rent. Nā si ex siccitate, fricandi quidem & ipsi, sed parcius: lauandi autem vberius. Respicendum verò ad virtutis modum semper est, in huiusmodi auxilijs. Atque ira quidem, tristitia, vigilia & cura, nec frictione, nec lauatione multa indigent. Sed omnibus qui ex eiusmodi occasione febricitarint, oleum infundendum est tepidum largeque cui minimè astringens vis insit: tum paululum fricandi, ex consuetudineque lauandi. Vltio verò, protinus ab initio, refrigerationem desyderat: tum crebriorem lauationem: minimè tamen aut oleum largum, aut frictionem crebram. Sint autem quæ refrigerent, & rosaceum, & omphacium, salis omnino expertia. Efficies hæc magis frigida, si ita vas, in quo continentur, in puteo suspendas, vt aquam tangat. Præterea, si defluxus frigida aquæ vasi se illidat, magis humorem refrigerat: magisque adhuc, nix circumposita. Infundere autem oleum ipsum syncipiti, sublata in altum manu, per mediocrem lanæ modum oportet. Hæc vsque ad inclinationem faciens, in balneum duces. Si verò qui memorato est temperamento, ex frigore febricitet, etiam ducendus ad balneum in remissione is est. Si autem cum grauedine & destillatione febricitet, prius quàm hæc sint concocta, lauandus non est. At qui ex vltione febricitant, ijs, vel quum hæc ad sint, lauari debent. Post lauacrum verò, ijsdem quibus ante mæ defacienda amborum capita sunt: eorum quidè qui ex vltione febricitarunt, refrigerantibus: qui ex frigore, calfacientibus. Cuiusmodi sunt irinū & nardinum vnguentum. Porro qui ex vltione febricitant, ijs intendenda quæ ex refrigerantibus constat curatio est: ijs verò qui ex frigore, quæ consistit in calfacientibus remittenda fuerit. Omnium autem conditionum comprehensarum in proposito temperamento, vbi febris diaria laborat, victus communis est ijs, qui & sit boni succi, & concoctu facilis, & qui nusquam exiguis cutis meatibus hæreat. Sed ijs qui exusti sunt, cum eo quod refrigeret, & humectet. Pari modo ijs, quos ira male habuit. Iis verò qui refrigerati fuerunt, cum eo quod calfaciat modicè. Iis qui per uigilio, & tristitia, & nimia cura confecti sunt, victus esse debet humectans, atque somnum concilians. At eundem modum ijs qui defatigati sunt, magis nutriendus: minus autem, ijs qui refrigerati. Reliquis, qui mediis sit amborum. Vinum verò ipse, his omnibus exhibere soleo, sed quod tum aspectu, tum viribus sit aquosum. Id enim ad omnia utilius quam aqua est: utpote quod & concoctionem iuuat, & urinas ac sudores prouocet. Etenim constat Hippocratem, non in diarijs modò febribus, verum etiam in acutis, vinum porrigere. Cæterum naturæ calidæ, magno opere frigida potione iuuantur: neque in diaria febre, ijs quibus in usu fuit, ipse eam circuncido. Si quis verò non assueuit, huic per se

brim dare non inciperim, nisi pristina sanitate prius reddita.

Febris ab obstructione mali succi, crassi, & glutinosi facta curatio. Cap. IIII.

Porro si propter obstructionem morata sit, transpiratio, si parua quidem ea sit, qui recte deserit, secundam fore accessionem vetabit: sin momentanea, non possis ita promittere. Quod si & multi, & crassi, & glutinosi impacti sint succi, quos hos excipit febris, fieri non potest, ut intra fines diatarum consistat: quando ex necessitate, huic in mali succi naturis ea, quae ex putredine humorum accenditur, succedet. Nam in alijs saltem temperamentis, quae in sequentibus exponam, excitari ex tali causa potest, citra humorum putredinem, aliqua continens febris species. Itaque nisi vitiosus succus transpiret penitus, necesse est ut putrescat: ut transpiret, autem, valido auxilio est opus. Ac si quidem vel puer, vel senex sit, sanguinem detrudere non licet. Inter has aetates, ubi robur aegro non deest, secunda vena est, vel si plenitudinis signa non adsint. Praestat enim vitiosi succi maiorem parte emissam, ad detergendas obstructions accedere: quum alioqui uerendum sit, ne si obstructionibus liberandis, prius quam uacua ueris, studeas, ipsas multo magis impingas. at solunt quidem obstructions, quae deterloriam obtinet facultatem, seu foris admota cuti, seu intro in corpus accepta. Periculum uero etiam est, ne quae foras trahunt, una cum ijs quae obstruunt, etiam aliud quippiam attrahant: & quae ab interno sursum feruntur, aliquid secum ex ijs quae in uasis continentur, rapiant. Quod ipsum si tenax & crassum sit, obstructionem plane, geminabit: sin aliter, multitudine certe sua, non parum omnino nocebit. Ne igitur haec contingant, utilissimum est inanisse corpus. Discerneretur autem magnitudo obstructionis ex ipsa magnitudine febris: ut quae ex maiore obstructione, maiori ex minori minor inciderit: Vbi uero modice iam uacua ueris, haud multo post, aut nutrimentum aliquod, aut pharmacum ex ijs quae detergeant, exhibebis. Atque in alimenterum quidem ratione sunt pristina & multis in pharmacorum, oxymeli & quaecunque incoquere in mulla licet, ceu calamintham, hyssopum, origanum, serpillum, irim, & apium. Verum haec omnia iusto sunt calidiora, ideoque febres accendunt, aequae ut uinum. Oxymeli uero solum, nec febres accendit, & strenue deterget, sicut ea quae glutinosa crassaque sunt, dissoluat, & meatus obstructos liberet. Inter mullam & oxymeli medium locum habet quod apomeli dicitur. Nec immerito arbitror & saccharum inter haec numerandum. Ex hoc uictu obseruabis quantum de febrili calore minuitur. Etenim si tertio die mane uideris minimum esse quod de febre relinquitur, ac nec

putredinis humorum in pulsu nota subsit, neque in urina cruditatis, suspecta uero hora, quae primo die febris occupauit, extra meridiem sit, audacter hominem quam ocysime lauabis, longe ante sextam horam. Abundè tamen sit, si intra tertiam horam lauationem compleueris. Ad eundem modum & si decimam horam suspectam habueris, usque ad septimam laues licet: quum tres aequinoctiales horas quatuorue inter balneum accessio nisque tempus interponi abundè sit satis. Debet autem in balneo corpus prius unctum ac moderatissime frictum, mox detergeri extrinsecus abluique. Moderatissime detergent tum erui, tum hordei, tum fabarum farina. Præterea mulla quae sit aquosa. Magis uero quam haec, iris, & panacis radix, & aristolochia, & mulla quae me diocri est mistura: ueluti etiam hac magis, quae meracissima est. Possunt autem vel hac magis detergere, tum spuma nitri, tum nitrum ipsum, tum aphronitrum. Sapo etiam ex ijs est, quae maxime detergere valent. Egredis balneum, præter aqua quae parum apij incoctum in se habuerit, nihil est offerendum.

Febris diaria ex cruditate orta, ex desurgendi frequentia, & a diarrhoea curatio, uentriculique dolentis medicatio. Cap. V. VI.

Iam uero diariae febres (de quibus tantum in presenti commentario agere est animus) in propositis corporum temperamentis, saepe numero etiam cruditatibus solent superuenire. Est autem pessima in eiusmodi temperamentis cruditas illa, citissimeque febrem accendit, in qua cibus in nidorulentam & fumosam qualitate corrumpitur. Quando ea quae in acidam uertit ut raro talibus naturis contingit, ita minus nocet. Nidorosa tamen cruditas, si alius lubrica sit, minus est noxia. Sin astringitur, grauis existit. Febricitant etiam nonnulli & ex ijs, quos diarrhoea ex cruditate male habet. Quibus utique non minime proritur febris ex desurgendi frequentia. Est autem eorum quibus clausa alius est, & quibus fluens, non eadem sanatio. Si igitur ea tantum quae corrupta fuere, per diarrhoeam uacuata esse videantur, tum lauandum, tum nutriendum in remissione febris est: sed ijs quae circa uentriculum sunt, prius consulto. Sin ita multa inapitio aut prius facta sit, aut nunc etiam in homine durer, ut uirtus iam sit defessa, satius est omitta lauatione cibare, sed consulto prius ijs quae circa uentrem sunt. Consultetur ita laborantibus, si modo uacuatio amplius non perseveret, fomento ex oleo & absinthio. Quod si quis morsus, aut doloris sensus in uentriculo adhuc supersit, amiri peniculo post fomentum debet, qui uel calidus sit, & siccus: uel ex oleo in quo absinthium incoctum fuit, uel ex unguento nardino madens;

ac plurimum expressus. Iam multo etiam satius sit, si purpura marina is fuerit: atque etiam longe optimum, si optima sit Tyria. Quod si os ventriculi imbecillius sit, tanta portione Chiaz mastiches in nardino tunsa, vnde sordium crassitudo existat, madefacta ex eo purpuram imponemus. Esto autem abunde calens taliū quodque quum primum admouetur. Nam quæ tepida sunt, dissolunt ventriculi firmitudinem. Vnguenta autem ipsa calfacere in duplici vase soleo: quandoquidem aliter calfacti s, vitatur eorum facultas. Cæterum fluente adhuc aluo, vtilius est, optimo recenteque melino, simili modo quo nardino, vti. Vtile autem ad omnia talia est, & mastichinum: nec in postremis conferunt spicata & foliata vnguenta, quæ Romanorum luxus inuenit. Mirè etiam ventriculū roborat, hoc cæratum quod subdam. Cæra Tyrrhenicæ, Vnguenti nardini, singulorū drachmās .ij. Fiat cæratum. Si verò intus vratur ventriculus ita vt affectus quidam phlegmonæ similis consistere in ipso videatur, vtilius est cæratum quod ex melino conficitur. Porro cibandi sunt, fluente quidem etiamnum aluo, polenta & pane, qui pauxillum aceti receperit. Quod si plus æquo aluus excernat, inspergere oportet polentam succo cotoneorum malorum, vel (si ægro magis arrideat) pirorum, aut malorum, aut myrtorum decocto. Sin venter nō amplius excernit, suffecerit tum alica, similiter pisanæ præparata: hoc est aceti habēs pauxillum: tum ex ea sine aceto forbitio: tum gallinaceorum testiculi: & saxatiles ex albo iure pisces: præterea fructuum aliquis ex ijs qui astringant, vel solius, vel cum pane. Quod si appetentia deiecta sit, ex medicamento, quod ex succo, vel ex carne cotoneorum conficitur, vnum aut duo cochlearia exhibebis. Atque ita sanè in prima remissione ijs qui ex cruditate febricitant, ventre excernente, mederi conuenit. At si omnino venter astringitur, si quidem in superioribus intestinis, vel etiam in ipso ventriculo cibus crudus consistat, aliquid diatrion pepereon propina, eius videlicet, quod in opere de utenda sanitate laudauimus, ceu & simplicissimum, & aptissimum, ijs qui cruditate laborant. Post deinde præcordia, omnemque ventrē perfundens. Hoc verò, etiam si inferius descenderint quæ vitiosa sunt, facies, plurius minorisque ratione id varians. Siquidem plus & temporis & perfusionis exigunt ad præparationem eorum quæ deinceps sunt agenda, quibus in superioribus ventris corruptum nutrimentum adhuc manet. Sin motum id notabiliter ad inferiora sit, adiuvandum aut glande subdita, aut leui per inferna infusione est. Vtique si morsus simul adsit, hunc mitigantibus nobis. Sin flatus, hunc comprimentibus. Sin neutrum fuerit, ex melle, aqua, & paululo olei ipsi sumum facientibus. Vbi uerò morsus uehemen-

tior urget, sabinum oleum, in quo aliquid seui anserini, uel gallinacei, uel caprilli liquatum sit, est utilius. Quorum copia si desit, iniiciendum oleo parum cæra est elota. Flatus verò sanandi sunt oleo in quo ruta, & semina quæ flatus discutunt, incocta fuere: cuiusmodi sunt apij, cumini marathri, sinopis, aliaque id genus. Vacuata atque, nutriendum protinus in ceteris quidem ijs, quos memorauimus similiter est: astringentibus tamen amoris. His igitur prima & secunda die obitis, si secunda die febris desijt, hominem lauare permittes. Ac ubi sequenti nocte citra offensam dormierit, sanum iam hominem prorsus existimabis. Si uerò qui cruditati successit dies cum sequente nocte febrem attulerit, ueluti in secundo die, ita tunc & accurandus, & nutriendus homo est. Quod si nox tertia diei febrile quiddam paululum afferat, ne sic quidem est formidandum, sed hos quoque postridie lauabis, nutriesque, ac reliqua omnia in illis, ut ante definitum est, ad portionem exequeris. Acida autem cruditas non contingit in biliosis temperamentis, nisi admodum raro, idque ex cibis qui promptè acescunt: nec accendere febrem diariam solet, æque ut nec concoctionis tarditas: quandoquidem si cibi ob talem cruditatem febricitant, quibus amara bilis abundat in temperamento, obstructionis & humorum putredinis est suspitio. Adhæc, furidus uapor ex tarditate concoctionis, aut cruditate, in qua ructus sentiuntur acidi, nunquam excitatur. Quippe frigidi halitus abs talibus succis ascendunt, hi quæ omnino paucissimi: minime autem uapores multi, humidique, ac fuliginosis cum neque in ijs quæ sunt extra, aliter aut fumum edi, aut fuliginem uideas, quam fumum ex materie semiu stis: fuliginem ex immodicè assis, uistis quæ. Est nanque fuligo uapor terrestris. Fumus mistio quædam ex terrestri, aqueaque substantia.

Intemperies calida atque humida est maxime obnoxia morbis putredinis. ideo morbis facile corripitur.

Cap. VII.

Absoluta iam in ijs naturis, quibus amara bilis redundat, diarium febrium disputatione, ad aliud corporum temperamentū transeamus, in quo ut calidum frigido, sic siccum humidū præualet. Est enim hæc intemperies omnium maxime obnoxia putredinis morbis, propterea quod per ipsam sanitatem ad putredinem proximè accedit: id quod tum ex sudoribus contingere est, qui grauiter his olent: tum uerò ex urinis deiectione, atque adeo ipsa etiam expiratione. Etenim qualis est hircorum, talis est harum naturarum temperies. Ideoque prompta est ex qualibet occasione tum alijs morbis, tum uerò febribus corripiri. Siquidem quum eorum cutis est stipata, effugere febrem nō possunt. Sed nec cum ualen-

nalentem cruditatē contrāxerunt; aut perusti fuerant, aut tale quippiam aliud perpesi. Iam uerò à cruditatibus nidorosis obstructionibusque, naturæ calidæ & humidæ, quàm siccæ, pròptius laeduntur. Itaque omnes diariæ febres accenduntur promptissimè in istiusmodi temperamenti, id quæ ex qualibet earum causarum, quas in biliosis naturis retuli: curationemque per similem illis habent, ac in paucis omnino dissidentem. Nam quæ hæc naturæ humidiores sint, magis quàm illæ famem & sitim perferunt. Est igitur illis ex usu balneum, quod cutim laxet, non autem quod corpus humectet. Quæcunque uerò de eiusmodi natura sunt dicta, eadem & de acquisito habitu dicta esse censendum.

Intemperantiarum omnium quæ sint, magis obnoxia febribus. Cap. VIII.

QUUM autem octo intemperies existant in uniuersum, opportunissima ad febres est calida & sicca: ac nisi quis illam (ut dictum est) cibet, docysimè in ea diaria febris in acutam mutatur. Propinqua huic est, quatenus ad febrem spectat, quis sit ad alia deterior, intemperies calida & humida. Tertia ab his intemperies est, ea simplex intemperantia, in qua tantum exuperat calidum. Huic proxima est simplex altera, in qua siccum humido præualeat. Ab hac deinceps media omnium est, scilicet quæ mediocritatem in utraque oppositione tuetur. Quatuor quæ reliquæ sunt intemperies, neque facillè febribus, occasione iam dictarum causarum, patent: neque diaria tentata, si in ediam tolerant, in plurium dierum febres transeunt: immo aliquæ, saltem earum, ubi citra corruptelam contraxerunt redundantiam humorum, utilitatē ex inedia sentiunt, ac potissimum quæ frigida est, & humida. Ab hac quæ humida est: Tercio loco quæ frigida: Quarto quæ simul frigida & sicca.

In febre ex intemperie orta quæ uictus ratio exigatur. Cap. IX.

IN eiusmodi ergo omnibus temperaturis, temperamenti quidem ratione, uictus ratio uarianda est. Nam ex eo quod eadem febris febriant, non diuersam, sed omnino eandem sortiuntur indicationem. Siquidem quod secundum naturam est, semper similia postulat. Quod autem præter naturam, contraria. Quum nimirum quod se naturaliter habet, custodire: quod præter naturam est, tollere expediat. Porro febris omnis præter naturam est: ideoque uictus rationem frigidam & humidam exigit. Temperamenta uerò ipsa, aliàs similia, aliàs contraria postulant. Quæ enim uitio carent, similia perpetuò: quippe quæ seruare expedit. Quæ uitium habent, aliàs similia,

aliàs contraria. Similia quidem, tū in alijs de quibus mox dicemus: tum in ulceribus omnibus. Contraria autem in eo uictu qui per sanitatem adhibetur, dum corrigere eorū intemperantiam est animus: necnō ubi eiusmodi uitiola naturæ à longo tempore, contraria uictus rationi assueuerunt: gaudent enim naturæ consuetis semper. Duplex itaque nobis in ijs qui sani sunt finis proponitur. Nēpe uel corpus sanum in pristina eius temperie tueri: uel hanc meliorem efficere. In ea tamen natura quæ haud dubiè in medio temperamento consistit, ab ipsa febris contrariorum indicatione accepta, catenus humidum frigidum: quæ adhibebimus uictum, quatenus siccus calidusque quàm antea iam redditum corpus appareat: Humidus igitur uictus (ut testatur etiam Hippocrates) febrientibus omnibus conuenit: maximè uerò pueris, & alijs, qui sic cibaria assueuerunt. Etenim febrientibus, quatenus februnt, ex ipsa contrariorum indicatione humidus uictus conducit: pueris ex similitudine. Nā quæ etas ex ijs sit quæ natura nobis insunt, similè sibi uictum postulat. Quæ uerò à consuetudine indicatio sumitur, sic supra est, sicuti & quæ ab ætate. Quippe seruari quoque hanc iubet Hippocrates, perinde ac proprium ætatis temperamentum. Sed à regione etiam & anni tempore interdum indicationes sumuntur. Ceterum à consuetudine quidem, semper est indicatio similitudinis, quoad scilicet ægrotant homines. At ab ætate, natura, regione, anni tempore, & statu cœli, ubi temperata hæc sunt, similitudinis semper præsidiorum est indicatio: siue ualeant homines, siue etiam ægrotent. Contra ab intemperatis anni tempore, statu cœli, & regione, contrariorum est indicatio. Verum ab ætate & natura, non absolute, sed cum consuetudine. Porro nihil in contrarijs indicationibus tam conuenit expendi, quàm magnitudinem eorum quæ ad indicationem conferunt: quæ quidem duplex existit: altera, quæ ex eorum dignitatibus spectatur: altera, quæ ex ipsorum proprijs substantijs. Quas sanè ex collatione cum mediocri, & quod secundum naturam est, esse accipienda liquet. Omnibus igitur conspirantibus in unum indicationibus, unam prorsus uictus rationem constituemus. Dissidentibus uerò inter se, quæ ualentiores & plures fuerint, eas præferemus, ita ut uictus species, quam hæc præscribent, anteponamus: minimè tamen negligamus contrariam. Porro quæ à febre sumitur indicatio, ea reliquis, quando omnes contrarium esse faciendum dicant, numero quidem inferior est: magnitudine tamen quæ ex dignitate spectatur, utique superior existit: potissimum si longè à natura recessit. Quippe duplex tūc ei magnitudo accedit: & quæ ex febris genere prouenit, quæ omnibus est communis: & quæ propria, suaque ipsius existit. Sin uerò parua sit febris, fas est reliquas omnes coniunctas indicationes, yna cum ipsa conferri.

ferri. Ac si quidē pares videant, media victus rō eligenda est. Sin altera indicatio exuperet, tantū recēssisse à temperato & medio victu par est, quā tūm ea quæ pollent, sua cōtraria superant. Ac diariarum quidem febrium indicationes ex his capiuntur generibus, raroque à laborantis virium modo. At febriū, quæ pluribus diebus affligunt, indicationes, tum virium respectum necessariō adhibent: tum causarum quæ ipsas excitant: ex ceptis tamen hecticis, utpote quas nulla accedit causa: quemadmodum neque corpus id, quod iā habitu calorem ignis in se recepit: siue id lapis sit, siue lignum. Illud namque commune cum diarijs habent, quod uidelicet non amplius fiant: disserunt autem in eo, quod diariæ in leui affectu calorem habēt: hecicæ in habitu qui ægre soluitur.

GALENI PERGAMENI
DE FEBRIBVS CVRANDIS
Liber Secundus.

Diariarum accessio est unica, transeunt hæ in putridas, heclicasque, quæ sit diaria, quæ putrida, quæ heclica. Cap. I.



DIARIARVM igitur curationē præcedenti libro exposuimus. Quarum sanè febrium unica accessio est, unico plurimum die, ex ipsarum saltem natura, circūscripta. Cæterum nisi quis eas

commodè tractet in reliqua duo genera febrium, nempe in putridas & heclicas, transeunt: putridas enim appello, quæ ex humorum putredine: heclicas uerò, ex immōdica solidarum partium nascuntur calfactione. At uerò in illo transitu à diarijs in reliqua illa duo febrium genera, alterum quoddam febrium genus mediū licet imaginari, quod neutri extremitatum sit idem. Cæterum medium id, quum inciderit, nec nosse ij possunt, nec reprimere, qui extremitatum, quarum existit medium, speciem ignorāt. Ergo ex adustione, cruditate, lassitudine, uigilia, perturbatione animi, uel bubone, ab euidenti causa aliqua oborto, nunquam ad tertium usque diem progredietur febris accessio, nisi quid delictum circa laborantem fuerit. At quibus stipatio febris occasio est, ijs etiam ultra hos porrigi accessio potest. Etenim stipatio fit, uel obstructis exilibus meatibus propter glutinosos, uel crassos, uel copiosos succos: aut conuentibus, ob ea quæ corpus siccarunt, uel denique improbè condensatis, ob occursum causarum refrigerantium. Quas igitur febres uel conuentia meatuum, uel recens corporum densatio excitat, hæ & post primam accessionem desistunt, si quis rectè ipsas tractet: & uerè diariæ tū sunt, tum dicuntur. At quæ ex obstructione creantur, si hæc quidem pusilla sit, solui quoque ipsæ similiter ut

aliæ diariæ possunt: si quis eas legitime sanet. Sin autem adeo uehementer sint humores impacti, ut ualentius aliquid quod eos eximat, postulent, id genus febres corrigi ultra unū diem necesse est: ac proinde diariarum genus uideri egressas. Verum si neque humor putrescens subit, neque ipsum corpus febrilem calorem susceperit, tanquam habitum, utique genus id febris, ab alijs duobus diuersum erit. Quare huiusmodi febri natura quidē eadē est cum diarijs: nomen uerò non idē.

Synocha febres quæ vocantur, ac quid sit harum genus. Cap. II.

SI quidem quæ febris ab initio ad finem usque unica accessionem sortiuntur, in multos dies porrectam, ex synochi, hoc est continentes uocantur. Quarum natura est duplex. Quædam namque earum manifestam habent putredinis notam. Quædam prorsus non habent: quas nimirum ex diariarum esse genere constat. Quum enim accessionis remissio ex feruentium humorum transpiratu cōtingere soleat: non transpirent autē prorsus in stipatione uehementi: necesse haud dubiū est, multorum dierum fieri accessionem. Igitur ubi in tali febre nulla subest occasio, quæ alterius accessionis principium excitet non modò multorum dierum euadit febris, sed absque inuasionē ullius accessionis, ab initio ad finem una febris persistit, nec quotidianā, nec tertianā, nec quartanam referens.

Synocharum febrium tres differentie: putredini quæ requirantur: continens febris in quibus non possit gigni corporibus. Cap. III.

QVONIAM igitur, ex duobus his foueri febris potest: & quod totus uapor non transpirat: & quod idem uapor ea quæ continet excalfaciat: necessum est tres esse synochorum differentias in uniuersum: nempe uel pari permanente magnitudine ea, quam in primæ accessionis uigore habuit: uel adiciere semper exiguum aliquid, minuentem: atque hæc uel æqualiter faciente, uel inæqualiter. Ac si quidem quod accenditur, ei quod transpirat par fuerit, nec augeri, nec minui febrilis calor cernetur. Verum si eorum alterum uicerit, utique si quod uacuatur, necessarium est febrem minui: sin quod adicitur, omnino incrementum. Hæc itaque est continentium febrium species una, quæ eandem naturam cum diarijs sortita, absque humorum putredine in plureis dies extenditur. Altera uerò cōtingit, ubi in omnibus uasis, ac potissimum maximis, æquabiliter succi putrescant. Quarum sanè febrium in gracili & frigido corpore neutra solet consistere: sed plurimum in ijs qui sanguine abundant, & corpulentis: quæ nec obstructio citra putredinem excitare febrim

brim valet, nisi id quod transpirat, & copiosum, & calidū sit: nec humorū putredo in omneis, quæ inter inguina & alas inter sunt uenas, æquabiliter ac cito porrigi in frigido habitu potest. Debent enim quæ putrescunt, tum calida & humida esse, tum difficilem habere transpirationem. Eoque fit ut neque in frigida ætate, neque in frigido corporis temperamento, continens exciteretur febris: quemadmodum neque in gracilibus, uel qui raro sint corporis habitus, sed prorsus in temperamentis, corporibus, atque naturis contrariis. Proinde fit, ut qui ita febricitant, ijs & pulsus maximus sit, & æqualis, & uehemens: arteriæque consistentia inter molle & durum mediocris. At celeritas atque frequentia pulsus, pro ipsius magnitudine febris. Hæc itaque sunt animarum febrium communia. Alteri tamen priuatim insunt notæ putredinis: non modò in lotio, sed in pulsu etiam, calorisque qualitate iniucunda.

Febrium continentium præsidium maximum est sanguinis missio. Cap. IIII.

QVarum sanè febrium dignotionem & curationem ipsi tum ratione, tum experientia didicimus, qui statim ab adolescentia philosophiæ studio capti, primum nos ad eam cõtulimus: mox patris euidenti insomnio moniti, ad medicinæ studium excolendum accessimus. Est porro continentium febrium præsidium maximum, si modò uires ualentes sint, sanguinis diminutio, uel usque ad deliquium animi. Primum namque in contrarium statum agitur corpus, celerimè ex animi defectu refrigeratum. Hoc uerò nihil inueniri posuit neque ipsis ægris, nec naturæ quæ animates gubernat, iucundius, uel iustius. Postmodum in corporibus ipsis necessariò superuenit alui deiectio: nonnunquam & uomitus bilis. Quas res statim à toto corpore maiores sudores excipiunt. Etenim uel sola sanguinis detractione sic obita restitui olim ipse quendam adolescentem ardentissima laborantem synocha. Cui sanè post duas à sanguinis missione horas paulum nutrimenti exhibui, permisi que ut quiesceret. Iam uerò eorum qui ex sola obstructione febricitantes mihi uidere contigit, nemo in putredinis febrem incidit, qui sanguinè prius detraxisset. Quem quidem tibi ualida uirtus subest, & ætas permittit, usque ad animi defectum (ut diximus) mittere expedit. Vbi horum alterum haud satis respondet, tutius est, quantum satis uisum fuerit, tantum principio detrahere quod defuit, iteratione supplere. Quo quidem præsidio omisso, in summum ægri discrimen ueniunt: nisi eos uel uirium robur, uel largum profluium sanguinis, uel sudor copiosus, ex manifesta perniciè eripiat.

Synochi quando oriantur, quæ sit plenitudo secundum vires, quæ secundum uasa. Cap. V.

AGimus itaque in præsentiarum de ijs febribus, quæ ex stipatis per obstructionem meatibus oriuntur. Quas, si sine putredine quidem consistant ex diatriarum esse genere dixit. Sin ijs putredo aliqua superueniat, ubi in omnibus uenis ac præcipuè magnis, ea constitit, synochas, siue continentes excitari febres: ubi in vnica animalis parte, exacerbationes quæ certo ambitu repetant. Quibus igitur corpus ex succorum abundantia inhabile ad transpirationem iam reditum, tantum caloris congestum, ut inde iam febricitat, ijs tantum sanguinis detrahendum est, quantum vires tolerant. Alioqui certè verendum est, ne aut suffocentur, aut corripiantur syncope, nisi eos vel uirium robur, vel plurimus sudor, uel largum sanguinis profluium à morte liberet. Nec verò existimes de plenitudine illa, quæ comparatur ad vires, hunc à nobis sermonè fieri (quippe quæ nec sic obstruit venarum ora, ut refrigerationem prohibeat, nec tunicas earum distendit, nec ruborem, nec tumorem inuehit) verum de ea quæ contineri à uasis ultra non valet: quæque ob id ipsum solet prædicta symptomata inducere. Siquidem copia hæc, dum bonitatem suam feruat, ut pariter augeri cum uirium robore est nata, ita si quando has grauatur, nec de cætero augebitur, & bonitatem naturæ amittet: quare tunc fieri nequit ut non putrescat. Ergo festinare ad sanguinem detrahendum oportet: quo uasorum naturæ, ex transpirando, ventilandoque, naturalem temperiem seruans, humoribus, eo quo inter initia modo, dominetur: quando si ad intemperiem uersa laborabit, metuendum est ne hi putrescant. Excitatur autem intemperies in ea, ex febris calore. Optimum itaque est in huiusmodi febribus statim non numero dierum, sed vni uirium robori attentum esse. Quocirca non solum sexto septimoque, sed etiam sequentibus diebus sanguis mittendus est. Quod si aut alij medici, aut æger, aut propinqui ipsius, non permittant ut feces uenam, ad frigidam exhibendam accedes, sed diligenter ante discernens, quantum nocuum ex ea contingere possit. Quippe intempestiue immodicèque exhibita, lentos & crassos humores attenuari, digerique prohibet. Imbecillas particulas corporis concutit. Nonnullis illico spirandi difficultatem, cõuulsionem, atque tremorem conciliat. Tum uerò, quibuscunque in particula principe tumor aliquis è phlegmone, edematosis, aut scirrhi genere constitit, ijs frigidam offerre non licet. Sed neque ijs quibus obstructio, putridusue humor non cõcoctus in cõmodat. At si per continentes febres cõcoctionis humorum notas uideris, absque impedimentis expositis, audacter ægris frigidam quantum appetant, dabis: præcipuè

puè si tali potioni affueverint. Porro erysipelas verum consistens in aliquo viscere, non aliter, quam frigida potu, sanabis. Sin verò mistum cū phlegmone sit, in hoc concoctionis expectandę sunt notę. Ceterum minus tuta ijs qui paucillum sanguinis, carnisque obtinent, frigida potio est. Celeriter namque ad solidas animalis pervenit partes, nulli quod eius vim frangat, occurrens. Qua ratione etiam hectica febres nec prorsus frigidam, nec multam aquam desyderant. At continentium febriū maxima remedia hæc duo sunt, detractio sanguinis, & potio frigida. Verum illa nullo non tempore: modò vires sustineant: hæc, quum & in pulsu & urinis, concoctionis evidentes cernuntur notę: febris autem est maxima. Est etiam habenda ratio in missione sanguinis, tam eorum quę præcesserunt, quam quę consequentur ipsam. Nam si præcedat ciborum cruditas, tanto tempore differre uenę sectionem iubebis, quantum satisfacere tum ad eorum concoctionem, tum ut excrementa descendant, videbitur. Sin sequetur necessariò uacuatio quępiam (ut exempli gratia, muliebre profluuium) tantum illi relinquendum est, ex eo quod superfluum existit, quantum est per eam uacuandum. Sed nec negligenda interim natura eius qui uenit uacuandus: sicuti neque ætas, nec cœli status, sub quo & regio, & anni tempus comprehenditur. Sunt enim nonnulli ad extrahendos digerendosque succos, natura propensius: nepe qui humidi & calidi existunt: quique raro sunt corporis textu. Adhæc, quibus os aëntis aut amara bile redundat, aut imbecillum est, aut supra modum sensibile. Pueri certè propter ætatem perpetuò. Cœli uerò status ubi calidus nimium & siccus est, corpus in ambientem resoluit. Atque hi quidam scopi sunt, qui à sanguinis de tractione dehortantur. Eam autem postulant, unà cum affectu, cuius causa primùm requirebatur, habitus durus, densusque, quique digeritur ægrè: tum ambiens humidus, frigidusque.

Methodus consistit in uniuersalibus, exercitatio in particularibus. Cap. VI.

QUum autè in uniuersalibus methodus, in particularibus exercitatio consistat, fieri non potest, ut sine multiplici in ægris singulatim exercitatione, quod ex usu sit facias: nec sine uniuersalium cognitione, probè exercitatio procedat. Non licet siquidem ullius artis scientiam nancisci, nisi & methodum quandam habueris per uniuersalia theorematà: & in particularibus te exemplis exerceas.

Methodum habere oportet in uniuersalibus, & exercitatio in particularibus. Cap. VII. VIII. VIII.

VT igitur reuertar ad methodum, eundem

uirtutis considerationem ad curationem morborum sæpe maximè necessarià arbitror: sic, ut quę circa ægrum administrantur, omnia fermè eius unius causa fiant: aliquando mediocriter necessariū: sic ut aliquid ex hac quoque, ad ea quę faciendū sunt, consilij petatur: non tamè præcipua facientium ratio huc omnis dirigatur. Possum rursus ostendere, uirtutē adedò exiguum ad inueniendā remediā cōferre, ut propter exilitatē et lateat: aliàs uerò prætermitti, ac silentio præteriri: quasi prorsus ex utiliter cōsiderandis nō sit: ut in diarijs febribus, in quibus uires nullā providentiā requirunt: utpote ualidæ. Verum quod in uirtute accidit, id in reliquis omnibus quę aliquid faciendum indicant, usu uenit.

Horum autem omnium aditum Hippocrates nobis ostendit, incultum tamen: quem methodo postea nos explanauimus: perinde, ut Traianus fecit, qui omnes Italiae uias asperitate difficiles, refecit, instaurauitque.

Anima naturalis sedes est hepar, irascibilis eor, rationalis cerebrum. vacuantia remedia uirtutem exolunt. Cap. X.

VT uerò accuratius de ipsis uiribus disserā, operępretiū est scire, tribus diuersi generis facultatibus siue animis uniuersum animal gubernari. Quarum sanè prima quę stirpibus est communis, quamque uocant naturalem, atque etiam apperitricem, iecur pro fonte habet: per uenasque illinc sparsas in uniuersum corpus, id alit. Secunda autem est, quę non modò ut stirpibus, aut uita præditis, sed etiam ut animalibus anima, est insita. Hæc in corde, fonte caloris insiti, residens, ab ipso per arterias ab eodem ortas, in totum corpus disseminatur: diciturque tum uitalis facultas, tum irascibilis anima. Tertia denique est anima ratiatrix, quę in cerebro domicilium habens, uoluntarijs actionibus præsidet: per neruosque, ceu per canales, toti corpori sensum & motum largitur. Has igitur facultates seruare, nihil planè est aliud, quam uitam seruare. Siquidem qualibet earum amissa, necessum est, reliquas simul perire. Ac proinde in opere de sanitate tuenda huc omne consilium direximus: in hoc uerò, primum propositum est, morbi sublatio. Nam cuiusmodi in illo est sanitatis tuitio, eiusmodi in hoc est morbi sublatio. Quorum utriusque communis est ipsa uitę custodia. Hoc tamen interest, quod quę secundæ ualitudinis tuendę gratia geruntur, eadem statim uitam tuentur: quę uerò affectiones præter naturam in morbis discutunt, ea non omnino uitę custodiant. Quippe aliqua eiusmodi prædita sunt facultate, ut si immoderatè aut intempestiuè utantur, uitam adimant: quod solent uacuationes immodicę. Ergo quum uirtus tantopere necessaria sit, eam autem

Iadant omnia vacuantia remedia, si quis ipsis parum moderate utatur: utiq; aduersæ inter se faciendorum indicationes in talibus corporibus sunt, in quibus affectus quo expugnetur, notabilem vacuationem desiderat: virtus autem hanc ferre non valet. Caterum quemadmodum nihil quod sanitatem tuetur in valentibus vires corrumpit: sic in ægrotis aliquando virtus succedit ijs, quæ veluti in perniciem eius administrantur: ut si euacuemus in plenitudine quæ est supra vires: aliquando ab ipsis dissoluitur. Etenim in synochis febribus ex meatuum stipitatione orris, quoniam valida plerumq; virtus est, citra periculum vacuatio adhibetur. In alijs verò quæ ex corruptela humorum gignuntur, existit maxime periculosa. Siquidem quod corruptum est, alienum à natura quum sit, id se auferendum dicat, vel vena incisa, vel purgatione. Horum autem præsidiorum neutrum feret imbecilla facultas, si quando cū corruptela coiuerit. Oportet igitur, vbi indicationes ita sibi aduersantur, paulatim quod vitiosum est, vacuare: paulatimq; quod salubre est, in eius locum reponere: quam curationem vitiosi succi Medici epicrasin nominant.

Sanguis dupliciter inutilis redditur, & quando utilis fit sanguinis missio. Cap. XI.

QUum igitur sectio venæ, sanguinis sit vacuatio: sanguis autem ipse utilis possessio naturæ existat: sic utiq; oportet venæ sectionem fieri, ut quod inutile ex sanguine ipsi naturæ est, emittatur. Fit porro sanguis bifariam naturæ inutilis: uel quum propriam qualitatem ad unguem non seruat: nec amplius nutrire, sicut prius, potest: uel dum ita multitudine creuit, ut premat vires, aut distendat uasa, uel rumpat ea, uel obstruat. Atq; in his quidem missio sanguinis utilis est, cū vacuatio præsidiorum unum: in alijs autem, cū quod humorum uehementiorem impetum ad partem diuersam reuocet, uel ad latera deriuat. Postulat autem semper ualentes vires, quæ modo vacuationis eius respondeant. Quoties igitur uirtuti notabilis ex vacuantibus auxilijs noxa incidet, toties ipsa utile aliquid indicabit: æquè utiq; ut quum manifestè iuuabitur. Vbi uerò ex ijs quæ affectum submouent, nec commodum illi accedit ullum, neq; incommodum, ibi ueluti inutilis prætermittitur.

Virtus quor, modis sit seruanda. Cap. XII. XIII.

PORRO quicquid aliquam præstat indicationem, si natura id simplex sit, etiam quod indicatur, utiq; simplex erit. At si illud compositum sit, & hoc erit quoq; compositum. At sanè quædam custodiam sui: quædam amotionem indicant. Virtus itaq; semper unam rem indicabit:

utiq; sui custodiam. Custodietur autem, primò quidem, si quod ex substantia ipsius uel inanitum uel alteratum est, correxerimus. Secundò uerò, si quæ ipsius substantiæ uacuare, alterareq; possunt prohibuerimus. Aestimari autem debet interim, quod magnitudine, dignitateue antecellit. Maxima igitur dignitas, uirium ipsarum est: quando uiuere ipsum nobis ex harum custodia constat: utpote quum uitam, aut ipsas esse vires, aut earum actiones, necesse sit. Virtus ergo omnium prima custodienda hominibus est. A uiriū indicatione proxima existit, quæ ab affectibus, quos curare conamur, subministratur: postea deinceps reliquæ. Quicquid igitur indicationi, quam vires præbent, aduersatur, id secundi est loci. Quæ uerò cum ijs quæ cōducunt uiribus, in idem competunt, hæc utrunq; calculum referunt: & eorum quæ primæ sunt notæ, & eorum quæ secundæ. Quare citra controuersiam facienda. Quæ uerò aduersantur, aliquando administranda prorsus non sunt: aliquando paulatim. Prima igitur indicatio omnium est, quæ à uirtute sumitur: non tamen sic prima, ut curationem nos doceat: quū ex numero curatricum indicationum non sit, sed uitalium. Nam neq; ut ualeamus, neq; ut à morbis liberemur ab ea quicquā primum desumimus, sed ut uiuamus: quāuis ex accidenti interdum uirtutis roboratio ad affectus curationem conducatur.

Indicationes medicatrices unde sumantur. morbi differentia. febris qua conueniant. Cap. XIII.

AT uerò medicatrices indicationes à morbo ipso sumuntur, & à temperie corporis, & ab ambiente nos aere: qui causæ sine qua non, rationem obtinet: quum sine ipso nec tolli morbus, nec teneri sanitas possit. In omni itaq; curatione agendorum indicationes in his tribus ad summum consistunt. Reliquæ autem omnes ab his in partes diductis, oriuntur. Caterum effectus ipse haudquaquā in causas diduci est aptus, quemadmodum temperies atq; ambiens aer: sed tantummodo in differentias. Nam aut in similaribus consistit partibus: aut in instrumentarijs. Ac in similaribus quidem, uel simplex est intemperies, uel composita. In instrumentarijs, circa simplicium partium uel posituram, uel formā, uel numerum, uel magnitudinem, tum quæ horum sigillatim traditæ sunt differentiæ, consistit. Porro affectuum qui simplices partes occupant, unus est intemperies calida. Quæ si in totum corpus diffusa sit, appellatur febris. Ideoq; omnis febris, quæ febris est, humectatio refrigeratioq; remedia sunt. Ac si sola quidem sit febris, ad refrigerandum humectandumq; ueluti ad finem, dirigitur omne medentis consilium. Quare, materia inuenta, opportunum tempus ex quatuor febris

febris temporibus sumes : quantitatem verò ; ex conferendo cum naturali habitu morbum. Quippe, quantum is recedit à naturali habitu, tantum opus est ægrum refrigeres & humectes. Ambiens autem aer (cuius fugere commercium non licet) si contrariam morbo temperiem habeat, è præsidiorum numero est unum : sin similem, vna est morbificarum causarum. Idcirco tunc inhibenda eius noxa est, scilicet reliquorum auxiliorum humiditate ac frigore intensis, adauctisq;. Ipse autem arte reddendus est talis, qualis ad profligandam febrem, aut aliam quampiam dispositionem, desyderatur. Si igitur morbus siccus & calidus sit, humidiores frigidioresq; domos & eligemus, & preparabimus. Sicuti è diuerso, si frigidus, humidusq;, eas quæ calfaciant & siccant. Sunt itaq; deligendæ quæ ex seipsis eiusmodi sint. Alioquin industria nostra preparabimus ipsas, per æstatem quidem eas subterraneas molientes, & ad Septentrionem cōuersas: ac pauimenta ipsarum assidue humore aspergentes: tum vt ex euripo aliquo aura expiret, machinantes: flores præterea & germina, quæ frigida humidæq; sint facultatis, per aream disseminantes: per hyemem verò, contraria horum facientes: præsertim vbi morbus suadet: ubi non suadet: excessus tantum utriusq; temporis remittentes.

Indicatio curationis generalissima est contrarietas.

Cap. XV.

POterunt rursus tres illæ indicationes prædictæ ad duas tantum reduci: nempe ad morbum & sanitatem. Neq; enim aliud ipsa sanatio est, quam morbi in sanitatem translatio. Qui affectus contrarij quum sint, necesse est per contraria fiat eorum alterius in alterum transmutatio. Atq; ita rursus una erit sola curationum indicatio generalissima, videlicet contrarietas. Cæterum ad accuratam contrariorum administratio nem, necessum est curandorum corporum prius & naturas & temperamenta cognoscere: quæ quidem tum ex ijs quæ in libris temperamentorum tradita sunt, noscuntur: tum ex ætate, & tota antea acta uita, quæ nimirum in uictus & exercitijs ratione consistit, præterea, in hac regione, & hoc anni tempore, & hoc cœli statu, conuersatione.

Consuetudo ad inuentionem remediorum, & ad sanitatem tuendam plurimum potest. *Cap. XVI.*

EX ipso autem temperamento inuento, ad ministrandorum indicatio suppeditabitur. Sed neq; paruum quid negligendum uel ad remediorum inuentionem consuetudo adfert: ueluti nec ad sanitatem tuendam: quum singulo

rum corporum etiam naturam ostendat. Nos si quidem uia rationeq; ab ea procedentes, inuenimus ipsarum partium affectum: dein ex illò rursus peruenimus ad faciendorum indicationem. Consuetudo itaq; curationis rationem indicat, per corporis naturam intercedentem, quemadmodum ætas: quæ & ipsa temperamenti interuentu, præstat indicationem.

Corpora dissipatu facilia, & difficilia sanguinis detractionem probibentia. *Cap. XVII.*

ADuertere autem oportet, corpora frigida & sicca, quæq; ex terrestri natura constant (cuiusmodi sunt mineralia): quàm ægerime solui. At quæ calida & humida sunt, eorum substantiam celerrimè dissipari in ambientem, quæ uerò in medio horum, ex diametro pugnantium, consistunt, ea corpora quo magis ad hæc, uel ad illa accesserint, eo uel aptiora ut dissipentur erunt, uel contumacia magis. In summa, citra calorem nō potest in halitum digeri corpus ullum, quandiu substantia eius coacta densataq; manserit. Puerorum autem substantia, facillimè omnium digeritur: dissipaturq; propterea quod est ut humidissima omnium, sic nulla frigidior. Quo minus uacuantis præsidij eget: quum ex se ipsa naturaliter abundè uacuetur. Fit autem profectò & propter calidam siccamq; regionem, & tempus æstiuum, & statum cœli impenfè siccum & calidum, notabilis per eum uacuatio. Itaq; hac de causa, qui sanguinis detractionem desyderant, ijs aut prorsus non scabimus uenam, aut parum detrahemus. Eruntque in hac detractione quoq; spectanda, natura ab initio, consuetudo, ætas, locus habitationis, anni tempus, cœli status, necnon is, quem curamus, affectus: aliaq; ratione, ante hunc, laborantis facultas. Quum uerò affectus sint, numerosi, cuiq; ipsorum sua est curationis per contraria indicatio. Quo circa, octo intemperamenta quum sint, octo erunt etiam morborum, quibus simplicia corpora sunt obnoxia, particulares indicationes. Ultraq; has, una eius affectus, qui instrumentum commune est, diciturq; continui diuortium: cuius sanè est indicatio curationis, unio. Est igitur unum morbi genus, quod similes & simplices animalis nexat particulas: quam intemperiem uocant. Huius aliquæ differentia oriuntur tibi corpora, nudis qualitatibus altera naturalia quæ ubi accedente etiam humorum affluxu. Quæ sanè dispositione utraq; uel afficitur una pars corporis, uel pluris, uel uniuersum corpus.

GALENI OPERA M. N. I.

DE FEBRIBUS CURANDIS

Libro III.

Indicatio ipsa de febre, de febrili causa, & de facultate

Cap. I.



L R C O in diarijs febribus simplex quidam est in corpore præternaturalis affectus: utpote. causæ quæ primum eas excitant, iam ademptis. In quibus verò causa quæ eas accendit adhuc manet, in ijs neq; affectus simplex, neq; sanatio est. Siquidem quod febris iam receptum in corpore est, id ex propria ipsius curandi indicatione discutere oportet: quod adhuc est futurum, id propulsare, ac ne fiat, vitare. Utabitur autem, si quæ id excitat causa prorsus summotæ sit. Itaq; in diarijs faciendorum indicationem maxime ex ipsa febre capiemus. In reliquis verò, quæ accensionis suæ causam intus habent, prima indicatio ab ipsa sumitur causa. Quare si febrium quæ multos dies continuant, recte ostendimus putredinem esse causam: hæc nimirum sananda est prima. Sed nec interim extinguenda febris, quæ per eam iam accensa est, ratio non habenda. Ac si quidem in idem consentiant, & quæ febrim extinguunt, & quæ oppugnant causam, in quod utraq; conspirant, quum vnum sit, sine cunctatione est agendum. Sin febris, quæ iam accensa sit, sanatio; causam quæ hanc excitauit, est auctura: aut quæ causam submouent, febrim exasperabunt, diligens habenda consideratio est de remediis specie. Etenim si intolerabilis ægro sit magnitudo febris, committendum non est, ut per ea quibus causam adimimus, febrim augeamus. Sin ita mediocris sit febris, ut quo tempore contra causam tantum pugnas, obruenda interim vires ægrotantis non sit, utiq; contemnendus is curatio nis modus non est. Non contemnendus autem nec ille est, qui contra id, cuius maius momentum est, instare iubet: nec tamen alterius omnino negligentem esse. Quum autem in examinandis ijs, ad hominis salutem non parum momenti facultas habere videatur, tria nimirum erunt, quæ in propositis iam ob putredinem febribus, agendorum indicatione nobis prima largiantur. Febris videlicet. Eius effectrix causa. Præterea naturalis facultas. Cæterum priora duo submouenda sunt: tertium est custodiendum. Erit itaq; rursus & hic necesse, ut tum febrim, tum eius causam, cum facultate ipsa conferas. Mox si eadem ambo remedia requirant, ea propterea exequaris. Sin indicationes pugnant, vnā præferas, uel quæ à viribus sumitur, uel quæ à causa, uel quæ à febre: sic ut quæ ceteris sit ualentior, hanc magis sequaris: nec tamen cæteras negligas.

Diaria quando, siant diuturniores: affectus harum multiplex, ac differentia multiplex. Cap. II.

N VNC verò ad particularium præsidium tum differentias nos conuertamus: repetita tamen mentione diariarum: quum & ipsæ in scitia medicorum, in plurium dierum febres aliquando degenerent: idq; uel earum effectricæ causa abeunte, uel etiamnum persistente. Porro abiit effectrix causa, quoties ab ira, dolore, vigilia, curâ, æstio, sole, fatigue, & bubone qui iam desuit, citra stipationem febris est excitata. Manet, quoties uel ab externa causa, uel ab ipsa febre, stipatio aliqua est orta. Nam & frigiditas, & astringentium usus, per mediam stipationem, semper febrim excitant. Vltio præterea nonnunquam constipat corporis habitum. Iam ipsum febris principium, ubi cum horrore inuasit, stipationem subinde fecit. Quinctiâ glutinosi, & crassi, aut etiam copiosi succi, ubi mediocriter obstruxerunt, diariam aliquando febrim accendunt. Dicuntur autem id genus febres omnes diariz, quia solui vno die sunt apte computata cum hoc, una & nocte. Cæterum non est idem diariarum omnium affectus. Sed ab aliquibus inseparabilis stipatio est: ab aliquibus minime inseparabilis: sed uel ut plerumq; simul adest: uel ambigua sorte: uel raro. Inseparabilis stipatio est ijs, qui ex aluminosa aqua, uel calcæthode, uel tali quapiâ alia, aut ex frigore, aut leui obstructione febricitant. Plurimum verò ijs adest, qui ex vltione febricitant. Ambigua sorte, ijs, qui ex fatigue. Quicumq; verò, ex ira uel tristitia, uel vigilijs, uel pertinaci studio, uel cruditate, uel bubone febricitant, ijs raro adiuncta stipatio est. Atq; harum omnium febrium nulla (quod utiq; ex ipsa sit) ad secundam usq; accessionem perdurat, sed intra quatuor & viginti horas omnino desinit: idq; cum sudore, uel madore, uel transpiratu quodâ halituoso. Aut si quando earum aliqua (quod tamen rarius contingit) longius trahunt, duæ ijs accedunt causæ, quæ ipsas solui uetant. Earum una frigus est, quod uel ex ambiæte aere, uel ex vltione quapiâ extrinsecus ad mora proueniat. Altera egregia illa diatrios est, si qui uidelicet hanc transire, medicorum in scitia coguntur. Multa igitur apparent diariarum esse febrium differentia particulares. Vnâ, quando iam prorsus recessit ipsarum effectrix causa: ueluti vltio. Altera, quando hæc etiam adest: sicuti stipatio. Cuius duæ sunt differentia: nempe exiguorum meatuum & desitas, & obstructio. Sanè desitudo ipsa, aliàs ex siccitate prouenit: aliàs ex frigore, coque uel simplici, uel cum astrictoria ui. Iam uerò obstructionum ipsarum, alia est, quæ ex abundantia: alia quæ ex qualitate succorum, scilicet qui aut lenti, aut crassi sint, incidit. Præferetur autem inter remedia, in ea quàm copia facit, sanguinis missio: in ea, quæ ex humorum qualitate consistit, attenuantium usus.

Consilium verò sumptum à viribus, ut in diarijs sanè est exiguum, ita in ijs qui pluribus diebus urgent, satis magni est momenti, eoq; maioris, quò hæ sunt longiores. Enim uerò, ubi naturaliter vires se habent, ne minimum quidem in diuturnis febribus uacuationum vsum morantur: vbi autem sunt infirmiores, pro magnitudine imbecillitatis, impedit vsum auxiliorum vacuantium. Rarius autem accidit, ut protinus in primo, secundoque die, vires imbecillæ cernantur, id quod tamè interdum accidit, vel propter ægrotantis malum corporis habitum, vel propter senium. Nonnullis etiam fatigatio, vbi tristitia, vigiliæq; præcesserunt, & inedia per totum secuta est diem, dein febris prius quam homo cibaretur, circa vespèram occupauit & nox in somnis est acta, vires impensè resoluit.

De nutritione febricitantium. Cap. III.

Porro quibus temperies corporis ad siccum calidumq; conuersa, febrem accendit, ij interdum vel in prima inuasiōe accessiōis, nutriendi sunt: ne dum ante illam. Eis autem solo ipse sorbitionem ex alica exhibere, iniectiones in eam mali punici granis: qui cibus bilioso stomacho est optimus. Nam & roborat hunc, malum punicum: & alica, cum diutissime in eo citra corruptionem maneat, sensim concoquitur, idque nec accescens, nec etiam innatans, *theophrastus de simplicibus*

De horrore, ac de rigore tractatur. Cap. IIII.

Igitur mordens halitus, succusq;, ubi per sensibilia corpora fertur, horrores & inæquales totius corporis concussiones facit, in ijs, quibus cute stipata, quæ prius transpirabat, iam sunt decedente. Quæ quidem, si fuliginosa sunt, febres accendunt. Eiusmodi autem halitus, succosq; tū multa & vehemens dimotio, tum vigiliæ, & ira, & dolor, & cura, augent: tum proximè ab istis, unum illud per se interdum augere eos sufficit, utiq; si cibum quis non sumpserit. Efficitur namq; corporis halitus in ijs naturis, quæ faciliè amaram bilem gignunt, ex longa inedia biliosus. Concussio itaq; siue rigor succedet, propter eorum quæ feruntur excrementorum, tum multitudinem, tū acrimoniam, tum impetus celeritatē, tum laborantis viriū imbecillitatē. Horror verò fiet, vbi & qualitas eorum, & impetus velocitas est remissa: tū copia minor, ac potissimum cum vires tristanti obsistant. Quod si largius remittantur iam dicta, ne horror quidem contingeret: sed vel quidam ceu ulcerosus sensus: vel tantum inæqualitas. Porro quibuscunque uirtute existente imbecilla, squalidoq; ipsius corporis habitu, incipientis adhuc accessiōis uidi adesse symptomata, ijs omnibus panè ex uino diluto, & calente, maturè, exhibens, horrorem statim inhibui. Quàto uerò hōs citius cibaueris, tanto scilicet magis febrem prohibueris. Sin dux ho-

re ab initio inæqualitatis interpositæ sint, nutries, tunc quoq;, modò adhuc duret horror: prædicēs tamē, quòd hi febricitabunt, cæterum innoxia febre, & cui cutis maior succedet, quo factò, tū lauare, tū nutrire debebis. Quòd si horror præterierit, ac iam planè febricitent, id temporis nō sunt cibandi: sed decrescēte iā accessiōe atq; interdū in summo uigore, nutriendi sunt solutionis integritate nō expectata. In nullo nāq; squalido affectu cōmodè finitur accessiō, prius q̃ illi uel ex lauaçro, uel humido uictu, humectatio accesserit.

Inedia nocet calidis, qui à principio corripiuntur hectica, quando uero sint nutriendi. Cap. V.

Calidis itaq; & siccis naturis, siue à primo ortu sint tales, siue sint etiam acquisitiæ, maximè inedia aduersatur, febriū paratissima causa. Inter alia autem, calidus in summo, siccusq; cœli status, iā dictā temperaturam efficit. Hic autem status alio anni tēpore, q̃ æstate, planè incidere nequit: sicuti nec humidissimus pariter frigidissimusq;, in alio q̃ hyeme. Corpora igitur calida & sicca, ex inedia faciliè in febres ardētes incidunt: à quibus, nisi prius mors occupet, in hecticas transeunt: atq; ab his, in marasmū: uel protinus ab initio, ardentibus præteritis abeunt in hecticas. Maximè autem siccas, calidasq; dispositiones corporum, à principio febris hectica corripit, id quod olim cuidam iuueni contigit, qui ex ira febricitauit. Cui quidē, quoties nutritus est, fontanæ planè gelidæ dedimus interim binos cyathos, interim ternos: quando frigidam simul multā sibi dari, qui ira sunt affecti, citra noxam non ferunt. Quo circa utilissimum fuerit, ubi febris ideam perspexeris, in prima statim occasione, minori cū periculo, copiosiori frigida uti: corporibus ad ualidam siccitatem nondum perductis. Iā uerò quemadmodum in quibus febris accenditur propter mordentem acrimoniam exalfecti, attenuatiq; à Sole, inedia, & laboribus, succi, maximum eius remedium est humidum nutrimentum: sic è diuerso, ubi ob copiam, uel obstructionē, uel phlegmonem, uel humoris alicuius putredinem, febris est orta, maximo malo est cibus. Quæ hos quidē, nec in febris inclinatione, citra noxam nutrias; nedū ipsa accessiōe inuadente: illos uerò, omni certè tempore, sed potissimum per inclinationē. In summa uerò, illa duo à primo statim die, sunt tibi in omni ægro spectanda, morbi summus uigor, & ægrotantis vires: à quibus cibandi consilia petas. Postea si trāsiri summū incrementū sine omni cibo potest, in cibi abstinentia hominem ipsum seruabis. Sin exiguum adminiculum requirat, abundè erit sola mulsa. Quòd si maius desyderat, quàm sit ex mulsa, ptisana: cremor lactis erit. At si fas non est summum morbi incrementum aut tenui uictu, aut inedia transire,

ri, id agendum, ut homo statim in prima accessionis inclinatione nutriatur. Aliquos vero ipso- rum, & quum intrasura adhuc est, & quum incipit, cibabis. Sint porro hi sicco temperamento & calido, oportet: tum viribus necessariò imbecillis: quum fieri nequeat, ut abundè siccum, calidumq; corpus, si febricitet, viribus sit valentibus. Si autem eum eiusmodi febris & corpore, momentanei membræ phlegmonæ sit coniuncta, omnino ager morietur: magisq; id certum est, si vel peripneumonia, vel pleuritis, vel angina, vel ventriculi, vel icterici phlegmonæ infestet: In quibus sanè affectibus yna salus est, virium robur. Nam quod ad phlegmonem quæ in ijs est partibus attinet, minime planè est cibandum. Quod ad virium infirmitatem, utiq; sæpe: Ac proinde necessum est, aut resoluantur vires, aut phlegmonæ augeatur.

Hæctica febris quando sit expectanda, ac victus ratio quæ sit febricitantibus. Cap. VI.

Quoties igitur vel ex lassitudine, vel ira, vel pluribus curis, vel vigilijs, vel tristitia, vel longa inedia, vel uniuerfis unà coëuntibus, siccatum corpus est, ac febris inuasit, quæ & aridam reddit curam, & igneum calorem refert, uti quæ hunc talem illior est hæctica febris correptum iri, potissimum in ætate, ac celi statu sicco, calidoq; . Oportet autem, quamprimum pituitiæ cremore, & sorbitione ex aliqua nutritum, panemq; post oblato, aquæ frigide potione hominē cures. Quippe protinus extinguitur, ac cessat omnino febris: modò nec phlegmonæ aliqua ei sit adiuncta, nec putridus humor. Quanquam ego etiam uel si hæc aderant, ægrotorum non paucis aquam frigidam dedi, tutius esse ratus, phlegmonas in præsens augere, quam sinere hominem in hæcticam febrem prolabi. Cæterum si magnum fore in commodum, uel humori putri, uel phlegmonæ sit suspitio, à frigida quidem danda abstinebis: refrigerantibus autem remedijs, quæ foris applicantur, uteris: modo ea super os ventriculi, aut tota præcordia: modo super pectus imponens: ubi scilicet plurimum subesse caloris, maxime iudicabis. Balneæ etiam, ijs qui siccato plurimū corpore sunt, & citra humorū putredinem februnt, non incommoda existunt. At phlegmonas subsequitur febres, propter putredinem humorū, qui in ipsis impacti habentur. Possunt tamē, uel citra phlegmonem, in ipsis uasis aliqui humores putrescere: idq; aut in una animalis particula, in finibus ipsorum impacti: aut etiam in totis eorum capacitatibus, quæ inter bubones & alas sunt, comprehensi. Vbi igitur citra putredinem squallenti corpori febricitare contigerit, caput totius curationis, in ijs remedijs quæ refrigerent, humectentq; , statuere oportet.

Remediorum refrigerantium, ac humectantium materia duplex est: refrigeratio in febre est periculosa.

Porro duplex genere est harum rerum prima materia: Una, eorum quæ foris incidunt: altera, quæ intus in corpus sumuntur. Extrinsecus corpori incidunt, tum aer ipse qui nos ambitum pharmaca, quæcunq; humectandi refrigerandique uim continent: & tertium præter hæc, dulcis aquæ balneum. Intro in corpus sumuntur, quæ eduntur, ac bibuntur, & inspiratus aer. Ab his generibus tentandum est propositis hoc loco febribus tum humiditatem, tum refrigerationem comparare. Verum refrigeratio, quoniam per efficacissimam qualitatem inducitur, & parui temporis est, & periculosa. Contra siccitatis, per ea quæ humectent, curatio, ut longi temporis est opus, ita minus est, quam refrigeratio, periculo exposita.

Febribus quales ades cōueniāt, quis aer. Cap. VII.

Sigitur temperatus sit aer, qualem se exhibet, tali eo est utendum, nihil amplius de iure nobis sollicitis. Sin uero admodum calidus, uel sit admodum frigidus, pro calido indurendus arte contrarius est, subterraneis inuentis domibus, quæ & frigidissimæ sint, maximeq; per sitæ, & ad septentrionem conuersæ: tum auris quibusdam suauibus opera nostra paratis: aliàs ex eurypis, in quos multi se aquarum fontes precipitent: aliàs aqua frigida ex uasis in uasa transfusa: id quod etiam conciliat somnum: præterea domo assidue aqua, quæ prorsus frigida sit, aspersa: ac rosas plurimis humi fufis, aut nitium capreolis, aut ruborum clauiculis, aut lèrisci ramis, aut deniq; reliquarum, quæ refrigerent, stirpium aliquibus, turba quoque hominum ingredi prohibita: ut quæ domum similiter calfaciat. At sic quidem calidissimum aerem, qui scilicet in æstate calida & sicca accidit, refrigerare est tentandum. Qui sanè si modicè frigidus sit, hoc esse contentos oportet, nihil de eius temperie alterantes. Qui uero frigidissimus est, utique quatenus respirando attrahitur, admittendus est, ut qui admodum calorem cordis refrigeret, non tamen quatenus extrinsecus ægrum coningit. Quippe densat, cogitque cutim, putrilaginosorumque humorum effluxum, atque transpirationem cohibet. Siquidem per pulmonem, quod rarum est viscus, difficile non est, utrum qualitas ipsius, tum etiam substantia, facillè ad cor perueniat: per cutim uero, utpote densatam, fieri id nō potest. Cæterum ex frigida inspiratione maior sequitur commodum, quam incommodum ex cute densanda: præsertim cum operimentis hanc nobis calfacere liceat. Porro utendum maxime eiusmodi aere est in ijs hæcticis, in quibus primū quæ afficitur, ipsum est cor: æquè ut si ventriculus primum affligere-

tur, ipsi per comesta & bibita succurrendum esset. At ieciori ex inspirato aere nulla certe accedit utilitas: à comestis nerò & bibitis, minor plane quam uetriculo: aliqua tamè haud obscure aduenit. Communis autem omnium sanatio est, per ea quæ extrinsecus applicata refrigerant, & humectant. Atq; ob hæc quidem viscera, magna ex parte heclicas, marasmodesq; febres accidere contèplati sumus. Superueniunt tamen aliquando & pulmonum intemperantia calida & sicca. Incidunt præterea & pectori, & mesenterio, & iecino, & colo: interim verò, & vterò, & renibus. In septo autem transuerso marasimum non vidi: febrem heclicam vidi. Eiusmodi autem affectum & spirandi difficultas, & delirium excipere solet. Ex quibus magna ex parte prius moriuntur, quam heclica sit prorsus perfecta. Est autem eorum agnitio facillima, tum ex pulsus duritia, tum ex eo quod præcordia plurimū trahuntur sursum, tum ex difficultate respirationis, quæ illis est inæqualis, & varia: interdum admodum rara, magna quæ: utiq; quum delirij malum præcipue dominatur. Frigidus itaq; ær tunc vel maximè confert, quum quod primum afficitur, ipsum est cor: quis confert & in reliquis febribus non parum: quandoquidem in his quoq; necesse est cor similem intemperiem recipiat.

Refrigerantia extrinsecus in febribus qualia esse debeant. Cap. VIII.

Plures etiam ubi sunt qui primum patiuntur, plus cæteris omnibus aerem refrigerantem postulant. Porro ex medicamentis, quæ admota extrinsecus in eiusmodi affectibus, refrigerandi humectandiq; vim possident, diligenda ea sunt, quæ non modò citra astringentem refrigerent, sed etiam corporis substantia sint tenui. Ac quæ quidem absolutissimè tenuium partium sit, substantiam exactè frigidam inuenisse, fortasse nò est. Dixi exactè, propter acetum. Quod quum omnium (quæ nouimus) potestate refrigerantium, plane tenuissimarum sit partium, admittam sibi aliquam habet caliditatè. Præterea corpora quæ contingit, siccant: quàmuis ad imaginationem sit humidum. Quo fit ut ad eos affectus, quos humectari & refrigerari expedit, solo eo nò utamur, sed tanto aquæ frigida admisto, ut possit bibi. Hoc autem medicamen quod subdā, humectantium & refrigerantium omnium simplicissimum est, optimumq; ad erysipelata, & pudendorum phlegmonas inter initia, prius quàm depascens aliqua subindictur putredo. Olei rosacei ex omphacino, oleo citra salè cōfecti. Vncias 3. uel 4. Ceræ albæ, & elotæ, unciam unā. Liquentur simul in uasè duplici, æstiat ceratum humidum, cui abundo refrigerato, misceatur paulatim in mortario tantum frigidissimæ aquæ, quā

tum in se, dum cum ea mollitur, accipere possit. Quod si acetum quoque admodum tenuis & claripaululum adijcere uelis, utiq; magis adhuc tum refrigerans, tum humectans medicamentum efficies. Non debet autem medicamentum hoc eo usq; super ægrum corpus manere, dum manifestè incalcat: sed assidue subinde mutari. Aliud. Oxalidos, aut oxylapathi succus, cum exigua polenta mistus, excipiat duplicato & detricto peniculo, aut linteo: assatumq; frigidum totum id admouetur. Quin etiam portulacæ, & semperuuij, & vix immatura succus, similiter polenta miscentur. Ad hæc, lens palustris, & viridis tribuli, & polygoni, & lactucæ, & intybi succus, aliaq; refrigerantia, cum tenui polenta miscentur. Licet etiam absque polenta, uti integris herbis trunsis. Iam uerò quod epithema ex pinguibus conficitur palmulis salutare medicamentum est. Porro coquere oportet harum carnem, omni membranoso exempto, alias ex solo claro aceto: alias aqua ipsi permista: atque hac, ubi tenera satis reddita est, trunsa uti. Est verò salutare medicamen ad alia, etiā succus rosarum frigidus, vñ cum polenta. Salutares similiter sunt & ipsæ rosæ contusæ. Præterea stipium, quæ moderatè astringunt, germina trita. Ad quem modum vii aliquando licet herbis medicocriter astringentibus, ut solano. Huiusmodi tamen refrigerantia omnia, illi tantum admoenda sunt parti, quæ primariò est affecta: non alijs quæ refrigerari non postulant. Ego nanq; hominem scio, qui imposito præcordijs refrigerante medicamento, laborarit statim dyspnœa: sicut aliterum, qui tussierit protinus.

Refrigerantium remediorum nonnulla per se refrigerant, ut potio frigida: alia per accidens, ut balneum, de quo agitur. Cap. X.

Verum ex remedijs ipsis, nonnulla quidem per se, neque intercedente alio, refrigerare sunt nata: ut gratia exempli, frigida potio, necnon succus unæ immaturæ. Alia autem ex accidenti: ut sanguinis missio, quæ calida aliquando intemperiem sanat. Ad eundem modum & clystere, & purgatio & fomentum, & cataplasma: quæ uidelicet digerant, concoquantur. Vtranque uerò facultatem in se comprehensam habet dulcis aquæ balneum temperatum: ut pote ex partibus uaria facultate præditis constans. Si quidem quum primum in id ægri ingrediuntur, in aere versantur calido: postea in calidam aquam descendunt. Mox ab hac egressi, in frigidam. Postremò sudorem detergent. Potest autè prima eius pars materias pectoris corpus, tum calfacere, tum liquare: præterea, quæ inæqualia sunt, æquare: & cutim laxare: & multa, quæ sub hac ante detinebatur, uacuare. Secunda eius pars, ubi quis in sicco corporis affectu ea vititur, potè madorem uilè solidis partibus

bus immittere. Tertia balnei pars potest, ubi quis frigida vititur, & totum corpus refrigerare, & cutim densare, & vires firmare. Quarta verò, corpus per sudores, citra refrigerationis noxam, vacuare. At ubi quis intempestive lauat, in horrores, cutisq; densitudinem incidit. Est autem continens ipsius horroris causa, mordentium excrementorum, aut etiam crudorum humorum, congestim actorum, citatior motus. Proinde, quibus horum est abundantia, caro verò ac cutis densa, siue balneum sint ingressi, siue steterint in sole, siue quoquomodo uel gestati, uel perfricti, uel exercitati, uehementius dimoti fuerint, utiq; ijs horror incidit. Contra, quibus hæc pauca sunt, & corporis habitus, ut remittatur, laxeturq; à balnei calore, promptius, ij non modò non horrent, sed etiam meliores redduntur, utpote excrementis per id uacuatis. Quo rationabilius, neq; in primò inuasionis initio, nec in incremento quiqua ægotantem lauit. Quippe densata est hoc tempore, coarctataq; & cutis ipsa, & quæ sub hac habetur carnea substantia. At in febris inclinatione uel incipiente, uel procedente, uel amplius progressa, sæpenumero nos ægros lauantes, non parum eis contulimus. Si quis igitur balneum ingressus, minimè inhorruit, sed laxata illi, nec non rarefacta est cutis, huic succedent planè excrementorum uacuatio, equalis per uniuersum corpus calor, exiguorum meatuum rarefactio, tensorum laxatio, densatorum fusio. Ac uacuatio quidem excrementorum, omni feбри est utilissima. Pari modo & rarefactio, & relaxatio. Fusio tamen, & calor, non item: sed calor omni feбри inimicus est. At fundi æqualiter, id solidis quidem animalis partibus non est alienum. Succis certè non perpetuò est utile. Sed quoties in animali uel phlegmone, uel affectus phlegmone similis constitit, uel vtravis plenitudo, omnium inimicissimum. Nam phlegmone quidem, quum calfacti & liquati succi ad ipsas confluunt, augentur. Tunica uerò uasorum, impares plenitudini, quæ iam ex liquatione est repleta spiritu, distenduntur, ac uires hoc nomine male habent. Ergo calidis illis, siccisq; affectibus, effusio mordentium est salubris: liquatioq; eorum contingit citra periculum. Calfactio tamen noxa non caret. Atq; hæc quidem ex prima balnei parte optimè administrata sumuntur. In secunda autem (quæ lauacrum erat) ut febrilia corpora ex humectatione iuuantur, sic ex calore nihil illis commodè accedit. At in tertia, refrigerantur innoxie, quæ fuerant excalfacta, & uires firmantur. Si qua uerò & laxata, & iusto plus sunt remissa, ea in naturalem redeunt mediocritatem, id quod quarta balnei pars, quæ deterfio est, indicat. Quippe quibus rite sunt omnia adhibita, ij post frigida usum adhuc sudant, & omnia ipsis excrementa uacuatur. A balneis igitur (ut unam omnium ueluti sum-

nam colligam) uacuatur quicquid in corpore uel humidum, uel fuliginosum præfuit. Reducuntur ad naturalem symmetriam, tum caro ipsa, tum cutis: corrigitur solidarum partium ariditas: & calor non modò is qui ex lauacro accessit, sed qui etiam præfuit, ex frigida usu extinguitur. Maximo huius rei documento est, præfidiu quod sentiunt homines, ex huiuscemodi balneo, ubi à feruenti sole exccati, lauantur. Quippe quum accedant ad id, ritu stipulae aridi, egressi è frigida, illico in naturalem habitum redeunt. Si itaq; certà febricitantium naturæ haberemus notitiam, non dubitaremus eorum aliquos assidue in aquis frigidis citra balneum lauare. Quia uerò exacta nobis dispositionum non est notitia, ac maxima ex errore impendet noxa, utiq; eiusmodi reculamur præfidia, potissimum in febribus hecticis: quando per has & pauci sanguinis, & nudum carne, & experti adipis corpus est redditum. Etenim inuenis corpulentus, ætatis tempore, ac in febris summo, uigore modò nulla uiscerum phlegmone subsit, sudabit, si in frigida se coniecerit. Quod si sit frigida: lauatiōi assuetus, securè remedio utetur. Qui autem ex calida & sicca intemperie febricitant hectica: ac potissimum qui iam marasmodos fiunt: ijs ubi tale præfidiu petunt, tutum non est in totam conijci: æquè ut nec gracilibus & imbecillis, qui ætate calida & sicca, longa uia peracta, refrigeratione indigēt. Nam neq; his tutus est frigidi solij usus, nisi prius fuerint in balneo æqualiter excalfacti. Siquidem simile quiddam nobis uidetur accidere, quum in frigidu solium post balneum ingredimur, ei quod ferro accidit, quum tingitur. Etenim tum refrigeramur, tum roboramur: quemadmodum & illud, ubi cadens iam redditu frigida mergitur. Atq; huius rei causa ad imbecilla corpora inueniuntur balneæ, quæ ea præcalfaciant, atq; ad frigidum soliu præparent. Non dissimile quiddam faciunt, & qui si ne balneo frigida utuntur, cum scilicet se ab exercitatione in eam salu demittunt. Siquidem quod nobis balneum, id præstat illis exercitatio: ut quæ non calfaciat tantum, sed etiam insitu caloris motu à profundo corpore extrorsum coniecit, sic, ut & frigida impetui occurrat, & quo minus uiscerum aliquod feriat, aduersetur, atq; prohibeat. Neq; enim ipsam frigida substantiam, neq; eius qualitatem omnino integram, usque ad uiscera pertingere est salubre. Immo satius & tutius fuerit, solam qualitatem, eamq; retusam calidorum occursu, descendere. Iam uerò qui hectica febricitantes ad balneum accedunt, nisi in frigidam sint dimisi, nihil iuuantur, contra q̃ alijs correpti febribus. Nam quum ijs solidarum partium affectus candenti ferro sit similis, calfecisse duntaxat eos, humectasseq; haudquaquam uidetur satis (sic. n. alimentum, incrementumq; præbuerimus feбри) sed opus est, ut meris in frigidam, extinguamus calorem.

Quòd si ex violento ipso, subitoq; frigida usu, malè fuerint affecti, utpote in contrariam qualitatem mutati, hos licet in toto quòd sequitur tempore, calfaciendo sanare: quum neq; par periculum sit in frigido affectu: nec in remedijs quæ illi adhibentur. Quum autem insanabilis solidarum partium summa siccitas sit, ad quam per hec ticas febres via expeditissima patet, melius est, hominem in frigidam intemperiem transferre, ac cui curationem adhibeamus habere, quàm tendentem rectè ad interitum sinere, desperatamque illi salutem facere. Ergo eos qui hectica februnt, illico omni ratione refrigeremus, antequàm progressi, in marasum perueniant. Nam quem iam occuparit marasmus, hunc neutiquàm sanare tentaueris. Ipsum tamen in alterum transferre marasum, quem appellant ex morbo senium licebit: ac sic superstitem, non tantum plures dies, sed etiam menses, seruare. In cæteris autem febribus, quas vel phlegmone, vel putrescentes succi accenderunt, nihil offendes, etiam si in frigidam ægrum ipsum non merferis. At in hecticis, id quod remedium affert, calidæ solum non est, sed frigida. Quicumq; igitur hectica febre laborant, atq; ex ijs præcipuè, qui iam marasmode tenentur, modò his nulla alia febris, vel ex solo putrescente humore, vel cù phlegmone, sit adiuncta, eos omnes audacter lauabis: sed prorsus citra omnem laborem: ne resoluantur vires. Sint ergo tres domus balnei: in quarum primam, quæ satis esse calida debet, in lectulo cubans ducatur: inibi què nudetur. Illinc autem valida sindone in secundam portari debet: quæ non tantum situ sit media, sed etiam temperie: tanto scilicet prima calidior, quanto est tertia frigidior. In ea itaq; oleo tepido super sindone perfundatur. Hoc facto, ad tertiam ducatur domum: ubi nimirum est solium, in cuius quidem moretur aqua mediocriter: idque sustentus sindone: nullaq; infusione aquæ, cuiusmodi in alijs vti solemus, adhibita: immo nec capiti eius quicquàm infundi velim: quum sit satis id quoq; bis, teruè vnà cum toto corpore, in aqua mergi: demissa mediocriter deorsum sindone: ac rursus per quatuor iuuenes, qui eum portant, leuata. Mox hinceductus; in frigidam semel totus tingatur: ne vel breuissimo quidem spatio illic moratus. Protinus verò alter paratà habens calentem sindonem; ipsi inijciat. Dein æger suo in lectulo collocatus, primum spongijs detergeatur: dein mollibus linteis, quoad fieri potest, blandissimè. Postea verò vinctus, amictusque vestibus, rursus super lectulo reducatur in aliquam aliam domum vicinam, ubi cibari consuevit: inibi que nutriatur.

Hæcticorum uisus ratio. Cap. XI.

Porro humidum esse, ac frigidum, quod hæcti-

cis febribus sit conducturum, nemo nescit. Eiusmodi verò sunt tum cremor pitisanæ, quum frigidus sumitur: tum alica, similiter pitisanæ cremori condita: id uero est ex aqua, & exiguo porri, & anetho; tum sale, oleo, & aceto. Commodus præterea ijs quisque laborant, est & exiguus in aqua frigida panis. Cæterum nullius horum, pura frigiditas esse debebit, sicuti potionis. Quippe hæc maturè tum incalescit, tum per corpus digeritur. Illa, quum plusculum temporis in ventriculo morantur, ipsum fortassis refrigerant, si fuerint immodicè frigida. Vbi autem febris iam traxerit, dandum quoq; asininum lac est, sed diligèter obseruato, ne in ventre concreascit. Cauebitur autem id, si mel illi admisceas: aut salis, quò uescimur, exiguum. Abstinendum tamen in hecticis, quoad fieri poterit, à melle est: atq; iccirco etiam à mulla. Quippe protinus in bilem conuertitur, & sicciores, acriorisq; caloris febres reddit. Dandus itaq; principio asinini lactis est non plus cythus: sed inducta in ipsum cubiculum asina; quò nullum tempus interponatur: æger autem id protinus bibat. At uerò si corruptum in ventre lac fuerit, pulsus paruos atq; inæquales inuenies, quales accidunt in compressione ventriculi. Sin autem non sit corruptum, & maiores & ualentiores eos quàm pro consuetudine inuenies. Quà ratione obseruata, licebit tum lactis, tum aliorum ciborum omnium modum sensim augere. Qui igitur iam marasmo uexantur, eos, sicuti dictum est, lauabis. Quos uerò hectica premit, nondum tamen marasmo tentantur, eos licet etiam laues, sine subiecta sindone: utpote uiribus adhuc ualentes. At qui ex his minùs sunt ualentes, eos non tutum est permittere in frigidam natationem descendere; sed foris ipsos potius perfundere: primum tepida: secundo frigida: qualis fontana est. Ac si quidem omnia curiosè administrantur, utique sanandi iam eius quem marasmus consumit, spes est. Sin error uel in uno committatur, is, reliqua subuertit omnia. Quippe quum exitialis horum effectus sit, ne leuissimum quidem errorem tolerat. Ac si quis talium est seruatus, huic carnosam tantum portionem marasmus iam occupauerat. Ipsi uerò solidis resiccatis, fieri nequit, ut homo prorsus sanetur. Etenim primum eiusmodi febris propriam partium humiditatem, ex qua nutriuntur, depascit. Hinc transit ad genus carnosum. Deinde solidas populatur particulas. Vocatur autem caro tantum ea quæ in musculo est. Nam quæ in uisceribus conspiciuntur, non carnes, sed paræchymata nominantur. Porro singularum particularum substantiæ moles, ex tali maximè completa est natura, quæ & perire, & regigni possit. At uerò nec fibrosa, nec neruosa, membranosa uel natura, eandem generationem habere cernitur: nec fas est eiusmodi singularum partium fibras, à febribus malignis liquari, perinde ut carnes: quando animal

animal ipsum, prius quàm hæc prorsus sint exicca-
te, interemerint. Sanè sunt & quas marasmodos
febres vocant, vniuersæ ex earum genere quæ col-
liquant: sed in eo differunt, quòd in his, quæ por-
tio carnis colliquatur, ea semper vaporis vice di-
geritur: in illis defluit in ventrem. Nam quemad-
modum quo magis animal vel adipe, vel carne
abundat, eo, quòd ab ipsius carnibus, dum in cra-
tulis torentur, defluit, copiosius cernitur: ad-
eundem modum in calidissimis febribus, si car-
nes humidæ ac molles, cū adipis copia fuerint, ea
sensus liquari deprehendas. Sin absq; adipe & sic-
cæ sint, insensibiliter absumuntur, & in febrès ma-
rasmodos transeunt. Hæc præmonitus, colliquan-
tium febrium ipsdem methodis curam ages: tum
ad frigidam exhibendam, quàm primum prope-
rans: tū ijs quæ refrigeret & humedent, nutriend.
Mullam verò inimicissimam illis esse censebis,

GALENI PERGAMENI
De Febribus curandis. Liber III.

Curationis scopi sunt duo: affectus, & ægri temperies.
Cap. I.



MODVM igitur curandarum eph-
emerarum, in octavo huius operis
commentario: continentium, in
nono: hæcticarum deniq; in deci-
mo, satis accurate exposuimus.
Nunc verò, quemadmodum quæ
ex putrescentibus humoribus excitantur, metho-
do sint sanandæ, aggredi est animus. Duo autem
sunt scopi curationis in vniuersum: affectus nem-
pe ipse: atq; egrorantis temperies. Affectus quip-
pe, ex ijs quæ sibi contraria sint, adhibenda esse
remedia indicat. Laborantis uerò temperies, si
mul cum ipso morbo, mensuram contrarietatis
definit. Potest etiã ambiens nos aer (qui ex cœli
statu, anni tempore, ac regionis natura suas mû-
tationes fortitur) unam efficere indicationem:
ac uel ægritudinis causis, uel senitatis, annuera-
ri. Porro auxilium, quo ad morbos tollendos uti-
mur, prima & ultima dicitur sanitatis causa: di-
uerstamea rationibus. Dicitur quippe ultima
tempore: quando quidem & natura, & ars, & for-
tuna, priores, secundum tempus, eo sanitatis exi-
stunt causæ. Prima uerò est, quatenus id primò
laborantis corpus tangit, alteratq; cuius affectum.
Ars siquidem artifexq; & fortuna, non per se pri-
mum, sed per auxilia morbos profligant: materie
quæ interuentu operantur: quemadmodum per
seipsam natura. Quæ nimirum tum ex spiritus,
tum solidarum particularum (quæ ex semine ge-
nitali oriuntur) tum carnosarum substantia, con-
stat. Quarum trium substantiarum singule pro-
priam pro natura sua tum qualitatem, tum quan-
titatem habent. Ac qualitas quidem earum, ex

congrua temperie humidi, sicci, calidi, & frigidi
efficitur. Quantitas uerò solidarum partium, par-
semper manet: sed ijs qui adhuc inaugmentur, nu-
mero duntaxat: qui uerò absoluti iam sunt, etiam
magnitudine. Carnosæ uerò substantiæ magni-
tudo variatur, etiam si iam non augeatur ani-
mans. Pari modo & substantia spiritus propemo-
dum quolibet momento tum maior, tum minor
conspicitur. Ergo ad duos illos scopos prius tra-
ditos, etiam unica uirtus addetur, iuxta earum
trium substantiarum enumerationem: aut tempe-
ries per se distinguetur: quæ & ipsa rursus bifa-
riam scinditur: nempe & in originalem naturam,
& in acquisitiuiam dispositionem: sic nimirum ut
ex istis, & alijs quæ prius dicta sunt, propria quæ-
dam cuiusq; remediorum sit indicatio. Ex ætate
etiam, uitæ studijs, consuetudineq; remediorum
indicationes sumuntur.

Intemperies contraria per contrariam est curanda, &
custodia per similia. Cap. II. III.

PROponatur igitur nobis intemperies quæ-
dam curanda. Ea utiq; per contrarium in
temperiem sanabitur. At quoniam vniuersi
febrium generis intemperies, est calor: utiq; per
frigiditatem curabitur. Quemadmodum autem
ab affectu ad materias præsidiorum peruenimus,
eodem etiam modo à singulis reliquorum gene-
rum primorum, ad eas est descendendum: ueluti
à uirtute, quæ morbo, cœu aduersatrix opponitur,
& cui omni ratione opitulari & subuenire, est cõ-
siliu. Quare uirtus quidem ipsa erit unus ac
primus scopus: alter autem, atq; secundus, quod
ab ea significatur: nempe custodia ipsius. Pari
etiam ratione, morbus quidem dicitur esse pri-
mus scopus: secundus autem, sublatio ipsius. At
uerò custodia, similia indicabit exhibitionem:
sublatio, contrariorum. Quoniam uerò uirtutis
substantiarum ex spiritu, tum ex carnosa specie,
tum solidis ipsis completur: ex ijs quæ similia
sunt, moliri cuiq; suam custodiam oportet. Spiri-
tui, ex respiratione, transpiratione, & uapore qui
ex sanguine attollitur. Solidorum uerò generi
ex solido nutrimento. Carnoso generi, per eam
naturam, quæ in medio humidorum ac solido-
rum corporum est. Porro cuiusque horum mo-
dum ex conseruandæ substantiæ modo inue-
nies: qualitatem uerò, ex ipsius temperie. Quum
autem horum cuiusq; temperies, uel optima sit,
uel aliquatenus uitiosa: quæ quidem optima est,
semper seruari debet. Quæ uerò omnino uitio-
sa non caret, hæc in sanis quidem, uel seruanda est,
uel alteranda: in ægris uerò seruanda. Quum au-
tem diuersitas non parua sit, in partium animalis
temperamento, propriam cuiq; mensuram, eo-
rum quæ ipsi similia sunt, oportet accommodare.
Nempe ei quæ terrea est magis, eorum quæ ma-
gis

gis sint terrea: & ei quæ humidior est, eorum quæ sint humidiora: ac sic de cæteris constitutionibus. Hinc verò iam materiæ particulares omnes in cibis, potione, aere, & omnibus peragi solitis, inueniendæ sunt. Quod si mutuo inter se pugnent aliquæ indicationes, perpendenda indicantium coporum tum magnitudo, tum dignitas est, efficiendumq; id, quod tum maiores, tum digniores scopi admonent. Quorum dignitas quidem iudicanda est, uel vitæ uel sanitatis respectu. Magnitudo autem est duplex: vel propriæ substantiæ ratione, vel declinationis à naturali habitu.

Synochos febris qua dicatur, & synochorum curatio.
Cap. IIII.

HIs igitur præmissis methodis, iam in febrium genere exercitemur, quod ex putredine nascitur. Ac primum ab illa febre exordiamur, quæ ex putredine humorum in maximis vasīs, vel in omnibus simul, computrescentium, oritur: quamq; necessum est synochon, hoc est continentē, existere. Fieri autē nequit, ut talis febris sanetur, nisi inhibita prius ipsa putredo sit: quæ sanē inhiberi, causa manente, non potest. Quare submouenda ipsius causa est, si modo putredo ipsa prior: mox post ipsam, febris sanari debeat. Ostensum autem est, illa tantum putrescere corpora, quæ quum calida humidaq; natura sint, neq; perspirata, neq; uentilata, in calido humidoq; loco includuntur. Quod si in motu sint, uentilenturque ac persciantur, posse ea non putrē, integraq; seruari: potissimum quæcunque corpora sua ipsorum natura reguntur: ut animalium, stirpiumq;. Ea namq; ab initio congenitos secum motus habent, quibus superflua excernant. Nec minus etiam est demonstratum, quanta sit tum respirationis, tum pulsuum utilitas, ad perspiratum, uentilationemq; corporis, atq; eius naturæ calorem tuendum. Itaq; si quid in eo manifestē putrescere debeat, dictas transpirationes esse impeditas oportet. Fieri autem non potest, ut illæ per totum sistantur animal, nisi vel finibus vasorum stipatis, uel tota cute. Porro accidere in finibus vasorum stipatio potest, uel ex vehemēti extrinsecus refrigeratione: uel ex succorū, qui extrorsum in ipsos confertim ruerint, crassitudine, multitudine, uel lentitia. Accidit hoc illis & ex ijs exercitationibus, quæ in palestra, uel aliās obcuntur, & itinere laborioso: uel ambientis statū, quum ex rigore in æstū mutatus est subito. Nonnullis uerò feruētes ex ira succi, ac foras si mūl impetu ruentes, effecerunt dictas stipationes. Quisquis igitur propositam sanaturus est febrem, hic simul causam eius oportet adimat: si multum calorem qui in animali excitatus ab ea est, refrigeret. Ac quemadmodum quidem ille refrigerandus sit, prius est dictum. Causam uerò adimi-

oportebit, propria cuiusq; naturæ innenta contrarietate. Vtiq; si ex frigida causa stipatum, densumq; redditum corpus est, relaxato eo, omniq; ratione rarefacto. Sin ex obstructione ita est affectum, hac reclusa. Quod uerò recludet, hic quoque ad contrarietatis indicationem attentus inuenies. Vbi nanq; abundantia humorum est, hos vacuabis. Vbi crassi, glutinosiq; sunt, eos tenues & fluxiles reddes.

Nutrimenti quantitas quomodo sit expendenda.
Cap. V.

SI plures causæ aliquando coibunt, omnibus per contraria occures. In eiusmodi autem distarum causarum complexu, cœpisse à sanguinis missione conueniet: ac abundantia vacuata, tum ad extenuandos humores venire. Ab hoc ad remittenda quæ sunt constricta, & rarefacienda quæ sunt densata. Atq; hæc quidem à morbi affectu indicatiue sumenda sunt. Quum autem ciborum atq; potionum, necnon spirituum decens quantitas, qualitasq; uirtutem ipsam custodiant: ac modus quidem quantitatis ipsorum, à uirtutis substantia inueniatur: qualitatis uerò, à temperie: nimirum æstimari debet, quemadmodum uires quæ corpus regunt, se habeant. Quæ quidē si sint ualentes, audacter uacuantibus præsidij uteris. Sin infirmiores sint redditæ, uacuantia remedia cautius administrabis. Sed & nutrimenti modus hinc tibi desumendus est. Quippe quum uires legitimū robur suum habent, & morbi summus uigor breui expectatur futurus, tenuissimo cibo uti licet. Vbi uerò infirmiores fuerint, non licet sine graui noxa. Sed adijcere ad nutrimenta tantum oportet, quantum est de robore uirium detractum. At nutrimenti qualitas, ex morbi affectu, unā cum solidorum corporum temperamento præsentī, sumenda est. Tempus autem nutriendi, quod quidem ad reliquas febres pertinet, quæ ex putredine oriuntur, in progressu sermonis dicetur. Quæ uerò unicam tantum à principio ad finem usque accessiōnem habent, synochiq; dicuntur (de quibus impræsentiarum est sermo) in ijs tunc offerendus est cibus, dum ægri melius se habent: eorūq; potissimum dici tempore, quo in sanitate prius cibari erant sueti. Est autem frigida quoque ijs propinanda, quum succi & iam concoquantur, & crassitudo eorum est extenuata.

Febrium putridarum differentia. Cap. VI. VII.

CÆterum iam operæpretium est explicare, quot sint febrium, quas putredo accendit, in uniuersum differentiæ. Dein, quænam sit ipsius generis earum cōmunis utilium auxiliiorum indicatio. Mox, quæ sit singulatim cuiusq; propria. Quod igitur ad differentias pertinet,

net, prima sanè ex eo est quòd causæ ipsius putredinis vel adsunt, vel non adsunt, Secunda ex eo quòd per totum animal, aut eius partem aliquà diffusa putredo sit. Tercia, quatenus cum phlegmone, aut citra hanc.

Putredo quid sit, & quomodo sit sananda. Cap. VIII.

ERgo ordiamur ab humorum putredine, quæ primum indicans in diuisione fuit. Cuius quidem natura, ad curationem erit inuentionis principium. Porro natura putredinis est mutatio totius putrefacti corporis ad corruptelam à calido externo. Non enim profectò à proprio calore corrumpitur, quicquàm: immo prorsus contra, quicquid in rebus subsistit, id augetur, roboratur, sanum est, ac viuit, dum proprio calore regitur, veluti nimirum ipsa animalium corpora, quando seruat proprius eorum calor: in cordis quidem corpore, per respirationem: in reliquis omnibus partibus, tum per communitatem quam habent cum corde, tum per aliam quandam respirationis speciem, quæ per totam agitur cutem, & transpiratio, per spiratione dicitur. His uero læsis, unà etiam calor natiuus læditur. Alter uero quidam alienus, ac præter naturam in corporibus excitatus, primum quidem ipsos succos propter humiditatem putrefacit, corrumpitq;: Spatio uero, tum adipem inuadit, tum etiam carnem. Putredinem in corporibus oria sanabimus, id quod iam corruptum est, omni ratione uacuantem: quod reliquum est moderatis motibus, & refrigerante perspiratu ad exactam symmetriam reducentes.

Putris humor quomodo sit uacuandus, & quæ medicamenta uacuantia in febribus conueniant.

Cap. VIII.

AC vacationem quidem illius per urinam deiectiones, sudores, uomitumq; molie-mur, si putridus humor, ad os uentriculi aliquando sua sponte imperum faciat. Post hanc, dimotiones mediocres, unà cum ambientis bonæ temperie adhibebimus. Causam uero putredinis, si adhuc perseveret in corpore, per contraria tollemus: Itaq; quoniam transpirationis prohibitio fuit occasio putredinis, hanc submouere oportet. Quia uero ea (quemadmodum exposuimus) à uarijs causis est orta, ipsarum singulis contraria medendi ratione occurremus. Sciendum tamen est, non easdem omnes partes uacuationes, medicamentis requirere: quum & temperamētis, & positis, & forma, & omni deniq; constitutione, naturaq; inter se dissideant. Quum autem maior pars medicamentorum uacuantium, febrem ipsam adaugeant, utpote facultate calida & sicca: diligenda medico sunt, quæ citra calfactionem, siccationemq; ualentem, ipsas uacuationes moliantur.

Cuiusmodi sunt cremor pitæ, aqua mulsa, oxymeli, apomeli, & apij radix, in aqua, quæ potius datur, incocta. Hæc autem ipsa uentri sunt quoq; idonea. Qui si nihil reddat, iniicienda per clysterem mulsa cum oleo est. Sanè totum corpus, prius quàm id uacuaretur, rarefaciendum non est. Vbi uacuatum sit, utiq; licebit id medicamentum aliquo, cui calor repidus insit, rarefacias: cuiusmodi est quòd ex chamæmelo conficitur. Hoc tepore si uinum quoq; aquosum bibatur, id omnes uacuationes promouerit. Idem faciat & temperatum dulcis aquæ lauacrum. Cæterum, ubi magnitudo febris obstat, sicuti in continentibus, nec uino est utendum, nec lauacro, nec ijs, quæ habitum rarefaciant, unctionibus. Iam uero id genus ardentissimis febribus, potus frigide confert: nisi subsint putrescentes humores, par aluum, urinas, uel sudores uacuandi. In uniuersum autem, dum plura simul coeunt symptomata, id quod maximum omnium est, aggredi oportet: atq; ei uel soli, uel magis quàm cæteris, subuenire. Porro ad corrigendos putrescentes humores, non tantum requirimus uires ipsius pulsus firmas: sicuti nec eius facultatis quæ uoluntariū motum largitur: sed multo magis ipsius concoctricis. Ergo si & uires cunctæ ualentes sint, & ardentissima febris, & concoctionis notæ planè euidentes, frigidam intrepidè propinabis. Quòd si etiam æger bona corporis habitudine sit, tum status cæli calidus, ac siccus, etiam si in frigidam narrationem huc dimittas, haudquaquàm lædetur. At si mediocris est febris, & uires non ualidæ, sed cum potis concoctionis, ijs qui ita se habent, balneum prodest, & uini potio: tum uero ex unctionibus ex quæ rarefaciunt: idq; multo magis, quum ambiens est frigidus. Neq; enim aut frigidam in balneo lotionem, aut frigidam potionem in eiusmodi cæli statu ferè expectunt, utpote inspirationibus assidue refrigerati: quum si quando in frigido ambiente uehementer uri ægrotum contingat, exigua salutis eius habenda spes est. Si uero nec concoctionis habeat signa, nec uires validas, seruari is planè non potest. Quo minus aut idem lauandus in balneo est, aut medicamentis ijs quæ rarefaciant, ungendus, aut uinum illi dandum, frigida uero offrenda. In quo enim desperata omnino est salus, imprudentis consilij fuerit apud vulgum infamare præsidia, quæ multis fuere saluti. Febris igitur, prout febris est, aqua frigida est perpetuo remedium. Quòd uero ad alia pertinet, non perpetuo. Veluti quum ex obstructione glutinosi & crassi humoris putredo nascitur. Ponatur autem cum hoc, & redundantiam in toto esse corpore: tum uirtutem non imbecillam. In eiusmodi etenim complexionibus, quum multa præter naturam in corpore sint, quædam eorum præcedentes causæ erunt: ueluti redundantia cum glutinosis, & crassis humoribus. Horum namq; uitio obstructio est orta:

orta : quæ morbus instrumentalis est, eorum quæ obstructa sunt corporum. Hanc symptomata sequuntur, ipsa transpirationis cohibitio: quam rursus putredo humorum excipit, antecedens quædam ipsius febris causa.

Obstructiones sunt aperiendæ, sed non prius quam plenitudo vacuetur. Cap. X.

Ergo qui febrem curare vult, necesse est inhibeat putredinem. Ac sic duæ indicationes se exhibent: altera à febris: altera à putredine. Atq; à febre rursus duæ: scilicet ut portio febris, quæ iam accensa est, percuretur: quæ vero etiamnum gignitur, inhibeatur. Aliæ autem duæ rursus à putredine erunt indicationes: ut & quod putredinis iam factum est, sanetur & quod in generatione adhuc est, sistatur. Porro: quod in generatione est, id perspiratio impedita facit. Ita ab hac rursus aliæ duæ indicationes nascentur: tum ut quod retentum est, vacuetur: tum quod retinendum est, prohibeatur. Prohibebitur sanè, si obstructioni medeamur. Cuius quoq; ipsius, quod iam occupavit, sanandum est: per ea quæ obstructa liberant, quod futurum est, propulsandum: per ea nimirum, quæ affluxum obstructionum succorum compescunt. Ergo quod ultimum in ipsa methodo resolutiva est inventum, id primum omnium in curatione tibi est peragendum. Etenim si ijs auxilijs, quæ obstructiones eximant, uti, non vacuata prius abundantia, uelimus, non modo nihil proficiemus, sed maiorem etiam redemus affectum. At si vacuata prius multitudine ad curandam obstructionem accedamus, medicamentis ijs utemur, quæ citra calorem obstructiones expedire sint apta. Vbi autem quæ obstruunt deterfa, dissectaq; sunt, per aluum, urinas, atque sudorem, ea vacuare tentandum, idq; medicamentis quoad licet, minimè calfacientibus. Hoc verò tempore, etiam vires roborare, quo & putredinem superent, & succos concoquant, studebimus. Quod autem febris ipsius iam accensum est, refrigerabimus. Itaq; in auxiliorum inveniendorum ordine, ultima est quæ ab hac sumitur indicatio, quamvis alia ratione sit prima: quum à febre uidelicet coeperit inveniendorum præsidiorum methodus.

Febris quando celerrime finiatur, & facultas mulsæ. Cap. XI.

AC si nullum quidem interim vehemens symptoma incidat, prohibeatque quomius auxilia ab initio morbi ad finem ita procedant, celerrimè febris finiatur. Sin tale quippiam inciderit, quod totam ad se curationem reuocet, producat & curationis finis. Expendere autem oportet medicamentorum tum usum, tum

noxam. Quippe aqua mulsæ, quatenus crassos succos extenuat, glutinosos deterget, atq; excretionem promouet, optimum in ijs synochis medicamen fuerit, quos habitus coarctatior, & putredo excitauit. Quatenus verò calorem febris adauget, est noxia. Quare si hic immodicus sit, parcendum mulsæ est: extendendumq; cremore ptisanæ. Quod si difficiles & contumaces iudicaueris esse obstructiones, etiam oxymelice. Ac hoc ipsum rursus, immodicè utare, & intestina radit, & tussim excitat, & nervosa lædit.

Contrariorū contraria esse remedia, contraria quæ dicuntur & quæ non. Cap. XII.

Perpetuè autem dogma illud existit, verum, contrariorū contraria esse remedia. Quandoquidem fieri non potest, ut eorum quæ præter naturam sunt, quicquàm per aliam ullam remediorum speciem curetur. Non tamen ex usu est semper omnibus quæ præter naturam sunt, medicis sed quum sola per se subsistunt. Nam si cum alijs unà incidant, alijs sæpe est ante illa medendum: sicuti in cauis ulceribus, ubi ea simul cum phlegmone sunt coniuncta. Siquidem uerum in his quoq; manet, quod per ea quæ carne implent, curantur. Caterum his uti non licet prius quàm curaueris phlegmonem. Quæ itaq; præter naturam sunt, omnia ab ijs quæ ipsis sunt, contraria curantur. Quum autem eorum quæ præter naturam sunt duplex prima sit differentia, alijs per se subsistentibus: ut puta affectibus: alijs in generatione suam essentiam habentibus, ac umbræ ritu affectus concomitantibus: nempe symptomatis utiq; sanatio quidem, affectuum sublatio est. Hanc uerò symptomatum amotio sequitur. Quare affectuum ipsorum, qui uerè & primariò curantur, potissimum dicuntur esse contraria remedia: symptomatum autem, ex accidenti. At uerò contraria dicuntur, quæ sub uno eodemq; genere, plurimum inter se dissident. Si autem in illo genere quod mediocrè est, hoc est mediū inter duo extrema, intellexeris, infinitam quandam contrariarum rerum multitudinem, quæ maioris minorisq; ratione, inter se dissideant, ex eo inuenies. Non enim in corporum modo qualitate, uerum etiam in quantitate, eiusmodi contrarietatem inuenias. Quam utiq; Aristoteles non contrarietatem, sed oppositionem nominat. Verum Hippocrati, omnia id genus contrariorū habent appellationem: sicuti etiam Platoni, qui ex contrarijs esse dicit generationes. Contemnere tamen nomina oportet: minimè autem scientiam rerum. Cuius non ignarus Hippocrates ait, Medicina appositio est, & detractio: deficientium quidem appositio: redundantium autem detractio. Porro deficientiunt, redundantq; nonnulla quidem in quantitate: quædam autem in qualitate. In quantitate,

tē, quū sanguis immodicē est auctus: aut rursus minor redditus. In qualitate, quū vel calidus, vel frigidus, vel crassus, vel tenuis, plus iusto, minusue, est effectus.

Causarum genera præter naturam. Cap. XIII.

Verū ad medendi indicationes propositi nobis febriū generis reuertamur. Genera causarum, quæ in nobis præter naturam oriuntur, sunt multitudo, crassitudo, & lentor humoris. Causa simul atq; symptoma est trāspirabilis excrementi retentio. Simili modo causa pariter & affectus est ipsa putredo. Morbus verò tum obstructio, tum febris ipsa. Symptoma est, transpirabilis excrementi retentio. Ergo indicabit præcedentium causarum quælibet propriū aliquid, poscens nimirum ablationem sui per opposita. Nempe multitudo ipsa, quæ ex eorum est numero, quæ sunt ad aliquid, in prædicamento quantitatis, uacuationem. Lentitudo verò & crassitudo, quæ sunt in qualitatis affectu, incisionem & abstersionem. Obstructio autem, qui morbus instrumentalis est, reclusionem. At transpirabiliū retentio, excretionem eorundem. Sicuti & humorum putredo, excretionem, refrigerationem, uentilationem, & concoctionem semiputridorum: quæ omnia illi ex aduerso respondent. Ipsius verò febris refrigeratio oppositio est. Singulæ itaque res semper unam indicationem exhibent. Ac si præter naturam ipsum indicans sit, semper indicabit contrarium: sicuti non contrarium, sed simile, si secundum naturam se habeat.

In febribus putridis quando, & quomodo mittendus est sanguis. Cap. XIII.

Igitur si vires eius qui ex putredine humorum febricitat, valentes sint, mittendus statim morbo incipiente est sanguis: si cruditas veneris non adsit. Sin vires infirmæ sint, aut ætas dehortetur, incidenda vena non est. Eiusmodi tamen febris in virtutem imbecillam non incidit. Quippe synochos bene habiti corporis, & calentis ætatis est propria. At si in puerum incidat, qui quartum decimum annum hætenus non attigerit, mitti illi sanguis non debet: propterea quod tætilis, quum præsertim calidi & humidi sint plurimum corporis substantiæ quotidie defluat, ac digeratur. Ita quod ex incidenda vena molendum nobis fuerat, id ultero nobis excurandi corporis natura præstat. Quod si corpus quartum decimum excesserit annum, æstimandum est qualis eius natura sit: num gracilis, & spissa, & dura, & copiosi sanguinis, an contra. Atque ita in priori missionem sanguinis adhibebis: in secunda, nequaquam. Quin etiam modus uacandi sanguinis ex ipsdem sumetur indicationibus.

Si enim cui sanguis mittitur, triginta annos sit natus: sed laxus, & mollis, & pinguis, & albus, & gracilibus uenis: huic aut planè sanguinem non mittes: aut parum detrahes. Et omnino quidem non mittes æstiuo tempore, regione æstuosa, & cœli statu calido & sicco. Parum detrahes in reliquis tum anni temporibus, tum regione, tum cœli statu. Iam uerò, si neq; obstructio, nec putredo subesset, sed sola redundantia succorum, protinus à missione sanguinis, pro naturæ suæ ratione homo se haberet. Verū quoniam nec obstructio, nec putredo per solam curari missionē sanguinis potest, reponi sanguinis aliquid ad spatium curationis debet: quo minus intempestiuè nutrire necessitate ulla cogamur. Quantum namq; ad huiusmodi pertinet febrem, prorsus nutriendum non est. Siquidem ostensum prius est, solum uirtutis respectum esse, qui nutrimento præbeat indicationem. At uero euacuationis ratione, nutrire oportet. Ita necessum est duorū alterum: aut febrem, si nutris, augere: aut vires, si non nutris, deicere. Satiū itaq; fuerit, aliquid sanguinis, quod propriū partibus animalis nutrimentum sit, relinquas: ac ipse paucissimas fortiones, potionesq; exhibere contentus sis: quibus utiq; ceu medicamentis, potius quàm nutrimenti egemus.

Vitium instituens pars artis ex quibus constat. Cap. XV.

Porrò quum ars ipsa tota sit magna, non leuissima eius pars, est scientia ordinandi uicinis. Quæ utiq; ex his maximè remedijs constituitur, cibo, potione, perfusione, cataplasmatibus, & clysteribus. Cæterum calfacere præcordia cataplasmatibus aut perfusionibus, non est perpetuo tutum: sed in ijs tantum ægris, quibus in toto corpore nullum erat superfluum. Cæteris omnibus extrema est perniciēs. Nam siue redundantia utrauis sit, uel ad uasa, uel iuxta vires: siue etiam in una parte pluribusue uitiōsa excrementa habeantur: omnia ad partem excelsam trahuntur: inibiq; sæpe phlegmonas excitant. Quare in eiusmodi morbis diuites potius quàm pauperes perperam solent curari. Nempe, & quod raro illis mittatur sanguis, uel si maximè tali egeant auxilio: & quod medici, ut agere aliquid semper uideantur, de præfundendis præcordijs maximè sint solliciti, itaq; accidit, ut illo ipso tempore phlegmonæ incipiant diuitibus, quo iam pauperibus, morbus propemodum productus ad finem est. Saluberrimum igitur est in febribus uenā incidere, non synochis modò, uerum etiam alijs omnibus, quas putrescens humor concitat: ubi præsertim neq; ætas, nec vires prohibent. Leuata enim quæ corpus nostrum regit natura, exonerataq; coquo ueluti sarcina premitur, haud ægrè quod reliquum

liquum est vincet: concoquens quod concoqui est habile: & excernens quod potest excerni. Porro ubi humor ad locum affectum confluit, remittere repellereq; hunc expedit: non ad ipsum trahere. At repellentia remedia, quæ certè astringendi vim obtinent, in principiis idonea sunt duplici ratione. Et quod robur affectis particulis inferant (unde minus promptè affluxum excrementorum in se recipiunt) & quod eorum quæ in ijs iam recepta sunt, tenuissimum extrorsum exprimant. Quod si tum fluxio humorum per ea remedia compescitur: tum densitas quæ in affecta particula relicta est, crassiora detinet: iam tempestiva relaxatio est, quo ea quæ retenta sunt, vacuescunt. Præcipuè autem astringentibus est utendum: ubi in iecur aut ventriculum, superuacuum aliquid profluit, quando & è primoribus admodum hæ partes sunt: & ut munus suum obeant, vel in ipsis morbis, est necessarium: quum alimentum corpori uniuerso conficiant. Quare ciborum concoctio, siue ea in iecinore, siue in ventriculo sit impropria, febres intendit: ac succi vitia exacerbant. Quo magis in omnia febri, ciborum concoctionis prospicere magnopere oportet. Atque eius rei gratia, roboris quoque instrumentorum quibus perficitur, non leuis habenda est cura.

Concoctionis instrumenta consideranda sunt. Cap. XVI.

XVII. XVIII.

SI ergo vel minima sit suspitio iecur aut ventriculum laborare, absynthiū protinus oleo incoquemus, ac eas particulas perfundemus. Quum autem duplex in omni absynthio facultas sit, utiq; in pontico astringendi facultas non parua est. In reliquis omnibus amara quidem qualitas est vehementissima: astrictio verò, aut planè obscura, aut prorsus nulla sentitur. Proinde ponticum ad iecinoris & ventris phlegmonas eligi præstat. Est autem id tum folio, tum flore longè quàm cætera absynthia minore. Odor quoque huic non modo non insuauis, verum etiam quid aromaticū referens. Reliquis omnibus planè est sedus. Quare hæc fugere oportet: uti autem semper pontico. Etiam reliquorum medicamentorum, in quibus mista cum amaritudine astringendi vis est, aliquid in oleum conijcere, atque ad eundem modum uti, licet. Amara siquidem qualitas præit, uiamq; astringenti facit. Ac si quidem intendere astrictionem studes, oleum ipsum etià astringendi vim habeat: cuiusmodi est, quod Hispanum uocant, & quæcunq; cum olæ frondibus præparantur. Sin leuiore uti astrictione placeat, aliud olei genus præparabis, præcipuè quod tenuium sit partium: quod genus Sabinum est. Optimum tamen ubi astringere vehementius expedit, est istrictum oleum. In penuria uerò absynthij inter initia uel melinum, uel mastichinum, uel lentiscinum satisfecerit. Quod si exi-

gua febris sit, etiam unguentum nardinum: quod utique ualentius ijs omnibus calfacit. Quare si aliorum copia non est, inualecente febre, rosaceum illi admiscebis. Sanè myrtini astrictio idonea non est: quum crassiorum sit partium, quàm ut altè descendere possit. Ad eundem gerò modum & cataplasma compositam vim obtineat, ex ea quæ tenuium sit partium, ac relaxet tum etiam, ex amara, astringenteq;. Superet autem in ijs, ubi scilicet tum reprimere, tum robur addere, studemus, quod astringat. Vbi tenuare ac digerere, amarum: ubi euocare, quæ ex relaxantibus tenuium maximè sint partium. Siquidè quæ crassæ substantiæ sunt, ea pus mouentibus sunt ac commodata. Cataplasmate autem quod sequitur fuimus nos sceleriter usi, contra iecinoris phlegmonem. Recip. Olei in quo absynthium decoctum fuerit, & cydoniorum decocti, sing. vnc. 3. myrobalanorum & rad. ireos, sing. drach. 2. Certe quod sit satis. Fiat emplastrum puluerizatorum, iuxta artis præcepta. Coquitur & in uino austero cydonium: ex ipsiusq; carne aliquid eiusmodi cataplasmaris inditur: ubi uidelicet & quod confluit copiosum est, & particula ipsa infirmior. Tunc siquidem astringentem vim in augemus. At uerò nec colo laborante, nec reliquorum intestinorum quouis, nec musculis qui in præcordijs habentur, aut ipso peritoneo, miscenda astringentia sunt. Sed nec quum uesica malè habet, uterus uerò modò nihili ultra ad locum fluat, nec sanguinis redundantia, nec excrementorum copia, in toto sit corpore. Porro renes & pectus in media prædictorum conditione consistunt: quantum scilicet à uentriculi iecinorisq; sollicitudine absunt, tantum reliquis antecellentia. Siquidem in uentriculo iecinoreq; resolui robur perniciosissimum est: minimè in illis periculosum. In his uerò est quidem periculosum, non tamen perinde ac in illis: nisi pus educere ex pectore, aut pulmone, aliquando sit opus. At in liene curando, si uel ager ex ijs sit, qui atræ bilis excrementum naturaliter congerant: uel etiam eo tempore succus is in eo redundet, necesse est reliquis astringentia permisceas: quo visceris robur custodias. Ita enim & excrementa ad se trahet: & quum corpus expurgarit, ipse rursus per uentriculum excernet. Sin atræ bilis sit omnino excrementum nullum, aut prorsus astringendum nō est, aut parcissimè. Ad hæc, si in quauis phlegmone obfessa particula, calor tumorem superet, agendum, ut sensim per ea quæ tepentē calorem obtinent, digeratur: quod genus est tū lini semen: tum chamæmælum. Quibus adijci uel hordei uel fabarum farina debet: quippe quorum neutrum ex calfacit. Sæpe uerò & artomelite ad eiusmodi phlegmonas ueimur: cui aquæ aliquid admiscemus. Ad lienem uerò etiam aceti aliquando aliquid. Si uerò laborantis phlegmone partis calor non multum à natura recesserit:

recesserit: tumor autē ipse fuerit notabilis, digere re haud timide sine aqua debetis: etiam fœnigræci aliquid supradictis immiscens. Si ueluti scirrhusa duritie phlegmone sit, propter humoris quē continet uel crassitudinem, uel lentorē, tum aceti aliquid, tū amara medicamenta, simul immiscenda curabis: potissimum in liene. Etenim uiscus hoc, propterea quod ab iecinore crassum humorem trahit, eiusmodi humoris occasione plerumque laborat. Quo magis cataplasmata quæ ex oxymelite, & ablinthio, & cappari fiunt, illi sunt idonea. Cæterū nec eorū qui ex putrescente humore febricitant, quenq̃ ipse lauabo; nec relaxantibus cataplasmatibus, prius q̃ superuacua purgarem, utar. His uacuatis, nō solum audacter laue, sed etiā cataplasmatibus utar in alijs quidē mēbris, ijs quę relaxent: in iecinore uerō ac uentriculo, additis etiam quæ astringant mediocriter.

Parius autē ad pectus, q̃ ad ea, utendū astringentibus est. Quādo talia humores qui phlegmonem excitant, in pulmones & cor nonnunq̃ cōprimunt. Ac cibis potius horum firmitudinē est consulendum. Neq; enim sicuti in iecinore & uentriculo phlegmone laborantibus, ita hic tenuissimō uictu est utendum. Ac longē quidē magis in pulmonis phlegmone abstinendum ab astringentibus est. Quādo in eo ipsis quoq; relaxantibus admiscēdum aliquid acuti quodāmodo, & euidenter calfacientiū est. Quippe foras trahere, potius q̃ reprimere, in eo debemus. Itaq; etiā cucurbitula, in ijs qui sic laborant, si prius sint uacuati, applicabunt. Si uerō abundātia succorū adsit, nō magis ex pulmone in pectus aliquid excrementi trāfferet, quā ex toto corpore attrahet in utrumq;.

Eadem ratione, neq; in cerebri & eius mēbrarum phlegmonis, cucurbitulis in morbi initio utemur: uerum ubi nec insiuit adhuc quicq̃, & totū corpus prius est uacuatum. At reprimentibus in his quoq; inter initia ntepdū. Sed quū per cranij ossa mediā occupātia regiōnē, in altum descēdere reprimentiū uim cupimus, eorū quę preire, ac deducere ea possunt, aliquid reprimētibus admiscebimus. Ea sunt, quarū substantia extenuibus partibus cōstat. Sanē aceti nō modo tenuiū partiū est, sed etiā nō mediocrē reprimēdi uim obtinet. Quo profectō rationabilius in principijs affectuum ipso utimur, rōfaceo admiscentes. Procedente uerō tempore, etiam spondylii & serpilli, aliquid miscent: quō scilicet tempore transire ad ea quæ concoquāt, ac digerant, cōuenit. Sanē ad eū modum & castoreo utimur: quum tamen ipso in alijs phlegmonis minimē utamur, quāuis etiam in summa inclinatione consistant. Est namque calidius id, quā ut phlegmonis sit idoneū.

Fluxiles reddantur meatūs, qui ad emissionem excrementorum sunt destinati. Cap. XIX. & XX.

Soleo autem ipse singularum particularum

meatus, qui ijs ad excrementorum emissionem sunt destinati, fluxiles reddere. Intestino, uentriculo, mesenterio, & iecinoris concauis, intestinum rectum. Renibus, uesicæ, iecinoris gibbis, uenæ cavae, arteriæ magnæ, & omnibus, quæ in lumbis habentur, eum qui uesicæ inseruit. Pulmonibus & pectori, arteriam asperam, atque fauces. Cerebro & eius inuolucris, eum qui per palatum & nares descendit. Paratur fluxibilitas ijs quidem quæ per sedem excerni debent, mulsa, & cibis ijs qui uentrē liquant, & pharmacis, quæ modicē proritare possunt. Ad uentriculum uerō, iecur, & lienē, si quando phlegmone sint uexata, nec mulsa ipsa est utilis; quoniā illico in bilem transit, ac uiscerum phlegmonas auget. Excrementa autem, ut cum urina excernantur, diureticis promouebis: quemadmodum quæ in pectore, & pulmone hærent, ijs quæ tusim excitant, euacuabis.

Porro balneum in remissione febris administratum, corpore iam mediocriter transpirante, nō exiguum commodum affert, omnia ex eo tum fuliginosa excrementa, tum humida educens. Curandum tamen est primō, ut citra horrorem administretur. Secundō, ut nullum primę naturæ uiscus sit imbecillum. Tertiō deniq; ne multitudo crudi humoris in primis uenis contineatur. Horror siquidem & auget, & gignit febrem. Partes uerō imbecillæ, per balneum liquatos humores multo facilius alliciunt: & quod succi liquati sint, & quod uiz dilatata. At crudorum humorum copia in totum corpus digeritur. Horum si nihil obstat, ex balneis duo hæc agro compendia accedunt: & quod redundantia humorum uacuabitur aliquid, & quod multum transpirabit calor febrilis. At uerō quum particula, quam obstructio, aut putredo, aut phlegmone obsedit, febris ipsius ueluti focus sit, si ei propter calorem suā spontē trahenti, alia quæpiam occasio extrinsecus, ex ijs quæ potestate exalfaciunt, accesserit, necesse est affectum intendi. Siquis autem prius toto uacuato corpore, relaxantibus curet, ubi scilicet maxima febris non adest, utique prodesse aliquando potest. Quo tempore etiam lauare citra noxam licet. Cauendum tamē à frigido solio ijs est, quando & crudi & putrescentes succi, minus apti sic ad exhalandum redduntur. Itaq; in progressu morbi, ubi & absumpta iam superuacua sunt, & tum cruda, tum putrescentia concocta, & cataplasmatibus relaxantibus, & balneis sine periculo utare. Porro aptissimū in febribus quæ intermittunt & repetunt, tempus est quum exhalare febrilis calor iam ceperit. Statim siquidem corpus ad nutrimentum præparant: huius quoq; opportuno tempore ex duplici coniectato respectu: nēpe summo præcedentis accessionis uigore, & futuræ principio. Ad hæc nāq; spectantes, operam dabimus, ut quā longisimē

gisimè ab utroq; nutriamus. Verum, si febris ipsa sit cōtinens; cōstat eam breuī finiciendā. Si igitur ultra septimū neūquā progressura videtur, prorsus continendus à cibo æger est, si uirtutem non defuturam cōiicimus. Sin ad nonum, aut undecimum, aut quārtumdecimum, usq; progressura uideatur, aut etiam finiciēda septimo, cæterum æger uires infirmiores habere, quā ut in tantum tempus sufficiat; necessum erit nutrire; ac deligere id, quod minus sit noxiū. Etenim ubi uel iecur, uel uentriculum phlegmone prehendit, perniciosissimum est ante accessionē cibare. Vbi hæc abest, quibus infirma est uirtus, utilissimum. Porro summuī uigorem febrilis accessionis expendes, an circa magnitudinē febrilis caloris sit siccus, squalensq;: an citra siccitatem urens. Priorem nanq; humectate uictu quāprimum madesacere oportet. In secundo, dum plurimum sese calor remittat, manere. In principij uerō accessionis more æstimabis, an corporis extrema refrigeret, & magnā sanguinis reuocationē ad interna corporis faciat; an omnino corpus nō premat. Quippe secundum hoc, ceu facile mansuetum, contemnes. In priore distinguas oportet. Nam si absq; uisceris phlegmone, aut succorum redundantia motus ad interiora in accessionibus pollet, nihil offendes paulo ante cibans. Sin uel phlegmone, uel redundantia subsit, cauenda est ante accessionem cibatō, ceu res maximè noxia.

GALENI PERGAMENI

DE FEBR. CURAND.

Liber V.

Symptomatum febribus incidentium dñia, et curatio. C. I. II

QUAE cum symptomatis consistunt febres, non sunt ad febriū genus ullum, aut species aut differentia distincta. Porro grauiorū symptomatum, & quæ rariūter febrientibus incidunt, primæ differentiz sunt tres. Aut. n. in lēsiōe actionū cōsistunt; aut in retentorū uacuatorum uē imodico excessu; aut in corporū ipsorū affectu. Ex quibus duz quidē differentie priores, si cōtristent, ad se totam curationem cōuertunt, affectumq; deserre cogunt. Tertia uerō, alterius quidē, quem curare oportet, affectus, est signum; nullam tamē seorsum curationem exigit: utpote cum affectu, unde nascitur, unā cessans. Nullum autē symptoma qua symptoma est, nec curationis rationem indicat, nec primū immutat; licet ex accidenti interdum id faciat; ubi scilicet causæ locum sortitur. Porro eorū omnium, ubi ueluti causæ curationem immutat, unū caput est, ipsa læsiō, siue uirtutis sit, siue dispositionis. Lædunt aut uires uigilia, dolor, atq; uacuatio immodica. Affectui uerō eadem, non utiq; semper, cæterum magna ex parte, nocent: ac potissimū quum fuerint immo-

dica. Qua de causa, quandoq; cogimur prius submouere symptoma, q̄ morbū, mutato uidelicet instituto. Ergo si labāt uires, non tñ uehementer sint resolute, sed adhuc resistūt, ad symptoma amsumus attentī, atq; id quāprimum tollere maramus. Sin iā resolute uehementer sint uires, non modo symptoma sedare, sed illas ē firmare cōtendimus. Vbi uerō uiriū roboris fiducia est, adeo nunquam contra symptoma pugnamus; ut (quod prorsus contrariū est) per ea nōnunquam presidia, quæ dolorē afferunt, morbos ipsos curemus; ueluti profectō dysenteriz ipsi mordebibus maximè medicamentis, tum potissimū medemur quum utiq; est grauissima. Est aut duplex medicis contra dolorē instandi ratio. Altera, qua delitijs cubantium subscribunt; altera, ex artis ratione. Quippe si licet agrū doloribus obnitentē ualentibus remedijs uno die persanari, qui tota curatione neglecta dolori tñ intentus est, non ex artis ratione, sed in gratiā egrotantis id facit. At si ex dolore uires soluuntur, atq; ex eo impēdet periculū, mitigari dolor, & roborari uires debent; quo & morbo resistere, & curationis spatio sufficere ualeant. Esto igit, terminus in egrotantibus, quē non transibit is, qui ex arte generose contra morbū pugnat, ut tutō medicetur. Et uerō qui dolorē mitigat, ut uires custodiat. Porro dolorē mitigant, quæ ex papaueris succo, uel alteri semine, uel radice mandragoræ, uel deniq; styrace cōstāt. Cæterū si fas sit, ijs remedijs quæ morbū sanent, utendo, qđ optamus efficere cauendum ab id genus soporiferis medicamentis est. Sin uerō ex uigilijs & uiribus resoluendis, eger ad mortis discrimen tendat, tñ profectō ipsis tēpestinē utare: nō ignarus. s. corporis habitū nonnihil ex eis lædendū; eligendā tñ potius lēsiōnē ipsam, q̄ mortem. Hac nimirū persuasiōe ipse quoq;, tametsi omnīū maximè ab usu grauiter sopientiū abhorrens (q̄ rebellē ualentemq; in corpore frigiditate relinquant) aliqñ tñ ea & colicis exhibeo, & ijs qui uel oculorū, uel aurīū, uel aliarū partiū uehementissimo dolore cruciātur. Interim uerō, & quum eger ex tenui destillatione, uigilijs, & uehementi tusli urgetur, pauillum eiusmodi medicamētū offero: facile noxā eius, si quis semel sit usus, spatio emendatū iri ratus. Oīa tñ id genus magis salubria sunt, si post annū à compositione sumant: ueluti quod ad Philonē refert. Quod ad dolores stupefaciendo sedādos, nullo minus est celebre. Id uerō ē si duorum, triumue, aut quatuor annorū sit, multo sanē fuerit prestantius; sed neq; inutile tñ sequētib; annis, ad decimū usq;. Ergo si curi canēdus est, quoad fieri pōt, eiusmodi medicamētōrū usus: ita si necessitas urgeat, nec admodū recētia sunt offerenda, q̄ frigida q̄ in his sunt, ualentēs uires adhuc habēat, nec ita antiqua, ut spē nostrā frustētur: sed tandī dimittenda sunt, quoad uolentia refrigerantiū ab eorū quæ calfaciunt

ciunt ut mitigetur. Et talium quidem medicamentorum usus, eorum qui aduersus symptoma pugnans, est proprius: potissimum ubi ex frigida causa dolor est excitatus. Obsunt .n. talia plurimum toti affectui, curatioq; cōtumacē eū reddūt.

At sanguinis missio, quæ scilicet vires nō deicit, symptoma spectantis medici opus non est, sed eius qui totum affectum adimere studet. Ad eundem modū & balneum, & purgatio, & fomēta calida, & vini potio. Quæ omnia, dum affectus sanant, vnā cum ipsis, etiam dolores sedant. Eodem modo & nutrimentū exhibitum, vbi sicco & squallente morbo os ventriculi afficitur, dum affectum ipsū sanat, hominem prehendi syncope prohibet.

Ventriculi os offensus in febris quo sit curandus. Cap. III

Porro qui ex copia crudorum humorum, vnā cum oris ventriculi offensione, febricitant, ij neque missionem sanguinis, neque purgationem tolerant: quum tamen uacuationem desiderant. Quare eis uacuatio per frictionem solum administratur. Ergo lintheis mediocriter aspersis statim in ipsis auspicijs morbi fricandi sunt, à cruribus superne deorsum. Debet enim radi ab his cutis, quum simul & cal fieri per eam, & digeri corpus postulet. Dein tota brachia, simili modo ab humeris superne deorsum. Vbi verò artus omnes abundē calere iam videbuntur, & metus fuerit ne quis ex multitudine frictionis, contusa iam carne, superueniat lassitudinis sensus, oleo relaxante uteris: quod genus est Sabinum. Ab astringente verò abstinere, cuiusmodi Hispani existit. Hyems verò si fuerit, nihilo deterius sit, si ad digerentium aliquod transferis, quale scyonium est, aut etiam chamæmelinum. Vbi igitur oleo membra ipsa abundē fricueris, oleum est detergendum, atq; ad spinam dorsū transeundum: quam totam pariter fricare, primum quidem sic a frictione: post oleo, expedit. Ab hac rursus ad erura te conferes: & ab his ad brachia: denuoque dein ad spinam: sic totum diem agens, in domo laeida, & temperata. Sanē mulla, in qua coctum hyssopum fuerit, his est aptissima. Qua sola primis tribus diebus utentur. Ipse verò eo tantum tempore dictam intermittere frictionem, quo somnus hominem occupauerit. Ad quem etiam alliciendum, & frictio vberior facit. Cæterum somnus vberior his minimē est salutaris: quum nec crudos succos digeri sinat: & viscera reddat gratiora. Sed si quis alius affectus est, qui somnum & vigilias modicas postulet, hic profecto in his est. Quippe somnus concoquit. Vigiliæ digerūt. Quorum utroq; est opus ijs qui ex multitudine crudorū succorum egrotant. Ac si pulsus his parvus admodū, infirmusq; sit, aut etiam supra hæc vehementer inæqualis, extremum periculum indicat: nec quicquam, præter iam dicta, molien-

dum est. Sin verò mediocriter sit robustus, nihil quæ intercibus uideatur, si sua quidē sponte alius cōmodē non deiciat, soluenda est, mulla iniecta. Quod si maior iusto superfluorū impetus ad aluū citetur, principio quidem percoquere mullam amplius oportet. Ea namq; sicut minus aluū subducit, ita magis nutrit. Post hæc, si superuacua largius descendant, ne sic quidem sistenda: sed exhibendus pro aqua mulla ptisanæ cremor est. Si uerò fluere pergat, alicæ sorbitione ægrum nutries. Si pulsus interim ad imbecillitatem, uel inæqualitatem, uel paruitatem mutentur, panem imburū diluto uino porrigere conuenit: utiq; si nec utrīculus, nec iecur laborēt phlegmone. Quādo si hac infestentur, corpore crudis succis referto, salus deplorata est, pulsibus sic immutatis. Minimē autem utendum cataplasmatibus aut perfusionibus est, prius q̃ superuacua magna ex parte partim uacuata sint, partim cōcocta. Interimq; sola mulla, in qua coctum hyssopū sit, usq; ad septimum diem utantur. Siquidem longissimam sic affecti cibi abstinentiam ferunt: corpore scilicet ex crudis ipsis, quos cōtinet, succis concoquendis alio. Verū si alius impense fluat, uel eger mullam fastidiat, ad ptisanæ cremorem est transeundum. Sin hunc quoq; auerfetur, alicā ad eundem quo ptisana modum ei præparabitur. Neq; enim eis qui sic sint affecti acutum incōmodum est. Immo sicubi crudos affatim succos esse animaduertis, oxymeli assidue pro mulla dabis: siquidem æstas sit, & æger frigide assuetus, frigidum: sin hyems autem, omnibus calidum. Maximē verò pulsus paruus, tardus, & rarus, frigidus subesse succos ostendit. Sanē propositis aduersissima sunt tum balneum, tum aer ambiens: quoties uel nimium calidus est, uel frigidus. Itaq; ut lauandi hi nō sunt, sic, & reclinandi in domo sunt: æstate quidem, quæ frigeat: hyeme, quæ caleat. Læduntur namq; non parum ab utroq; excessu. Atq; hæc quidem agenda sunt tibi, vbi à primo die curationem suscepseris. Si autē ad eos quos iam præmit syncope accitus fueris, si ea quæ retuli loca phlegmone uacent, panē exhibebis nō multū, eumq; ex uino aliquo, quod telerē in corpus digestionē adiunet: statimq; ad frictiones uenies, quas ut diximus ad ministrabis. Ac si quidē celi status sit uehementer calidus, cū frigida uinū dabis: cū calida aut mediocriter, si temperatus. Quæ tñ secundo & tertio dabitur potio, omnino calidā exhibendā curabis: ut quæ succorum crudorū concoctionē adiunet. At quibus ex flaua bili, quæ os ventriculi infestet, syncope incidit, ijs frigida exhibenda potio est.

Syncope laborantibus quale uinum sit exhibendum, ac uinorum genera quæ sint. Cap. IIII.

Vinum tñ quod & calidū natura sit, & deductionē in corpus promoueat, oibus quos syncope male habet, offerre cōuenit. Con-

stat autem ex vinis ea deligenda esse, quæ & flauo colore sint, & substantia tenui, & ætate vetera, Talia nimirum & boni odoris continuò fuerint, Quinetiam si paululù ubi mista sunt, gustes, senties calorem per totum corpus transmitti. Cæterum amara præ uetustate uina ne sunt, præsertim quæ ijs exhibebis, quibus stomachus flaua bile urgetur. Commodissima igitur his uina sunt, quæ quum naturaliter sint austera, sensilè iam astringendi vim, propter uetustatè nò amplius exhibent: calorè tñ admodù euidentè habent. Huius igitur generis uinorù optima sunt, Surétinù, Signinum, Sabinù, Tiburtinù, & Marsum: oïa quidè Italiica, astringetiãq; Quibus tamè ex crudis humoribus syncopes periculum imminet, sanè Falernù tãto iam memoratis præstat, quanto tum melioris est succi, tñ etiã calidius: utpote quod & uelocius illis digeretur per corpus: & crudis succis còcoquẽdis auxilio erit. In summa uerò, quibus ex abundantia crudorù humorù syncope incidit, ijs crassa uina, ceu noxia: aquosa, ceu parù efficacia, fugiẽda sunt. Deligenda autè eorù sunt media, quæq; flaua existant, & calida. Neq; enim inuenias ex albo uinorum genere calidum ullum: quando etiã austera, & mediocriter alba, quum inueterauerint, quodãmodo fuluiora redduntur. Quotquot autè in ipsis calidissima sunt, omnia profectò sunt flaua. Reliquorù uini generù, austera quæ medio-criter alba, crassaq; sunt, certè nullù ad digestionem in corpus est idoneum. Si tamen abundè in ueterarint, nec aliorum copia sit, uti illis licebit: quod stomachum roborent. Cæterum uina quæ calfaciunt immodicè, ijs offerenda non sunt, quibus caput est imbecillum, facileq; ab id genus uinis repletur. Porro uina quæ odora, fuluaq; sunt, quantum ex ipsorum est natura, omnia caput grauant. Eoq; tum Falernum, tum Tmolites, tñ Lesbù, infirmo capiti noxia sunt. At uina austera, uentriculum roborant, caputq; inter omnia uina minimè tentant: digestionem tamen in corpus nò promouent: quo magis fugiẽda tibi in syncope præhensis sunt, non secus quàm aqua. In penuria uerò uini quod còmodum utriq; syncope sit, ei inquam quæ ex multitudine crudi succi oritur, & ei quæ ex bile incidit, coactus uti uino, utris aquosis, magisq; si antiqua fuerint. Talia namque, tametsi non ualenter excalfaciant, facile tamen deducuntur in corpus. Quo nomine uinas præter cætera omnia promouent. A quibus secundum locum obtinent, quæcunque fuluorù maximè sunt tenuia: quæ etiam ad syncopas præcipuè sunt deligenda.

Synopsis & uirium lapsus quomodo cognoscatur & curetur. Cap. V.

Est autem syncope præceps uirium lapsus. Quum autem essentia uirium, quibus regitur corpus, tum in spiritu, tum in solidorù

corporum temperamento consistat, hæc nobis, & ubi integra sunt, seruari: & ubi corrupta sunt, ad integrù reuocari omnino debent. At uerò substantia spiritus, ipsaq; solida corpora, sic nobis sunt custodienda in morbis, ut tum qualitate, tum quantitate, quoad fieri licet, se naturaliter habeant. Curandù itaq; est, ut quæ substantiæ portio ab eis defluit, hanc per appositionem sarcinatus: quod in ipsis uerò alterascit, in debità temperiem per contrariam alterationè restituamus. Si igitur tum uacuatio, tñ alteratio sensim, paulatimq; fiant, etiam correctio utriusq; sensim administrabitur: quod munus ad artem sanitatis totè pertinet. Sin confertim & semel, ac magna aliquando uacuatio, uel etiam adiectio incidat, sic sanè & efficietur morbus, & medendi methodum ad eorum sanationem desiderabimus. Porro animalis spiritus, à cerebro, ueluti à fonte, nascitur. Qui partim ex inspirado, partim ex eo quod reticularis plexus suppeditat, irrigatur, aliturq;. At uitalis spiritus continetur in corde, & arterijs: nutriturq; tum ex aere inspirato, tñ ex sanguine haliuoso. Quod si naturalis quoq; aliquis spiritus sit, utiq; continebitur is in iecinore & uenis. Virium igitur lapsus, qui quidem solidorù corporum substantiæ resolutæ succedit, in longissimis morbis subinde incidit: animante ex frequenti atrophia extenuato; præterea in colliquantibus febribus. Qui uerò ex substantiæ temperie mutata prouenit, is, uel ubi immodicè ipsi fuerint calfacta, frigefacta, madefacta, uel exiccata, uel horum aliquibus copulatis affecta, prouenit. At alteratio spiritus, tum ex uitiosis oritur succis, tum ex ambientis aeris malitia: præterea uenentis facultatibus, aut animalium quæ uirus excitat, uenentis. Ipsi uerò essentia spiritus corruptio (quæ tñ ob animi affectus, cuiusmodi sunt timor subitus, uehemensq;, nec non mæror, iracundia, atq; summa uoluptas, tum ob ingentem dolorem: præterea ob plures motiones, uigiliãq;, obq; immodicam ipsius tenuitatem, & continentium eum uasorum raritudinem, atq; adèd ante hæc omnia, ob respiratù prohibitum, & nutrimenti defectum incidit) diligentius corrigi postulat. Sciendum autè est, in omnibus perturbatibus, ipsam per se ipsam moueri animam: quæ nimirum in alijs actiuis functionibus mouet etiam & ipsa corpus. Ob idq; resoluitur eius robur, utroq; motuum suorum generum, si modum excedant. Ergo nec rarefaciendum immodicè ægròtantis est corpus, si spiritum retineri in ipso studeas: sed nec quæ in eo sunt, per comesta & bibita ualenter extenuanda. Est etiam ad uirium robur tuendum, ciborum atq; potionum habenda ratio, ut sint tum quantitate modici, tum qualitate exquisiti. Aer præterea quem inspiramus, debet esse ut optime temperatus, sic ab omni corruptela & inquinamento alienissimus.

Curandum

Curandum similiter est, ut ipsa corpora solida, in quibus uel maxime consistere uirium substantia uideatur, sint sano temperamento. Quippe ad conseruandum uirtutis robur, & syncopalem accessiōem prohibenda, singulare præsidiū est temperamenti custodia. Ante omnia quidem, trium principiorum: mox uero reliquarum partium, quæcūq; in consortium affectus, principia secum ex facili trahunt. Cuiusmodi est os uentri culi, quod propter exquisitum sensum, accersit syncopas. At uero si humores crudi uires sua copia premant, ac propter multitudinem simul & crassitudinem exiguos animalis meatus obstruant, is affectus multis nominibus exitialis est, ac syncope opportunos reddit. Quippe succi crudi nutrire priusq; sint, cōcocti, nequeunt. Quod si nec obstruant, nec onerent, syncopem ij certē nō inferunt, sed deliquia animi. Siquidem resoluunt turgētes huiusmodi, nisi frequentius nutrantur. Sunt autem nutriendi hi extenuantibus, calfacientibusq; idq; nō copiose, nec semel. Medicamenta similiter sint extenuantia, calfacientiaq; sed moderatē. His & aquosum uinum idoneū ab initio est, nisi tamen uehementer febricitent. Et enim qui laborant ex huiusmodi succis, hos quotidie accessiones exercent, precipueq; ad uesperam, noctuq;.

Virium lapsus extenuissimis succis curatio. Cap. VII.

Qui uero extenuissimis succis urgetur syncope, diuersa à iam dictis ratione curandi sunt. Illos namq; paulatim & assidue uacemus. At qui sic se habent, hos paulatim & assidue nutriemus. Quod si uiribus imbecillis, aliquod his uiscus phlegmone obsessum sit, eorū salus est deplorata. Quando nec ipsos licet assidue nutrire, sed tantum in remissionibus: & seruari nō possunt, si nō nutrantur. Non solum autem extenuatis ad eum modum spiritu & sanguine solet sæpe uiris resolui, sed etiam facultate expultrice per uniuersam corporis molem immoderatus concitata: id quod accidere maxime solet, ob retentis imbecillitatē. Ergo nutrire, quicquid horū ineiderit, est necesse, sicuti etiā corporis summa densare: non secusq; priorum rarefacere. Frigidum itaq; ijs acere astringentemq; comparabimus. Vngendi præterea sunt attrictorijs vnguentis. Tū cibi ijs dandi, qui non admodū promptē diffuāt. Cuiusmodi sunt panis, sorbitio ex alica, fructus austeri, & qui non facile corrumpantur, ouorum uitelli (quando quidem albū ægrē concoquitur) gallinaceorū, qui lacte alti sint, testiculi, ac denique suillum cerebrum, diligenter assum, uel in alio iure legitime elixū, porro & anetho iniectis. In summa, omni ratione agendum, ut & succorū materiam crassiorem reddas, & eam densas, & exhalationem inhibeas. Vinum uero ipsis aquo-

sum, necessarium inter initia est, sumptum post cibos. Quod si ex sententia nobis omnia responderint, etiā carnei ijs aliquid nutrimenti post alia dabimus: potissimum post quartum diem: succis qui febrem excitauerunt, iam ad concoctionem uenientibus. In omnibus autem eiusmodi curationibus, si iam adsit syncope, omnis sollicitudo medietas ad symptoma uertetur. Sin expectetur, utriusque curā habebit, & ut symptoma nō incadat, & ut paulatim discutiat̃ morbus: quē celerius discutere mus, si nullus symptomatis subesset metus. Quippe qui multitudine crudi succi grauat̃, hunc si modō iustam semel uacuationē ferre posset, nec metus aliquis syncopes impederet, semel arbitror, uacuatū explicaremus à morbo. Eū uero, cuius spiritus & succi facile exhalant, si ante accessiōem cibare non cogeremur, longiorem illi morbum certē non redderemus.

Syncope quibus succedere causis; & doloribus causa quas sint. Cap. VII.

Sunt & aliz quinq; occasiones quibus succedunt syncopæ: nempe dolor uehemens, uigilantissimam uentris inanitiōem, motus in delirantibus: ac deniq; principiorum intemperantia, uel nuda, uel cum humorū affluxu. Si igitur causam ipsam unde excitatur dolor, adimere possis, ita utiq; contra symptoma non pugnaueris, sed curaueris ægritudinem. At si qua occasione prohibitus, affectui submouendo intentum esse non licet uehementiā mitigabis doloris. Dolent porro tantum particulæ sensibiles, idq; uel ob continuitatis diuortium, uel ob aliquam alterationem, non sensim, sed confertim & uolenter factam. Quippe uidentur corpora, non solum quā in non naturalem habitum confertim aguntur, t̃stem mutationem sentire, sed etiam in ipso ad naturalem statum suum reditu, nisi is sensim fiat, torqueri. ac ex alterantibus quidem dolore afficiunt, omnia uehementer calfacientia, atque refrigerantia. Ipsam autem solutionem continui, necesse est, uel ruptionem, uel contusionem, uel erosionem existere. At ruptio ex distentione quadam contusio ex grauante aliquo, erosio ex mordente prouenit qualitate. Ergo quum nihil extrinsecus sit, quod uel distendat, uel grauet, uel erodat, sed ex seipso horum aliquod corpus sentiat, neminem latere potest, distentionem ab aliqua intrinsecus substantia, quæ multitudine sua corpus se continens distendat, aut immodica siccitate, prouenire: contusionem, ex eo quod aliquod corpus occurrit extrinsecus, quod uel durum, uel magnū, uel graue, uel simul ambo exitit: erosionem uero, ex succo aliquo, cui mordens natura insit. Qui quidem si sit in tunicis intestinorū imbibitus, comodissime hic ra piera expurgatur. Quod si aliquam exulcera-

tionem pepererit, nutriendus certè æger est calente alica, sed iniectis mali punici granis. Potus autem illi offerendus est mali punici cremor.

Dysenteria curatio. Cap. VIII.

Porro si sanguinis abundantia sit quod distendit, protinus sanguis mittendus est: modò vires ægri non sint infirmæ. Sed si is vel sanguinis missionem timeat, uel viribus sit imbecillis, tum reuellendus in diuersum est sanguis: tum per propinqua deriuandus. Quod si his peractis dolor etiam persistat, patet profectò in ægrotante particula impactum esse: quod contristat. Patet verò non minus, & quod curatio ipsa per digesta medicamenta molienda sit. Similiter etià curantur dolores à flatulento spiritu orti: magis tamen ij extenuantia remedia desiderant. Si moles aliqua grauando, contundendo uel dolorem excitet, moli ipsi est medendum. Sin mordens humor, aduersissima huic sunt, quæ extenuant, & calfaciunt. Postulat nanq; huius generis affectus ut ea quæ contristant vacuentur, aut alterentur, aut medicamentis torporem inferentibus recondantur. Ea quippe minus hos affectus lædunt, quàm alios, qui à crassis glutinosisque humoribus proficiuntur. Huiusmodi tamen succos, dolor vehemens non comitatur, nisi aliquis eis halitus spiritus copuletur: qui ex ijs corporibus quibus continetur, erumpere prorsus non possit. Nā sic, grauissimi solent excitari dolores. Etenim quum tunicae intestinorum sint duplices, si in medio ipsarum spatio frigidus ac viscidus humor collectus sit, à calore liquatus, in flatulentum mutatur spiritum: qui crassus frigidusq; quū sit, acerbissimos dolores inducit. Ac ad tempus quidem, post bibitum medicamē stupefaciens, prorsus indolentes redduntur ægri: ceterum affectus ijs uarijs modis fit maior. Nam & intestinorum tunicae medicamentorum frigiditate densiores, minusq; flatui transmittendo habiles, redduntur: & humor ipse tum crassior, tum ad motum inepior euadit. Quare id genus dolores omnes, per ea quæ incidunt, & concoquant: præterea flatu discutiant, desiccantq; citra ualentem calfacitionem, curandi sunt. A nullo autem in eiusmodi succis tam est metuendum, quàm à calore qui & eos liquet, & in flatum vertat, sed non ualeat discutere: porro agrestis quidam, allio comesto, uinoque ad uesperam meraciori bibiro, à dolore colico fuit liberatus: neq; id iniuria. Allium siquidem flatum discutit, ac minimè sitim infert. Quam ob rem ipse allium theriacem agrestium appello: estq; commodissimum ijs omnibus, qui regionem frigidam incolunt. Quos igitur ex superaddita causa uehemens intestinorum dolor citra febrem exercet, ijs & alliu esse licet, & theriacem bibere. At si cum febre unà talis dolor aliqua

do incidat, principio quidem, si id ferunt, fomentum siccum ex milio adhibendum est. Si ab hoc non quiescant, semen aliquod, quod flatum dissipet, in oleo quod tenuium sit partium, coquere, mox per linteam, quo purum sit, oleum colare, dein anseris, aut gallinaceum seuum, nec salsum, nec admodum uetus, in ipso oleo liquare, & per sedē infundere, oportet. At si neq; ex hoc remittantur dolores, secundo rursus iniiciendū est idē, adiecta etiā castorei & papaueris succi, utriusque fabæ non amplius magnitudine. Olei uerò hemina modus esto. Excipitur & lanula ex hoc medicamento aliquid: quæ appensa forti filo, quam penitissimè in rectum intestinum inferi debet: quo utiq; & quum liber, id faciliè recipiatur, & euidentem utilitatem cōferat. Similiter & oculorum, & aurium dolores, qui ab iisdem causis in febre excitantur, sedare conueniet fomentum ex milio. Sed infundimus etiam auribus medicamentū id quod ex castoreo & papaueris succo cōficiatur, sapā liquatum. Quod sanè auri instillatum, oculorum etiam, ac dentium dolores lenit. Nam uerò, si cataplasma imponi aliquando res ipsa suadeat, papauerum capitibus in aqua coctis, ac fenigreci, uel hordei, uel lini seminis farina aque immissa, cataplasma conficies. Porro collyria ex opio confecta, uehementissimos oculorum dolores laxant: utendumq; his est, quum maxima necessitas urget. Nā tamen si imbecilliores ex frigiditate in reliquā uitam ipsas reddant particulas, occurrunt tamen præsentī discrimini: ac postea frigiditatem ab opio relictam, licet nobis corrigere, tum oleis calidis, tum etiam collyrijs. Nempe auribus oleum id quod solum castoreum recipit, instillamus: oculis uerò, ex cinnamomo collyrium. Qui à solo spiritu flatuoso cruciantur, illi co cucurbitula admota, tum à dolore liberi, tum omnino sani redduntur: in quacumq; corporis parte dolor sit excitatus. Quibus uerò non spiritus modò flatuosus, sed etiam humor quispiam, unde is oritur, uentris dolorem excitat, ijs illico ad ipsos dolor sedatur: reddit tñ uel in sequenti nocte, uel post tridie, uel et tercio die similis dolor. Quare in his primū doloris accessio est curanda: admota scilicet cucurbitula. Postea uacandus humor, infuso per sedem aliquo medicamento calfaciente simul & attenuante. Ego uerò oleo quopiam tenuis substantiæ uti assueui, tutam in eo præcoquens. Quo iniecto, nonnulli ægri paulo post excernunt humorem uitreum: atq; ex hoc protinus simul & à dolore, & ab affectu liberantur. Si dolor ex tenui acriq; excites humore, qui conuulsiones uehementes etiam inducere solet, si quidem in uentriculo talis humor consistat, uomitu expellendus est, aqua tepida propinata: sin autem in intestinis, iniicere per sedem oportet aliquod medicamentum, quod blandè eluere, de tergereq; eiusmodi humorem possit. Commodissimus

sumus itaq; ad id fuerit cremor ptisanæ. Cibi verò exhibendi his sunt, qui & boni sint succi, nec facile corrumpantur. Qui ob siccitatem vehementem distenduntur, & discruciantur, si curari ij de beant, humectatione desiderant. Ceterum si affectus is, sit febris occasione contractus, percuratu est difficilis, vel potius curationem non recipit. Quippe conuulsionem quæ ex plenitudine neruorum partium, vel ex humore mordente, vel denique ex ingenti frigore oriuntur, curari possunt. Quæ verò ex neruorum particularum ariditate proveniunt, nullus certe ijs ad sanitatem est locus.

F I N I S

G A L E N I P E R G A M E N I

DE FEBRIBVS. CVRANDIS. LIBER, I.

qui primus est in his, qui de arte curatiua ad Glauconem inscribuntur. Cap. I.



NON communem tantum omnium hominum naturam medicum cognoscere oportet, sed etiam vniuscuiusque propriam. Non tamen propriam singulorum naturam, æque atq; communem, possibile est scribere. Quum igitur ad recte medendum plurimum conferre temporis occasio, & quantitas auxiliorum, videatur, hæc autem propria in vnoquoque ægro se contemplanda obijciant, nec quicquam proprium possit sermone explicari: ob id nimirum quod commune est, scribere cogimur, quamuis id sit usu secundum. Etenim quantum quisque à naturali recessit habitu, ad tantam morbus magnitudinem peruenit. Distantiam verò recessus, facile deprehendet is, qui naturalem vniuscuiusque ægri statum exquisitè cognouerit. Quod quidem quum nobis non liceat, confugimus ad cõnes notiones: in quibus artifex plus aliquid, quam inertes, assequitur. Porro qui omnia quæ secundum naturam & præter naturam sunt, diuisione artificiosa cõplexus fuerit, atq; ab ijs omnibus, quæ sufficienter diuisa erunt, indicationes sumplerit, solus is, quantum humanis permittitur viribus, minimè errabit medendo. Atq; illos quidem quorum habebit notitiam, melius curabit, quam ceteros. Ignotos verò, proximè illis, quoad fieri poterit ad sanitatem perducet. Si quis enim primum distinxerit differentiam ætatum: postea eam quæ secundum temperaturas, potèntias, colores, calores, habitudines, pulsuum motus, assuetudines, industrias, animiq; mores habetur: atque his quoque adiunxerit maris, femineq; discrimen, expenderitq; regionum, temporum, atq; adeo ambientis aeris temperies, hic ad propriam laborantis naturam agnoscendam proximè accedet. Nunc verò de his solum ægrotis dicere proposuimus, quorum natura, ante quam morbum contra-

herent, nobis erat exquisitè perspecta. Cum quibus tamen & reliqui omnes intelligentur, qui nobis erant ignoti.

De febribus ephemeris. Cap. II.

Rimò igitur de ephemeris febribus, utpote simplicissimis disseramus: quæ nimirum ob lassitudinem, ebrietatem, iram, excandescenciam, merorem, atq; alias vehementes animi solitudines excitantur. Ex quarum genere sunt, quæ ab inguinum inflammationibus trahunt ortum, præter quam si absq; ulcere fiant manifestæ. Tunc siquidem & suspectæ sunt, minimeq; mites apparent. Vigiliæ plerumq; induxerunt simplicem febrem: sicuti frigefactio, & exustio quandoq;. Atque hæc omnes febres soluntur facillimè, in hunc modum: Oportet enim ipsos confestim ducere ad balnea: deinq; ad conuictam victus rationem. Nam qui triduanum terminum absq; cibo expectant, sæpius acriores febres efficiunt. Quum igitur ad ægrum accedes, primum à maximis quæ circa ipsum sunt, est consideratio inchoanda: deinde & ab alijs: adeo ut nec minimè quicquam omittas. Nam ut magis aut minus ei quæ sit ex maximis indicationi credamus, ex aliorum sit adiunctione. Maxima quidem in omnibus febribus signa in pulsibus, atque vrinis consistunt. His verò addere oportet, quæcunq; alia circa faciem scribit Hippocrates: accubitus quoque & respirationem: item ea quæ ab ore excernuntur, atque alui sedimina: & si quid aliud accidere circa aliquam corporis partem, aut operationem uideris. Quæ omnia cõia sunt omnibus febribus. Postquam itaq; ex pulsibus atq; vrinis febris naturam perceperis, quum pulsus nullum inflammationis signum habuerit, neq; omnino inæqualitas in aliqua arteriæ compulsionem se ostenderit, aut si hoc adfuerit, omnino sit imbecille: vrinæ autem, aut prorsus similes ijs quæ secundum naturam se habent; aut non multum à naturali statu recesserint: tunc sanè & ad omnia illa, quæ nuper à nobis exposita sunt, accedere oportet: & quum ueluti chorus quidam omnia concinnè loquuntur, tunc certe fidere oportet, ac, si libeat, interrogare, nunquid aliqua manifesta antecesserit causa. Siquid enim huiusmodi æger fateatur, expectata prima febris solutione, statim oportet lauare: quum tunc certior sit tibi facta cognitio, ex ipso solutionis modo. Nam arteriarum motus in hoc in totum assimilatur ei, qui in sanis deprehenditur: quum in nulla alia febre ad naturalem habitum reuertatur. Iam verò plurimis ephemerarum humidi quidam vapores, & quibusdam etiam sudores utiles cõspiciuntur, accessione cessante. Quo tempore etiam vrinæ multo meliores, quam circa febris initia, videbuntur: & si capitis aut alterius dolor, simul inuaserit, neq; hic amplius persistet.

perflitet. Aegrotantis quoq; , in tolerando facilis, magnū & ipsa signum, febris suauitatem tibi indicabit. Et si dum lauantur, nec horror aliquis insolitus molestauerit, nec alia tristitia adfuerit, post balneumq; & deinceps bene se habere perseueret, tunc ne uerearis offerre cibum, & vinum: adhibito tamen pro tempore modo. Communiter autē omnibus detentis ephamera, urinae ruffe excernuntur. Adiungitur verō his qui propter tristitiam febricitant, acritudo potius quā abū dantia caloris: quemadmodum ē diuerso ijs, qui propter furorem. Sed & extenuatio corporis in ijs quos tristitia aut cura vexarunt, conspectior existit: oculorum præterea cauitas, & quædam in consuetudine decoloratio. Hæc quidem sunt & ijs qui quouis modo aliter cogitarunt, communia. Maxime itaq; ex oculis distinguere oportet. Nā ex his etiam in sanis animæ mores coniscere possumus. At eos qui diu vigilarunt, arguit quædam palloris forma, faciesq; subtruncata, nec non ipse oculorū motus, quo vix palpebras, humore quodam imbutas, attollere possunt. At qui tristantur, aut cogitationibus detinentur, ijs exiccantur palpebræ. Cauitas est commune accidens omnibus, mœrori, vigilijs, cogitationibus, non tamen furori. In hoc enim, nec oculorum cauitas, nec manifestus pallor: & plus caloris atq; celerius ex imo prorumpit: nec pulsuum magnitudo destruitur, quemadmodum in vigilijs, tristitia, & cogitationibus. Eorum etiam qui ex lassitudine in febrem inciderunt, cutis est siccior, quā in aliqua alia ephamera. Quæ autem ex densata cute accidunt febres (densatur enim aut ex frigore, aut ex aliqua qualitate astringente) hæc quidem solæ inter omnes febres, passio astricta existunt: ac per solo tactu noscuntur: tum ob densitatem cutis, tum ob differentiam caloris, qui miris quidem in primo tactu sentitur, acris autem, si plussculum tardemus. Non tamen & his urinae sunt ruffæ: neq; moles corporis concidit: neq; oculi redduntur aut caui, aut aridi: sicuti nec pulsus minores, quemadmodum in mœroribus, curis, vigilijs, aut exercitijs immoderatis.

De febribus ex inflammationibus inguinum. Cap. III.

Febres quæ ex inguinum inflammatione fiunt, pulsus habeant maximos, ueloces, atq; frequentes: plurimusq; illis calor inest: ac post quā febris constitierit, statim ex profundo quædam emergit humiditas, calida quidō, sed miris. Atq; in totum facies rubicunda illis, & magis tumens, urinaq; subalbida. Communis autem omnibus huiusmodi febribus est pulsus æqualitas. Curare igitur omnes quidem oportet balneis. Cæterum qui ex cutis densitate, aut inguinis inflammatione febricitant, si in aere balnei immorari uideris, haudquaquam nocebis. Reliquos om-

nes quā citissime oportet ab aere semouere. Si uerō diutius in aqua immorari voluerint, permittere. Oleo autem multo, & tepido, & manibus mollioribus perfricare quamplurimum, sed eos præferim, qui ex labore febricitant. Secundo autem loco, qui mœtus habent astrictos: at tertio, qui inguinum patiuntur inflammationem: quos nimirum sæpius lauare expedir. Cibum autem concoctum facilem assumere qui ex labore febricitant, possunt multoties: non æquē tamen, qui ex densitate cutis, aut inguinis inflammatione laborant: quorum etiam utriusq; tenuis uictus est uilis. Sed & uinum potare quantum possunt conuincere, sunt permittendi, quibus labor febris occasio exitit. Mensuræ autem ratio, ex uisibus & ætate sumitur ægrotantis: nec non ex naturali temperie, consuetudine, anni tempore, & regione, alijsque id genus. Qui uerō ex inguinum inflammatione febricitant, arcendi sunt a uini potu, donec inflammationes soluantur. At, qui cutis foramina habent astricta, aut refrigerati sunt, si quidem non multum hoc affectu laborent, nec plenum corpus habeant, non sunt a uini potu prohibendi. Qui autē supra modū refrigerati sunt, aut plenior corpore, prohibere utile est. Rursus, qui ex uigilijs, aut aliquo animi affectu februnt, postquam balneaueris, cibo humido ac boni succi reficere oportet: uinum uerō omnibus ijs qui uigiliam passi sunt, intrepidē offerre, nisi capitis dolore premantur, aut pulsuum uenarum in temporibus sentiant. Sed & ijs qui ex ira aut mœrore aliquo, aut cogitatione febricitant, uinū est exhibendum: sicuti & illis, qui furore perciti fuerunt, quando omnino perturbatio fuerit refrigerata, nam prius sanē usus uini erit periculosus. Tentare autem oportet semper adferre contrarium ei quod infestat: labori quidem, quietem: uigilijs somnū, iræ, furori, & tristitia, sermonibus, actionibus, spectaculis, enarrationibus, animi iucunditatem. Sic qui ex cogitatione laborat, omnino rationationes omittat. Et qui ex inguinum inflammatione febricitat, eius curationi intendat: ac multo prius uiceris, unde originem habuit. Atq; hæcenus de ephemerarum indicijs, remedijsq; Reliquæ uerō febres, nonnullæ ex inflammationibus: nonnullæ ex humoribus accenduntur. Et quæ ex inflammationibus fiunt, sunt ueluti symptomata quædam partium inflammatarū.

De febribus putridis. Cap. IIII.

At quæ ex humorum putredine accenduntur febres, ex & dicuntur putridæ, & sunt non morborū symptomata, sed ipsa morbi. Et his uerō nonnullæ quidem absq; accidentibus accidunt, & mitissimæ sunt: nonnullæ itē, cum accidentibus urgent. Earum igitur, quæ accidentibus carent, paucæ quidem ad exactam sunt cogni-

cognitionem, diem quartum desiderant.

De signis febrium intermittentium. Cap. V.

QUæ igitur cum rigore inuadunt, non ab re ex earum esse numero iudicabis; quæ per circuitus infestant. Tertianæ enim atque quartanæ, in totum cum rigore accessiones faciunt. Sed tertianæ quidem in primo insultu cum nimio sæpe rigore incipiunt: quartanam autem non vidimus cum vehementi rigore incipientem, sed procedente tempore magnitudo ei superuenit, præter id, quod nec statim ab initio hæc febris ut plurimum solet inuadere, sed alijs quæ antecesserint, subsequi. Quartana itaque solet errabundis febribus superuenire. Quotidiana verò raro accedit absque læsione oris ventriculi. Rursus quartana ex male affecto splene gignitur, ut tertiana ex affectu iecinoris. Quæ verò cum valido rigore incipit, magis febris tertiana, quam aliquæ aliarum febrium fore speratur. Quod si reliqua etiam signa attestentur, hanc dubio procul in prima statim die tertianam esse cognoscēs. Etenim calor multus & acris adesse debet: pulsus autem magni, calidi, vehementes, veloces, atque frequentes, omnisque inæqualitatis, præterquam febrilis, expertes. Rigor porro, veluti si à realiqua acuta, plus quam frigida, corpus perungeretur: quum ij qui quartanam aut quotidianam intermittentem patiuntur, potius frigidum rigorem percipiant. Tempus autem anni æstiuum: sicut & locus, & præsens status calidus. Sit autem & ægotantis natura calidior, & biliosior, & ætas adolescentis: & exercitationes potius quam otiositas antecesserint: magisque deustio, quam frigefactio, & parcitas cibi, potius quam crapula. Vigiliæ quoque, mœrores, atque labores, & intensæ cogitationes, ad eundem affectum perducunt. Quod si multos alios eodem tempore laborantes contigerit tertianis corripi febribus, hoc quoque maximè aliquid, præter ea quæ nuper diximus, signum erit. Si igitur hæc omnia adfuerint indicia, aut saltem quæ maxima sunt, & sitis quoque, vehemens adiungatur, vomitusque, bilis, aut sudor, uel utraque, superuenerint, tunc nulla dubitatio relinquitur. Quod si inter hæc à febris quieuerit homo, hæc inquam quæ ex suo motu est omnibus nota, propria uerò febrium inæqualitas, in arteriarum motu relinquatur, tunc firmiter poteris esse tertianam febrem ostendere, ac si tertio iam die accessione fecisse vidisses.

De signis quartanæ. Cap. VI.

Dum rigent qui quartana tenentur, pulsus habent satis tardos & raros. Quum autem consistit febris, atque etiam augetur, necesse quidem est, ut veloces fiant, atque frequentes.

Seruat tamen & tunc propria ipsius tarditas, raritasque, si additam uelocitatem atque frequentiam in accessionibus mediteris. Iam quæ omnibus communis est febribus, in uno pulsu inæqualitatem, in hac manifestissimè licet comprehendere. Multo namque uelocius principium, finemque motus inuenies, quam medium. Præterea æstus, & deustio nem, & quendam ueluti feruorem, qualis in tertianis uidetur in quartanis haudquaquam inuenies. Sed & egrotantis natura inspiciunda est, an atra in ea bilis abundet: & tempus quoque anni, an sit autumnus: & præsens status, an inæqualis. Sic uerò & loci natura, & morborum peruagantium, uulgariter, & an licet intumuerit, febrisque, antecesserit inordinata, & ætas senior quam consistentium: & an cum sudore febres desinant. In his uerò bilis, flauæ uomitus minimè expectandus est: quemadmodum nec in quotidianis intermittentibus. Hoc etenim tertianarum est proprium signum. At quæ febris cessauerit, si adhuc uestigium febris remanserit, pulsusque, ijs, qui secundum naturam, rariiores atque tardiores fuerint, quartana proculdubio erit huiusmodi febris.

De signis quotidiana intermittens. Cap. VII.

QUotidianæ intermittens calorem humidiores cum quadam acrimonia esse oportet: non quum primum manus admouetur, occurrentem, sed per moram. Nam quædam fumosa caliditas cum multo uapore commixta perspirare uidebitur. Sed & his longe minores sunt pulsus pulsibus quartanarum, quam istarum pulsus pulsibus tertianarum. Rursus uerò tanto rariiores sunt in quotidianis intermittentibus pulsus, his qui in tertianis, quanto illis pulsus quartanarum. Attarditas in utrisque eodem modo se habet. Minus uerò fistulosa hæc febris est: tantumque eam quartana excedit, quantum istam tertiana. Humidissimum etiam totum corpus in his febribus est, & uomitus pituitosi. Quæcumque autem excernuntur per uentrem, frigidiora, humidiora, crudiora, & pituitosiora existunt. Et quidem ætatibus, naturis, anni, statibus & temperaturis humidioribus hæc febres accidunt. Nā adolescentem biliosa & sicca temperatura, nunquam uidi quotidiana corripit febre. Pueri autem, præsertim minores natu, & ex adultis pituitosi, & habitudinis crassa, atque otio plurimè dediti, nec non crapulis, ebrietatibus, balneis asiduis, post cibum præsertim, utentes, facile à quotidianis capiuntur. Loca etiam humidiora, atque ex anni temporibus hybernū, ex statibusque humidiores, hæc præcipue conciliant febre. Quod si popularitèr etiam grassetur, hoc quoque non parum ad eam dignoscendam conducet. Non tamen harum febrium declinationes, quemadmodum tertianarum & quartanarum, sudoribus terminantur. Quare ne

que ad integram quietem, exceptis paucis, perueniunt. Quotidianarum urinz sunt albæ, & tenues, vel crassæ & turbulentæ, vel rubicundæ. Tertianarum rufæ, vel subrufæ. Quartanarum variaz quidem, sed crudæ omnes.

De signis febrium continuarum. Cap. VIII.

Febres autē continuas hinc cognoscēs, quod nullum eis adest signum ex ijs quæ adesse intermittētibz diximus: & quod intra quatuor & viginti horas non cessent. Si verò inæquale incrementum habuerint, hoc quidem, præter alia signa, longius etiam tempus ostendit: nec non si proprium febrium signum in pulsibus manifestum adsit. Quod si inordinatio etiam ac inæqualitas ipsis vel inconcinnitas insit, & hoc etiam indicium simul magnitudinis atq; continuitatis. Si verò in hoc statu permanentes, tertio die maiorem accessionem ostenderint, aut excrementa & urinz omnino crudæ apparuerint, non possunt huiusmodi febres ante septimū diem terminari. Ad hæc si quarta dies tertiæ diei similis fuerit, & febris veluti deurens, nec facies, aut reliquum corpus collabatur quicquā, huiusmodi febris ad longius extendi tempus consuevit. Ac tales quidem sunt differentiz earum febrium, quæ accidentibus carent. Curatio autem cuiusq; earum deinceps scribetur: primū tamen intermittētiū; dein continuarum. Ex intermittētibz igitur breuissima mitissimaq; est tertiana. Longissima autem, & quantum in ipsa est, handquāquam periculosa, quartana. Quotidiana verò, & longa, & non sine periculo. Porro vbi morbi existunt acuti, celeriterq; ad statum perueniunt, & si ualde tenuem victum exhibeas, non multum lædes. Vbi verò sunt diuturniores, nisi ab initio cibo vberiore reficias, hominem simul cum morbo perimes: aut intempestiue victus modum commutabis. Neq; enim oportet statu accedente offere largiorem cibum quā prius: sed contrā, potius tenuissimum victum, qui in toto morbo exhibeatur, in statum reseruare. Distinguendum autem est, nūm exquisita, an minimè exquisita sit febris. Etenim exquisita tertiana, ad maximū, septem circuitibus iudicatur: estq; minimè periculosa. Alteram verò non exquisitam, quandoq; vidi, quū in autumno incepisset, in uere desuisse. Quantum autem hæc natura inter se differunt, tantum rationabile est & rationem victus mutare. Ergo si quæ in principio sermonis tertianarū febriu indicia scripsimus, oīa adfuerint, exquisita reddunt tertianam. Cuius accessionis tēpus breue, quatuor, aut quinq; aut sex: at longissimum, undecim aut duodecim horas complectitur. Atque huiusmodi febrium urinz, tertio die, aut ad summum quarto, coctionis signum ostendunt. Quibus sanè indicijs exquisitam, a non exquisita

tertiana distingues. Eadem quoq; ratione exquisitam quartanam & quotidianam. Cui enim omnia insunt indicia, quæ in quartanis febribz antea descripsimus, hæc uera & exquisita est quartana. Cui uerò minimè, spuria & non exquisita existit. Quotidiana etiā cui omnia quæ diximus insunt, exquisita est: quæ autem eam naturam nō habet, spuria. Non igitur quæadmodum exquisita quotidianæ & quartanæ, sic etiā nō exquisitæ sunt longæ. Nam quemadmodum exquisita tertiana est breuis, sic & quotidiana & quartana diuturnæ. Cæterū non licet nobis bene prænoscere, nisi quantitatem morbi atq; uirium accurate expendamus. Etenim si uires adeo ualidæ fuerint, ut morbum uincere possint, necesse est ægrotum euadere. Sin verò contrā, omnino morietur.

De cura exquisita tertiana. Cap. IX.

Exquisitam ergo tertianam, ut quæ ex flaua bile commota inuale scat, quammaximè fieri potest, refrigerare, atq; humectare oportet. Nam contrariorum contraria remedia sunt: quæ quidem quod superfluum est, reprimant: quod uerò deficit, suppleant. At flauæ bilis humor, omnium qui in corpore sunt, aridissimus, calidissimusq; existit. Hunc igitur, quum ad uentriculum repit, per uomitum educere oportet. Quum uerò uergit ad inferiora, eodē modo per aluum id quod fieri solet sponte, in exquisitis tertianis. Per urinam quoq; & sudores oportet ipsum uacuari. Ac uenter quidē, mollibus clysteribus inanitus est: urina uerò, potionibus, in quibus apium, aut anethum maduerit, prouocanda. Quod si tibi coctionis signa monstrentur, iam cum fiducia aliquid absynthij exhibebis: quod alioqui summum est remedium, ubi infestauerit bilis, si præsertim ex ipsius coma, quantum sit satis, accipiens, mellicratō intinxeris. Balnea uerò calida, ex aqua potabili profunt: tum quia aliquid bilis educunt, tum quia sua qualitate & humectant, & potentiā refrigerant. At marinæ aquæ salæ, nitrosæ, & sulphureæ, plus quidem bilis educunt, sed magis sua qualitate nocent, quā euacuationibus iuuent. Semper autem oportet contrarias qualitates, illis quæ inualuerint præter naturam, opponere: quum hoc multo plus iuuet, quā quomodolibet euacuare. Hic itaq; in balneis scopus sit, ut corpus madeat, utq; humectetur. Vbi igitur plurimum olei calidi infuderis, ad aquam perdere, ac madefacere oportet. Quod si in ea natare uoluerint, quantum id facere possunt, permittendum. At qui balneis admodum delectantur, si etiam bis in die lauari permiseris, non aberrabis. Sed illud semper habeto in memoria, ut intempestiue id faciant. Si uerò etiam coctionis signa ostendantur, si sæpius laueris, nihil deliqueris. A uino autem, ante quā morbus coquatur, pro-

ius est abstinendum. Verum ubi concoqui is coeperit, dandum est ab initio tenue, aquaticum, ac que paucum. Vbi verò iam prope est, ut morbus solvatur, amplius est offerendum. Cibi autem quicumq; humectant, atq; refrigerant, omnes utiles sunt exquisitis tertianis. Ceterum quantitas in ipsis sit tanta, ut bene concoqui possint. Exoleribus quidem atriplex, blitum, lappathum, malua, lactuca, & cucurbita. Ex alijs verò, prisanz succus, sorbitio ex alica, ex piscibusq; saxatiles. Ex uolatilibus deniq; ea, quæ mollibus constant carnibus. Quæ autem talia non sunt, eorum alæ, testiculi quoq; gallorum, & suum pedes, & cerebrâ. Paruum uerò si etiam dederis carnes assas, nihil nocabis. Sed & oua ad sorbendum sunt offerenda: & præsertim vitelli eorum: nam his facilius quàm pars alba coquuntur. Ex fructibus autem illos tantum degustet, qui non sunt omnino difficiles coctu. Oportet abstinere à melle, sinapi, salitis & acris omnibus: sicuti & à vinis satis uetustis & calidis.

De cura tertiane nothæ.

Cap. X.

IN ijs verò quæ non adeo exquisitæ sunt, prouidendum est, ne morbus augeatur: neue aggrauantis vires corrumpant, quæ laborare longiori tempore debet. Quare operæpretium est scire, ad quantum magnitudinem morbus ipse sit perueniturus: & quantæ sint ipsius agri vires: ut ad ea inspiciens quæ maius auxilium postulant, inedia quidem, in ualentioribus utatis uiribus, & morbo concoctu difficili: largiori autem cibo, ubi vires sunt infirmiores, nec morbus admodum ad concoctionem contumax. Iam uerò in tertianis non exquisitis, nec statim circa initia balneare expedit: sed quum primum coctionis signa apparuerint. Nec cibum quotidie offerre expedit, sed alternis diebus. Quies uerò, & calfactio circa præcordia iuuant, & sorbitiones quæ concoquuntur facili: & clysteria non admodum mollia. Quod si sanguinem mittere oporteat, neq; hoc quoq; omittendum est. Sed ab initio statim, tantum sanguinis detrahendum est, quantum præsens status exigit. Sic autem totius victus ratio, non quæ humectet, atq; refrigeret uniuersum corpus: sed quæ aliquem modum etiam assumat, ad calfaciendum, inieciendumq;. Plurimum igitur eos iuuat prisanz succus pipere adiecto. Ad hæc hyssopum, uel origanum, uel spicam nardi mulla infundes, & decoquens, ad bibendum propina, & quæcunq; alia prouocantia urinam, exceptis illis, quæ præter modum calfaciunt, exiccantq;. Maxime uerò post diem septimam danda eis ingitet est ablynthi coma. Et quidem oxymel porione plurimos iuuat: & aliquid ex ijs quæ molliter ventrem subducunt. Vomitus etiam post cibum, adeo his quibus hæc febris perdurauerit, utilis est, ut mul-

tos sciam solis uomitibus statim fuisse curatos.

De cura quartanarum.

Cap. XI.

Quartanas ab initio mediocriter, ac leniter tractare oportet, nullum forte medicamentum, aut euacuationem exhibentes: nisi forte sanguis vehemèter superabundans appareat. Ceterum si uena incisa, is qui fluit, niger & crassus uideatur (qualis in ijs præcipue uisitur, qui lienelaborat) audacius mittendus est. At si flauus, aut tenuis cernatur, subito supprimendus. Venâ uerò secare oportet, uel anteriorem, uel mediam, quæ est in sinistro cubito. Victum deinceps institue re sine flatibus, ac optimum: uentremq; emolli-re, ijs quæ usitata sunt, expedit. Quod si hæc nihil proficiant clysteribus utendum est, à principio quidem mollibus: postmodum uerò acrioribus. Arcendi sunt autem à suilis carnibus, ab omnibusq; edulijs, quæ tenacia sunt, & tardum habet exitum, quæq; tum refrigerant, tum siccant corpus. Vino uerò utendum est albo, tenui, & medio-criter calido, & uolatilibus quæ boni sunt succi, nec in paludibus degunt. Pisces sunt adhibendi, qui facile concoquantur, ac molles carnibus, nihil quæ tenax habentes. Utendum est autem falsamentis, & sinapi: ac certis diebus medicamentum diatrion pepereon, uel diosporiticum est assumendum. Quod si quotidie piper tantum cum aqua biberent, recte etiam facerent. A frictionibus autem, ambulationibus, atq; balneis, non sunt penitus prohibendi. Quanquam si omnino possent à balneo abstinere, solis contenti frictionibus, inde plurimum iuuarentur. Iam si quartana ipsa sit breuis, nec admodum uiolenta, nihil nocuerit, si diebus interiectis ad consueta exercitia se transferant. Hæc igitur ab initio, & usq; ad statum sunt peragenda. In statu autem subtilior uictus ratio adhibenda est, quàm ante, uel post. Statim uerò æger continendus in quiete est: ac uisceribus prouidendum ungentis & cataplasmatibus, quæ molli-re & laxare possint. Deinde medicamentis utendum, quæ ciendi urinam uim habeant. Vbi uerò coctionis signa apparuerint, tunc sanè purgare oportet ijs quæ humores atros inaniant, non semel tantum, sed sæpius, si uideatur necesse. Utendum autem & uomitibus statim à cibo: & si nihil prohibuerit, ellæborum album est exhibendum: primò quidem, permistum radiculis: quod si nihil profecerit, ipsum per se. Ceterum qui nequeunt euomere, ij uehemèti per inferiora purgentur: ac postmodum offeratur eis in potu, medicamentum confectum ex uiperis: necnon quod succum cyrenaicum recipit. Quicumq; uerò ab initio aliquid ex hisce medicamentis exhibuerunt, aut omnino ante statum, quartanam quæ erat simplex, duplicem reddiderunt, aut omnino maiorem, atq; difficiliorem: ex duplici autem triplicem, aut

omnino

omnino ambas difficiliiores.

De cura quotidiana.

Cap. XII.

Quotidianam autem quam volueris cura re, oxymelite vitæ post primos dies: & illis quæ probè possunt urinam ciere: vni versumq; totius victus caput sit ad incidendum efficacius. Circa statum verò, de ventriculo est habenda sollicitudo, ac de ipsius oris præsertim. Deinceps iubendum est, ut post radículas & cibos assumptos vomant. His etiam quæ pituitam subducunt, utendum.

De cura febrium continuarum, quæ carent accidentibus. Cap. XIII.

In continuis autem febribus, quibus non ultra septimum futurus status est, si vires validæ sint, & ætas consentiat, admodum exquisitus & tenuis victus est instituendus. In quibus verò uel status totius morbi longius abest à septimo, vel vires robustæ non fuerint, uberiori cibo ægri sunt reficiendi: quemadmodum propè statum tenuiori. Quum autem iam adest status, tenuissimum victum seruare oportet: deinde rursus semper uberiorem. Sanguinem verò mittere oportet, & ob morbi magnitudinem. Quibus autem rubor multo intensior, quam pro naturæ ordine, & maior, quam pro consuetudine, totius corporis moles, venæque erantes, extensæque fuerint, ijs etiam est auferendus, nisi vires, aut ætas, aut aliquid comæmoratorum, prohiberit. Quod uerò huiusmodi victus in febribus acutis omnibus iuuat, rectè iam dictum est. Cre morem igitur pituitæ, ijs quibus non accessit, exhibere oportet: & mellisratum quibus non bile scit: & sorbitiones ex alica: & panem ex aqua. Porro in febribus præter modum calidis, videnti busq; quum primû cõtionis signa appauerint, tunc audacter aquam frigidâ propinabis. Modus uerò in quantitate seruatur, quæ admodum tempus anni, regio, ætas, natura, consuetudoq; exigunt.

De curatione febrium cum accidentibus. Cap. XIII.

Quæ febres cum accidentibus videntur, non æquè simplicem exigunt curationem. Sed pro viribus metiendû est, quanta sit ipsa febris, quantumq; ex accidentibus immineat periculum: atq; ad id quod uehementius fuerit, & difficilius, intendendum: non posthabita omnino etiam alterius cura. Etenim ubi simul cû ipsa febre sentitur circa os ventriculi anxietas, morbus, & imbecillitas, prius sanè uacuandî humores non sunt, quam os ipsum ventris corroboretur: etiam si eruditæ aut cacochymia æger ipse laboret. Sed nec si fuerit febris cum ventris profluui-

alia est opus euacuatione. Verum hæc sola sufficit, quantum non sit pro ratione ipsius plenitudinis. Iam uerò si quis simul & distentione nervorum laborauerit, & sanguinis egerit missione, neq; huic tantum semel mittere oportet, quantum exigit morbus, sed aliquid etiam accidentis est linquendû, cuius causa sæpe sudores eueniunt, & uigiliæ molestant, & vires ægroti debilitantur. Ita etiam si uehementes uigiliæ, aut dolor intensus ægrotum cruciant, cauendæ sunt subitæ euacuationes, ac multæ. Ipsa præterea ambiens aeris temperies, loco accidentis cuiusdam habenda est, dum exquisitè calidæ & sicca fuerit, qualis est tempore medio inter canis & arcturi ortum. Si etiam ualde frigida fuerit, tunc quoq; sanguinem mittere formidandum. Ob hæc etiam neque in locis admodum calidis, aut frigidis, sanguinem mittere audemus. Quod si regioni temporis status cõsentiat, etiã omnino abstinemus: si uerò non consentiat, euacuamus quidem, sed multo minus, q̃ si neutrum prohiberet. Tolerantia etiam ægri, seu quoddam accidens, expendenda uenit: nec secus ipsa temperatura. Nam quicumq; calidi & sicci natura sunt, hi omnes faciliè ab integris euacuationibus offenduntur. Consuetudo quoque non parui momenti est, quum ad omnia alia, tum præcipuè ad euacuationis indicationem. Quidam enim nunquam prius fuerè uacuat, & multis cibis sunt usi. Nonnulli contra, nec multis cibis sunt usi, & euacuationibus assueuerunt. Hos igitur intrepide euacuare oportet, si reliqua etiam consentiant: alios uerò, ne si reliqua omnia id suaserint. Eodem pariter modo & corporis habitus considerandus. Nam qui densa & solida carne constant, non offenduntur faciliè. Quare non oportet uereri ipsos uacuare ex toto, si quidem & alia id iubent. At qui mollem, & renellâ, & disfluentem carnem sortiuntur, ij mirum in modum sunt ad patiendum habiles. Quare uel si reliqua omnia sanguinem esse mittendum suadeant, non tamen id facere audendum est, sed uotandum alijs euacuationibus moderatè. Eodem modo & in ijs qui supra modum crassi aut macilentissimi sunt, ab incidenda uena super sedendum, cæterasq; integras euacuationes uereri oportet. His etiam & ætas annumeranda est, uelut quoddam symptoma, quod prohibendi integram uacuacionem uim habet. Neq; enim pueri, neq; seniores hanc sine noxa tolerant. Hosce igitur omnes, si dispositiones hortentur, non semel nec ex toto, sed paulatim oportet uacuare, inedijs moderatis, frictionibus, clysteribus mollibus, perfusionibus, atq; balneis. Quod si duo contraria symptomata, aut morbi, coeant, aduersus id quod magis urgeat instandum: nec interim alterum negligendum. Eas uerò quæ habentur ex accidentibus & morbis indicationes, non simpliciter, sed secundum causam à qua singula sunt, considerare oportet.

quæ duo nomina de unica re dicuntur, cuius plures existunt, causa. Siquidem non solum per varios affectus corporis, sed etiam in vehementissimis perturbationibus animi, nonnulli exoluti fuerunt: præcipueq; senes, & natura imbecilli. Et enim plures corû tristati, aut lætati, aut irati animo defecerunt. Qui autem magis robusto sunt corpore, ex immodicis euacuationibus idem patiuntur. Iam verò si abscessus quispiam rumpatur, vires vehementer lædit, ac tum præcipue, quum materia simul tota ad ventriculum, vel ipsius os, aut thoracem deflexerit. Quod si quando etiam nos abscessus secantes, totum simul emittere pus uoluerimus, animi defectum subsequi est necessarium. Nec verò laborantibus aqua inter cutem, tota simul humiditas (quis ea præter naturam sit) potest sine noxa uacuari: sed tunc quoq; necessum est, hominem deficere animo. Ex dolorum etiam vehementia, similiter dissolutiones accidunt. Quinetiam nervus percussus, & muscoli caput, & maligna in articulis ulcera, & immoderata quædam frigiditas, aut caliditas, vitalisq; roboris exolutio, præterea insignis cruditas, obstructioq;, aut inflammatio alicuius præcipue partis, aut os ventriculi male affectum, aut improbe euacuationes, aut deniq; alia multa, de quibus postea dicemus, inferre possunt defectum animi. Quarum sanè causarum singulæ propriam curationem desiderant. Porro eos, qui ex choleris, & alui profluuiis, & alijs tum largè, tum uno impetu factis euacuationibus dissoluantur, frigida spargere oportet, & nares comprehendere, & os ventriculi perfricare, iubereq; ut uomant, stomachum irritando digito vel penne immisione, ac deniq; alligare pedes & manus. Oportet autem ne xus fieri, plures quidem, ac fortiores, circa manus, quando per inferiorem partem fiunt euacuationes. Nam si uacuatio per superiora fiat plures ac vehementiores ligaturæ cruribus admodum sunt. Situm quoq; aliquæ parti fluxionem patienti expedit inuenire, in aduersum tendentem, sed moderatè. Nam si nimium tendatur, atq; ex hoc fatigetur, nihilo minus irritatur, quàm si inclinaret ad eundem. In uniuersum autem, aut ad cõia mēbris patientibus in aduersum trahere oportet: aut ad ea in quibus est fluxionis origo. Atq; ideo vehementes euacuationes quæ ex matricibus fiunt, cucurbitulæ iuxta mammas appositæ, statim sedant. Quæ uerò ex naribus, hepatis, ac spleni secundum naturam patientis. Quod si ex ambabus naribus simul plurimus sanguis effluat, utriq; uisceri applicandæ sunt. Vinum etiam aqua frigida temperatum, curat eas, quæ ex magnis sunt euacuationibus, dissolutiones: ac tunc præsertim, quum humores fluunt ad ventriculum. Cæterum si aliquod uiscus sit inflammatus, aut caput doleat vehementius, aut aliqua alienatio animi affuerit, aut febris ardens in morbo crudo: magna & penè insanabilia ex potu uini, huiuscemodi affectibus nocumenta proueniunt. Iam uerò, qui frigidum potare

nō sunt assueti, aut manifestè ex ipso læduntur, quæque natura sunt frigidiores, & qui in extrema sunt senectute, & loco degunt natura frigidiori, & tpe hybernò, cauere à potione frigida debent. At qui contrario modo se habent, ijs intrepidè illam offerre licet. Sit autem uinum, in fluxionibus quæ ad uentriculum fiunt, calidum simul & tenue, quale Lesbium. in sanguinis uerò fluxibus, crassum, & nigrum, & acerbum. Ipsi autem locis imponere oportet, ueluti uentriculo, matrici, stomacho, & thoraci, quæ corroborandi uim habent: capiti autem & fronti, præter hæc illa et quæ refrigerent. Et quibus uel in superficie, uel in naribus, uena aliqua disrupa est, medicamen aliquod, ex ijs sanguinem suppressere possunt, est imponendum. Porro balneæ in fluxionibus ad uentriculum quidem apertissimæ sunt: ac sanguinis fluxum acriter irritant. Et quicumq; ob sudoris copiam animi defectum patiuntur, his etiam plurimum nocent: ut quas potius astringere oporteat, atq; refrigerare. His etiam uinum frigidum exhibendum est: ac nihil omnino calidum. Sed nec etiam artus ipsorum ligare oportet, neq; cogere ad uomitum, neq; ullo modo mouere. At uentis refrigerantibus aditum preparare: aerem quoq; domus alterare frigida & acida qualitate, myrtorum frondibus, & uitium capreolis, ac rosas pauimentum consternentes. Nihil uerò horum confert, ubi fluxiones ad uentriculum fiunt. At qui exoluantur ob plenitudinem, eorum artus plurimum perfricare oportet, calfacere, ac deligare. A uino uerò & cibis sunt abstinendi, & à balneis, si febriant. Sufficit autem, si eis dederimus mellicrati potum, in quo ebullierit thymus, uel origanum, uel pulegium, uel hyssopus. Cõuenit quoq; oxymel. Quæ ex matrice laborant, atq; exoluantur, non aliter sunt curandæ, excepto oxymelite. Fricare autem ac deligare magis earum crura oportet, quàm manus. At quibus uterus aut sursum, aut ad latus reuellitur, inguinibus & coxis cucurbitulas applicamus: & naribus quidem, ea quæ foetidissimum habent odorem: matricibus autem odorata, & ea quæ laxare, calfacereq; possunt, medicamenta offere mus. Si uerò ob imbecillitatem uentriculi, animi sequatur deliquium, ea quæ roborandi uim habent oportet emplastra adhibere, quale est quod fit ex palmulis, uino, farina hordei, croco, aloe, & mastiche. Madefacere autem ijs quæ constant ex absinthio, oleo melino, & mastichino: necnon nardo, uino, & cenanthe. Quod si exurantur, miscere ex refrigerantibus aliquid conuenit, ueluti cucurbitulæ, lactucæ, portulacæ, solani, intybi, atque uinæ acerbæ succum. Aqua etiam frigida plurimum uiuat male affectos stomacho, si tempestiue, hoc est in declinatione, exhibeatur. Alioquin plurimum obest. Atq; his qui os uentriculi imbecillum habent, uinum calidum exhibere oportet, si nihil prohibeat. Plurimum uerò uiuat eos qui sic laborant, et frictio extremorum. Quod

si ex ijs remedijs nihil melius se habuerint, eos quidem qui adusti sunt, quamprimū ad balnea ducere oportet. Qui verò aliquid frigoris sentiunt, medicamen diatrion pepereon, ipsumq; piper solum, atq; etiam absynthium bibant. At qui exitiosis humoribus os ventriculi mordicantibus exoluuntur, hos post aqua calida, aut hydrolei potum, fac vomere. Vacuatis humoribus, partem lesam oportet modis omnibus roborare: partim ijs quæ admoventur extrinsecus: partim absynthij potione. Cæterum si humores adhuc in uentre consistant, minimè sanè astringere, sed tantum eoncalfacere oportet. Vbi verò multa pituita in ore ventriculi acervata fuerit, fovere quidem plurimum oleo, in quo ebullierit absynthium: postea mellieratum exhibere; in quo hyssopum, uel quid simile infasum fuerit: item oxymeli; & piper, & diatrion pepereon, & diospoliticon medicamen. Victus ratio in summa, incidendi uim habeat. Quæ uerò ex nimia frigiditate eueniunt exolutiones, eodem modo curandæ sunt, quo bulimi, omnimodo calefacientibus. Vinum igitur eis exhibere oportet, calida temperatum: ac cibos qui calfaciendi naturam habent: fricareq; & calfacere ad ignem simul. Quæ ex calore nimio accidunt deliquia animi, ijs quæ refrigerandi & roborandi uim habent, curantur. Statim igitur ipsos corroborabis, si aqua frigida sparseris, & flabellaueris; & os ventriculi perfricaueris, & agitaueris, uinoq; & cibo refeceris. At qui ob inflammationis magnitudinē, aut uehemētis febris malignitatem, animi defectū patiuntur, & in principijs accessionum refrigerantur, ijs artus fricare fortiter, & calfacere, cruraq; ac manus alligare, & uigilias, cibiq; & potus omnimodam abstinentiam præcipere oportet. Optimum uerò in his quid futurum sit, præcognoscere. Eos etiam qui ex siccitate in principijs accessionum, defectum animi sunt incursuri, optimum est præuidere. Nam si duabus aut tribus horis ante accessionē exhibito cibo, concoctu facili, manus ac pedes constringi insieris, non interibunt. Quod si magnum imminere periculū suspicatus fueris, uinū in alicam elixam infusum, dare anticipabis: aut panem quoq; ex alica. At si medioeris expectatur defectus animi, parcendum est uino: sed sufficit tunc mala punica, aut pira, cibis ipsis miscere. Ijs qui præter expectationem in periculum inciderunt, uinum calidum, & panis est exhibendus: parumq; aliquid cum eo alicæ calidæ. Qui ob præcipui membri obstructionem linquuntur animo, ijs oxymel dare oportet, atq; ex hyssopo, origano, pulegio, & melle potum: cibosq; incidenti naturam habentes. Sed nec deterius fuerit artus perfricare, deligareq;. Prodest etiam hîc potibus uti, qui urinam ciendi uim habent: ueluti qui anethum, fœniculum, apium, petroselinum, ammi, daucum, & spicam nardi recipiunt. Quæ

ubi manifestè iuuerint, iam uino albo, & tenui, nec admodum antiquo, est utendum. Fiunt uerò & in huiusmodi dispositionibus, quum uehementes fuerint, pulsus inæquales, intercidentisque. Qui ex abscessus disruptione, aut sectione exoluuntur, aut ex superflua aquæ inter cutim inanitione, ijs quidem confestim optimis odoribus sunt fouendi. Paulo autem post, sorbitionibus concoctu facilibus, sunt reficiendi. Si uerò ob tristitiam, aut gaudium, aut timorem, aut irā, aut terrorem exolui uideantur, odoribus, & narium apprehensionibus reuocandi sunt, cogendi quæ ad uomitum. Eodem pariter modo, qui ex uulneribus, aut purgationibus, aut doloribus qui in articulis, neruis, & musculorum chordis eueniunt, exoluuntur, reuocandi statim ab eo affectu sunt: postmodū uerò, conueniens passioni cura afferenda. Defectus animi qui ex intestini laxioris doloribus, aut ilei, aut similibus cruciatibus fiunt, ex patientiū locorum calefactione, frictioneque extremorum curantur. At, quæ ex propria imbecillitate uirium, quæ regunt corpus, eueniunt exolutiones, ex intemperie uidelicet oritur, partium à quibus uires profisciscuntur, contrarijs intemperaturis curandæ sunt. Virtus ergo uitalis, quæ ex corde nascitur, ex pulsū imbecillitate cognoscitur. At quæ ex hepate oritur, & naturalis dicitur, ex sanguineis egestionibus, ab initio aquosis atq; tenuibus: postmodum uerò crassis, admodum facis. Quæ ex cerebro originem ducit, quam animalem appellant, ex motuum uoluntariorum imbecillitateprehenditur.

De cura capitis à uarijs occasionibus lesi. Cap. XV.

Igitur symptomatum causæ, congruam curationem ostendunt. Veluti si quis doleat caput, simulq; fastidiat cibos, ex fameq; sentiat mordicationem, iubendus est, ut euomat: nā uel bilem uomet, uel pituitam; uel utrunq;. Porro qui cum grauitate dolores capitis fiunt, multitudinem indicant. Qui autem cum mordicatione, uaporis humorisue acritudinem. Cum pulsu uerò, inflammationem. At cum tensione, si quidem sine grauitate ac pulsu, spiritus flatulenti & crudi multitudinem. Si uero cum pulsu, inflammationē corporis membranosi. At si adsit grauitas, multitudo intra membranas contenta significatur. Quū igitur omnia distinxeris, causam ex qua horum singula fiunt, considerare oportebit. Veluti si multitudo uaporis atque humoris contineatur, aduertere oportet, nunquid ob multitudinem februm humores diffusi, ac ueluti effluuantes, ad caput ascenderint: aut propter eius partis imbecillitatē: aut ob totius corporis plenitudinē. Hanc enim totius corporis euacuationibus haud difficulter curabis. Eam uerò quæ ex partis imbecillitate contingit, partim quidem in contrarium trahendo per totum corpus: partim

partim ipsi capiti remedia adhibendo. Atq; in cō-
 trarium quidem trahēs, clysteribus acerbis, hexi-
 bus, frictionibus plurimis infernarum partium,
 & si expediat, sanguinis aliquantula detractio-
 ne. Partem autē sanabis eo tempore quo ad uniuersum
 corpus retrahis, ijs vtens asperginibus, quæ
 à capite uim repellendi habent: ac dein euacuati-
 ribus: postremò deniq; corroborantibus. Repel-
 lit autem oleum quod immaturum dicitur, ac
 tum oxyrhodinū, tum rosaceum, & quæcunq;
 ex capitibus papaueris, & teneris oliuæ germi-
 nibus, & hederæ corymbis, menthaq; uiridi, & si-
 fymbrio fiunt. Utendum verò ipsis, in multitu-
 dine crudiori & frigidiori, tepidis: in calidiori
 autem & biliosiori, frigidis. Euacuat etiam, dis-
 soluitq; oleum calidum, ipsum per sese: & magis
 si antiquum fuerit, & sycionium, aut anethum fer-
 uesfactum in ipso fuerit. Quod si spondylium, vel
 serpillum, uel pulegij comam, vel calaminthæ,
 vel menthæ, vel sisymbrij, intus decoxeris, ita
 etiam crassiores succos uacuaueris. Hæc uerò ip-
 sa, uirium etiam aliquid membro imbecillo adij-
 ciunt. Quod si etiam ex usu videatur, per nares at-
 que palatum expurgatio molienda est, sternuta-
 mentumq; excitandum. Si ad balnea hominem
 duxeris, ficcis sindonibus caput est perfrican-
 dum, salq; & nitrum, & synapi, sine oleo impo-
 nendum. Hæ itaq; sunt ex particulæ imbecillita-
 te, doloris capitis medicinæ. At quando ex ma-
 gnitudine febris accidit, & medicamenta adhibe-
 re conuenit, frigida qualitates ac vires, & quæ ex
 hydrelego & oxyrhodino, & papaueris capitulis
 perfusiones constant, expediunt. In dolore au-
 tem capitis, qui sanguinis fluxum, aut vomitum
 decretorium significat, remedia inuestiganda nō
 sunt: quum non accidens, sed talis dolor bō-
 num existat signum. Siquidem ubi natura excre-
 tionem aliquam, ac præcipuè vomitum, aut san-
 guinis per nares fluxum molitur, horum infepa-
 rabile indicium est capitis dolor. Considerandæ
 igitur ad cognoscendam crism, primū quidem
 sunt febrium species, an calida sint, atq; vrentes:
 nam hæc per excretionem iudicari consueuerunt:
 quæadmodum quæ moliores sunt, ac veluti fumi-
 gantes, diu durant, & sæpius in abscessus conten-
 dunt. Secundo loco, an morbus sit salutaris. Nam
 quis obsecro bonam crism in morbo pernicio-
 so expectauerit? Tertiò ad hæc totius morbi tem-
 pus considerandū. Nam si principij vel augmenti
 adsit signum, minimè autem status, nec conco-
 ctionis signa in urinis, vel sputis, vel alui excre-

mentis cernantur, non est quoddam bonam spes cri-
 sim. Porro difficilis tolerantia antecedere om-
 nem crism solet. Quæ quidem si in die accidat,
 crisis sequetur noctu. Si autē noctu, in die. Si igitur
 tale aliquid uideas cōsiderandum est, quotus
 sit ægritudinis dies. Etenim septimus dies, etiam
 ex paruo naturæ apparatu, ad crism per excretio-
 nem mouetur. Sextus uerò, magno apparatu in-
 diget: & sæpe neq; ulla in eo fit crism, nec sine
 periculo, nec fideliter accidit. Ergo si dolor ca-
 pitis statim ab initio non inuasit, sicuti quoddam
 ipsius morbi symptoma, sed in ipsa ante crism
 perturbatione: dein si collum etiam aliquid con-
 dolescat, & præcordia retracta sint, aut repente
 superuenerit difficilis respiratio, pulsusq; in tu-
 morem subito elati, non reciderint in paruitatē,
 neq; debiles fuerint, statim crism per sanguinis
 fluxum è naribus, expectanda est. Si uerò non
 modò non deciderint, sed etiam in altum attol-
 lantur, & uehementiam assumpserint, faciē iā
 ægrotantis inspicere oportet. Nam si quod in ea
 membrum palpitet, aut uenæ quæ sunt in tem-
 poribus pulsant, aut malum, uel nasus, uel oculus
 rubidior sit factus, magis etiam talis crism est ex-
 pectanda. Quod si etiam inuiti illachryment, uel
 imaginentur se splendorēs cernere, ac nares ip-
 sas scalpant, tunc non iam fluxurum, sed iam fluē-
 tem conspicias sanguinem. Nec uerò ex his per-
 terrearis, si hominem desipientem, aut resiliē-
 tem uideris. Nam & hæc humorum repentium
 ad partes supernas indicia sunt. Præterea si ægro-
 tus sit adolescens, aut alioqui natura calidus, aut
 multo sanguine abundans, magis adhuc de hoc
 sperandum erit. Quod si sæpius etiam antea illi
 sanguis è naribus fluere est uisus, hoc uel solum
 sufficit fluxus sanguinis spem confirmare. Si ue-
 rò & tempus anni æstas sit, uel calidus cœli sta-
 tus, & si plures eo tempore crism ex sanguinis
 fluxu habuerint, ægriq; corpus plenum extiterit,
 & consuetæ excretionēs retentæ, hæc inquam
 omnia spem uehementius augebunt. Has itaq; &
 alias excretionēs omnes prænoscere licet, si hæc
 duo tantū explorauerimus, & unde naturæ mo-
 tus agatur, & in quam partem. Siquidem quæ de
 se iunt adiuuabimus, & quæ immoderatè ferun-
 tur, coercebimus, si ista nouerimus. Veluti con-
 festim sanguinis fluxus ex splene magnæ cucurbi-
 tæ sinistris præcordijs superpositæ, faciliè retra-
 hunt. At qui ab hepate proficiscitur, dextris, Qui
 ab alijs membris, eadem ratione.

Interprete Ioanne Guinterio.

De Febribus diarijs dignoscendis curandisq; Cap. I.

DIARIAS febres, urinarū in primo die coctio calorisq; suauitas ceu proprias ipsarum & inseparabiles notę testantur. Verum à prima febrium solutione, certiores habiturus es earū cognitio nem. Quippe arteria-

rum in hac motus ei qui in secunda ualetudine fuit, ex toto respondet, cum nulla ex alijs febribus in naturalem statum reuertatur. iam vero q̃ facile morbum fert æger, maximum & id indicium est. Opportuni sunt, id genus febribus, in quorum corpore quod transpirat, halituosum non est, sed mordax & acre fumo fuliginis non ab simile. Hi autem sunt calidi & sicci temperamento breuiter biliosi, quos *πικροχολές* Græci uocat, qui igitur ob lassitudinem febricitarunt, pinguius si mul ac molliter fricandi sunt, in balneumq; ducendi. Quibus siccitas febrem intulit, fricandi hi quidem minus, sed lauandi sunt liberalius. Quos curæ, mœrores, vigilæ, & ira exercuerunt: lauare quidem non subinde oportet, uerum oleo copiosiore tepido, cui minima astringens uis insit, tum paululum fricare, tum ex consuetudine lauare cōuenit. Ab insolatu uisti, protinus ab initio refrigerationem desiderant, tum crebriore lauatiōem: minime uero aut oleum largum, aut crebram fricātionem. Sint autem quæ refrigeret & rosaceum & omphacinum, quod nihil in se salis habeat: ea dē uero sincipiti uehementer superfundere oportet: & ubi febris inclinauerit, in balneum æger ducendus est. Siquis ex frigoris iniuriā febrem concipit, etiam is in remissione lauandus est. At si cū grauedine & destillatione febricitat, priusquam hæ concoquantur, lauatiōi non committetur. Porro qui æstus iniurijs patuerūt, ij, vel cum hæ ad sunt, commode lauantur. Post lauacrum uero caput perfundendum est: eorum quidē qui ex uisione febricitarunt, refrigerantibus: qui autem ex frigore, calefacientibus mediocriter, cuiusmodi irinum est, & nardinum unguētum. Verum in quibus meatuum constipatio febrem excitat, his conuenit ex aqua dulci, & temperata lauatio, tum frictio, quæ rarefaciat, & exercitationes modicæ, uisq; dulcibus procreandis succis idoneus. At cui propter inedia febres cōtracta fuerit, ei opus est

statim, ubi prima accessio remiserit, in balneum perducere, & tepente oleo largissime perfundi, tum molli manu perfricari, lente in calidi solij aqua immorari. Simul atq; exierit, ac sese recollegerit, denique balneum ingredi, postea aquam calidam potare, mox ptisanæ cremorem, deinde lactucam assumere, & aliquid piscium eorum qui molli sunt carne, ex albo iure. Omnium uero communis esto uictus species, quæ, & boni sit succi, & concoctu facilis, & quæ nusquam exiguis cutis meatibus inhæreat. Vinum propinetur & æstu, & uiribus aquosum. Oportet autem in primo febrium insultu nonnunquam primæ accessiōis horum aliqua mutare, in quibus corporis intemperies ad calidius, sicciusque transiens, febres accendit. Qui ex inguinum inflammatione febrem conceperunt, ne medicum quidem interrogant quid sit faciendum, sed ulceri, quod in inguinibus, excitatum est, prospicientes, lauant, ubi accessio declinauerit. Cæterum à uino ipsi sunt arcendi, priusquam inflammationes inguinū fuerint solutæ, & tenuiore uictu enutriendi.

De putridarum febrium agnitione. Cap. II.

PUTRIDÆ febres dignoscuntur his notis: nulla ipsas exterior causa præcedit: neq; à rigore incipiunt, neq; æstu, neq; frigore uehementi: quod & ipsum est peculiare febrium putridarum indicium, sicut & pulsuum depressio. Nominat sic, cum incipiente accessione perexiguos quidē ipsos & inæquales obtinent: ut qui singulariter illiusmodi febribus sint peculiare. iam & caloris qualitas maxima putridarū febrium nota est, qui fuliginosus adeo existit, ut manum erodat. Similiter ad ipsas proprie spectat etiam urinarum cruditas, & obscura coctio. Magnum uero & notabile concoctionis indicium, in primis urinis nunquam eiusmodi febres representant.

Curatio febrium putridarum. Cap. III.

SI uires sint ualidæ ei qui ex putredine febricitat, sanguinē dimittes protinus, modo eruditās uentriculum non infestat. At si uires imbecillæ, aut ætas prohibeat, sanguinem non detrahes, à cuius uacuatione putrida per urinas aluum & sudores expurgare conuenit. Sin autem sponte sua nonnunquā impetum ad os uentriculi capeffiant, etiam per uomitum: alioqui non oportet

et ea præter naturam irritare: verū deligi materiæ debent, quæ sine calefaciendo siccandoq; ualenter, prædictas uacuationes moliri possunt, ueluti psisanæ cremor, aqua mulsa, oxymeli, & apomeli, apijq; radix in aqua potabili incocta. Cum alius nihil deijcit, ex aqua mulsa cum oleo clystere ducenda est. uerum totum corpus rarefacere prius non expedit, q̄ uacuatum fuerit: ubi uacuaueris, rarefacias utique licet, oleo tepido calido, quale est, quod ex chamæmelo conficitur. in hoc tempore uinum aquosum potui datum, uinuerfas promouet uacuationes: cuiusdem facultatis est temperatum dulcis aqua lauacrum. Quod si uero febris magnitudo obstiterit, neque uino utendum, neque lauacro, neque unctionibus rarefaciendi uirtute prædis, sed aqua frigida his in febribus commode bibitur, nisi quid & hanc prohibeat. Ergo si quidem & uires robustæ omnes fuerint, & febris ardentissima, & concoctionis signa plane euidencia, frigidam cum fiducia exhibebis. Præterea si bona corporis habitudine sit eger, tum status cœli calidus ac ficcus, etiam si in frigidam natationem hunc dimittas, haudquaquam lædetur: si autem mediocris existat febris, & uires inualidæ, sed cum notis concoctionis, ijs qui ita se habent balneum prodest, & uini potio. Tū uero ex unctionibus ea quæ rarefaciunt.

De tertianarum agnitione. Cap. IIII.

Tertiana febris cum sit flauæ bilis commotæ soboles, proutinus ab initio rigore, hoc est totius corporis concussionem haud exigam infert. hoc discrimine à quartanæ rigore uariat, quod pungere uideatur & cutem conuulnere. In quartanis autem, accessionis insultus uehementem perfrictionem habet. Quotidianas nequaquam rigor præcedit: sed membra solum perfrigescent. Ceterum tertiana etiam exactum pulsuū ordinem obtinet. siti uero uehementi in statu affligit, & hominem perurit, ac paulo post consistit, calorq; æquabiliter per omnes corporis partes diffunditur, nihiloq; magis pectus quam extrema calent. Et si manum iniicis, primo quidem cōtactu, calor copiosus & acris occurrit, ueluti cū uapore quodam erumpens, sed paulo post à manu remanente uincitur. Vbi potione æger fuerit recreatus, statim copia uaporis calidi per cutem emergit, sudorem nuntia. Bilis uomitio superuenit, aut aluus soluitur, perque urinæ biliosa redditur. præterea ad integritatem tertiana desinit, ubi accessionis tempus, horarum non plurium duodecim expedit. Febrē igitur quæ intra duodecim horas terminatur, exactam tertianam nominamus: quæ uero diuturniorem accessionem habuerit, illam simplici uocabulo tertianam nuncupamus. quæcunque aut longissime productam accessionem seruauerit, exi-

guum uero interuallum, hanc rursus extensam tertianam dicimus.

Curatio tertiana.

Cap. V.

Exquisitam tertianam, ut quam flaua bilis præcreet, humectare oportet ac refrigerare, & sane quod in uentriculū confluit, uomitionibus, quod ad inferiora uergit, alui deiectionibus, elicere. Item per urinas & sudores uacuare id ipsum conuenit. Aluus itaque mollibus clysterijs euocatur: urina porionibus, in quibus apij & anethum maduerunt. simulatq; coctionis signa deprehenderis, magna iam confidentia etiam absinthium dederis. Balnea uero ex aqua calida potulenta conueniunt: quibus neq; nitrum, neque sal, neque sinapi adijci, sed oleo quāmaxime calido infuso ægrum oportet in aquam descendere: At qui balneis admodū gaudent, eos etiam si bis die laueris, haud peccabis. Vbi uero cōcoctionis notas perceperis, tunc, uel si sæpius laueris, nihil offendes. Porro uinum priusquā morbus concoquatur, ex toto circuncidendum est. simulatq; cōcoqui inceperit, tenue, aquosum modicū, primo die exhibendum. Cibi humectantes, refrigerantes quæ utiliter assumuntur. A melle abstinendū, sinapi, salis & acris omnibus. uinis autem admodum uetustis, & natura calidis. Ceterū nihil miri est, si in hominibus primum exercitis, in ediamq; expertis, tunc autem ordine cōuerso oriosis cibo quæ uis pleniorē, bilis maxima ex parte mixta pituita reperiatur. Cuius rei gratia complures tertianæ, aut citra totius corporis concussionem funt, aut per exigua ipsis oboritur, unde etiā animaduersionem propriam desiderant. Neq; enim balneum, neque cibus aliquis liberalior tertianis spurjis ante concoctionem conuenit: quoniam ne panis quidem micæ, ouæ, & consimilia.

Curatio tertiana notha Cap. VI.

Lauare in tertianis spurjis per initia salubre non est, sed quādo iam cōcoctionis notæ apparent: neque cibum quotidie exhibere, sed alternis diebus abunde est. Quies autē, & præcordiorum fōtus ipsis conducit, tum sorbitiones concoctu faciles, & clysteres aluo inditi non admodū molles. Atq; si sanguinem detrahère opus est, neque hoc amittere oportet. Tota uero uictus ratio erit, nō quæ refrigeret uniuersum corpus, humectetq; uerum etiam modus aliquis qui magis incidat, ac calefaciat, adhibeatur. Maxime uero conduxerit ipsis psisanæ cremor pipere iniectio, uel hyssopum quoque nonnunquam, uel origanum, uel spica nardi, aquæ mulsæ admixta, incocta; potui exhibetur, & alia, quæ urinæ eiciendæ sunt, præterquam ea, quæ uehementer calefaciunt, exiccantq;. Maxime uero absinthij coma

post septimum diem continue porrigitur. Iam & oxymel epotum, multis fuit auxilio. ad hæc nonnulla ex his quæ molliter uentrē subducunt. Porro uomitus secundum cibum, ijs quibus hæc febris in uetustatem incidit, utilissimus est.

Quartanarum cognitio. Cap. VII.

Quartana inuadit multa cū perfrictione, ut quæ ex frigido humore, atra bile originem trahat. Calorem uero feruoremq; febrilem tertianæ modo non obtrinet, imo nec bilis uomitus eam comitatur. Adhæc si urinæ tenues, albæ, & dilutæ fuerint, quartana erit febris. Eximia uero ipsius nota est, pulsus exiguus, & rarus. Cæterum in autumno potissimum incipit erraticis superueniens febribus, ac nonnunquam in forma eius potissimum subsistit quæ quarto die reuertitur: aliquando etiam plurium dierum intervallo, iuxta quosdā circuitus accessionē habet,

Curatio quartanarum Cap. VIII.

Quartana laborantes leniter tractandi sunt, neq; medicamento ullo forti sollicitandi, neq; uacuatione, nisi forte sanguis uehementer exuperare uideatur, cum uenam disseccare conuenit. Victus eis offeretur optimus, qui non inflet, & uenter his quibus uti consuevit, emolli ri debet. Quod si hæc nihil proficiant, clysteribus per initia mollibus, deinde acribus utendum est. A suilla carne prohibeantur ægri, atq; ab omnibus cibis qui glutinosi, ad exitum tardi sunt, tum qui refrigerant corpus humectantq;. Vinum uile est tenue, album & modice calidum. Item salsa & sinapi ex usu sunt, tum triduo assumptum medicamentum diatrion pipereon, id est, quod triplici constat pipere, uel quod diospoliticon appellant. Iam & piper solum recte ex aqua quoti die sumitur. In morbi statu uictus egro tenuissimus præcipietur, statim uero etiam ut diu conquiescat, inungendum est, tum uisceribus prospiciendum per ea quæ emolliunt, relaxantq;. Insecutis diebus medicamenta conferunt, quæ urinam cient. atq; si cōcoctionis notæ apparuerint, cum fiducia tunc quoque ijs uti expedit, quæ atros humores uacuant, idq; non semel duntaxat, uerum etiam sæpius. Porro secundum ualidam purgationem, & medicamentum quod uiperis constat, exhibetur, & alia quæ ad eiusmodi febres commendantur, inter quæ est & nobis familiarē, omnium probatissimum, quod succum cyrenaicum recipit.

Quotidiana agnitio. Cap. IX.

Quotidiana huiusmodi cum rigore primo statim die inuadit, sed temporis spa-

tio perfrictio magis quam rigor oritur. Aegre uero incalescit, & diuturnum habet incrementum, non tamen adurit ægros, neq; multum, & crebro spirare compellit, ac ueluti flammam ex ore elidere, uel frigidam bibere. pituitosi autem uomitus hic accidunt, & quæ aluum uacuantur, frigidiora, crudiora, dilutiora, & pituitosiora cernuntur: totū corpus crudis humoribus redundat; sudores minime primis diebus erumpunt, neque ad integritatem uenitur, cutis ægrotantibus albi cat, urinæ uel tenues sunt & exalbida, uel crassa, turbida & rubra.

Curatio quotidiana. Cap. X.

Quotidianam curantes, oxymelite primis diebus utimur, tum ijs quæ urinam probe eliciunt, ac uniuersa victus species incoforia esto, circa statum uero uentris habenda est ratio, præsertim ipsius orificij, deinde ægris inbendum est, ut à radícula, & cibis assumptis uoluant. Itidem utantur ijs quæ pituitam subducunt, idque tam diu, quam febris cessauerit.

De hepialo febris et rigore, quæ nullo calore possunt euinci. Cap. XI.

Si uitrea pituita, quæ omnium aliarum frigidissima est, nondum putrefacta toto in corpore exundauerit inexpugnabiles, & qui nullo euinci calore possunt, rigores sine febre excitant. In febribus enim quæ humoris uitio accenduntur, putrefactio maxime febrilem calorem suscitatur. At si toto hæc pituita putruerit, quod tamen raro fit ob immensam putrefactionem quotidianæ febris causa redditur. Quando uero non tota æqualiter, sed ex dimidio ipsius putrida fuerit, aut aliqua ipsius partes, nonnullæ uero non putruerint. Hepialum febrem hanc facit: in qua simul & rigor & febris caliditas est. Particulæ quidem humoris eius necdum putredinem expertæ, omnibus uenis, uel etiam reliquo corpori cōmunicatæ & sparsæ rigore creant: putrefactæ uero febrem accendunt. Dicta est autem Hepialos per translationem à sale: dico autem mari, quod à principio tranquillum apparet, cum turbatur difficillimum euadit. Vel ab Hepios, quod est molliter & alacrin, quod signat calefacere, quasi dracas. quoniam blande & leniter calefacit. Atq; hæc febris cum ex quotidianarum genere existat, uelut ex pituita nascens: illarū curationi subiicitur specialis, nisi quod tanto commemorata quotidiana calidioribus magisq; incidentibus præsidij indiget, quanto etiam pituita frigidior illa existat. Hepiali uero rigor multo magis calefacientia requirit, Itaque medicamentū ex triplici confectum pipere: ex calaminthe, præterea & quod liquore cyrenaico constat, his sunt accom-

moda. Item ex castoreo, similibusq; preparata remedia conueniunt. Latius autem diffusiusq; explicatam curationem horum reperies in capite 45. de perfrictione. Insuper Lypyriæ & Tiphodes quæq; præter commemoratas febres dicuntur, cum sint ex relatarum numero, etiam curationes, tum in illis expositas, tum exponendas postulat.

De febris continens. Cap. XII.

Continentes finitimæ sunt, singulis intermittentibus: tertianæ quidem exactæ ardēs, quæ causos dicitur: quotidianæ, ea quæ singulis diebus accessionem habet, non autem ad integritatem definit. Sic etiam quartanæ ea quæ quarto die accedit. Exactus namq; causos, cum omnes alias exquisitæ tertianæ notas seruet, hoc solo discrimine uariat, quod non cum totius corporis concussione, sicut appellatur, inuadat, neq; ad integritatem ueniat. Qui singulis diebus accessionem obtinet causos, omnes similiter exactis quotidianis notas præ se fert, quod autem ad integritatem non peruenit, hæc res à quotidiana specie consimili differt: ea ratione & quæ quarto quoq; die accessionem habet, uerum ad integritatem non cessat, finitima est quartanæ. Continens itaq; febris est, quæ non ante ad integritatem terminatur, quam ex toto fuerit soluta, etsi inclinatio aliqua sensibilis appareat. Quæ autem nulla accedit, quæ sensibus queat percipi, hæc quoque ex ardentium genere habetur, sed acrimonia ab ipsis uariat.

Agnitio februm continentium, & curatio. Cap. XIII.

Continentium februm origo ex sanguine est, qui nunc effervescent, tantum nunc putrefactus obstruitur. Quapropter accessio ipsis ad usq; finem una est. Indicia uero sunt, pulsus maximi, uementes, citati crebri, æquabiles, non mordaces. Urinæ non multum adeo à sanis recedunt. Curatio est, sanguinis quousq; deficiat anima, dimissio. Qui si non fuerit detractus, febricitantes in summum ueniunt discrimen. At si quid per uenæ sectionem uacuare prohibuerit, alijs uero remedijs oportet, quæ meatus recludunt, copiam materię uacuant, & februm ferno rem leniunt. Cum autem euidentes humorum concoctionis notas in ipsis uideris, neq; in principio particula inflammatio quædam, aut tumor œdematis specie repræsentans, aut schirrus fuerit, neq; particula aliqua temperamento adeo frigido, ut in hanc noxam procubat, cum fiducia frigidam propinato: maxime si æger eius potioni assueuerit.

Ardentium agnitio. Cap. XIII.

Ardentibus hæc superueniunt, arida lingua,

crassa & nigra, uentriculi rosio, deflectiones palidæ, sitis uehemens, uigilia, nonnunquam etiam delirium.

Ardentium curatio. Cap. XV.

Horum alterutrum fieri necessarium est, si perfecte morbus solui debet: aut biliosos excerni humores, aut eosdem extinguere. Excernuntur itaq; per sudores, uomitiones, & imū uentrem. Extinguuntur autem frigida potu: quoniam nos ardentissimas febres, causos appellant, ex toto curauimus. Sustinere eos qui his cruciantur, non aqua sola conuenit; neq; mulla duntaxat, uerum diluta mulla exhibita. Nam qui huiusmodi morbis consistant, sola portione sustentandi sunt. Porro balneum illis solū usui est, qui citra tumorem inflammationi, aut erysipelati consimilem, ardenti febre laborant. Quod si uero concoctionis nota percipiantur, multo magis ipsis conducet. Qui ex falso humore febrim ardentem conceperunt, his est inuicis. Verum ipsi dem potissimum etiam cremorem cibi loco offerre conuenit.

Februm quibus ex affectu erysipelas reuerente origo est curatio & agnitio. Cap. XVI.

Febres quæ ex affectu uiscerum erysipelas referente procreantur, his notis agnosces: interna ferunt immodice, dolor urget uehemens, præterea sitis excruciat, & æstus immoderatus. Summatim ex indicijs acerrimæ bilis cum paucis sanguine putrescentis deprehendes. Hunc in modum curabitur: A balneo in totum abstinere decet. Aqua frigida per morbi statum uehementi, hoc est frigidissima utendum est: per initia non item. Extrinsecus uero refrigerantia imponuntur. Et si nihil hæc promouerint, etiam intro sumere cogentur. Maxime ipsis conueniunt lactucæ, & quæ parem his facultatem obtinent, à foris & ipse lactucæ succus idoneus est, adeoq; intybi & semperuiui, & reliqua refrigerandi uirtute prædita, sed præstantissimo partem plurima utimur. Nam humorem refrigerantis alicuius expressum pilæ cum portulacæ iniicimus, deinde contusum exprimimus: cum usus exigit, modico polentæ mixto & in aqua frigida merso, partem refrigeramus. Linteum uero duplicatum in ea intinctum extrinsecus, aut ubi calor sentitur, præcordijs obrendimus, non diu adhærere sinentes, uerum aliud frigidum eius loco applicantes. Iam uero & oleum omphacinum medicamini nonnunquam miscemus.

Hæticarum februm agnitio. Cap. XVII.

Hætica febris non in humoribus, & spiritu solum, sed iam partibus etiam solidis consistit. Hæc dolorem nescit, & qui ea detinentur,

nequa quam febricitare se existimant: neque enim calorem percipiunt, cum uniuersa ipsis par ticulæ æqualiter sint excalfactæ. Duplex hectica- rum febrium species est, prima ardentibus ma- gna ex parte superuenit, quæ prorogantur adeo ut tempore corporis ipsius cordis madorem ab- sumat, uel etiam si copiosus adhuc subsistat: alia manente etiamnum humiditate cordis corpus oc- cupans, inde potissimum accenditur. Vnam sane ipsius generationem prodidimus, reliqua est, cû statim ab initio inuadit, primam originem diarijs similem, ex moerore, ira, lassitudine maiore, una cum exustione sortita. Hec igitur non difficulter cedit remedijs. Quæ uero ex ipsis in marcorem qui Græcis dicitur *μαρasmus* deuenit, omnem re- spuit curationem. Atque hæc sanè cognita est fa- cillima: oculi siquidem præter modum concavi testantur, & lemæ ipsis inhaerescunt aridæ, tum dispositio quædam squalida, uiuidi ipsorum co- loris flos emarcuit, frons sicca est & intëta. Quin etiam conuiuent plurimum, hac occupati, quem admodum dormituriens, uerum affectio, som- nus non est, sed uigilandi impotentia: tempora collapsa sunt, & quid enim aliud præter ossa & cu- tem solam habent? Nam si deaudent uentrem inspexeris, neq; intestinum, neq; uiscus ullum su- peresse tibi uidebitur: præcordia sursum conuel- luntur, & cutis ipsis extrema resiccata est, pul- sus gracilis, creber & durus. Caliditas autè pri- mo occurso languida, paulo post acris & rodens erumpit, quousq; igitur humiditatis aliquid reli- quum est, hectica solum febris dicitur. Cum uero periclitatur, ne nihil amplius humoris super sit, absolutus iam marcor constituitur.

Hecticae febrium curatio. Cap. XVIII.

HECTICA febre laborantes, statim ab initio nutriri desiderant, humorum rodentium gratia. Maximum uero remedium huius est, victus humectans. Conuenit igitur quam ma- xime pulsanæ cremoris halicæq; forbitionibus, & pane præterea adiecto ægrum nutritum, mode- rato frigida potu curare, si neque inflammatio quædam, neq; humorum putrefactio subest: at si magnam inde offensam fore coniecturaueris, fri- gida abstinere oportet, extrinsecus autè impo- sitis, quæ refrigerant auxilijs, uti. Balnea uero hoc morbo obnoxij, quolibet tempore sunt idonea.

De semitertianis. Cap. XIX.

QUANDO quidem tertiana cum rigore, quo- tidiana uero citra illum inuadit: quæ am- barum mixtura constat, horrorem indu- cit, qui minor quidem res est rigore, maior autè perfrictione. Quapropter cum horror æquali ab utriusq; extremis interuallo, medium amborum

rigoris nimitum & frigoris occupet, quod contè- peratis inuicem extremis accidit, non abs re no- men huiusmodi febris semitertianæ indiderunt. Porro duplici modo generatur: uel enim duæ ac- cessiones in idem tempus concurrunt, uel statim ab initio ambæ inuicem iunguntur. Quando igitur tertiana præpollet, magis horrida febris effi- citur, & rigoris etiam nonnihil per accessionem assumit. Propterea autem talis calidior est & ardè- tior, tum uomitionem quandam bilis, aut deie- ctionem, aut madorem adfert. Quando altera pituitosa superat, perfrictiones quidem summa exercent, pauci uero horrores: neque tamen li- tis, neq; ardor in his affligit. Cum pares magnitu- dine sunt tertiana intermittens, & quotidiana cõ- tinua, insultus quidem accessionis cum horrore accidit. At cum ex pituita proueniens febris præ- celluerit, submissiones pulsuum sunt, & horrores. Si uero calidior præualeat subito incallescunt. Talis sane est exacta semitertiana, ex æquualen- te duarum febrium, puta tertianæ intermittentis & quotidianæ continuæ temperatura proficiscens. Non exquisita uero uel bilem largiorem, uel pi- tuita causatur, quæ iam magis etiã curationi reni- titur, cum paucus humor à copiosiori ex cœlesti artisq; auxilio expedituinci possit. Si autem pitui- ta sit superior, præsidijs maxime utemur, quæ in quotidiana exposuimus. Sin autem flaua bilis, ijs quæ in tertiana comprehensa sunt, in totum ei quod urget incumbentes, sed ita, ne alterum pro- fus negligamus.

De Morbis publice grassantibus. Cap. XX.

PUBLICE grassantes communesq; morbos no- minant, qui multis simul obueniunt, quorum ut generatio, sic etiam causa communis est. Cibi igitur communes prauis, illiusmodi morbos pariunt. Item communis aquæ uiciata potio, ni- mis laboriosa uitæ ratio, labores quibus quisque affuerat omisi, inedia, repletio, idq; dum sa- mes grassatur, aut fecundis annona prouentus est. Item regionum naturæ, communes subinde morbos intulerunt, quæ nōnunquam palustres aliquando barathrum uicinum habentes uapores exiciosum prauumq; exhalant. Hæc igitur con- tinuè accidere consueuerunt. Aer uero nos am- biens, temperamenta corporum commutat, uel calidior impendit, uel frigidior, uel humidior euadens: siquidem in alias causas neque omnes simul incidimus, neque eis toto die immoramur. At quoniam aer qui omnibus circumfusos est, & per inspiratum attrahitur, ut animalium corpora pro temperamenti ipsius immutationibus afficiat- tur, necesse est. Qui igitur hæc intelligit, non so- lum morbos ex unoquoq; aeris statu futuros præ- sagiet, sed etiam ne fiant prohibebit, contrarium immoderatis circumflui aeris temperaturis uicū indicens.

Itaq; corpora morbo alicui ex propria intemperie uicina, hæc à simili circundantis nos aeris temperamento deprehenduntur. Quæ contrariam celo temperiem obtinent, præter quod nullam offensam experiuntur, etiam meliora sunt, dum repugnans aeris immoderatio temperamenti immoderationem punit. ac qui hoc nouit, secundâ ualetudinem tuebitur, contraria corporibus inducens, nunc refrigerantia scilicet, nunc calida: aqua quidem super infusa refrigerans, itidem otio, ciborum inedia, & potu largiore: calefaciens autem, operimento, laboribus, cibo liberaliore, & interdum parciore. Præterea pyra incendiò haud mediocriter aerem ad calidum & siccum mutaueris, si tunc humidus fuerit, quo modo Acronem acragantinum factitasse ferunt.

De pestilentia ex commentarijs Ruffi. Cap. XXI.

Pestilentia grauisima quæq; superueniunt: aëbilq; i hac sicut in alijs morbis singulis de finitum. Etenim delirium accidit, & bilis uomitio, præcordia intenduntur, labores afficiunt, sudores largi erumpunt, extrema algent, alui profluvia urgent biliosa, tenuia & flatulenta, urinæ cernuntur diluta, tenues, biliosa, nigra, mala habent subsidia, quæ superinnatant, pessima, nares sanguinem destillant, pectus ardet, lingua torrida est, siticulosa tristitia oboritur, torquent uigiliæ, cõuulsiones uiolenta, aliaq; multa praua. At si quis pestem uenturam prænosceret ex malignorum anni temporum, & uitæ studiorum ad sanitatem haud conducentium animaduersione, aliorumq; animalium præcedente interitu, his apud se consideratis, & illud præterea perpendito cuiusmodi sit præsens anni tempus, qualisq; uniuersus annus. Inde siquidem qualis uictus ratio esse debeat, optime deprehendes: utpote cum anni tempus, si quidem rite ortum est, ex sicco humidum nunc euaserit, necessum est uictus ratione desiccare, ut humor superfluus absumatur. Cæterum uictus habenda est ratio. Quibus superior uentriculus pituitam continet, uomitionibus sollicitare, quibus sanguis inundauerit, secare uenam oportet. Item per urinas, & ex toto corpore facta purgatio, aliaq; hoc in casu sunt utiles. Quod si etiâ æger ardore æstuet, & flammam usque ad pectus pertineat, haud abs re fuerit refrigeria pectori applicare, & potionem frigidam offerre, idq; nõ paulatim, nam magis hoc pacto incendit, uerum uniuersum ut flammam extinguat. In quibus autem ardor interiora occupat, summa uero in alge scunt, cutis in superficie frigida percipitur, præcordia contenduntur, uenter syntexim patitur, aut uomitu, aut infra reiectiones fiunt, uigiliæ urgent, mens desipit, lingua est aspera, hi calefacientia requirunt remedia, ut calor per totum corpus distrahatur, ac si alio quopiam modo ab internis

foras poterit elici. Iam uero & hæc potio utiliter præsumitur. Aloes partes duæ, guttae ammoniaci partes duæ, myrrha pars una. Hæc in uino odorato contrita, instar dimidiæ cyathi exhibentur, nimirum quotidie. Haud noui, inquit Rufus, qui post hunc potum pestem non superauerit. Hæc quidem Rufus memoriz prodidit. Galenus autem tradit ad pestilenciales putredines, bolum armeniacum salubriter potari. Simili felicitate etiâ Theriacen ex uiperis magnam prodesse. Etenim in pestilentia quæ Romanam internecino morbi genere depopulata est, omnes quos nullum ex his medicamentis adiuuit, interiisse scriptum reliquit.

De ijs qui ex redundantia crudorum humorum syncope periclitantur. Cap. XXII.

Nonnulli febricitare incipiunt, ubi magnâ crudorum humorum copiâ ore uentriculi simul offenso, uel ex cruditatibus, uel alia quapiam occasione congefferunt. His & præcordia inflantur, & os uentriculi uastiore mole, quàm pro naturæ modo cernitur: ad hæc color ipsis ad albidius, aquosiusq; quàm naturaliter esse debet, & eorum speciem quos aqua inter cutem male habet, magis est mutatus. quibuscum ad nigrius liuidiusq;, nulli talium sanguis mitti sine maximo dispendio solet, etsi uacuationem desiderent. Verum nec sanguinis dimissionem, nec purgationem sustinent, utpote quos etiam sine his syncope subito adoriatur. Ratio igitur medendi talibus est quàm frictione molimur. Incipere uero per initia statim morbi oportet, ac primum à superiore crurum parte deorsum, idq; linteis non admodum mollibus, sed modice asperis. Deinde tota brachia ab humeris usq;, & superiore parte deorsum simili modo sunt fricanda. Vbi uero artus omnes abunde calidi uidentur, & metus est, ne quis ex ampla frictione lassitudinis sensus superueniat, oleo relaxante uteris, quale est Sabinum: ab astringente uero abstinebis, cuiusmodi Hispanum est, Histricumq;: et quod unâ cum germinibus uel ex oliua adhuc immatura conficitur. per hyemem uero digerentium usus erit, quod genus est Sicyonum & chamæmelinû. Cum iam artus plurimum perfricueris, postea oleum detergetur, inde ad spinam dorsi transitus est: hæcque tota perfricabitur similiter, ab hac rursus ad crura te conferes. & hinc ad brachia. exinde rursus ad spinam: ita toto die facies. Porro mulla, in qua coctum hyssopum fuit, his est aptissima. cauendumq; ne vel cibum, vel sorbitionem, uel aquam exhibeas, uel omnino liberaliter bibere fias, nisi mullam tribus primis diebus duxeris, tuis ipse manibus, quas dixi partes ordine perfricans. Sin pulsus robore mediocri sit, ac magnitudine, considera quæ ad alium spectant, ac si sua sponte

sponte commode non deiciat, cum fiducia aliquid in aluū ab inferioribus partibus infundes. Quid si maior iusto recrementorum imperus ad aluū extetur, principio quidem percoquere multis amplius oportebit: minus enim ea subducit, magis nutrit: cruda uero minus nutrit, magis subducit. At si plenius superuacua descendant, ne sic quidem sistenda aluus, sed exhibendus pro aqua multa ptisanz cremor est. Si uero fluere pergant, chondri sorbitione nutries. Si ex pulsus imbecillitate uires quoq; collapsas didicerimus, panem ex uino diluto exhibere conueniet: utiq; si ne uenter, nec iecur inflammatione laboret: quādo si hac infestentur iam corpore crudis succis refocto, nulla plane medicina periculo subtrahit. At qui si quādoque crassi abunde humores depræhendantur, oxymeli pro multa continue exhibebitur. Ergo si æstas sit, & eger frigida potioni assuetus, frigidum huic oxymeli dabis: sin hyems sit, calidum omnibus. Sane balneū his est aduersissimum, tum aer ambiens uel nimium calidus uel frigidus. Porro ijs quos syncope iam premit, si partes modo commemoratz inflammatione uacent, panis exhibebitur modicus, isq; ex uino quod celerem in corpus digestionem adiuet, statimq; ad frictionem ueniundum est, quæ pro tradito quoque iam modo administrabitur: verum quibus ex flaua bili, quæ os uentriculi infestet, syncope medit ijs frigida offerenda potio est, uinum tamen tenue, rubens & uetus.

De his qui ob prætenuis humores syncope opprimuntur. Cap. XXIII.

Qui tenuium humorum uitio syncope premuntur, diuersam à supradictis curandi rationem desiderant, ut quos dignoscendi notæ illis contrariæ testentur. Nutrire hos oportet paulatim & continue. porro ad exitum spectare existimandi sunt, si uel iecur ipsorum, uel uentriculum inflammatio obsedit, uiribus iā languentibus. In eiusmodi affectibus emortua illa species in facie celeriter apparet. Sane nutrire quicquid horum inciderit, est necesse: sicut etiam corporis summa densare, non secus quā prius rarefacere, & frigidum ipsis aerem accersire. Vngendi sunt præterea astrictorijs unguentis. tum cibi ijs dandi, qui non admodum promptè diffuant, non aqua multa, nō ptisanz cremor, sed panis & sorbitio ex chondro, & fugaces fructus austeri, qui non facile corrumpantur, tum ipsi per se, tum uero & cum pane. Vinū ijs aquosum necessariū inter initia est, sumptū post cibū.

De reliquis occasionibus quibus syncope succedunt. Cap. XXIII.

Reliquæ occasiones, quæ syncopas concitant, quatuor sunt numero: dolor uehemens, ui-

giliæ, immodica uentris inanitio, ac in ijs qui aliena loquuntur, aliquando motus. Sed & quintā, si placet, addas, nempe principiorū intemperiem. Celerrime igitur cor affectum in perniciem precipitatur, mox cerebrum, deinde breui iecur

De dolore. Cap. XXV.

Itaque dolor, qui stuporem inducit ex frigida oritur dispositione. Pulsatilis labor magnæ inflammationis comes est. Sin autem tanquam ab aculeo impacto, aut ueluti à terebro forari putet, crassi intestini species doloris est. pulsatilis, circa membranas constituitur: pertundens uehementissimis nō heterocrannijs solum, sed cephalæis quoque accidit. Interim hic à parte primario affecta, ceu à radice subito in uicinas perfertur. Porro diffidentes utrinque neruorum dolores sunt, cum & laborant, & ad utraque extrema tenduntur: minime uero in latitudinē porrecti perui dolores percipiunt, membrana uero sub cute porrecte tensuos, stupefacientesque dolores inducit, quæ inter carnem hærescit, tanquam dilaniantem cruciatum excitat: multæ siquidem & inæqualiter inhærescunt, & ipsam carnem amplectuntur. Quæ uero membranæ ossibus circūdantur, profundæ sunt, ipsorumque ossium tanquam dolentium imaginem repræsentant. Quando igitur nulla extrinsecus doloris occasio fieri apparet, præcedens uictus ratio uenit inspicienda, fuerit ne præter consuetudinem otiosa, aut cibis homo usus sit largioribus, ijsque ex ualenti materia uel solita excretio sit retenta. Nam si ex his aliquid, uel omnia quoque appareant, doloris causa est repletio: ac quamcitisime homo uacuari debet. Sic enim licebit tibi maxima cum securitate ijs uti remedijs, quæ fluxiones dolentibus particulis incumbentes repellant. Si igitur sanguinis sit copia, quod distendit, ueluti in inflammatione oriri solet, protinus si uires patiuntur, sanguis dimittendus est. Sed si æger sanguinis missionem timeat, uel imbecillis sit uiribus, tum auertendus in diuersum sanguis est, tum per magnam uenam patienti particulæ propinquā deriuandus. Vbi uero uitiolus humor duntaxat affligit, purgatus est. Si utraque cocant, ambabus utere uacuationibus, sanguine prius emissio. Quod si his peractis dolor etiam remanet, constat profectò in ægrotante particula impactum esse quod afficit. Patet uero non minus & curationem ipsam per digerentia medicamenta esse moliendam. Par ratione & qui ex flatuoso spiritu dolores contrahuntur, curabimus: sed simul in his potius tum extenuantibus cibis tum potione, tum per sedæ iniectionibus, tum cataplasmaris auxiliares, tum irrorationibus atque fomentis ambiens ipsum corpus rarefacientes. Sin moles aliqua grauando, contundendo uel dolorem excitet, moli ei-

dem est medendum. Sin rodens humor est qui affligit, aduersissima huic sunt quæ extenuant & calefaciunt. Anethum oleo incoctum, dolorem lenit, & somniferum est: & uiride sicco magis.

Si corpus tæbe consumatur. Cap. XXVI.

QUum per uentrem aliquid non ex esculentis poculentisq; uerum ex ipsius corporis substantia excernitur humore in aluū ipsam confluente qui quidem fluxu bili continue per uentrem, & infra erumpenti consimilis est, odoris autem fœditate, tum quod deiectus flauior & crassitie glutinosus; interim oleosus appareat, ab ipsa differt, tunc nimirum caro pinguis & recens coacta ab ardenti febre resoluitur, & eliquescit. Malo inueterante, non nihil etiam ex ipsis solidis partibus absumitur. In hac perniciosissima febre frigida portio utilis est, quæ ex terra frigidissima petitur. Huiusmodi quoque esse conuenit cataplasmata, & epithemata, quæ refrigerent, thoraci & præcordiis imposita. Item cibi refrigerantes recte offeruntur.

De uigilijs in febribus. Cap. XXVII.

AT uero eorum, qui immodicis torquentur uigilijs, crura & manus uincire, quo tempore somnum capere solent, iubemus & excitari. nonnunquam palpebras aperire, uel conuiuere compelimus, donec abunde fatigentur. Inde subito uincula soluimus lucernamq; tolhimus, & altam esse quietem iniugimus. si nihilo minus uigiliæ pertinaciter urgent, ubi accessio remiserit, frons nigri papaueris caput decocto, illuitur, naribusq; offertur papaueris albi cortex torrefactus detritusq;, & mandragoræ radicis laugata tantundem cum uino. Item rosacei malagmate facies illinitur, serpillioq; cum meli loto in passo decocto. Hoc etiam in accessionibus est utendum. uel trita papaueris capita excipientes pane cum rosaceo uel eiusmodi cerato illinimus. Cibus quodammodo sit plenior, exquisitiorq;. Adijciatur autem sorbitionibus caput papaueris albi feminis cochleariū trium instar. oleribus cõmiscetur papaueris nigri, si quid folia fuerint uiridia, quantum tribus digitis potest comprehendi: sin minus, tria quatuorue papaueris capita sicca, simul incocta deligantur. Si ne sic quidem somnus accesserit, papaueris lachryma, aut succo mândragoræ circumlinentur. Iam eclegma ex papaueris capitibus compositum, & præsertim ex decocto, mensura cochlearij, uel unius, uel dimidij potum, somnum frequenter accersit. In quibus autem caput non est repletum, & uigilia infestant utere in declinationibus etiam tali suffitu. folij amomi, costi, arnabo, singulorum uncia. carpobalsami libra, styracis, amomi,

ammoniaci, bdellij scythici, mandragoræ radicis, lachrymæ papaueris, singulorum drachmis quatuor. Ex lignis cupressi accensis suffito.

Curatio soporis noxi, qui cataphora Grecis dicitur. Cap. XXVIII.

FRons posca, cui lactis aliquid sit adiectum, abstergitur, & summa ualide ligamentis excipiuntur. naribus admoventur quæ incisionem facultatem obtinent. In remissionibus etiam cucurbitulæ ualenter dorso, & spinæ defiguntur. Si morbus his non cedit remedijs, etiam quæ sternutamenta excitant, obijciuntur. Ciborum materia sit quæ incidat diuidatq;, ueluti in præceptis de sanitate tuenda est comprehensum.

Curatio doloris capitis in febribus. Cap. XXIX.

SI capitis dolor in febribus affligit, post conuenientem febrili uacuationem in accessionum declinationibus, caput inungi debet, primum communi oleo crudo, uel rosaceo, cui etiam aceti paucillum sit admixtum: si æstas sit, & febris ardens, frigidò: sin hyems neque febris ardens, calido, aut tepido. Incoquatur nonnunquam oleo & serpilli polygonijq; succus. per æstatem etiam papaueris capita, uel ipsum papauer: quemadmodum hyeme pucedani momentum. Quod si uero dolor in fronte perseveret, sinciputq; pilis careat, hoc quoq; oblinendum est ueteri polenta & polygonio: uel pane similiter & rosis, uel modica myrto, uel serpillio: Quosdam & pulegium applicatum magis leuauit. Nonnullis etiam cum ignis sensus inest, psyllium polenta temperatum profuit, uel ipsum per se in uiscum coctione redactum, & continue mutatum. Item corianum similiter cum polenta, & aloe cum aceto illinitur myrrhaq;, & ammoniacum pari modo, necnon crocomagma. Pulsatiles dolores ruta, menthaq; cum pane diffiat, rosaceo quoque superaddito. Atqui si dolor commemoratis auxilijs non eliditur, primum caput ad cutem adtondere oportet. deinde pinguioribus asperginibus totum ipsum foueri mox cucurbitulæ occipitio aglutinari, & summæ partes deligari debent, permulceriq;. Iam uero irudines recte affiguntur: Cæterum si defluxio quædam à capite, uel grauedo oborta capitis dolorem suscitauerit, ijs utendum est auxilijs, quæ aduersus hæc suo loco perscribentur. Sin autem à stomachi regionibus uapores sursum tendentes caput offenderint, etiam horum ratio habenda est, ueluti præceptum à nobis est.

Quomodo stomachi curâ habere conueniat. Cap. XXX.

SI stomachus imbecillis fuerit, corroborantibus oblinetur, quod genus palmulæ sunt, quinum, farinæ, crocus, mastiche, & aloe aspergi-

que debet medicamentis ex absinthio, melino, mastichino, nardo, & uino confectis. At si ardorem experiatur, miscendum aliquod ex refrigerantibus, puta cucurbitæ succus, lactuca, portulacæ, solani, fereos, & vix immaturæ. Sin autem inflammatio quædam in uisceribus appareat, etiam relaxantia quædam adiungenda sunt: aspersioni bus, oleum chamæmelinum, cyprinum, adipēs gallinæ, aut anseris, bdellium, uel ammoniacum, & similia: cataplasmatibus autem apij, semē, scœnugrecum, althææ, chamæmelorum flos & ut uno uerbo expediam, compositam habeant facultatem, tum relaxantem subrilium partium amararumque, tum astringentem.

De immodico frigore in febribus & rigore. Cap. XXXI.

Rigori, qui crisis ratione obuenit, remedijs occurrere non oportet: nec uehementiam eius dissoluere. Quod ex sudore frigus prouenit, prompte remittitur, ac nihil adfert molestiæ. In solo autem rigore, aut algore, ex frigidissima copiosaque potissimum pituita nato, primū quidē artus plurimis in locis constringendi sunt, mox oleo delinendi chamæmelino aut cyprino, aut irino. Sin autem maiore auxilio tibi opus sit, etiam piper oleo admisceris, uel cachry, uel adarcan, uel castoreum molliterque totum corpus infricabis. Porro ne facile oleosum istud præsidium defluat, haud fuerit absurdum & ceræ momentum colliquefacere. At si per hæc rigor non possit exal fieri, ualentioribus quoque ex his factis acopis necnon dropacibus & sinapismis uti consilium est, aliaque fomenta rite admolari. Item acriora ex ijs quæ admoventur naribus, comino de faciunt, calaminthe, pulegium & hyssopum. Potui dabitur ante accessionem mulsa, in qua piper, & ruta sit incocta. ad hæc liquoris cyrenaici cocto melleformati instar mihi duabus horis ante accessionem præstabis. Similiter & liquoris sylphij. Ad hæc quod in quartanis ex liquore cyrenaico componitur, multis fuit auxilio, iam uero in oleum largius, quod incaluerit nonnulli descendentes, rigores pertinacissimos absterferunt, ut Archigenes memoriæ prodidit. Galenus autem ante accessionem, curem abrotano infricandum præcipit, uel calamintha arida, uel cunilę tũ folijs tum floribus, uel costo, uel pyrethro, utroque horum cum oleo, unde fiet, ut uel nequaquã, uel certe minus rigeant.

De sudoribus. Cap. XXXII.

Sudores, quibus morbus soluitur, excipere soporiter, quandiu fatis uacuatũ fuerit, adiutareque; fotu mediocri, & quiete. quam obrẽ non abstergendus est: nam alius quoque alium elicit, & calido clystere in aluum dato, & sorbi-

tione, & somno. At sudores in remissionibus morborum erumpentes, simile ijs qui morbum finiunt, *xeritici* appellant, ad ministerium capiunt. Itaque præsidia quibus sudores euocantur, libro superiore capite quadragesimo octauo abunde sunt comprehensa. Cum enim sudores largius eruperint, abstergendo, leuandoque; opera menta refrigerare cõuenit. Etenim lassant supra modum excidentēs, ut in syncopen frequenter agros perduxerint. Leui ueste madidaque debent esse cõtecti, fenestris patentibus, ut perflatus aeris frigidior accedat. his somnus adiungatur, & euentilatio. Insuper myrtus nigra in pollinem coacta, corpori inspergatur. Similiter galla, picca cortex, electrum & polenta cum uino astringente, particulis sudores recipientibus imponantur, faciesque posca per spongiam aspergatur. Archigenes etiam calcem non resinctam, & floces uini combustas, tum in his, tum in rigore, quẽ nullus euincit calor, assumit. Ambo siquidẽ, inquit, per fotus calidos succescunt. Media uero corporis loca delinenda succo arnoglosse, uel coriani, uel portulacæ, uel brasicę præcipit, ut cõstricta, sudores reprimant. Idem præstat reprimendo creta ci molia aqua dissoluta, dorso per somnum, & thoraci subiecta. Totum uero corpus rosoraceo perungitur, uel melino, uel myrteo, uel lentiscino, uel ceratis quæ ex his consunt. Nam magis sunt his idoneæ reunctiones, quæ latentes meatus obstruendo, humoris exitum prohibeant. Patet autem omnibus quod cibis quoque sicior his conuenit, & uina mediocriter astringentia. Cæterum largiore potu, & præsertim humidiorẽ, tum crebris iniectionibus abstineant. Si autem fieri potest, gestatione corpus agendum, in frigidiorẽ ædificio, ut summæ his partes quàm maxime refrigerescant. Qui porro per elisum sudores fiunt, (hi autem uel ob dolores excitantur, uel conuulsiones) & retentione, fotuque; extremo rum, & refrigerio per panniculos laneos accessito, leuiter curantur.

De tussi in febribus. Cap. XXXIII.

Tussi in febribus, præsertim cum rigore obuenientibus occurrere conuenit. Nam nullis intentione, febris quæ inclinabat erigitur recolligiturque. Aduersus hanc formulæ medicamenti ex melle cocto coactoque, hypoglossia nocant, offerruntur. Linguae autem supposita, unde nomen habent, eliquescunt: & quod spirandi impedit facilitatem, discutiunt: tempus ipsarum est in accessionum statu, & spatium quod paulum accessionem præcedit. datur etiam hydromeli discoctum. Quibus autem de nervoso genere metus non est, temporis processu exhibebis cum fiduria & oxymeli. Sin minus, hyssopi decoctum, quod etiam rigentibus auxiliatur. Item castoreum cum

cum febris ardens non est, neruoso quoque genere commiscetur. Adhuc eclegma ex piceæ fructu, nucifis pinis, iride, semine lini, amygdalis amaris, & urticæ semine plurima uero ex parte cibis quoque hæc simul adiunguntur. Ac resina quoque & cerebintina in uno exhibetur. Extrinsicus autem thoraci, & locis arteriæ uicinis, lana sulfure infecta imponatur, ac pingue, oleum uero rutaceum esto, uel irinum, uel anethum. Præterea deligatura ualida in locum exacte porrecta, tussim cohibet: dico autem per medias partes extremasque. Non ratione caret, & apophlegmatismis tussis gratia uti, utroque herbæ pituitariæ genere, & syluestri, & satiuo comanducato. uel cum mastiche summa debent infricari, contrectari, & ligaturis intercepti. deinde rursus soluenda est retractio. At si propter febris acrimoniam tussis concitatur, utendum est. gargarizationibus ex aqua tepida, necnon frigida subinde profuit, & ex posca, & palmularum decocto, uel rosarum, uel dulcisradicula. Visceribus autem, uel etiam cordi ipsi iniiciuntur quæ modice refrigerant.

De sternutamento. Cap. XXXIII.

Sternutamenta dum febribus incidunt, subinde molestant. Etenim caput replent, & uirtutem arguunt. Nonnullis sanguinem quoque eliciunt, & alia huiusmodi inferunt incommoda. Quare aduersus ipso remedijs pugnandum est. Cohibet itaque sternutamentum inuadens, nasi perfricatio, frontis & oculorum apertio, studiosa palati frictio, nictus, illum intentio, capitis in altum eleuatio, inclinatioque ad latus, summorum musculorum contrectatio, maxillæ musculorum perunctio, calentis olei in aures infusio, ligamentum calidum mento impostum. Caueri debet repentina ex somno excitatio, fumus, puluis, acrior odoratus pipetis, castorei, sinapis, mentæ, suauitas malorum, & farinæ odor. obtundunt enim sternutamenti elisum, & spongiæ ex mati inanes. Vbi uero cupiditas sternutandi oborta fuerit: non autem sternutamentum erumpat, labij quies idonea est. tum acriorum odorum experientia, & animi remissio.

De cibi fastidio. Cap. XXXV.

Quibus uitiosi humores fastidium procreant, ij cibis & poculentis sollicitandi sunt, qui huiusmodi succos uel per uomitiones, uel per aluum excernere soleant, uel contemperat, meliores reddant, quorum materiam libro superiore, qui totius operis primus est, comprehendimus. At si ob uirtutis imbecillitatem, cibum respuant, quoniam omnis facultas ex particularum intemperie infirmatur: conuenit intemperamenti speciem, contrarijs medicari. Plura de fa-

stidio, in stomachi uitijs, libro tertio pertractabimus. In febricitantibus autem, statim per initia cibi cupiditas, ijs quæ odorem mouent, recuperanda est. Potissimum uero polenta in aquam merfa, uel poscam, uel dilutam uini potionem, uel cuiusdam odorati, & fructuum fugatium qui astringant decoctum, item perunctione blanda, & moderata totius corporis frictione, eliditur cibi fastidium, ac contrectatione tum frontis collutione, aquæ sorbitione modicæ. Caterum stomachus digito immisso turbatus, ad cibum assumendum quodammodo sollicitatur, idque potissimum bilioso quodam humore, aut acido, sursum educto. Secundum primos dies, cataplasmatibus quoque à foris stomachus ad cibum conuertitur, ex palmulis, malis, cenanthe, absinthio, & aloë confectis. Cibi autem præparentur plures simplicesque, & frumentacei. Insuper alterius generis uarietatem quandam sortiri, qui tamen non ab ijs abhorrent, qui in febribus dantur, in quibus & fructus fugaces conueniunt, qui non ex facili acefcunt, neque nimium dulces sunt, sed maturi, neque ad facietatem exhibendi, uerum quantum ad aliorum ciborum cupiditatem excitandam sufficit. Præsto autem sint reficiendis familiarissimi, qui tunc corripere agros, rum adhortari queant. Porro febribus solutis, si in uirium recreatione perduret fastidium, etiam si sarum cum oxymelite coctum, lactuca, oliuæ halmades, capparis, salsamentum, bulbi & quicquid ad bonitatem stomachi facit, accommode tur. Nec non & illud ipsum in memoriam reducatur, quibus cibis per sanitatem maxime usi sint. item ambulationes, gestationes, clamores, dropacismi, frictiones & exercitia adhibeantur. Præterea absinthij succi portio, uel aloës, aceti que scillitis instar mistri absorptum, in id uehementer efficax est.

De grandi fame, quæ Græcis bulimos dicitur.

Cap. XXXVI.

Suero in grandem famem, quam bulimon appellant Græci (dico autem cum minus quam par est, cibos corpora sentiunt) fastidium inclinauerit, hisce reficiemus, tum alijs, quæ naribus admonentur, suillisque carnis asis, & hœdinis. In summa omnibus, quæ nidorosum odorem repræsentant. Acrimonia sanè februm lenita, & extremæ partes deligari ipsique excitari debent, maxillas pungendo & crines, uel auriculas uellendo. refectis, panis ex diluta uini potione, uel aliud quippiam distribui facile exhibetur.

De canino appetitu. Cap. XXXVII.

Et si hoc symptoma febribus non adeo superueniat, sed nonnunquam secundum ipsas,

præsertim gratia cognationis, quam cum fastidio contraxit, nil tamen fuerit mali, etiam de immodico appetitu, quò ambo naturæ modum excedant, sermonem instituere. Quoniam igitur à pituita potissimū acida constituitur affectus, ijs utendum est, quæ hanc incidant repurgentq;: Talia autem sunt maxime, dulcia, salsa, & alioquin abstergentia calida. Vinum igitur ipsis recte datur copiosum, ex eorum numero quæ impenſe calefaciunt, cuiusmodi habentur colore uermicula, aut rubra, astrictionis expertia. Verum dulciora potius propinantur, uel non sitientibus. At cum optime habuerint, primum ipsis pingua, mox alia omnia ex oleo largiore præparata, quibus nihil austerum, aut astringens sit adiectum, offerentur. Hæc etenim, licet aduersus ipsam causam manifeste non pugnent, attamen impotentē ad cibos animi impetum dissoluunt. Horum autem penuria consistentiam pituitæ stomacho inhaerentis absument, minuitq;. Iam fassamenta ipsis commodè exhibentur, ab his vina commemorata liberaliter assumpta prosunt, quod ubi longiori tēpore fecerint, caninus appetitus finitur.

De sitim. Cap. XXXVIII.

Sitim admodum longam fieri existimabis ex siccitate, aut caliditate; particularum per quas humor ex ore in uentriculum deferretur. & siccitatis quidem remedium est somnus, caliditatis autem uigilia. Nonnulli uero sitibundi ex uino ciborumq; caliditate fiunt, quibus medetur frigida potio. Præuas autem qualitates desiderant, quemadmodum & cibos, præpollenti humorum uitio respondentes. Ceterum siti pressos inextinguibili, unde etiam mortem oppetierunt, noui qui uiperas dipsadas aliquando uorassent, item qui uino ueteri sese inebriassent, item nauigantes, qui ob aquæ potabilis defectum, marinam bibere ausi, interierunt. Verum sitim in febribus placare solet, fons capitis ex oleo frigidissimo, uel rosaceo, uniuersim superaccommodatus. Optime facit ad sitim nigra lactuca semen commanducatum, item glycyrriza appellata. adhæc cucumeris semen in ore retentum. Datur etiam ad sitim hoc catapotium. cucumeris domesticæ drachmæ octo, tragacanthi drachmæ quatuor, tragacanthum soluitur ouorum crudorum ætentiū albumine. & cum fuerit dissolutum cōtritumq;, cucumeris semini prius leuigato adiungitur. Postq̃ emolieris, pilulæ formantur, in umbraq; siccantur, ex his una sub lingua tenenda exhibetur: humor paulatim salina solutus deglutitur. Iam dilutum malorum cydoniorum, uel pitorum, uel mēspilorum, uel pampinorum uitis, uel mali granati succus sorbitioni datur.

De lingua scabritie. Cap. XXXIX.

Humectanda est linguæ scabrities, lini seminis decocto ægris in os dato. melius autem facit myxa cum lini semine incocta, ac digito in hunc succum demerso lingua infricata, aqua puriore abluitur. uel spongia abstergitur. deinde rosaceo illinitur, iam ipsum rosaceo melle temperatum; in id ualde efficax est, & portulacæ succus in ore retentus. item rhuobsoniorum mullæ admistum bene facit. insuper Damascenæ, & myscion (hoc autem est myxa) ore retenta & linguæ circumdata. His adde etiam lactucæ cauliculum. Archigenes autem tradit etiā salem indicum, colore quidem & substantia communi similem, gustu autem mellitum, lenticulæ instar, uel plurimum ad fabæ magnitudinem deuoratum, uehementer posse humectare. Cæterum in latus decumbere prodest, nam supinus cubitus exicat: item os conningere. hiatus enim madorem absument. Sternutamenta porro accersita, linguas quouis alio plenius humectant.

De nausea. Cap. XL.

Cum sine cibo assumpto nausæbundus æger efficitur, cuius licet, arbitrari ratione inueneri prauos humores uentriculum obsidere. Nonnulli uero turbantur, sed nihil enomūt, humore ipsis tunicis imbutis. Pituitosos itaque succos concoquere oportet, seruando ægrum in quiete, inedia, & somno. tenuiores uomitus eiicit, qui nonnunquam ex pituita cremore, uel mullæ excitatur. glutinosi humores & crassi, attenuantia desiderant: quod genus est oxymel, & similia. Humiditate autem praua tunicis impacta, picra ex aloe utilis est. uerum quæ astringunt, haud mediocrem noxam conciliant, quemadmodum rursus, cum humiditas multa citra malitiam inest, astringentia quidem q̃ utilissima sunt: medicamentum uero ex aloe in mātorem perducit. Cum uero frigiditas humori adest, astringentibus misceri etiam debent calefacientia. Nota est frigida affectus, quod neque sitim, neque ardorem eo deſtenti experiantur.

De bilis uomitione. Cap. XLI.

Bilem uomentibus cataplasma applicandum est ex palmulis, malicorio, galla uino incoctis, uel posca, pane simul contrito: Item acacia, hypocystis, balauſtium, & rhu cataplasmati adiungantur. Præter hæc cucurbitula admodum magnifice auxiliatur, cum largiore flamma. cibum uero frequenter paulatim dabimus. In his autem qui atram bilem uomunt, & inflationes stomachi experiuntur, spongas aceto quàm acerrimo

rimo calente madidas imposito, vel hederæ folia uino incocta illinito.

De singultibus. Cap. XLII.

Singultus oritur uel ex repletione, uel inanitione, uel succis acrioribus stomachum erodentibus, quibus per uomitionem redditis, cessat. Plerique uero medicamentum diatrion peperon assumentes, si statim uinum superbiberint, singultiunt. Quod aut nonnulli et cibo intus corrupto singultu infestentur, cuiuslibet notum est. Iam non pauci rigore correpti singultiunt. Vomitus itaque, iis qui ex repletione, aut rosione stomachi singultu cruciantur, mederi abunde comperimus: calida uero, iis qui ob persfrictionem. At quum ab humorum repletione, singultus originem habuerit, violenter indiget euacuatione, quam sternutamentum præstat, ob inanitionem creati singultus, sternutamento non finiuntur; datur aut singultiuicibus ruta cum uino, uel nitrum in mulla, uel selesi, uel daucum, uel cyminum, uel gingiber, uel calamintha, uel nardus gallica. Hæc sane singultus ex ciborum corruptione, aut frigore, aut repletione contracti, auxilia sunt. qui autem ex frigidorum uiscosorumque humorum copia singultu experiantur, castoreum tribus obolis potui sument ex posca, idem cum impositum una cum oleo ueteri sicyonio adiunat. Insuper acetum scillites, uel oxymeli potum conuenit. denique spiritus retentio, presens est remedium.

De aluo in febribus astricta, & citæ. Cap. XLIII.

Quæ arefcentem aluum præritant, libro priore quantum res exegerit comprehendimus, quoniam uero eadem quoque liquida febribus incidit, in præsentiarum mentionem ipsius facere oportet. Multi enim non febris ratione, sed ob hoc solum accidens in perniciem præcipitati sunt. Principio igitur excipiemus que egeruntur, nullo remedio occurrentes à corruptione & cruditæ emanantibus. Sin autem uacuatio modum excedat, cohibenda aluus est, & si quidem actiora efferuntur boni succi esse, & alioquin crassioris conuenit, quæ assumuntur. huiusmodi existunt ex chondro, & prifana sorbitiones, balneæ his postquam morbus ematuruerit sunt idonea. Cum uero pituitosiora & fluida erumpunt, contra sicciore calidioresque cibi erunt, quatenus febres permittant. Huius generis habentur, quæ ex panificijs calefacientibus consunt. Balneis hi prohibendi si nihil aliud compulerit. Porro ubi concoctrix facultas infirmatur, astringentibus tum cibis, tum remedijs utendum est. cibis sane, in quibus maxime malum granatum, aut poma, aut pira, aut mespila sint iniecta, uel etiam hispis, & uino tenui odorato astringente reme-

dijs autem, cataplasmatibus, nimirum ex polente, palmulis, absinthio, rosis, myrtis, & consimili materia. Cæterum considerandum uenit, quibus potissimum particulis cataplasmata debeant imponi, dico autem stomacho, aut imo uentri; non nunquam & circa lumbos applicamus. Cruentas autem excretiones reprimunt ex thure confecta, desiccantque, uel pollem polentæ, uel farinæ, uel thus, uel manna uino macerata, uel posca. Porro actiorem humiditatem etiam iniectione per aluum, edulcare competit, nunc ipsa aqua, nunc prifana cremore, uel chondri, uel oxyæ, uel tragi, idque non semel, uerum sæpius. Postea uero adiunguntur etiam rosæ sicca, uel myrti, nonnunquam & gallæ, & ouum simul cum rosaceo uino que tenui astringenti, uel rosarum decocto inditum; uel sedi quoque appositum excernendi cupiditates retundit. Cum frequens desidendi est appetitus, agatium sedi accommodatum ex calidis pissamentis immittatur.

De sanguinis distillatione, & eiusdem ex naribus profluio. Cap. XLIII.

Quoniam distillatio totius corporis, aut capitis redundantiam innui, per extusionem, uel densitatem eueniens; largior autem excretio habilis est laxare & minuere copiam. ratioque est inde ipsam moliri, unde natura præclinauerit. his ego consideratis ausus sum in quartanarum distillationibus scalpello, ut mos est, narium uasa conuulnere, oportet autem non exiguo fluore contentum esse, sed pro uinitibus derrahere. Spontanea in febribus per nares sanguinis profluvia, si in crisi sunt, excipere conuenit. sin autem sanguis immodice erumpat, sistere conandum est. Primus itaque extremæ partes ualide deligabuntur, æger sublimi capite figurabitur. Videtur etiam præputij deligatura sanguinis peculiariter ex naribus profluvia cohibere. æger non expurget narium foramina, neque irriter, uerum sanguinem concrecere sinat. nasis spongia, quæ in posca maduerit refrigerat, ac obturamen ex linimento naribus profluentibus demittatur, medicamento quodam ex eis quæ sanguinem comprimunt, inuncto; horum materiam, & reliquam locorum affectorum curationem libro subsequenti uerbosius persequemur.

Si anima deficiat. Cap. XLV.

Qui ex cholera, alui profluio, alijsque multis, & uniuersim factis uacuationibus, resoluuntur, iis aqua frigida aspergitur, & nares comprehenduntur, os uentriculi infricatur uomitus præcipitur, stomachus turbatur, uel digitis immisissis, uel pinnis. præterea pluribus uinculis ualide deligari debet. Cum per imas partes

ticulas uacuationes fiunt, manus: cum per superiores crura. Caterum sanguine fundebus prospicienda est figura sine dolore sublimis, & cucurbitula defigetur, quæ particulas retrahat contrario uacuationem experientibus modo. Curat etiam uinum aqua temperatum resolutiones ex subitis uacuationibus ortas nisi uiscerum inflammatio, aut uehemens capitis dolor, aut attonitus aliquis affectus, aut febris ardens, in efudo morbo prohibeat: in his siquidem magna uinum adfert incommoda. Et si ætas fuerit, calidiq; temperamenti æger, ac frigida assueuerit, frigida exhibebitur, sin contraria euerint, calida. At si ex sudoris copia animæ deficiunt, cutis desanda est; quemadmodum à nobis prius est dictum. Tu ut frigidus aliquis perflatus accedat, prospiciendū est. Porro in uentriculum defluxionibus nihil horū cōuenit, præterquā ipsi uentriculo stomachoq; corroborantia admoüere, & affectos in balneum ducere. Hoc siquidem illiusmodi fluoribus est accommodatissimum, uerum sanguinis profluvia, & sudores uehementer proritat. Qui ob plenitudinem animo destituuntur, uino ciboq; abstinebunt, item balneis, si febricitent. Potio autē multa datur, in qua uel thymus, uel origanū, uel pulegiū, uel hyssopum sit incoctum. Propitiū uero ijs est & oxymeli. At si propter humores uitiosos in stomacho cōtentos anima defecerit, iubedi sunt uomere ab hydrelæo, digitis, aut pinnis in os demissis. Sin autem uomere nequeant, oleum q̄ laudatissimum ipsis propinabitur, hoc enim & aluo ex inferioribus partibus ifusum, subinde uacuat. Iam uero absinthiū ipsis auxiliatur. Porro si propter stomachi imbecillitatem dissoluatur, ijs uti expedit quæ firmando ipsi sunt: ueluti ante in capite de eodem comprehensum est, summaq; per fricare oportet. Exusti in sole ad balneū ducuntur, qui perfrixerunt, medicamen diatrion pipercon,

iplumq; piper assumāt. Qui uero ob caliditatem largiorem, æstumue, aut lentā in balneo moram, animo deficiunt, curantur frigida aspersa, aeris perspiratu, stomachi frictione, uini cibiq; usu. Sin autem propter inflammationis magnitudinem, aut febris malignitatem in accessionibus animus deliquerit, perfrigescentq; artus, fricare ualenter iubeto, fouere & deligare. Ad hæc uigiliis inedia quæ præcipito. Ea uero & ante accessione facienda sunt. Quibus ob siccitatem anima deficit, duabus tribusue horis ante accessione, cibus offertur, uel chondri cremor, uel panis ex aqua simul cum mali granati nucleis, aut pomis, aut piris. Si autem magni periculi metus sit, etiam uinum dabitur. item ijs qui subito animam perdunt, his remedijs succurrendum est, ac ubiq; causam considerare conuenit, propter quam animæ defectus accidat, atq; contra hanc pugnandum est. Nō nunquam uero & symptomatis maior habenda est sollicitudo, nempe cum periculum, uel etiam mortem minatur.

Quomodo ulcus circa os factum proueniens curetur.
Cap. XLVI.

ET hic affectus, febribus potissimum lentis, ex diurno decubitu superuenit. Cum itaque sacri oris regio incipit rubescere, circulum ex lana iustæ magnitudinis, parti subijcimus, postea rosaceum, uel myrteum ceratum, quod argenti spumam, aut cerulam habeat, super accommodabimus. Inflammatione autē ob orta, cataplasma ex pane cum solano, uel polygono, uel arnoglossa, uel tenera brassica applicatur. Si ulcus serpat, lenticula cū malicorio illinitur.

FINIS.

ALEXANDRI TRALLIANI LIBER DE FEBRIBUS.

IO. GVINTERIO ANDERNACO

Interprete.

De Febribus

Cap. I.



Cum postulaueris à me charissime Cosma, ut curationes, quas in diuersis morbis frequenter sum ex pertus tibi exponerem, non grauate obtēperauī, ut qui fatear in re me gratiam utrisque, & tibi, & patri tuo pro beniuolentia, quam subinde mi-

hi benigne præstitistis, debere. Hic enim protinus ab initio non in artis modo operibus, sed etiam in uniuersis uitæ negotijs commodus mihi fuit administer: tu uero cum apud Barbaros, ne utiquam me propter casus euentusq; rerum quæ nos urserunt negligendum censuisti. Quare etiā senex in posterū uobis morē gero, & cum nō amplius

plius laborē ferre possim, librū hāc cōscribendū. & experimenta, quæ longo usu, atq; exercitatione in hominum morbis à me sunt comperta, in cōmentarium redigenda petui. Oblectabit autem non paucissimos, qui hāc citra inuidiam inspicere voluerint, accurata ista docendi ratio, breuitatq; simul & perspicuitas dictionis. Studui enim quantum licuit, uerbis uti communibus, magisq; perspicuis, ut etiā vulgaribus liber esset dictione ipsa facilis & explicatus. Exordium itaque à Diarjjs febribus sumemus, diuinissimi Galeni doctrinam pro uiribus hic quoque imitantes.

Quod sane Febris essentia, substantiaq; & natura nihil aliud sit, q̃ tum cordis tum arteriarū calor naturali contrarius, à præstantissimis medicorum, Galeno potissimum, & Hippocrati est demonstratum. Quare huc Erasistrati opinionē adducere, Asclepiadiq; & aliorum medicorum chorū, superuacaneū existamaui. Quod autem rationi consentit, febriū à corde potius quam ab alia corporis nostri particula proficisci, multis licet argumētis colligere. Si quidē febris natui caloris est mutatio, natuius autē calor in corde existit, cōstat etiā febriū in corde sedē habere. At quoniā febris est nō solus absolute calor naturalē contrarius, sed in materia quadā subsistit, materia vero triplex genere in nobis habetur, manifestū est, q̃ febris quoque in tribus cōsistere materijs cognoscitur, in spiritibus nempe, humoribus & solidis particulis. Si igitur spiritus immutatus fuerit, febriū parit ex illo proveniente, quā Græci Ephemerū, nos Diariā appellamus: si autem humores, eā quæ putredini fertur acceptā: si uero particule solidæ, Hæcticam efficiant. Dicamus itaque de ynagūq; quid sit, & quomodo species eius dignosci optimeque possit curari. Exponemus autem primum Diariam, utpote omnium simplicissimā, quæq; simul uniuersis magna ex parte hominibus superuenire consueuerit.

Diariarum nota.

Febres Diariæ cum ex spiritibus habeant originem, nihil stabile, neque firmum continent, sed uti celeriter generantur, ita etiam soluantur. unde & Diariæ uocatæ sunt, ad unum usq; diem, aut paulo diutius interdum durantes. Notari uero ipsæ hoc pacto debent, ex tactu, urinis, & præterea etiam pulsibus. Ex tactu enim caloris copia nobis innotescit, cum is sola quantitate increuerit, ut spectare licet etiam calorem, qui in balneo excitatur. Ex urinis autem quoniā his per initia morbi manifestas concoctionis notas repræsentant, quod in nulla aliarum febriū inesse solet. Ac pulsus harum celsæ arteriæ & eleuatam diastolē tardiores uero systolen obtinent. Nam refrigerium magis quam recrementorum expurgationem requirunt. Iam eiusmodi febres statim quoque habent æquabiliorem, & declinationem, quæ

in purum interuallum, perfectamque integritatem definat. Habentur autem aliæ quoque notæ febrium, quæ ob spiritus constituntur, uerum hæc quoq; abunde speciem febris declarare uobis, & alijs à febribus possunt secernere.

Diariæ curatio.

Diariæ febres cum communem habeant generationem quantum ad ipsas attinet, communem quoque curationem recipiunt. At quoniā non una earum causa, sed plures, & uariæ esse solent, de his dicendum arbitror. Etenim lassitudo, frigus, repletio, inedia, uigiliæ, ciborum in uentre corruptio, ulcera & omnes (ut ita dicam) antecedentes causæ, hæc eō febres produciunt. Quandoquidem igitur non una febris Diariæ efficiens causa existit, sed plures, conuenit etiam, ut nos non paucas quasdam curationes, sed cum plures unicuique speciei conuenientes exponamus.

De his qui ex lassitudine febricitant.

Qui ob lassitudinem febricitant plerumque medicos non expectant, sed statim ubi febriū declinasse senserint, ad balneum proficiscuntur, tanquam à natura quadam edocti optimum præcipuumq; remedium esse defatigatis lauacrū. Hoc aut pleriq; etiam medicorum inconsiderate faciunt: & nulla ratione habita ad lauacra transmittunt, unde interim non paucos insigniter offendant. Si namque corpus recrementis uacuum, neque plethoricum, aut uitiosis obnoxium succis inuentum fuerit, maxime iuuantur, nec alterius indigent curationis. Quibus autem corpus omnibus ex æquo succis scatet, plethoricum appellat, & uitiosis infestatur, quod cacochymum dicitur, putrediniq; est opportunum, ut hinc non modo spiritus, sed humores quoque antea incaluerint, uice uersa plurimum offenduntur, & in febres putridas prompte incidunt, præsertim si uictu uisi sunt minus curiosi. Ne igitur idem nobis quod illis accidat, primum notas earum persequi oportet. Nonnullæ igitur earū sunt exquisitæ, nonnullæ uero nō exquisitæ, cū sint, in putridas prolabantur. Ita nanque & lauare, & nutrire probe & non lauare rarius bona ratione poterimus.

Curatio eorum qui ex lassitudine febricitant.

Quoniam ex lassitudine febricitantes diligenter planè humectandi sunt, & refrigerandi, fiet id cōmode balneis teporatis, uictu, & unctionibus, quæ nullam discutiendi uim obtinent. Nam in his omnia facere oportet, quæ humiditatē potius augere, quā ex corpore auferre possūt. Quare neq; corpus multū perfricare, neq; tepida ex solo oleo unctione, sed ex hydreleo magis uti oportet. Quippe id liberalius, quā ipsum oleū p se humectat, & pe-

nitijs in corpus ab aqua transmittitur refrigerat
que articulos exalfectos & feruidos ex nimio la
bore affectos. Quo circa neq; vngere in aere cali
do neque perfricare conuenit, sudoribus enim
manantibus ne humectare quidem prorsus un
ctio poterit, ut quæ cum eis à corpore decingat.
Præstat autem meo iudicio multa tepida sudorē
elucere & ægrotantē in exteriorem domum egres
sum strigilli abstergere atque ita hydrelæo perun
gere, deinde exiguo spacio interposito intrare ip
sum, & in calentijs aquæ solum descendere ita ut
neque integram omnino horam in aere perseue
ret, sed tantum transire uideatur. Sic enim hume
ctabitur, & metuēdū non erit, ne perustus incen
susque ab aere, aliā rursus febrem acquirat. Hęc
sane medendi ratio omnibus ex lassitudine febricitantibus conducit, præsertim ijs qui calidiore
sunt temperamento. Ignoro igitur, cur Diuini
simus Galenus oleo quidē tepido duntaxat vsus
fuerit, aquam uero ei miscere uitarit: licet enim
& frigidam ei aquam, præterea etiam tepidam
admiscere. In summa, ut cuiusq; temperamentū
est, calorisque & siccitatis ex lassitudine ortæ ex
cessus, ita quoque unctione utendum erit. Quod
si uero iterum rursus lauare ægros uolueris, eodē
modo perungere, & in calidæ solum de
mittere, & in eo, aliquandiu immorari ualde qui
dem ipsos hac ratione iuuabis, ut reuersi à balneo
lassitudinis omnisq; intemperiei prorsus obliui
scentur. Atque hac ratione etiam in ijs utendum
erit, qui ex uigilijs febricitarunt, item qui ex mœ
rore: & in illis qui ex morbo se recolligunt. Re
stat nunc, ut de his sermonē instituamus, quibus
cruditas superueniens febrem Diariam excitauit.

De his qui ex cruditate febricitant.

Cruditas ex caliditate, magis autem ex frigida
intemperie generatur. Notatur facile ex ructu,
nidoroso quidem in his, quibus caliditas crudita
tem induxit, acido uero, quibus frigiditas illam
peperit. At non solum ructus, sed etiam aliz om
nes notæ attendendæ sunt ætas inquam, tempera
mentum, studia uitæ, & reliqua totius uictus ra
tio. Neq; enim si ructus est nidorosus, calidam
iam quoque cruditatem esse prorsus suspicabi
mur. Interdum enim ex ingestorum etiam quali
tate fuit excitata, uel cum ægri ipsi nidorosum,
aut melleū quid in cibo antea assumpserit. Quin
nec acidus ructus omnino suspicionē nobis præ
bet, ut frigidam intemperiem dicamus, quippe
etiam acidus cibus, & acerbus frequenter effecit,
ut ructus acidus appareret, interim uero calidi
tas quoque, nam acidus ructus nō solum ex frigi
ditate, sed calida etiam intemperie generatur, fie
rique non potest, ut eiusmodi cesset ructus, nisi
quis refrigeratē & humectantē uictu usus fuerit.
Conuenit igitur cruditates ex omnibus iam com

memoratis internoscere, atq; ubi sic discretæ fue
rint, firmam earum curationem aggredi.

*De ciborum corruptione ex caliditate, & nidoroso u
ctu proveniente.*

Qui sane ex caliditate ciborum corruptionē
nidorosamque cruditatem sustinuerunt, eaq; de
causa in febrem Diariam inciderunt, ijs non cale
facientes cibi, aut potus adhiberi debent. Et si
enim exiguo tempore mitigari, leniriq; uidebua
tur, flatibus qui infestabant, dissipatis, postea
tamen occasionem præbent, ut febris Diaria ma
gis incendatur, interim uero, ut etiam febris, quæ
ex humorum putredine oriri solet, rursus subse
quatur. Ne igitur hæc ueniant, congrua uictus ra
tio præscribi, & curatio quæ ē contrario repu
gnet, adhibenda est. Quippe fieri nequit, ut affe
ctus qui infestat, ex toto conquiescat, & ueluti
radicatus excindatur, ubi causa quæ ipsum efficie
bat, prius non fuerit sublata. Quare si tibi cibus,
qui ad nidorosam cruditatem inclinauerit, su
spendere adhuc in uentriculo uideatur, tūc potio
ni aqua calida potissimum est sumenda. Hęc nan
que partem humorum eluere, abstergere, & ad in
feriorem uentrem propellere, partem uero ut in
corpus etiam distribuatur, præparare, & præterea
spiritum iam siccum, incensumq; temperare, &
lenire, meatusque laxiores efficere potest. Haud
nouī, an quis hoc præstantius remedium ijs qui
ex calida intemperie cruditate laborarunt, coq;
in Diariam febrem inciderunt, excogitare possit.
Quod si uero cibi corrupti non in uentriculo hæ
rerē tibi uideantur, sed per aluum egeri, rursus
hic non solum non impediri, sed etiam adiunari
debet, quo ea quæ corrupta sunt, per uentrem
potius queant excerni, sin autem immoderatus
per aluum ferantur, rodantq; intestinum, etiam
hic ad balneum ægros ducere conuenit, & uen
tris iecorisque regionem potissimum uino meli
no perungere, & panē ex aqua calida nutrire. Por
ro iniiciatur in eam & apij & coriandri radix, ue
rum apium nō multum in ea effernescat, sed pro
tinus, antequā in calida ualde maceretur, auferat
tur. Si uero caliditas, aut inflammatio quæpiam
uentriculum obsederit, neq; radix apij, sed cori
andri tantū immitti debet, uel ossa panis calidæ uic
rum, aut tertio intincta esui per se exhibeatur. At
si uenter copiosius profluxerit, ut deinceps uires
debilitentur, etiam omphaco meli, aut hydrome
lum, aut hydrososatum dabitur. Sin autem nulla
inflammatio uentriculi os obsidere uideatur, uini
Cnidij, aut Sabini quod exiguam habeat astric
tionem, momentum propinari ipsis debet. Sin
uires nullam noxam expertæ fuerint, caue ne ui
num permittas, præcipue calidiore temperamen
to præditis. Si nanq; nidorosa cruditas ex calore
acciderit, constat magis eam in calidioribus au
tum

Etum iri; si uino uti uoluerimus. Ac mirari mihi subit, quomodo diuinissimus Galenus in opere de medendis morbis calefacientibus remedijs usus appareat. Nam antidotum quod à triplici pipere Græci diatrion pepereon appellant, & illud quod ex malis cotoneis paratur, exhiberi ipsis permittit, extrinsecus autem rursus uentriculo purpuram nardino, absinthio, & mastiche imbutam; applicare. Atque hæc calida imponere iubet, ne uentriculi robur dissoluatur. Ego uero ea ne utiquam calidiore affectu presis cōuenire arbitror. Atque hæc nequaquam dico contradicendi studio, sed quod ita mihi ueritas habere uideatur, quam semper cuius præponendam censeo. Si enim nidorosus ructus, & cruditas à caliditate prouenerit, conueniebat, uti arbitror; contrarijs hanc remedijs moderate utentes, ita medicari. Sin autem à calidioribus pinguibusq; cibis orta fuerit, etiam sic uictus cōtrarius, qui modice refrigerare possit, iniungi debebat. In summa didicimus, omnia quæ naturam excesserunt, contrarijs curari oportere, & rutaceum oleum, & si quæ alia est calida iniectio; adhibere dissuadeo; atq; hoc cauendum est, in quibus corruptio & febris ex calida intemperie sunt subsecutæ.

De his qui ex cruditate febricitant humore magis acido proveniente.

Hactenus de his, qui ob nidorosum ructum febricitarunt egimus. nunc autem dicamus etiam de illis, qui ex frigida intemperie in cruditatem inciderunt. Acida cruditas non adeo celeriter febrim solet accendere. si uero etiam febrim excitare contigerit, perpende, & disquire, num quando que etiam calida intemperies acidum ructu procrearet, sit enim interdum, ut is non solū ex frigore, sed etiam ex caliditate frequenter oboriatur. Idem siquidem in externis quoq; uidemus. Accidit enim in calidis pariter, & frigidis admodū domicilijs, ut uinū nonnunq; in acidum cōuertatur. Similiter aut in fermento quoq; idē spectare licet; hoc etenim in calidioribus retentum domicilijs, in acorem mutatur, idem uero experitur, ubi à gelido aere fuerit refrigeratum. Quare uinum idemq; accidens à contrarijs causis generatur. Attendere igitur oportet signa, tum presentia, tum quæ præcesserunt, ut ex omnibus possis cognoscere, quæ tandem sit causa, calida ne, an frigida; atq; ita ad curationem uenire. Quare si acidus ructus ex caliditate prouenerit, refrigerantibus, & potu, & cibo uti conuenit, præcipue his, qui resistere possunt, & non facile corrumpi. Quapropter neq; cremor ptisanæ, neq; halicæ ipsis est exhibendus, facile enim corrumpuntur, & in stomacho supernant, suspendunturq; unde etiam accidit, ut ipsis magis accescat. Itaq; pisces, qui dura carne sunt præditi, his expediunt, & gal-

linæ ex decocto, aut simplici iure paratæ, adhæc Illicia similiter dura, cuiusmodi sunt, quæ ex buccino, & glauco, orphoq; pisce potissimum conficiuntur. Nec mireris quod hæc dicam, qui namque ex calida intemperie acores experiuntur, eos etiam si pedem bubulum exhibeas, nō offendes, immo adiuuabis quoque. Ego sane noui quendam cum longo tempore acorem experiretur, his medicis perlanasse. præterea etiam ostrea non cocta, & duracina exhibui, omniq; alimento quod refrigeraret, ægre corrumpereetur mutareturq; sum usus.

De acidoructu, qui ex frigida intemperie nascitur.

Quod si acidus ructus nō à calidiore, sed frigidiore intemperie originem traxerit, tunc potius uictus calefaciens, & antidota conueniunt, cuiusmodi sunt tum quod ex malis cotoneis cōficitur, tum quod à triplici pipere Diatrion pepereon nominatur; adhæc fomentum ex nardino. Quæ igitur diuinissimus Galenus in nidoroso ructu fieri præcepit, ea ego omnia ijs potius, qui ex frigida intemperie cruditatem sunt experti, conuenire, & non aliter habere posse arbitror.

De febris diarijs, quæ ex obstructione generantur.

Febris Diaria ex uiscosis etiam crassiq; humoribus nascitur, dum nimirum excrementa propter meatus occlusos nō perspirant, fiuntq; acriora. Aduertere igitur animum hic, & internoscere oportet, sola ne copia, an crassities sola, & humorum lentor obstructionem effecerit. Si enim copia pepererit, ante omnia sane per sanguinis missionem vacuatio tentanda est, deinde sic particularibus utendum præsidijs, quæ laxare, discutere, vel extenuare possunt. Nam si vacuatione omissa laxantibus quispiam, aut discutientibus uti uoluerit, malorum magnorum autor erit, quippe obstructionem multo adhuc maiorem reddet, discutientibus ante concoctionem, aut euacuationem vltis remedijs. Quod si non copia, sed uiscosi crassiq; humores obstructionē procreauerint, sanguis mittendus non est, sed decoctis potius quibusdam utendum, quæ extenuare possunt, ita ut non calefaciant, nec inspergere oportet, quæ uulgares medici temere audent, ut serpillum, aut calaminthem, aut hyssopum, aut organum, aut rutam his adhibere, ignari quod multo magis offendant, quā iuuent ægros. Et si enim materiā attenuare non nihil uideantur, alia tamen ratione offendant, dum febres reddunt aciores. Quare illa potius querere conabimur, quæ abstergere & attenuare citra caliditatem nouimus. Hoc autem in numero habetur oxymeli, quod & generose abstergit, & febres non exacuit. At qui nec hoc in omnibus uerum existit. In quibus enim occasio-

nem morbi crassa recrementa præbent, quæ & ob-
structionem excitant, & febrem accenderint.
Diarham, à calore, aut siccitate crassitiem & lèto-
rem consecuta, quemadmodum id in rebus plus
æ quo coctis, aut affatis nimium fieri cernimus, in
his oxymeli exhibendum quoq; non est, neq; ue-
ro in quibus siccus est temperamentum, aut mor-
bores quidam, aut lassitudines, aut ira, aut soli-
citas, aut uigilæ præcesserunt. Etsi enim talia
non admodum calefaciant, tamen siccando mate-
riam adhuc magis crassam faciunt, quam, ut arbi-
trantur, attenuent. Quæ enim à siccitate coacta
fuerint, & crassiora quam prius euaserint, nun-
quam eiusmodi siccans aliquod medicamentum
attenuare potest. Ego siquidem in huiusmodi tẽ-
peramentis subinde spectavi, quod oxymeli cui-
piam propinatum, pro eo quod urinas prouoca-
re debet, retentionem potius, & obstructio-
nem materiz pepererit, ut hinc etiam febres ma-
gis fuerint auctæ. Verum cum uulgare, isti cau-
sam ignorent, ad alia eam referunt. Quapropter
illis tantum exhiberi debet oxymeli, in quibus
cruda crassaq; & frigida recrementa hærent, ad
hæc qui pituitoso & frigido sunt temperamẽto,
in quibus etiam cruditates, replètiões, & ocio-
sa potius uita præcesserit. In his nanq; ipsis ido-
neum existit, & si quid uiscosum in hæret, & cras-
sum, à frigidis cibis, aut potionibus collectum.
Ex omnibus autẽ alijs quæ medici ipsis in balneo,
ad extergendam cutem, ut saponem, mel, & a-
phonitru præcipiunt, hæc magis attenuare, & mea-
tus obstructos liberare possunt. Veruntamen in
calidioribus temperamentis non solum ab oxy-
melite, sed alijs quoq; decoctis, quæ siccare, aut
calefacere possunt, abstinendum censeo. Victu
autem utendum humido magis, & tẽperato qui
nihil siccum, & acre in se habeat. Quare pituitosa,
& foris & intus est eis aptissima, ut quæ præter-
quam quod humectet, etiam absterforium non
nihil, & attenuatorium obtineat. Admisceatur
autem ei apomelitidis paululum, nam id quoque
absterforium quippiam citra ullum calorem pos-
sident. Iam pisces hisce cõueniunt, quippe alimẽ-
tum inde proueniens, & probe concoquitur, &
nequaquam meatibus inhærescit, adhæc gallina-
rum cohortalium alæ, & lactucarum caules, inty-
bi, & troxyma. Hæc igitur uictus ratione illi fuisse
mandati sunt, in quibus recrementa terrestria ma-
gis, & crassiora quam fuerint, à calore facta sen-
suerint. Sin autem nihil tale fuerit, pituitosiora ue-
ro ea tibi appareant, quæ obstructionem excita-
rent, tunc confidenti animo etiam decoctum apij,
anisi, adianthi, & oxymeli non modo simplicius,
sed etiam compositum propinato. Nã in frigidio-
ribus tẽperamentis, & in quibus materia pituitosa
est, & humidior, in his id quod à diuinissimo
Galeno dicitur, uerissimum existit, nempe quod
oxymeli tum obstergiu generose, tum febres non

exacuit, in naturis autem biliosioribus, & magis
melancholicis rarissime exhibendum. Porro quod
in uiribus iam magis debilitatis nullus eo uti de-
beat, id quoq; ijs constare arbitror, qui Hippocra-
tis scripta didicerunt, & experientia quoq; pene-
perunt, quod uim etiam radendi intestina obte-
neat. Multas siquidem noxas, & incommoditates
continet. Ac diligenter is, qui uelit aut oxymeli,
aut herbarum decoctum, aut aliud quoddam in-
cisforium curationis gratia exhibere, tum faculta-
tem eius quod propinatur, tum quantitatem, tum
qualitatem, tum ordinem, tum ne temere, & in-
distincte in omnibus utatur remedijs, diligenter
cognoscere debet. Hoc enim ad præstâtissimum
quemq; medicum pertinet, ut omnia perquirat,
curiosèq; examinet, & præsidia considerare di-
stincte q; admoueat.

De febribus ex putredine creatis.

Cap. II.

Q Vòd omnes febres continentes ex mate-
ria quæ eas incendit, intra uasa subsisten-
te, & putrescente generantur, omnibus in-
confesso est. Atq; idcirco etiam continuationem
habent, neq; rigorem mouent, qui in externam
cutem feratur, sensibilisq; particulas rodar, ut in
his quæ intermittunt, fieri solet; unde in continen-
tibus, si inquit, rigor superueniat, bonum est in-
diciu. Atq; hoc in ardentibus, quas Causos gra-
ci appellant, etiam uidere licet. Docuit autẽ nos
id quoq; Diuinissimus Hippocrates, ubi ait; si
qui ardente febre laborat, rigor superueniat, mor-
bi solutio expectanda est. Porro sunt nonnulli,
qui etiã febres intermittentes intra uasa consiste-
re, quæadmodum & continentes arbitrentur, ac ni-
hil prorsus loci, sed quantitatis & qualitaris ratio-
ne differre. Etenim in continuis, & multam, & cras-
sam esse materiam existimare cõuenit, atq; ideo
neq; extra uasa euicti posse, intermittere uim uero
tenuiorem, & ut in externam cutem efferratur, ma-
gis idoneam. Porro huiusmodi etiam intermitte-
ntibus accidit, & materia extra uasa putrescit, uim
nam quoq; restantur. Quippe materiam ipsam,
quæ iam dudum computruerit, repræsentant. At
que hinc sane integra morbi tempora coniectu-
ra deprehendimus, quando sc. concoctionis in-
itium morbus habet, quando incrementum, & sta-
tum. Alij uero non de loco solum in quo consti-
tuuntur & generatione quam febres habent, dis-
sentiant, sed etiam de materia ipsa, unde procre-
antur. Nonnulli etenim in uniuersum febres ex bile
incendi dixerunt, cum febris res quæpiam calida
sit, & sicca, talis autẽ bilis quoq; existat ad gene-
randos huiusmodi affectus accommodata. Alij
uero ipsorum non bilem, sed pituitam causantur,
eo quod hæc rursus ad putrescendum obtrun-
dumq; non parum est idonea, cum humida sit &
crassa. Iam hoc quoq; nobis indicat ipsum pitui-

re vocabulum, quod Phlegma Græce dicitur, à verbo Phlegin, quod est inflammare. Nam Phlegma eo quod inflamet ipsum & calefaciat dictum est, atq; hoc sane palam est absurdum. Cæterum de humore melancholico nonnulli opinati sunt, nunquam ipsum febrem posse incēdere, eo quod frigidus ipse sit natura, & siccus, nihilq; habeat humidi, aut calidi, unde putredines generentur. Nihil itaq; mirum est, quosdam putare melancholicum humorem neutiquam plane putredine recipere. Non desunt, qui in uniuersum febrem nunquam à putredine fieri pronunciarint. Nam humores in uenis exardescere, non putrefieri distant. Si namq; hoc esset, inquirunt, cur tandem non etiam lumbrici, aut aliz quædam bestiz in uasis, si putrefactio est, gigni cernuntur, quemadmodum in uentre & alijs particulis? Quinetiā in externis omnibus hoc spectare licet, quod quæ putrescunt, variarum rerum species generare solent, quarum nulla unquam per urinas excerni uisa est. Dicendum igitur est putrescere, & incendi, ut uidere id licet in pice & bitumine, aut arundinibus, aut chartis alijsq; multis fieri, quæ prompte ab igni afficiuntur, incendunturq;. Sic igitur nonnulla etiam scintillam modicam nacta, magnam & immensam flammam excitant, ut nō solum uicina, sed etiam omnia longius sita combusserint. Tale quid etiam in nobis, inquirunt, accidit. Incipit enim spiritus inflammari, atque exardescere, non enim iam computrescere, ipsum quoq; dicendum est, quia nisi spiritus humectantia & refrigerantia, quæ ipsum temperare & mitigare possint consequatur, etiam uicina depascitur. Atq; ex his ipsis ille nimirum primus est, qui ad hoc magis idoneus inueniri poterit. Non solum autem de putrescenda in uasis materia, ut opinor, dissentiunt, sed etiam de putrefactionis modo. Alij siquidem ipsam ex calido & humido, nimirum humiditate fieri dixerunt, ad uetera, & putrefacta ligna respicientes. Sic enim res habere uidetur, ac puto utrosque uera dicere, fieriq; nōnunquam etiam putredinem ex siccitate, magis autem adustione. Nonnulli uero medicorum nullam prorsus in uenis putredinem fieri, sed magis in uentre existimarunt. Eius autem rei fidem faciunt tum ex uermibus, quæ in eo generantur, tum excrementis subductis, quæ & malum odorem, & ad putredinem nihilominus inclinationem repræsentent. indicant hoc quoq; uomitus, inquirunt, qui crebro tam perfecte febres exciderunt, ut æger non amplius malam accessionem sit expertus. Iam alios rursus à febris liberatos ex una & sola sorbitione, uel iniectione conspexisse, uerum nō ex his modo, sed alijs quoque multis accurate uidere licet, quod ueter etiam febrium ex putredine ortarum causa existat, forsitan autem aliarum quoq; fons, & origo ipse proprie existit.

Nota febris ex putredine.

In primis sane scire conuenit, febres quæ ex putredine oriuntur, non solū à præcedere causa, sed etiam ex Diariorum febrium degeneratione originē habere. Cognosces autem febrium degenerationē ex tribus hisce notis potissimum, prima sane est quod febris Diarie quæ præcessit, non in purum desinat interuallum; secundaq; status nō fiat ad tolerandum facilis; tertia quod status nō desinat madore, aut subdore. Hæc sunt indicia manifestissima, quod febris Diaria in putridam transierit. At in qualem febri speciem degeneratura sit, hac ratione, & coniectura colligere, & internoscere oportet. Si namq; pallidus eger fuerit uigilijs torqueatur, curis afficiatur, & ætate floreat, scito bilem totam Terrianam excitasse febrem. Sin autem albus, & uita ociosus existat Quotidianam esse putato, quemadmodum etiam si plumbei coloris, quartanam. Atq; hæc sane notæ sunt febrium Diariorum, quæ in putridas degenerarunt. Cæterum uero etiam generatim comitatur eas id, quod nulli aliarum febrium ad est, ut rigor, aut horror, aut frigus superueniat, præcipue intermittentibus. Nam in continetibus nihil horum euenit, uerum etiam si contingat, aut horror, aut rigor, in Semiterrianis tale incidit. Adhæc inæqualis pulsuum motus, & caliditas has potissimum sequitur, & quod multas re duplicationes, quas Græci Anadiplofes uocant, præcipue efficiat, imiteturq; columbarum sterminus, quod secundum putredinis successionem, ignem accendit, ac rursus conquiescit, lamrodæ qualitas & ipsa maximum febrium ex putredine ortarum indicium existit. Apparet etenim in Hæticis quoq; sed in alto magis delitescit, ex putredine uero ortis febribus rodens qualitas per extimas partes maxime percipitur, in super maxima & certissima nota est, etiam pulsuum systole citior, & urinarum cruditas, nā in Diarijs semper concoctæ apparent. Tantum etiam de febribus ex putredine internoscendis dictum sit.

De curatione febrium continentium.

Continentes febres solerti diligentia curari debent, subitoq; id faciendum, quo internotio dictauerit, siue sanguinis missionem, siue purgationem requirat. Maximum enim incommodum est, cum in omnibus morbis, tū uero incōtinentibus dilatio. Nam febres uehementiores redduntur, dum putredo augetur, & uires imbecilliores fiunt, ut quæ febrium magnitudinē non amplius ferre possint, neq; præterea magnorum præsidiorum aliquod ad curationem admittere queant.

Internotio.

Qui igitur sanguinis missione indigent, eos hoc

hoc pacto internoscere tibi licet, urinas habent rubras, turbas, & putridas, multumq; acres, oculos biliosos, & rubros, totum corpus graue, uenas latiores, & earum torulos quam antea, tumidiore. Ceterum etiam causæ quæ præcesserunt, humorem redundantem tibi indicabunt, præcipue uictus ratio. Nā ægri calidioribus magna parte cibis, potibus, uino liberaliore & magis uersuto, carnibus pinguibus usi deprehenduntur. Multi uero ex inedia, aut ira in continentes febres, quæ ob putredinem nascuntur, inciderunt, alij ob sanguinis uenarum in ano extantium hæmorrhoidas Græci appellant, retentionem; alij uero ob sanguinis copiam potius hæc habent indicia, nonnulli ex bile superflua pallidi sunt magis, & nigriores. Quando autem humores etiam plus æquo adusti fuerint, tunc ipsis urina adhuc magis pallida, & subinde nigrior apparet, & deiectiones similiter acres, & biliosæ. Hoc igitur modo humores qui redundant qualesq; sunt, cognoscere oportet.

Curatio.

Itaq; febres ex putredine, & sanguinis abundantia ortæ, uenæ sectione curari debent, non tamen minus etiam his, quia bile infestentur, sanguinem detrahes, siquidem turgens, ad purgationem idoneus, crassior, & copia tibi peccare uideatur. Nam perspiratu discutere materiam intus latentem, & putrescentem conducit, quippe minor efficitur, nec permittendum ut ea propter copiam, & crassitatem meatibus infarciatur, & putrescat. Quod si uenæ sectionem non possis ob uires ægri imbecilliores, aut quod is sanguinem dimittere metuerit, adhibere, tunc magis ad uictus rationem, quæ refrigerare possit, & humectare, nec non attenuare, & diffundere adeo citra calorem queat, respicito. Postquam uero hoc feceris, & materia multo minor, & concoctionis notas habere uideatur, tunc audacter aquam frigidam exhibeto.

De frigida potu.

Atq; id facies potissimum, si æger aquam bibere consueuerit, adhuc si nec inflammatio, aut scirrhus tumor, aut laxus, quod œdema dicitur, particulam quandam possideat. Si enim ex his aliquod apparuerit, aquæ potio uitanda est,

De inflammatione Erysipelacea.

Quod si inflammatio feruens, & Erysipelacea fuerit tunc frigida potum exhibere, ne tenta ueris. Prædicito autem id quod futurum sit, nepe quod feruor febris extinguetur quidem necessario, ipsa uero tota non prorsus discutietur, sed tempore aliquo procedente febris reliquæ ad-

huc supersites, tuto & particulatim dissoluentur. Ego sane noui aquam me frigidam alicui dedisse, qui Erysipelate infestaretur, ardentiq; & continua febris laboraret, ac uehementiam febris ex ea restinxit, eripuitq; petiolicis, dum fere exinde tempestinis cataplasmatibus, & inunctionibus interijssent, ut medici semper in omnibus solent adhibere.

Nota inflammationis Erysipelaceæ.

Sciendum est eos, qui ardenti febris laborant ob Erysipelaceam inflammationem magis quam alios sitire, uestimenta à corpore proijcere. Erit denique autem hoc est indicium, quod etiam tertio quoq; die accessiorem, ualidiorē experientur, & crementa per aluum biliosa, & sanies similis excreant. At qui in pulmone inflammationem Erysipelaceam sentiunt, non adeo uehementer sitiunt, sed frequentem magnamq; respirationem addunt, genas habent rubentes, linguam scabram & delirant, frigidumq; aerem magis appetunt, magisq; ab eo quam frigida potio iuuantur, quam ijs potius, qui in alia parte inflammationem habent Erysipelaceam, offerre continent, illis autem, quorum pulmonem hæc exercet, frigidum aerem, ut à quo etiam iuuantur, ad spirandum magis procurato.

De causis, hoc est, ardenti febris, falsa. Cap. III.

Scire hoc quoq; oportet, duas esse causas species, unam sane ueram, & exquisitam, quæ omnia commemorata habeat, sitim uehementem, deiectiones biliosas, linguam scabram, & nigricantem: falsa autem, & ipsa quoq; sitim adfert, sed non adeo uehementem, & intensam, neque linguæ nigrorem, neq; excrementum per aluum excremitur biliosum, sed magis corruptum, neq; amaritudo in gustu ex pituitoso humore solusq; potius superante percipitur, unde etiam periculosa magis est, quam febris germana. Quæ propter causas ueris exquisitisq;, cum à flaua excitentur bile, aquæ frigida potio magis conuenit, aliaque omnia, quæ refrigerare etiam ex infestata cultate, & actu possunt. Quibus autem ex pituita origo est, his frigida potio exhiberi non debet, ac nulla quæ actu refrigerant, uerum illa potius, quæ mitem calorem, tepidumq; soluta sunt, cuiusmodi existunt superfusiones etiam solæ, quæ ex lini semine parantur, subinde uero etiam quæ ex ordeacea farina aquæ incoctæ, cui chamæmelum, & melilotum adiecta fuerint, conficiuntur. Nam lintei lancei iuri herbarum, quas diximus decoctorum, intincti magis conueniunt. At clarum est, quod etiam oleum quoddam, cuiusmodi est chamæmelinum, rosaceum, & omphacinum, decocto recte accommodatur. Intelligendum autem est huiusmodi fomenta non solū falsis, sed etiam germanis

germanis causis conducere, falsis tamen amplius. Quæ enim & facultatē, & actū refrigerant, ea germanis potius competere, cuiusmodi sunt etiā Lexippyreta, quæ ex rosaceo parantur, quibus adiectus quoq; sit succus herbarum refrigerantium, coryledonis, oxalidis, lactucæ, atriplicis, portulacæ, plâtaginis, & aliarū cōplurium. Cum igitur differentias ipsarū notaueris, & materiem, unde accenduntur, ita etiā intelligito, quatenus refrigerare, & quomodo id quod corrumpitur, expurgare debeas.

Ad stomachum ardore aestuantem.

Quibus stomachus ardore aestuat, probe facit aqua frigida cum rosaceo subacta, & extrinsecus imposita, aut sesamum aqua maceratum, deinde cum rosaceo diligenter laugatum. Item ceratū rosaceum bene facit, cui admixtus sit portulacæ, & uuz accerbit succus pari portione. Sin autem totum quoque corpus ceratō inducto humectaueris, ualde commodabis.

Quomodo febres ex sanguineo humore provenientes notari debeant.

Febres, quæ ex sanguinei humoris putredine accenduntur, inde cognosces, quod mitis statim calor ad primum manus tactum percipitur, qui nihil abeat rodens, & acre, quale in febribus, quæ ex flaua bile plus satis adusta excitantur, deprehenditur. Apparet etenim in febribus etiam ex pituita putrescente creatis statim per initia calortum mitis, tum vaporosus. Sin autem quis manū diutius admoneat, paulo post rodens caliditas tactui occurrit, veluti per colum quoddam, aut cribrum sursum emergens. Vbi igitur febres ex sanguine oriuntur internoueris, statim per initia, ut dictum est, uenam secato, eos autem qui ex bile febricitant purgato potius, si materia tibi ad excretionem procliuus videatur, & febris quæ inuadit, vehemens non fuerit. Noui autem me etiam acuta laborantem febre purgasse, verum huiusmodi multā diligentemq; notationē, & animaduersionem requirunt, & medicum, qui animo fuerit confidenti. Abunde vero est, etiam sanguine duntaxat mittere, eo quod tutius efficaciusq; sit remedium, & refrigerante ac humectante uictu, atq; huiusmodi unctionibus in posterum uti.

De uictus ratione.

In omnibus sane pitisanæ cremor idoneus existit, sed in germanis quidem, & perurētibus Causis, quæ siti uehementi cruciant, etiam refrigeratum cremorem concedere oportet, accerata similiter parare ex aqua frigida, rosaceo, & refrigerantibus, in falsis autem, nequaquam, uerum suffi-

ciunt omnia tepida, & temperata, & nullum ex ijs quæ uehementer refrigerare possunt, habentia, porro lactucæ caules refrigeratas, oia, similiter quæ intybūm agrestem, & domesticum, & cucurbitas ijs qui perardenti febre laborant, omnia exhibere conducit. Oxymel uero his dari prorsus non debet, nec multiplicia ac varij generis omnia decocta, ut quæ grauiter febricitantibus omnia sint inimica. Porro si multis ægrum uigilijs consiliari acciderit, tunc ei antidotum, quod a papaueris capitibus Dia codyon Græcis appellantur, offerendum est. Quippe ubi denotatum fuerit, somnū inducit, & febrium uehementiam ardoremque obrundit. Quod si uero etiam falsis Causis ob uigilias, aut mentis alienationē ægro molestam, dare ipsam cogaris, eam memento apomelitidis ei admixto, exhibeto. Sic namq; metuendum non est, ne medicamentum frigiditate materiam reddat transibere. Ac rhodomeli & hydrorofatum aque mixtum, ac rosatum ipsum per se refrigeratum, ijs potissimum qui icteris ardorem sentiebant, me exhibuisse noui.

De balneo.

Lauandi sunt, qui feruida & perardenti febre laborant, in domo potissimum, ubi solium habeatur tepente aqua plenum, ut totum ægri corpus uideat; ab aqua operiatur. Non autem radiū ges ei aliā præterea neque omnino ipsam commouebis, ut quæ uires digerat, & conuellat. Quare neq; imbecillis admodum uiribus præditos in solio lauare conuenit, quod apud Romanos in solio demittere, dicitur, illi uero in id descendit, quorum uires dissolutioni & degestioni, quæ ex repida prouenit, obistere ac tolerare possunt. Tanrum de causis, & continentibus febribus dictum sit, putoque hæc abunde sufficere. Si enim ex particularibus quippiam prætermisum fuerit, ex his quæ generatim membratimque dicta sunt, reliquum ipse tibi inuenire poteris.

De Syncope quæ in febribus accidit.

Virium ruine quas Græci syncopas appellant, subito in ægris oriuntur, aut ex crudorum humorum præsertim os uentriculi grauantium copia, aut ex biliosis nimiumq; tenuibus, & qui facile dissipantur, humoribus, interdum uero etiam, dum ad os uentriculi confluunt, ut hac quoque de causa vires conuelli prostratarique cōtingat. Quoniam igitur virium ruine non una ex causa, sed tum ex crudis, tum ex tenuibus biliosisque humoribus oboriuntur, uidendum est quomodo horum differentiarum discerni, notarique debeant. Nisi enim discrimina internoueris, fieri non potest, ut remedia ad unamquamque causam recte accommodes.

*Nota febrium in quibus humorum crudorum copia
syncopen inducit.*

Qui sane ob crudorum humorum copiam in syncopen incidunt, primum sane faciem habent tumidiorem, pallidioremq; os ventriculi totum que ventrem flatibus distentū, adhuc pulsus exiguos, raros, & tardos, insuper ructus sustinent acidos, habitumq; pituitosiorē repræsentant. Iam ea quæ præcesserunt clarius tibi humorem superantem indicabunt. Nam cruditates tunc cōtinuè plurimum præcedunt, ocia, intempestiua balnea, leguminum fructuumq; fugacium, & carniū repletio, uinique crassioris sinister usus hoc igitur modo, qui ex crudorum humorū abundantia syncopen experiuntur, internosci debent.

Nota eorum, qui ob biliosos tenuesque humores Syncope conflantur.

Qui ob biliosos tenuesque humores Syncope laborant, hac ratione internosci possunt. Primitus sane facies ipsorum squalida est, & sicca, pulsus exigui, inæquales, & inordinati apparebunt, deiectio autem biliosa est, uigiliæ magis quàm in alijs urgent, sitisq; affligit. Iam ex alijs quoque multis notis discerni possunt, præsertim vero ijs quæ præcesserunt. Solitudines enim, & tristitia, cibufque modicus ijs qui ex uitiolis, & acribus assumptis, hos præcedere magna parte consuevit. Sic igitur ipsi internosci debent.

Curatio eorum, qui Syncope periclitantur.

Curandi sunt, qui ex crudorum humorum copia in Syncopen incidunt, tenui uictu, atque omnibus quæ extenuare possunt. Salubre igitur est, quantum ad copiam attinet, uacuationem per se etiam uenâ moliri, eamque rursus iterare, immo non permitte, ut humores crudi rursus in corpore redundant. Metus enim est, ne uires prostratz humorem crudum nequeant concoquere, & distribuere. Satiùs igitur arbitror, ut uacuationē potius uitemus. Sin autē humor usq; adeo superauerit, ut periculū sit ne uires suffocentur, non absurdum est tunc ex copia modicum subtrahere, & grauatas ipsas leuare. Videmus enim plerumque id etiam in igne euenire. Quippe cum is prope modum à uiridibus lignis extingueretur, subinde paucis ademptis rursus illuxit, & ijs quæ ipsum suffocabant, superior euasit. Quapropter si uires robustæ, & copia quæ offendit, admodum ampla fuerit, in eum modum est agendum. Sin autem imbecillæ fuerint, & cruditas multa subsit, frictionibus incumbendum, atq; ijs quæ sensim extenuare, ac discutere, crudosque humores, & incoctos possunt concoquere. Tale vero est chamæmelum, ut quod rarefaciat, dissipet, & causas

morbi concoquat. At frictionem incipere conuenit à cruribus deorsum deinde ad totam spinā, & brachia transeundum est: postea rursus à brachijs ad inferiores partes & pedes, idq; frequentius faciundum est, ita ut virium ratio habeatur. Cum enim nonnulli sæpe immoderatam magis frictionem adhibuissent, vires subito digestæ, dissolutæq; fuerunt. Ego ita quendam ex incititia, fricantium in syncopen prolapsum conspexi, iusserat enim ille continue integrum diem & noctem ipsum perfricari, & à cibo omni ad quintum usq; diem abstinere, deinde cum impie hoc ipse faceret, æger qui non potuit utrunq; tum de fatigationem, tum inedia in alios quinque dies tolerare, Syncope interiit. Conueniebat enim meo iudicio, cum qui tam immoderata frictione, & acribus oleis in usum adhibitis tantam cruditatem discutiendam putabat, non prorsus à cibo ægrum continere adeo, neq; rursus nimium cograuare, sed ab immoderata frictione desinere. Nam ubi fames, laborandum non est, sicut inter omnia hoc quoque prudens ille senex pronuntiavit. Haud noui, quid etiam Diuinissimo Galeno in mentem uenerit, quod ita faciundum esse præcipiat. frictionibus autem immoderatis utendum, oleumq; sicyonium inducendum, ac inediā imperet. Nam hyssopum ipsis una cū modico melle bibere præcipit, nihilq; aliud ad septimum usq; diem assumere. Qui d' *Dij* immortales vires adeo ualidas esse cogitare poterit, qui si multa omnia, & inediā, & frictionem pariter ferre queat. Mihi sane melius uidetur, & moderatius perfricare, & rursus nutrire ad vires respiciendo, cremore ptisanæ, aut halicæ cum oxymelitz, & pane in uinum tincto, ubi uires admodum imbecillæ appareant. Nam utrunque faciendo, interim sane ex copia humorum non nihil perfricationem dissipemus, deinde rursus commodum alimentum, quod cōcoqui facile, & in partes corporis distribui possit, substituamus, tum vires conseruari, tum crudi humores probe concoqui poterunt.

De uino.

Vinum dare febri quidem causa nō oportet, verum ob crudiorē materiam superantē, eorum quæ sensim extenuare, & calefacere possunt, usus existit. Nihil itaque absurdi est tenue, quod quæ in corpus facile distribuitur, & nullam manifestam astrictionem, aut dulcedinem obtinet, exhibere, ætate uero non nimium recens, neq; uetus esto, neque colore nigrum, sed potius subrubens, & album, & substantia tenue. Cupimus enim, ut quam primum in uenas, totamq; corpus distribuatur, præsertim tum vires & collapsas, & in periculo interitus constitutas recreare festinamus.

De Balneo.

Qui ex humorum cruditate syncope laborant, non sunt opior, ad balneum cito ducendi. Nam materia cum crassior sit, & copiosa, nondumque extenuata, eoq; discuti nequeat, inde magis meatibus infarcietur, & febris augebit. Vbi igitur humores extenuati fuerint, & concoctio iam appareat, ita tandem lauare aegros, & cibo leuiter calefaciente nutrire oportet, utpote porro probe cocto cum apomelite, & piscibus si fieri potest, fatilibus, sin minus fluuialibus, quos Greci Anadromus appellant, ex oxymelite, & gallinarum cohortalium alis. Postquam vires ex his auctae fuerint, citra noxam deinceps cibi offerri possunt, quae ualentioribus sint ad nutriendum materiam.

Curatio eorum, qui ob tenuium humorum putredinem Syncope conflantur.

Qui ex subtiliorum humorum putredine in Syncope incidunt, eos constet contrario modo curandos esse uictu, qui humores crassos reddat, & aegre in partes digeratur. Cremor igitur halicis istis conuenit, & panis hydrosolato, aut omphacomeleli intinctus, ite gallorum testiculi, citrum, intybus lactuca, astaci, pectinas, buccina, erinaceus, amphraturum, mala, malum punicum, pirae. Atque haec non una uice, sed particulatim, & ex interuallis offerre conuenit, ut etiam id quod ratione alimenti datur, non grauet in Syncope vires, sed potius augeat.

De Vino.

Vinum his aquosum dari debet, quale est Cnidium, aut Sareptinum, aut generosum Sabinum: non si atate nimis uetustum, sed aquosum adeo, neque merum bibatur. Quin & unctio adhibeatur, quae nullam habeat uim cutis laxandae, aut rarefaciendae efficacem, sed e contrario densandae, & corroborandae: cuiusmodi est etiam oleum melinum. Puluerum uero eiusmodi usus esto, qualis rosarum flos ipseque rose, si inspergantur, existit, praecipue quando etiam sudores copiosius erumpunt, & aeger in Syncope incidit, ad summam imbecillitatem perueniunt.

De animi defectione.

Quoniam uero animi quoque defectiones Syn copas inducentes aegris contingunt, viresq; repente deiiciunt, consentaneum est ut de his quoque generalius disceptemus, deinde ita, quae etiam nobis tempus intelligenda obtulit, apponemus. Ijs quae Diuissimo Galeno sunt prodita. Ipsa igitur defectionis animi res una est, causa uero ipsius multae, & unaquaeque ipsius species propriam obtinet. At de omnibus nunc scribere non licet, affectus autem qui simul comitantur, seorsum curari non possunt. Tantum igitur in praesenti libro de eis dicemus, quomodo quis accessionebus subito incidentibus queat resistere.

De his qui ob subitas uacuationes animo deficiunt.

Qui igitur ob Choleram, intestinorum lauita

tem, & alias subitas uacuationes animo deficiunt, ijs aquam frigidam aspergere oportet, nares comprehendere, os uentriculi perfricare, stomachum ad uomitionem turbare, aut digitis, aut pennis inditis, imo & manus & crura ligare conuenit, ac deligaturae plures uehementioresq; esse debent, in superioribus quidem partibus, si deorsum uerget euacuatio: in imis autem, si sursum erumpat. Ceterum uinum aqua frigida dilutum Syn copis medetur, quae ob uacuationes uno impetu factas & uirium dissolutiones eueniunt, maxime cum defluxiones in uentriculum decubuerint: sed inspicendum est, numquid uinum prohibeat. Balneae fluxionibus quidem in uentriculum idoneae sunt, uerum sanguinis fluorem uehementer irriant: adhuc eis qui ob copiam sudorum animo deficiunt, atq; hi ratione maxime contraria curantur. Cutis horum refrigeranda, astringenda, non laxanda est, ac uinum his potissimum frigidum exhiberi, nihilq; prorsus calidum offerri debet, imo neq; ligare imos artus, neq; uomitu cogere oportet, sed uetorum ingressus ad eos potius moliri conuenit, ac domus aërem ad refrigerantem & astringentem qualitatem conuertere, myrtiq; & uinum capreolis, & rosae pauimentum insternere. Horum nullo uteris, ubi fluxiones in uentrem tendunt, nam fluxio augefcit quantum cutis densata fuerit. Qui igitur ob uacuationes dissoluantur, ijs hoc pacto statim succurrendum est.

De his qui ex copia humorum animo

deficiunt.

Quibus ex copia animus deficit, non similiter tractari debent, uerum artus in illis quamplurimum perfricare, calefacere, deligare conuenit, uino autem, ciboque, & balneis, si febricitent, abstinere. Satis est eis etiam mulsam potui dare in qua thymum, aut origanum, aut pulegium, aut hyssopum decoctum sit: conducit etiam oxymeli.

De his, quae ex utero animi defectionem experiantur.

Et quae utero dissoluantur pari modo praeterquam oxymelite curandae sunt. Ac cura potius quam brachia earum deligare, ac fricare oportet. Quemadmodum enim quibus sanguis ex utero immoderate profluit, earum mamillis cucurbitulas defigere solemus, ita quibus uterus sursum, & ad latus attractus est, inguinibus foeminibusque admouebimus, naribus, ea quae fetidissimum odorem mouent. Vteris autem odoratis, & quae laxare possunt, ac calefacere.

De ijs, qui ob imbecillum stomachum animi defectionem experiantur.

Quod si stomachus imbecillus fuerit, atq; ideo animus deficiat, obduci quidem debet ijs, quae roborandi uim habent, cuiusmodi parantur ex palmulis, uino, farinis, croco, aloe, ac mastiche: foueri autem oleo absinthite, melino, mastichino, & nardino.

Si ardor stomachum infestet.

Si ardor stomachum exercet, refrigerantium aliquod miscerit, debet ut succus cucurbitę, lactu-
cę, portulacę, solani, cichorij, & uux acerbę. is qui
dem nõ astringit solum, sed etiam confirmat. Iã
aqua frigida tempestiue ijs data, quibus stoma-
chus ardore estuat, frequenter profuit. Sin autem
intempestiue exhibeatur, ualde nocet: atque id-
circo potius quando dari debeat, accurate inter-
noscendum est. Vinum autem calidum imbecilli
stomacho si nihil aliud obstat, recte exhibetur.
Iam extremorum frictio tales quoque insigniter
adiuuat, quod si ex his melius habuerint, si ardo-
rem quidem in stomacho sentiunt, ad balneum
celerrime ducēdi: qui vero frigiditatem aliquam
percipiūt, his medicamentum diatrion pepereon,
apsumque piper solum, & absinthium propinari
debet: qui ex vitiosis humoribus, ventriculi os ro-
dentibus animi defectionem sustinent, his aqua
calente, & hydrelæo dato vomitus præcipitur. Sin
autem æger difficulter vomat, ipsas stomachi re-
giones, pedes, & manus prius oportet fomentis
calefacere. Sin vomere nequeat, digiti, aut penni
in os inditis ad id prouocandi sunt. Sine sic qui-
dem potuerint, rursus eis oleum calidum quam
copiosissimum exhibere conuenit. Solet autem
frequenter hydrelæum non ad vomitum incita-
re, sed uentrem emollire, id quæ non exiguum
præsentibus ægris præsidium affert. Quare si æ-
ger non sua sponte ad uomitum proclius est, arte
is sollicitari debet: maximè autem rebus quoq;
appositis id præstare conandum est. At si uacatio
ex his prouenerit, absinthij turionibus decoctis
mulla potiri que dari, in sequenti tempore uinum
quoq; debet, & particule uarijs modis tum exter-
nis Epithematis, tum absinthij potione roborari,
non tamē id per initia facere præcipio, sed postea
cum uenter fuerit purgatus. Vbi uero humores in
eo continentur, neutiquam eum astringere, sed
fomentis tantum calefacere, ut antea compræhen-
sum est, oportet.

Si ob pituitam animus deficiat.

Vbi pituita frigida, copiosa que in stomacho
collecta fuerit, is oleo, in quo absinthij turiones
decocti sunt, liberaliter fouendus est: deinde uero
mel, piper, & antidotum, quod Diospolites, ac
uniuersa uictus ratio incisoria adhibeatur.

Si ob frigiditatem animi defectio eueniat.

Qui ob ualidas perfrictiones animo deficiunt
eos similiter, ac grandi fame infestatos curabis,
nempe ut omni modo eos calefacias, tum uino
calida diluto, tum cibis calori excitando efficaci-
bus exhibitis. Adhæc perfricare eos, & ad ignem
calefacere expedit.

Si ob caliditatem animus deficiat.

Defectiones animi ob caliditatem ampliorē
prouenientes, refrigerantibus, & ijs quæ roborā-
re possunt, curare oportet. Incidunt autem hæ ijs

potissimum, qui in aere suffocato, & balneis diu-
tius sunt immorati. Roborabis igitur ipsos si quā
primum aquam frigidam potioni exhibeas, refri-
geria uentilando excites, & in aerem ducas: os
uentriculi perfrices, uomitumque prorites: dein-
de uero & uinum, & cibos offeras.

*Si ob igneas inflammationes animus
deficit.*

Qui ob inflammationis magnitudinem, & fe-
brium malitiam animo deficiunt, cum in accessio-
nibus perfrigescunt eorum artus ualenter perfri-
care, & calefacere, crura & brachia deligare opor-
tet: uigiliæ indici ægris, omnisque cibus & potio
circumcidi debet. Optimum autem in his est præ-
noscere, quando futura sit accessio, ut hoc ipsum
antequam illa inuadat, efficere possis. At qui ex
siccitate, & inedia in Syncopen per accessionem
initia concidunt, optimū est ijs antea prospicere.
Si enim horis duabus, aut tribus ante accessionē
cibo dato pedes & manus contineri iusseris, non
interibunt. oportet autem cibos esse, qui facile &
concoqui, & in corpus distribui possint. Si uero
etiam uehemens aliquod periculum subesse con-
sideraueris, uinum mox exhibebis, maxime quod
chondro incocto superfuderis: si panem quoque
in chondri uicem offeras, idem ualeat. Quod si
mediocris Syncope expectetur, neq; uinum dari
debet, uerum abunde, tunc est malum punicum,
aut pīrum, aut malum, aut aliud quoddam pomū
astringens cibo miscere. Et si ob hæc accessionē
moderate ferant, cum rursus cibum offers, non
necesse est pomis uti. Hæc quidem agenda sunt,
si id quod futurum est, prænoueris. Illis autem
qui repente in periculum incidunt, uinum exhibe-
bis, panemque calidum & cum eo chondri ualde
exiguum. Si enim copiosius cibos etiam conco-
ctu difficiliore ita affectis dare uelis, non modo
in Syncopen incident, sed etiam suffocabuntur.

*Si ob nobilis particule obstructionem ani-
mus deficit.*

Quibus ex insignis particule obstructione ani-
mos deficit, oxymeli propinatur, & qui ex hyssopo,
origano, pulegio, & melle tum potus, tum ci-
bi conficiuntur, exhiberi debent: imo etiam artus
& fricare & deligare uincit. Iam prodest quoque
cientibus urinam uti, cuiusmodi sunt ea quæ ex
anetho, sceniculo, apio, spica nardi, danco, & ami-
parantur. Ex quibus cum manifestum iam com-
modum apparuerit, uino etiam utendum albo, te-
nui, & non ualde uetusto.

Obstructionis nota.

Deprehendes huiusmodi obstructiones cum ex
alijs pulsuum inequalitatibus, tum uero ex ijs ma-
xime, quæ ex magnitudine, paruitate, uehementia,
& obstructione cernuntur, depræhendunturque,
concurfu, ut uocant plethorico, non præsentē.
Sunt autem pulsus in ea, qui etiam ob magnas
huiusmodi affectiones intermittētes redduntur.

Cum animus ob sectionem abscessus, aut rupturam deficit.

Quibus propter rupturam abscessus, aut sectionem uacuationemq; uno impetu facta animi defectio orta fuerit, hos quamprimum odoratis recreare oportet: paulo autem post sorbitionibus concoctu facilibus alere.

Si ob gaudium aut merorem & similia: item si ob dolorem animus deficit.

Qui uero ex tristitia, aut gaudio, aut metu, aut attoniti in animi defectione inciderint, eos post quā odoratis admotis, naribusq; comprehensos restituerimus, ad uomitū cogemus. Pari modo, qui ex uulneribus, ac doloribus articularum, neruorum, & musculorum tendinum deficiunt, quam primum recreare oportet: postea affectus quoque curationem aggredi.

Si ob Ilium, aut Colicū animus deficit.

In Colicis affectibus, aut Ileosis, aut aliquo eorum, qui adeo magnos cruciatus inducunt, comitantes animi defectiones, si affecta particula foucantur, conquiescunt.

Si ob uirium imbecillitatem animus deficit.

Sin autem ex propria facultatis quę corpus regit, imbecillitate animę defectio contingat, quę intemperie illarū partium comitatur, unde uires ducunt originem, contrariis curabitur, calefaciēdo quidem frigidas, refrigerando autē calidas: atque in alijs simili ratione. Facultas igitur quę uitalis dicitur, ex corde proficiscitur, quā ex obscuris pulsibus cognosci demonstratū est: quę autē ex icore pronemī, cruentis deiectionibus, quę per initia quidem aquosę & tenues, postea uero amurcę instar crassę fiunt. At quę ex cerebro trahit originem, quam nonnulli singulari uocabulo animale m nuncupant, ex uoluntarij motus imbecillitate cognoscitur.

De febre Hectica. Cap. IIII.

Cum immodicus feruor humiditati substantiali, quę solidis particulis inest, superuenit, non tamen hac dissipata fuerit, uerū salua adhuc in eis perseveret, semperq; ferueat, & nullam declinationem habeat, tunc huius febris speciem Hecticam nominant.

De Marasmo ex Hectica.

Quod si humiditas substantialis in nobis consumatur, huiusmodi febris a marcore Gręcis ab solute Marasmodis appellatur. Sin autē in totum consumpta fuerit, aut torrefacta, tūc Marasmus constituitur: unde Hectica quidē non adeo difficilem curationē recipit, torrida autē ac marcida

nullam. Ne igitur difficilibus curatu tanquā facilibus per ignoratiā manum admoueamus, & sperato successu frustremur, neque rursus curatu facilia, ceu deplorata uitemus, una quęque ipsarum species ab altera diligenter nobis est discernēda, ut hę singulę etiā optime internosci queāt.

Quomodo Diaria ab Hectica discerni queat, & notari.

Hecticę febres quemadmodū Diarię frequenter etiam ipsę precedente causa nascuntur, & nō semper a februm ob putredinem ortatum transitu. Ad scire licet caloris qualitatē in Hecticis quidē acrem, & siccā esse, in Diarijs autē mitissimā, atque celeriter tactui occurrit, & quodāmodo imprimitur. Iam ex urinis quoque has licet facile discernere: nā si perfecta concoctio per initia tibi appareat, tūc Diariā febrim esse putato: cum autem cibus quidē sumitur, nulla autem concoctio appareat, Hecticam suspicari oportet, quę etiā ex pulsibus notatur. Nā in Diarijs magni sunt, & celerēs, in Hecticis autē exigui, & obscuri, cum sint uirium imbecillitatem portendunt. Iam numeris horarum inuicem discernuntur: nam horis decem præteritis si febris non coquieuerit, Hecticam fore potius existimandū est.

Quomodo Hectica a putridis discerni debeat.

Quod si febris interuallum prorsus nullū habeat adhuc neque obscurior, aut uehemērior fiat, neque adeo ualida, Hecticam esse hanc putato. Nam in putridis & incrementum, & imminutio accidit, augmentum quidem in statu, imminutio autem in declinationibus.

Quomodo continens ab Hecticis discernatur.

Esti uero Continentes hac ratione similes Hecticis uideantur, quod & ipsę nec augmentum, nec imminutionē recipiunt, atamē caloris qualitate, & pulsibus ab illis discernuntur, siquidem Contineptium calor non est siccus, & acris quē admodum in Hecticis, sed etiam in summa cute magis apparet. Ac in Continentibus pulsus sane magni, & celerēs existūt, in Hecticis autē & exigui, & obscuri. Hoc sane modo Hecticas ab omnibus ex putredine ortis discernere poteris.

Nota Hecticarum maxima.

Maxima uero nota est Hecticarum, quod a cibo caloris incrementum fieri uideatur, non est autem incrementum, sed caliditatis in alto calatę occultatq; argumentum. Quippe in his tale fieri contingit, quale in calce. Etenim ut ignis in hac calatus ab iniecta aqua depræhenditur, sic etiam in Hecticis cibus, assumptus calorem in alto delitescens foras euocat.

*Nota Hæctica in Marasmoden febrim
transcuntis.*

Marasmodes febris ab Hæctica profectæ signa etiā ex ipsa sola ægri facile omnibus manifestissima existunt. Primum. n. color uiuus ac sanguineus, quē Græci choeas, anthos hoc est florē coloris appellant, non amplius in eis seruatur, sed nigrior quodammodo, exaridus, & ab immodica febrili caliditate squalidus apparet. cutis uero frō eis ualide distenditur, & palpebræ grauantur; ceu in ijs qui dormituriunt, non autē est somnus, sed potius imbecillitas musculorum, qui palpebras sursum attrahere solent, unde etiā pituitas crassas, quas lemas uocant græci, aridas ob naturalium facultatē impotentiam in oculis habet: præcordia intentā sunt; non autē quod ipsa uere sint intēta, sed quia membranz, & nervi rēfionē quādam ob siccitatem sustinuerint. Nā tali de causa imaginatio quādam nobis oritur, ut præcordia & inflammari, & distenta esse putemus. Ac pulsus in eius modi duri sunt, & exigui simili ex causa, & frequentes propter usus necessitatē, obscuri ob imbecillitatem: graciles, quia in latum extendi nequeunt. At quid opus est talia signa commemorare, cum hæc adeo euidenter Marasmodē febrim repræsentare nobis possint. Cum igitur moderatiores sint per initia, ualentiores autē ubi radices iā egerint, etiam id quod nondum est per id quod iam est, Marasmodum fieri significat. Postquam omnium iam Hæcticarum notas exposuerimus, ad curationem modo digrediemur.

Curatio febris Hæctica.

Hæcticam si probe curare cogites, uictu utro qui humectet, & refrigeret, eo quod etiam non aliunde occasionem accepit, quā ex humiditatis, quæ solidas ipsas partes imprimis nutrire potest, indigentia. Verū quia refrigerantia diuersam fortuntur facultatem, etenim alia plus, alia minus sunt efficacia, sciendū est, quibus snā aqua, & aliud quoddam refrigerans, & quibus quidem magis, quibus aut minus dari debeat, item quibus nullo modo offerre oporteat, ad hoc tempus, quo exhiberi conueniat; item quos sane tum intus, tum foris refrigerare, quos uero solummodo extrinsecus oporteat. Cum. n. ita nos omnia distinxerimus, & curatio Hæcticarū quamuis sit operosa, tū facilis, tum prompta ad sanationem efficitur.

Quibus frigida dari debeat.

Siquidem igitur æger primario in Hæcticam febrim inciderit, atq; non ex acutorum morborū transitu originem traxerit, cum fiducia cremorē pituæ potioni offerro; & panem in aquam tinctum, lactucasq; ac omni cibo utitor. Post cibū aquam frigidam, quantum uelit, potui dato: cauere enim hic febris insultus & metuere nō oportet. Neque enim remissionem, aut accessiones,

quemadmodum in febribus ex putredine ortis inuenire licet. Ita sane agendū est si quando ipsa febris Hæctica per se ac primario, fuerit, ægriq; uires imbecillæ, & non alia febris ex putredine creata, ei sit admixta.

Quibus frigidam dare non oporteat.

Prepende rursum, num quandoque febris Hæctica inflammatione magna præcordia infestante, aut putredine quādam inuenis apparente, aut crudioribus humoribus excitata fuerit. Fieri namque potest, ut Hæctica sit febris, & ut quædam ex putredine prouenientiū ipsam adulterauerit. Si igitur tale quid fuerit aqua dari nō debet, & præsertim, si nulla concoctio in urinis appareat, neque inflammatio feruens, & magnitudine insignis: præterea si uires ægri sint imbecillæ.

Quando frigida exhibeatur, etiam inflammatione infestante.

Sin autem inflammatio feruens admodū fuerit biliosa, Erysipelacea, frigida recte exhibetur. Ego sane noui me cuidam tali affectu laboranti, æstuantiq; ardore frigida exhibita plurimū profuisse, ita tamen ut prædixerim ægrum paulo diutius morbo conflictatum, quod etiam accidit, tardius enim uires recolligebat. euaserat autem ut non cum febris esset aucta, Hæctica in Marasmodem inciderit. Hac autem ratione, etiam si quæ ex putredine ortarum admixta fuerit & præcipue ex ardentium genere, frigida potui exhiberi debet: neq; uero simpliciter in his dabitur, sed cum bonæ concoctionis notæ in urinis iam apparuerint, tunc offerre conducit.

De Hæcticis febribus, quæ ex alijs in eas transcuntibus mutatisque generantur.

Quod si Hæctica ex acutis morbis in eam commutatis oboriatur, magna. n. ex parte Marasmodes Hæcticæ succedunt, ubi ardentes febres non recte curantur frigida potu interdicitur, præsertim immoderato. Nā corpore iā antea extenuato, imbecillique simul, & excarni reddito, tum propter tēpus, quo illa excepta est, tum propter ardentium febrium intemperiem, necesse est duplicē comitari noxam, aut ualidam uirium deiectionem interitumq; aut refrigerato corde, caloremq; nativo protinus abolito Marasmodem senio per similem, quem merito ex morbo senium uocabant, sublequi. Hoc enim & frigidum & siccum existit quod nequāquam febrim inducit. Quare neque refrigerantia hic Marasmodus, sed potius humectantia simul & calefacientia requirit.

Quomodo ex extremis remedijs succurrendū ijs sit quibus frigidam dare non possumus.

Cataplasmatis igitur, fomentis, ceratisq; refrigerantibus

ranibus in oibus quidē febribus recte utimur, in quibus aque potio dari nequit, aut ob uiriū imbecillitatē, aut ob corpus plus equo extenuatum, carnibusq; destitutū. Inspicito autem, num etiā Hectica marasmodes iam excitata ex affecta particula primario duxerit originem. Etenim ex inflammatione iecōris, ventris, mesarzi, renū, & colī, adhuc ob diuturnas uteri, pectoris, pulmonis, septi transuersi, & aliarum partium inflammationes prouenire solet. Quare inspiciendū est, animaduertendumq; quā in particula febri Marasmodē subsequi cōtigerit, eiq; potius remedia ad refrigerandū humectandūq; efficacia adhibebimus, ut ipsum ueluti ignis fomitem extinguas. Multa igitur sunt in id efficacia, sed nullum ita ut cezarum rosaceum. Quippē solidas partes refrigerare, & humectare potest, aetueri ne humiditas quē modica in eis adhuc superest, prorsus intereat, in hunc autem modum conficitur. Cere quādrans, rosacei sextans. Cera semel, aut bis lauatur deinde ubi in aqua frigida soluta fuerit, rosaceo sic adijcito, sed ex hoc seruato instar unciae paulo plus aut minus. Et cū ceratū lento igne probe solutum fuerit, finito ipsum refrigerare, deinde ex cerato portionem acceptā in pila subigito, interrim relictū rosacei, interim aque frigide momentū in pilā coniiciēs, donec totum rosaceū insumptum fuerit, ac cerato probe mixtū esse cōspexeris. Quod si etiam ouorum albumina adijcere uolueris, praestantius adhuc erit remediū. Pari modo si cīcōrē pīsanā adiunxeris, melius adhuc efficies. Oportet autem linimenta crebrius mutare, nec permittere, ut medicamentū diutius corpori adhārescat, neque multum incālescat, quippe mora imbecillius redditur. Ceratū hoc ad multa est utilissimū, nec eorum temere uti oportet. Ego sane hoc frequenter usus incipientes Hecticas cito discussi, ne ad auctā Marasmodē febri incurrere powerint. Oportet autē in his quoque usui istius insistere, & non cum detrectare, sed etiam crebrius adhibere, alias uiceratū inducētes, alias liquidius reddentes, hydrosarō copiose diluēdo. Ita namq; hoc praesidio instar vntionis uti licebit, cū omni in corpore, tum praecipue in consumptis, & extenuatis, ac nō modo semel in die, sed etiam bis ita praesertim in uisceribus uti conuenit. Quoniam autem iterum illinemus, ratio est, ut etiam secunda uice vntum abstergamus.

De fomento.

Fomentis utendum ex succo lactucae, vuz. immature, portulacae, solani, & umbilici ueneris. Praestat autē succos etiam refrigeratos, & praesertim niue superaccommodare. Quod si nobilis quaedam particula inflammatione tentetur, succos non per se ac separatim, uerum oleo omphacino admixto, aut chamemelino, aut etiam rosaceo, aut simul omnibus inducere conabimur. At pectori remedia nō nimis refrigerantia admoeri debēt.

nisi multus feruor, aut inflammatio in eo spectata fuerit. Verum, ne si quidem linimenta diutius inhærere sinemus, eo quod plerūq; ab immodica ipsorum refrigeratione haud mediocrem non solum respirationis, sed etiam uocis noxam expertos nouimus.

De domo in qua aeger decumbet.

Non solum autem refrigerijs, quae extrinsecus admoventur, sed etiā aeris mutandi ad frigidius artificio auxiliari tentabimur. Si igitur aestas fuerit, in subterranea domo aeger decumbet, & pauimentum aqua frigida copiose conspergetur, ut aer hinc frigidior euadat iā aqua ex alijs uasis in alia decidat: nā mediocritas huius strepitus ē somnum prouocat, praestat adhuc, si aerem ita immutes, ut non modo refrigerare corpus, sed etiā corrobore possit, id quod fiet, si pauimento iniicias refrigerantium aliquod, aut rosam, aut semperuiuum, aut rubum, aut lentiscuriones, aut uitis capreolos, aut simile quoddam, tum ad refrigerandum tum ad robur inducendum efficax. Huiusmodi sane aer omnibus quidem Hecticis conducit, maxime uero, quibus pulmo & cor igneum ardorem primario senserit. Etenim a cibo & potu refrigerante, non tantū iuuantur, quantum a frigidi aeris inspiratu: cōtra maius a cibo sentiūt commodum, quam ab aere, si iecur, & uenter, aut alia quāpiā particula fuerit affecta. Ita sane ubi aestas fuerit, aerem ad frigidum mutari oportet, ubi hyems calidior parandus non est: quocūq; .n. frigidus fuerit, nihil ipsos offendit. Reliquū uero corpus solo modo moderate cooperiri oportet, pluribus tugumentis incālescat, & aeger ideo uirium defectionem aliquam sustineat.

De Balneo.

Balneum ijs conducit, qui Hectica febre laborant, quae per se fuerit, & non cū aliqua ex humorum putredine prouenientium coniuncta inueniatur. Tunc, nō offenduntur, & nequāq; iuuantur, praesertim si credis adhuc humoribus sanare, quis ipsos uoluerit: neq; minus leduntur, si inflammatione nobiles particulas obsidente, & mōdice id facere tentaueris. Sciendum autē, nō modo Hectica febre laborantibus, sed et frigidis sicisq; intemperiebus & senio ex morbo balneum conferre. Habēt enim balnea hoc quoq; admiratione dignum, qd & calidas & frigidas intemperies iuuare possunt. In summa, si quis diuersos illos lauandi modos nouerit, is meo iudicio etiam omnem intemperiem mutare in contrariū poterit. Esto igitur temperatus aer, vntio, & solū, eluere autem oleū conuenit, ac statim cū aeger in exteriorē domus partem ingressus fuerit corpus perungi, uerum diutius in aere morari non debet, oleum autem uisceribus potius superfundi. Egressus aeger in frigidā solium, quod non aquā frigidā, sed lactis more tepentem habeat, perungatur.

perungatur, circumdatus autem operimentis, nō admodū diu in eis immoretur cū uestē iam induet, rursus totū corpus ungatur. Valde. n. hoc iuuare ipsos potest, quoniam humiditatem quæ a balneo accedit, diu retinere oportet, & non finire, ut prompte ex corpore defluat. Egressus æger ex balneo, aut cremorem ptisanæ, aut halicæ, aut lac assumat: sin autem sitis vrgeat, etiam cum ad huc operimentis inuolutus est, non recuses, aut lac, aut aliud quoddam alimentum exhibere. Etenim tunc potius in uniuersum corpus distribuitur, cum attrahitur.

De lacte.

Lac igitur omnibus Hecticis, præsertim in Marasmo desinentibus, si quid aliud, idoneum est. Quapropter etiam ijs ualde conueniens est, qui vires habent imbecilles, neque alimentum possunt attrahere: & hoc solum in corpus distribui, trahi que nō parum accommodate potest. Itaque lac muliebre primum locum obtinet, secundum uero asinum. Verum quoniam æger nonnulli hoc assument, caprillum ipsis dandum est, quod medium fere existit, & magis potest nutrire. Constat autem etiam curā animalis habendam esse, ut nutriatur domi ordeo, myrti, lentisci, & quercus folijs. ita enim lac nō amplius corrumpitur. Nam huius sollicitudo habenda est, ut ne Hecticorum alius subducatur præcipue eorum, qui ex frequenti Syncope, & diuturna uacuatione alui in Marasmodem febriū inciderant. Quamobrem quibus uenter imbecillis, & facile subducitur, in his etiam lac bis coquere, uel etiam fluuiales lapillos in id conficere oportet. Redduntur autem igne candentes, ut serosum a lacte per ipsos dissoluatur. Atqui lac solum nolint assumere etiam cum ptisana, aut halica, aut chidrio ipsum decoctum exhibeto: adhuc eū itrio, hoc est libo suminali, & similagine similiter bis coctum offerro: præterea magis adhuc illis lac exhiberi debet, quibus etiam uenter copiosiora, & biliosiora deijcere uidetur. Procedente autem tempore, ubi febres mitigatæ fuerint, & vires aliquomodo instauratæ, mollissimum, & recentem caseum ex eo coagulatum dare ipsis nō alienum est. Quatenus enim vires augeri cernimus, eatenus nos quoque cibis adijciemus.

De uino.

Vinum ijs qui frigidam, siccamque intemperiem in solidis particulis habent, & Marasmo ex morbo, ut uocant, detinentur, exhibere necesse est, ut quos calefacere simul, & humectare oporteat, quæ omnia uinum moderatum prestare ipsis potest. Qui uero cum febris marcescunt, præsertim qui macie torrentur, ijs uinum dare cautio est: ut quod eis, si quid aliud maxime aduersetur.

Si ex syncope marasmus obtigerit. Cap. V.

Qui ex Syncope Marasmo contabescunt, ijs quantum sanè ad uires collapsas, & perfrictionem frequenter comitantem attinet, uinum offerri debet. Quoniam uero etiam caliditas naturæ contraria, febrisque, præterea eis adest, & perfrictio quidem interdū conuiescit, rursus autem febris superuenit, ac summam cū periculum sit, ne alias aliter æger intereat, nunc a perfrictione, nūc a febris, necesse est tum demum ad urgentem causam respicere, ac nonnunquam uinum tempestine præcipere, nonnunquam uero rursus id dissuadere.

De testiculis gallorum.

Testiculos gallorum, quos Græci Orchis & Parastatas appellant, dare his oportet. Perpetuo enim omnibus Hecticæ laborantibus commodi existunt, cum abunde nutrire, & uires augere possint, ubi probe concocti fuerint. Quapropter id alimentum semper exhibendum est, ubi vires nondum ad extremum collapsæ fuerint. Quod enim præsidium deinceps esse potest, si vires alimentum non coquant, superentque? Quippe nequaquam cibus uires augebit, sed natura, quæ omne alimentum & concoquere, & mutare, & corpori apponere consuevit.

De fructibus pomaceis.

Fructus pomaceus, qui Opora græcis dicitur, quia sane humectat, ideo Hecticis cibus est accommodatus. Quoniam uero omnes propemodum nō solum humectare, sed etiam refrigerare solent, idcirco rursus dicendum nō est, uniuersim omni Hectico conuenire. Illis enim qui calida & sicca intemperie laborant, & omnibus qui Marasmo contabescunt, & torrentur, cōgrue frigida & humida victus ratio adhibetur, maxime peporum medulla, & cucumerum, item mela, duracina, & cerasia his sunt idonea. Qui autem frigida intemperie detinentur, & in senium ex morbo inciderunt, ijs inutilia. Reliqui uero pomacei fructus, qui non adeo refrigerant, sed potius calefaciunt, & humectant modice, exhibere nō est absurdum: nempe uiam maturam, valde dulcem, præsertim quæ passa est, ac malum valde dulce, & ficum admodum maturum. Nam hæc probe concocta propemodum nihil nocet. Si igitur uenter nihil nos impediat, plus iusto excernes cum fiducia cibos commemoratos exhibeto. Si nanq; tale quippiam fuerit, & aliud magis quam conuenit profluere uideatur, his quidem abstinendum in præsentia, dandum aut punicum modice astringens aut pirū, aut malum eiusdē qualitatis, præsertim ante alium cibum, nam si a cibo sumatur, alium subducunt. Ac cibi qui stomacho potius, & cordi corroborando sunt utiles, Marasmo

ex Syncope confabescuntibus, & omnibus Hefticis dari debent. Si hi quoq; siti, & uehementi febrilaborare uideantur, etiam ipsis fructus pomacei refrigerantes, opportune offeruntur. Breuiter omnia ad id quod magis urget, accomodari debent. Hanc enim rationem animaduersioneque obseruans, nunquam aliquem offendas neq; si pomaceum fructum, aut alium quempiam cibum exhibeas. Nam omnia quantitate, qualitate, tempore, ordine, & utendi modo, aut bene, aut male administrantur.

De tabe quæ Marasmius græce dicitur.

Si tabes quam græci uocant Marasmius reuera humiditatis quæ in solidis partibus subsistit, absolutus existit interitus, nullâ medicinam recipit. Propter hoc igitur nonnulli medicorum merito decepti in discernendo, putarunt se uerum Marasmius curasse. Etenim fieri potest, ut tenuitas carniū, maciesq; & ueluti colliquatio earum refarciatur, primariam uero humiditatem, & quæ solida ipsa nutrire potest, prorsus absumptâ perditamque non licet restituere. Sic enim senium quoq; sanari nequit, ut quod naturalis sit tabes. Quemadmodum igitur senium nulla medicina tolli potest, sic neq; ea quæ reuera tabes. Attamen propter humanum benignumq; artis auxiliū contendere cum morbis oportet, & non cense deploratos omnino relinquere. Interdum enim ubi quis naturam dextram nactus fuerit, & tabes incipiat, nondumq; solidas partes torruerit, speratum successum consequi poterit. Sin autem minus, quanto magis æger affectus est, tãto minus agendum. Nam desperatis malisq; uictis manus admoueri non debet.

De tertiana. Cap. VI.

Tertiana quidem facilis curatū est, cum autem à medicis illis, qui nulla ratione, & via exstuntur, male tractatur, non difficilis modo curatū, sed etiam insanabilis interdum redditur. Constat igitur cibum humectantē refrigerantēq; in omnibus esse præscribendum, cum Tertiana mixtione pura, & germana existit, & à solo bile excitatur. Itaq; præsana cremor super omnia utilis ipsis censetur, atq; hoc usi nonnulli usq; ad Crisim, hoc est morbi solutionem, optime superstitēs uitæ manserunt. Sin autem minus oblectentur præsana, etiam auenæ eremoris ipsis dabitur: ac lactuca, aut intybi caulibus utendum. Quod si febris non fuerit uehemens, et quædam moris concoctioni appareat, etiam gallinarum alæ, & pisciculus moli carne præditus concedi potest. Vrinæ in his prouocari debent, maxime apij radices, & adianthi diluto. Nam anethi decoctum & si urinam mouere prope possit, uitare tamen ipsum ma-

gis oportet in germanis Tertianis, & in quibus callidius sicciorq; temperamentum habetur, præterea si egri solitudine, & uigilijs cruciantur. Nam in his omnibus offensa maior, quam utilitas provenire solet. Absinthij etiam decoctum maxime uitandum est, quando calidum, & siccum ægri temperamentum habent. Noui autem ego nonnullos etiam paticularum colliquationem expertos, quod immoderatus illud assumpsisset, & non vitassent. Contigit enim quorundam sane patres solidas sicciores deprehendi, quorundam uero bilem, & feruescentem, non quantitate, sed qualitate potius offendere: alium autem igneam intemperiem, aut inflammationem in ore uentri celi sentire. In his itaq; omnibus talia uitanda sunt & tepida liberaliori magis ante cibum utendum. Nihil autem minus etiam in alio tempore potio exhibenda, quippe hæc humectat, feruorem refrigerat, meatusq; laxat. Quare ex his omnibus accidit, hanc quidem partem bilis per uentrem excerni, aliam uero per urinas, quæ antea detinebatur, & propter caliditatis feruorem, & propter nimiam decoctorum adustionem non potuit expurgari. Miror autem quomodo Galenus qui artem legitime, si quis etiam aliorum medicorum exercuit, adeo indistincte scripserit, ut dicat exquisita Tertiana correptis absinthij dilutum à septimo die propinandum esse. Ego uero falsis Tertianis potius dedi, mixto ei oxymelitis momento. Sic enim pituita miscellam, & citra noxam magis extendat, & leuiter purgat, ut non usus ueniat origani, aut hyssopi, aut calaminthæ, aut pulegij. Quæ omnia acriora sunt & cum periculo, crebroq; febrim iam magis accendunt. Hæc igitur uniuersa uitare magis oportet, & tunc audacter offerre, quando pituita bilem longe superauerit, & temperamentum ægri frigidius fuerit, uitaq; ociosa præcesserit, & alia omnia, quæ humorem frigidiorē superantem efficiunt. Sin autem humor, qui abundat, contrarius horum fuerit, tum his abstinendum est, utendum uero illis potius quæ extenuant, & accessiones uehementiores fieri non cogunt.

De pomaceis fructibus.

Pomaceos fructus, quos oporan Græcis appellari diximus, exquisitis Tertianis parcissime exhiberi conuenit, nempe uiam dulcem, persica cocta, & non cocta, peponumq; medullam præferim autem si etiā ægri siti uexentur. Ego sanè noui, me frequenter agros, ne amplius accessione febris infestarentur, impediuisse, cum peponas probe refrigeratos hora ante incursum morbi assumere inuissem, & rursus aquam teperatam copiosam, & quantam potuerint, peponi superbere præcepissem. Secutus itaque est non multo post aquam epotam aliquibus sane sudor, alijs copiosa bilis per aluum. Offendi autem ego ple-

rosque Romæ medicos, qui ne nomen quidem peponum tanquam bilem procreantium proferre audebant. Quum itaq; ego cuidam aliquando, & sitienti uehementer, & æstu flagranti, defatigatoque iniunxissem, ut peponem assumeret, quidam præfens medicus exclamauit, homo cur ægrum magis uis occidere? an nō didicisti, quod pepon bilem producat, lege Galenum de alimentis, ubi dicat manifestò, peponem comestū Cholericos efficere. Laboraui igitur ego non parum, ut ijs persuaderē, qui intellectu assequi poterant, Galenum non dicere hic ipsos pepones bilē creare, sed Choleram efficere. Cholera autem uocabant stomachi subuersionem cum uomitu, & perturbatione uentris: ac Cholicos, quibus hæc accidunt. Nam pepon reuera habet aliud stomacho contrarium, quare etiam copiosior comestus uomitum, uentris perturbationem, & præterea perfrictionem, ac totius corporis conuulsiones excitat. Ac melopepon nihil horum facere censetur: non enim habet adeo, quod stomacho aduersetur: imo neque pepon modicē comestus: Proinde Tertianæ febris detentis cum fiducia dari debet: nec non his qui Causo & calida intemperie laborant, siue in renibus, siue in iecore, uel in stomacho, uel capite. Nihil enim eiusmodi in temperiebus aduersari potest, debellare, & euincere, ut pepon, aut qui dicitur melopepon. Quo modo enim ea quæ refrigerant, & humectant bilem parere possint, non uideo: ubi autem peponum facultas tibi deest, etiam cauliculi lactucarum refrigerati, & cucurbitæ, item cucumerum medulla, persica coctionem non experta, sed in uaporem suspensa, & ab eo solo cocta, uelutiq; condita substitui possunt, eisq; & similibus semper uti licet. Iam in oleribus, & pomaceis fructibus etiam omnibus deligere oportet, quæ refrigerare queant, & humectare, conuenienter ea pro uniuscuiusque temperamento, & morbi magnitudine accommodantes.

De balneo.

Balneum, ut maximum præsidium, ipsi præbendum, maxime calido & sicco temperamento præditis, & qui crebris uti lauacris consueuerunt: nec concoctione omnino expectanda est, sed ubi siccitas urget, etiam ante concoctionem lauare conuenit. Modus autem lauandi talis esto. Postquam æger in temperatum aerem ingressus fuerit, modicè sudarit, & tepidas aquas acceperit, ita oleo non simplici perungatur. Quid enim corpus bile exardescens, humectare, aut refrigerare probe præterquam aqua potest? præstat igitur aquam tepidam admiscere, sic. n. refrigerare, & humectare magis, & in altum corporis penetrare percipitur. Vinctio autem adhibeatur non in domo, quæ calidum aerem habet, sed in exteriorem eius partem reuerso, quam etiam a molliendo

malacticè appellant: deinde post illitionem hydrelæ, aut hydrochammæli. Nam si bilis multa & præcipue crassior sit, non alienum est in uicē olei communis etiam chamæmelino uti, quod vim discutiendi multo habet ampliorem, sed nō diu æger in ære immorabitur, verum celerrimo transitu tantum usus in tepidum calentis aquæ solium descēdet, in eoq; diutius subsistet. Egressus autem ex domo calida, monendus, ut in aqua frigida immoretur: & si bene habuerit, etiam ieiuniū indices, indumentis uero iam sumptis, ut aquæ tepidæ quantum uelit, paruo spacio interposito, bibere hortandus est. Nam à potione sudores copiosos effundi uidebis: interim uero etiam bilem per uomitum reijci, ut æger quam primum ex ijs quæ superueniebant, morbo fuerit liberatus. Reuersus autem in domum, si pepon non adfuerit, aut alimentum quod diximus sumat, aut lactucarum cauliculos, aut cucurbitas, aut cucumeres, aut ptisanam. Cæteram aquam tepidam non modo semel, sed etiam bis & frequenter dare expedit, & nihil metuere. In hoc namq; morbo aqua tepida maximum est præsidium. Te tabimus autē in declinatione potius exhibere, & ante accessionem: interim uero etiam in accessione. Noui siquidem accessionibus subtrahi debere, ut Diuiniſsimus Hippocrates inquit, ac uerum est, quantum ad hoc attinet, etiam cum nihil urget. Frequenter enim cogimur propter causam urgentem, non tepidam modo aquam, sed etiam cibum in ipsa accessione offerre. In illis autem hoc agendum est, qui immoderatum stomachi habitum, & uirium imbecillitatem habent, ut insultus magnitudinem ferre nequeat, sed Synocopem minetur. Noui igitur ego in his qui immoderate roduntur, tepidam me aquam propinasse, deinde uomitu oborto, & bile copiosissima excreta, istorum beneficio accessionem conquiesuisse. Ut autem illa aucta fuerant, ita etiam alia decreſcebāt, & aqua temperata, & bile euacuatā

Quomodo tertiana discernatur, germana ac uera ne sit, an falsa.

Tertianas illas germanas esse censendum est, quibus omnia quæ cognata dicuntur, consenserint, ætas dico, regio, consuetudo, temperamentum, studia, & victus ratio. Potest autem senex quoq; Tertianâ infestari, quæ omnem Tertianæ germanæ speciem, omnemq; modum conseruet. Ego sane meis oculis hæc in senē quodam conspexi, qui flauam bilē uomeret, similiterque per alium excerneret, uehementer febricitaret: atque idcirco accessio cum ualido rigore eum inuadebat, ac declinatio multis sudoribus accidebat, detinebatur autem accessione horis fere decem, aut duodecim. Huius alij sane familiares, eo quod senex esset, decoctum exhibere præcepiebāt, ac omnia illa facere quæ falsis Tertianis

ut aiunt, idonea existunt: fereq; interijisset. æger decoctis ex hyssopo, origano, & pulegio assumptis, nisi quis subito ex periculo ipsum subtraxisset, iubens eum etiam pepones assumere, & lactucas, & ptisanam, quæ nihil curiosum habent, operosumque, ac omnem alium uictum, qui humectaret, ac refrigeraret, ut in Tertianâ exquisita, non deceptus ætate, quod senex esset, sed potius toto temperamento. Habuerat enim iam inde ab initio igneam intemperiem, quam alij propemodum omnes postea, ad amulsim confectiabunt. Quare naturam ægri, & causas præcedentes maxime attendere oportet: nihil autem minus, imo etiam omnium maxime febris speciem. Ego autem neq; Tertianarum falsarum uictus rationem in omnibus ut ueram, & utilem commendo, quâ Galenus in libris ad Glauconem philosophum præcipere uidetur, iniiciens omnino ptisanæ piper, aut origanum, aut hyssopum. Etenim huiusmodi plerumq; periculosa sunt, & febres nehemetiores accendunt, idq; magis adhuc, si temperamentum corporis calidius inueniatur, & pituita mitior quam bilis, & quæ non adeo calefacientia requirat. Quippe satis erat, in his uti, & non multis valde refrigerantibus, & his quæ sensum extenuare citra calorem possunt, qualis est radix apij expurgata, ut non particeps sit radicularum: item ptisana similiter, interim adiunctum habes apium, aut anisum, aut comam porri, aut mellis, & aceti momentum. Quod si non admodum in sincera, ac falsa Tertianâ fuerit, nullus horum usus est, uerum abunde est sola ptisana per se uti, & id quod biliosum est, contemperare: quod pituitosum, dissolvere, non autem siccantibus cōpingere, ac cogere: quemadmodum ij qui piper, & hyssopum præcipiunt, faciunt, eo quod illa uideantur extenuare. Oportet autem diligenter animum aduertere eum qui humectante uictu usus sit, ut cum humores ab illis dissolutos uideat, statim euacuandis eis extrahendisq; incubat, medicamento exhibito, quod non magnam calefaciendi uim obtineat. Eius autem generis multa sunt, & quæ ex oxymelite simplicius parantur, & quæ ex succo rosarum modico, agarico, & scammonia lachryma. Quando igitur humores cōpendiose subducendi sunt? Nimirum cum diffundi iam eos, & turgere tandē conspexeris, ut Diuini sumus Hippocrates scriptum reliquit.

Quomodo humores diffundi, dissoluiq; & iam ad excretionem incitari cognoscatur.

Materiam subiectam temperato, aut humectante uictu dissolui inde cognoscet, quod cum per initia esset immobilis, nunc aliquo modo agitari incipiat, atq; alias in alium locum descendere: interim ad os uentriculi, & intestina: interim etiam ad articulos, aut cutem. Peritum igitur animaduertere hunc humorum motum, & obser-

uare diligenter oportet, & dare aliquid, quod eos subducatur, antequam oberrantes noxam intulerint, in partem aliquam nobiliorem decumbentes. Verum vulgares medici nihil horum norunt, ut qui motiones humorum discernere non laborant, unde fit, ut contraria faciant. Postquam igitur hæc uiderint statim ad ea prorumpunt quæ siccare humores, & crassos facere possunt, atq; huiusmodi quidem astringentia medicamenta, similemque uictum præcipiunt, unde accedit, ut humores inde crassiores redditi neq; purgantibus facile cedant medicamentis, neque obediant. Conuenit igitur, ut qui humores dissolutos nouerit, non modo semel exhibeat, quæ per aluum subducere possint, sed etiam rursus humectante uictu vsu, & dissoluentes, si quæ sicce & crassæ reliquæ subsint, iterum leuiter expurgēt. Ita enim humoribus modice subtractis, etiam solus uictus morbum in totum euincere, mutare, & ad bonum statum deducere poterit, ut nulla alia medicina indigeat. Quod si opus erit, licebit etiam epithematis simplicioribus uti, & superfusionibus, & cum concoctio apparere incipit, & longe antequam accessio expectetur. Ita namq; erunt tum efficaciora, tum magna ex parte accessiones expectatas discutiunt. Quoniam autem purgantibus utendum est, ut ea promptè, & compendiose inuenias, bonum esse duxi, etiam cōpositionem ipsorum hic apponere: in hunc modum habet.

Rhodomeli purgans.

Rosarum succi sextarij duo: mellis sextarius: scammonia torrefactæ uncia. Omnia simul coquuntur. Summus medicamenti modus est cochlearia quatuor: medius tria: minor duo. Hoc non solum Tertianarijs propinari debet, sed ijs etiam, qui lippitudine, & alio quodam modo ex bile, & calida intemperie ægrotant.

Aliud Rhodomeli purgans.

Rosarum succi sextarius: scammonia uncia, agarici drach. piperis drach. duæ: mellis unc. sex. Ad ignem lentum coquantur, & ubi in crassitiem coierint, adijcito scammoniam, agaricum, & piper: ac utitor. Datur instar cochlearium. quinque, aut sex. Hoc solis cōuenit qui falsa Tertianâ detinentur. Habet enim non nihil, quod etiam pituita subducatur, cum agaricum, & piper receperit. Noui autem purgasse me etiam medicamento, quod corticem mali citrij reciperet, & eo quod ex malis cotoneis paratur, & horum penuria sola usum scammonia. Quod enim ipsa non modo bilem, sed etiam pituitam potius euacuat, manifestum est, si quis temperato, & humectante uictu vsus, pituitam diffundat, uacuabit hanc quoque scammonia: nec indigebit ijs, quæ agaricum, aut cucurbitam syluestrem recipiunt. Quare etiam si quis recto uictu usum falsam Tertianam scammonia purgare

gare uelit, non delinquet. Hæc quoque hæcenus de Tertianâ breuiter à nobis dicta sunt. Non enim scimus ignari, ueteres quoq; de his scripsisse, & nemo ea de causa culpandus erit. Quæ enim nobis quoq; tempus, & longa experientia noscenda obtulit, hæc æquum censui amicis, & medicis ea nos postulantiibus exponere, quæ quidem parua existunt, sed magnam uim continent. Nam methodi prædictæ non in Tertianis tantum, sed in alijs quoque multis morbis accommodari possunt.

De quotidiana. Cap. VII.

Quod quotidiana febris ex pituita trahit originem, omnibus inconfesso est: quippe neque acuta febris esse his appareret, neque sitis ualida urget, neque perurens quid, & sic cum habere sub primo statim contactu percipitur, sed magis ubi manus diutius immoratur, caliditas fuliginosa ex alto emergere deprehenditur: ac pulsus bona ex parte exigui, & rari existunt, incrementum non uelox, sed longiore tempore detinet: sudores qui ipsis oboriuntur, nunquam purum ostendunt interuallum, quale in Tertianâ, aut Quartanâ frequenter apparere uidemus. Iam manifestius adhuc febris speciem etiam ex præcedentibus causis cognoscere, si non obiter, sed multa cum diligentia inquirere, & examinare omnia coneris. Etenim cruditates plurimæ, crapula, & balnei immoderati usus, interdum iecoris quoq; & stomachi perfrictio præcedit. Hæc igitur eum attendere, & diligenter considerare oportet, qui febris speciem uelit cognoscere. Nam interdum indicia omnia simul adsunt: interdum non, quippe in Germanis; exquisitisque febribus uniuersa prope inueniuntur: in falsis autem non omnia, sed quædam ipsorum adsunt, quædam non semper, propter varias ipsarum causas. Ac maxima quædam in eis tunc curandis, tum internoscendis differentia deprehenditur. In hunc itaque modum internosci debent. Quin & Diuinitissimus Galenus, Ruphus, & plerique alij ueteres de hac re copiosius tradiderunt, nos autem deinceps etiam de curatione agamus. Nam curandi ratio ab illis prædita in quæstionem aliquam uocatur, num uidelicet uera in omnibus existat.

De curatione.

Quod febris Quotidiana, ut quæ ex pituita nascatur, ex tenuantiu incidentiumque usu requiratur, uerum existit, si enim crassa est, & viscosa, ex tenuantiibus indigebit. Duplex autem harum differentia esse cernitur, quædam enim incisoriam uim obtinent, ita ut simul egregie calefacere possint, quædam autem incidendi quidem, non autem ualde calefaciendi potestatem habent, quædam in

totum non calefaciunt. Quibus igitur in hoc morbo uti oportet? ipsæ neque calefacere possunt, an illis quæ citra calorem extenuant? uidetur enim Diuinitissimus Galenus in distinctione Glauconi Philosopho præcipere, ut extenuantibus utatur. Conueniebat autem meo iudicio, cum maxima sit differentia, dimissione ac distinctione uti, quibus, in quo utendum sit. Neque enim pituita huius, unde febris accenditur, unam habet speciem: alia enim est falsa: alia acida: alia vitrea: utraq; uero frigida, & crassa: ac ideo quod particulis sit impacta, febri excitauit. Merito igitur etiam extenuantia ad curationem desiderat: falsa uero non similiter: siquidem & caliditas, & siccitas hoc ei præstat. Calidam autem ipsam quoque esse constat: inde, quod intestinum rodatur atque, & grauissima tormeta, quas Dysenterias Græci vocant, nihil minus etiam quam bilem, cum huius quoque qualitem receperit, suscitetur. Nam humores non secundum materiam ipsorum, sed etiam secundum qualitates eis subiectas operantur. Hæc siquidem aduersus ipsas pugnant, & operantur. Ac pituita falsa, etiam si videatur, tamen constat facultate siccam esse, quemadmodum etiam aquam marinam. Iam alia multa imaginatione quidem sunt humida, facultate autem sicca. At quod pituita falsa nequit per ea, quæ inflammant ipsam, siccantque, extenuari quandoque, & diffundi, sed potius adhuc etiam crassior effici, manifesto hoc testantur nitrum, sal, & iura falsa. Quippe hæc calefcentia, crassiora redduntur. Nam id ab Aristotele, ipsaque experientia probatum est, ea quæ à calore coacta fuerint, non a calore, sed a contrario dissolui posse. Hæc igitur etiam in corporis humoribus considerari debent, & si quidem falsi sunt, non calefacientia, aut quæ admodum siccant, aut extenuare possunt, adhibere oportet, quæ uulgares in eis faciunt, raphani radica, ipsi exhibentes, piper, falsamentum, capparium, & decocta, quæ uel hemeter extenuant, & antidota, quæ aduersus eiusmodi offeruntur. Hæc sane oportebat ipsi potius quotidianis, quæ a frigido atque acido humore prouenerunt, operari: quippe ab eiusmodi adiuuantur. Ego sane noui crebro me omnia hæc in quotidiana, quæ a frigida humidaque, & acida pituita incensa fuit, obtulisse. In quibus autem falsum, aut biliosum quid admixtum fuerit, in his magna ex parte extenuans quidam exhibuisse, præferim si etiam ægri temperamentum calidius erat. Minime uero eiusmodi medicamenta per initia morbi ægrotanti exhibere conuenit, cum falsus adhuc humor superat, præpolleretque, & ægri corpus fuerit immoderate. Sin autem etiam huiusmodi aliquo uti oportebit, eo quod æger appetat, aut ut appetentia restituitur, temperato prius victu utendum erit: ac ubi concoquere æger inceperit, tunc ei permittendum, ut assumat tum cibos, tum potus, qui leuiter extenuent, & calefaciant, ut pote apij turiones, porrique, & piperris exigui, uini momentum, eiusque albi, idque non frequenter

frequenter, nam vsus eorū liberalior noxius est. Verum laborandū est, vt humores ad cōcoctiōnem perueniant, neq; in vetustatē venire sinendi, sed purgandi. Cum enim in corpore diutius infidēt, magis adhuc ab omnibus præsidijs quā calefaciūt vidēturq; extenuare, crasū sunt, vt nō amplius ne medicamētis quidem ad purgandū efficacibus promptē cedāt, cū difficiles ipsi ad motū & terrestres magis ab ipsis euaserint. Noueris at hāc ad purgationē esse opportunitatē temporis, & cōmoditatem. Frequenter. n. vrinarū notā a præsumpto viciū, & tēperata potione mutantur, atque tunc huiusmodi vrinās incoctas esse, ab ijs qui id nō nouerūt, cēseri uidemus. At quia frequēter accidit materiā in totū corpus diffundi, & alias aliter, aut per sudores, aut uomitū, aut uē trem dissipari: ideo vrinā etia sedimentū expertes vulgo apparent. Satiū igitur est cōsiderare, & discernere, quādo potius materia extenuari, diffundi, ad excretionem incitari, & ex loco in locū trāsire incipit, atq; ita demū purgare oportebit, nō solis vrinis animū adhibentes. Nō aut conuenit vniuersā curationem moliri, sed per vias, & interualla. Ita nanq; accōmodari debet morbis, qui ex crassioribus humoribus generantur ac sensim extenuare, & lauitior purgate materiā copiam oportet, donec satis habere uibebitur. Nam si æger assumat medicamentū, quod copiosius purget, magnā corpori intemperiem conciliat, & potius nocet, quam iuuat, magisq; in ijs adhuc, qui calidiore temperamēto, & biliōsiore pręditi sunt.

Quando falsis vtendum in quotidianis febribus.

Qui iecur, aut os ventriculi habent refrigeratum, & acidam pituitā uomunt, tenenturque quotidiana, his etiam calidioribus cibis, si uoles, uti nō alienum est. Humidus enim & frigidus stomachus uniuersa extenuantia citra noxam tolerat. Ausus igitur ego quandoq; sum in quodā, qui quotidie febris accessionem experiretur, & pituitam uomeret, falsis uti, & cibo, qui Græcis Encathera dicitur: item hydrogarō, porri decocti iure, & nō aquoso, ac mirifice conualuit, ita tamē, ut & ori ventriculi, unguentis epithematisq; ei ex trinfecus applicatis, & totius corporis tēperatura prospexerim. non alienum est hęc quoque in Quotidianis tentare, ac pituitā qualitatē, & quātitatem obseruare, atq; ita conuenientem unicuique uictum pręscribere. Quemadmodum enim nō una pituita est species, ita neq; unā uictus rationem esse oportet, sed unicuiq; speciei idoneā. Ac in omni medicina idem pręstandum est, & id quod unicuique salubre est quærendum. ut autē is qui medicamenta quærit, promptē ea possit inuenire, & non aliunde cum Antidota, tum purgationes colligere cogatur, exposui hic discrimina, adiuncta etia distinctione, qualia in quibus usurpare potius oporteat.

De fomentis & cataplasmatibus.

Fomentis autem, & cataplasmatibus per initia statim uti festinandum non est, neq; cum copia humorum in toto corpore superat. Metus. n. est ne dum uiscera nimium incalescunt, laxanturq; cōfluxus quidam ad partes affectas decumbat, & adaucta illuc inflammatione, pręterquam quod nihil proficimus, magis etiā offendamus. Quod ij quoque faciunt, qui priusquam totum corpus recrementis fuerit liberatum, cataplasmatibus, & superfusionibus uti non uerentur. Ego itaq; noui etiam inflammationes, quæ non erant, ob pręcipitem ipsorū usum superuenire. Ne igitur officium; laborandū est copia iam imminuta, & cum iam concoctio quædam in vrinis apparere incipit, calefacientia, aut laxantia si usus requirat, uisceribus inducere. Fugito autem fomenta, aut cataplasmata, quæ laxare tamen, & quæ repellere possunt, mixtam uero confectiōnem ipsorum parato. Et si quidem uiscera infirmiora, & defluxionibus opportuna uideantur, ægerq; fastidiat, astringentium, & roborantium uires intendere oportet, sin autem inflammatione, aut dolore uentur, laxantia potius. Summatim utriusque, medicamenti tum laxantis tum repellentis, uires pro causa urgente, & intendere, & remittere conuenit.

De stomachi imbecillis, & mediocriter inflammatione laborantis fomento.

Ad quinas uini partes misceto omphacij quaternas, chamæmeli binas, & mastiches momentum. Quod si inflammatio feruens appareat, etiam si gleucinum, aut nardinum adieceris, nihil nocebis, sed plurimum quoque iuuabis. Sin autem os ventriculi non infirmum æger habere, aut cibum nō fastidire uideatur, loco uini decoctum fomento admisceas, glandemque unguentariam, & fenugræcum prius in illo decoquendum curaro. Hanc quoq; animaduersionem in cataplasmatibus seruare ratio est, ut mixta in ipsis fiat curatio, & utrobiq; sane anethinum, aut cyprinum, aut nardinum cataplasmati semper adijciatur. At si acoris, aut frigiditatis in stomacho sensus est, etiam in decocto in quo illa parantur, nardum Gallicā, absinthium & anethum adiungere eis oportet. Cum falsum humorem uomunt ægri temperamento calidi, solum quoque chamæmelinum oleum adijcere semper, & mastichæ momentum inspergere conduci. At tempus cataplasmatum esto hora, ante accessionem, absq; plurimo potu, & imposita non diu inhærescant. Quippe omnia, siue fomentum, siue cataplasmata fuerint, etiam si maxime ea quis ex medicamētis omnibus, quæ robur adferre possunt, apparare potuerit, tamen si diutius corpori incumbant, uirium resolutionem, & imbecillitatem efficiunt. Tantum de fomentis, & cataplasmatibus dictum sit. Si enim particularium quoque nonnihil prętermisissim sit, id ratione

ratione quis adinuenire poterit, si omnia confideret, & animum ad id quod conducit intendat.

De purgatione

Materia iam attenuata diffusaq; oxymelite, & alijs quæ in cibis extenuare solent, & decoctis, & cataplasmatibus adhibitis, tunc demum ad purgandum eam venito, valde enim à vacuationibus adiuvantur. Non oportet autem vniuersè ipsos purgare, sed per vices, & simplicioribus: hinc demum aliquanto valentioribus. Cum enim materia sit crassa, haud facile ijs cedit, quæ vniuersam celeremq; vacuationem præstant. Agarici igitur scrupulos tres aut quatuor ex melle exhibeto: in terim etiam plus, aut minus pro ægrotantis viri ratione, & humoris qui superat, quantitate. Quippe pituitam educit, nec morbum inueterari sinit.

Aliud: Et granum Cnidium, si post concoctionem datur, diuturnis Quotidianis medetur. Adhuc catapotia quibus ego semper, & in Quartanis & alijs affectibus vri soleo, benefaciunt in vesperam data. Habes ipsorum descriptionem alibi quoque proditam: hæc autem recipit. Aloes vnciam, cucurbitæ sylvestris vncias duas, scammoniz vnciam: euphorbiæ semunciam: veratri nigri corticis vnciam: bdelli vnciam: gummi vnciam: nitri Alexadrini semunciam: in alio exemplari habetur scunciam. Succo brassicæ excipito, datoq; ex eis scrupulos quatuor, aut quinque: nihil metuens, aut rofionem, aut nimiam purgationem: vacuat sine omni molestia non modo pituitam, sed etiam humorem melancholicum, eo quæ circuitus quartanos finiunt. Dato hæc catapotia, granorum instar figurata, in quibus multa cruditas, crapula, & vita ociosa præcescit, temperamentum quæ est pituitosius, & quod nihil siccum, aut acre obtinet. Nam in eiusmodi tuto dantur: & qui hæc assumunt, valde adiuvantur.

Aliud quod citra molestiam sumitur, à sale dictum

Gracis Halatium, admodum
efficax.

Gingiberis, petroselinii Macedonici, epithymi, laseris, cumini, apij seminis, ligustici, singulorum vnciæ quatuor: scammoniz vnciæ tres, & semissis: salis communis, & torrefacti vnciæ quatuor.

Aliud ut scriptura Halatiorum habet præstantius

Gingiberis semuncia: petrosellini Macedonici, epithymi, laseris, apij seminis, ameos, cumini, ligustici, piperis, singulorum drachmæ duæ: salis torrefacti vnciæ duæ, semis: scammoniz scuncia, scropuli sex. Dato vesperi in febrium intervallis, quâdo cunq; velint. At si alium emoliri velis dato cochleare vnum: sin autem plus purgare cogites, duo: ac in robustioribus viris scrupulos septem exhibeto: in pueris & mulieribus gravidis, & in summa sin imbecillioribus tribus, vel quatuor scrupulis vacuationem moliaris. Ita sine omni molestia, & periculo offerentur. Licet etiam cum

pane dare, & ex posca, & oleribus. Attamen præstat in morbis, qui per circuitus reuertuntur, cum pituita cremore ipsum præbere. Tantum etiam de purgationibus dictum sit.

De antidotis ad Quotidianas.

Styracis calamitis, iridis Illyricæ, myrrhæ, singulorum drachmæ quatuor: opoponacis, piperis, galbani, opij singulæ drachmæ. Hæc trita omnia in unitatem cogito admiscens eis mellis quod sufficit, ac dato fabæ ægyptiæ instar ante accessionem in lecto decumbenti peruncto quæ ex oleo, & pipere granis decem iuxta uero apposita sint prunæ. Hoc somnum, & sudores excitat, leuatq; præcipue, eos qui multa cruditate scatent.

Aliud.

Agarici, gentianæ, singulæ drachmæ dantur cum mulla ante accessionem. Hoc medioenter extenuat, meatus infractos aperit, & materiam per aluum, & vrinas moderate ducit.

Aliud.

Decoctum chamedryos ijs quos Quotidiana febris circuitus affligit, potioni dato. Vrinas multas ducit, & leuat. aptum ergo illis, qui non valde febricitant, neque temperamento calido sunt, & sicco.

Antidotum ad quotidianas, facit etiam

ad quartanas.

Opij, oppoponacis, castorei, seminis dauci singulorum drachmæ quatuor: laugatis paulum mellis adijcito, viris obulos tres, pueris duos exhibeto. Vtitor autem hoc tanquam admirabili ex multo hora ante accessionem, & præsertim quos non falsa pituita vrget, nec bene calidum siccumque temperamentum inest.

De unctione.

Unctione utemur ita, ut ad horrores febrisque magnitudinem, & ægri vires respiciamus. Si namque multa perfrictione, & horrore infestante, febris non adeo tibi uehementis appareat, neque vires imbecillæ, sed robustæ, magis utitor ualidis unctionibus, quæ externam cutem calefacere, ad roborem perducere, & extenuare possunt. Si contra, neque vires ualidæ, neque frigus multum, ac febres uehementes fieri uidentur, tunc ijs utendum erit, quæ cutem modice extenuant, & rarefaciunt. Dicamus igitur de unctionum differentiis, hoc ipsum præterea distinguentes, quæ nam ualentiora, quæ uero imbecilliora existant.

Unctio valida.

Pyrethro, pipere, & nitro pari portione cum pulegij momento, in unitatem coctis, & ex oleo contritis, summas corporis partes, & spinam perungito. Sin autem frigus etiam in ea percipitur, mirifica est unctio, & ualde proficit, uehementem perfrictionem, morbi que ueritatem expertis.

Alia mediocris.

Piperis grana tria, & micam thuris in laeuorem trita ex oleo illinito.

Alia.

Nitro ex oleo trito summas ægri partes, spinamq; tum in balneo, tum extra illud perfricari iubeto. mouet enim sudores, & inuat.

Alia valde bona, & multis experimentis comprobata.

Arthemisiæ Crocodiliadis, adipis Crocodili fluuiatilis, singulorū vnciæ sex; olei sextarius. Coctis ex oleo eggū & præsertim eius spinā ante accessio nē vngito, ac miraberis efficaciam. Nō abs re est et odoratū quid admiscere, eo quod unctio ingrati sit odoris, & contraria quadā ratione operetur.

Alia in quibus febres vehementes vrgent, & frigus prædomino moderatum apparet efficax.

Spume lebetū in balneis effervescentiū oleū admiscero, dū visci erasitudo fiat, vngitoq; corpus, antequā febris inuadat. Idem naturaliter præstat.

Naturalia, quæ corpori alligari solent.

Lapis Actites cum ad alia plurima, tum ad rigores, qui per circuitus reuertantur, & præsertim ad quotidianas facit, sic corpori alligetur.

Aliud quod appendi solet, multis experimentis mentis à me probatum.

In folium oleæ ex communi atramento inscribito, Ca, Roi, A. Capito autem folium oleæ ante solis exortum, & collo suspendito.

Aliud naturale ad Quotidianas.

Animalculum quod desidet, & textit, ut muscas tenetur, bene facit, si linteolo illigatur, & sinistro brachio appendatur.

De Quartana. Cap. V III.

Quartanæ febris non una est species, sed multiplices, & diuersæ existunt. Etenim alia ex flaua bile nimium adusta, alia ex feculento sanguine nascitur, non solum autem materia, sed etiam loco in quo constituuntur, inuicem differunt: hæc enim in uasis, illa in liene potius subsistit. Quoniā igitur diuersæ sunt species, curationis quoq; modos diuersos, & non unum, sicut vulgares arbitrantur, esse oportet. Nanq; ab humore melancholico creatur, merito calefacientibus humectantibusq; inuatur. Quæ uero ex nimia bilis adustione prouenit, humectantibus, & refrigerantibus, ut peponibus, uua, ostris, pisciculis, aqua, & breuiter temperata, & refrigerante uictus ratione, ac balneis tepidis tractari debet. Mihi itaq; frequenter subit mirari, quomodo Diuinisissimus Galenus in omnibus nō alium quendam uictum, quam qui calefacere ipsos, & siccare possit, præcipere uideatur. Præbet enim ipsis antidotum Diatrion pepereon, & quod Diospolites dicitur: item liquorem Cyrenaiū, & Theriacam, & in cibo, salsamentum & piper. hoc autem potissimum quotidie bibere iussit. In uniuersum præcipit abstinere ijs, quæ refrigerant & humectant, eo quod humor, inquit, morbum efficiens frigidus existat. Verum etsi humor melancholicus calefacientia desideret non tamen necessario etiam siccantibus indiget. si quidem frigidus est & siccus,

calefacientibus, & humectantibus opus habebit. At non uidetur etiam humectantiū aliquot prorsus uelle præscribere, sed è contrario omnia quæ siccant affantq; nimium, & humorem crassiores potius reddunt. Nam quæ uidentur magis extenuare, cum sint etiam paulo calidiora, quam ut mediocriter extenuet, postea terrestres magis, & multo quam prius crassiores efficiunt, dum humiditatem quæ in eis subsistit, exuguunt, insumuntq; ut natura ideo recrementa lentius excoquat. Didicimus enim concoctiones omnemque uitæ originē calido fieri, & humido, id quod etiam in externis uidere licet. Nam fructus & singulæ stirpes à pluuijs, & solis calore producuntur, & præterea omnia quæ præter naturam existunt, contraria ad curationem requiruntur: quæ secundum naturam, sunt similia potius. Quare hoc est præstantissimū medicī officium, ut calidum quidem refrigeret, siccum autem humectet, frigidum calefaciat, & humidum siccet. In summa, ut ea quæ sunt uitia ac affectus, contrariorū usu euincat, ac omnia quæ res postulat curiose persequatur, omniq; arte & ratione, tanquam in bello decertans, ægrum conseruet. Si quando igitur accidat ægrum & siccior quoq; uti uictu, uel quod appetat, uel etiam quod ita laborans siccantia medicamenta aut cibos requirat, nempe hydrogærum, uel conditum, uel eiusmodi aliquod præsidium, consulo & tunc, ubi semel, aut bis eo fuerit usus, ac corpus modice incalescat, rursus statim ad uictum per initia institutum, qui leniter humectare, & calefacere possit, reuerti. Ita enim neque ea quæ calefaciunt, assumpta multum adeo nocere poterunt: & præterea humor qui natura admoendum difficilis, & siccior erat facilius solui poterit, ut ipse remissus post dissolutionem, & quodammodo excerni incitatus à medicamentis, quæ benigne euacuat, citra noxam paulatim suberahi queat. Etenim sic agendum est in crassioribus siccioribusque humoribus, ac humectare ipsos, & dissoluere cōuenit: nec diutius dissolutio eorum expectanda est, sed protinus ad purgationē ipsorū properandū: & si adhuc res postulat, rursus humectando, tū balneis, tū uictu ita subducere expedit.

Quartana, quæ ex nimia flaua bilis adustione excitatur.

Quod si quartana nō tibi à sicco, frigidoq; humore, sed potius bilioso, & plus satis adusto excitari uideat, tūc potius refrigerare potentibus uti oportet: si quidē eger et natura calidus simul & siccus, etate uigēs, & frigide potionis assuetus appareat, adhuc si anni tps sit æstiuū: interim uero si et cures, uigilie, tristitia, ira, & acriū medicamentorū usus præcesserit. hæc. n. oīa biliosa, & ex adustione nimia quartanā generare, possūt. In his igit nō peccaueris, si potionibus, et cibis frigidis utaris, ut peponibus, si tps dederit, duracinis, intybis & lactuca; breuiter nō offēdes, si oīa agas q̄ in germana tertiana tētaueris. Nulla. n. alia rōe humor q̄ à

ē aliditate, & siccitate inspissatus fuerit, euinci potest, nisi quedam refrigerantia humectantiaq; asumpseris, quemadmodum etiam quæ à frigiditate inspissata sunt, à calefacientibus. Hęc igitur, vti diximus, vniuersa calefacientia, etsi extenuare videantur, tamen inspissant præterea. Quare in his offerenda non sunt vt quæ eiusmodi humorem crassum reddant magis quam extenuent, præsertim quæ vehementius calefacere, & inspissare prædicantur. Quare neq; in quartana cataplasmatibus, aut superfusionibus, fomentisq; vti studebimus. Quippe vntio sola quæ ex copiosiore hydrelæo paratur, frequentius à balneo, & cibis temperatis adhibita calorem abunde contemperare, ac lenire potest, & si quæ in iecore durities est, hanc quoque laxare. Sin autem res postulauerit, ipso quoque solo potius vti oportet, vel etiam chamæmeli decocto in quo absinthij, thuriones, palmulæ pingues, & melilotū deferbuerint. Noui me in quartana etiam frequenter epirhematis vsum, tempore quidē opportuno, vt in tertiana ante accessionem, ex farina ordei, lini, semine, & decocto chamæmeli, ac multū profecisse, vt eger nō amplius accessione expertus, fuerit. præsertim autem in quartana, quæ ex nimia bilis adustione concitata erat, ac in pueris temperamento calidioribus, in quibus inflammatio quæpiam præcordia exercet, talia probari videntur. At si quis etiam in frigida quartana, (sic enim appellanda est, quæ ex frigido, & sicco humore melancholico excitatur,) superfusione item calidiore ante accessionē vtatur, hic item maximum adiuumentum sentiet, vt etiam subito febris conquiescat, quamuis molestam accessionem ægrum experiri contigerit. Satius autem est, si quis etiam toto antea vacuato corpore superfusionibus, omniq; alio particulari præsidio vtatur. Qui enim toto corpore adhuc sordido, ac impuro, vel cataplasmata inducere, vel perfundere aggrediuntur, hi insignium malorum auctores fiunt. Caterum quartanas ex adusta bile consistentes purgare decet, corpus prius humectando plenior cibo, & quiete: quæ vero ob humorem melancholicum procreatur, humectare quidem eas oportet, (siccus enim humor ille existit,) ob terrestrem vero eius partem, & frigidam, tum calefacere, tum extenuare conuenit. Purgationem autē non per febris iničia, sed cum concoctio iam apparet, moliri, debemus. Ita porro etiam si ægrum sanguinis vacationem requirere censes, vt ex quo humor melancholicus procreatur, in statu, cum humor quoque à natura cōcoqui solet, tentare eam cōuenit. Tunc enim leuata natura reliquias materiæ euincit, id quod tibi cōcoctio in yrinis apparens indicat, ad medicamentum purgans, nempe, quod ex Rhodomelite conficitur, bilem, & humores nimium adustos sine molestia purgans, hoc præstare debet: habet autem in hunc modum.

Purgatio ex Rhodomelite.

Succi rosarū sextarij duo mellis, sextarij: scamonie torrefactę vncia. Omnia simul coquuntur, danturq; ad summum chochlearia duo, vel minus. At si humor biliosus nō admodum calidus, & siccus, sed crassior, ac pituitoso humore adulteratus esse videatur, paulū agarici prædicto Rhodomeliti adijciendū erit: atq; in eū modum hic quoque leniter purgari debet. Vt autē prompte cōponas medicamentū, paresq; subscribam eius quoque mixturā, quæ ita habet. Rosarū succi libra: scammonie vncia: agarici vncie quatuor, piperis scrupuli duo mellis vncie sex. Ad ignē lentum hęc coquito, ac vbi in crassitiem coierint, adijcito scamoniam & piper, atq; vti tor. Nam sine omni adeo molestia vacuat, præterquam quod non multū calefaciat.

Purgatio quæ ex malis cotoneis paratur.

Mala cotonea octo impleto scammonia, cuius modus sit vncia, & extrinsecus ea fermento oblinito atq; sic assanda dato: vbi assata probe fuerint, adijcto mel probe lauigatū ac vti tor pro yrinum ratione, in febribus quæ à bile excitatur & in ijs, qui generosam purgationē ferre nequeunt, atq; in pueris magis, & mulieribus, nā citra omne proptus molestiā purgat, sin ipsū efficacius reddere voles, in istum modū parato. Scammonie vnciā: petroselinī: Macedonici vnciā, piperis albi vnciā: agarici semunciam, succi cotoneorū vncias sex, succi citrinorū vncias tres, mellis libram. Dato in stat vnciā. Succū melle coquito, atq; ita pulueres leuigatos inspergito, ac in pixide recondito cū fiducia. Est enim præsidium in multos vsus accommodatum, vt quod non solū bilem, sed etiam pituitā & humorem melancholicū repurgare probe possit. Atq; idcirco quartanis quoque falsis exhibere licet, in illis autē magis, quorū stomachus affectus neq; concoquere bene, neq; appetere cibū potest nec nō ijs qui quotidianis infestantur. Hac decanla varijs in mixturis ad omnia præparare cōducit.

De vomitu.

Vomitibus omnibus vtilissimus est, præsertim ijs qui humores crassos in ore vetriculi continent. Nā crassitie extenuat, & vt cōcoquatur, celeriusq; discutiatur, efficit. Optimū autē tempus ad vomitum est accessione incipiente: quoniā etiam tunc humores, cum materię mouentur, & illi in stomachum confluunt, illumq; rodunt, nauseam excitāt. Dato eis nullam non nimis aquosam: ita namq; procliuus ad excretionem prorūpent, qui autem valde lenti sunt, & difficulter auelli possunt, egrius excrenētur, ac pennis præcipue anserinis vtiendū est, vt maiori irritatu vomitus omnino proueniat. Si. n. ex lētis humoribus aliquid sursum eductum fuerit, statim etiam accessio minuetur, tum spacio temporis, tum simul more ac cōsuetudine. Ego enim noui me hoc modo inueteratas quartanas discussisse, vt nonnullē ipsarum superata iam deteriore parte conquieuerint.

De salsamentis.

Salsamentis autē in illis nimirum, qui ab humore melancholico excitantur, & in quibus stomachus vitiosis humoribus scaturit, aut multa liemem vrget obstructio, vtendum est. Maxime hic commendatur etiam Encathera dicta, & quæ Alexandrinorum Buridia sunt, Menomenia, & Membridia. Oportet autem eum, qui horum aliquod assumit, aliquandiu sitim tolerare, & nullā potionem ingerere, vt efficere quid possint, & vim suam corpori imprimere: deinde vbi ita viribus destituitur æger, vt sitim ferre nequeat, tunc vinum Ascalonites, aut Gazites dilutum quantumlibet, propinare licet. Ego itaque noui quendam ex his qui Quartana ex terrestri & frigido humore laboraret, ita huius victus rationis vsu liberatum, vt etiam per alium humorem superatē excreuerit. Erat autem id quod excreuerat adeo valde nigrum, ut nonnullis medicorum metū incuteret, non modo ob colorem, sed etiam propter copiam euacuatā. Verū quod eger paulo post morbum facilius ferre inceperit, & quod licet, qui antea maximus erat, paruus euaserit, effecit, vt omnes bene sperarent, & nihil amplius metuerent. Sciendum vero est, quod tibi enumerati, & quicquid abstergere, & extenuare medicriter potest etiam cum concoctio incipit apparere, humidioribus tēperamēto, frigidioribus, & bene habitis dari debēt. Etenim humores tūc magis & repurgantibus, & extenuantibus prōptē obediunt. Qui enim per initia, et in materia planē esset incocta, extenuantibus vel purgantibus vsi sunt, hi præterquam quod nihil eorum quæ superabant, in corpore vacuare potuerint, etiam sicciores crassioresq; humores effecerūt. Si itaq; talis sit Quartana, quæ à frigido, & terrestri humore concitetur, ita agere oportet. Sin autem à bilioso humore, exusto, & in cinerem redacto prouenerit, omnia contraria, quæ humectare, aut refrigerare possunt, tentare conuenit: balneum dulcis aquæ adhibere, & cibos tēperatos. In summa quemadmodum diuersas habent species, ita quoque differentem ipsarum victum præscribere oportet.

De antidotis.

Nonnulli veteres Quartanarijs, etiam antidota dederunt ac multas variasq; descriptiones ab ipsis proditas inuenire licet. Quin & Diuinisimus Galenus eam memoriæ prodidit, sed nullā videtur vsus distinctione: unde pleriq; cum eis quæ titulo ipsa promittebant persuasi, deinde non exquisita discretionē exhibuissent, maximæ offensionis & periculorum auctores extiterūt. Miror fanē, cur antidotum ex liquore Cyrenaico paratum omnibus conuenire dixerit, iubeatq; frequenter eo uti, at qui nō uidetur res sic se habere. Neq; enim citra offensionem quis ipsum hominibus calido, sicco, & bilioso temperamento præditis, &

in Quartanā ex nimia aduersione prolapsi, bibendum dederit. Attamen nec ea quæ ex sulphure uiuo, & pipere confecta sunt neq; Theriace antidotum dari debet. Hęc. n. uniuersa istis aduersantur. Quare præstat eis, si fieri potest, nullum antidotum exhibere, uerum sufficit, uictu potius refrigerante, & contēperante, nec nominis quæ superflua repurgant frequentius uti. Sin autem antidoto interim uti cogaris, illa potius in Quartanis ex aduersione nimia ortis propinauda putes, quæ constant ex opio, cicuta, & alterco, itē quæ urinam prouocare possunt, ita ut non ualde calefaciant, idq; in eis præcipue, quos uigilia, & sitis comitatur. Nam somnus ante accessionem obueniens frequenter impediuit, ne accessio in totum oboriretur, aut effecit, ut moderatio ea fieret. Porro ut antidota à me dicta facile inueniantur, necessariū duxi compositiones exponere maxime illorum, quorum etiam antea in Quartanis, quæ ab humore Melancholico excitantur, multam habui experientiam.

Antidotum ad quartanas, quæ ex humore melancholico constituuntur.

Castorei, papaueris, mirrhæ, piperis albi, liquoris Cyrenaici, singulorum drachmæ quatuor. Liqueorem lenigatum & aqua maceratum reliquis adijcito, singuloq; catapotia, & dato ante accessionē ieiunō, aut cēnato ex aqua. Præstat si egrū ipsum etiam perungas, nempe oleo calido, quod nitrum admixtum habeat.

Aliud etiam ad quotidianas efficax.

Opoponacis, opij, castorei, alterci seminis, singulorum drachmæ quatuor. Lenigatis paulum mellis admisceto, datoq; adultis quidē dimidiæ drachmæ instar, pueris aut hora antequam inuadat accessio obulos duos.

Aliud ad Quartanam.

Liquoris Cyrenaici, piperis, mirrhæ, rutę folia, singulorum drachmæ quatuor. Detritis, probeq; mixtis ante accessionem ex oxymelite utitor.

Antidotum Acariston.

Facit ad multos interiores affectus, præcipue uero ad Quartanas. Croci uncia, opij uncie septem, galbani uncie septem, casia uncia tres, styracis uncia septem, myrrhæ uncia quatuor, castorei uncia septem, costi uncia tres, piperis uncie quatuor, spice nardi uncie septē, mellis despumati, quod sufficit. Datur fabæ ægyptiæ instar ex mulla ante accessionem.

*Antidotum quod & ipsum mirriscē ad**Quartanas ualeat.*

Styracis exquiliti drachmæ quatuor, myrrhæ drachmæ duę, opoponacis drachmæ quatuor, iridis selquidrachma, piperis drachmæ sex, galbani drachma, lachrymæ papaueris drachma. Datur fabæ ægyptiæ instar melle exceptum hora antequam accessio inuadat.

Pastillus insignis admodum ad Quartanas.

Opii veteris, rute foliorū, singulorum drachmę due: croci drachma, alterci foliorū drachmę due. Contusa increta, laugataq; in pastillos redigito, qui singuli scrupulos duos pēdeant. Ac dato horis duabus ante accessionem ex posca, pro ægri virium ratione.

Pastillus alius benefaciens admodum Quartanis.

Piperis albi, seminis dauci Cretici pares portiones. Contusas incretasque ante accessionem ex multa aqua calida cochlearij mensura dato. Hoc plerosq; cū simplicius sit, adiuvit quartanarios.

Pastillus alius præstantissimus, ut nullus alius, succurrens curasq; cellerrime: elicit enim sudores, atque ita morbo diuturno agrum liberat.

Opii drachma, piperis longi, castorei, singulę Mulso conformantur. Dato singulis obolum ex oxymelite lotis, & in lecto repositis. Hoc multos sudores euocat, & magna ex parte bis, aut ter potum liberat. Hæ omnes validæ sunt antidotorum vires, ad calefaciendum, & attenuadum efficaces. Quare etiam Quartanis potius, vt diximus, conueniunt, quæ à melancholico, & terrestri humore excitantur adulteranturque à pituita, non autem continue, sed per longa intervalla exhiberi debet, Nam liberalior eorū vsus humores multo adhuc sicciōres, crassioresq; efficit. Tutius autem dantur, cum concoctio iam apparuerit, & vires sint robustæ, ac ægri multum ad hoc inclinationem habent, qui & à nobis medicamenta fumere consueverunt, & nos pharmaca sibi offerre compellunt. Sunt enim nonnulli non modo barbari, sed etiam alij pleriq; opinione ac ratione aliena præditi, vt etiam secari utiq; præ omni medicina malint, ac eos qui hæc faciunt, scire aliquid arbitrantur, inuitantq; studiose in edes suas, & præstantiores hosce medicos censent, quam qui uictum præscribunt. Si igitur nostrum aliquis dare quid eis cogatur, qui calido siccoq; tēperamēto sūt, & ex nimia flaue bilis adustione Quartanā experiuntur, illa offeret antidota, quæ uim non adeo acrem, & calidam possident, sed quantum licet, ac uacant, & si fieri poterit, refrigeratā potius, & ad somnum inducendum, sensimq; extenuadum efficacā obtinet, qualis est etiam Xenocratis pastillus, cum ad alia pleraque utilis, tum uero eximie, & ad Quartanas, & ad Tertianas. descriptio ipsius in hunc modum habet.

Pastillus ad Quartanarios ex nimia flaue bilis adustione.

Seminis papaueris hortensis, lachrymæ papaueris, singulorum scrupuli duo: alterci albi, succi

dulcis radicula singulorum scrupuli sex: styracis, anisi, singulorum scrupuli quatuor: croci, castorei corticis mandragorę, singulorum scrupuli tres. Arida contusa, incretaque, succo, sapa uel passo Cretico ueteri excipito, ac utitor cum fiducia in his præcipue, quos uigilia comitatur, alius profuit, os uentriculi fluxione laborat, & dolor Colicæ exercet.

Aliud simplicius.

Decoctum scopiuri herbę mirifice prope omnibus auxiliatur, si ante accessionē bibatur. Iuuat enim non modo ratione naturali, sed etiam quia materiam per aluum & uomitus educit.

De lapide armeniaco.

Lapis qui Armeniacus dic itur, siue lotus, siue illotus offeratur, quatuor siliquarum pondere mirabiliter ad omnē Quartanę speciem ualet. Nam humorem melancholicum ut nullum aliud præsidium euacuat: sed lotus quidem aqua per inferiora magis purgat: illotus autem per uomitiones citra calorem, non quemadmodum alia. Si uero nonnulli lapidis potionem odio habuerint in catapotia redigito, his medicamentis ei adiectis. Aloes scrupuli quatuor: epythimi scrupuli tres: agarici scrupulus: lapidis Armeniaci scrupulus: gariophyli grana quinq;: scammoniz scrupuli quinq;. Excipito succo Citrij, aut Croco melo, aut Rhodomelo, aut Rhodomelite. Dantur scrupuli duo. Proficiunt etiam catapotia ex epythymo absque scammonia, habent autem in hunc modū. Absinthij succi drachmę quatuor: medullę cucurbitę syluestris drachma: aloes drachmę duæ, mastiches drachmę tres: epythymi drachmę duæ. Datur noctu catapotia. Benefaciunt etiam ad mendaces Quartanas, quę paulum quoque pituitæ habent admixtum.

Aliud antidotum mirificum ad multa efficax maxime uero Quartanis.

Vetustum capitis dolorē sinit, uertiginosūq; affectum, comitiales accessiones, & uigilias sopit: insaniam quæ Mania dicitur, sedat: magnos oculorū dolores lenit: fluxionē dolorēq; dentium discutit: spiradi difficultatem, omnemq; asthmatis causam abigit, tussis uetustæ, peripneumoniz, & pleuritidi medetur, cum sicce, tum humide: omne à pulmone humiditatis uitium dissipat, sputa tenuia mitigat, & educationi parationem ex hydromelite potum efficit. Sin autem quis sanguinem spuerit, ex oxymelite, aut posca, aut polygonij succo, aut plantaginis drachmarum duarum instar dato, pro ægri uiribus ponderi paulum quiddam adijciens, aut detrahens. Cæterum hoc antidotum stomachi est præsidium. Nam ex humiditate flacidum, imbecillemq; astringit, & firmat, cibosque ob uomitiones non

non continentem roborat, & omnes uetriculi inflationes per ructus discutit, punctorios iecoris dolores mitigat, & Arquatis morbis auxiliatur. Nam unamquamq; partem ad priorem naturam reuocat, & atra bilis morbum, quæ Melancholia dicitur, diuturnum, & turbulentum, uigiliisq; leuatis lienis grauitatem subtrahit, & faciei colorem restituit, pituitam bilem per intestina detrahit, caliditatem intestinæ partitæ suggerit, distributionis meatus aperit, urinas segregat, & ueluti renes inuadit, atque ita ex eis tum arenas tum sanguinis grumos, ad uesicam propellit, tenibus ac uesicæ medetur, urinae difficultatem reprimat. Omnibus porro prædictis affectibus potu assumptum opitulatur. In ileosis autem morbis, & Coeliacis hæc potio ueluti uiam preparat, inueteratum sterces subducit, uetustamq; inflammationem resoluat, tormina lenit, distentionem uasorum remittit, & quietem inducit, non ueterini modo, sed somno concilians. Qui igitur per os id assumere nequeat, his inijecto per alium cum fœnugræci succo, & dolore liberat. Iam plurimū auxiliari potest uteri, ut aiunt, calamitatibus. Quippe dolores quoque ex partu solatur, & uigilias molestissimas imminuit, elationem distensionemq; uteri molit, morbosam purgationem reficit, recreatq; & angustos uasorum meatus dilatat, sanguinis in uterum profluium acutius, magisq; subitum non modo potu restringit, sed etiam uino calente in ipsam infusum sistit, item uocis abscissionem, & neruorum contorsiones potu mitigat. Utimur eo in Articularijs, & Podagricis, ac plurimum id opitulari ægris compertum est. Maxime uero inuenias medicamentum uim istam in uirulentis, non modo si per os exhibeatur seruare, sed etiam si locis oblatis illinatur, proficere, ac in uehementibus periculis utroq; modo antidoto utendum est. Itaq; non solum in continuis febribus, ardētibusq;, & colliquantibus, quæ syntecticæ græcis dicuntur ex aqua, uel mulla sumitur, ac maxima titulus eius promittit. Datur ægris drachma instar hora una, aut duabus ante accessiōem, in Quartanis autē copiosiore uxor medicamento, eo quod diuturnius malum inhaereat, & ægre refici possit. Qui medicamentum hoc donauit, incomparabile ipsum esse asseuerabat. Hæc est ipsius cōpositio. Myrrhæ scrupuli septē, spicæ nardi scrupuli treditim, croci scrupuli quindecim, castorei scrupuli quatuor, opij scrupuli octodecim, amomi scrupuli quatuor, anisi, scrupuli decē, petroselinæ Macedonici scrupuli quindecim, apij seminis scrupuli duodecim, iunci quadrati floris scrupuli nouem, casia Aegyptiæ scrupuli quatuor, piperis albi scrupuli quatuor, piperis nigri scrupuli quindecim, sysonis Syriaci scrupuli duodecim, styracis scrupuli sex, seselios scrupuli quatuor, Hedichroi fecis, quod magna dicitur, scrupuli quinque, mellis despumati quod sa-

tis est. Syracem dilatatum melle soluito, arida super insperges. Opiū uero ex sapa macerato, donec mellis fiat spissitudo, atq; sic reliquis adijcito

De balneis.

Sciendum est, balneis quoq; sic utendum esse, ad unamquamq; speciem respiciendo, calidioribus quidem in ijs, quæ ex humore melancholico excitantur, temperatis autem potius in illis, quæ ob nimiam humoris biliosi adustionem proueniunt, adhuc exercitijs similiter, & frictione, sed minus in calidioribus.

De unctiōe.

Præterea unctio interdum quidem adhibenda est ex oleo cyprino, aut gleucino in frigidioribus, Chamæmelino autem, uel oleo dulci, aut hydreleo in calidioribus. In summa pro uaria huius specie, diuersa quoq; curatio adhibeatur. Frictio nē tā, ut maximū præsidium, si quid aliud adhibere conuenit, nūc copiosiorē, nunc pauciorē. Satis igitur sunt, & dicta iam remedia, & uniuersa uictus ratio, si quis oīno perseveratē uti uelit diuturnæ Quartanæ medebitur. Quoniam uero nonnulli negligentes metuunt, ne morbus diutius moretur, & multis corripiantur accessiōibus, omnibus desiderant uti, & naturalibus simul, & his quæ alligantur, necessariū duxi propter huiusmodi hæc quoq; exponere, si quid a nobis ex longo tēporis usu, & experientia cognosci potuerit.

Medicamentum.

Medicamentum, quod appendi solet ad quartanas, sæpe a nobis multis experimentis comprobatum. Scarabæus Quartanarios curat, oportet autem ipsum uiuum extrinsecus fuluo linæolo firmiter alligatū, collo suspendere. dicunt autem hoc ipsū præstare, si ita appendatur. Est hoc quoq; uerum, usu multo compertū. Lacertam uiridem appendito, item ex unguibus ægri tum manuum, tum pedum exigū præcisum, sicut facere solent, quibus ungues præciduntur, rufo panniculo iniicere, & in eo firmiter illigatū ita appendito, ac rursus appensam ipsam resolvere unde etiam capta fuerit. Referunt quoq;, si quis ex gena hirci pilos acceptos ægro adalliget, mirabiliter Quartanæ posse mederi. Omnium uero naturalium medicorum testimonijs confirmatum est sanguinem qui primus a uirgine fuerit excretus, naturaliter Quartanæ aduersari, similiter etiam corruptæ sanguinem efficere, si quis ipsum ægro ad brachiale dextræ manus, aut ad eiusdem brachium alliget. Noni ego quendam, qui hac ratione utens Quartanam curauerit: dabat mulieri parienti pallium ægotantis ferendum quod ille interius ferebat, illotū, & iam perspirabile: postea a partu pallium recipiens, ægro ferendum rursus præbebat. Ac Quartana non amplius in posterum affligere, mirabiliter contrarietate quadam, & ratione arcana deprehendebatur.

Ex libris Aetij de Erysipelaceis viscerum
affectibus.

Erysiplaceus affectus nonnunquam viscerum alicui oboritur, qui febrem ardentem, & Hæcticam inferat. & siquidem Erysipelas ventriculum oblideat, hinc febris incenditur, quam Lepyrian Greci nominant, sin autem iecur infestet, Typhode, si pulmonē exerceat, Grynodē. Huiusmodi vero febris primum refrigerantibus, & humectantibus, tum cibis, tum potibus, & ijs quæ exterius imponuntur indiget. Quoniam igitur Hæctica febris alteri morbo non est cōmixta, balneum requirit, quemadmodū etiam alij omnes calores, & siccitates. Quod si Erysipelaceus affectus viscera vrgeat, abstinendum quidem balneo in totum, frigida autem in morbi vigore strenue vtēdum est. Ita nominare consueuimus, cum vna vice & frigidissima, & multam dederimus, verum ante statum frigida non vtēmur, nisi ab ægro, qui & frigida potioni asseuerit, et sitim ferre nequeat, coacti fuerimus. Extrinsecus igitur imponi debent, quæ refrigerant, & si nihil proficiunt, tunc etiam frigidam potionem dare, aut potius cibos refrigerantes oportet. Maxime omnium conueniunt teneræ, & dulces lactuæ. eluantur autem liberaliore aqua frigida, optime quidem ita sum-

pta proficiunt. Quoniam vero iniucunditatem ipsarum, si ita sumantur, gratiorē nonnunquam reddere coacti sumus, aceto copiosiori aquæ frigida mixto, intingere illas permittemus. Acetū autē sit tale, quod ab omni vitiosa qualitate prorsus recesserit. Extrinsecus etiam ipsa lactuæ succus accommodari potest: imo & semperuiui, & scris, similiterq; refrigerantiū. Præstantissimum quoque est, quo nos vtimur, ex oliuis acerbis, & rhoe. Humorem enim ipsorū expressum in pilam cum portulaca viridi cōmiscimus: deinde cōtissum exprimimus: & coniecto in vas liquore, & orificio exacte obturato, vas in aquam frigidam mittimus: præstaret autem si vas etiam nunc obduceretur. In vsu miscemus farinæ ordei tenuissimæ: deinde maceratum, vt liquidius sit, linteoduplici illinimus, imponimusq; præcordijs, ita vt nō diu sinamus inhaerere, sed postquam tepidum euaserit, hoc quidem tollentes, alterum imponamus, idq; perperuo consequenter facientes, donec æger altas corporis partes quodammodo refrigerari senserit, & sitim minus crucietur. Miscemus autem nonnunquam etiam oleū omphacinum, & rosaceum, vbi Erysipelas inflammatorium præcordia torserit. Atque hæc sanē de febrium curatione abunde dicta esse arbitramur.

D E F E B R I B V S

A E T I I L I B E R.

Febrium diuisio, & de diarijs febribus. Cap. 1.



LX morbis ob intemperie oriētibz unus est & febris ipsa, calore præternaturali ad tantam immodestiam euecta, vt angat hominem, & actionem lædat. Differentiæ huius caloris maioris ac minoris ratione distinguuntur, & iuxta subiectum siue mate-

riam: aut ipsum cordis corpus calore occupante, aut humores, aut aerēam essentiam. Incipit igitur hæc præternaturalis caliditas, aliàs ex alio de prædictis, & nisi soluta fuerit, progressu temporis similiter reliqua duo genera afficit. Et si quidem in spiritibus permanferit hic calor, diariā febrem efficit. Si vero humores occuparit, febrem putridam incēdit. Si vero ipsum cordis corpus iniuriā affecerit, hæcticā ac habitualem febrem facit. Nam aliqui febriēntes facile solubilem affectionem habent, velut calefactū sole lignum. Aliqui

uero ægre solubilem, velut accensum ab igne lignum vt etiam fumum edat. Quidam uero planē exuruntur, velut lignum ad carbonis naturā adactum. Tria igitur sunt genera, diariæ, putridæ & hæcticæ. Primum itaque de diarijs tractabimus. Fiunt hæc febres, velut dictum est, citra humorum putrefactionem, solo spiritu feruēfacto, & propterea diarię appellantur. Nam ubi loxi sunt egri in prima huius febris declinatione, & cibum bonū fucci ac humectum acceperint, non amplius secundo febriant. Propriū autem & inseparabile signum diariarū febrium est vrinarum coctio in prima die & caloris iucunditas. Verum post exacerbationem sedatam, certiorē habebis cognitionem. Nam arteriarum motus, per omnia assimilatur motui sanorū quod nulli alij febri adest. Et ipsa bona ægri tolerantia maximum liberationis signum est. Et urina multo meliores post exacerbationem quam in febri principio tibi apparebunt. Et si ipsis dum lauantur, nequē horror aliquis insueris acciderit, neq; alia aliqua iniucunditas, & post balneum consequent

quenter bona tolerantia mansent, confidenter nutrire potes ipsum, & vinum exhibere intrepide bibendum, quantum in praesens moderatum est. Facile vero a talibus febribus capiuntur hi in quibus defluxiones corporis non vaporousum, sed acre quid ac fumosum habent. Quare si quando suppressus fuerit coaceruatus in ipsis calor, febri lis efficitur. Auspicantes vero ac externa la cessantes harum febrium causa sunt, lassitudines, frigiditates, vigiliae, cura, tristitia, iracundia, rigor, ardor ac exustio cutis ut difficulter transpirationem admittat.

De diarijs ex lassitudine febribus.

Cap. I.

Qui ex lassitudine febricitant, cutem sicciorem quam qui ex alia quadam diaria febre laborant, habent. Et hoc maxime contingit his, qui simul frige facti sunt ex multalassitudine, ut etiam post febris uigorem permaneat ipsis siccitas. Et pulsus his parui sunt. Qui uero non nimium fatigati sunt, his humiditates quaedam, aut uapor calidus ea profundo effertur. Magni autem sunt & his pulsus. Oportet autem ipsos statim post exacerbationis declinationem, in balneum ducere. Et accurate simul ac molliter modico oleo dalei tepido perfrictos, aquarum dulcium lauacris lauare. Sed neque si in aere balnei ipsos morari iusseris, quicquam laesis, propter frigiditatem. Postea quietis studiū prodest.

De febribus ex uigilijs, & cura & tristitia, aut ira.

Cap. III.

Eos qui ex uigilijs febricitant, distinguit etiam coloris species. Est enim subrumina. Sed & oculorum motus manifesti sunt: uix enim arcollunt supercilia. Et caui sunt ipsis oculi, immo etiam siccis. Pulsus autem densiores sunt omnibus ob uigilias, curam, ac tristitiam febricentibus. Qui uero ex ira februnt, his neque cauitas oculorum adest, neque color ille. Et calor his est amplior, & uelut ex profundo emergens. Et magni sunt his pulsus. Omnes igitur relati, neque frictionibus neque balneis multis opus habent. Sed multi olei perfusione omnino non adstringentes. Atque ubi parum defrici sunt, pro more lauentur.

De febribus ex ardore.

Cap. IIII.

Febrientes ex ardore statim ab initio perfrigeratibus, sapare oportet, & balneis pluribus dulcissimarum ac temperatissimarum aquarum. Oleum autem modicum adhibendum est, & omnino non affricandum. Sint autem quae adhibentur capiti frigefacientia, omphacium & rosaceum ex ipso preparatum sine sale. Facere

autem haec possumus frigida, uas in quo continentur suspendentes in puteum ut aquam contingat. Sed adhuc magis saliens aqua frigida, oleum rigefacit, & magis adhuc nix forinfecus uasi circumposita. Perfundendum est autem sinciput ex oleo sic frige facto, lana moderate excepto, ita ut manum in sublime leuemus, & hoc indefinenter faciamus, usque ad febris declinationem, atque ita in balneum dulcium ac temperatarum aquarum ducamus, accessu solo aeris balnei per transitum concesso.

De febrientibus ex frigore.

Cap. V.

Si quis frige factus febricitauit, suppressis uidelicet fumosis transpirationibus, quae per cutem fiunt, & hic in balneum ducendus est in febris delinatione. Caput autem calefaciendum est & ante balneum, & post balneum, in declinatione, ex unguento amaricino aut nardino.

De febrientibus ex grauedine ac destillatione.

Cap. VI.

Qui ob grauedinem februnt lauare non oportet priusquam ea concoquatur, si ex frigiditate aut cruditate destillatio facta est. Caput autem humectandum est irino unguento aut amaricino aut nardino. Si uero ex ardore facta est destillatio capite calefacto, & in star cucurbitae attrahente materiam ex locis subiectis: hunc statim in balneum dulcium ac temperatarum aquarum ducere oportet, & in frigidam immergere, & sub salientem locare. In balneis autem frigefacientibus caput humectare. Sunt autem ea moderata, propter balneum.

De febribus ex cutis densitate.

Cap. VII.

Densatur cutis aut ex frigore, aut acerbata qualitate ipsi praeter adueritudinem allapsa. Quae quid accidit etiam his qui in aluminosa aqua lauantur. Arctissima est his cutis, ut etiam tactu cognoscatur. Immo & calor motus, laevis quidem iuxta primam manus admotionem apparet, aeris efficitur, si diutius tactus perseveret. Urinae autem non uelut alijs fulvae sunt. Quare non accusamus in his quod alimentum non sentiant, unde corporis moles contrahitur. Neque uero oculi cani ac siccis fiunt. Verum sunt quibus humidiores & prominentiores essentidentur naturalibus, eo quod non contingit transpiratio in ipsis, sed materiae magis intus concluduntur. Unde neque pulsus parui sunt uelut in tristitia, aut cura, aut uigilijs, & ualde immoderatis exercitijs. Curare porro eos oportet aquarum dulcissimarum ac temperatissimarum balneis, post exacerbationis declinationem, & praecipere ipsis ut aliquodiu in balnei aere morentur, affundendumque est ipsis oleum

oleum dulce tepidū, & fricatio mollis ac moderata adhibenda. Tenuis autem victus præscribendus est, & vinum dandum tenue & album.

De febribus ex fame. Cap. VIII.

SI ob famē fiat febris, exacerbatione declinante in balneū ducantur, & plurimo oleo tepido dulcissimo perfusi læuissime fricētur, & plurimo tempore in calido folio morētur. Egressi deinde ac viribus reſecti rursus in balneum ducantur, & in calidum solum locentur. Postea egressis post balneiturbationem sedatam, danda est aqua calida potanda, deinde ptisanæ succus, aliquando etiam pisces petrosi in iure albo parati.

Dieta communis omnium diariarum febrium.

Cap. VIII.

Dieta in febribus diarijs omnibus cōmunē scōpū habet, ut sit ex edulij boni succi & quæ oīno concoquuntur, & nusquam circa meatus detinentur, his quidem qui ex ardore aut ira febriūt, quæ simul frigefaciunt ac humectant: frigefactis uero, minus alentia & moderate calefacientia. His autem qui vīgilarunt, aut tristes fuerunt, aut curis vexati, humidus & somnificus cibus congruus est. Fatigatis autem plurimus & maxime nutriens: At in quibus intēperatura corporis calidior ac siccior facta est, eos oportet aliquando circa primum exacerbationis impetum nutrire. Vinum autem dandum est omnibus qui ex diaria febre laborant, aquosum, tenue ac albū, quod & concoctionem adiuvat, & vrinas ac sudores propellit. His uero qui uīgilarunt, aut tristes fuerunt aut curis vexati, magis intrepide uinum datur. Sed & fatigatis nimium, dandum est quantum superare possunt. Iratis autem priusquam ab affectu omnino liberati fuerint, minime tutum est uinum dare.

De febrientibus ex inguinum inflammatione.

Cap. X.

Siquidem citra laceſcentē externā causam in inguinis glandularū inflammatio fiat, multitudine sanguinis plerunque in uniuerso corpore indicat. Nam & calor in his amplior est quam in prædictis, & facies rubicunda ac tumida apparet. Oportet igitur celerrime uenam secare priusquam materia in inflammato putrescat, ac febrem putridam accendat, post uenæ sectionem utendum est tenui diætā, usque ad perfectam liberationem. At inflammato inguini, ante uenæ sectionem adstringentia ac repellentia imponenda sunt post uenam sectam, laxantia ac moderate discutiētia. Cæterum quibus propter offensionem digitorū pedis, aut aliud quid tale, inguinis inflammatio

facta est, & ea de causa febris diaria consequuta, tales ne interrogāt quidem Medicum quid facere oporteat: sed ulceri ex quo inguinis inflammatio facta est prospicientes, lauātur circa exacerbationis declinationem. Prohibendū autem est uinum omnibus ex inguinis inflammatione febrientibus, donec inflammatio fuerit soluta. Et uictus ratio tenuior ipsis constituenda est.

De diarijs febribus ex cruditate obortis.

Cap. XI.

In corporibus ex malis humoribus uitiatis cruditates oriētes citissime febrem accēdunt. Minus autem sit malum, si ob cruditatem aluus infra erumpat. Non paruum autem malum est, si fuerit suppressa. Febriunt autem aliqui etiam in quibus profluuium uentris ob cruditatem sit. Si quidem igitur sola corrupta euacuata esse appa-ruerint: lauandi sunt ac nutriendi in febris declinatione. Si uero plus iusto euacuatio fiat, melius est nutrire citra balneū prospiciendo uentri ipsi. Cura uero uentris dupliciter fiat. Si enim non amplius feratur ipsa aluus, absinthium modicum aqua macerans coquito cum oleo in duplici uasculo, & ex hoc loco circa uentrem humectato. Deinde lapsum lanæ purpureæ oleo imbutū uentri imposito. Si uero debilius est os uentris, mastichen cum unguēto nardino ad strigementiciam crassitudinem redige, & purpurā ex eo imbutam impone. Sint autem ea quæ imponuntur ad tactū calida: tepida enim robur uentris exolunt. At si adhuc feratur aluus, melius est optimo melino uti pro nardino, cum modico uino. Commodum est ad hæc & mastichinum. Si uero etiam uenter exuratur post euacuationē, melino similiter utaris, aut cerato ex ipso parato. Nutriendi porro sunt adhuc fluente aluo, ex polenta & panibus paucissimum acetum habētibus, quos hinc oxylipes Græci uocant. Inspergenda est autem polenta succo malorum punicorum aut pīrorum, aut malorum, præsertim cotoneorum. Vel in ipso eorum decoctum, aut myrtorū. Si uero fluxus cessarit, alica detur, & gallorū testes, & pisces petrosi in iure albo parati, & fructus adstringentes. Si uero inappetētes fuerint, ut auerſentur cibos, ex concoctione medicamēto ex malorum cotoneorum succo ac melle cōposito, cochlearium unū aut duo danda sunt. Si autem nō affuerit id quod ex sacco cōpositum est, detur id quod ex carnibus cotoneorum paratur, cui nihil omnino piperis additum est, aut ualde exiguum quiddam. Si uero supprimatur aluus in his qui ob cruditatem ex diaria febre febriunt, siquidem cibi adhuc in uentre continentur, plurima tepida pota, digitis aut pennis immisſis, per uomitum iubeamus id quod molestum est reijcere: deinde præcordia fouere, & quietem agere. Si uero cibi iam descen-

derunt

ad intestina, reclinatis ipsis ita ut partes circa caput & stomachum sursum uergentes habeant, foueatur uenter, & somnus concilietur. Post somnum autem glandula subdetur, ad superfluitates quæ descenderunt educendas, aut per mitiorem clysterem, quale est fursurum decoctum, euacuatio fiat. Dieta sit tenuissima, quæ plurimam exterforiam uim in se habet. Quod si inflatio accesserit, incoquere oportet in oleo euminu, aut rutæ, & infundere per sedem. Enacnata uero alio, statim nutriantur. Si uero etiam citra molestiam dormierint, postridie lauentur, adhibentes uentri unguentum nardinum cum modico uino. Et post balneum similiter tenui uictu utantur. Si uero etiam tertia dies febrem aliquam induxerit, neque sic timendum est, sed similiter lauandum, ac moderate nutriendum. Dare autem oportet talibus ante cibum aliquod concoctorium, oxyporium à citra penetratione appellatum medicamentum, & præsertim quod ex cotoneis malis fit cochlearij mensura.

Curatio diariarum febrium multarum dierum, quarum aliqua ex mutatione diariarum generantur, ob cutis obturationem.

Cap. XII.

QUædam febres propter obturationem uasorum circa cutem fiunt, ex diariarum mutatione, quum non probe curatæ fuerint statim ab initio. Contingit hoc maxime in corporibus uitiosis humoribus præditis quum multum fuerint uoraces. Nam in talibus circa primam ac secundam diem aliquantisper, non est in pulsû putredinis signum, sicut neq; in urinis, cruditatis: dum enim prolongatur, quidem declinatio, & non amplius iuxta proportionem remittit, suspecta est affectio: si enim non transpirauerint perfecte, necesse est putrefactos esse uitiosos humores. Siquidem igitur puer aut senex fuerit ægrotus, uenam secare non expedit. In medijs autem ætatibus, robore præsentente, egroto uena secetur, si sanè etiam plenitudinis signa affuerint in corpore. Detrahendum est autem pro uiribus, & obturationis magnitudine: maior nam febris ob uehementiores obturationes incidit. Minor autem ob minores. Euacuata uero multitudine, & rarefactis meatibus, fumosa ac fuliginosa superfluitates transpirantes pauciores fieri poterunt. Periculosum enim est aperire potentibus obstructions uiri ante euacuationem. Quæ enim uim exterforiam habent, exhibita dum exhalant, simul attrahunt quid ex crassis ac uiscosis humoribus in uasis, & duplicat in angustis meatibus obturationes. Si uero etiam extrinsecus cuti admoueantur exterforia, periculum est ne attrahant etiam aliud quid ad meatus obstructos. Quo igitur secure & intrinsecus exhalatio, & extrinsecus attractio cõtingat, utilis sumus

est euacuare pro uiribus corpus: post euacuacionem uero non longa facta dilacione, aliqua exterforia edulia aut pharma dare. Eduliorum quidem loco prisanam & aquam mulsam, pro phar-macis autem, acetum mulsam ex solo aceto ac melle paratum. Quæ enim in aceto mulso coquantur alias, uelut calamintha, & similia calida, febres accendunt, uelut etiam uinum. At post tertiam diem, neq; putredinis humorum signo in pulsibus præsentente, neq; in urinis cruditate, & ubi hora suspecta in qua febris accessit in prima die transijt, confidenter iam hominem lauare oportet. Si uero etiam circa decimam horam suspectus tibi fuerit paroxysmus siue exacerbatio, lauare oportet ante horam sextam. In balneo uero corpore præcalescto illinire oportet oleo dulci tepido, & moderatius confricare, postea depurgare & ablueri forinsecus corpus. Eligenda ad hoc quædam moderate extergētia, qualis est hordeacea farina & sabacea. Deinde immittere in solium calidæ temperate, deinde etiam in frigidam. Si uero circa decimam horam, ut ita demus, turbatio quædam suspecta sit, nihil exhibendum est præter aquam cui incocta est hyssopus & parum apij. Deinde si nihil mali intulerit hora, nutriantur. Si uero etiam quid attulerit, oïo moderatū apparebit. Quare & lauare poteris postridie ac nutrire. At ubi magna facta est obturatio, necesseario putrefactio contingit. Vnde curatio in putredinosa febre referenda, etiam his congrua est.

De febribus continentibus siue synochis.

Cap. XIII.

Continens febris nominatur, cuius ab initio usque ad finem una est exacerbatio, nulla alterius exacerbationis principij significationem faciens. Corporibus bono habitu præditis, & multo sanguine repletis, & ætate calida peculiaris est continens febris. Conflatur enim ob calidi sanguinis copiam nondum putrefacti, & eo quod non transpirat, feruore solum caliditatem excitantis: quemadmodum nouum uinum solet in dolijs; tempus autem talium febrium maxime uernum est. Sunt autem differentia febris continentis tres, nam aut æqualis permanet magnitudo ab initio usq; ad solutionem, aut additamentum facit, aut detractionem: hoc autem cõtingit prout maiores, aut minores fiunt transpirationes, ex eo quod densior aut rarior est habitus corporis affecti. Est autem multa copia quæ in talibus affligit, & feruorem sanguinis ebullientem consequenter febris accendit, aliquando uero etiam crassitudo. Scopus igitur curationis in ipsis est euacuare copiam, & extinguere calorem præternaturalem, & crassitudinem secare, siquidem affuerit. Deinde ueterem bonam temperaturam debilitatis partibus reparare.

De uena sectione. Cap. XIII.

SI ualida sunt uires, & ætas permittit, & nihil aliud fortiter resistit, sanguinis tantum auferre oportet, quantum uires tolerant. Prestat autem si uires adsunt, usque ad animi deliquium ducere. Quibus uero non sic uena secta est, hi ad extremum periculum deueniunt, ut aut suffocentur, aut animo linquantur, nisi uirium robur, aut larga sanguinis eruptio, aut multus sudor, ex manifesta perniciæ ipso seripiat. Nam multitudo in his non amplius a uenis contineri potens, obturat ac distendit corporis molem, & propterea ipsum aliquando dirumpit, & uasa maxime in naribus aperit. Ea gratia festinare oportet ad sanguinis detractionem, quantum uires ferunt: quo uasorum natura ex transpiratione ac uentilatione, naturale temperamentum cõseruans, iuxta morem ab initio humoribus dominetur. Verum animaduertendum est & ad ipsius uenæ sectionis scopos. Præcedente enim ciborum cruditate, eousq; uenæ sectionem differre conuenit donec tibi satis esse uidebitur concoctio ipsorum in uentre peracta, itemq; , fecæ superfluitatem in intestinis. Si uero suspectam habes post uenæ sectionem, aliam fore sanguinis euacuationem, uelut myliæbrem purgationem, aut hæmorrhoidum in sede fluxum, relinquere oportet in uenæ sectione tantum sanguinis quantum per alios locos, euacuandum putas. Quare siue menses fuerint moti, siue hæmorrhoids aperta, totum negotium nature permittito. Si uero non tantum quantum oportebat euacuatum fuerit, tunc uenam secato, quo ex utrisque compositis perficiatur quod cõuenit. Aptus est ad uenæ sectionem habitus corporis durus, multi sanguinis, densus, & ægre transpirans. Status aeris humidior. Resistit uenæ sectioni puerilis ac senilis ætas, temperamentum calidum, ac siccum ualde, & tempus ac regio consimilis; & qui natura humidiores sunt, & præsertim cum caliditate, & qui raro habitu præditi sunt, insuper quibus os uentris aut amara bili ualde uexatur, aut de bile est, aut ultra instum subtili sensu præditum: hi enim omne facile transpirant, & in uenæ sectione animi deliquiis corripuntur, ex quibus ægre reuocari possunt. Similiter, autem etiam si triginta annorum fuerit is cui uena secanda est uerum humidus & mollis, & pinguis ac albus corpore, & paruas uenas habuerit: huic aut omnino non uenam secabis, aut parum detrahes: omnino quidē non estatis tempore & in reliquis eiusdem ordinis: parum uero, alijs temporibus ac reliquis constitutionibus. Proinde aliqui in animi deliquium lapsi in ipsis medicorum manibus, non sunt reuocati, quare si quis euacuasset citra uirium dissolutionem, non periissent. Aliqui uero per omnem deinceps uitam, totum corporis temperamētum frigidius habuerunt, propter im-

modicam euacuationem, ut quidam in malo corpore ac habitu uitā degerint: quidam uero ex hoc ipso pernicioso morbo correpti sunt, ab aqua intercutē, & erectæ ceruicis spiratione, hepatisq; ac uentris debilitate, & semisphyderatione, optimū igitur est quemadmodum nos semper facere uideri non dierū numero animum aduertere, neq; soli multitudini, sed uirium robori, in omnibus quidem, uerū maxime in continentibus febribus, si enim uires conseruentur, non solum sexta ac septima, sed etiā sequētib; diebus uenam secabis.

De frigida aque exhibitione. Cap. XIII.

SI aliquando coactus fueris curare egrotum, qui nō solum antea uenæ secandæ auxilium omisit, sed etiam nunc aut propter timiditatem egroti, aut cognatorum, sanguinem detrudere prohibearis: ad frigida exhibitionē deueniendum est exacta præscriptione facta, quantum ex ipsa fieri possit detrimētum. Nam si hoc paruum vel omnino nullum futurum est danda est in potu frigida sincera quantum æger eius uoluerit. Tunc autem danda est frigida, quum in urinis uideris concoctionis signa. Neque autem in principio, neq; in augmento danda est frigida: sed in ipso vigore totius morbi, ac particularis exacerbationis. Opportuno enim tempore data frigida, corroborat solidarum partium naturam. Corroborata uero natura præattenuatos humores aggredditur, ut bonos quidem detineat, inutiles uero eiciat, aut per uentrem, aut per vomitum, aut sudores: Si uero frigida potus fuerit æger tempore sanitatis, ualde confidenter frigidam dato ipsa experientia doctus, omnia uiscera frigide familiaritate sustinere. Si enim omnino aliqua pars adeo frigida esset, ut ab ipsa læderetur, sanitatis itaque tempore euidenter detrimētum ostendisset. Quum autem nulla pars in sanitate læsa sit, ne in febre quidem lædi poterit, quum maximum propugnaculum habeat in profundo ardentis caloris multitudinem. Quapropter his qui modicum sanguinem, & minimum carnis habent frigida potus periculosior est. Cito n. ad solidas animalis partes penetrat carnis nudatas. Quapropter etiam habituales febres, neq; sincera, neq; multa frigida opus habent. Tenuia enim sunt in ipsis ac modici sanguinis corpora. Vnde quum magni detrimētum immincat in ineptis, a frigida exhibitione abstinere, & ut alijs auxilijs, quæ obturationes referant, & multitudinem euacuant, & feruorem febris mitigant. At uero detrimēta ex intempestiuo frigida potu orientia hæc sunt: Viscosos ac crassos humores attenuari ac transpirare frigida impedit. Quare siue inflammatio fuerit in aliquo viscere, siue ignis sacer, siue indurata, siue mollis ac laxa affectio, frigida potus ad huius sanationē nihil cõfert: sed euestigio quidem non modicam affert.

effert lenitatem, eo quod febrem iam factam extinguat. Manente autem intus causa, quum ex frigida densatum fuerit corpus, aliam febrem accendit priore grauiorem. Atq; hæc quidē detrimenti species contemni poterat. Verum pleriq; debilia habentes uiscera, citius & facilius à frigida exhibitione læduntur. Quibusdam enim istomachus siue gula adeo fortiter affectus est, ut perdidit actionē & uix potuerit deglutire. Alijs uenter læsus est, ut uix concoquere potuerit. Alijs hepatis, ut ex hoc in aquam inter cutem inciderint. Alijs colum, aut pulmō, aut rhēnes & uelica, aut aliud quid à frigida læsum, debile ad propriam actionem factum est. Quidam ipsorum statim erectæ ceruicis spiratione, aut alto sopore, aut lethargo, aut aurium abscessu, aut conuulsionibus, aut tremoribus, aut siderationibus corripuntur. Et ut in summa dicam: Omne neruorum genus & caput ipsis affligitur. Noui quod formidinē tibi induxerim per ea quæ retuli, ad frigida exhibitionem. Verū uidisti me sæpe ipsa opportune usum esse, & in quibus dare oportet. Et semper utilitatem assequutum esse, citra ægri læsionem.

Diata in febris continentibus. Cap. XV.

Quibus uena secta est, his ego post duas uel tres sectas horas, semper do modicum pistiæ succum, & iubeo quiescere. Eo postquam ex somnis surrexerint, rursus similiter pistiæ succum exhibeo, & in hoc perseuero usq; ad tertiam diem. Quarta ferē semper in balneum duco. Tales enim opportune uena secta uiribus robullis, & ad animi deliquium euacuati, necessatio sequitur non longe postea uentris secessus, at tenuatis uidelicet humoribus, & leuatis ac corroboratis uiribus. Aliquando uero etiam bilis notuit. Ad quæ statim et humiditates per totū corpus aut sudores succedunt. Quare consideret hos hos lauato quarta die. At uero tempus exhibendi cibi in febris continentibus, tum his quæ iam relaxe sunt, tum his quæ postea referentur, quæ sanentiam solum ab initio usq; ad finem exacerbationem habent est bona ægri tolerantia & consuetudo. Tunc enim ipsis cibi dandi sunt, quādo tolerantissimi sibi ipsis esse uidentur. Et illo præsertim tempore diei, in quo etiam prius morē accipiendi cibi habuerunt: maxime enim tolerantē portulerint cibos isto tempore acceptos. Robustis igitur uiribus, & dum uigor morbi breui expectatur, tenuissimo uictu uti licet. Vbi uero uirēs egre sunt, non licet tenui uictu uti, citra magnum detrimentum. Quare alimentis, tantum apponendū est, quantum roboris uiribus detractum est.

Vniuersalis doctrina de febris putridis. Cap. XVI.

Transpirationis angustia ac impedimentum internum obscurorum totius corporis obtu-

rationem facit, per quos fumosæ & fuliginosæ superfluitates quotidie transpirant. At obcuratio uis affectio quum parua fuerit, & probe tractata, diariam febrem efficit. Quum autem siue propter magnitudinem, siue imperitiam Medicorum consuetum diararum tempus excesserit, aut continet, aut aliam quandam ob humorum putrefactionem accendit febrem. At uero transpiratio multiformiter impeditur, & dum densantur meatus propter siccitatem, aut adstrictionem cutis, & dum obturantur propter multitudinem & crassitudinem ac viscositatem humorum. Dum itaq; quotidie fumosarum ac fuliginosarum superfluitatum transpiratio impeditur, naturalis in nobis calor affligitur. Alius uero præter naturam corporibus accedens, primum humores propter humiditatem putrefacit ac corrumpit. Progressu uero temporis etiam pinguedinem ac carnem, & ipsa solida corpora inuadit. Est autem putrefactio essentię putrescentis corporis ad corruptionē transmutatio, à calore præter naturam fiens. Putrescentes igitur humores, aut intra uasa arctati, continuas, & nunquam intermittentes usq; ad perfectam morbi solutionem febres efficiunt: aut per totum corpus delati, & extra uasa, elapsi, quandam febrem per circuitum accedentem, & interualla habentem accendunt, uelut tertianā, quartanā, quotidianam, aut aliam consimilem. Causa uero tur non excidant extra uasa humores in febris continuis, est aut multitudo, aut crassitudo, aut viscositas ipsorum. Quemadmodum igitur dum inanimata corpora putrescunt, primum ab eis exiis quæ iam putruerunt, deinde reliquum in acre frigido suspendimus, & per spirationes perfrigerantes molimur. Eodem modo sanabimus in humanis corporibus putrefactionem, quod quidem iam corruptū est omni modo euacuantes. Reliquum uero gestationibus moderatis & transpirationibus perfrigerantibus, ad exactam ac naturalem proportionem reducentes. Proinde ubi prius de non intermittētib; febribus tractauerimus, mentionem faciemus deinceps & reliquarum.

De febris putridis. Cap. XVII.

Quoniam in omnibus uasis, & præsertim maxime, circa alas ac inguina, ac consimilibus, sanguis calidior æqualiter redundas putruerit, febrem putridam continentem efficit. Plerumq; uero in corporibus multi sanguinis ac carnosiss, & denso habitu præditis, & superfluitatibus calidis repletis hæc generatur. Proinde his iam febrientibus pulsus maximus & æqualis ac uehemens est, & qui compagem arteriæ neq; duriores, neq; moliores habet. Ad tantam uero uelocitatem ac densitatem uenit, ad quantam magnitudinem ipsa febris uenit. Atq; hæc quidē ambabus

ambabus communia sunt, huic uidelicet, & prædictæ continenti citra putrefactionem febris. Verum huic præcipua putrefactionis signa in urinis, & pulsibus, & caloris specie adfunt. Curatio uero harum febrium, in utroq; genere comunicat, tum in eo quod cum putrefactione, tum eo quod sine hac est. At essentia quidem & uniuersa ipsarum natura, ex genere putridarum est. Verum quatenus una est tota ipsarum exacerbatio, ab initio usq; ad totius morbi solutionem, eatenus comunicat cum continenti absque putrefactione. Oportet itaq; etiam curationem ipsis in hoc solū cum illis continentibus comunem esse. Per alia uero omnia bifariam secari, ita ut quosdam medendi scopos ex genere putridarū accipiamus, quosdam uero ex propria ipsarum essentia. Sanguis enim est qui in hac febre putrefactionem suscipit. Sic uero etiam alias differentias putrefactorum humorum sanare conuenit, iudicationem partim, à putrefactione sumendo, partim à propria uniuscuiusque differentia, uelut pituita, aut utraq; bile. Quandoquidem igitur putridarum febrium septem subiecta sunt præter naturam, à quibus iudicationes sumuntur, nempe copia humorum, & crassitudo, & uiscositas, & obturatio, & transpiratium suppressio, & putrefactio, & febris non habens interuallum, unamquaq; sanare ex relatis affectionem sanare oportet per contraria. Copiam per euacuationem. Crassitudinem per secantia. Viscositatem per extergentia. Obturationem, aperiens. Transpirantium suppressionem, siquidem propter constrictionem cutis facta est, per diffundentia. Si uero propter densitatem, per rarefacientia. Deinde putrefactionem, extergentibus & alterantibus, ac transmutantibus. Febrem autem, per frigefacientia. Quum igitur uires fuerint fortes, uena & his secanda est, nisi cruditas uentris, aut alterius cuiusdā partis prohibeat, uelut antea dictum est. Nam ex his quæ de illis diximus: considerare oportet conuenientia etiam de his, quādoquidem uero neq; obturatio neq; putrefactio curari potest per solam uenæ sectionem. quum alijs auxilijs opus habeant referuare aliquid sanguinis oportet ad curationis tempus, ut ne necessitas aliqua ingruat, ob inopiam, intempestiue nutriendi. Quantum enim ad talem febrem attinet omnino non nutrire oportet. Quantum uero ad sanguinis euacuationem, nutrire opus erit. Quare ex duobus alterum necessarium erit, ut aut nutriendum febrem augeamus: aut non nutriendum: uires dissoluamus. Melius igitur uelut dictum est, relinquere sanguinis proprium alimentum animalis partibus. Et ipsum contentum esse modicis forbitionum exhibitionibus, uelut sunt præsana & aqua mulsa, quibus, ut medicamenti magis quam alimentis opus habemus. Si uero ob aliquam causam relictum fuerit uenæ sectionis auxilium: homini per tenuem uictum conuictio, quā

iam concocti fuerint humores, crassitudo ipsarum fuerit præattenuata, febre in uigore existente, dabimus frigidam aquam, uelut in superioribus continentibus febribus, nisi quid ex illic relatis prohibeat exhibitionem. Quod si uero etiam frigida potiois auxilium fuerit relictum, alijs auxilijs utendum est, quæ obturationes aperiant, & multitudinem euacuant, & feruorem mitigant, uelut antea dictum est, & deinceps consequenter referetur.

Communis diata omnium febrium putridarum.

Cap. XVIII.

IN omnibus putridis febribus in comuni putrefactos humores expurgare oportet, per urinam & uentrem ac sudores. Hoc enim commune est omni putredini. Si uero aliquando sua sponte ad os uentris impetum fecerint per uomitus euacuentur. Alioqui non oportet ægre uomentes præternaturā irritare, ut ne uires oris uentris exoluatur, quibus maxime in morbis opus habemus. Eligenda uero sunt quæ citra calefactionem ac resiccationem prædictas euacuationes perficere possunt. Velut est præsana succus, & aqua mulsa, acetum mulsum simplicissimum, & fauorum mellis elotorum cremor, apomeli. Græci nocant, & radices apij decoctum. Aqua itaq; mulsa ad secandos crassos humores, & detergendos uiscosos, & promouendas excretionem, optima fuerit, in febribus ex coarctatione ac putrefactione abortis, & præsertim continentibus putridis. attamen febrilem calorem augeat. Quare si immodica fuerit caliditas, ab aqua mulsa abstinendum est, & utendum præsana succo. Si uero obturationes ægre solubiles esse indicauerimus, acetum mulsum dandum est: quanquam & hoc si quis immodice utatur intestina radit, & tussim mouet, & neruosas partes laedit, ut difficile sit reperire tale auxilium; quod nihil lædens multum prodest. atq; hoc contingit propter complexum affectionum præter naturam in corpore. Quapropter his qui facile à quacūq; re exhibita læduntur, melius est ut præsana succo utatur donec ualidius alimentum accipere possint. At si alius non egerat, aqua mulsa cum solo oleo infusa eluatur, totum uero corpus forinsecus ante euacuationem discussorijs diffilare non oportet, post euacuationem uero discussorijs uti licet. Pharmacis autem utendum est tepidam caliditatem habentibus, uelut est oleum chamæmelinum. & in hoc tempore, inter discutiendum inquam, etiam uinum aquosum potum omnes excretionem mouet. Concoctione uero manifesta in urinis apparente, etiam lauare licet, dulcis & potabilis aquæ balneo.

De febribus continuis. Cap. XIX.

Febres continuæ eiusdem generis sunt cum intermittentibus siue interpolatis. Eiusdem autem generis dico cum tertiana exquisita febrem

febrē ardentem (causum Græcis) dictam exquisitam, & cum quotidiana, eam quæ quotidie exacerbat, & tamen non intermittit. Nam & febris ardēs omnes alias exquisitę tertianę notas seruat, & in hoc solum ab illa differt, quod cū rigore non irruit neq; intermittit. Et quæ quotidie exacerbat, similiter omnes notas habet cum quotidiana. In eo uero quod non intermittit, eiusdem cum illa generis est. Eodē modo etiam quæ per quartam exacerbat, non autem intermittit, eiusdem generis est cū quartanis. Et manifestum est quod neque rigor exacerbationes præcedit, neque sudor consequitur in hac febre, quemadmodum neque in febre ardente. In febre ardente rigor superueniens soluit ægri tudinem. Differt autem febris ardens à continente putrida, eo quod hæc ex sanguine putrefacto conflat, & à principio usq; in finem unam habet exacerbationem. Febris autem ardens ex flaua bile putrescente incenditur, & alterius diebus exacerbat, & quādam habet febris imminutionem ac uelut remissionem. Continens uero putrida similis manet vsque ad solutionem.

Cura febris ardentis. Philumeni.

Cap. XX.

Est igitur febris ex flaua bile putrefacta incensa, continua ardentissima, & neq; medicis, neque agris bona ordinem exhibet. Lingua enim in his arida est & nigra ac aspera. Morfus item uentris, ac sitis intolerabilis, & vigilie. Aliquando etiam delirium. Primum itaq; leniter ac blande hanc febrē aggredi oportet. Vbi uero concoctionis signa apparuerint in urinis & morbus iam uigerit acius instare, & ad frigida potum accedere. Nisi & hic aliquid prohibeat, & his quę de continentibus febribus relata sunt. Prima uero auxilia in febre ardenti sunt. Decubitus in locis frigidis, qui ad purum aërem patent ac perflantur. Stratum molle & sæpius renouatum, amicu la assidue permutata, & satis gracilia & nō sordida. Lectus sit abunde amplus, quo possint mēbra calefacta subinde ad alias atque alias eius partes trāferri. Et per flabellū ac ignauior concitetur. Epithemata conueniūt pectori ac stomacho imposita, palmulę cū uino & rosaceo aut melino tritę. Sunt & frigefaciētia cōmoda, uelut sunt pampini uitis triti, seris, polygonum, plantago, ramēta cucurbitę, lactuca, rumex acutus. Singulis autem ammiscēantur micę panis præmadefactę, aut polentę. Oportet tamē assiduos horum usus deuotare. At uero paniculi linei complicati moderate grāciles aqua & oleo calido imbutę, & pectori ac stomacho impositę, ardentē febrē mirifice mitigant. Sed & aqua & oleum calidū, aut aqua & oleū rosaceum, ex alto in pectus delata per lanę manipulū, uehementiā

ardoris facile obtundūt. Oportet autē abāde calidam esse aquā & oleum, aut aquam & rosaceum. Tepida enim partium firmitatē exoluunt. Si uero parū mitri his ammixtū fuerit, sudores excludere poterint. In ardentissimis autē febribus etiam acetū parum ammiscēdum est, nam & hoc quod debet facit. Cibi porro offerēdi sūt humidissimi, & nihil acre habentes, uelut sunt lactuca, caules cū posca aquosa seruefacti, & cucurbitę similiter cū posca. Sed & prisanę succus tenuior dandus est absque sale, aut alio additamento. Et aliquando post cibum aquam frigidam cochlearij unius aut duorum mensura absorbeant. Aut sit potius ipsorum porus in totū lactei repōris. Sed & aqua frigida fracta colluenda ac gargarisanda præbeatur. Et rosarum succi cochlearium absorptum stomachum refrigerat. Quin & alia animi oblectamenta procurentur. Folia uitis uiridia, item myrti ac rosarum per pauimentum spargantur: & aqua frigida frequenter irroretur. Et aqua salientes in uicinia sonum ædant. Tempus autē frigefaciētiū epithematū ac similiū, est vigor exacerbationis. Nam in principijs ac augmentis exacerbationum, dū adhuc ināqualiter affectū est, & caliditas circa uiscera resider, si hæc adhibeantur, diffundunt quidem sensum, uerum repellentia caliditatem in profundū, maius detrimentum inducunt, in cluso intus feruido calore, & rursus febrē ardentiorē efficiēte. At in uigore exacerbationum, expassa caliditate per totum corpus, facile extingui poterit ea quæ adhuc reliqua est circa uiscera. Nam & melius spirantes, & minus siticulosi sunt, his in tempore adhibitis. Et ipsorū rosido uapore excluso, ad somnum conuertuntur. Cæterum iustante iam uigore totius morbi, & nullo prohibente ex his quæ in continenti febre relata sunt, tempus iam est frigida exhibendę. In quibus igitur confidimus, nullum ex uisceribus, neque caput, uelut dictū est, lationem incurfurū, sinceram sanē frigidam exhibemus. In quibus uero metus est, atq; is uel minus impedimento est, pro prima uice frigidum exhibebimus potum siue frigidā. Frangitur autē si quis temperatę aquę calidę cyathū unum, ad quinque frigida purę sincere ammiscuerit. Atque talis potio suspectis corporibus exhibetur. Quidam uero olei rosacei cyathū frigidę exhibendę affundunt, & sic exhibent. Ipsum enim rosaceum nō ualde frigefacit, & oleositas rursus corporibus intus oblita, non permittit ipsa à frigida aqua ladi. Et simul firmitatem quādam exhibet uentri rosaceum, & lubricitatem, propter oleositatem. Quidam pro rosaceo, melinum exhibent. Porro balneum illis solum conuenit in ardenti febre, qui citra tumorem aliquem inflammatum, aut erysipelatum ægrotant, ubi concoctionis signa apparuerint in urinis. Quod si quis iuuenis sit carnosus, tempore asta-

ris & constitutione calida ac sicca, febre in vigore existente, & concoctione in urinis apparente, citra visceris alicuius inflammationem, & in lauacrum frigide notatorium seipsum iniiciat, atque natet, sudores viq; commouerit. Si uero etiam ad frigida balneum adfuerit, valde confidenter hoc auxilio utatur. Quibusdam enim statim venter biliosa ægescit. At si moderata est febris, & vires robustæ, vnâ cum concoctionis signis, profunt ipsis balnea dulcium ac temperatarum aquarum, & ex vnguentis chamæmelinum, præsertim si aer ambiens, frigidus fuerit. Nam si aliquando contigerit, vt frigidus existente ambiente æger fortiter à febre excuratur, modicam salutis spem de ipso habere oportet. Si uero neque concoctionis signa affuerint, in tali aeris statu, neque vires fortes habere apparuerit, talem seruari impossibile est. Quare neque lauabis ipsum, neque inunges rarefacientibus medicamentis, neq; vinum dabis neque frigidam. In quibus enim desperata est salus, vanum est auxilia multos seruantia imperitorum calumniæ exponere. Proinde ego sanè Medicos quosdā noui methodi ignaros, qui imitati sunt ea quæ à nobis fieri solent, & usi sunt his auxilijs, in his qui penitus mortui fuerunt, & neq; quicquam profecisse, & opportunum ipsorum usum suspectum ac horrendum fecisse. At nos & temporum occasiones, & auxilia describimus, in his qui seruari possunt. Nā qui incurabiles sunt egri, his neque occasio, neque auxilia commodant.

Tertiana exquisita dinotio. Cap. XXI.

Febbris tertiana exquisita in corporibus natura biliosioribus omnino consistit, & in ætate uigoris, & maxime tempore æstiuo, & in locis calidis ac siccis temperamento, & in tali ambiētis nos aeris statu. Sed & vitæ in laboribus, & curis, ac vigilijs, ardoribusq; & paucis alimēto, eoq; calido & sicco. Et immodicus calefacientium ac siccantium potionum ac medicamentorum usus, apta sunt ad febrem tertianam. Quum igitur gignatur tertiana, ex flaua bile putrefacta, ac mota, & extra uasa lata, statim à principio rigorem insignem inducit, qui à quartanæ febris rigore in hoc differt, quod in tertianis pungi ac uulnerari corpus uideatur. Nam in quartanis inuasio uehementer perfrigerationem habet, & magis in profundo. Quotidianam uero neque rigor omnino præcedit, sed magis circumfrigunt. Est etiam inter tertianis febribus ordo pulsuum exquisitus & equalitas. Excitatur autē in progressibus exacerbationum pulsus ipse ad uehementiam ac magnitudinem & densitatem. Sitim etiam inducit tertiana, maxime in uigore, & hominem exurit, vt se denudet & abiciat uestitum, & magnum ac densum spiritum ducat, & uelut flammam quandam efficit, & frigida bibere expectat. Et paulo post calor

æqualiter per totum corpus extenditur. Quod etiam manū inieceris corpori, iuxta primū contractum calor multus & acris occurrit qui uelut cum uapore quodam affertur. Vincitur autem paulo post à manu, & sanè iam etiā bibere tempus est ægro, atq; ubi bibit, statim multitudinem calidi uaporis per cutem remittit, prænuntiam sudoris, & vomitus bilis apparet, & aliquando etiam uenter egerit. Urinæ uero his sunt biliosæ & subfuluæ ac subfluæ, & moderate crassæ, & paulo post aut nubeculam albam, aut quidam in medio dependens bonum efficiunt. At si fuluiores fuerint urinæ, & neq; quid in medio pendens, neque nubecula, in primo circuitu apparuerit, ad septem circuitus extendetur morbus. Verum exquisita tertiana quæ in prima die ostendit in urinis subdentiā albam ac leuem, & æqualem, tertium circuitum non transgreditur. Hæc febris in integra febris quietem desinit post exacerbationem, uniuersum exacerbationis tempus duodecim horarum ad summum faciens, & non plurium. Atq; hanc exquisitam tertianā nominamus. Quæ uero diuturniorē habuerit exacerbationē, eam appellamus extentā. Si uero quotidie exacerbauerit, cum rigore irruens uehementi, habuerit autem omnes prædictas notas in pulsibus & urinis, & reliquo corpore, hanc duplam tertianam nominamus. Et hoc contingit propter multitudinem & crassitudinem bilis inæqualitatem.

Tertiana exquisita curatio. Cap. XXII.

Tertianam igitur exquisitam uelut à flammabile commota siccitate, humectare ac refrigerare quantum eius fieri potest, cōuenit. Et quæ quidem in supernum uentrem conflant, euacuare per vomitus. Quæ uero infernū subeunt, similiter per infernam excretionem. Sed & urinis ac sudoribus uia aperienda est, & uenter quidem mollibus infusis euacuandus est. Urinæ autem propellendæ sunt, apio & anetho in potionibus maceratis. Et si concoctionis signa apparuerint, confidenter iam etiam abstinij comā aqua mulsā maceratā ac excōlatā dabis. Balnea uero ipsis conueniunt, ex aqua calida potabili temperata, & neque nitrum, neque aliud quiddam tale in balneis adhibere, sed aquam & oleum præcæfacto corpori circumfundere, & in calida solium locare, ac hortari ut in ipso moretur quantum eius fieri potest. Eos uero qui balneum amant etiam si bis laueris, non peccaueris. A uino uero abstinendum est penitus priusquam concoquat morbus. Vbi uero concoqui incipit, tenue & aquosum ac modicum, primum dandum est, propesolutionem uero, uberius. Cibi qui humectant ac frigefaciunt, omnes commodant tertianis exquisitis. Quantitas uero in ipsis tanta sit, quantum probe concoquere possunt. Et ex oleis

ribus quidem conueniunt atriplex, blitum, malua, lactuca, & cucurbita. Ex reliquis autem pitifana succus, & sorbitiones ex alica, & pisces petrosi, & ex volucris quæ mollem carnem habent. Ex alijs alas, & gallorum testes, & suillos pedes, ac cerebella, & paruorum porcellorum extremas partes dare conuenit. Sorbendi sunt etiam ouorum vitelli, & fructus gustandi non ægrè concoctiles. Abstine dum uero ab omnibus dulcibus & acerbis, & salis, nidorosisq; ac virosis edulij ac potibus. Et à veteribus ac natura calidis vinis.

Tertiane spuria curatio. Cap. XXII.

IN non exquisitis tertianis, neque lauare statim ab initio bonum est, sed quando iam appaauerint signa concoctionis: neque quotidie nutrire, sed satis est alterius. Quies autem & calefactio præcordiorum ipsis conducit & sorbitiones concoctu faciliores. Infusa item inferni uentris non valde mollia. Et si sanguinis detractione opus habuerint, neq; hæc relinquatur, sed statim ab initio distinctione facta, velut in Sermone de venæ sectione dictum est, moderatus sanguis auferatur, quantum in præsens satis est. Torus uero diæta status non frigefaciens & humectans sit in totum, velut in tertianis exquisitis, sed etiam quid de incisorio ac calefactorio modo assumat: nimirum velut crassiore bile subiecta, & non ualde calidiore. Maxime uero contulerit ipsis pitifana succus, iniecto pipere & hyssopo aut origano. Sed & nardi spicam cum aqua multa, coctam bibendam dato. Et alia quoq; quæ urinam cient, præter quam extreme calefacientia ac siccantia. Maxime quoque absinthij cremor assidue dandus est post septimam diem. Sed & acetum mulsum multis profuit potum. Et aliquod lene purgatorium, bona concoctione in urinis apparente. At uero uomitus ab accepto cibo, vsq; adeo commodus est his qui in hac febre perseverant: ut multos nouerim statim perfecte liberatos ex huius usu.

De hemitritæ, hoc est, semitertiana.

Cap. XXIII.

Febbris semitertiana appellata, sit pituita putrefacta ad putrefactum amarè bilis humorum amixta, & est ex duabus febribus composita, quotidiana enim cum circumfrigefactione irruente, tertiana uero cum rigore, febris ex ambabus mixta, horrorem inducit, & de rigore quidem minus, plus autem de frigefactione, id quod extremitatibus permixtis contingit. Itaq; neque absonum nomen huic feбри imposuerunt qui hemitritæm dixerunt. Duplex est autem modus generationis eius. Aut duabus exacerbationis uno tempore coincidentibus: Aut statim ab initio utrisq; inter se permixtis. Quum igitur

tertiana prædominatur horridior febris fit, & iuxta accessionem etiam aliquid rigoris assumit. Statim uero talis etiam calidior est & estuosior, & quandam bilis vomitum, aut egestionem, aut sudorem inducit. Vbi uero altera pituitosior febris præualeat, prædominatur quidem frigiditas extremitatum, uerum modici sunt horrores: & non sunt siticulosi, neque estuosi. At ubi æquales magnitudine fuerint, & tertiana interpollata, & quotidiana continua, inuasio quidem exacerbationis cum horrore contingit. Et quum pituitosa febris dominatur, contractiones fiunt ac horrores: Quum autem biliosa febris præualuerit, acerrime incalescunt. Atque hæc quidem est semitertiana exquisita, ex tertiana intermittente & quotidiana continua composita, ambarum febrium temperatura æquali existente. Cæterum semitertiana non exquisita, aut biliosum humorem habet, aut pituitosum. Quum igitur ex utrisq; relatis humoribus semitertiana febris confletur, etiam curationem mixtam esse conuenit. Quare ex his quæ de tertiana relata sunt, & ex his quæ de quotidiana dicuntur, curationem componere oportet.

Quartana exquisita dimotio. Cap. XXV.

Quartana exquisita omnem ætatem inuadit, præcipue tamen inclinatam. Hippocrates autem in libro de septenario, vigoris ætatem dixit. Idem asserere videtur, eundem hominem non bis quartanam febrem incidere. Verba eius sunt. Primum quidem quartana febre idem homo bis neq; capitur, neq; unquam captus est, neq; de cætero corripitur, si semel sanus fiat, & hoc propterea: Iuxta propriam uniuscuiusq; hominis naturam, & ætatem vigoris contingit. Necessarium enim est vigentem hominis naturam in hoc tempore quartana febre corripi. Præterito autem vigore exolutam esse à quartana, & ab inuasionem. At uero naturæ corporum magis atrabiliariæ hanc febrem perferunt, & ex temporibus Autumnis, & præsertim ubi ipse seipso fuerit frigidior ac siccior, & inæqualis. Edulia item ac potiones, & totus vitæ victus siccus & frigidus tempore existens, quartanarum febrium signum est: Et lienes aucti. Hæc autem febris non statim à prima die omnino irruit cum rigore. Sed aliquando ex alijs in hanc fit transmutatio, ex his quæ erroneæ ac inordinate vocantur. Verum in progressu rigor accedit, & cum augecente etiam rigor augetur. Sensus autem egrotis contingit, non uelut pûgatur & stimuletur cutis, velut in tertianis contingit, sed & perfrigeratur vehementer, & velut frangitur vsq; ad ossa. Proinde audire est egros dicentes, quod os suum lassitudine tenentur, & carnem confringi imaginatur. Pulsus porro sunt parui, obscuri, ac tardi & rari in principijs accessionum, velut in nulla alia affe-

tionis. Etenim iuxta inuasionem quartanarum arteria tibi ligata esse videbitur, & introrsum retrahi ac prohiberi à regressu. Quare etiam si iuuenis fuerit æger, tamen senilis extremæ ætatis motum arteriæ imitatur. Si enim egrotantis naturalem pulsus noueris, aut in principio exacerbationis alterius morbi affueris, nihil aliud expectaueris, quo minus pronuncies, irruentem à principio febrem quartanam esse adeo immensa quædam mutatio pulsus ad raritatem ac tarditatem fit. Urinæ uero his in principio quidē albæ ac tenues & aquosæ, nimirum propter materiæ crassitudinem percolatæ. Progrediente uero morbo, pro ratione colorationis fiunt, & subsidentiam habent crassam. Sequitur autem sudorum copia circa exacerbationis declinationem. Ex Rufo. Quartanæ igitur à splene initium sumentes, diuturniores sunt. Fiunt autem manifestæ ex colore, & cruditatibus, & quod uenter non facile egerit, & ex splenis tumore, & quod ad sinistram magis se reclinent. Est autem periculum ne progressu temporis etiam in aquam inter cutem incendant. At uero propter hepar inflammatum quartanarij, coloris sunt albicantis, & toto corpore tumidi, & urinæ his sunt ualde rubræ, sandaracham referentes. Et ad contactum tumor dextri præcordij occurrit. Et hi etiam magis difficulter spirant quàm splenici, & subruescunt, & postremo in hydropem inuitabilem delabuntur.

Quartana curatio. Cap. XXVI.

IN principio igitur moderate ac leniter tractandi qui ex quartana febre laborant, ita ut neque medicamentum aliquod forte adhibeamus, neque euacuationem, nisi sanæ sanguis ualde abundare uideatur. Tunc enim moderate sanguinē auferre oportet. Et si diducta uenæ sanguis fluens niger ac crassus fuerit, confidenter euacua: Talis autem in splenicis maxime reperitur. Vbi uero flauus ac tenuis apparuerit, statim cohibe. Secunda est autem uena, aut interna, aut media; in sinistro cubito, si splenicus fuerit homo: Aut in dextro, si circa hepar fuerit affectio. Dieta uero sit flatus expers, & bonæ. Venter autē molliatur quantum eius fieri potest, per consuetos cibos. Si uero hi nihil profecerint, infusus per elytherem utendum est, primum quidem mollioribus, postea acribus. Prohibendæ sunt carnes porcinæ, & omnes uiscosæ ac tardi transitus. Item frigida ac humida edulia omnia. Vino utendum est paucò, albo, & tenui, ac moderate calido, uolucris autem montanis. Et piscibus mollis carnis, ac facilis concoctionis, & nihil uiscosum habentibus. Utendum est etiam salsamentis ac sinapi. Et per dies aliquod accipiendum est pharmacum ex tribus piperis generibus, & diospoliticū appellatum. Et si piper solum tritum quotidie

acceperint, recte utique fecerint. A frictionibus aut & deambulationibus & alijs consuetis, non penitus arceantur. A balneis uero abstineant frictionibus contenti, quæ ualde profunt. Et si breuis fuerit ac non ualde uiolenta quartana: non malum fuerit in intermedijs diebus consueta exercitia contingere. Atque hæc quidē in principio ac augmento faciendæ sūt. In uigore uero morbi tenuiore uictu utendum est, & iubendi sunt egri diu quiescere, & uisceribus prospiciendum est, & adhibitis fomētis ac cataplasmatibus molliore ac laxare potibus, & flatus dissoluere. Talia uero sunt, farina ordeacea, & semen liniris, cuminū, chamæpitis, & ruta, in aqua mulla cocta. Oleū quoque à fomēto cataplasmati miscendum est. Oportet aut primū olei foris per paucos dies irrigare, atque ita cataplasmati uti, in die uidelicet adhibitis, si æger ferat. Epithematis autē utendum est polyarchio, & eo quod ex styrace paratur, & similibus. Consequenter autē etiam urinam cientibus utendum est. Et aqua mulla in potu exhibenda, in qua cocta est ruta & anethū. Quod si concoctionis morbi signa euidenter apparuerint, cōfidendum est statim pharmacis humores nigros euacuantibus, & non semel, sed sæpius, si opus fuerit. Conuenit autem Epithymum quartanis potum, & Veratrū nigrū maxime prodest, eo quod citra molestiā euacuet ea quæ molestant. Et uinum dulce in uacuum colocythidis calicē infusum. Omnibus tamen miscendum est apium, aut anisum, aut dauci semen, incunditatis gratia. Assidue et betæ ac ostreorum decoctum bibant. Conueniunt his quoque aloëdaria Oribasij quæ sic habebat. Aloes drac. c. spicæ nardi, asari, mastiches, croci, xylobalsami, singulorum drach. vj. cassiæ drach. xij. epithymi drac. xvj. veratri nigri exēpta medulla drac. viij. forma pilulas magnitudine erui cū pulegij decocto, & exhibe pro viribus. Possunt & cum melle cocto pilulæ formari. Ego uero etiam ueratrū intermū adieci. Utendum est & uomitibus à cibo, & raphanis: si nihil impederit. Plerique enim ipsi assidue vsi: partim perfecte à morbo liberati sunt, partim facile pertulerunt. Nam una cū hoc quod euacuant ea quæ stomachum infestant, etiam facilius concoquūt tales. Vbi uero nihil iam prohibet, etiam albū ueratrū dandū est, primum quidem raphanis infusū uelut in Sermone de purgatorijs dictū est, postea uero etiā ipsum per se. Qui uero vomere non possunt his uehementius inferre purgatis dandū est medicamentū ex viperis, theriaca appellatū, & reliqua quæ ad tales febres laudantur. Inter quæ est & familiare illud nobis osim probatissimū, quod recipit succi cyrenæici, & piperis, & myrrhæ troglodyticæ, & foliorū rutæ vidiū, singulorū equal. partes. Singula seorsim leuissime teruntur, & ruta cū melle trita excipiuntur, sunt quæ pilulæ, de quibus aliquibus obolos unus alijs duo exhibentur. Aliud Aсклеpiadæ, hoc etiam somnium

sonnium facit, quo etiam ipse utor piperis longi, myrrhæ troglodyticæ, succi papaueris, castorij, singulorum pares portiones efforma & utere, obolum unum aut dimidium exhibens cum aceto mulso duabus horis ante accessionem. Aliud ad quartanam facit & ad arthriticos: hoc in quartanis dato per lotis duabus horis ante accessionem drachmæ unius pondere cum aceto mulso. Arthriticis vero cum aqua mulsa. Bituminis unciz una myrrhæ troglodyticæ drach. duz, folijs méthæ uiridibus leuissime & titis excipe, ac utere uelut prædictum est. Cæterum qui in principijs talium pharmacorum aliquod exhibuerunt, aut omnino ante uigorem, hi sæpe simplicem quartanam duplicem fecerunt, aut omnino maiorem ac difficiliorem effecerunt. Aut duplicem antea triplicem reddiderunt, aut omnino duas difficiliiores ac maiores effecerunt. Noui ego quendam medicum qui ausus fuit è tribus quartanis correpto dare theriacam ante morbi uigorem. Deinde auctis omnibus accidentibus quum febris continua successisset hominem peremit. Archigenis. Quartana febre laborantibus, inquit Archigenes, trifolij bitum. olenis seminis drach. una in tribus aquæ mulsæ cyathis, exhibere solet. Mirifice etiam ipsis prodest bitumen ipsum iudaicum tritum potum cum uino diluto drachmæ pondere. Verum pharmacum minime molestum, & sæpe successum sortitum expertus sum ego hoc, maxime in quibus splenes tument, & hydrops initium capit. Hederæ corymbifere folia quinque cum myrrhæ troglodyticæ magnitudine fabæ trita, in aquæ mulsæ dulcioris hæmina exhibetur. Sed & castorium potum rigores mitigat, & morbosam carnem consumit, & concoctionibus in uenis opitulatur, & segniciem admodum eximit. Rufi. Absinthij cremor humores uentrem infestantes deterget, & concoctioni auxiliatur. Vnde neque salinam colligunt qui absinthium bibunt. Mitigat etiam inflammationes hepatis ac splenis, & yrinam impellit, & menses muliebres. At si eger adfectus fuerit, & habitus uentris euacuatione gaudeat & mordaces humores secedant, lac recens multum alinum aut equinum, quibusdā dedi, quos magis purgare uolui. Alij uero caprinum propter familiaritatem & parabilitatem. Exhibui autem ab initio heminas tres, & progressus sum usque ad sex. Deinde intermisso uno circuitu, similiter à tribus heminis incepti, & addita quotidie hemina, ad sex progressus sum, & postea detracta quotidie hemina una rursus per duos circuitus quicui. Et simul morbus dissoluebatur, & corpus nutriebatur. Oportet autem animal boni succi esse, cuius lac exhibemus. Si uero alicui non accessit neque nidosum sit neque per uentrem erumpit, etiam in suspecta die, sorbitionis loco moderate dandum est, multo tempore ante accessionem, & bucellæ panis modicæ superingerendæ. At uero morbo in uigore constituto,

apparente manifestissima concoctione, nullo uiscere laeso, adfectis tempore sanitatis, etiam aqua frigidam exhibui duarum heminarum mensuram, instante iam prope inuasionem, & reuera à multis rigorem prohibui, non parum sæpe etiam febribus exemptis. Melius est autem etiam forinsecus calefacere corpus cyprino aut sicyonio, ante exacerbationes quidem, ut ne rigeant, sedatis autem exacerbationibus, ut ne ab extra allabētibus perfrigerentur. Dioscorides porro dicit prodesse his qui quartana tenentur febre, hæc in potu accepta etiam ante accessionem. Plantaginis radices quatuor, sicce tritæ in uino bibuntur. Verbenacæ rectæ quartus à terra geniculus tritus cum uino potatur. In tertiana uero tertius radices, item libanoidis drach. j. in uino exhibetur. Quod si oleo allinæ totum corpus, extremitates autem ex unguento aliquo ad rigores destinato innuxeris, & ægrum coniectum quiescere sineris, non expectietur rigorem.

Quotidiana febris dinotio

Cap. XXXVI.

Quotidiana febris in pituitosioribus naturis consistit, & tempore hyemis, & in humidioribus ac frigidioribus constitutionibus. Et senes quoque magis infestat & pueros, propter edacitatem, & præsertim eos qui in humidis ac frigidis regionibus degunt, & uitam ociosam agunt cum repletionem, atque hoc magis ubi post cibos assidue balneis utantur, & adhuc multo magis ubi ipsi cibi natura sunt pituitosiores, & inordinatus est ipsorum usus. Hæc igitur febris neque cum rigore irruit statim in prima die, sed temporis progressu, non rigor, sed circumfrigefactio ægræ concalescens ipsis accedit. In pulsibus autem manifesta ordinis confusio, & inæqualitas adest, tempore irruptionis exacerbationis præsertim, & uelocitas ac uementia motus ipsis non adest. Non autem exurit febris hæc ægrotos, neque densam respirationem facit, neque crebras efflationes, neque frigidæ expectentiam excitat. Sed hæc febres minime siticulosæ sunt. Vomunt autem pituitosa. Et quæ per uentrem infernæ ipsis euacuantur, frigidiora, pallidiora, crudiora, & aquosiora omnino sunt. Exudant autem nequaquam in primis diebus, neque ad putrefactam febriæ quietem deueniunt. Albus est ipsorum color. Urinæ albæ & tenues in primis diebus minguntur; postea uero crassæ ac conturbatæ. Hic humor quotidie exacerbatur, desinit autem in quietem febris non integram, uniuersum tempus faciens horarum plerumque octo & decem. Quapropter etiam amphimerina febris à grecis uocatur, de ambabus enim participat, die ac nocte.

Quotidiana febris curatio. Cap. XXVIII.

IN quotidiana febris curatione aceto mulso utimur in primis diebus, & his quæ urinas probe impellere possunt. Et tona diætæ forma secandi uim habeat. Circâ uigoré uero uentri prospicere oportet, & præsertim ori ipsius: Et postea uomere à cibis, & raphanis, & purgatorijs pituitam euacuantibus uti. Reliquam diætam ad communes scopos respectu facto comperies, ut scilicet attenuate diætæ, & pharmacis incisorijs ac attenuantibus utaris.

De Epialis febribus. Cap. XXVIII.

PRædicti generis, pituitosi inquam, est & febris quæ priuatim à leni afflictione Epiala appellatur, quum simul & febricitant & rigent, & utrunque percipiunt eodem tempore in omni corporis parte. Pituita enim acida, & nitrea appellata, citra febrem quidem, rigorem inducit. Si uero putredo aliqua moderata ipsis accedat, febrem epialâ efficit. Si uero amplius putrescat, præcedit quidem rigor, sequitur autem febris, exuperata frigiditate à multitudine caloris, ut omnino nō appareat iuxta augmenta & uigores exacerbationum. Fortassis aut & pituita uitrea acidam qualitatem habet. Curatio porro consimilis est his qui quotidiana febre laborant, incisoria curationis modo amplius aucto.

Communia auxilia febrium per circuitum

repetentium Dioscoridis.

Cap. XXX.

IN cōi ad omnem circuitum ac rigores utiliter exhibetur ea quæ sudores mouere pōt, & sunt hæc. Seminis smyrnij drach. i. datur potanda ex uino duabus horis ante accessionem. Item aristolochiæ drach. i. & iridis drach. 2. & calaminthæ decoctum cū castorij drach. i. in quartanis & quotidianis. Chamædryos itē decoctū assidue potatū, quartanam, & quotidianam soluere solet. Caroi quoque semen, ferulæ semen, uerbasci radix, aut succus cum uino. Aliud, quod ad omnem circuitum, & maxime ad quartanas datur duabus horis ante accessionem. Facit & ad calculosos, ac dysentericos, & stomachicōs. Est etiam anxiosis ac desperatis, & lippientibus commodum. Seminis hyoscyami albi, seminis apij, seminis anisi, sty racis, singulorum drach. quatuor, croci drach. decem, opij drach. tres, castorij drach. duas, myrrhæ drach. duas cum aqua ad fabæ ægyptiæ magnitudinem formato, & cū duobus aquæ cyathis exhibeto. Aliud ad omnem circuitum Aphrodæ. Seminis hyoscyami, myrrhæ trogloditicæ, opij, sty racis, singulorum drach. una, croci, zingiberis, aloes, singulorum drach. decem, & obolos tres, excipe

melle, & exhibe nucis ponticæ magnitudine, cum aquæ cyathis tres præillitis extremitatibus ac curibus, & sine ut dormiat. Ego uero etiam castorij drachm. unā adieci, & mirifice uim suam declarauit. Utere etiam confidenter antidoto pæonia, & ea quæ ex sulphure constat. Miram enim efficaciam habent aduersus omnem circuitum præsertim quartanas ac quotidianas febres. Cæterum quæ trita cum oleo illinuntur, profunt omnibus qui per circuitū exacerbantur, cum rigore, foveat enim corpus, & sudores mouent. Sunt autem hæc Chamæmeli flos tritus, & in pastillos efformatus, ac in umbra fricatus, & usus expetente cum oleo tritus ac illitus. Semen uiticis cū oleo, semen libanotidis, flos salis, nitrum, spuma nitri, bacca lauri, pyretrum, smyrnij semen, hypericū, calaminthia, canchryon, castoriū, conyza, costus, granum cniidium, cum nitro oleo & aceto, oleum amygdalinum, cyprinum, irinum, gleucium, chamædry, staphis agrestis. Asclepiadæ unguentum ad accessiones cum rigore. Hoc sæpe tertianas depulsiuit: spumæ nitri drach. ij. myrrhæ drac. duas, piperis grana viginti, ceræ drach. quatuor olei cyprini, aut irini, aut gleucini, aut amygdalini sexuncæ, liquefacta aridis ammisceantur. Vfus est hora ante accessionem. Magis autem confricandi sunt pedes, unde horrores initium sumere uidentur. Aliud ad tertianas. Grani cniidij, spumæ nitri, piperis, æquales portiones excipe irino, & ad strigmentariam crassitudinē redige, & uterē extremitates leniter confricans. Hoc medicamentum sudores eicit, & per duos aut tres circuitus sanitatē reducit. Aliud, ad quartanas, tertianas, ac reliquos circuitus. Myrrhæ drach. octo, casia drach. decem, piperis drach. duodecim, staphidis agrestis drach. tres, nitri drach. iij. ceræ sexuncem. Cyprini aut alterius talis lib. j. Myrrham uino dilue, & staphidem reliqua contunde ac tribra, & cū myrrha tere, ac corato affuso excipe. Vfus autem tempore pharmacū cum pari cyprini portione illine.

De ignis sacri circa viscera affectionibus.

Cap. XXXI.

Eunt aliquando ignis sacri affectiones circa aliqua viscera, febrē ardentē ac habitualē inducentes. Et si quidem circa uentrem fuerit ignis sacer, erylipelas græcis appellatus, febrē ex his ac censam lypiriam nominant. Si uero circa hepar, urentem siue fumosam. Si circa pulmonem, algidam. Talis aut febris frigefaciētibz ac humectantibus opus habet edulijs ac potibus, & his quæ extrinsecus imponuntur. Quū igitur febris habitualis aliū morbum ammixtū non habet balneo indiget, quemadmodū etiam alia oēs caliditates ac siccitates. Si uero affectio fuerit circa viscera ignis sacri, à balneo quidem abstinere oportet in totū, frigida uero in uigore morbi utendum est contra-tiosa, sic aut appellare solemus quū semel frigidi-

dislimam

disfinam: & multam dāmus. Anteuigorem autem frigida non est danda, nisi ab ægroto cogamur, cum mos sit frigidam bibere, & qui sitim non ferat. At forinsecus imponenda sunt frigefaciencia: & si nihil profecerint, tunc etiam frigida potius exhibeatur, aut edulia potius frigefaciencia. conueniunt autem maxime lactucæ humidæ ac dulces, pura frigida elotæ. Atq; sic quidem acceptæ optimæ sunt. Si per opus fuerit aliquādo ad preces ægrorum, in suauitatem ipsarum mitiga re, acetum multæ aquæ frigidæ ammixtum, ad intinctum concedemus. Sit autem acetum, exacte se paratum ab omni uinosa qualitate. Forinsecus autem etiam ipse lactucæ succus aptus est. Immo etiam semperuiui & intybi, portulacæ, atriplicis, solaniq; ac plantaginis, cum paniceo trito, & modico bono rosaceo, & his quæ similiter resiccant. Optimum uero est id quo nos utimur, iuxta viuarum acerbarum tempus: expressum enim ipsarum liquorem, in mortarium conijcimus, cum portulacis uiridibus tundimus, & utrunq; liquorem in uas mittimus. osculumque eius diligenter obturamus, atque sic uas in aquam immittimus. Melius autem est etiam niue uas obruere. Vtus autem tempore potentiam tenuissimam ammiscuo, & postea subigo ut liquidius euadat nedicamentum, idq; duplici linteolo infarctum præcordijs impono: non immorari sino, sed ubi tepidum factum fuerit tollo, ac alterum impono. Atq; hoc semper consequenter facio, donec eger sentiat profunditatem quodam modo perfrigeratam, & à siti liberetur. Ammiscemus autem aliquando etiam oleum omphacinū aut rosaceum, ubi circa præcordia fuerit ignis sacer, inflammationis naturam habens. Vidi mulierem supinam decubentem in terra & uoce destitutā, habentem quæ pulsū formicantem, unā cum manuum ac pedum perfrigeratione. Putabam autem calidam esse affectionem. Nam simul cum relatis pessimis signis, densiorem uidebā respirationem factam. Hoc autem signum est magni doloris, ac calidi morbi in præcordijs ac thoracis partibus existētis. Dixit autem quidam ex astantibus se audisse mulierem dicere, quod arderet eius stomachus, & frigide potius magnā cupiditatem haberet. Quapropter etiā in paui mēto iacet, inquit, uenans frigiditatem. Itaq; confusus dedi ipsi per cochleariū aquā frigidam, iterū atq; iterū immittens ipsam ori eius uiolenter. Videbam aut labia ipsius placi de aquā intus attrahere. Et ratiocinatus ipsam ex petere frigidæ potum, propter insitam uentri feruidam affectionem, rursus amplius exhibui. Post hoc autem oculis quoque annuere incepit, indicans sic me facere debere. Accepta itaq; confessione ex papaueris capitibus constante, diacodion appellata, parum de ea cum uino cnidio & aqua frigida, per cochlearium ori infudi. Et ex hoc nimirum paulo post sensum loqui cepit. Qua

re rursus amplius de hac potione dedi, uino emmeleo pro cnidio accepto, cū modica aqua. Ori item uentris semperuiuum & lactucam, cum pane trito & rosacco imposui. Frigidā autem hæc adhibui propter affectionis caliditatem, & tempus æstatis, donec frigiditatem abunde sentiret.

De colliquatione Philagrii. Cap. XXXII.

Colliquatio noīatur quum excernitur quid per uentrem, non ex comestis aut concoctis, sed ex humoribus ex toto corpore in ipsum confluentibus, quod simile quidem est bili quæ assidue per uomitum reijcitur, ac per uentrem secedit. Differt autem ab ipsa fetoris graueolentia, & quod egestio fuluior apparet, & crassitudinem habet strigmentitiam, aliquando etiam oleosam, aut adiposam. Colliquatio autem appellatur hic morbus: quoniam recens compacta essentia pinguedinis ac carnis ab ardentissima febre dissoluitur ac colliquescit. Et ubi iam diuturnum est malum, etiam ipsarum solidarum partium essentia ex parte eliquatur. Quapropter grauissima omnium est hæc febris. Satis autem clarum est extinctorijs medelis utimur, ita ut ualde frigidā aquam potandam exhibeamus, & cataplasmata & epithēmata frigefaciencia thoraci ac præcordijs imponamus. Et cibos humectantes ac frigefacientes demus. Dictum est autem de his in tractatione de febris ardentibus. Diceretur item consequenter in sequenti capite.

De febris quæ in calidis ac siccis temperaturis sunt, citra inflammationem ac putrefactionem. Cap. XXXIII.

Quicūq; temperatura biliosi, & habitu graciles & natura aridi, & stomachum subtili sensu præditum habentes, & qui facile in bilem effruescit: hi ubi famem aut uigiliās pertulerunt, aut nimium delassati sunt, & præsertim in profectiope ac æstiuo sole, aut tristitia affecti sunt, aut grauib; curis pressi, prompte ab horribus ac febribus corripuntur. Nam habitus in biliosis naturis, ob famem ac omnia relata, facile in bilem effruescit. Et primum quidem in æqualitatem percipiunt, postea etiam horrorem. Et si quidem in motibus persenerant, aut cibum non acceperint, statim febricitant. Mordaces enim humores ac vapores per sensitiua corpora delati, horrores ac rigores generant. Et propterea horrente ac densata cute, uelut quæ ex natura in his aridior est, cohibentur fuliginosæ, ac fumosæ superfluitates, antea trāspirare solitæ, & sic febrem accendunt, nisi talis cibum accipiēdo uelut dixi præuerterit. Ostendi autem tibi aliquos qui sic febricitarunt, & maxime qui ex longo morbo se recolligebant. Ex quibus uni in foro obuiz factus horro-

horrore incipiente, introducto ipsi in officinam quandam, panem ex uino diluto exhibui, & euestigio horrore sedauit, & febrem prohibui. Alios uero in suas domos abire festinantes, in principio horrore, aut paulo post nutriui. Et in summa, quibus adhuc sunt principij exacerbationum accidentia in talibus temperaturis, his omnibus panem ex uino diluto cito exhibui, & horrorem statim sedauit, & febrem prohibui. Quanto enim citius ipsos nutries, tanto magis febrem impedies. Si uero aliquando paulo tardius ipsos nutriui, febris quidem facta non est. Calor autem modicus ipsis accedet, ut si diutius moreris nutrire, tali caliditate excalescet, ambiguum ut sit an febrem appellare ipsam oporteat. Si uero duæ horæ post horrore initium factæ fuerint, manente adhuc horrore etiam tunc nutrire oportet. Verum prædicere, quod febricitabunt hi febre non molesta, ad quam exudationes consequentur. Et hoc facto, & lauare oportet, & rursus nutrire. At postquam sedatus est horror, incipitque febris cum contractione, non amplius nutriendi sunt illo tempore. Declinante uero exacerbatione statim alantur, & ne expectetur donec febris integre quiescat. Datur etiam potus aqua calida in uigore amplior. In omnibus enim squalentibus affectionibus non cessant exacerbationes, priusquam aut balneis, aut alimentis humectantibus rigentur. Quosdam uero etiam declinatione incipiente: Alios autem uigore exacerbationis instante nutrio. Fames enim in his temperaturis, maxime febrientibus, non simpliciter nocua est, sed si quid aliud perniciofa. Aut enim ex fame inardentes febres incidunt, ex quibus si non morte præuenti fuerint, in habituales delabuntur, & ex his rursus in tabem. Aut statim ab initio habitualis febris ipsis coincidit. Proinde à principio sic nutrire oportet eos qui talem temperaturam habent. Quum uero aut ex lassitudinibus, aut ira, aut curis pluribus, aut uigilia, aut tristitia, aut ex omnibus simul commissis, corpore uehementer resiccato, febris inuaserit, squalidam quidem habens cutem, ardentem autem caliditatem, timor profecto est talem hominem habituali febre corripendum esse, & præsertim in ætate, & sicca ac calida constitutione. Opus igitur habent tales humectantibus ac frigefacientibus edulijs ac potibus. Qui enim temperatura calidi ac sicci sunt, hi etiam necessario uires debiles habent. Non enim fieri potest, ut corpus calidum ac siccum, ubi febricitet uires ualidas habeat. Conuenit igitur quam celerrime per persanæ succum, aut sorbitiones ex alica nutrire, & paululum panis insuper exhibere, atque sic per frigidæ potum ægrum curare. Extinguitur enim statim ac sedatur febris perfecte, si non inflammatio aliqua ipsi adest, neque humorum putrefactio. Si tamen magnum detrimentum futurum coniectaris, exhibitionem eius inhibe, & per ea quæ extrinsecus

corpori adueniunt ac adhibentur, curatione molire. Forinsecus autem adueniunt, aer nos ambiens, & quæcunque humectare ac frigefacere solent medicamenta. Et ad hæc aquarum dulcium balnea. Si itaque ambiens nos aer temperatus fuerit, utendum est eo, uelut habet, nihil amplius moliendo. Si uero aut multum calidus est aut frigidus, calido quidem uice uersa excogitandæ sunt subterraneæ domus, frigidaque, ac quæ uentis persflant ad septentrionem conuersæ. Auras quoque ipsis quædam proprias excogitabimus. Aliquando ex Eurypis in quos plures aquæ salientes se præcipitant. Aliquando aqua frigida ex uasis in uasa transfluit. Hæc uero statim etiam somnum conciliant. Respergenda est etiam domus assidue frigida aqua pura. Et rosæ multæ, aut uitium pampini, aut myrtus per terram sternantur: Aut aliæ quædam plantæ frigefacientes. Arcenda est ab ingressu hominum copia. Nam & hoc domum calefacit. Si uero frigidissimus est aer, uelut in hyeme maxime, per tegumenta corpus foueatur. Frigus enim densat ac constringit cutem, & humorum qui intus aduruntur defluxiones transpirare prohibet. Maiorem enim ex frigida inspiratione utilitatem fore noscendum est, quam ea est quæ ex cutis perfrigeratione contingit. Similiter autem & in his quæ forinsecus imponuntur, eligenda sunt frigefacientia citra fortem adstrictionem, densationemque ipsius cutis. Et non solum quæ ingefaciunt, sed etiam quæ compage corporis fuerint partium tenuium, quantum eius reperire est in frigefacientibus aut citra ammixtionem alterius uehementis qualitatis. Est autem simplicissimum medicamentum ex humectantibus ac refrigerantibus, quo & ad ignem sacrum utor, & ad pudendorum inflammationes in principio. Ceram albissimam in duplici nase liquato, & in aqua frigidam diffundito, ac manibus emollito, dum eam eluens. Deinde similiter ipsam liquatam, in aliam aquam diffundito, & rursus tertio idem facito. Ad hanc autem ceram sic lotam, rosaceum ex optimo oleo omphacino preparatum adijcitur, ut sit quidem ceræ unc. j. rosacei uero triens. Hæc similiter in duplici nase liquato, & ab igne ablata, moueto, donec aliquantulum frigescant. Postea in mortarium diffunde, & pistillo fortiter tere, aqua potabili ac frigidissima paulatim insillata quantum satis est, & tandem fictili puram aquam habente excipe, & aquam quotidie permuta. Hoc pharmacum tenui linteo inductum impone, non super totum pectus, uelut quidam faciunt, neque super tota præcordia, sed illo maxime loco in quo multæ caliditatis sensus percipitur. Permutetur autem pharmacum semper priusquam manifeste calefiat. Aliud epithema optimū. Rumicis acuti succus polëta tenui ammixta, duplicato linteo detrito excipitur, & frigidus imponatur. Facit & portulacæ succus, & semper uiui

peruius; cum vix acerbæ succo & polenta. Item tribull. viridis succus, & polygoni, ac seridis, & laetæ cum polenta. Sed & ipsa horum folia trita imponito. Bonum pharmacum etiam hoc est: Palmarum pinguium carnem exemptis membranis, cum posca moratiore ad flacciditatem usque coctam; & cum tenuissima polenta tritam imponere. Si vero aridius hoc videbitur, ex prædicto cetero parum, aut rosacei optimi minimum quiddam ammiscere. Bonum etiam pharmacum est rosarum succus cum tenui polenta. Et ipsæ rosæ triæ impositæ. Et hæc quidem assumimus multum frigefacere volentes. Si vero moderate hoc facere uoluimus, non modica est copia emplastrorum leniter perfrigerare potentium. Ego enim noui imposito aliquando frigido medicamento præcordijs, hominem eueffigio diffidenter spirasse: alium autem statim tulsiuisse. Et paulo post amborum accidens queniisse, frigido pharmaco sublato. Balnea porro dulcior ac calidiora aquarum, aut potius temperatarum, utilissima sunt omnibus, siccam ac calidam temperaturam habentibus. Lauandi autem sunt quemadmodum hecticis, in secunda balnei domo, corpore ex aqua & oleo calido perfuso, & ipsis statim in temperatæ aquæ soliu locatis. Deinde etiam in frigida solium. In frigida tamen moram diutius trahere non oportet. Si uero inflammatio alicuius uisceris accedat, balneum recusare oportet. Illud tamen nosse expedit, quod si quando inflammatio principalis partis in talibus febribus ac corporibus coincident, omnino morientur. Et præsertim si pulmonis, aut membranae costas succingentis, aut uentris, aut hepatis inflammatio fuerit. Nam quantum ad inflammationes harum partium attinet, minime nutrire oportet. Quantum uero ad uirium debilitatem, sæpe nutrire oportet. Quare necessarium est, ut aut dum non nutrimus, vires exoluamus: aut dum nutrimus, inflammationes augeamus.

De febribus hecticis ac tabidis. Cap. XXXIII.

HETICA; hoc est, habitualis nominatur febris, quum ad tantam immodestiam uenerit caliditas præter naturam, ut in habitu sit ipsius solidæ essentia similaris corporis cordis. Et propterea ægre solubilem habet structuram. Primum igitur calor præternaturalis eliquat, & resiccet, ac consumit essentiam in partibus uelut ex humore concretam, qualis est pinguedo, & caro: Deinde uero propriam humiditatem consumit, ex qua corpora nutriuntur. Quæ sane circumsusa est ac instar rosis dispersa, circa omnes animalis partes. Hinc autem transit ad carnosum genus, quod fibris & membranosis partibus solidorum corporum insitum est, quod sane discidentes coqui tollunt, fibras uero abiciunt. Exactum

autem eius complementum in hoc est, si ipsa solida similium partium essentia siccor facta est, quando & tabida febris uocatur. Duplex est autem genus hecticarum febrium. Quædam enim ex ipsis post febres ardentes plerumque fiunt, aut absque adeo in longum extentas, ut temporis progressu humorem corporis cordis consumpserint. Aut manente adhuc humiditate fientes, & cordis corpus occupantes, hinc incenduntur: quemadmodum lucernarum flamma ex funiculo, superflite adhuc in lucernis oleo. Et hæc quidem una est ipsarum generatio. Altera uero quum ab initio statim irruerint, primam generationem diarijs similem facientes, ob tristitiam, & iram, & lassitudinem ampliorem simul cum ardore factam. Has igitur non difficile est curare. Eas uero quæ in tabem procedunt, sanare impossibile est. Natura enim ipsarum calida est & sicca, simile quiddam patiente corde, quale quid patitur funiculus in lucernis: ubi plurimum fuerit exustus. Qui enim exustus est comminuitur, ut neque si largum oleum affuderis, luculentam flammam excitare possis. Proinde parua hæc & infirma flamma circumcirca tremit, semper amplius minor euadens, donec fuerit extincta. Facilis autem cognitu est hæc febris. Priusquam enim contigeris pulsus ac caliditatem, oculos immodice cauos uidebis, uelut in foueis quibusdam sitos, & gramas in ipsis reperies siccas, & squallidam quandam afflictionem, qualis his fieri solet qui per totum diem in sole æstiuo multum puluerem percurrunt. Perijt autem & ipsorum coloris uitalis flos. Et cutis, circa frontem sicca est ac circumtensa. Et plerumque palpebris nictant, uelut somno grauati. Est autem hæc affectio non somnus, sed impotentia uigilandi. Et tempora sunt collapsa, ut loci caui appareant. Et quid aliud quam ossa & cutis sunt in totum? ut etiam si denudatum consideraueris uentrem, neque aliquod intestinum, neque uiscus aliquod saluum esse putes, & præcordia uehementer retracta esse ad thoracem, & cutem totam siccam ac obaridam, & si descenderis digitis apprehensam, uelut corium quoddam producit. Febris itaque exacte tabida incurabilis est uelut dixi. Tabescit enim in ipsis totum corpus, instar arboris extreme arefactæ, aut ob flammæ uicinam, aut ob uehementem ac immodicam siccitatem. Atque hæc est quam senectam ex morbo uocant. Tela enim corpus fit in his qui secundum naturam ad extremam senectam perueniunt citra febrem, paulatim extincto in ipsis insito calore. Verum eorum qui secundum naturam consueuerunt, mors sine molestia contingit, ob frigiditatem ac siccitatem imminens. Tabida uero febris non solum sicca, sed calida affectio est. Hæc igitur uelut dixi incurabilis est. Illud porro omnibus febribus hecticis commune est ut debiles sint & æquales semper, a prima die usque ad extremam respirationem.

Maximum autem & minime ambiguum naturæ ipsius signum habebis, si cibum homini præbueris. Aimento enim accepto accenditur calor, & pulsus augetur ad magnitudinem ac uelocitatem. Et quod in ipsis contingit simile est ei quod accidit in calce ac lapidibus calefactis. Si enim frigidissimam aquam ipsis affuderis, multo calidiores apparent uapor se in ipsis caliditate, ab humida essentia irrigata. Donec igitur aliquid humide essentię feruatur, hectica solū febris est. Quum uero in periculum uenerit, ut non amplius superfit aliquid humiditatis, exacta iam tabes, Marasmus græcis dictus, consistit. Nos autem earum solum curationem aggredimur, quæ sanari possunt.

Hecticarum febrium curatio. Cap. XXXV.

HECTICAS febres omni modo statim refrigeramus, priusquam progressæ in tabem desinant. Caput autem curationis ipsarum in humectantibus, ac frigefacientibus consistit, tum his quæ foris adhibentur, tum quæ intra corpus accipiuntur. In quibus est & aer qui inspiratur. Omnes igitur hecticos, etiam si iam principium tabescendi acceperint, absque hoc ut alia febris ipsis sit implicata, aut propter humorum putrefactionē, aut cum principalis partis inflammatione, confidenter lauato, citra omnem tamen laborem, ut ne uires exoluantur. Deferatur itaque æger in lecto ad balneum. Præparata autem ipsi sindone calida, in ipsa ad primam balnei domum gesseritur. Sint autem quatuor qui sindonem teneant, in singulis angulis unus: Deinde in prima domo nudatus, ad secundam portetur. In qua toto corpore ex oleo tepido dulcissimo perfusus, ad tertiam domum feratur, & in solium locetur. Sit autem aer balnei temperatus, & humidus præparetur, parietibus aqua calida respersis. In ipsa uero solij aqua temperata abunde quiescat, moderate in sindone uectus, nulla corporis perfusione fiente, neque ite capitis perfusione. Hinc autem extractus à quatuor adolescentibus sindonem gestantibus, in frigidam aquam confertim mergatur, ne minimum quidem moræ in ipsa trahens. Statim autem alius paratam habens sindo-

nem aliam, ipsi iniiciat, & alius aliam simili modo: demissus autem in lectum, mollibus linteis lenissime detergatur. Postea uero uinctus & uestibus contextus ad domum in lecto referatur. Sic autem & domus balneo uicina. Eos quidem igitur qui iam tabescunt, lauare oportet uelut dictum est. Qui uero in hecticis febribus sunt nondum tabescētes, hi etiam citra sindonem lauari possunt. Deferendi tamen & hi sunt ad domum siue in lecto, siue in uehiculo quopiam, aut lectica; deinde oleum ipsis infundendum, uelut dictum est. Ex postea ad calidam aquam ducantur, ut in illam morentur. Deinde ad frigidam prodeant, ut nihil omnino moram in ipsa trahant. Atque ita detergi ac inuncti ad domum reducantur. De balneis igitur satis dictum est. Consequens est prout alimentorum uiribus addamus. Quod quidem igitur frigidus, & humidus conuenit esse cibos hecticis febribus profuturos, omnibus manifestum est. Tales autem sunt, prifanz succus frigidus acceptus, & alica uelut prifana preparata, conuenit etiam panis aqua frigida madefactus. Verum nullius horum frigiditas sincera sit, ueluti potus. Nam quæ bibuntur, & cito caleſcunt, & meatus penetrant. Quæ uero eduntur aut sorbentur, diutius in uentre perseverantia, perfrigerant ipsum finem modicè fuerint frigida. At ubi iam diuturnia est febris lac asinum dādum est, diligentia animaduersione habita, ne in uentre in caseum coaguletur. Hoc uero aliquando etiam ipse eger nos docebit, ut qui suæ naturæ habet experimentum. Quandoque autem nos ipsos deprehendere oportebit paulatim ad eius usum progrediendo. Fugida est autem quantum eius fieri potest, mellis mixtura in omnibus hecticis febribus. Dandum uero est primum lac asinæ in cubiculum adductæ, quo calidum adhuc lac potetur. Si quidem igitur probe fuerit concoctum, & non corruptum, copia eius augeri potest, ut in exhibitione cyathus dimidiis addatur. Reliqua uero diætā facienda est, uelut in siccis uentris intemperaturis, uelut proprio loco dicitur. Quanto autem hecticarum febrium caliditas maior illis est, tanto frigidioribus auxilijs opus habet, & diligentia ampliore, ut ne damnum aliquod consequatur, ex fortiorum auxiliorum usu.

F I N I S.

DE FEBRIBVS

ARABVM MEDICORVM, ET IVDÆORVM,

Tomus Secundus.




AVICENNAE DE FEBRIBVS

TRACTATVS QVATVOR.

Tractatus Primus de Febre ephimera.



De diffinitione Febris, & generibus februm. Cap. I.



FEBRIS est calor extraneus accensus in corde, & procedens ab eo mediantibus spiritu & sanguine per arterias & venas in totum corpus: in quo inflammatur in eo inflammatione, quæ nocet operationibus naturalibus: non sicut caliditas ire &

laboris: cum non ulpimatur & uetecum non peruenit ad hoc ut sit accensa, & noceat operationibus. Et sunt quidam homines qui diuidunt febres in duas diuisiones: primas scilicet in febrem aggritudinem, & in febrem accidentis: & ponunt febres apostematam de genere febris accidentis. Et intentio qui de his sermonis eorum est hæc: quod febris aggritudinalis est illa inter quam, & causam quæ non est aggritudo non est medium, sicut febris putredinis: putredo enim est causa eius absque medio: & non est putredo in se ipsa aggritudo: immo est causa aggritudinis. Febris uero apostematæ est accidens apostemati existens, dum est apostema, sequens ipsum: & apostema est aggritudo in se ipso. Et contradicenti quidem inest ut dicat: quoniam si propterea quod febris apostematæ sequitur caliditatem eius, & sequitur uel cõgõmitatur dolorem ipsius, uidetur ut sit febris accidens: tunc oportet ut sit plurimum februm ephimerarum accidentis: & si ipsa sequitur putredinem, quæ est in apostemate, tunc apostema non est causa eius prima, unde est apostema: immo quantum ad putredinem, quæ est in ipso, causa igitur eius quæ est essentialis, est putredo, & apostema non est causa eius nisi per accidens. Et dicimus quod si non significauerint per febrem accidens, hoc: immo non intellexerunt per eam, nisi quod ipsa

sequitur apostema inuentum, per inuentionem apostematis: similiter est dispositio februm putredinis per comparisonem ad putredinem. Verum occupatio in huiusmodi contradictionibus est illud, quod non confert in scientia medicinæ aliquid: & facit medicum procedere ex arte sua ad inquisitiones, quæ fortasse impediunt ipsum ab arte sua: procedamus ergo secundum id quod consuetum est. Dicamus ergo propterea quod febres apostematæ, & oppilationum sunt febres accidentis, & aliæ febres sunt aggritudines: tunc conueniens est ut dicamus, Quoniam propterea quod omnia quæ sunt in corpore hominis sunt tria genera, scilicet membra continentia illud, quod est in eis de humiditatibus, & spiritibus, quorum comparatio est comparatio parietum balnei: Et humiditas contenta, & eius comparatio est comparatio aquæ balnei: Et spiritus animalis, & uitalis, & naturalis, & uapores sparsi, & comparatio eorum est comparatio aeris balnei. Et accensum cum caliditate extranea inflammatione prima est illud quod quando ipsum extinguitur in frigidatur quod ei uicinatur: & quando in frigidatur illud quod est uicinum ei, non oportet ut ipsum extinguatur: immo possibile est ut remaneat, & redeat, & calefaciat illud quod ei uicinum est: existens unum istorum trium generum extra, quæ non inuenitur in homine genus corporeum. Et si accendatur febris in membris radicalibus accensione prima: sicut acceditur ad ustio: uerbi gratia: in parietibus balnei, aut in folle ferrarij, aut in olla coci, tunc illud genus februm nominatur febris hæctica. Et si accendatur febris accensione prima in humoribus: deinde accendatur ex eis in membris sicut accidit: ut effundatur aqua calida in balneo, & igniantur uel calefiant parietes eius, causa ipsius: aut ius cali-

dum in olla & accendatur olla causa eius, tunc illud genus febrium nominatur febris humoris. Et si accendatur febris accensione sua prima in spiritibus, & vaporibus: deinde accendatur ex eis in membris, & humoribus: sicut accidit, ut perveniat ad balneum aer calidus, aut accendatur ignis in eo, quare calefiat aer eius, & perveniat ad aquam, & parietes: tunc genus illud febris nominatur febris ephimera: quoniam est accensa in re subtili, quae resolvitur cum velocitate: & raro pertransit diem cum nocte sua: nisi convertatur ad genus aliud febrium. Haec ergo divisio febrium est per modum propinquum divisioni euenienti per differentias. Et diuiduntur febres alio modo. Dicitur enim quod defebribus sunt febres acutae: & de eis sunt non acutae. Et de eis sunt chronicae: & de eis sunt non chronicae: Et de eis sunt nocturnae: & de eis sunt diurnae. Et de eis sunt salubres recte: & de eis sunt habentes accidentia horribilia. Et de eis sunt dimittentes: & de eis sunt inseparabiles. Et de inseparabilibus sunt quaedam, quibus in sunt intensiones. & remissiones seu tepores. Et de eis sunt similes. Et de eis sunt calidae. Et de eis sunt frigidae habentes rigorem, aut horripilationem. Et de eis sunt simplices. Et de eis sunt compositae.

De preparatis ad febres. Cap. II.

Dixerunt quidam quod corpora vehementius preparata ad febres sunt corpora calida, & humida: & proprie cum humiditas est fortior caliditate: & isti quidem foetidi sudoris, & urinae, & egestionis. Et corpora calida & sicca iterum sunt preparata ad febres acutas, & incipiunt prius ephimerae, deinde festinant ad putredinem, & adustionem: & quandoque faciunt cadere in hecticam. Et sequuntur ea ambo, quae aequantur in humiditate & siccitate, & dominatur caliditas: & ista sunt de genere eorum in quibus incipit febris vaporis calidi, deinde permittitur ad febrem humoris. Postea illa in quibus aequantur calor & frigus, & multiplicatur humiditas, & isti quidem febres putredinis accidunt secundum plurimum incipientes. Et corpora frigida & humida, & frigida & sicca, sunt longinquiora corpora a febribus, & proprie ab ephimera.

De horis febrium. Cap. III.

Febrium horae sunt sicut reliquarum egritudinum: principium, & augmentum, & status. Et apud ultimum, & declinatio. Et sunt quandoque, istae horae vniuersales. Et sunt quandoque, particulares secundum quemlibet paroxysmum, & timor est in principio usque ad statum: apud declinationem vero non moritur aeger ex ipsa febre, nisi per id quod dicemus de causa. Et principium quidem est hora, in qua calor naturalis praefoca-

tur a materia submergente ipsum in membro, & est hora, in qua non apparet digestionis, aut diuersionis eius contrariae digestionis vestigiū. Et principium quidem est inuentum in omni egritudine. verum quandoque occultatur, sicut est eius occultatio in syncho, & epilepsia, & apoplexia. Et quando principium est occultum paucorum accidentium, existimatur quod non sit principium in ea. Et similiter quandoque in die primo febrium acutarum videtur nubes, & signum maturitatis, & existimatur quod non sit ei principium: & non est ita. Et augmentum quidem est hora in qua commouetur caliditas innata ad resistendum materiei motu manifesto, & apparent signa digestionis: aut signa contraria digestionis. Et status est hora in qua vehemens est pugna inter naturam & materiam: & apparet victoria vnius ambarū eam super aliam: & est hora pugnae: & eius spatium est in habentibus paroxysmos acutos, paroxysmus vnus, & non cognoscitur nisi per illum qui sequitur ipsum: aut duo paroxysmi, & cognoscitur in tertio eius: & non addit super illos ambo, & in pluribus, nisi in egritudinibus macronoxijs: fortasse enim assimilantur paroxysmi plures in omnibus iudicijs suis: & illic apud statum completur vestigium digestionis aut contrarij eius. Et declinatio quidem est hora in qua calor innatus iam dominatur materiei, & vincit eam: & exilit in congregationis eius separatione. s. rei postea, & tunc alleviatur caliditas intrinseca, & expellitur ad extremitates donec resolvitur, & multoties accidit error. Et status quidem diuersificatur in egritudinibus. Aegritudinum enim valde acutarum longinquior status est usque ad quatuordecim dies: & febres ephimerae sunt de hac summa: verum tamen ipsae non numerantur acutae, quoniam non sufficit in acuitate egritudinis. vsq. status eius proximus, immo sit de egritudinibus habentibus timorem. Et sequuntur eas febres acutae absolutae, & sunt illae quarum status est usque ad septimum diem sicut febris adustina, seu caustion, & tertiana continua. Et ex eis sunt, quae sunt minus acutae quam illae, & sunt illae quarum status peruenit usque ad quatuordecim dies, & quae sunt post illas sunt acutae chronicae usque ad 21 diem, postea sunt chronicae usque ad 40. & 60. & quod est supra id. Et cognitio quidem egritudinum acutarum in gradibus suis, & chronicarum, est iuuatiua in regimine: tibi aegri secundum quod dicemus in sequentibus. Et plures quidem febrium complent principium, & augmentum, & statum in paroxysmo vno: & faciunt paroxysmum alium declinando. Et febres quidem diuersificantur in his temporibus: de eis enim sunt, quarum augmentum prolongatur: et de eis sunt, quarum declinatio prolongatur.

Cognitio horarum inuersalium ægritudinis, & proprie status. Cap. III.

Cognitio horarum ægritudinis inuersalium quandoq; est ex specie ægritudinis: nam spasmus, siccus, & epilepsia, & apoplexia, & squinantia sunt ex acutis ualde. Et tertiana pura, & caisson de acutis non ualde. Et quartana, & paralytis de macronoxijs. Et quandoq; ex motu ægritudinis: nam si paroxysmi sunt breues, significant quod status est propinquus: sicut tertiana pura, tempus enim paroxysmorum eius est ex tribus horis vsq; ad quatuordecim horas: & si sint prolixi, significant qd materia est grossa, & status longinquus: sicut in tertiana non pura. Et si non fuerint illic paroxysmi, immo materia eius fuerit acuta sicut synochi, tunc ægritudo erit acuta: Et si fuerit materia eius grossa frigida, aut decliuis ad grossitudinem, tunc ægritudo erit non acuta. Et quandoq; ex forma seu figura, quoniã si ipsa extenuetur vel tornatilis fiat: velociter, & contabescant facies & hypocondria, tunc ægritudo erit acuta, & si remaserint cū dispositione sua, tunc ægritudo non erit illius acuitatis. Et quandoq; est ex virtute ægri cui velociter aduenit debilitas: quare est ægritudo acuta: aut non apparet illud, & est ægritudo non acuta. Et quandoq; est ex ætate, & tempore, nam in tempore calido, & ætate calida festinat status ægritudinum: & in temporibus frigidis, & ætatibus frigidis tardatur status ægritudinum: & similiter est dispositio regionum. Et ex pulsu, nam si est velox, frequens magnus, tunc ægritudo est ad acuitatem decliuis: & si non, tunc non est acuta. Et ex rigore, nam si est prolixi spatij, tunc ægritudo est decliuis ad prolixitatem: & si est breuis spatij, tunc ægritudo ad acuitatem tendit. Et quãdo nullo modo est rigor, tunc ipsa est ex breuiori genere ipsius. Et cognoscuntur horæ ægritudinis quandoq; ex parte horarum paroxysmorum, nam si fuerint procedentes secundum antecessionem superfluentem, ad illum qui antecedit superfluitate tendente ad additionem tunc ægritudo erit in augmento: quoniam de ægritudinibus sunt, quæ currunt vsq; ad finem horarum suarum secundum additionem, & sunt quandoq; de genere tertianæ, & de genere quotidianæ & cum iam steterint post antecessionem, & steterint superfluitates, tunc sine dubio erit ægritudo in statu. Et seruans horam vnam est longi spatij: & si postponitur, tunc ægritudo est in declinatione. Et similiter cognoscitur dispositio horarum ex augmento accidentium febris, & statione eorum, & declinatione ipsorum, & ex additione paroxysmorum eius in longitudine, & breuiatione ipsorum: & fortasse diuersificantur & non assimilantur. Et quandoq; cognoscuntur ex dispositione euacuationum: nam cum accidit in paroxysmo aliquo sudor, aut ventris fluxus, & paroxysmus secundus, qui est post ipsum est in

similitudine vehementiæ primi, & fortitudine eius, aut supra ipsam, tunc euacuatio eius est propter multitudinem, non propter fortitudinem, & ægritudo iudicatur longa. Et quandoq; cognoscuntur ex parte digestionis secundum quod diximus, & contrarij digestionis. Verbigratia quando apparet sputum cum digestionem aliquam, aut vrina in qua est nubes aliqua, tunc est principium augmenti: deinde quandoq; multiplicatur illud, & apparet, aut contrarium eius, tunc est status: & iterum quando apparet digestio, aut contrarium eius velociter ex sputo, aut nube, tunc scias quod status est propinquus: & si tardatur, tunc scias, quod status est longinquus. Cognitio autem horarum particularium sic accipitur: nam hora principij paroxysmi est hora in qua coarctatur pulsus, & tu iam sciisti intentionem eius: & plures fit color extremitatum, & infrigidantur extrema, & proprie extremitas auris, & nasi, vsq; ad horam in qua sentitur spatio caliditatis. Et quandoq; associatur principio alteratio coloris, & pigritia, & angustia, & tarditas motuum, & profunditas somni, & mollificatio palpebrarum, & grauitas sermonis, & horripilatio inter spatulas, & in dorso, & fortasse accidit in eo rigor fortis, & quandoq; accidit cursus saliuæ, & saltus temporum, & tinnitus aurium, & sternutatio, & tensio membrorum corporis. Et uehementius quidem debilitatur virtus propter debilitatem quæ est in principio, aut statu. Et horæ augmenti mediætas prima est hora, in qua pulsus incipit apparere, & magnificari, & velox fieri, & spargitur calor in toto corpore secundam æqualitatem, & mediætas eius altera est hora, in qua non cessat hæc caliditas sparsa cum æqualitate augmentari. Et hora status est hora in qua remanent caliditas sparsa cum æqualitate, & accidentia cum dispositione sua, & pulsus fit maior quam vnquam, & sit uehementius velox, & frequens. Et hora declinationis est hora in qua incipit diminutio, & incipit pulsus temperari, & equari. Deinde illa in qua incipit corpus sudare, & perducit ad eradicationem. Et multo tunc quidam accidit apud mortem dispositio, quæ est sicut declinatio, & est quasi eger euaserit: & non oportet vt tu occuperis in hoc, immo cognoscas dispositionem pulsus, & an magnificetur, & fortis fiat. Et si tibi videtur, ponam tibi exemplum de tertiana. Attende ergo qd in tertiana in pluribus dispositionibus incipit horripilatio: deinde frigus, & rigor, postea sedatur rigor, & minoratur frigus, & incipit calefactio: postea æquatur calefactio, deinde additur: postea stat: deinde incipit minui vsquequo eradicitur. Et scias qd tempus ægritudinis prolóngatur, aut propter multitudinem materiei, aut propter grossitatem eius, aut propter frigus eius. Et quandoq; adiunat ad illud tempus frigidum, & regio frigida, & ætas frigida, & debilitas caloris innati, & spissitudo seu densitas cutis.

Sermo vniuersalis de febribus ephemeris. Cap. V.

CAUSE omnium specierum febris ephimere sunt causæ primitiue calefacientes essentia liter, & calefacientes per accidens de summa occurrentium, & assumptorum. s. in cibo, & in potu & passionum corporearum, & animalium, & ex doloribus, & apostematibus extrinsecis. & quandoque quædam ex eis sunt ex oppilationibus, quarum causa non est primitiua, & non perueniunt causæ earum cum vehementia sua ad hoc, vt pertranseat illud quod inflamat spiritum: nam si pertranseat illud, faciunt cadere in hecticam: aut in speciem febrium humorum quam dicemus. Causæ enim primitiue plerumque mouent antecedentes: quod si mouerint eas ad putredinem, erunt febres putredinis. Et sunt quidam hominum qui existimant, quod febris ephimera non fit, nisi ex labore spiritus, & corporis, & illud est error. Et istæ quidem febres secundum plurimum recedunt in die vno, & raro pertranseunt tertium diem. Nam si pertranseant illam quantitatem, existimatur de esse earum, quod ipsæ permuratur. Et intentio quidem permutationis est, quod accensio caliditatis pertransit spiritum: aut ad corpus, aut humorē. Licet sint de hominibus qui dicant, quod ipsa quandoque remanet sex diebus, & consumitur integrā consumptione: cui non esset similis, si permutaretur ad genus aliud. Et hæc quidem febris est facilis curationis, & difficilis cognitionis: & similiter principium hecticæ. Et homines quidem velocius læduntur ab eis, si erretur in eis, sunt illi in quibus calor & siccitas sunt magis vincentes: quoniam perueniunt velociter ad hecticam, & tertianam. Deinde illi in quibus calor & humiditas vincunt, quoniam perueniunt velociter ad febrem putredinis. Deinde illi in quibus calor est plus. Deinde illi in quibus est plus siccitas. Et cum illi, qui habent complexionem siccam & calidam, accidit famies, & associantur ei vigilia, & labor animalis, & labor corporeus, festinat ad ipsum febris ephimera cum horripilatione quadam. Quod si non succurratur, & cibetur statim, festinabit ad ipsum febris putredinis.

Signa propria febrium ephemerarum, distinguentia eas ab alijs. Cap. VI.

DE proprietatibus earum est, quod ipsæ non fiunt a causis antecedentibus: neque incipiunt cum coarctatione, & est quod ipsæ non incipiunt secundum plurimum cum rigore, & frigore extrematarum, & profundatione caliditatis, & declinatione ad pigritiam, & somnum, & submersionem pulsus, & diuersitatem eius, & paruitatem ipsius. Immo fortasse accidit in principio earum similitudo frigoris, & horripilationis, & puctio:

cuius causa est vapor chymi mali, & remouetur velociter: & accidit, sed raro rigor propter multitudinem vaporum lædentium lacertos propter punctionem suam plurimam superfluam. Et est eius inflammatio non mordicatiua aspera, immo bona, sicut caliditas corporis laborantis, & ebrii. Et cum est vrina in primo die digesta, & pulsus bonus, tunc iudica quod est febris ephimera: & illud ideo, quoniam vrina non alteratur in ea in quantum ipsa est ephimera, & est sedimē eius digestum, non decliue ad colorem humoris, & est quandoque nubes eius pendens, & quandoque natans boni coloris, & quandoque accidit vt non equetur color eius, tñ eius substantia est equalis: et non alteratur color eius, nisi propter id quod associatur ei de causa alterationis vrinæ: quamuis non sit illis febris ephimera ex eo quod dicemus in ephimera ex labore, & similibus ei. Et pulsus est decliuis ad spissitudinē, & fortitudinē, & magnitudinē nisi in ea quæ est a passionibus debilitantibus, & nisi fuerit in stomacho humor mordicatus, aut frigidus, aut causa alia de his, quæ purificant pulsū. pter febrē. Et raro quidē diuersificatur: si vero diuersificetur, erit ei ordo: nam si diuersificetur illud, tunc erit propter causam aliam antecedentem febrem, aut associatam ei, sicut est labor vehemens, aut mordicatio vehemens in visceribus, & similia his. Et quandoque accidit vt indurētur pulsus propter frigus vehemens, & insipifans infrigidans, aut propter caliditatem solis vehementem exiccantem: aut propter vehementem laborem exiccantem, aut famem, aut angustias, aut vigilias, aut euacuationes. Et quandoque festinat in eo dilatatio, & tardatur constrictio: & non festinat plusquam naturalis nisi raro, & cum velocitate pauca, quoniam necessitas euentationis in eo est vehementior, quam necessitas educendi vaporem corruptū: vapor namque in eo non est corruptus cōparatione sui ad equalem: immo est calefactus cōparatione sui ad eum. Et cum ambiguus sit tibi pulsus, & constrictio ipsius, tunc scias ex anhelitu: Et pulsus quidem reddit post eradicationem eius ad consuetudinē eius naturalem in illo corpore, & hoc est signum bonū. Et scias penitus, quod quoties vrina & pulsus sunt boni, significant quod febris est ephimera: & quando non sunt boni, non oportet vt non sit ephimera, multoties enim est in ea vrina tincta, & pulsus diuersus, & debilis, & parus. Et de illis, quæ significant quod ipsa est febris ephimera, est vt sit principium eius facile, & leue: & sit augmentum eius non addens supra duas horas, & neque associetur statui accidentia vehementia. Et in febre putrida est cōtrariū, & vt non accidat in ea accidentia praua: & non sit in ea acuitas caloris vehemens, & minorentur cum ea dolores: quod sicut ea dolor fuerit capitis, aut dolor alius non sit fixus inseparabilis post eradicationē eius: & hoc quidē significat quod ipsa est ephimera. Et plura

rimum quidem eradicationis eius fit per sudorem, & humorositatem similem sudori naturali, non humoso: & non sit uehemens superfluitas iterum in quantitate sua: immo appropinquat sudori naturali in quantitate sua sicut est proximus ei in qualitate sua. Si enim uideris sudorem plurimum, tunc febris erit non ephimera. Et de eis de quibus febris ephimera experitur, est ut ingrediatur balneum habens eam: cumq; mora fecerit euenire in eo quasi horripilationem non consuetam, scitur quod febris est febris putredinis: & egrediatur habens eam ex balneo illico: & si nihil alteratur à dispositione sua tunc febris est ephimera.

Permutatio febris ephimeræ. Cap. VII.

Cum expedit ut febrem ephimeram patiens cibetur, & errat medicus super eam, & non cibatur ipsum: permutatur febris in corporibus cholericis ad hecticam & incensiuam, & in corporibus carnosissimis ad synocham, quæ est absq; putredine: & fortasse permutatur ad illam, quæ est cum putredine. Et similiter quando necessarium est adiutorium in aperiendo poros, & rarificando corpus, & non fit, fit inflammatio in humoribus retentis in corpore inflammatione qua fit calefactio cum fortitudine, & fit putrefactio.

Signa permutationis febris ephimeræ ad febres alias. Cap. VIII.

Significatio illius est, quod ipsa declinat absque sudore, aut humorositate: aut cum sudore absq; mundificatione per sudorem: & est declinatio longa difficilis, & absque mundificatione pulsus. Immo remanet in pulsu aliquid, & remanet dolor capitis si fuerit: & hoc totum significat permutationem ad febrem putrefactionis humoris aut ad sanguineam & si causæ fuerint uehementes, aut prolongetur mora eius, permutabitur ad hecticam. Quod si ad hecticam permutetur, videbis tactum arteriarum calidum valde: & uidebis febrem similem, uel fixam, & in omnibus membris additur calefactio super repletionem: & in tempore acceptionis cibi: aut videbis pulsum ferme æqualitatem cum durtie, & paruitate. Et videbis signa reliqua, quæ diximus de signis hecticæ. Et quando permutatur ad genus febrium sanguinis: quod nominatur synocha absq; putredine: uidebis additionem, & repletionem caliditatis: & inflammatio nem faciei. Et quandoq; permutatur ad febres putredinis, apparent horripilatio, & diuersitas pulsus, & paruitas, & coarctatio: & est caliditas mordicatio sicca, & uehementia accidentium. In urina autem fortasse remanet digestio rei præ-

cedentis, & in pluribus non apparet in ea digestio.

Curationes febris ephimeræ secundum modum uniuersalem. Cap. IX.

In omnibus speciebus febris ephimeræ oportet, ut afferantur super corpora patientium eas, quæ nutriant eos nutrimento bono cum uelocitate digestionis: quoniam febriens est æger: & æger est læsus, & læsus non digerit aut rard digerit. At quibusdam eorum conceditur quiescere seu deliciari in ea: sicut patienti febrem ex labore, & angustia, & fame, & illis in quorum corporibus cholera plurima est. Et qui conqueritur se pati horripilationem in principio, deglutiat cibum infusum in aqua, & uino ut sit magis penetrans: & isti quidem cibantur etiam in principio febris. Et quibusdam prohibetur quiescere seu deliciari in ea, & innuitur eis ut fiat subtilitatio regiminis sicut in patiente febrem ex oppilatione, & soliditate, & ex apostemate. Et melius quidem est ut postponatur cibatio usq; ad declinationem, nisi in illis quos excepimus. Et aqua frigida quidem oportet ut non prohibeatur in principio rei, quoniam virtus est fortis: quare non timetur debilitas eius: & est melior cura in infrigidando spiritus. uerum si fuerit illic debilitas in uisceribus, & febris iam extenditur, seu prolongatur, aut fuerit febris ex oppilatione, tunc melius est ut de ea non multum sumatur. Et conceditur eis balneum cum eorum paroxysmus committitur in febribus ephimeris propter intentiones de quibus est humectatio. & de eis est prouocatio sudoris, & rarificatio pororum, & de eis est infrigidatio in secunda dispositione: & prohibetur ubi timetur casus putredinis. Et non oportet ut euitetur balneum nisi habens eam ex oppilatione, quandoq; enim balneum generat ægritudinem putridam: & similiter patiens eam ex fatietate nauasatiua, nisi in fine rei, & cum dilatantur pori, & descendit nauasatiua fatietas: illic enim oportet ut balneetur. Et habens catarrhum non balneetur, nisi sit adustius. Et omnes habentes febres ephimeras oportet, ut non prolongent moram in aere balnei, immo in aqua eius quantum uolunt, nisi habentes eam ex soliditate, & ex spissitudine: eis enim conuenit, ut prolongent moram in aere balnei donec fudent. Inunctio autem si fuerit effundendo, aut liniendo tantum, oppilat poros. Et in curatione omnis febris ephimeræ, quæ est ab oppilatione extrinseca, aut intrinseca, fricatio aperit poros habentis eam, deinde si obuiat humiditati plurimæ, resoluit eam, & si obuiat humiditati paruæ, exiccat corpus. Euacuatione autem non indiget aliquis eorum nisi habens oppilationem repletionalem, & habens nauasatiuam fatietatem: & qui habent febrem ephimeram ex soliditate, cuius corpus est repletum.

Species febris ephimera. Cap. X.

DE febris ephimeris sunt, quæ omnino comparantur ad dispositiones animales. Et de eis sunt quæ comparantur ad dispositiones corporeas. Et de eis sunt, quæ proportionantur ad res quæ eueniunt de foris. Et de comparatis ad dispositiones animales est illa, quæ fit ex angustia, & illa quæ fit ex tristitia, & illa quæ fit ex existimatione, & cogitatione, & ira, & vigilijs, & somno, & tranquillitate, & timore, & gaudio. Et de proportionatis ad dispositiones corporeas sunt illæ quæ comparantur ad res, quæ sunt actiones & motus: & de eis sunt, quæ comparantur ad non actiones & motus, & ad contraria eorum. Et comparatæ ad res, quæ sunt motus, & contraria eorum est illa, quæ fit ex labore: & illa, quæ ex tranquillitate, & illa, quæ fit ex euacuatione: & de eis est febris ephimera ex dolore; & de eis est febris ephimera, quæ est cum syncopi, & de eis est illa, quæ fit ex fame, & de eis est illa, quæ fit ex siti. Et de comparatis ad ea, quæ non sunt actiones, est illa, quæ fit ex oppilatione: & de eis est illa, quæ fit ex nauseatiua satietate: & de eis est illa, quæ fit ex apostemate: & de eis est illa, quæ fit ex asperitate uel siccitate cutis. Comparatæ autem ad res, quæ accidunt de foris sunt, sicut illa, quæ fit ex adustione solis, & sicut quæ fit ex condensatione cutis facta ex frigore, & facta ex ablutione cum aquis stypticis. dicam itaque unamquamque earum cum curatione sua.

De febre ephimera ex angustia, & signis eius.

Cap. XI.

Q Vandoque accidit ex motu spiritus ad interiora, & conculcatione eius in eis propter superfluitatem angustia febris spiritualis. Cuius signa sunt igneitas urinae, & acuitas eius: ita ut habens eam sentiat acuitatem ipsius, propter dominium siccitatis in ea: & est motus oculi ad clausiorem decliuem: & est oculus submersus propter resolutionem cum quiete corporis, & facies est tendens ad citrinitatem propter profunditatem caliditatis. Et pulsus est ad debilitatem, & paruitatem decliuem: & forte declinat ad duritiem.

De cura. Cap. XII.

O portet ut habens eam multiplicet introitum urine, & ponat plurimum suæ intentionis in balneatione cum aqua balnei absque aere eius, & multiplicet eam inunctionem cum oleo post illud: oleum enim est magis iuuatuum ei quam balneum. Et utatur laxificatibus, & odoriferis frigidis. Et ponat super pectus suum epithemata infrigidantia ex mucilaginis, &

succis, & aquis boni odoris, & sumat in potum plurimam commistionis: est enim bonum medicamen ei.

De febre ephimera ex beam. Cap. XIII.

Q Vandoque accidit ex multitudine tristitie propter rem quæ sitam motus laboriosus, spiritum calefaciens, faciens cadere in febrem: cuius signa sunt similia signis eius, quæ est ex angustia: nisi quia motus oculi cum profunditate sua, propter resolutionem est ad partem extrinsecam: & pulsus non est demissus depressus: immo est in eo eleuatio aliqua cum debilitate: si ipsa debilitas fuerit cum eo. Et cura eius est sicut cura eius, quæ est ex angustia.

De febre ephimera ex cogitatione.

Cap. XIII.

Q Vandoque accidit ex multitudine cogitationis in rebus, febris similis illi, quæ est ex angustia & tristitia, nisi quia motus oculi est equalis, non ad clausiorem, neque ad exitum decliuem, & est decliuem ad profunditatem: & pulsus est diuersus in eleuatione & depressione & plurimum quidem est equalis: Et facies est ad citrinitatem decliuem. Et cura eius est cura illius, quæ est ex tristitia.

De febre ephimera ex ira. Cap. XIV.

Q Vandoque accidit propter superfluitatem motus spiritus ad exteriora in dispositione iræ, calefactio superflua accensa in spiritu. Cuius signa sunt rubedo faciei, nisi permisceatur ei timor, quoniam citrinatur: & inflatio faciei similis ei, quæ inflatur in dormitione: Et sunt oculi rubei tendentes exterius propter vehementiam motus spiritus ad exteriora. Et quandoque accidit quibusdam eorum tremor, propter motum humoris: aut propter debilitatem naturarum. Et est aqua rubea, acuti tactus propter acuitatem suam. Et quandoque est cum ea aliquotulum claritatis. Et pulsus est grossus, plenus, eleuatus, frequens.

De cura. Cap. XVI.

Faceos quiescere, & fac ut occupentur laxificantibus, & narrationibus, & vocibus bonis & ludis mirabilibus: & fac eos ingredi balneum in aqua tepida, non plurimi caloris: & inungantur plurimum cum aliquo oleo plurimum: illud enim est magis conueniens eis, quam aqua calida. Et cibentur eis, quæ infrigidant, & humectant. Et prohibeantur a uino omnino non enim est eis via ad ipsum.

De febre ephimera ex vigilijs. Cap. XVII.

Q Vandoq; etiam accidit ex vigilijs febris ephimera: cuius signa sunt, antecessio vigiliarum, & grauitas palpebrarum, & fortasse nō aperit eas, & profundatio oculi propter resolutionem, & inflatio palpebrarum propter corruptionem cibi, & multitudinem vaporis: Et conturbatio vrinæ propter priuationem digestionis. Et debilitas pulsus: Et citrinitas faciei propter malitiā digestionis: Et inflatio eius propter tumefactionem factam ex malitia digestionis, sed non est cum rubedine, sicut in illa quæ est ex ira.

De curatione. Cap. XVIII.

C Vratio autem eius est ociari, & quiescere, & dormire, & embrocare caput cum eis, quæ infrigidant & humectant: & balneum humidum, & cibi bonorum chymorum: & inunctiones humectantes. Et vinum est ex rebus magis conferentibus eis: & sumant in potu ipsum sine timore, nisi fuerit dolor capitis.

De febre ephimera ex somno & quiete.

Cap. XIX.

A Spiritu quandoque resoluuntur vapores calidi per vigilias, & motus. Cum ergo prolongatur somnus, & tranquillitas, & non resoluuntur: accidit ex eis calefactio spiritus & febris eius. Cuius signa sunt ista, significat enim eam antecessio somni, & tranquillitas plurima, & proprie, quæ non est in consuetudine, & cadit contrarium consuetudinis, & significat ipsam repletio vaporosa pulsus.

De curatione eius. Cap. XX.

C Vratio eius est sudatio in aere balnei, & ablutio æqualis cum aqua calida, & paucitas cibi, & declinatio eius ad id quod infrigidat, & humectat ipsum, & eaeritium temperatum, & non oportet vt bibat vinum.

De febre ephimera ex gaudio. Cap. XXI.

Q Vandoq; accidit ex gaudio febris, sicut illa quæ fit ex ira. Cuius signa sunt proxima signis eius, quæ est ex ira, nisi quia forma oculi est forma gaudentis, non formā irascentis. Et est frequentia in pulsu minor. Et cura eius est proxima curationi eius, quæ est ex ira.

De febre ephimera ex timore. Cap. XXII.

Q Vandoq; accidit ex timore febris secundū semita, quæ accidit ex angustia. Proportio

namq; timoris ad angustiam, est proportio iræ, ad gaudium, ex hoc, quod motus, timoris est ad interiora, & iræ ad exteriora, & fit subito, & aliorum modorum fit gradatim. Cuius signa sunt proxima signis eius, quæ fit ex angustia: nisi quia diuersitas in pulsu est vehementior: & forma oculi eius est forma terri. Curatio eius est proxima curationi eius, quæ fit ex angustia: & oportet ut securctur à timore: & ueniatur ad eum cum nuntijs gaudere facientibus: & vinum confert eis.

De febre ephimera ex labore. Cap. XXIII.

L Abor quandoq; peruenit ad summum in calefaciendo spiritum, ita ut fiat febris nō cens operationibus, & est plurimi nocumēti, & grauitatis ipsius super vitalem, & animalem. Signa sunt antecessio laboris, & additio calefactionis iuncturarum super alia: & sensatio lassitudinis: & siccitas corporis. Et quandoq; accidit in fine eius humectatio, si fuerit labor temperatus, & nō fuerit calor exicans, aut frigus prohibens sudorem. Si autē labor fuerit superfluus, minoratur humectatio, & sudor: & quandoque sequitur ipsum tusis sicca propter communitatem pulmonis: & fit pulsus eius parvus debilis: & quandoq; declinat ad duritiem: & vrina est citrina, acuta propter motum, & subtilis propter resolutionem.

De cura. Cap. XXIIII.

C Vratio eorum est tranquillitas, & balneatio intina: & inunctio cum fricatione leui superiuncturas: & acceptio cibi boni chymī, humectantis, secundum quantitatem quæ digeratur, de genere carniū pullorum, & hodi, & piscium petrosorum. Et quoniam virtutes eorum sunt debiles, tunc non oportet vt confidant de se, posse digerere, quod digerebāt in dispositione sanitatis: immo minus illo. Et propter hoc cibentur eis, quorum paucum nutrit plurimum, sicut ea quæ diximus: & sicut vitelliorum sorbillum, & testiculi gallorum sunt eis boni. Quidam tamen existimauerunt: quod oportet vt patientium lassitudinem regimen plus subtrahatur quam aliorum: sed illud non est rectum. Et oportet vt sumant de fructibus humidis. Et sumant in potu vinum plurimæ commissionis, si fuerint asucci: aut iuleb, & aliud, si non fuerint confecti. Et oportet vt eorum inunctio sit plurima, quam inunctio aliorum cum oleo aliquo vt humectentur eorum membra, & iuncturæ exsiccatæ: & iterum vt mollificetur illud quod accidit eis de tensione. Et oleum violæ est de oleis melioribus eis. Et oportet vt communicet inunctio eorum corpori: & proprie capiti, & collo, & spondylis dorsū,

dorsi, & iuncturis omnibus: & proprie post balneationem. Et oportet vt mollificetur strata eorum, & aromatizentur indumenta eorum, & sedilia eorum: & si indigent iteratione balnei propter reliquias, iterentur omnia quæ scripta sunt in capitulo suo.

De febre ephimera ex euacuatione.

Cap. XXV.

Q Vandoque accidit ex commotione humorum post ventris solutionem motus spirituum superfluous, & inflammans in ipso febrem propter multitudinem lasitudinis, quæ sequitur ipsam. Et quandoque faciunt eam medicinæ solutiua, propterea quod calefaciunt. Et quandoq; sequitur phlebotomiam, propterea quod redire facit humiditatem vaporum: & sanguinitatem earum ad furiositatem cholicam.

Curatio. Cap. XXVL

O Portet vt subtilietur vel ingenietur in retinendo naturam per ea quæ sunt ordinata in capitulis suis: & vt cibetur eger cum eo, quod confortat plus: secundum quantitatem qua digeratur, de eis quæ infrigidat & humectant & sint in eo pontica, styptica: & ponantur super stomachum emplastra, & embrocæ confortantia calefacta, non tepesfacta. Nam omne tepidum est mollificatiuum, & resoluit virtutem. Et de hac summa est lana infusa in oleo nardino, aut oleo frigidiores eo, aromatizato: & exprimatur adeo, donec separentur ab ea partes olei. Et ponantur super cor, & hepar ea, quæ infrigidant.

De febre ephimera ex dolore. Cap. XXVII.

D Olor quandoq; calefacit spiritum adeo, donec inflammetur febris. Signa. Dolor in capite, aut oculo, aut aure, aut dente, aut iuncturis, aut extremitatibus, aut colica, aut hamorrhoidibus, aut alijs de doloribus furunculorum.

De cura eius quæ fit ex dolore.

Cap. XXVIII.

R Egatur dolor cum eo quod oportet in capitulo suo, deinde curetur cura eius, quæ fit ex labore. Quod si timeatur ex potu vini motus doloris, non detur in potu.

De febre ephimera ex syncopi. Cap. XIX.

Q Vandoq; accidit ei, cui supervenit syncopis propter agitationem motus spirituum calefactio, quæ convertitur in fe-

bre: & quandoq; remanent de ea post ablationem timoris in syncopi reliquæ. Signa. Vicinitas syncopis, & casus virtutis absq; signis febrium aliarum, quæ non sunt ex febribus ephimeris. Et pulsus in ea est diuersarum dispositionum. Quandoq; enim, cadit, & destruitur, quando vincit frigus: Et quandoq; fit velox, & apparet, cum dominatur caliditas: & simulatur pulsui patientium extenuationem exiecativam, in duntie cum dispositione pulsus vermicularis.

Curatio. Cap. XXX.

C Vra eius est cura syncopis, & dare cibos velocis digestionis, boni chymi, de illis quos sciisti: & si indigneris vt des in potu vinum, fac: & non cures de febre. Cum ergo liberatur ex syncopi, & remanet febris, similis ei, quæ est cū extenuatione, curetur cū eo quod est in canone de infrigidatione, & humectatione.

De febre ephimera ex fame. Cap. XXXI.

Q Vandoq; acuuntur vapores in corpore quando non inveniunt, nutrimentum, & generant febrem: Et eius pulsus est debilis, parvus, & quandoq; declinat ad duritiem. Curatio. Cibatio quidē in febre est sicut ex forbitionibus factis ex Kist hordei cum oleis, & post illas cum cibis bonis confortatibus: Et balneetur, & effundatur super caput eius aqua plurima tepida: & sedeat in ea, & humectetur corpus eius cum eis, quæ sunt sicut oleum violæ & rosæ, & cucurbitinum.

De febre ephimera ex siti. Cap. XXXII.

H Aec proxima est ei quæ est ex fame: & est dignior vt accidat propter defectum aquæ cum qua sedatur caliditas fortis in vaporibus. Curatio. Est dare in potu aquam frigidam & aquas fructuum frigidorum, & proprie granatorum. Et humectare corpus cum tina, & si possibile est ei balneatio cum aqua frigida, faciat.

De febre ephimera ex oppilatione.

Cap. XXXIII.

O Ppilationes sunt in poris cutis, propter siccitatem eius, & paucitatem ablutionis, & multitudinem pulueris, & propter frigiditatem. Et propter ablutionem cum aquis frigidis stypticis. Et propter adustionem solis. Et quandoque fit in villis venarum, & in ramis earum, & orificijs ipsarum, & cursibus seu vijs earum. Et cum dicitur febris ephimera ex oppilationē, non innuitur nisi ad hanc speciem. Nam accidit vt minoretur resolutio, & multiplicetur reple-

repletio, & coarctatio, & priuetur respiratio, & aggregetur vapor plurimus, calidus, & non resoluitur, & tunc eueniat caliditas superflua, & dum perseverauerit eius inflammatio in subtiliori ex corporibus, quod est spiritus, erit febris ephimera. Quod si inflammatur in sanguine, est species famosa sinocha, quam dicemus: & est illa, quæ est de summa febrium humorum, & non est propter putredinem, immo est propter inflammationem, & ebullitionem. Quod si perducatur illud ad putredinem, quam facit oppilatio, & priuatio respirationis, permutatur ad febres putredinis. Et huiusmodi quidem oppilatio, aut sit ex multitudine humorum, & sanguinis, aut ex grossitudine eorum, aut ex viscositate eorum: aut propter casum rei de causis oppilationis in instrumēto, non in meatu sicut frigus constringens, aut apostema coarctans, aut nascentia rei: aut aliud de illis quarum te oportet rememorari. Et hæc quidē febris de febribus ephimeris parum permutatur ad hecticam: quoniam corpus in ea est plurimæ materiæ. Et in hac febre iterum est sitis, & inflammatio, & adhærentia caliditatis: & urina media inter igneam, & fuscā. Et hæc febris est difficilis ad cognoscendum, cuius similitudo est proxima similitudini febrium humorum. Et hæc febris quandoque remanet usque ad diem tertium, & in eo quod est post ipsum, si sunt oppilationes plurimæ fortes. Et non sint oppilationes eum inspissatione cutis causatæ de foris: & si sunt oppilationes paucae, festinat eius eradicatio, si non fuerit error. Et hæc febris inter febres ephimeras, quandoque accidit, & redit propter fixationem oppilationis, quæ est causa quare fiunt ei sicut paroxysmi. Et hæc quidem febris multo rarius permutatur ad frigus, & horripilationem, & significat quod ipsa sit putrida. Et cum illa quæ est ex oppilationem facit accidere dolorem in latere sinistro post phlebotomiam lateris dextrini non est excusatio iterationis phlebotomiæ: præcipue cum sedatur febris, & perseverat dolor. Signa. Quando accidit febris ephimera non à causa primitiua, & est longæ declinationis, tunc existima, quod ipsa est ex oppilationem, & proprie quæ deo declinat sine euacuatione torida. Et verificant existimationem suam signa repletionis, in corporibus plurimi sanguinis, & generatibus eum: aut grossorum humorum, viscosorum. Et differentia quidem inter ea ambo est, quoniam si oppilationes in eis sunt propter grossitudinem humorum, & viscositatem eorum, significant ea signa nota eis, & non est illic inflatio corporis, & rubedo, & tensio, & ad summum non sunt illic signa multitudinis. Et in illis in quibus causa est repletio, sunt signa repletionis ex rubedine faciei, & exuberatione venarum, & inflatione, & tensione, & alia apparentia. Et si superfluent oppilationes, pulsus est parvus: & si non superfluent,

non oportet ut minoretur pulsus. Cura. Cum causa est multitudo humorum, & repletio, tunc oportet ut in principio properes ad phlebotomiam, & euacuationem. Et ut phlebotomes eum cum iam non febricit, tunc est melius. Et quando febricit, si non fuerit necessitas, tunc statio est magis conueniens: phlebotomia enim facit humores currere, & præmiscet inter eos. Si autem non fuerit excusatio, tunc non oportet ut postponatur, & tardetur phlebotomia, & euacuatio. Deinde fiat occupatio in eius quæ aperiant oppilationes, & mundificent meatus. Et non properes ante euacuationem ad mundificandos meatus, & apertionem. Illud enim fortasse sit causa ad attrahendum humores subito ad quosdam meatus, & inuiscandum in eis: & illud est res in qua sunt errores plurimi: & fortasse addit in oppilationibus, si fuerint grossi, & proprie si meatus in creatione sua fuerint stricti. Verum phlebotomia iterum, & euacuatio quandoque educunt superfluitates fumosas, facientes coarctationem suam hanc febrem, & prohibent, ut permutetur ad putredinem, & proprie cum ad ultimum facis eam peruenire, & facis approximare syncopi. Et si non sentis multitudinem humorum, immo sentis oppilationes, & quod ipsæ sunt accidentes a grossitudine eorum, & viscositate ipsorum: tunc fortasse non indiges phlebotomia superflua, & euacuatione superflua: immo indiges apertione. Et apertio quidem est cum abstergentibus ex medicinis, & cibus. Et propterea quod egritudo est febris, non est possibile ut redeas in apertiendo ad abstergentia calida: immo ad illa quæ sunt inter syrupum acetosum purum, usque ad illam qui est cum seminibus, & aqua endiuie usque ad aquam sceniculi. Et cibus sit ille in quo est ablutio: & non in quo est viscositas, sicut Kist hordei. Et zuccarū cū hoc quod ipsum est propinquū cibo, est in ipso apertio, & absterfio: non est ergo malum si misceatur cū Kist hordei. Demum oportet ut cōsideres cū euacuaueris, si necessaria fuerit euacuatio eius, & facta fuerit apertio sicut cum eis quæ diximus, an minuat febris, & deficiat, & an, si paroxysmos habuerit, frangatur, & debilitetur paroxysmus eius secundus à primo. Et considera urinam: & si inuenis eam non priuatam digestionem: & in pulsu, & si inuenis eum non significare putredinem, procedes secundum hoc regimen. Et intromitte egrum in die tertio post paroxysmum in balneum, hora mollificationis paroxysmi expectati, si fuerit febris, usque ad quinque horas. Et inunge eum: & frica ipsum cum rebus in quibus est absterfio æqualis, sicut quod est inter farinam fabarum usque ad farinam orobi, & farinam radicum lilij, & aristolochiæ emollitæ cum aliquantulo mellis & aque. Quod si fueris ausus uti fortiori hoc, tunc utere spuma baurac. Et si existimas quod balneum al-

terat naturā eius in aliquo, & facit accidere quasi horripilationem, non moretur in eo ictu oculi. oppilationes enim istæ non sunt de genere earum, quas aperit balneum. Cum ergo egreditur de balneo, nō oportet ut approximetur cibo, neq; uino, nisi post securitatem ex paroxysmo. Si autem exigit dispositio ut cibetur aliquantulum, & non tolerat: detur in potu id in quo est apertio, sicut aqua hordei subulis, plurimę aque, pauci hordei, plurimę decoctionis, decocta cum apio. Quod si paroxysmus non iteratur ei, tunc balnea cum secundo, si desiderauerit illud, & ciba ipsum. Et si fuerit paroxysmus diminutus à paroxysmo primo, & vrina fuerit bona, tunc confide in ueritate curationis, & paucitate oppilationis: & cura eum post eradicationem eius, sicut curasti, & ciba ipsum. Et si uenerit paroxysmus sicut fuit, aut fortior illo, & urina non fuerit sicut oportet, tunc ægrotudo est tendens ad putredinem: & curatio eius est curatio putredinis.

De febre ephimera ex nauseatiua satietate, & repletione. Cap. XXXIII.

Quandoq; accidunt ex nauseatiua satietate uapores mali, ex quibus accenditur caliditas, & inflammantur spiritus, quare accidit febris & proprie in corporibus cholericis: & in illis qui non habent amplos poros. Nā plurimum superfluitatum eorum uaporat uaporationes famosas: & minoratur in eis eructuatio acida. Et de illis qui sunt uehementius dispositi ad illam, sunt illi qui incipiunt post nauseatiuam satietatem uti exercitio, & motu, & ire sub sole, & balneatione postquam accidit eis hoc: multi plicantur enim in eis uapores fumosi: & proprie quando habuerint in corporibus suis dolorem & mordicationem, & proprie in uisceribus eorum. De materia uero eructationis acetosæ, & in habentibus eam, raro contingit ut generetur febris. Si autem generetur erit debilis: immo nō generatur. Et existimamus febrem generatam cum eructuatione acetosa esse propter causam aliam à satietate nauseatiua. Et isti quidem cum eorum soluuntur naturæ, iuuantur ualde, & remouetur febris eorum propter expulsionem superfluitatis superflue fumosæ. Et diuersificatur quidem curatio eius, cuius retinetur natura ex illis, & cuius soluitur. Et si natura illius, qui febricit ex nauseatiua satietate, leniatur duabus ascillationibus, aut tribus, deinde phlebotometur, fortis sit super eam fluxus ventris: & fortasse fiet fluxus hepaticus, quem significabunt pulsus cordis, & nigredo linguæ. Et simulantur accidentia febris ephimeræ ex repletione accidentibus febris conclusæ: rubent enim oculi, & facies ualde, & fit inflammatio uehemens, & magnificatur pulsus, & fit uelox: & rubet urina.

Amplius cum plus remanet, non excedit tres dies. Et scias, quod febris ephimera ex nauseatiua satietate quandoq; uenit cum periodicis quatuor, aut septem, & cum hoc est febris ephimera, uerum pulsus eius est sanus. Signa eius sunt alteratio eructuationis ad acetositatē, aut fumositatem. Cum ergo alteratur eructuatio ad sanitatem, indicat sanitatem. Et urina quidem istorum est priuata digestionē aquosa. Et quando causa nauseatiue satietatis est uigilia, est in facie, & faucibus eorum inflatio: & in palpebris eorum est grauitas.

De cura. Cap. XXXV.

Patiens hanc nauseatiuam satietatem non euacuatur quin aut sit natura eius non soluta, aut sit soluta. Quod si natura eius fuerit non soluta, tunc conuenientius est ut soluas eam. Et si fuerit aliquid cibi, aut fecis, aut grauitatis remanens in stomacho, tunc oportebit ut facias uomere ipsum, deinde solue eum. Et considera ubi inuenit grauitatē. & considera tūc, an sit rectius euacuare illud cū clysteribus, & suppositorijs, aut cum aliquo, quod bibitur de super ut soluatur, aut deponatur, aut digeratur. Et significat illud, quod rectius est de hoc dispositio eructuationis: fortasse. n. necessarium erit, si fuerit cibus stans desuper, & sit difficilis uomitus, ut non aspi-ciatur ad febrem, sed administretur diapepe-reon, ut præcipitetur, & descendat cum digestionē; aut administretur, quod est debilius eo: & administrentur embrocæ, & emplastra digestiua cognita in capitulo digestionis: & solutiua cognita in capitulo solutionis. Cum ergo descenderit, tunc aut egredietur per seipsum, aut iuuabitur cum supposito. Et toleretur fames super eum tamdiu, donec non remaneat hæsitatio in destructione satietatis nauseatiuæ: deinde sumat cibum leuem, uelocis digestionis, boni chymi, & festinatio ad famem, & ad somnum, est ex eis quæ sunt sufficiens curatio uel sufficiens adiutorium in al-leuiatione repletionis. Quod si natura fuerit soluta, considera an res, quæ euacuatur, sit illud quod est corruptum. Et si fuerit illud, non retineatur donec totum euacuatur usq; ad postremum eius. Et expecta declinationem paroxysmi, & fac ingredi ipsum tunc balneum, & ciba ipsum, nisi fuerit illic superfluum destruens uirtutem: tunc enim non facias ipsum ingredi balneum, immo ciba ipsum, & conforta stomachum eius cum rebus, quas scies, & quarum quedam scriptæ sunt in capitulis de solutione ventris: & de illis est lana infusa in oleo, in quo est uirtus absinthij, aut etiam in oleo nardino postquam fuerit expressa, & separata fuerit ab ea maxima pars olei. Et si persequatur solutio, & inuenis id, quod egreditur, absq; genere eius, quod corruptum

ptum est, administra oleū de cydonijs bonum, recens secundum hunc modum, & oleum de mastice: & non est iterum in oleo nardino contrarietas eis. Et fortasse administrabimus cerataria, & proprie quando non suffert dispositio stricturam eorum super ventres eorum. Et quandoque indigemus emplastris fortioribus hoc, de emplastris prædictis in cholirica passione. Et da eis in potu aquas fructuum, si desiderat eas: & da ei ad comedendum illud cuius alleviatur nutrimentum, & facilis sit digestio, sicut testiculi galli & pisces alradradi, & præmitte super illud aliquid de fructibus, & succis, & robur stypticis. Et si abscinditur de appetitu aliquid, admoue ipsum cum eis, quæ sciisti, & proprie cum eis, quæ fiunt ex cydonijs. Et cum expeditus fueris: non est malum, ut administres ei electuarium forte de illis, quæ digerunt, & confortant stomachum, & aperiunt oppilationes: & illud post ablationem febris, & accidentium. Et iterum quidem ad phlebotomiam est, ut non fiat in ea, donec declinet: tunc enim fiat: & illud quod prius datur in potu, est aqua hordei. Et cibus sit sicut ille, qui sit de agresta cum cucurbita, & amygdalis paucis. Et infrigidetur locus eius, & odoramentum eius, & trochisci de camphora in quibus non ponitur reubarbarum.

De febre ephimera ex apostemate. Cap. XXXVI.

Febres sequentes apostemata interiora sunt putridæ. Et quandoque associatur eis hæctica: & non sunt de numero febrium ephimerarum. Apostemata uero extrinseca, sicut sunt furunculi, & exituræ, vel bubones, quæ eueniunt in ea, & proprie apostemata magna, quæ fiunt in membris glandulosis, & in carnibus, quæ vocantur molles, sicut illa, quæ fiunt in inguinibus à superfluitatibus hepatis, & in axillis à superfluitatibus cordis, & sub aure à superfluitatibus cerebri, quandoque sequuntur febres, & non euacuantur quin aut sit illud, quod peruenit ex eis ad cor donec igneat ipsum calefactio sola, aut cum putredine: quod si fuerit calefactio sola: tunc erit de genere febrium ephimerarum. Et si fuerit calefactio cum putredine, tunc erit de genere febrium apostematum intrinsecorum. Et plurimum, quod accidit de istis febribus sequentibus apostemata sequentia causas primarias ex ulceribus, & scabie, & doloribus, & percussioneibus, & calibus, ad quæ expelluntur materia, & retinentur in uis. apud carnes molles, est de genere febris ephimeræ. Et plurimum, quod accidit de istis febribus sequentibus apostemata, quorum causa sunt antecedentes, sicut repletiones, & oppilationes præteritæ sunt putridæ, & secundum plurimum febres sunt radices, & apostemata sunt sequentia, licet quæ

dōq; accidat è contrariō. Et Hippo. nominauit has febres, malignas, quæ ex eis sunt ephimeræ, & quæ non sunt ephimeræ. Et febres quidem sequentes ea secundum plurimum sunt ephimeræ, & si non sunt ephimeræ sunt malæ. Et plurimum quidem harum sequuntur apostemata sanguinea: & quandoq; accidunt sequentes erysipilam, & similia ei. Signa earum sunt ea, quæ diximus de antecessione apostematum ante eas. Et facies est inflata & rubea, augmentata in his duobus super dispositionem sanitatis. Et non est caliditas vehementer mordicans, quamuis sit multitudo eius in eis: quoniam huiusmodi apostemata sunt sanguinea, nisi sint febres sequentes erysipilam: & tunc istis febribus succedit humectatio uel toritas resudans à corpore, & est pulsus in eis uelox, magnus, frequens propter repletionem & caliditatem. Et est urina aquosa alba propter cursum materierum ad apostemata, & ulcera. Cura. Oportet ut antecessio fiat in ea cum phlebotomia, & fluxu uentris. Et curetur apostema cum eo, quod oportet in capitulo suo. Et subuietur regimen: & non bibat uinum omnino: & non cibetur, nisi post declinationem completam. Et necessaria sunt extinguentia, & infrigidantia humectantia: & emplastra infrigidata cum niue super membrum infirmum apostemosum, ut aut non noceant apostemati, neq; faciant ipsum crudum: immo infrigidetur uia inter ipsum, & cor, infrigidatione penetrante in profundum.

De febre ephimera ex siccitate uel asperitate.

Cap. XXXVII.

Hæc febris iterum sequitur priuationem resolutionis propter oppilationes non profundas. Et plures quidem hominum cum dimittunt consuetudines suas balneandi, febriunt. Et plures eorum sunt illi, in quorum corporibus generatur vapor cholericus, propter complexiunem corporum eorum, & ciborum ipsorum, & aquarum ipsarum, malarum, & propter dispositiones eorum accidentes ex nigilijs, & laboribus. Curatio eius est extinctio, & administratio balnei, & sudare in eo post declinationem. Et fricari cum eis, quæ sunt sicut fursus, & farina fabarum, & amygdalarum amatarum, & semen melonis, & aliquid de alafnan, & baurac. Et sit cibus eius extinguens, & humectans: & uinum eius sit plurimum commissionis. Et iterum balneum mustoticis.

Febris ephimera ex calore. Cap. XXXVIII.

Quandoq; accidit ex calore aeris, & calore balnei, & similium, febris ephimera, & plurimum illius non accidit, nisi ex uoluntate caloris Solis. Et est prima suspensio eius

eius cum spiritu animali: cum primum, quod eo læditur, sit caput: calefacit enim aer eius, & pervenit ad cor, & fit febris: deinde spargitur in totum corpus. Et quandoq; fit eius suspensio cum corde propter caliditatem anhelitus: & quando custoditur caput à calore. Sed illa, quæ ex Sole accidit, plurimum imprimit in cerebro & capite: & propter illud, qui non est mundus, impletur caput eius. Et illa, quæ non fit ex Sole, sed fit ex diebus canicularibus, & ex balneatione, & ex alijs, impressionem facit in cor. Signa sunt causa eveniens ex uehementia inflammationis capitis in parte solari cerebri. Et fortasse est cum grauitate, & repletionem, si non fuerit corpus mundum. Et magnitudo anhelitus in parte cordiali. Et illud, quod apparet de corpore uehementis calefactionis calidius interiore eius. Et de illis quibus scitur, illud est quod sitis eius est minor sitis illius, cuius caliditas, est illa caliditas, & est in hac habitudine contraria uel diuersa ei, quæ est ex densitate. Curatio: Est necessarium ut incipiat in curatione eius cum eo, quod infrigidat ex embrocis super caput, & pectus: & ex oleis frigidis, & proprie oleo ros. infrigidato super niuem, quod fundatur super caput, & pectus: ex loco longinquo. Et detur in potu aqua frigida & que currunt cursu eius: & sine cessatione eius fiat illud usque quo declinet febris. Cumq; auferatur ingrediatur tinam & non curetur de catarrho, si fuerit cum eo, & balneatur cum aqua tepida: & non permittas aerem eius calefacere ipsum: & non timeas ex effusione aquæ calidæ super caput eius: quoniam ipsa humectat, & resoluit febre: & necessitas ad balneandū plus est, quàm necessitas ad fricationem. Cum ergo egreditur: inunge uehementer caput eius cum oleis frigidis, sicut est oleum rosaceum, & de nenuphare.

De febre ephimera, quæ accidit ex soliditate uel condensatione cutis causata à frigore.

Cap. XXXIX.

Quandoq; accidit ex frigore, & balneatione cum aquis frigidis, ut condensentur pori extrinseci: & coarctentur uapores fumosi, secundum quod dictum est in illa, quæ fit ex siccitate uel asperitate cutis: quare accidit febris, & multoties perducit ad putridam. Et non perducit ad illam febrem, nisi quando vapor præfocatus est acutus, non suauis. suauis enim non generat eam. Signa eius sunt causa: & corpus in ea in primis cum tangitur, non est uehementis caliditatis. Cumq; signatur manus, sentitur calor eleuari. Et pulsus non est in paruitate, in qua est in illa, quæ fit ex angustia, tristitia, & fame, quoniam non est illic resolutio: sed est uelox propter necessitatem attractendi aeris: nisi sit frigus uehementis & fortasse declinat ad duritiem

Et oculus non est profundus, immo quandoq; est inflatus propter vaporem coarctatum. Et urina quandoq; est alba, quoniam caliditas est præfocata: & quandoq; est tincta, quoniam caliditas, quæ resoluebatur ex poris expellitur ad uisuriam. Curatio: Cooperiantur in febre, donec sudent: cum ergo declinant, ingrediantur balneum, & balneentur cum aqua ad caliditatem declinui, & cum aere calido: & embrocantur super ipsos aque in quibus decocta sunt, sicut amaracum, & anethum, & sisymbrium. Et fricetur cum eis, quæ diximus, quæ abstergunt poros, & mollificant eos: Et postponatur in eis inunctio usque quo sudent, & fricentur, & balneentur cum aqua calida ualde. Et oportet ut antecedit balneatio cum aqua, balneatione cum aere: deinde inungatur cum aliquo ex oleis dilatantibus poros. Et fundatur super capita eorum sicut oleum de anetho, & Keiri, & de chamæmilla. Et cibentur cibis leuibus, & aromatizetur. Et sumant in potu uinum album, subtile, comistum: & est melius eis, quàm aqua propter id, quod est in eo de sudatione, & prouocatione. Et inunctio cum oleo aliquo patientibus ex labore, est magis iuuatiua, quàm patientibus ex soliditate.

De febre ephimera ex soliditate uel condensatione cutis causata ex aquis stypticis.

Cap. XL.

Quandoq; accidit illis, qui balneantur in aquis stypticis facientibus sicut super quam uincit uirum aluminis, aut draganthi, ut uehementis fiat spissitudo pororum extrinsecorum, quare coarctantur eorum uapores: & accidit eis, quod diximus aliquoties: & multoties quidem perducit ad putredinem.

De signis. Cap. XL.

Significant eam causa, & quod significatur de asperitate cutis, quasi ipsa exiccata sit præparata præparatione, qua præparantur coria: & sicut si tangatur cutis, infusa in aqua draganthi: & est dispositio in additione caliditatis post tempus ex tactu manus sicut in alijs de illis, quæ accidunt ex oppilatione pororum. Et pulsus est debiliior, & minor, & uehementioris uelocitatis. Et urina est uehementius alba, & tenuis, sicut urina mulieris: & non est in corporibus eorum detumitio uel extenuatio, neq; in oculis eorum profundatio. Cura. Oportet, ut curetur cum propinquitate curationis eorum, qui sunt ante eos: ueruntamen eis non datur in potu uinum, nisi post fiduciam uehementiæ amplitudinis pororum, nisi sit condensatio parua: fortasse enim tunc aperit eam uinum. Et oportet ut subtiliatio regiminis ipsorum sit maior: &

mora eorum in aere balnei, & balneatione eorum cum aqua calida maior. Et oportet ut tardetur inunctio eorum plus.

De febre ephimera ex vino. Cap. 42.

QVandoque accidit ex uino febris ephimera, & cura eorum est cura ebrietatis. Et fortasse indigent solutione cum aqua frutuum, & similibus, & phlebotomia, & uomitu, & proprie quādo perseverat dolor capitis eorum. Et oportet ut ingrediatur balneū post declinationē.

De febre ephimera ex cibis calidis. Cap. 43.

Cibi calidi faciunt febrē ephimeram: & sicut illa, quę est ex Sole secundū plurimū, est cerebialis, & in spiritu animali: & illa, quę fit ex balneo est cordialis, & in spiritu uitali similiter illa, quę fit ex cibo ē hepatica, & in spiritu naturali.

De cura. Cap. 44.

Eius curatio est prouocatio cum infrigidantibus notis: & solutio naturę est melior cū siracost, & tamarindis. Et rectificare hepār cum eis, quę sunt aqua endiuia, & oleum, & syrupus acetosus: & emplastra infrigidantia ex sandalis, & camphora, & aqua ros. & oleo, & succo eius, & ex succis olerum infrigidatis actu. Et extinctio cum eibis frigidis, & humidis.

Principium sermonis de febribus putridis & complementum sermonis est in febribus sanguineis, & cholericis.

TRACTATUS II.

Sermo vniuersalis de febribus putridis. Cap. 1.



PUTREDO accidit aut propter cibum malū, cum est pręparatus ut putrescat illud, quod generatur ab eo propter malitiam suę substantię. Aut propterea, quod uelociter recipit corruptionē, quāuis sit bonę substantię, sicut lac. Aut quoniam est aquosus, nutrimenti mali, remouens sanguinem a substantia sua uel grossitie sua sicut illud, quod generatur a fructibus humidis ualde. Aut quā est ex illis, quę non conuertuntur ad sanguinē bonum: imō remanet humor malus frigidus, quē abhorret calor innatus, & putrefacit ipsum extraneus sicut ille, qui gnatur a cucumere, & citrulo, & piris, & similibus. Aut pp malitiā artificij eius, aut horę ipsius. Aut ordinis eius scđm quod scis. Aut pp oppilationē prohibere respirationē, & euationē, pp cōplexionē corporis malā cū nō pōt digestionem facere bonā. Et sunt iterum uirtutes de illis, quę nō faciunt in cibo aut humore aliquid, quare dimittunt eū crudū. Et hmoi quidem complexio aut generat humorem malū, aut corrumpit id quod generat pp abbreviationem suam in digestionē, & quia mouet eum motu pigro. Et istę causę sunt iuuantes in gnatione oppilationis generantis putredinē. Aut propter dispositiones extrinsecas ex aeribus malis, sicut est aer pestilentia, & aer lacunarum, & locorum infusorum in quib. madefiunt res ut linū & asphaltum. Et quāq; aggregatur de eis numerus rerū plurimus. Et plurimum causarum putredinis humorum est oppilatio. Et oppilatio quidem aut est propter multitudinem humoris, aut grossitudinem suam, aut uiscositatem sui. Et causę multitudinis humorū, & uiscositatis, & grossitie humorum sunt notę. Et generatio oppilationis est nota. Ergo quā fecerint oppilationē, accidit putredo propter euationis priuationem, & proprie cum fuerint succedentes ei motus in non sua hora super repletionē, & nauseatiuam satietatem. Et balneationes similiter aut statio sub Sole aut sumere calefacientia super repletionem: & dimissio cautelę obseruationis digestionis in stomacho, & hepate, & succurrendi defectui si acciderit cum calefactione ipsorum amborum cum linimentis seu epithematibus, & fomentationibus, & uaporationibus. Et putredo quidem quāq; est cōis corpori toti: & quāq; est in membro propter debilitatem suam: aut propter uehementiam caliditatis suę extraneę, & suę acuitatis, aut doloris eius. Et humor recipiens putredinem, aut est cholera cuius natura est ut illud quod ab ea uaporat sit uapor fumosus subtilis acutus aut sanguinis cuius natura est ut euaporet ab eo uapor subtilis: Aut phlegma cuius natura est ut illud quod euaporat ab eo, sit uapor spissus. Aut melancholia cuius natura est ut illud quod euaporat ab ea, sit uapor fumosus, spissus, puluerulentus. Et putredo quidem cholera facit tertianam, & quę currunt cursu eius. Et putredo sanguinis facit cōclusam. Et putredo phlegmatis secundū plurimum, facit quotidianā: & quę currunt cursu eius. Et putredo melancholice facit quartanam: & quę currunt cursu eius. Et sanguis locus est intra uenas, quare putredo eius est intra uenas. Cholera autem & phlegma, & melancholia quāq; putrescunt intra uenas: & quāq; extra uenas: & quā putrescunt extra uenas, si non est causa alia, neq; est putredo in apostemate intrinseco, quod det cordi putredinem cōtinuam, faciunt periodos quas diximus unicuique humori accidere & eradicari quāuis phlegmatica non eradicetur, quin ibi sint reliquię oculę. Et quā putrescunt intra uenas faciunt adhuc etiā febris: & non eradicatur neq; est proxima ei, quę eradicatur: immo est assidua inseparabilis: sed ei est uehementia per quam cognoscitur paroxysmus, qui est ei. Et quā putredo est intrinseca cōis super uenas oēs aut super plurimum earum, quę uicinantur cordi, tūc non sunt forsitan additiones, & diminutiones apparen-

tes. Cum autē est secundum contrariū eius apparent alterationes manifestę. Et febris putredinis quidē extrinsece non eradicatur, & reddit nisi qm̄ materiei, quę putrescit superuenit putredo in tpe paroxysmi: & finiuntur eius humiditates ex quib. pendebat caliditas, & resoluuntur & egrediuntur ex corpore: qm̄ non sunt retentę in uenis, ita ut prohibeat eas illud à cōplemento resolutionis: & remanet cinereitas eius, & ipsius terreitas, quę nō sunt uehiculum febris, & caliditatis: sicut uidetur de dispositione cumulorum stercoreum paulatim paulatim putrescentiū donec fiat cinis totū: deinde non remanet caliditas. Et qm̄ non remanet in humore adusto per putredinem caliditas, destruitur febris, quousq; aggregetur uice alia ad locum putredinis. Et iam remanserunt in ea reliquę caliditatis ex putredine prima, quamuis non remaneat materia: aut propter inuentionem causę primę putredinis in materia prima, & inflāmur in materia secūda secundum semitā putrefactionis. Res ergo putredinis periodice procedit secundum inuentionem caliditatis deficientis, putrefacientis & resoluentis, & facientis cinerem, & perueniētis ad uicinū aliud, donec abscindat terminū, & finiat materiam, & non inueniat uicinum aliud & remaneant reliquę febris expectantes materiam aliam, quę effundatur ad locum eius. Cum aut putredo est intra uenas: tunc accidit ut sit resolutio cōpleta difficilis: & q̄ procedat putredo propter continuitatē cuiusdam rei, quę est in uenis cum quadā alia, & putrescit oīs res, quę uicina est ei: deinde procedit ad uicinum aliud. Et iterum illud, quod comprehensum est in uenis, est uehementioris perueniētiōis ad cor. Et istę quidem febres quibus sunt paroxysmi eradicationis, & teporis, qnq; dimittunt ordinē suū propter diuersitatem materierum in multitudine, & paucitate, & grossitudine, & tenuitate: & propter diuersitatem in eis in genere, qm̄ permutantur quędam materię, & sunt de genere materiei alterius, quę diuersificatur ab eis in specie, non in multitudine & paucitate, & tenuitate, & grossitie tantum. Et qnq; fit ex malitia regiminis egri: aut propter debilitatem eius: aut propter multitudinē sensus eius. Et paroxysmi quidē qui eradicantur, incipiunt secundum plurimū cum horripilatione, aut frigore, aut rigore, & resoluuntur per sudorem. Et nō incipiunt cum frigore aut horripilatione secundum plurimum, nisi aut propter frigus humoris, aut acuitatem eius: quare humor mordicat lacertas: aut propter profundationem caliditatis ad inferiora euntis uersus materiam: aut propter debilitatem uirtutis: aut propter frigus aeris, sicut contingit tempore hyemis. Et illud quod fit ex mordicatione caliditatis, est dignius ut proportionetur ad horripilationē, quā ad frigus. Et plurimum, quod accidit de eo, est ut sit sicut punctio acum in omni membro. Verum resolutio materiei cū sudore est, qm̄ caliditas pu-

trificans resoluūt humiditatem, & remanet cinereitas: cum ergo sit illa humiditas non obfessa in uenis, facilis fit expulsio eius per sudorē in poris. Paroxysmi autē febris inseparabilis, quę tepescit, & non eradicatur, nō incipiunt cum frigore, nisi propter debilitatem uirtutis: aut propter profundationē caloris innati, quare infrigidantur extremitates: & illud est signū malum. Et in quibus febribus componuntur frigus, & horripilatio, qm̄ materia, quę putrescit, est composita ex frigido, & mordicatio. Et qnq; componuntur quędam febres putredinis tali compositione, qua fiant in forma inseparabiles: & illud est uerbi gratia, quādo incipit humor putrescere in loco, & cū superueniēt ei putredo, incipit humor de genere eius, aut non de genere eius putrescere: tunc obuiat paroxysmus secundus tpi eradicationis paroxysmi primi, deinde cōtinuatur res ita. Et quādoq; cōponuntur febres putredinis modis alijs compositionis, quos distinguā in capitulis suis. Et paroxysmi quidem febrū prolongantur quādoq;, & quādoq; abbreviatur: & prolōgatio eorum est aut propter grossitudinē materię aut uiscositatē eius, aut multitudinē eius: aut ipsius quietem: aut propter debilitatem uirtutis, aut propter debilitatē sensus: aut propter spissitudinem pororum: quare non resoluuntur humor & eorum abbreviatio est propter contraria eorū. Et paroxysmi iterum festinant, & tardantur: & tarditas eorum est, aut propterea, quia eorum materia est pauca, aut tardi motus ad mineram putredinis propter grossitiem suam, & hoc quidem est sicut materia quartanę. Et uelocitas eorū est, qm̄ ipsa est multa, sicut phlegma, nisi sit uitreum, qm̄ paroxysmi eius quādoq; tardantur: aut subtilis sicut cholera. Et deteriores quidem febres sunt inseparabiles in quibus putredo est intra uenas. Deinde illę, quę eradicantur, in quibus est putredo in toto corpore, aut in partibus cordis. Ex parum quidem accidit senibus febris ualde accensa propter frigus complexionis eorū, & paucitatem carnis ipsorum. Pulsus uero dispositiones diuersificantur in febribus putredinis, secundum diuersitatem earum in generibus suis, & secundum diuersitatem speciei unius earum in uehementia, & debilitate: & in fortitudine accidentium, & debilitate eorum. Et quādoq; accidit ei durities, aut propter apostemā calidum uehementis extensionis: aut propter apostemā calidū in mēbro uenoso aut propter apostemā durū: aut propter uehementiā siccitatis: aut cū dominat frigus in principijs. Et qnq; fit lenis pp̄ materiam lenem phlegmaticam, & sanguineam, & propterea, q̄ apostema est in membro leni, sicut illud, q̄ est in hepate, & peripneumonia, & lethargia: aut propter humoresitatē cū expectatur qm̄ uult ut sedet. Et pulsus quidē in principio paroxysmorū fit debilis coarctatus propter aduentū uirtutis super materiā, & occupationem eius in mundando & euentando

Sermo vniuersalis de signis febrium putredinis. Cap. 2.

Significant febres putredinis aduentus causarum antecedentium eas : & proprie quando non est in eis causa primitiua . Et pulsus , & anhelitus constrictio est uelox , quoniā necessitas est ad mundificandū uehemens ualde . Et est caliditas mordicatiua non suauis , sicut est caliditas ephimeræ febris . Et plurimū quidem febrium putredinis antecedit almeliletu , & almeliletu quidē est dispositio , cui admiscetur caliditas , non perueniens ad hoc ut sit febris : & associatur ei lassitudo , & fractio membrorum , & pigrizia , & alices , & saluus , & commotio somni , & uigilia , & constrictio anhelitus , & tensio uenarum , & hypochondriorū , & dolor capitis , & pulsatio capitis . Cum ergo prolongatur facit cadere in febres putredinis : aut facit accidere debilitatem , & citrinitatem coloris . Et quandoque associantur almeliletu antecedenti febres , multitudo superfluitatis , & mucus , & nausea , & urina plurima , & egestio plurima putrida , & grauitas capitis , & tebegi . Et accidit frequentia in pulsu non à causa extrinseca , ex labore , aut ira , aut alijs . Cum ergo acciderit in eo coarctatio , tunc iam uenit paroxysmus , & coarctatio quidem est submersio pulsus , & paruitas diuersa in qua accidunt pulsationes magnæ , fortes , & non est uelocitas eius fortis . Sed diuersitas in principio , & in augmento est ex proprietatibus significantibus febrem putridam : quamuis non appareat in tertiana plurima apparitione propter lenitatem materiei . Et de signis quidem quod febris sit putrida , est euacuatio periodi primi sudoris , & humectationis . Ephimera enim est e contrario illius dum non permutatur ad putredinem , licet sit in principio febris tertianæ propter lenitatem eius prædictam , & quod augmentum eius est permixtum , non proportionatum , non simile . Et prolixitas augmenti iterum significat , quod ipsa est putrida . Et additio pulsus in magnitudine secundum processionem significat augmentum . Amplius aut est interpollata incipiens eum rigore , aut horripilatione , & dimittens secundum plurimum cum sudore & humoresitate & procedens periodice cum paroxysmis suis . Aut est inseparabilis cum tepore aut sine tepore , non similis ephimeræ , in urina , & pulsu , & complemento mundificationis , & quiete accidentium . Et cum plurimis quidem putridarum sunt accidentia plurima ex siti , & dolore capitis , & nigredine linguæ , & proprie apud statum : & multiplicatur inquietudo ex angustia , & agitatione reuerenti , quam facit pugna materiei & uirtutis : quandoque , & eleuatur materia , & quandoque confurgit uirtus . Et pulsus propter illud quandoque redit ad magnitudinem , & fortitudinem : & quandoque ad paruitatem , & debilitatem , & coarctationem . Durities aut sit quandoque , & non oportet semper

ut sit nisi sit cum febre aperienda durum , in quocunque membro sit : aut aperienda in membro duro quamuis non sit durum : aut iam acciderit potus aquæ frigida : aut aliquid aliud de illis , quæ indurant pulsum de illis , quæ dicuntur in libro pulsuum . Diuersitas autem in principio , & augmento est ex proprietatibus febris putridæ : & est de significationibus eius fortibus , quamuis non appareat in tertiana plurimum , propter leuitatem materiei . Et dum non sit pulsus fortis & non sit uelox uelocitate prædicta , tunc febris adhuc est ephimera : & non permutatur ad putredinem . Et est urina in principio indigesta , aut parum digesta : & fortasse est acuta . Et scias , quod à febris acutis raro sit euasio nisi cum contractione membri . Et quando remanserit febris post quietem apostematis in pleuresi , & similibus , tunc scias , quod de materia remansit aliquid , & quod materia iam declinauit ad locum ubi apparet dolor .

De signis febris continuæ. Cap. 3.

In continua est diuersitas pulsus , quæ est secundum febrem , apparens ualde : & est in plurimo eius non habens ordinem , neque pondus . Et perseverat febris , & non separatur post viginti quatuor horas . Et non associatur ei , quod diximus de dispositionibus interpollatæ scilicet de antecessione rigoris , & alijs . Et de illis , quæ significant eam est eius assiduitas , & uehementia diuersitatis dispositionis eius apud augmentum : minuitur enim quandoque , & augetur vice alia .

De rebus in quibus differunt febres putredinis , & in quibus communicant. Cap. 4.

Febres quæ est propter putredinem cholera , motus est tertianus , siue sit motus principij paroxysmi , aut principij uehementiæ : nisi species eius , quæ dicitur adusta , cuius motus est occultus ualde : & est sicut inseparabilis conclusa . Et tertiana quidem pura est acuta propter subtilitatem materiei : & eius caliditas est magna , mordicatiua propter fortitudinem cholera : sed est salutifera : propterea , quod cholera est leuis supernaturam , & quoniam ipsa facit quietem . Tertiana uero non pura est longioris spatij , quam pura . Et pura quidem raro pertransit septem periodos , nisi ab errore . Continua quandoque consumitur in hebdomada . Et illa , quæ est ex putredine sanguinis , est continua , inseparabilis : & eius calor est plurimus , communis , cum lenitate , non cum mordicatione cholera : & quandoque peruenit ad statum in quatuor diebus . Phlegmatica autem periodicans omni die , est lenis caliditatis per

comparationem ad cholicam : & est longa propter viscositatem materiei, & frigus eius, & multitudinē eius : & est magni timoris, quoniam habet paruum spatium eradicationis & temporis, & quoniam ipsa associatur corruptioni & debilitati in ore stomachi à qua non excusatur : & illud est de illis, quæ attrahunt accidentia mala ex syncope, & pulsu cordis, & casu appetitus. Et quæ de ea est inseparabilis, est res magis similis hectica, si non esset lenitas pulsus : quamvis quandoq; fiat durus etiā. Et quantum est minus pura, est minoris, & brevioris paroxysmi nisi declinet cum paruitate suæ puritatis ad melancholiam. Quartana autem est non acuta propter frigus materiei, longa propter illud : & fortasse extēditur, quæ de ea pura est anno uno : & non pura est brevioris spatij : verum in ea nō est timor, quoniam quietem facit in spatio longo : & quoniam ipsa nō est talis acuitatis, q̃ ipsam sequatur accidentia vehementia. Et quartana quidem, & tertiana assidua, & interpolata consumuntur per vomitum, & solutionem ventris, aut sudorem, aut prouocationem vrinæ. Adustia autem consumitur per huiusmodi, & fluxum sanguinis narium. Et scias, quod principium prolongatur in tertiana, & status in conclusa, & declinatio in incensua, seu adustia, & status & declinatio in quotidiana : quamvis raro inueniatur quartana continua, & quotidiana integra eradicationis. Et febres quādo non curantur, secundum q̃ oportet, & proprie apostemosæ, conuertuntur ad arefactionē : & proprie in febribus acutis, in quibus oportet vt patientes eas, cibentur : & non cibantur propter intentionem ut perueniat natura super materiā : aut oportet vt detur in potu aqua frigida, & nō datur in potu propter intentionem ut non fiat cruda, & non succurritur cum extinctione alia. Quoniam si fuerit intentio quam dicturi sumus in cibaione, & dando in potu aquam frigidam, fortior duarum intentionum prædictarum, præmittatur super eas ambas, & dimittatur observatio illarum duarum.

De significationibus accidentium febrium. Cap. 5.

SCias, quod acceptio significationum febrium est ex regimine antecedente, & quomodo fuit. Et ex dispositionibus & accidentibus præsentibus ex eis, quæ dicemus, & ex regionibus, & temporibus, & ex ætate, & complexione, & ex pulsu, & vrinā, & vomitu, & egestionē, & fluxu sanguinis narium, & ex dispositione febris in rigore, & sudore, & qualitate caliditatis, & ex paroxysmis, & ex dispositione appetitus, & sitis, & ex dispositione anhelitus, & ex coniunctis sicut dolore capitis, & vigilijs, & alienatione, & inquietudine, & alijs. Febribus enim adsunt accidentia ex quibus significantur dispositiones earum : de quibus sunt accidentia significantia magnitudinem earum, & ipsarum paruitatem ; sicut qualitas caliditatis, &

quantitas ipsius. Et de ea est, quæ est mordicativa vehementer a principio quæ incepit, vel inuadit usque ad finem suum. Et de ea est, quæ mordicat in primis, deinde minuitur propter resolutionem materiei, & lenitur. Et de eis sunt, quæ non mordicant. Et de eis sunt quarum caliditas est humida. Et de eis quarum caliditas est sicca. Et sunt accidentia, quæ significant genus earum, sicut accidentia propria cum tertiana, sicut principium paroxysmi cum punctione, & horripilatione, & mordicatione caliditatis in eo. Et accidentia significantia malitiam earum, sicut inquietudo, & alienatio, & vigilie. Et accidentia significantia digestionem, & indigestionem sunt sicut illud, quod dicemus de dispositionibus vrinæ. Et accidentia, quæ significant crism, quæ dicemus. Et accidentia significantia sospitatem aut contrarium eius : & dicemus omnia illa. Et formæ insunt iudicia plurima, sicut ille cuius conuertitur color ad plumbeitatem ex albedine, & viriditate : & significat frigiditatem humorum, & paucitatem caloris innati : aut conuertitur ad tebegi, & inflationem sicut accidit ei cuius febris causa est satietas nauscatitia : & sicut velocitas detumitionis vel extenuationis faciei, & tormentitatis eius, & tenuitas nasi, & significant aut vehementiam caliditatis, aut subtilitatem humoris, aut uelocitatem resolutionis eorum propter amplitudinem pororum. Et motus in seipsis, & exitus eorum a consuetudine, aut casus eorum habent significationes & res aliæ de illis quas dicemus. Et accidentium febrium quedam sunt quorum hora est hora status, sicut alienatio, & commistio mentis, propter inflammationem capitis. Et de illis sunt quorum hora est principium, sicut horripilatio, & frigus, & sicut profunditas somni, quæ consequitur plurimum principiorum febrium, propter debilitatem cerebri, & declinationem caliditatis ad interiora ubi est materia : & multitudinem vaporum eleuatorum propter commotionem incipientem in corpore, usquequo resoluat eos inflammatio : & adiuvat illud frigus cerebri in seipso & frigus humoris, qui nult putrefieri, & calefit. Et res ex quibus scitur dispositio febris, & ex qua specie sit, sunt dispositio febris in acuitate sua, & sua lenitate : & dispositio febris in hoc, quod ipsa accidit à causis primitiuis, aut antecedentibus secundum conditionem prædictam. Et dispositio febris in adhaerentia uel continuitate sua : & eradicatione : & tempore suo : & dispositio febris in inceptione sua cum rigore : & frigore, & horripilatione, aut eius contrario, & in quo tempore fuerit illud, quod ex eo fuit. Et dispositio febris in dimissione sua cum sudore plurimo, aut pauco. Aut dispositio præterita regiminis, & ætas, & forma, & tempus, & ars, & dispositio pulsus, & vrinæ.

*Sermo de rigore, & frigore, & horripilatione,
& fractione. Cap. 6.*

Horripilatio est dispositio in qua inuenit corpus diuersitatem in frigore, & punctione in cute, & lacertis: & antecedit eam pigritia, & fractio, & quasi fractio est species eius. Frigus autem est ut sentiunt in membris suis, & dorsis lacertorum suorum frigus purum. Rigor vero est, ut non possit continere membra sua ex commotione, & tremore eueniente in eis, & motibus inuoluntariis: & fortasse est frigus forte, & non fit rigor fortis, sicut in febribus phlegmaticis, & quartana. Et de causis uehementiæ rigoris est uehementia virtutis expulsiuæ in lacertis: & propter illud quanto est causa rigoris mordacior, est rigor uehementior: & sang. submergitur cum rigore ad interiora. Et scias, quod humor frigidus est quietus, quem iam consuevit membrum in quo est: & quiescit passio eius ab eo, quare non sentit frigus eius. Cum ergo mouetur, & spargitur sparsione plurima, aut pauca propter aliquam causam. s. propter caliditatem separantem, aut aliud, patitur ab eo membrum, quod erat non occurrens ei: & sentit frigus eius propter causam complexio nis diuersæ: & tu quidem sciisti hoc in radicibus vniuersalibus scientiæ medicinæ. Et multoties quidem accidit à phlegmate vitreo sparso in corpore rigor, non perducens ad febrem. Et quandoque sunt ei periodi: & non est fortitudo eius fortitudo rigoris perducens ad febrem. Et materia, quæ facit lassitudinem per paucitatem suam, facit rigorem per suam multitudinem antequam putrescat: nam si non putrescit, non perducit ad febrem. Et quandoque accidit frigus, & rigor propter submersionem caloris in corpore causa cibi, & quæ sunt ei similia. Et rigor, & frigus antecedunt febres, quoniam humor crudus effunditur ad lacertos in primis, & nocet frigore suo per comparisonem ad lacertos: deinde cum incipit putrescere, incipit calefieri. Et quandoque antecedit rigor febres propter mordicationem humoris, & fortitudinem virtutis expulsiuæ, quæ est in lacertis, sicut excutitur homo ex effusione aquæ calidæ ualde super cutem, & proprie cum est falsa. Et fortasse sit nocumentum eius, quod mordicat causa ut refugiat calor innatus ad interiora, & dominetur frigus: quare fit cum mordicatione caloris frigus, quasi frigus ambiens extrinsece, & mordicatio calidi fit apud panniculos interiores. Et quandoque accidit rigor: propterea, quia refugit calor ad interiora, sicut fit in apostematibus intrinsecis. Et quandoque significat rigor, & horripilatio sanitatem in febribus inseparabilibus, quoniam significat quod materia expellitur ex uenis, & egreditur. Verum quando non est cum digestionem, & in hora cretica, & non sequitur eam leuitas, est significatio, quæ expulsiō illius quæ uirtus non est: quoniam uirtus est vincens: immo quoniam materia multa expellitur propter multitudinem

suā. Et de rigore est, qui significat mortem sicut ille, qui sequitur debilitatem virtutis & casum caloris in nati & siccitatem. Horripilatio uero fit ex causis paucioribus causis rigoris. Et commotio animæ, & periodi indicat periodum. Et senum quidem febres sunt sepultæ: Et quandoque est causa in longitudine febris grossitudo in uisceribus, quare resupinetur febriens, & extendat pedes suos, & tangatur viscera sua. Et quando denigratur lingua febriētis cum alleviatione febris, tunc febris eius est sepulta. Et quandoque associatur febri paralytis, ergo curetur febris in primis. Et de eis quæ conueniunt illis, est syrupus acetosus permixtus cum gele niabin, & aqua cicris cum oleo, si tolerat febris. Et ratio capitis ex eis, quæ inspissant cutem eius, quare reuertuntur vapores, & fit fortis febris.

*De intentione ad curationes vniuersales febrium
putredinis. Cap. 7.*

Scias quod intentio in medicando has febres quandoque vertitur ad partem febris, quare est necessarium ut infrigidetur, & humectent. & quandoque ad partem materiei, ubi necesse est ut digeratur, aut necesse est ut euacuetur. Et digestio quidem in grossa est æquatio eius cum subtiliatione. In subtili est æquatio eius cum ingrossatione. Et quandoque contraria sunt illa, quæ requirit febris de infrigidatione, & illud quod requirit humor de digestionem, & euacuationem, & resolutionem. Quandoque non est digestiū, & euacuatū calidū: immo est secundum plurimum ita, & tunc oportet ut obseruetur magis timorosa de una duarum rerum. Et fortasse contrarium est illud, quod conuenit febri de infrigidatione cum eis, quæ sunt sicut batech indi, & reliqua olera, ei quod conuenit materiei de minoratione, quare prohibet illud dare ea in potu, nisi ubi non est materia. Et omnino sollicitudo sit ut postponatur aqua alfuache. i. fructuum recentium usque ad hebdomadam: & sit contentus aqua hordei. Et omnes fructus nocent febricitantibus cum ebullitione sua, & corruptione sua in stomacho. Et multoties quidem inuenitur res, quæ digerit, & subtiliat, & infrigidat cum euacuatione sicut syrupus acerosus. Et scias, quod febris quandoque est tantæ uehementiæ, & acuitatis, quod non licet uti regimine causæ, immo indiget infrigidatione ultima: & proprie cum non inuenis uirtutem fortem, resistentem, tolerantem. Quod si inuenis eam resistentem, tolerantem, abscinde causam, & rege humorem, & abscinde cibum: & non infrigidas infrigidatione, quæ prohibeat resolutionem. Quod si inuenis uirtutem deficientem, sis occupatus in æquatione complexio nem contrariam ei, quare infrigida eam, & uiuifica uirtutem cum cibo. Cumque uirtus fortificata fuerit per uiuificationem suam, & vincit contrarium suum, redi ad causam. Et cum tu infrigidas de istis febribus, tunc non infrigidas cum eo in quo sunt stypticitas, & inspissatio sicut sunt trochisci infrigidantes, nisi post digestionem, & euacuationem.

tionem. Et scias, quod cura febris putrida est di-
 uersa à curatione febris hectica. Curatio. n. hecti-
 ca est contenta super contrarietatem ægritudinis :
 & curatio febris putrida non est contenta super
 contrarietatem ægritudinis tantum, immo super
 ipsam & super abscessionem causæ eius: quamuis
 ipsa non sit similis vel conformis ægritudini. Et ci-
 batio quid est amica virtuti ex parte viuificatio-
 nis eius, & inimica virtuti ex parte q. ipsa est ami-
 ca inimico eius, & est materia: quare est adiuuans
 vitanq; earum, quamobrem indiges in regimine
 eius canones: & nos singulare capitulum ei, si Deus
 voluerit, faciemus. Et scias, quod non est tibi pos-
 sibile curare febrē, nisi cognoueris eam. Quod si
 ignoraueris, tunc subtilia regimen: & prouide ne
 occurrat paroxysmo, nisi ventrem habeat vacuū.
 Et non moueas in die paroxysmi aliquid quantū
 possibile est tibi, neq; cures febrē. Et oportet ut
 obserues in omnibus illis dispositionem virtutis.
 Quod si fuerit fortis, & fuerit illud, quod vincit
 sanguis, aut cum humore, qui vincit, sanguis, tunc
 phlebotomia est magis conueniens, & proprie cū
 vrina est rubea, grossa, non citrina ignea, ex qua ti-
 meatur apud phlebotomiam victoria cholera, &
 acuitas eius. Deinde fac sequi phlebotomiam so-
 lutionem vtrius subtilē, proprie si fuerit illic sic-
 citas, cum eis quæ sunt sicut aqua hordei, & alira
 cost parum, & aqua hordei & syrupus acetosus.
 Et si natura non fuerit lenis adde in eo, quod est si-
 cuc siracost, quod sit sicut syrupus viol. Et si finis
 intentus lenificatio, non fluxus ventris, & non so-
 lutio laboriosa. Et magis dilectum est apud me ad-
 ministratio clysteriorum secundum quantitatem
 vel mensuram qua indiget in virtute. Et de cly-
 steribus communis iuuamenti lenibus est clyste-
 re factum ex oleo viol. & succo foliorum sicla, &
 vitello oui, & zuccaro ru. & baurac. Cum ergo le-
 niteris hac lenificatione fortasse in statu indigebis
 eo debiliore quam illud quo indigisti in princi-
 pio. Et illud est quando natura est obediēs. Dein-
 de fac ipsum sequi ea, quæ vrinā prouocent: sicut
 syrupus acetosus decoctus cum radice apij, & si-
 milibus. Deinde fac ipsum sudare, & aperi poro-
 sitates eius cum illis in quibus non sit calor for-
 tis, sicut cum inunctione ex oleo chamæmeli-
 no, & fricatione cum vino albo, & cum aqua dul-
 ci tepida. Et si febris fuerit acuta valde non con-
 ceditur aliquid ex vnctionibus & embrocationi-
 bus. Quod si inuenis humorem in primis declina-
 re ad stomachum, fac vomere cum eis in quibus
 non sit diuersitas consuetudini: immo cum eis,
 quæ sunt sicut syrupus acetosus cum aqua calida,
 cum natura mouet humorem ad vomitum: & non
 diuersifices eam, si fuerit declinatio ad intestina,
 & senferit infirmus rugitum, & descensum facis,
 tunc adhibe, quod soluat ventrem. Et prohibe eū
 à somno in principijs febrium: proprie quādo est
 horripilatio, aut frigus, & rigor, quoniam proion-

gatur super eū frigus, & rigor: ipse nanq; adiungit
 materias, si fuerint commotæ ad quædam visce-
 ra, & prohibet digestionem humorum: apud de-
 clinationem vero est inuatiuus valde: & fortasse
 non nocet apud statum. Et non prohibeas ei aquā
 frigidā, nisi fuerit humor, qui est in eo, crudus,
 & grossus: tunc. n. prohibet digestionem. Et scias,
 q. quando phlebotomia iuuat, deinde vteris via
 mala, vel regimine malo & non est corpus mun-
 dicatum, indicat recidiuam. Humoris autē cho-
 lerici digestio est, vt cōuersus à sua subtilitate fiat
 spissus: & aqua quidem frigida facit illud, nisi sit
 stomachus, aut hepar debile, aut frigidum: aut sit
 in visceribus apostema: aut sit in neruis eius do-
 lor: aut sit complexio eius pauci sanguinis: aut ca-
 liditas eius innata debilis, quare debilitatur post
 potum aquæ frigidæ. Aut sit non consuetus pota-
 re aquam frigidā: sicut illi, qui sunt de regione
 calida: isti. n. spasmanur velociter, & associatur
 eis singultus: & extenuatus est de hac summa.
 Vbi autem materia calida, aut grossa iam digesta
 est, & corpus est carnosum, & caliditas innata ex-
 berans, & virtus est fortis, & viscera sana, & non
 frigida eorum complexio radicalis, & non insue-
 ta aquæ frigidæ, immo assueta aqua frigida valde
 tunc aqua frigida est melior res: multoties. n. ad-
 iuuat ad expellendum materiam cum solutione na-
 turæ, aut per vomitum, aut per vrinam, aut per su-
 dorem, aut per omnia illa: quare sit statim, ut sa-
 nctur. Et quādoque dat in potu medicus de aqua
 frigida infirmo quantitatem plurimam adeo, do-
 nec color eius fiat viridis, & tremat, quæ sit saltem
 perueniens usque ad heminam unam, & dimidia.
 Et fortasse conuerteritur febris ad phlegmaticam:
 & fortasse confortatur natura, & expellit mater-
 iam cum sudore, & vrina, & fluxu venteris, & est
 sanitas. Et quandoque iterum sunt quædam pro-
 hibentia, deinde timetur malitia caliditatis, & si-
 tis, & existimas, q. peruenitur per eam ad aridita-
 tem, vel extenuationem, non prohibeas aquā fri-
 gidā, nā additio apostematis & cruditatis eius
 fortasse melior est, quam extenuatio. Et syrupus
 quidem acetosus quandoque etiam sedat sitim,
 & incidit, & soluit: & nocumentum ipsius aposte-
 mati non est plurimum, sicut nocumentum aquæ:
 & non est ei vis aggregandi materiam, & in pus-
 sandi eam. Et similiter iuleb plurimā comestio-
 nis. Et cum non licet bibere aquam frigidā, &
 sit audax super eam, timetur q. faciat accidere con-
 strictionem pororum: quare sit causa febris alter-
 rius propter aduentum oppilationis alterius: &
 fortasse erit uehementior prima. Et quando ob-
 uiat membro debili, corrumpit operationē eius:
 & multoties facit deglutionem difficilem, & facit
 difficultatem anhelitus: & facit accidere tremo-
 rem, & spasmus, & debilitatē vesicæ, aut renis,
 aut colon. Et ille quem plurimum oportet ex eis
 prohibere à potu aquæ frigidæ, est cui nocet in sa-
 nitate

nitate sua: immo cum videris figuram fortem, & musculos grossos & complexionem calidam siccam, & euacuaueris, tunc quandoque concedes infusionem fieri in aqua frigida, & apud declinationem & apparitionem signorum digestionis, & euacuationem humorum, non est malum, vt administretur balneum; & potus vini subtilis commisti, & inunctio cum oleis resoluentibus. Et cum administraueris canones predictos in principio euentus febris, tunc oportet post illud, vt tu occiperis in digestionem, & euacuationem, quæ non est secundum semitam minorationis & desiccationis, & iam diximus eam: immo secundum semitam abscissionis causæ. Et non euacues materiam indigestam in calido, aut frigido nisi propter necessitatem: fortasse enim multiplicatur euacuatio alterius humoris non præparati cum digestionem ut euacuetur. Et fortasse permiscetur cum ea malignum cum bono: propterea, quod mouetur malignum cum bono absq; digestionem sua. Et tu non auscultes virum, qui existimabat, quod intentio in digerendo est subtiliare, & humor calidus est subtilis, quare non est necesse ut subtilietur. Res enim non est sicut dixit, immo intentio in digerendo est æquare substantiam materiei, ita vt fiat præparata ad expulsionem facilem, & subtile imbibitum, & grossum fixum, & viscosum adhærens: totum illud non est præparatum ad expulsionem facilem: immo est necessarium ut inspissetur subtile parumper, & subtilietur spissum parumper, & incidatur viscosum. Et si uir iste non audisset in sermone antiquorum de digestionem alia quid ex genere eius, quod diximus, & considerasset dispositionem digestionis humorum per sputum expulforum, scilicet quia qui de eis subtilis est, indiget ut inspissetur: & qui de eis spissus est, indiget ut subtilietur, necessariū fuisse ut sciisses hoc per illud. Et quare est, quod non considerauit in seipso, & non dixit, quare est, quod vrinæ in febribus acutis non habent in principiis earum sedimen, deinde sunt habentes sedimen, & an sedimen laudabile est aliquid aliud ab humore faciente ægritudinem, qui iam digestus est, & quare non expellitur in principiis ægritudinis, si est subtilitas ultimum, quod intenditur in digestionem: & necessarium esset tunc, quod sit in principio febrium sanguinis & cholerae sedimen laudabile. Si autem natura non est possibile expellere illam superfluitatem, nisi post horam, in qua fit præparatio ad expellendum in urinam, tunc similiter oportet ut sciat, quod arti euacuare humorem ante illam horam in qua apparet digestio in urina, est prohibitum, difficile, laboriosum. Et fortasse mouet, & non operatur vti oportet: & fortasse miscet malignum cum bono. Et esset melius homini huic, ut bene opinaretur de illis, qui fuerunt sicut Gal. & Hippo. in eis, quæ scripserunt de hoc, aut considerasset optimam considerationem, postea rediisset ad contradictionem:

quia contradicens primoribus cum veritate est excusatus. Verum melius esset ei ut bene considerasset prius. Et opinor, quod huic viro acciderunt experimenta, quæ profuerunt in hoc capitulo, & acquieuit in eis. Et huiusmodi quidem experimentis, quæ non sunt secundum canones, accidit eis, ut nec unum valeat, seu iunet, aut accideris ut neq; unum frustretur operationem suam inuatiua, & hoc est conueniens. Cum autem materia est plurima, mobilis, permutabilis de membro ad membrum, & existimas, quod non est spacium in digestionem eius, aut fortasse accidit ex ea apostema, fisen, aut aliud ab eo. Et si dimittatur, faciet cadere in timore ante tempus, in quo cadit digestio eius: & illud est longius, quam tempus in quo cadit, uel expectatur digestio æqualis, proculdubio tunc est necessaria euacuatio eius: timor enim in hoc est minor, quam timor in illa: & cum hoc natura mouetur ad expellendum eam, propter multitudinem sui noementi: cum ergo adiunatur natura, conuenit ei adiutorium ultimum: quare non est excusatio eius. Et scias, quod phlebotomia quando est intentio sanguinis non est ex genere eius, in quo expectatur digestio, expectationem, quæ est in solutiuis: & non expectatur digestio nisi in humoribus alijs. Et cum postponitur phlebotomia à principio ægritudinis, tunc non phlebotomes in statu eius, cum non sit ei intentio, & fortasse interficet propter aduentum debilitatis uirtutis. Et si similiter si times uictoriam humoris, & magis necessaria cautella est euacuatio, & si non est digestus non moueas nisi in principio: apud statum vero non moueas aliquid, donec vincat natura, & digeratur: & si ipsa non mouet, moue tu motu simili, uel conuenienti motui eius, uel ad partem ad quam ipsa mouet: & si ipsa mouet, aut mouit, tunc dimitte eam & operationem eius. Et hoc est illud, quod nominauit Hippo. furiositatem, ubi dixit: oportet ut administretur medicina solutiua postquam digeritur ægritudo. In principio autem ægritudinis non oportet ut administretur illud, nisi ægritudo sit furiosa, & forsitan non est secundum plurimum furiosa. Et talis est ista euacuatio necessaria, quæ non est in hora sua, sicut cibatio necessaria, quæ non est in hora sua. Et proportio istius euacuationis ad prohibendam acuitatem materiei, est sicut proportio illius cibationis ad prohibendum uirtutem à casu suo. Cum ergo exerces euacuationem, tunc considera horam interpolationis, aut horam ipsius teporis, aut frigidioris horam, quæ est in die: & non euacues per fluxum uentris in die periodi. Neque phlebotomes. Et non agas cum euacuationem artis contra partem euacuationis naturæ. Et non moueas humorem cum eo, quod facit statim dispositionem motus periodi. Et omnino caueatur à regimine grosso in hora periodi, ita ut non derur in potu aqua hordei zucarum, neque iuleb, ut non frangat periodum cum con-

frictione meatuum; quoniam est timor; immo adiuua nisi superfluat, quoniam medicus adiutor est naturæ, non impediens eam. Et oportet ut scias, quod multoties indigetur medicina forti debili, sed eius fortitudo est hoc, quod soluit humorem grossum, viscosum: & ipsius quidem debilitas est ex hoc, quod facit ascellare semel aut bis. Et non euacuetur plurimum simul, ita ut non cadat virtus. Et consilium quidem meum in phlebotomia est, ut dimittatur quantum possibile est. Si autem non est possibile, tunc multiplicatio numeri est melior multiplicatione quantitatis: oportet enim ut non euacuetur sanguis multus subito, quoniam euacuatur multum de eo cuius non est necessaria euacuatio. Et non erit in sanguine uel ex sanguine resistentia sen quod resistit euacuationibus quibus fortasse indigetur: & debilitatur virtus à resistendo in crisis expectatis. Et scias, quod quando aggantur dolor capitis, & febris: tunc curatio febris est dignior. Et scias, quod dolor capitis quandoque facit redire febrem declinatam, ad augmentum, quare oportet ut sedetur. Et cum infans lactens febricitat, tunc oportet ut rectificetur lac matris eius. Et quando vrina ictერი in febre fuerit cruda, significat apostema: quare est curatio dare in potu aquam hordei, aut syrupum acetosum. Cum ergo quiescit febris, intentio sit ad apostema. Et quando fuerit cum febre colica, dum non aperitur uia, non exhibeatur in potu aqua hordei, immo ius galli, & lenifica cum clysteri, & multiplicata unctuositate eius: deinde detur in potu aqua hordei, si necesse fuerit. De solutiuis uero est portio facta ex tamarindis, & tereniabin, & siracost. Et quandoque ponitur in ea aqua iuleb, & quandoque ponitur in ea casia fist. Et fortasse projicitur desuper scammonia. Et fortasse datur in potu scammonia sola in iuleb. Et fortasse est necessarium administrare ea quæ sunt sicut aloë, quando materia est grossa. Et melius quidem est ut ablatur, & nutriatur cum aqua endiuia, & aqua solatri deinde fiant ex eo pilulæ. Mirobalanos uero citrinos quidam administrauerunt, & dum inuenitur ab eis via alia: i. administratio aliarum medicinarum, fiat: quoniam ipsi cōstringunt poros, post solutionem ventris, & exasperant viscera: quod si fuerint necessarij, tunc administrentur post digestionem integram. Et aqua duorum granatorum est maximi iuuamenti præcipue expressa cum pulpis amborum in quibusdam horis. Et ex solutiuis est illud, quod fit ex niolis, & scammonia: ita ut de uiol. sit quantitas aure. i. de scammonia usque ad Kirat id est & quandoque ponitur in eis parum mentæ. Et quandoque fit ex infrigidantibus extinguentibus medicina, in qua ponitur scammonia, sicut pilulæ huiusmodi. Recip. coriandri, spodij, rosarum ana drach. 5. camphoræ tofugi. i. scammonia quodecima pars drach. j. & usque ad sextam partem eius: & detur in potu eis. Aliud. Recip. siracost. drach. v. tereniabin etiam drach. v. succi pomorum de seni, succi cydoniorum partes æquales, succi coriandri humidi sextam partis unius, aggrega succos, & submerge in eis siracost, & tereniabin, & inspissetur cum eis, donec existimetur, quod sint inspissata, deinde sume camphoræ pondus sextæ drach. i. & medietatis sextæ, scammonia danich. i. & eleuetur medicina ab igne, & pulveriza desuper camphoram, & scammonia. Et conseruetur ne resoluatur cum vapore, deinde dimittatur donec coaguletur per se cum facilitate: & dos eius sit à drach. ii. usque ad. ii. & 5. Et est possibile ut fiat ex tereniabin, & siracost, & zucca, ro tabarzet natif. i. formæ, quæ sunt sicut penidiz, & ponitur in ea scammonia, & camphora secundum quantitatem, quæ cadat in una portione eius, uidelicet camphoræ usque ad tofugi. i. & scammonia usque ad sextam drach. i. quare fit tunc delectabile animæ non horribile. Et febricitans quidem in ætate febre acuta non ingrediatur domum frigidam ventosam proprie quando sudat, ut non conuertatur materia à resolutione sua. Et trochisci quidem non sunt conuenientes principijs harum febrium, nisi post digestionem, & euacuationem. Et trochisci quidem sunt magis conuenientes ei cuius febris est adhærens in suo stomacho, quasi ipsa sit hectica. Et dimissor consuetudinis in regimine suo, sentit quandoque febre: & non est tantum nocumentum, quoniam causa eius est dimissio consuetudinis in regimine.

cost. drach. v. tereniabin etiam drach. v. succi pomorum de seni, succi cydoniorum partes æquales, succi coriandri humidi sextam partis unius, aggrega succos, & submerge in eis siracost, & tereniabin, & inspissetur cum eis, donec existimetur, quod sint inspissata, deinde sume camphoræ pondus sextæ drach. i. & medietatis sextæ, scammonia danich. i. & eleuetur medicina ab igne, & pulveriza desuper camphoram, & scammonia. Et conseruetur ne resoluatur cum vapore, deinde dimittatur donec coaguletur per se cum facilitate: & dos eius sit à drach. ii. usque ad. ii. & 5. Et est possibile ut fiat ex tereniabin, & siracost, & zucca, ro tabarzet natif. i. formæ, quæ sunt sicut penidiz, & ponitur in ea scammonia, & camphora secundum quantitatem, quæ cadat in una portione eius, uidelicet camphoræ usque ad tofugi. i. & scammonia usque ad sextam drach. i. quare fit tunc delectabile animæ non horribile. Et febricitans quidem in ætate febre acuta non ingrediatur domum frigidam ventosam proprie quando sudat, ut non conuertatur materia à resolutione sua. Et trochisci quidem non sunt conuenientes principijs harum febrium, nisi post digestionem, & euacuationem. Et trochisci quidem sunt magis conuenientes ei cuius febris est adhærens in suo stomacho, quasi ipsa sit hectica. Et dimissor consuetudinis in regimine suo, sentit quandoque febre: & non est tantum nocumentum, quoniam causa eius est dimissio consuetudinis in regimine.

De cibatione febricitantium in generali. Cap. 8.

Scias quod conuenientiores cibi febricitantibus sunt cibi humidi: & proprie ei cuius complexio est humida ex infantibus, & grassis: uel ociose uiuentibus: conueniunt enim ex hoc, quod assimilantur complexionem, & ex hoc, quod sunt contrarij ægritudini. Cumque accidit febris, & natura est sicca, non cibis penitus dum non egreditur perfecte fæx. Et oportet ut occurrant eis paroxysmi periodici, & paroxysmi exacerbationum tribus ipsorum uacuis: in quibus non sit cibus omnino: nam si cibati fuerint, in illa hora occupabitur natura in digerendo: & dimittet digerere, & expellere: & confirmabitur ægritudo, & prolongabitur. Et propter illud oportet ut postponant cibationem usque ad declinationem: & in eo quod est post ipsam. Et si accadat forte ut hora declinationis sit hora consuetudinis in cibo, tunc est melius quam esse potest. Et scias, quod de cibatione & regimine est, quod est subtile ualde, & de grossum ualde, & de eo quod est inter illa: & est pars eius declinans ad subtile plus: & pars eius declinat ad spissum plus. Et subtile ultimum in subtilitate, est prohibitio cibi. Et grossum ualde, est administratio ciborum sanorum hominum. Et illud quod sequitur latus subtile & est ex eis, quæ sunt

font media est, ut sit contentus in cibo succo granatorum, & iuleb subtili valde: & post ipsum aqua hordei subtili: & post ipsam aqua hordei grossa: & oleribus frigidis, & humidis sicut atriplices, & spinachia, & bliti, & similia: & postea Kisch hordei sicut est, & est medium. Et illi, qui sequuntur latus grossi, sunt sicut gallina, & extremitates. Et subtiliores eis sunt sicut alchubugi, & pulli, galliculi, & subtiliores eis sunt alae pullorum & alciugi, & oia fortibilia pauca subtilia, & pisces parui. Et subtilius eis est. Kisch hordei sicut est. Et febrilius eo est panis similis solutus in aqua bene frigida solutio ne bona subtili. Grossi autem est cibus fortior. Et Kisch quidem hordei est bonus cibus: ipsum enim aggregat ad glutinationem, & digestionem suam, & lenitatem, & planitiam, & lubricitatem, & absterfionem, & humectationem, & contrarietatem febris, & sedationem sitis, & uelocitatem penetrationis, & ablutionem: & non est in eo stygicitas: qua propter non residet, neque figitur in poris, & meatibus, quamuis sint constricti, & non est in ea adhaerentia cum incedit per meri, & fortasse abstergit illud, quod est sicut phlegma. Et quando bona fit eius decoctio non inflat omnino. Et antiqui quidem vsu sunt ubi necessaria est subtiliatio regiminis subtilioris, quam regimen cum Kisch hordei & aqua eius, aqua mellis plurimae aquae: quoniam nutrimentum eius est paruum: & quod ipsa facit penetrare aquam: & eius humectatio, & absterfio, & eius appetitio, & prouocatio eius est multa, & caliditas eius est contrafracta. Et ipsa proculdubio quandoque addit in uirtute additionem quadam, quamuis sit parua. Et sequitur eam syrupus acetosus de melle, sed est grossior, & nutritibilior: & fortioris incisionis, & absterfionis: & non est in eo de calefactione, & de nocumento viscerum calidorum, quod est in melle, sed in hoc loco mel canne, quod est zucarum & proprie mundificatum, est melius melle apisi: licet eius absterfio sit minor absterfione mellis: & similiter syrupus acetosus de zuccaro: sed contentari in syrupo acetoso quandoque faciet incurtere rasuram intestinorum, & hoc quidem timorofum est in aegritudinibus acutis. Et nos ponemus aquae hordei potationem, & syrupi acetosi, sermonem singularem. Et subtiliationem quidem regiminis aegri significat natura materiei aegritudinis: & applicatio uel permanentia naturae, in digerendo ipsam, & resoluendo, & euacuando eam. Et dignior horarum ad subtiliationem est status: hic enim est uehementia occupationis naturae in pugna materiei. Et non oportet ut ab ea recedens occupetur re alia, & proprie apud crism: ante uero illud, pugna nondum est confirmata. Et de illis, quae significant, & faciunt pertinere ad subtiliationem, est ut si sit necessitas phlebotomiae, aut solutionis ventris, aut cly-

steris, aut sedationis doloris, tunc oportet ut des operam ad expediendam uel complendam illam necessitatem: deinde ciba si necessarius est cibus, nisi sit prohibens aliud: Et ingrossationem quidem regiminis significat uel requirit uirtus. Et dignior horarum ad ingrossandum est hora, in qua uirtus non est ualde occupata in materia: & est principium aegritudinis. Et oportet ut succurratur nocumento illius ingrossationis cum sparsione: quoniam est leuius super uirtutem iterum. Et aetas quidem propter suam resolutionem indiget additione cibationis & separatione eius: nam uirtus non sufficit ad digerendum illud, quod multum est semel. Et quoniam resolutionem in ea est per sparsionem: tunc oportet ut cambium sit per sparsionem. Et an hyeme est res contraria, quoniam propter paruitatem resolutionis eius, non facit indigere cibo multo. Amplius si multum dederit cambium uice una, uirtus erit tolerans ipsum, & fortis in se expediendo ab eo uice una. Et autumnus quidem est tempus malum: & propter hoc oportet & subtilietur in eo inter conseruationem uirtutis, & inter dominium materiae, & partire paulatim in eo est melius: & prorsus partire cum debilitate uirtutis est melius aegro. Et scias, quod si non esset illud, quod pertinet uirtuti, esset magis necessarium, ut subtiliaretur cibus ultima subtiliatione, sed uirtus non suffert illud, & deficit: & cum deficit, non ualet curatio. Curans enim sicut sciuit, est uirtus, non medicus: quoniam medicus est minister faciens peruenire instrumenta ad uirtutem. Et cum intellexeris hoc, tunc oportebit ut consideres, nam si aegritudo fuerit ualde acuta, & illud est ut sit status eius propinquus, & existimaueris quod uirtus non deficiet in hoc tempore, quod est inter principium eius usque ad statum eius, alleuiabis occupationem super uirtutem, & incitabis eam super materiam: & non facias eam occupari in cibo spisso, immo subtilia regimen etiam cum dimissione cibi omnino, & proprie in die crisis. Et si uideris aegritudinem acutam non ualde, immo acutam absolute, tunc oportebit ut subtilies regimen non in ultimo nisi apud statum, in die crisis proprie: nisi propter causam maximam. Et si uideris aegritudinem chronicam, aut propinquam chronicam, non subtilies regimen: uirtus enim non saluabitur usque ad statum cum subtiliatione regiminis. Verum est tibi necessarium cum hoc in omnibus speciebus ut sit principium tui regiminis grossius: & postea tui regiminis proueniens ad statum, subtilius: & gradatim procedas in eo, quod est inter illa, ita ut uirtus sit conseruata usque prope statum: tunc enim intende super materiam, & non sis occupatus in alio. Et quando scis, quod uirtus est fortis, tunc fortasse necessarium facit dispositio ut sis contentus iuleb & similibus: & si non plus, saltem

saltem hebdomada una, & proprie in febribus apostematum. Quod si timueris debilitatem, sis contentus aqua hordei. Et cum ambigua sit tibi dispositio in egritudine, & non cognoscis eam, tunc ut declines ad subtiliationem est melius, quam ut declines ad additionem, te obseruante virtutem, & tolerantiam. Et illius quidem, qui existimauit, quod cibatio, & confortatio in febre acuta est melior, quoniam non est intentio in digestionem, & in potestate tua est euacuatio cum volueris ut faciat id natura, aut non faciat, errorem iam te scire fecit: immo quando times casum virtutis, tunc cibatio est melior. Et de corporibus sunt corpora cholericum, quae requirunt regimen diuersum ab illo, quod diximus: & proprie quando sunt assueta comestioni plurimae: ipsi enim cum non cibantur etiam in ipso principio febris, immo in hora, quae est prauior ea, & est hora status, non vacuae sunt dispositiones eorum a duabus rebus: quoniam cum ipsi sint debilius virtutum, superuenit ei syncopis, & moriuntur in proximo: & si sunt fortius virtutum, cadunt in extenuationem, & apparent super eos signa ariditatis ex subtiliatione nasi, & profundatione oculorum: & quod tempora sunt depressa, & fortasse superuenit eis syncopis ante illud, propter illud, quod effunditur ad stomachos eorum de cholera mordicativa. Et sunt de hominibus quidam, qui sunt exuberantis carnis, sed cum absconditur ab eis cibis, debilitantur, & extenuationem incurrunt: quare non tolerant prohibitionem cibi. Et omnis cuius calor innatus fortis est valde, aut plurimus, aut calor innatus est valde debilis, paucus non potest dimittere cibum. Et de his sunt quibus accidit dolor, & lesio in stomacho, & dolor capitis propter communitatem, & isti sunt de hoc genere. Et istis fortasse sufficit aqua hordei: & fortasse egent ut misceant succum granatorum, & similia illi, ut confortetur os stomachi. Et quandoque est nobis necessarium, ut faciamus eos vomere cum facilitate, ante cibum. Et in plurimis istorum cum debilitantur, aut fortasse superuenit eis syncopis, causa non est uehementia debilitatis: immo effusio cholerae ad os stomachi: cum ergo sumunt in potu syrupum acetosum permixtum cum aqua calida multa, aut vinum permixtum cum aqua multa, euomunt in vomitu humores cholericos, & virtus eorum fit fortis: cumque cibantur aliquo rebus styptico, sedantur. Et senes quidem, & debiles, & infantes sunt de genere eorum, qui non tolerant famem. Primi vero senes sunt uehementis tolerantiae famis: & sequuntur eos iuuenes: & proprie habentes solida membra, amplas uenas in aere frigido. Et multoties quidem errat medicus in huiusmodi agrotis secundum alium modum: quoniam ipse prohibet eis cibum in principio febris, & quando appropinquat status & sciuerit,

quod cadit uirtus, cibatur in illa hora necessario: iam ergo errauerat duobus modis: & si ipse cibaret eos in principio, esset error ille, & ignorantia infra hunc errorem. Et accidit istis agrotis ut accendant eis catarrhi crudi, & cholericis, & uigiliis & inquietudo propter priuationem digestionis: & inquieti fiunt, & modo quiescunt & modo mouentur & coarctant materiae uirtutes eorum, & multiplicantur ipsorum vapores, quare adiungunt id, quod non est, & tremunt, & citantur uel saluunt, & permutantur in lectis, & imaginantur, quod non est, & iedigant labia eorum inferiora propter dolorem oris stomachi, & contristantur animae eorum propter grauitatem materiei.

Canon in dando in potu aquam hordei, & syrupum acetosum. Cap. 9.

Aqua hordei quedam est in qua non est de corpore hordei, nisi quod est sicut uirtus, & forma: & non est ei introitus in curatione, aut fiducia in inuamento: nisi quando est completa decoctionis. Et quae de ea est melior, est ut sit aquae quantitas sacraiani 20. & hordei sacraiani 1. & sit iam reducta prope uel circa ad duas quintas: & assumatur illud, quod de ea rubrum est, & subtile. Hoc enim est subtile, cuius nutrimentum est minus: & cuius humectatio est maior, & ablutio eius, & extractio superfluitatibus ab ea, & digestio facta ab ipsa est multa, & infirigidatio eius est equalis. Et de ea est in qua est aliquid de corpore hordei, & farina eius. Et magis dilectum mihi in huiusmodi est ut non sit plurimum decocta: immo secundum mensuram, quae auferat inflationem, & non perueniat ad hoc, ut faciat ipsam viscosam uehementer. Et huiusmodi quidem est pluris nutrimenti, & minoris ablationis, & digestionis: & accidit ei multoties ut acetet in stomacho frigido in substantia sua: id est in natura sua, & si sit in eo calor extraneus multus ex capitulo malitiae complexionis. Et aqua quidem hordei quandoque est decocta ex hordeo ipso sicut est: & quandoque est excoctum. Et melior quidem syrupus acetosus apud me est ille in quo ponitur zaccarum in uase, deinde funditur super ipsum acetum forte, quod sit de uino, tantae quantitatibus ne eleuetur super dorsum zaccari: immo dimittat ipsum discooperum, deinde ponantur sub uase carbones quieti, non multae caliditatis, aut cinis calidus donec liquefiat zaccarum in aceto sine ebullitione, deinde colligitur spuma, & dimittitur una hora non cum multo calore, donec misceatur zaccarum cum aceto, deinde funditur super ipsum aquae quantitas duorum digitorum, & bullit usque ad spissitudinem. Et aggregare syrupum acetosum, & aquam hordei simul, est illaudabile: quoniam corrumpit aquam hordei secundum plurimum.

Et non oportet ut detur in potu aqua hordei, cum siccitas naturæ adest: immo ante ipsam fiat clystere. Quod si acetet in stomacho, detur in potu, quod de ea est magis subtile. Quod si acetat, coquatur cum ea radix apij, & eius simile. Si uero acetat iterum: tunc necessarium est ut misceatur aliquid piperis cum ea, proprie quando materia non est uehementis subtilitatis, & caliditatis. Et quando multiplicatur eius inflatio: tunc misceatur cum ea ad calefactos parum aceti uini. Verum cum syrupus acetosus in potu datur in mane incidit humores, & præparat ad expulsionem. Et tunc consequenter post duas horas ad aquam alkischi hordei subtilem prædictam, ut abluat, quod incidit, & abstergat id, & extrahat ipsum per sudorem & prouocationem. Et non est nocuum si detur in potu syrupus acetosus apud cœnam, cum iam separatus est cibus à stomacho. Et quandoque est necessarium ut præmittatur in lebe ante aquam hordei, ut addat in humectatione: & illud est, cum uides siccitatem dominantem super corpus, & linguam. Et quandoque est necessarium ut præmittatur ante ipsam ad liniendum naturam aliquid de tamarindis ante illud: pen duas horas.

De curationibus febrium acutarum. Cap. 10.

Quod dictum est de regimine lenificationis, & prouocationis, & sudationis, & digestionis: deinde euacuationis cum medicina post illud: & quod dictum est de cibatione post ipsum: est illud, quod oportet te rememorare hic. At modi extinctionis uehementiæ caliditatis, sunt cum infrigidatione aeris. Et cum infrigidatione cibi. Et cum epithematibus, & emplastris. Et cum medicinis. Et cum retentione eorum, quæ sunt sicut mucilago psyllij, & mucilago granorum cydonij, & succus portulacæ, & succus liquiritiæ in ore, ut sedetur sitis: nam assiduare gutturi patientis ægitudine acutam aliquid ut remaneat guttur humidum & non exiccet, in curis eorum est iuuatuum ualde. Et quandoque iuuantur per administrationem clysteris facti ex succo melonis indi, & cucumeris, & cucurbitæ, & portulacæ cum oleo rosaceo, & cum aliquantulo camphoræ, iuuamento maximo. Et oportet ut sit aer infrigidatus quantum possibile est: & eius infrigidatio est per prohibitionem alzahame: i. multitudinis hominum, & per suspensionem flabellorum multorum: & per positionem niuis plurimæ. Et si domus est proximi temporis ex quo linita fuerit luto libero, & proprie illo in quo ponitur loco paleæ, cœtum papyri: tunc est melius. Et quandoque præparantur in ea manationes ut fontium, & orationes, & currit in ea aqua dulcis. Aut stratus est super fontem seu lacunam coopertam cum reti facto ex chordis uel cum cannis uel uir-

gulis præparatis in modum retis. Et sit stratus super quem dormitur ex tabari inflato, & his similibus: & reliquum stratus sit extremitatibus salicij, & cydoniorum, & myrti aspersi aqua rosacea, & folijs pomorum, & uiolis, & nenufaris, & rosis. Exponuntur quandoque tabach: i. uasa lata magna, in quibus sunt odorifera ex fructibus fructuum boni odoris frigidorum: uel ex fructibus boni odoris frigidis, sicut malorum & cydoniorum & speciebus pirorum boni odoris aspersis aqua rosacea, & nenufare & salicibus, super quæ sunt puluerizata sandali, & rosæ, & camphoræ, & super quæ iam distillatum est parum uini odoriferi, tunc est illud, quod est ultimum. Hoc ergo est regimen aeris. Regimen autem cibi iam sciuitis: & si uoluntas ad est ut cum infrigidatione sit lenificatio, tunc detur aqua cucurbitæ, & aqua melonis indi proprie, & aqua alcheta & alcheted, & lactuca cum aceto, est ultima. Et quod conueniens est ad sedandum siue eorum, est foca factum ex pane similæ eum aqua casei accepta est dog post collationem uehementem. Et si adest uoluntas ut cum infrigidatione sit retentio, tunc detur succus granati muzij & acetosi, & aqua acresta, & aqua mori de semi. & aqua acetositis limonis non falsi: & aqua acetositis citri, & quæ sunt his similia: & aqua cereculi, & est berberis. Epithemata uero, & emplastra sunt ex succis notis: & proprie aqua rosacea, aut succo rosarum recentium cum sandalis, & camphoræ, & aqua coriandri, & endiuie, commistis est plurimæ infrigidationis: & mucilago psyllij cum aceto, & aqua rosacea est huius generis. Et embrocare hepar cum infrigidantibus est res maxima, & magis iuuans: nam cum æquatur est in eo maior pars rectificationis, & fortasse rectificata quam. Et quando illic est catarrhus, & tussis, aut in capite eius est grauitas, aut tēsis, significat multitudinem uaporum, quare oportet ne fundatur super caput aqua, aut acetum: immo occupetur cum inclinatione capitis super uapores aquæ, secundum quod dispositio facit illud necessarium. Si uero non fuerit catarrhus, neque aliquid eorum, quæ diximus, tunc administra de embrocis, & epithematibus, quæ vis. Et nocibilior embroca in huius dispositione repletionis capitis, est multisio lactis super caput: fortasse enim facit accidere apostema in capite, & perditionem. Et magis saluarum horum embrocationis capitis cum repletionem eius, est ut sit uapor cholericus, non humidus: immo in huiusmodi hora fortasse non nocet applicatio lactis: immo confert. Et cognoscitur ex dispositione somni, & uigilijs, & humiditate superiorum partium narium, & earum siccitate: cum ergo uideris somnum, aut profunditatem somni, aut humiditatem superiorum partium narium, tunc caue embrocationem, & inunctionem: & stude in attrahendo materiam ad inferiora, & cum uideris rubedinem in naso, & facie uehementem,

tunc

tunc non erit malum ut facias currere sanguinem ex naribus. Et infrigida hepar cum emplastris: & cum infrigidas, caue ne occurras cum infrigidatione uehementi, hora sudoris, & resolutionis: immo oportet ut consideres illud: fortasse enim sit causa in longatione ægritudinis: licet quandoque sit longitudo ægritudinis saluior, quam ipsius acuitas. Et oportet ut caueas in febribus acutis casum rursus intestinorum: quoniam addit in debilitate uirtutis, & terretur natura à receptione superfluitatum ad intestina, & ab expulsiōe earum ab eis nisi cogant & dominantur superfluitates, & quandoque redeunt superfluitates ad superiora, & lædunt hypochondria, & inflant ea, & lædunt caput. Et quandoque est in syrupo de papatere iuuamentum mirabile in inspissando materiam subtilem: propter digestionem eius, & in faciendū somnum.

Rememoratio accidentium, quæ difficilia sunt in febribus acutis. Cap. 11.

Loquamur itaque in primis de accidentibus, quæ uehementia sunt in febribus, & de curatione eorum: & festinemus ad distinguendum febres acutas. Et hæc quidem accidentia sunt sicut rigor, & frigus, & horripilatio: & sicut sudor plurimus: & sicut fluxus sanguinis narium superfluus: & sicut uomitus laboriosus: & fluxus uentris debilitans: & sicut sitis, quæ non toleratur: & sicut profunditas somni plurima: & sicut uigilatio inseparabilis: & sicut asperitas linguæ, & siccitas seu exiccatio oris: & sicut sternutatio continua, seu uehemens & dolor capitis prauus: & tussis frequens: & sicut casus appetitus, & bolismus: & sicut appetitus caninus & frigus uehemens & singultus.

De regimine rigoris, et horripilationis cum superfluitatibus. Cap. 12.

Quod est de hoc sequens sudorem, rectificatur uelociter, & non indiget regimine. Et cetero non oportet ut contrarium fiat per remotionem: & non est de illis, quæ debilitant, & quæ faciunt aliud: & quandoque sedantur cum ligatione extremitatum, & fricatione facili, & cum calefactione cooperturæ: & cum unctiōe de oleo de anetho, & de chamæmilla si indigetur eo. In forti autem quando perseverat, siue sit in febribus, siue sit in alijs, oportet ut ligentur extremitates in locis plurimis, & inunctio fiat cum oleo chamæmilino, & radicis lilij. Et sunt de hominibus, qui confortant illud cum eis, quæ sunt sicut cardamomum, & castoreum, & ruta, & sccha, & calamethum, & baurach, & piper, & pyrethrum. Et quandoque concedit illud administrationem linimenti ex sinapi, & assa fortida. Et quandoque

decoquuntur medicinz istæ in aqua, deinde coquitur in ea aliquod oleum. Et aqua eruca fortis est in hoc capitulo per se sola, aut cū oleo aliquo, quod decoquitur cum ea. Et similiter decoctio oximi, & aqua eius.

Confectio olei boni.

Sumantur anethum siccum, & myrrha, & ruta, & calamentum, & piper, & pyrethrum, & coquantur in uino decoctione ultima, deinde decoquantur colatum in tanto quantum est medietas eius de oleo sisamino, usquequo consumatur aqua, & remaneat oleum, & administretur inungendo. Et de oleis fortibus in eis, in tali qualis est rigor quantus, est oleum de costo, & oleum de sccha, & oleum de abrotano, & oleum de lilio, & oleum de myrrha: & ponantur in vnc. i. olei, pondus, drach. 3. piperis, & sexta, drach. i. pyrethri tritorum. Et administretur absinthium decoctum in oleo aliquo: aut oleum oliuæ in quo decoctum est apium. Et introitus in oleo calido est iuuatiuus valde. Et fortasse necessariæ sunt potiones. Et multoties sedatur cum potu aquæ calidæ multæ caliditatis, & cum inclinatione super uaporem eius. Et quando non sedatur per id, si materia est grossa, decoquantur in aqua anisum, & calamethum, & semen apij, & mastix, & eruca, & anethum, & similia. Et euaporetur cū aqua in qua decocta sunt ea, quæ sunt sicut sccha, & abrotanum, & calamentum, & anethum, & squinanthum, & ruta, & sansucus, & costus, & semina calida. Et omnes medicinz fortis prouocationis sedant rigorem. Et de medicinis sedantibus rigorem maximum in quartana, & similibus sibi, est ut bibatur de costo aureus. i. cū aqua calida, & de agarico quantum de ipso in aqua calida. Et in agarico est iuuamentum, & quandoque ponitur cum eo parum opij, quoniam facit dormire, & facit sudare, & prohibet uehementiam rigoris, & alia. Et iterum ireos quantitas aut. i. in aqua calida. Et iterum abel uel iuniperi pondus aure. i. cum aqua calida. Et iterum apium montanum pondus aure. i. cum aqua calida. Et de compositis est theriaca diatessaron, & theriaca hazare & diacyminum, & diacalamentum, & diapepeleon, & syrupus de melle in quo feruent sicut assa, & ruta, & pyrethrum, & piper. Pilulæ expertæ, quæ dantur in potu ante rigorem per horam unam, infirmo quiescente super lectum suum, & aere eius calefacto cum igne, aut cooperimento: quoniam temperant ipsum, aut prohibent ipsum: quarum confectio. Recipe storacis, myrrhæ, opij, opopanaxi piperis omnium ana partem. i. conficiantur cum butyro, & sit dosis eius quantitas fabæ. Et iterum sumantur opopanaxi, castorei, dauci, assæ, pyrethri, opij ana partes æquales, fiat sicut primo fit. Descriptio bona. Recip. opopanaxi, serapini, aniuden, & cymini, carmeni, & seminis apij, & piperis ana aur. i. 5. seminis hyusquiami albi, croci, aristolochiæ, castorei, euphorbij, myrrhæ, ameos, zinzib.

est: omnia ana pondus tertie drachm; semi-
nis haemel, pyrethri omnium ana aurea conficiantur
cum melle: & dosis eius sit a uellana cum aqua
calida valde. Et fortasse est necessarium in eo, ut
detur in potu vinum calefactum, & cibi calefacti.
Et solutio ventris cum eis, quæ sunt sicut hiera, &
diacydonites, & diaphnicon: immo quando est ri-
gor parvus, & proprie sine febre, dentur in potu
pillule foetida: quoniam ipsæ sunt sanitas eius.

Regimen sudoris superflui in febribus.

Cap. 13.

Oportet ne sudor creticus: quantum possibile
est, restringatur. Cum autem euenit neces-
sitas, & pertransit terminum, tunc oportet
reuerteretur, & infrigidetur locus. Si autem non
iuvat, tunc super instrumentum positus, quo pueri
vel iuvenes solent in aere concui, commoueatur
in loco frigido. Et non oportet, ut occupetur in
exuccando illud, quod torando egreditur faciendo
exuccationem post exuccationem: nam illud est
causa ad illud provocandū, & multiplicandum, &
fortasse attrahit syncopim. Nam eius absterfio ad-
dipin ipsum, & citius dimissio restringit ipsum. Et
oportet ut inungat eum cum oleo rosæ foris, & oleo
myrtino, aut cum oleo de kalef, & cum oleo de
balaustijs, aut fiat oleum cum aquis in quibus de-
coquantur cydonia pontica, & mala pontica, &
rosæ & balaustij & similia, & collectur & decoqua-
tur in ea oleum, secundum quod scivisti, & quandoque
pulverizantur desuper grana myrti contusa, & ba-
laustij, & karabe contritum, sicut pulvis, qui ap-
paret in radio solis, & similia, quoniam restringit.
Et quandoque restringit acetum mistum aqua, &
succus agrestis, & decoctio balaustiarum, & deco-
ctio gallarū, & decoctio myrti, & succus kalef est
mirabilis, & aqua semperuius. Et cures sit: veher-
mens, liniatur cum mucilaginis frigidis, & cum gū-
mi, & proprie cum ponuntur in huiusmodi sanda-
li & caphora, & proprie quando frigatur denas per-
gitur cum his duobus, & euentatur. Et quando ve-
hemens sit res, oportet ut ponatur, mix super extre-
ma, & sola sint in ea extrema: aut balneetur cum
aqua frigida, si suffert eam.

Regimen fluxus sanguinis narium superflui. Cap. 14.

Oportet ut non properetur ad prohibendum
illum, qui creticus est, quantum possibile
est. Cum autem est necesse prohibere fluxū
sanguinis narium in febribus acutis, tunc liga ex-
tremā, & pone ventosas super latus, quod sequitur
narem vel vicinatur nari ex qua est fluxus sangui-
nis narium. Deinde consequenter adhibe infrigi-
dationem illius loci, & si possibile erit tibi ut in-
frigidet, & restringatur per illud, tunc non ponas

ventosas desuper. Et distilla in nasum aliquas di-
stillationes predictas in capitulo fluxus sanguinis
narium, & cum non est prohibens aliquid, infrigi-
da caput cum infrigidantibus predictis in eo. Et
quandoque aduenit patietibus quartanam fluxus
sanguinis narium, quare oportet ut iuues cum facien-
tibus fluere sanguine ex naribus scitis in ipso. n.
est sanatio quartana. Si vero superfluitas tim-
uerimus, faciemus sicut illud, quod fecimus.

Regimen vomitus, qui accidit eis. Cap. 15.

Creticus iterum non abscindatur nisi apud
necessitatem, & secundum plurimum ab-
scinditur vomitus ipsum et nausea ipso-
rum in eis per vomitum, et per adiutorium eius
quo extrahitur humor nō pius sicut est syrupus
acetosus simplex et aqua calida. Et quandoque est
necessarium ut fortificetur: quare ponatur loco
syrupi acetosi puri syrupus acetosus cum seminibus.
Et si humor est imbibitus, et grossus, tunc oportet
ut fiat solutio dando in potu, quod est sicut alo-
e & hiera. Et quando nō est imbibitus, fortasse co-
fer hiera et aloē. Et si est imbibitus, non grossus
mundat ipsum syrupus acetosus cum aqua calida:
deinde æquat ipsum post illud aqua granatorum,
quæ bibatur. Quod si euomerit eam, bibat ipsam
nice alia, donec æquetur et quiescat. Et similiter
syrupus de menta cum granis granatorum. Et for-
tasse sedat ipsum infrigidatio stomachi. Et non
oportet ut approximet rebus ponticis, et le dan-
tibus uomitum cum ponticitate sua, et acetositate
sua styptica ille, qui habet humorem imbibitum,
quia est malum, et addit imbibitioni: sed non im-
bibitum, quandoque facient eū deiscere dorsum,
quāuis sit grossus: et quandoque iuuabunt vir-
tutem stomachi ad expellendum eum per superio-
ra. Et quando assiduauerit uomitus de cholera, et
non fuerit de genere imbibiti, tunc utere stypticis
et proprie emplastris iuantibus factis ex corti-
cibus granatorum, et gallis, et his similibus cum
uino permisto, aut aceto permisto. Et ad uomitū
quidem cholerae nigrae superfluum submergatur
spongia in aceto, et ponatur super stomachum.
Quod si necessarium fuerit aliquid fortius, admi-
nistra medicinas predictas in capitulo retentionis
vomitus.

Regimen fluxus ventris, qui accidit eis. Cap. 16.

In singulariter in capitulo fluxus ventris locū
in sumus in hac intentione: ergo redeamus ad
illud. Et de illis, quæ conferunt ex uia ciborum
sunt almes torrefacti, et lentes torrefactæ, et co-
riandrum, quodcunque horum duorum fuerit,
elixetur, et fundatur aqua ab eo, et proprie quādo
sit acetosum cum granis granatorum, quoniam
est bonum.

Regimen suis eorum superflua. Cap. 17.

Oportet ut inungatur caput cum oleo frigido valde, & fundatur super ipsum, & ponatur super caput si non fuerit, & prohibeat, & cū aquis infrigidantibus, & retēione mucilaginis semi. cydoniorū permixta cum oleo. ros. vltimo: in bonitate in ore aut infusione prunorū, & medullarū alcheta & alcheted, & cucurbitz, & seminis lactucæ nigræ, & radicū liquiritiæ, & pilularum descriptarū in antidotario ad sitim. Et de illis, quæ masticantur & sugūtur sunt tamarindi. Et fitis quidē quandoq; fit ex siccitate, & abscindit eā somnus: & quandoq; fit ex calore, & abscindunt eam vigilie.

De profunditate somni quæ accidit eis. Cap. 18.

Oportet ut remoueatū a profunditate somnū fabulis, & his similibus per voces. Et ligentur membra eorum inferiora ligatione dolorosa, postquā non fuerit, quod prohibeat. Et supponatur collyriū subtile si natura fuerit restricta, & in hora quietis, aut in hora teporis in assidua, & inseparabili ventoseatur, quod est inter ambas spatulas, & spondyles.

De grauitate caput eorum. Cap. 19.

Oportet ut alienetur ab eis emulsio lactis super capita eorum: aut effusio olei super ea aut embroca: aut caput purgiū immo sint cōtēti vaporationibus, factis cū embrocis ex chamemilla, & sint in eis violæ, & furfur, & his similia.

De vigilia superflua vel non naturali habentium.

febres, & aliorum. Cap. 20.

Natribus attrahere oleū de papauere cū oleo de semine lactucæ, & oleo nenufarino, & oleo de cucurbita, & adherere aliquid de stupefacientibus famosis super tēpora, & incuruare caput super vapores humectantes: & odorare nenufar, & poma mādragoræ, & alsahelesfrā aspersum ex longinquo, & embroca humectantes, & res quas scis. Et similiter si nō fuerit, quod prohibeat, detur in potu syrupus papaueris, & de locheius. Deinde multiplicetur inter manus eius cādele: & eleuetur voces cum fabulis, & ligentur cū insitis extremitates eius ligatione dolorosa parum, cum nasit. i. cū ligamentis seu nodis velociter solubilibus. Deinde præcipiatur ei ut dormiat, & claudat oculos: cumq; dormit parū, extinguantur candele, & cessent voces, & soluatur nasit. i. ligamēta velociter solubilia, quoniā dormiet. Et cū iauemur leuitatē, & quietē ex paroxysmo, aut vehemētia, assidue ablutionē faciei cum aqua in qua decoctū est papauer nigrum cū aliquātulo mandragoræ, &

radice eius. Ercū est illic humor baurachint, eo, ferat aqua in qua cocta sunt: sisymbriū, & melilotum, & alhaquen, & papauer, ablucendo faciem, & incuruando super vaporem eius.

De dolore ventris qui accidit eis. Cap. 21.

Et ex effusione cholerae ad stomachū: & si accidit in principio periodi eius, detur in potu parum syrupi de malis cum syrupo acetoso.

De asperitate lingua eorum, & eius viscositate.

Capit. 22.

In essentia quidē viscositatis fricetur cū chaizā aut cū virgulis salicis cū oleo amygdalino, & zuccaro tabarzet, donec mundetur, aut cū spōgia & pauco sale, & ol. ros. In hoc. n. est alleuiatio multa infirmi. Et post illud, cum eius asperitas est nō propter viscositatē, immo à siccitate, oportet ut teneat in ore suo sebesten, aut nucleos prunorū, aut salem, qui asportatur de India: etiam est in colore salis & dulcedine mellis: & sumat de eo secundum quod dixit Archigenes quantitatem fabæ vnius. Et grana cydoniorum sunt ex eis, quæ humectant linguam, & prohibent exiccationem eius, & oportet ut non stent ore aperto plurimum neque resupinetur dormiens, nam hæc duo exiccant linguam.

De sterinitatione assidua quæ accidit eis.

Capit. 23.

Quandoq; magnificatur nocumentum sterinitationis assidue cum eis: lædit namque oculos, & replet capita eorum, & debilitat eorum virtutes: & fortasse facit fluxum sanguinis narium. Quare oportet, ut fricetur eorum frōs, & oculi, & nasus, & aperiantur ora eorum, & fricentur eorum palata cum vehementia, & tendantur capita eorum, & conuertantur, & præmantur vel fricentur eorum extrema: & fundantur in aures eorum olea tepida ad caliditatem parumper declinaria: & humectentur lacerti eorum, & ipsorum mandibula: & ponantur super eorum ceruicibus puluinaria calefacta, & non excitentur a somno eorum subito: & prohibeantur a puluere, & a fumo, & omni in cuius odore est acuitas: & olfaciant fauch, & lutū alnahagi & spongiam marinā.

De dolore capitis, qui accidit eis. Cap. 24.

Iga extremitates eorum, & proprie eorum, & cum insita liga, & frica pedes eorum: & supponantur eis collyria trahentia materiam ad inferiora: & conforta capita eorum cum infrigidantibus notis. Et si non fuerit, quod prohibeat ex catarrho, aut tussi, embrocetur capita ipsorum cum

cum decoctione rosarum, & violarum, & hordii, & foliorum salicis, & his similibus, & similiter oleo ros. & oleo de salicibus. Et quando non excusat hoc, tunc permisce embroas infrigidantes cum lenitinis, sicut chamæmilla, & stupefactinis, sicut est papauer. Et non mulgeas lac nisi cum remouetur febris. Si autem virtus fuerit fortis, mulgeas lac caprimoni, & si fuerit debilis, mulgeas lac muliebre. Et caue lac apud repletionem humidæ corporalem facientem suber: & similiter caue oia humectantia. Et tu non administres humectantia nisi ubi est vapor fumosus, & caput siccatum, & parum somni. Et quando multiplicatur repletio in capite ex vapore humido, trahere eum ad inferiora cum collyrijs & clysteribus, & stringe membra inferiora, ita quod testiculos.

De tussis eorum. Cap. 25.

Tussis plurimum accidit eis ex calore, aut siccitate: quare oportet ut teneant in oribus suis pilulas bichixias, aut loch de papauere facta cum medullis fructuum frigidis, & amylo, & his similibus. Et vtantur ceratarijs infrigidantibus factis ex oleo ros. & ex mucilagine psyllij, & succo portulacæ, & alijs.

De destructione appetitus eorum. Cap. 26.

Quandoq; est causa eius humor in ore stomachi, quod sentitur ex eo, quod dictum est de destructione appetitus, & euacuatur per vomitum, aut solutione vëtris. Et multoties inuariantur cum intromissione digitorum in guttur, & commotione stomachi: & proprie quando vomitus expellit cholicam rem, aut acetosam. Et quandoq; est ex vehementia debilitatis: quare curetur complexio, quæ facit eam cum eo, quod sentitur. Et oportet ut approximes eis odores bonos excitantes appetitum, sicut odor sanichi infusi cum aqua, aut cum aqua, & aceto. Et detur eis electarium proportionale febricitantibus, & parum vini, & decoctionem fructuum ponticorum, boni odoris: & lambant aliquid de aceto gelatine piscium, aut hœdi, & his similibus. Et ponantur super stomachum post dies primos emplastra facta ex fructibus. Et sint in eis absinthium & aloë, secundum quod scis: & inunctio eius cum oleo bonis est iuuatiua.

De bolismo eorum. Cap. 27.

Oportet ut curentur cum odoramentis, & utro alnahagi aut luto armeno maderactis cum aceto, & odorent almosofat, & panem mundum calidum, & carnes assatas, & stringe eorum extremitates. Et extende aures eorum, & ea pillos ipsorum. Et conforta eorum cerebrum cum

embrocis infrigidantibus, & humectantibus: plurimum namq; bolismi eorum est propter destructionem sensus oris stomachi propter causam communicantem ramis, qui adueniunt ei cum sensu: & est corpus exigens vel requirens cibum, verum sensus non exquirat ipsum.

De nigredine lingua eorum. Cap. 28.

Oportet ut non dimittatur super linguam nigredo, immo fricetur cum eo, quod sentitur, & si non, eleuabuntur ad caput vapores maligni, & facient cadere in sursum.

De appetitu eorum canino. Cap. 29.

Vrantur cum vniuosis frigidis, & dulcibus.

De syncope qua accidit eis. Cap. 30.

Quandoq; accidit eis syncope in principio febrium propter effusionem cholæræ ad os stomachi eorum: quare oportet ut detur eis ante paroxysmum, aut apud paroxysmum frustum panis de simila cum aqua graaati, & aqua acrestæ. Et scias, quod quando aggregantur syncope, & febris, tunc syncope est dignior curatione: & si indiget cibo, tunc detur parum panis permixti vel maderacti cum drac. 3. vini antiqui: & si non, syrupi maioris antiqui, cuius resoluta est superfluitas. Et phlebotomia quidē multoties addit in syncope. Et clystere leue est magis conueniens. Et vomitus est iuuatiuus eis. Et costrictio crurium, & ponere manus, & pedes in aqua calida. Et cum euadunt, tunc de solitudine est ut cibetur sanichi hordii infrigidato, in quo sint grana granatorum.

De costrictione anhelitus eorum. Cap. 31.

Constrictio anhelitus accidit eis, aut propter spasmus & siccitatem, quæ accidit eis in lacertis anhelitus: aut propter materiam præfocatiuam descendantem ad guttur eorum: aut propter debilitatem, quæ dominatur nervis venientibus ad membra anhelitus. Et prima quidem curatur cum unguentis vel emplastris humectantibus. Et secunda cum eis, quæ prohibent strangulationem. Et tertia cum æquatione complexionis in cerebro, & inunctione colli cum eis, quæ infrigidant & humectant: & super stomachum iterum, ex eis, quæ sunt sicut rasura cucurbitæ, & portulacæ, & sandali cum oleo ros. & similibus eis.

De vehementi cherebux. i. angustia vel inquietudine eorum. Cap. 32.

Quando multiplicatur chereb. i. angustia vel inquietudo causa oris stomachi, & aduentu humoris mordicati in eo, tunc infrigida stomachos eorum cum eis, quæ scis de cibis: & euertetur sen respirent aerē & iaceant, seu & dormiant in loco proximo motibus aque, strati

to extremitatibus, & ramis frigidis, & odoriferis frigidis, & nenufare, & rosas, & asperitionibus frigidis factis ex fructibus odoriferis, frigidis, & san- dalis. Et multoties quidem conferunt in eorum angustia vel inquietudine clysteria frigida, facta ex aqua cucurbitæ, & citruli, & succo portulacæ, & semperuiuz cum oleo rosato.

Difficultas diglutiendi, quæ accidit eis. Cap. 33.

Difficultas diglutiendi cum accidit eis, & febris fuerit sanguinea vel cōclusa, tunc phlebotomia fiat & extrahatur sanguis paulatim, & cibetur cum aceto & lactucis, si appetitus in eis fuerit aliquantulum excitatus, & si nō, contenti sint aqua hordei, & alienent, quæ subito occurrunt. & si fuerit cum eo stypticitas naturæ, tunc suppositoria, & clysteria sunt meliora plurimum quam solutiuum desuper.

Frigus extremitatum quod accidit eis. Cap. 34.

Multoties profundatur calor eorum, & in- frigidantur eorum extrema, & eua porare facit calor submersus ad caput. Ponantur ergo extremitates in aqua calida, & non bibat aquam frigidam.

Sermo vniuersalis de febre cholericæ. Cap. 35.

Febres cholericæ tres sunt: tertiana cōtinua, & tertiana periodica, & caufon. Et tertiana quidē periodica aut est pura, & fit à cholera pura: aut nō pura, & fit cū putredine cholere grossæ substantiæ propter cōmissionem cholere cum phlegmate cōmissione cōplexionali vnita: & per hoc diuersificatur ab hemitritæ, cū hemitritæ faciant duæ materiæ separatæ: & hanc faciat materia vna, quæ in seipsa est permixta, cū cuius calore permiscetur aliquantulum frigoris, quod grauat suā putredinē, & suam resolutionem, & suā digestionem: & propter illud quidē sūnt in hemitritæ duo paroxysmi: & tertianæ non puræ paroxysmus vnus. Et hæc quidē non pura quandoq; prolongatur tēpore longo. & circiter medietatē anni. Et quādoq; perducit ad trehel, i. tumefactionem membrorum similē cachexiæ, & magnitudinem splenis. Caufon vero seu incensiuū est de genere continuæ: nisi quod ei associantur excrementiæ & tepores sui non sensati: & accidentia eius sunt vehementia. Et causa est acuitas materiei, & multitudo: cum eius casus sit circa cor, & in venis oris stomachi, aut in partibus hepatis proprie: & ad summum in membris nobilibus vicinis cordi. In tertiana vero cholera est in carne, & ad partes cutis: & in continua est sparsa in venis corporis, quæ elongantur à corde. Et vehementia quidē sitis, & angustia, & inquietudo, & vigilia, &

alienatio, & nausea, & amaritudo oris, & bothorlabiorum, & scissio eorum, & dolor capitis multiplicatur in febribus cholericis. Et est natura in pluribus earum ad siccitatem declinans: quoniam materiei motus est ad superiora, aut ad illud quod apparet de corpore & cute.

De tertiana absolute, & nominatur tritæus. Cap. 36.

Paroxysmus tertianæ incipit in primis cum horripilatione, vt punctura acus, deinde in- frigidat, & incipit facere rigorem difficilem valde difficiliorem reliquis rigoribus, non frigidum aut cum paucō frigore. Et nō est frigus eius nisi propter profundationem caloris ad interiora versus materiam eius, & inuenit sicut puncturas acuum. Et hic quidē rigor cum vehementia sua est velocis sedationis, & calefactionis, & tu iam sciisti causam huius rigoris. Et fit rigor eius in diebus primis fortior, & vehementior: & in quartana econtrario. Et iterum rigor incipit cum fortitudine, deinde lenitur paulatim, & minuitur velociter, & in quartana econtrario. Et sudor multiplicatur in tertiana, cum dimittit. Et fit vrina in ea rubea tendens ad igneam, in qua non est multa grosstitudo. Aut est non pura, & fit vrina eius cruda aut grossa. Et tertianæ caliditas est saluior caliditate caufonidis: & quanto prolixius manus tangit corpus, non additur inflammatio: immo quandoque minuitur inflammatio eius: in caufonide additur inflammatio. Et accidentia, quæ accidunt eis in tertiana sunt vigiliæ sine grauitate in capite, nisi in quibusdam non puris, & sitis, & furor, & ira, & odia locutionis. Et est pulsus eius acutus, velox per comparisonem ad reliquas febres: & non est æqualis constrictionis, & dilationis, quoniā humor debilitat eū, vel coarctat eum, & additur ei diuersitas apud stratum. Et diuersitas in ea est infra illam, quæ est in alijs febribus humoralibus, & minor ea, quæ est in alijs cum duritie eius: & est pulsus fortior in ea: immo non est diuersitas in ea secundum plurimum, nisi diuersitas febri appropriata existens infra alias vel minor alijs. Et in principio quidē est necessarium, vt coarctetur pulsus vsq; ad horam dilationis febris: postea cōfortatur, & fit velox, & frequens. Et eius diuersitas nō est cum illa superfluitate. Et quandoque significant ipsam ætatē, & consuetudo, & regio, & ars, & forma, & tempus, & multitudo eūsus tertianæ in illa hora. Cū ergo componuntur duæ tertianæ, sunt paroxysmi euenientes omni die: qui ergo considerat tertianam per paroxysmum, errat in ea, immo oportet ut attendantur significationes aliæ & paroxysmi confirmant eas. Et patientibus quidē tertianam accidunt vigiliæ, & amor solitudinis: & multoties sentiunt ebullitionem apud hepar.

Differentia inter tertianam puram, & non puram. Cap. 37.

PVra est subtilis, levis, cuius paroxysmus consumitur à quatuor horis usque ad duodecim horas: & non addit super eas multum. Et si addit additionem multā: tunc est non pura. Et est secundum plurimum perueniens ad septem horas. Et calefit in ea corpus uelociter. Et uides caliditatem procedere ex corpore, & extremitates adhuc sunt frigide. Et similiter pura non addit cum non accedit error supra 7. periodos. Et quandoque consumitur propter subtilitatem suae materiae in paroxysmo uno, in quo accedit uomitus: aut uentris solutio mundificans. Et apparet digestio in urina in primo die: aut in tertio, aut in quarto, aut in septimo. Si autem addit super septem periodos additionem plurimam, tunc est de genere non pura. Et similiter si prolongatur spatium sui rigoris: & sit additio suorum paroxysmorum. Et antecessio eorum adinuicem secundum ordinem seruantem proportionem similes: & in non pura est illud diuersum non ordinatum. Et similiter quando assimilantur paroxysmi secundum terminum unum: & similiter reliqua signa prolongationis febris etiam sunt de illis quae scis. Et cum uides principium cum rigore, secundum quod determinauimus, & statum cum sudore exuberante, tunc non dubites, quoniam ipsa sit pura. Et in pura quidem est, cum eam habens bibit aquam, procedit in corpore uapor humidus quasi ipse. uelit sudare, & quandoque sudat. Et cum non pura inuenitur grauitas plurima in capite, & extensio: & prolongatur paroxysmus ita ut perueniat ad uiginti quatuor horas: aut triginta horas usque ad horam suam: & tepescit donec complentur 48. hor. & per quantitatem additionis paroxysmi super 12. horas, est eius elongatio a puritate. Et in tertiana quidem non pura tardatur apparitio digestionis: & non apparet in forma ofuscationis, neque extenuatio: & fortasse non eradicatur cum sudore copioso. Et fortasse non incipit cum rigore, forti, & non est caliditas cum illa fortitudine, neque est augmentum eius æquale: immo est quasi ipsum addatur, deinde procedit, & minuitur: Et accidentia sequa minorantur in ea.

Tertiana continua. Cap. 38.

COgnoscitur per uehementiā paroxysmorum tertianae: & per uehementiā accidentiū tertianae. Et apud G. quidem cum sang. putrefit, fit de hoc genere: & de eo fiet sermo post.

Cura tertiana pura. Cap. 39.

Oportet ut rememoreris illud quod dedimus tibi de radicibus in curatione febris, de solutione uentris, & cibo, & in primis ca-

pitulis: & fabrica super illud. Et tu quidem non auscultes sermonem eius, qui concedit in principio solutiua fortia: & myrobalanos, & his similia, nisi cum conditione & qualitate quam diximus. Immo oportet ut propiores in primis, & lenias lenitate quadā cum eis, quae diximus illic: sicut sunt tamarindi quantitate 40. dra. qui infundantur in aqua calida in nocte, & colentur, & proijciatur de super siracost, aut tereniabin, aut aqua duorum granatorum: & sicut decoctio lubleb cum tereniabin & cum cibib enucleatis, aut infusio prunorum cum tereniabin, aut siracost, aut syrup. viol. & uiolae conditae. Et fortasse facit mucilago psyllij cum quibusdam syrupis, sicut est syrup. prunorum, lubricitatem, & lenificationem, aut cum decoctione letium cum lubleb. Aut clysteria lenia sicut est clystere cum decoctione althaeae, & iuinbae, & sebesten & radice liquiritiae, & oleo uiol. & succo siclae, & baurac, secundum modum quem scis. Et illud quoniam necessitas agit ad ipsam. Rectum namque est ne in potu detur quod est sicut aqua hordei, neque ei simile, neque cibi, nisi natura iam lenificata. Et si uentris solutio in principio in febre tertiana pura, minoris sit malitiae, quae eius simile in alijs: licet sit eius malitia magna. Et quoniam est possibile, ut non phlebotomes usque ad tres periodos, fac. Et similiter quoniam times quod sit ægrotudo furiosa, & facis illud, erit illud quod accedit de errore, si accedit, minus quam aliud. Et oportet ut non moueas in die paroxysmi aliquid, nisi propter necessitatem, & non cibes nisi apud conditiones praedictas: & ut prouoces urinam cum emulsione seminum. Et oportet ut superueniat ei paroxysmus dum est famelicus, & non est in stomacho eius aliquid, immo oportet ut sumat in potu syrupum acetosum omni mane: & post duas horas aquam hordei in die, in qua non est paroxysmus. Et syrupus quidem acetosus post paroxysmum est conueniens, & similiter ponere pedes in aqua tepida ad attrahendum residuum caloris. Et ego magis diligo ut sit in syrupo acetoso, proprie in postremis, emulsio seminum frigidorum diureticorum aut ante paroxysmum per tres horas, aut quatuor: & detur in potu iterum post paroxysmum, aqua hordei. Et quando necessaria est subtilitatio regiminis, detur in potu sicut aqua granatorum, & aqua melonis indi, & his similia. Et gradatim fiat eius regimen secundum modum praedictum. Et quoties appropinquat status, subtilietur. Et in diebus primis cibetur cum kisch hordei, & pane comminuto cum aqua frigida aut pane sicut est aut emulsione panis in ea, & cum eo quod fit ex almes, & lentibus. Et quando cibus acetat in stomacho, non detur in potu aqua hordei, quae non est ualde subtilis: & si necessarium fuerit dare ipsum in potu, confortetur parum cum decoctione radicis apij. Si autem stomachus fuerit frigidior illo, & febris non magna, & non pura, ponatur parum piperis secundum consilium Hippo. Quod si signa

significauerint quod crisis est propinqua, tunc sufficiat ei aqua hordei, & aqua granatorum, & syrupus acetosus. Et fructus quidem qui diliguntur eis, sunt granata dulcia & muza, & pruna matura, melon uero indus est res maximi iuuamenti, cum hoc quod ipse soluit, & prouocat, & frangit uehementiam caloris, & facit sudare, & fortasse non nocent aldestembuiat parui: & ex olenibus cucurbita, & alcheta & alchered: & lactuca. Et scias quod intentio in eo quo cibantur patientes tertianam, aut est humectatio sicut datur eis in fine de extremitatibus althaiugi, & de testiculis galorum: & cerebellis hadorum, quibus non est narsa, & uitellis ouorum. Aut est infrigidatio, & humectatio simul sicut in xisch hordei. Et non uel times in infrigidatione multa, & proprie in principio, nisi inuenias inflammationem uehementem, aut timeas conuersionem eius ad causonidem aut ad continuam. Quod si consequatur crisis, & uideris digestionem in urina, & est sedimen laudabile quod cognouisti, tunc si excusat, bene est: & si non, cura tunc cum eo quo innatur natura ex prouocatione urinae, aut solutione ventris, aut vomitu, aut fluxu sanguinum. Et non agas contra ipsam in hoc. Quod si non inuenis declinationem manifestam, tunc euacua cum solutione uentris. Nam de illo est scammonae sexta drach. i. in iuleba: aut decoctio myrobalanorum cum ramarindis, & tereniabin, & passulis, & radicibus, & casia fistula, secundum quod sciuit. Et tibi inest ut confortes eas cum fumoterra, & sene, & scammonae. Et de illis quae conueniunt eis sunt trochisci de spodio solutiu. Et de illis est medicamen solutiuum istius descriptionis. Recip. myrobalanorum citrinorum enucleatorum pondus drach. 4. zuccari tabarzet pondus, drach. 20. scammonae pondus sextae, drach. i. bibatur cum aqua frigida: & post illud curentur cum prouocatione. Et si fuerint illic caliditas superflua, & inflammatio maxima, cum iam euacuaueris eum, non erit ei malum dare in potu aliquid de extinguentibus fortibus, de illis quae dicta sunt in regimine acutis: & fortasse conferint ei emplastra ex eis. Balneo uero oportet ne approximet nisi post digestionem. Post digestionem autem, & apud declinationem est ipsum melior curatio eis, & proprie consuetis: quamuis error in intromittendo eos in balneo ante digestionem saluior sit quam suum simile cum alijs. Et oportet ut sit balneum eorum temperatum, boni aeris, qui sit humidus, in quo sudent cum facilitate: ita ut non inflammentur eorum corda, & inungantur cum oleo viol. & ros. conuassato cum aqua, & non prolongent in eo moram, immo egrediantur uelociter: nam iteratio est eis conuenientior: quam stationis prolongatio: & si apud exitum infundantur in aqua tepida, stent in ea secundum quantitatem declinationis. Deinde cum egrediuntur, tunc conuenit

eis ut bibant uinum album, subtile multa commistione permistum, & cooperiantur in locis suis: sudabunt enim sudore uehementi: & siquid residuum fuerit digeretur. Et post illud cibentur quibus infrigidantibus, & humectantibus, & olenibus quae sunt illius modi. Et non timeas post declinationem potare eos uinum plurimum commistum. Vinum enim habens caliditatem contra tam per commistionem confert quantitati remanenti ex eo, in resoluendo illud cuius necessaria est resolutio: & succurrit aquae penetranti cum fortitudine sua, & permistione eius quod est in eo de calefactione pauca: quare infrigidat uehementer, & humectat. Et si fuerint illic accidentia sitis, & dolor capitis, & uigiliarum, & aliorum iam ubi praeteriit eorum cura. Et quando post crisin remanet aliquid caloris inseparabilis, tunc sibi superest ut administres syrupum acetosum cum succis diureticis: aut in quo decocta sunt semina, & radices diureticae. Et scias quod cura tertianae continua, est cura tertianae interpolata: sed est declinatio ad obseruationem dispositionum digestionis, & ad infrigidandum cum syrupo acetoso factum cum semine citruli, & semine endiuiae proprie conculsis. Et post ipsum post duas horas, datur in potu aqua hordei: & ad subtiliationem cibi, & ad administranda clysteria lenia in principio, & ad prouocationem: & oportet ut cum facilitate procedant, & non sumant in potu de solutiu in principio, aut in eo quod ei appropinquat nisi ea, quae sunt sicut syrupus niol. & aqua fructuum, & non utantur nisi clysteribus lenibus.

Cura tertiana non pura. Cap. 39

REs in quibus diuersificatur cura tertianae non purae, a curatione tertianae purae sunt res in quibus communicat febris frigida. Quod licentia in balneo, quae conceditur habentibus tertianam puram absque hoc quod expectetur digestio, & non expectatur plurimum declinationis si expectetur digestio, est in eis illicita uel prohibita. Quoniam balneum permiscet phlegma indigestum cum eo quod effunditur ad locum putredinis: & permiscet humorem malum cum putredo, & resoluit subtile, & facit remanere spissum. Et quod cibatio omni die iterum, aut prope cibationem, est ex eis quae illis nocent: immo oportet ut cibentur uno die, & alio die non. Et sit in cibis eorum quod abstergat, & calefaciat parum. Erat cibatio in principijs egritudinis grossior quam sit in principijs purae: deinde gradatim perueniat ad subtiliationem supra subtiliationem tertianae. Et subtiliatio eius in ea in principijs sit cum fama eius plusquam subtiliatio cum cibo subtile ualde. Et ut sit infrigidatio minor. Et ut clysterizetur in principio clysteribus acutioribus. Et ut expectetur digestio plus in solutione uentris eorum.

forti-

forti. Et ut sint in aqua hordei eorum uirtutes digestiur, & resolutiur: sicut est illud quod diximus in eo in cuius stomacho acetat aqua hordei, immo fortiores quam in illo. Fortasse enim necesse est ut decoquantur in ea hyssopus, & origanum, & calamentum, & spica secundum complexionem: & blitis iuuatiua est eis. Et permistio aquæ cicris cum aqua hordei, & in fine eius aqua cicris est iuuatiua eis. Et oportet ut consideretur propinquitas non pura ad puram: & elongatio eius ab ea: & secundum illud diuersificetur inter curam eius, & curam puræ, quod si fuerit ualde propinqua puræ, tunc diuersifica inter eas diuersificatione parua. Et cum uideris urinas eorum grossas, tunc phlebotomia. Et cum phlebotomaueris non indigebis clysteri. Et scias quod non est res magis iuuans eos, quam uomitus post cibum. Et de solutiuis in principiis eius, quæ sunt propinquiora æqualitati, est aqua algeleniabin decocti, & syrupus acetosus. Et fortasse ponemus in ea cassiam fistulam. Et fortius illo est ut ponas in ea uirtutem turbit. Et clysteria in principio sunt magis dilecta, quam solutiua alia, & sunt clysteria in quibus est uirtus alhascech, & chamæmillæ, & ficlæ, & cartami, & uiolarum, & sebesten, & ficis, & odor turbit. Et in eis sit cassiæ fistulæ, & oleum sframini, & baurach, & fortasse indigetaturatiore istorum secundum elongationem febris a pura. Adiuantia autem ad digestionem sunt sicut syrupus acetosus permistus cum aliquanto de algeleniabin: aut syrupus acetosus de radicibus. Et post septimum sicut decoctio absinthij est enim iuuatiua, subtiliatiua materiei, & confortatiua stomachi. Et similiter aqua feniculi, & aqua apij cum syrupo acetoso. Et si pertransit 14. tunc non est malum dare in potu trochiscos ros. minores. Si autem ægritudo prolongatur, non inuenimus excusationem quin demus ea, quæ sunt sicut trochisci de eupatorio, & decoctio eius. Et calefactio partium hypochondriorum est huius generis. Et emplastratio mirach eorum iterum cum eis, quæ digerunt, & maturant, & mollificant tensionem, cum uenerit illic. Cum ergo sciueris quod digestio iam aduenit, tunc euacua, & prouoca, & non cures. Et de euacuationibus bonis eis est, ut sumatur hieræ picræ, drach. 5. succi absinthij, & eupatorii amborum ana, drach. 3. feminis apij, myrobalanorum, citri kebulorū ana, drach. 5. turbit. drach. 7. fiant pilulæ ex eis cum aqua apij: & sit dosis eius, drach. 2. Et de illis est decoctio bona in uentione nostra. Recip. eupatorii, absinthij, myrobalanorum, kebulorum ana drach. 5. feminis melonis, feminis cucumeris, & althetæ & sem. apij, fuchaha, bedeoard omnium ana drach. 6. turbit. drach. 1. cassiæ fistulæ, drach. 6. passularum enucleatarum, drach. 20. ficuum. 10. numero, sebesten numero 30. geleniabin facti cum ros. persicis pondus, drach. 15. decoquantur om-

nia secundum quod decoqui solent huiusmodi decoctiones. Et sumatur de ea cadus magnus, in qua posita sit siliqua. i. scammonæ. Et fortasse necessaria est medicina fortis uno modo, & debilis alio modo: eius uero fortitudo est secundum hoc, quod ipsa euacuat humiorem uiscosum, sed ipsius debilitas est secundum hoc, quod ipsa non euacuat plurimum uice una: immo possibile est ut fiat gradatio in ea, quare euacuet humorem cuius euacuatio est necessaria multis uicibus, ut non destruat uirtutem. Et hæc medicina est illa, quæ possibile est ut partiatur in pluribus uicibus & possibile est ut aggregetur, & parum quidem ex ipsa medicina soluit parum ex humore malo, & plurimum de medicina prædicta soluet plurimum ex malo humore. De decoctionibus uero parum fortasse non facit aliquid. Et huiusmodi quidem medicina est, ut sumatur turbit quantitas drac. 5. & plus, secundum necessitatem, & scammonæ proprie altiusugi. i. aut supra id: & conficiatur cum geleniabin prædicto, & bibatur. Aut sumatur de agarico, & scammonæ secundum hanc compositionem, & conficiatur cum geleniabin prædicto, & bibatur. Aut ponatur in succo rosarum recentium cuius quantitas sit vnc. 1. & bibatur. Aut in syrupo ros. & bibatur.

De febre caufon, & est illa, quæ nominatur faricos id est febre ardente. Cap. 40.

CAUFON est secundum duos modos: aut enim caufon est cholericæ, & est causa in ea multitudo putredinis: aut intra uenas corporis totius: aut in uenis, quæ sequuntur partes cordis proprie, aut in uenis partium oris stomachi: aut in hepate. Aut phlegmaticæ, & fit ex phlegmate falso putrefacto in uenis, quæ sequuntur partes cordis, sicut dixit Hipp. in epidimia. Et non fit phlegma falsum, sicut sciisti, nisi ex aquositate phlegmatis cum cholera acuta. Est ergo cholera, quæ putrefit ignea cinerulentâ permista aquositate plurimæ. Et quoniam caufon uehementiora habet accidentia, quam tertiana, oportet ut sit breuioris spatij quam ipsa. Et senibus quidem parum accidunt febres caufonides: & cum accidunt eis, pereunt: quoniam non sunt in eis nisi a causa ualde forti. Amplius eorum uirtutes sunt debiles: In iuuenibus autem, & pueris plurimum accidunt. & est in infantibus leuior propter humiditatem eorum. Et quandoque est in eis cum profundatione somni propter eluationem uaporum ad caput. Et Hipp. quidem dixit, quod si aliter accidit in febre caufon tremor, tunc permistio mentis resoluit ab eo tremorem. Et uidetur ut sit illud, quoniam cerebrum calefit ualde, & calefit uerui: & est uerisimile ut sit caufon, & sit permistio mentis, quæ resoluitur per tremorem, propter expulsionem materierum ad neruos. Et plurimum

mum quidem consumitur cum uomitu, & solutione ventris, aut sudore, aut fluxu sanguinis narium.

Signa. Cap. 41.

Signa eius sunt inseparabilitas, & occultatio te-
poris, & uehementia accidentium ex asperitate linguæ, & ex citrinitate eius in primis, & ex nigredine eius secundo. Et ex retentione sudoris nisi apud crism. Et uehementia sitis, nisi accidat rufsis parua, quæ sedat illam sitim sicut dixit Hipp. Et uidetur, ut sit uehementia, sitis eorum propter causam pulmonis: ergo cum mouetur tussis parua, humectatur per id quod currit ad ipsum ex carne molli. Et caliditas in causone quidem secundum plurimum non est ita fortis in exterioribus, sicut fortitudo eius in interioribus. Et est contractio in ea leuior, quam in alijs. Et in facta quidem ex cholera, fortia sunt accidentia mala ex vigilijs, & inquietudine, & adustione, & permissione mentis, & fluxu sang. narium, & dolore capitis, & pulsatione temporum, & profunditate oculorum, & solutione ventris cum cholera pura, & casu appetitus. Et quando accidit infantibus, abhorrent mamillam, & non recipiunt eam, & corrumpitur illud quod sugitur de lacte, & accitat.

Cura causonidis. Cap. 42.

Est cura tertianæ puræ. Et cum indigent euacuatione, sicut cum illis, quæ dicta sunt, tunc festinatio est melior. Complementum uero est apud digestionem. Et non phlebotometur, fortasse enim inflammabit eos: & fortasse inuabit eos, si fuerit illic turbiditas, aqua, & rubedo. Verum indigent subtiliatione, & infrigidatione uehementiore, & infrigidatione actuali eius quod ipsi sumunt. Et cum tumescat uirtus, est necessarium cibare eos, quamuis non appetant: & proprie in eo ex quo resoluitur res plurima: multoties enim aduenit eis bolismus propter priuationem sensus. Et indigent lenificatione in principio fortiori, & curationibus febris acutæ prædictis, secundum omnes modos uel uias narratas. Et quandoque conueniens est ut dormiant apud teporem paruum febris super aquam tamarindorum. Et quandoque ponitur in ea parum camphoræ. Et diligitur eis syrupus acetosus, aut emulsio seminis portulacæ, aut emulsio seminis endiuæ: & barch alzach est eis bona ualde. Et consideret in potatione aquæ frigidæ secundum quod diximus illud. Quod si non fuerit quod prohibeat detur in potu de ea etiam usque ad infrigidationem uehementem, uel usque ad extinctionem. Et fortasse aduenit eis permissio mentis, & obliuiscuntur perere aquam: quare oportet, ut sor-

beant de ea qualibet hora paulatim, paulatim sorbitiones plurimas: & proprie in eo cuius linguam uides siccam. Et cura accidentia eius superflua cum eis, quæ diximus in capitulis suis. Et oportet ut caueatur in eis superfluitas sanguinis narium, est enim de eis in quibus magnificatur timor apud eos. Et oportet ut obseruetur anhelitus eorum: & non dimittas partes pectoris spasmarum. Et oportet ut obserues capita eorum cum aceto, & oleo rosaceo, & sandalis, & aqua rosacea, & camphora, & his similibus. Et embroces cum decoctionibus in quibus decocta sunt ea, quæ diximus. Et quando fortes sunt in eis uigiliæ, tunc cura eos. Et non est malum, ut in potu des syrupum de papauere etiam, & si sit de nigro, in huiusmodi dispositione. Et in fine eius da in potu trochiscos, qui conueniunt eis, sicut sunt trochisci de camphora. Et in illa hora conuenit eis syrupus acetosus cum emulsione seminis cucumeris, & seminis endiuæ, & seminis portulacæ, de unoquoque eorum sit pondus, drach. 2. Et syrupi acetosi sit pondus, drach. 25. usque ad 35. secundum quod uidetur. Et si fuerit illic uentris solutio, tunc dentur trochisci de spodio constrictiui. Trochisci boni. Recip. spodij, ros. ana drach. 2. f. croci sextam, drach. 1. seminis portulacæ, seminis endiuæ ana drach. 3. seminis cucurbitæ, seminis cucumeris ana drach. 1. sandalorum, drach. 1. f. succi liquiritiæ, amyli ana drach. 1. camphoræ sextam, drach. 1. f. & dosis eius sit drach. 1. Et iterum ros. drach. 4. sem. melonis, alchazar & alcheta, & portulacæ omnium ana drach. 2. croci tertiam, drach. 1. camphoræ sextam, drach. 1. gummi, amyli, dragaganthi, succi liquiritiæ ana drach. 1. dosis eius, drach. 2. Et cum declinat agnitus manifeste, tunc non est malum uti balneo, cuius aqua declinat ad frigus. Et illi in quibus magis diligitur balneum ex eis, sunt quorum febris est ex phlegmate falso.

De febre sanguinis. Cap. 43.

Opinatus est Gal. quod non sit febris sanguinis putredine sanguinis. Nam sanguis cum putrefit, fit cholera, & non est sanguis: fit ergo tunc febris cholericæ, non sanguineæ: & fit causon prædictus aut tertiana: & cura eam cum illa cura. Hic uero sermo eius est contrarius sermoni Hipp. & contrarius ei quod est conueniens: & plurimum quidem erroris eius est in sermone eius: quando putrefit sanguis, fit cholera: iste enim sermo facit opinari duas intentiones, quarum una est: quod quando putrefit, peruenit ad hoc, ut fiat post putredinem cholera: sicut dicitur, lignum quando inflammatur, efficitur cinis, & secunda, quod quando putrefit, fit in dispositione qua ipse putrefit cholera: sicut dicitur, quod lignum quando calefit, fit cinis. Consideremus itaque in unaquaque duarum propositionum Intel-

Intellectus vero primus est corruptæ acceptionis tribus modis, quorum primus est, quod sanguis quando putrescit conuertitur subtile eius ad choleram malam, & spissum eius ad melancholiam: non ergo cum totalitate sua fit cholera. Et secundus est, quod illud fit post putredinem: & nostra consideratio est in dispositione putredinis, & tertius est, quoniam post illud fit cholera, & non scimus, an in ea sit putredo, an non: nam plurime res putrescunt, & separatur ex eis subtile, & spissum: & non est in spisso, neque in subtrili putredo: quoniam non est necessarium ut fit putridum id, quod generatur à putrido: fit enim ex putredine, quod non est putridum. Et si generatio eius à putredine faceret putredinem eius necessariam, oportere ut esset spissum cinerulentum iterum putridum: esset ergo illic febris melancholica iterum: hoc ergo est illud, quod facit esse necessarium expositio eius, quod primo intellectum est. Quod vero intelligitur secundo, est mendacium purum, quoniam putredo est via corruptionis: & putredo quidem habet tempus. Et conuersio sanguinis in choleram non fit in tempore. Immo putredo quidem est corruptio accedens sanguini dum est sanguis: sicut accedit phlegmati dum est phlegma: & non fit cholera, neque melancholia, nisi conuertatur post illud cum complemento putredinis. Verum veritas sana est sermo Hip. quod ex sanguinis putredine generatur febris. Dicamus ergo nunc quod febris sanguinis est febris putredinis, & febris calefactionis, & ebullitionis, quam nominauit Hippo. synochum conclusum non alias. Et plurimum ebullitionis eius est ex oppilatione suffocante caliditatem. Et quandoque fit à causis alijs, quæ vehementes sunt supra vehementiam febris ephimeræ. Et quandoque nominantur inflammaturæ vel incensuræ fortes: & est de summa febrium, quæ sunt inter febres putredinis, & febres ephimeras: quæ differunt à febribus ephimeris, propterea quod calefactum primum in ea est humor: & differt à febribus putredinis, quoniam non est ei putredo: & est febris acuta, non febris ephimera, neque febris hectica, neque febris putredinis. Et multoties quidem permutatur ad febrem putredinis, aut febrem hecticam. Et multoties quidem facit eam currere Gal. cursu febrium diei. Et videtur Gal. quod febris sanguinis non componitur cum reliquis febribus, quoniam putredo in sanguine est communis omni humori: & in hoc est contradictio quibusdam intentionibus suis, in quo non est necesse prolongare sermonem, quoniam non inuatur cum eo medicus. Et causa quidem huius febris est repletio, & oppilatio, & plurimum eius est exercitio proprie non consueto: & dimissio euacuationis, deinde usus exercitij laboriosi. Et quandoque facit putredinem in eo multa aquositas sanguinis ex commestione fructuum aquosorum, quare conuertitur ad putredinem: & multitudo humoris cru-

di in eo est propinqua, quare præparat ipsum ad putredinem: sicut qui generatur ex alcheta, & alcheta, & piris & similibus. Et hæc quidem febris est continua, quæ non repescit propter contumacitatem materiei, & eius adhaerentiam usque ad crism, aut mortem: & eius species sunt tres, quarum saluior est paracasticus incipiens cum difficultate. deinde non cessat diminui, quoniam resolutio in eo est maior quam putrefactio. Deinde est homotenus: & fortasse similatur septem diebus. Et nequior eorum est acmasticus, quoniam resolutio in eo est minor quam putrefactio, & eius crisis est usque ad septimum secundum plurimum. Et eius consumptio est cum euacuatione, aut sensata, aut insensata. Et quandoque permutatur ad causonidem, & ad sursen: & quandoque permutatur cum in frigidatione plurima ad lethargiam, & quandoque permutatur ad variolas, & morbillum: & quandoque accidit in ea ventositas, & inflatio ventris, ex qua prouenit sicut vox tympani, & non deponit eam ventris solutio cum inquietudine. Et quando solutio ventris non valet, deinde egreditur alaf viridis lata proprie est de signis mortis.

Signa.

Cap. 44.

Signa febris sanguineæ sunt adhaerentia febris: & rubedo faciei, & oculorum. Et inflatio ventrum, & temporum. Et repletio completa absque rigore. Et non est sudor nisi apud crism. Et multoties associatur ei pruritus in naso, & in loco ventosato, vel ubi iam posita fuerint ventosæ: & constructio in anhelitu: & multoties accidit eis profunditas somni, & difficultas sermonis, & est malum: & similiter apostema gutturis, & duarum amygdalarum, & vix: & cursus lachrymarum. Et caliditas eius est plurima humida vaporosa similis caliditati balnei non sicca, sicut in causonide: & pulsus eius est magnus, lenis, fortis, plenus, velox, frequens valde, diuersus, non plurimæ diuersitatis, & est minoris diuersitatis, & velocitatis quam in causonide & in tertiana. Et non est caliditas eius in termino causonidis, & tertianæ fortis. Et illius quæ ex ea est à putredine, & caliditas, & accidentia sunt vehementiora, & cura eius est difficilior, & magis similis cum causonide. At vero subtilitas sang. & grositudo cognoscuntur propter illud quod egreditur de eo. Et synocha feruida est res magis similis in principio sui febri ephimeræ: verum caliditas eius est parua mordicationis, & lationis: & inuenit ex ea inflammationem, & dyspnoeam, & est plurimum impressionis eius prope cor. Putrida vero est æqualis, & similis æquali secundum plurimum. Signa autem permutationis eius sunt cuiusque eorum ad quod permutatur & pfocationis, & apostematum gutturis, & duarum amygdalarum: & tu iam sciisti ea. Et signa variolarum scies: & signa sursen, & doloris capitis.

lis, & permissionis mentis, & aliorum iam sciuit. Signa vero longitudinis eius, sicut iam sciuit, sunt: ex postpositione signorum digestionis, & ornate faciei, & diversitate dispositionis eius in spatio suo ex additione, & statione, & diminutione, ita ut sit quasi ipsa sit tepida. Illud enim significat, quod sang. est plenus humore crudo. Spatium vero crisis eius significant apparitione signorum digestionis: quæ si tardatur usque post tertium, & quartum, non fit crisis in septimo. Et auloties: quidem fit crisis eius in quarto.

Cura febris sanguinis. Cap. 45.

Intentio in curatione febris sanguinis est evacuationio plurima usque ad syncopim. Et ingrossatio substantiæ sanguinis, si fuerit subtilis valde aquosus, aut cholericus. Et in frigidatio eius, & mundificatio, & subtilizatio ipsius si fuerit grossus & iam sumplerit æger prius generatiua sanguinis grossi, & generatiua humoris crudi. Et digestio materiei facientis febrem, & eius resolutio. Evacuatio autem non est aliqua sicut phlebotomia ex manu, in quacunque hora accidat: & non expectatur crisis, neque digestio. Nisi sit repletio nauseatiua: tunc enim caue eam, & remoue ipsam. Quod si febris perseverauerit, tunc phlebotomia: & non cesses phlebotomare, donec æger appropinquat syncopi, aut cadat in syncopim, si corpus fuerit forte: syncopis nanque in frigidat complexionem fortem. Et scias quod phlebotomia, & sumere in potu aquam frigidam quandoque exculant à regimine alio. Et partitio quidem in ea est melior si non fuerit quod necessariam faciat festinationem: nam fortasse erit in ea, quæ est infra appropinquationem syncopis, sufficientia vel ultimatio in curatione. Et fortasse sequetur phlebotomiam ultimam statim fluxus ventris cholericus, & sudor, quæ oportet omni hora abstergere ita quod abstergio successus fiat vel abstergio continue succedat sudori, fortasse. n. saluabitur cum eo. Et succuratur ei, quod accidit de debilitate, & syncopi cum cibo subuli, & quiete. Et oportet ut continetur lenificatio naturæ cum illis, quæ sciuntur de illis, quæ sunt sicut aqua duorum granatorum. s. dulcis & muzzi usque ad terminum, & siracost, & tamarindi, & collyria leuia de quibus diximus. Et quandoque est necessarium apud digestionem euacuare cum eis, quæ sunt sicut myrabol. & fumus terræ, & casia fistula, & his similia de illis, quæ sciuit. Quod si dispositio non tolerat phlebotomiam in manus phlebotometur vena, quæ est inter duo cornua frontis, aut ponantur ventosa. Si autem non preparatur aliquid eorum, & hoc propter accedens quod prohibet, tunc fac solutionem ventris secundum modum, qui est in causonide. Et in frigidatio sit cum eis, quæ aperiunt, & incidunt, & sedant ebullitionem. Et si acciderit ex phlebotomia syn-

copis, ciba enim pane, & aqua cresta. Quod si accidat fluxus sang. narium per se, non abscondant nisi cum appropinquantur syncopis. Sanguinis vero ingrossatio fiat cum eis, quæ sunt sicut rob iububarum: & est, ut decoquantur. c. iububarum lib. v. aquæ, donec remaneat tertia, & inspilletur cum zuccaro: & quanto plus minoratur zuccaro, tanto est melius. Et lentes iterum proprie preparate cum aceto acetoso forti sunt huius generis. Et caue ne des in potu rob iububarum, aut corpus lentium, materia existente grossa. Eius vero in frigidatio sit cum eis, quæ sunt sicut aqua lentium in frigidata: & aqua lactucæ in frigidata: & sumenda in potu aquam frigidam, si non fuerit quod prohibeat: & fortasse sumitur in potu donec tremere faciat, & in frigidet vehementer, forsitan enim sanat eum. Et quandoque permuratur febris ad phlegmaticam, & curatur cum trochiscis de rosæ, & similibus. Et hæc quidem cura est quorundam antiquorum: & secuti sunt eam quidam modernorum. Dase autem in potu aquam hordei, est curatio conferens ei, sed cum lenitate naturæ. Et melior horarum ad hoc, est hora vehementis ebullitionis, & angustie, & inflammationis, & frequentie casachan. Et scias quod esse contentum in frigidatione, & dimittere phlebotomiam, & ventris solutionem, addit in oppilatione, & coarctatione: quare additur pueredo & caliditas in secunda dispositione. Mundificatio autem facit secundam diversitatem exigentis virtutis, & debilitatis, cum digerentibus humorem crudum, quoniam fortasse ipse est causa in putrefactione sanguinis. Et in fine eius da ei in potu, quæ sunt sicut trochisci de camphora, & trochisci de spodio. Et isti etiam trochisci sunt boni. Recip. spodij drach. 3. seminis portulacæ drach. 5. seminis cucumeris drach. 4. seminis cucurbitæ drach. 6. gummi, & dragaganthi, & amyli omnium ana drach. 3. succi liquiritie pondus drach. 7. fiant ex eis trochisci. Descriptio alia, & proprie apud debilitatem hepatis. Recip. rosarum drach. 3. succi berberis drach. 2. seminis cucumeris, & melonis, & alchethæ 1. cucumeris anguinalis, & portulacæ, & spodij omnium ana pondus drach. 1. gummi, & dragaganthi, & amyli omnium ana drach. 5. rauid sceni, & eroci, & camphoræ omnium ana pondus quartæ drach. 1. fiant trochisci. Cibi vero sint illi qui sunt ex iumbis, & illi qui sunt ex lentibus cum aceto, & granatis, & sumach. Et si sit aliquid eorum constructio cuius timeatur, frangatur cum siracost, & prunis, & cum cibo qui sit de cucurbita, & cum cibo qui sit de succo limonum vel ex acetositate citri vel aramiorum. Et eius fructus sint pira de sceni, & granata, & mala de sceni. Et eius olera sint alchethæ, cum er anguinalis, & cucurbitæ, & alchethæ, & endiuia, & portulaca, & herba dicta acetosa, & cotiandrum, & quæ sunt eis similia. Et si accidat dolor capitis, aut pulsus cordis, aut vigilia, aut profunditas

*auditas somniant fluxus sanguinis narium super
fluus, destruens virtutem; & alia de accidentibus
difficilibus; cura cum eis, quæ docuimus te in
loco suo.*

De febre phlegmatica. Cap. 46.

Sciisti quod febris putredinis phlegmatis quandoq; est paroxysmalis: & quandoq; est inseparabilis & sciisti causam in hoc. Et sunt ei horæ sicut reliquis febribus, & minor horarum sui principij secundum plurimū est 18. dierum: & eius eradicatio in pluribus est inter 40. & 60. dies. Et saluior earum est illa, quæ est mundorum teporū, & præcipue illa, quæ est multi sudoris: significat enim subtilitatem materiei, & paucitatem eius, & raritatem corporis. Longior ergo partium huius ægritudinis est augmentum: quamuis eius declinatio iterum sit longior declinatione tertianæ plurimum. Et phlegma quidē putridum quandoq; est vitreum: & quandoq; est acetosum: & quandoq; est dulce: & quandoque est salum: & tu iam sciisti quomodo ex falso sit causon. Et plurimum quidem accidit febris phlegmatica humidis: & ætiose viuentibus, & senibus, & infantibus, & patientibus nauseatiuam satietatem, & exercitantibus, & balneantibus se super repletionem, & habentibus seruatiuam acetosam, & habentibus repletionem, & patientibus, & descensum catharri ad stomachum, qui putrescit in eo. Et parum quidē euacuatur à leſione in ore stomachi. Et sciās quod cum omni febre cum qua est frigus, constringitur pulsus, & minoratur.

Signa phlegmatica periodica. Cap. 47.

In illa quidem in qua causa est phlegma vitru, aut acetosum, frigus multiplicatur valde. Et rigor in vitreo est vehementior. At frigus non incipit in ea subito, immo paulatim in extremitatibus: deinde perueniunt ad hoc vt fiant sicut nix, quæ non caleſcunt niſi cum difficultate, neque caleſcunt subito, neq; secundum gradationem continuam: immo paulatim cum reditu frigoris, & fortasse commiſcetur frigori eius in principio horripilatio. Fit ergo frigus propter illud, quod non putrit: & horripilatio propter illud quod iam putruit. Et maius frigus eius, & ipsius rigor, sunt in periodis status. Et hæc quidem febris non est ex materia, quæ faciat punctionem, ita vt sit causa rigoris secundum viam expulſionis, putredo nāq; eius est putredo rei lenis. Et incipit cum grauitate, & profunditate somni. Et multoties incipit in paroxysmis primis sine frigore, & sine rigore, immo postponitur vsque ad tempus: & fortasse erit frigus, & non erit rigor. Et multoties incipit cum ſyncopi, & quandoque non fit. Et in hac quidem ægritudine multiplicatur ſyncopis propter debi-

lilitatem oris stomachi, & casum appetitus, & priuationem alitimbres: quæ est præparans materiā nutritiui, & virtutis. Illam vero, quæ est ex phlegmate falso, antecedit horripilatio, & non fit vehemens frigus eius. Illam autem quæ est ex phlegmate dulci, raro antecedit in principio vsque ad plurimos paroxysmos horripilatio, neque frigus, neque rigor. Et plurimæ quidem periodi febris phlegmatis incipiunt cum ſyncopi: Et iam apparet in ea in principijs calor vehementior: & in postremis minoratur illud. Et videtur vt sit causa in hoc, quoniam putredo antecedit prius ad magis dulce, & magis salum, & magis subtile, deinde ad grossius & frigidius. Et tactus caliditatis eius in primis est debilis, & vaporosus, deinde cum prolongatur positio manus super membrum, sentit manus acuitatem & mōrdicationem. Veruntamen non est similis, neque æqualis in omnibus super quæ cadit manus: immo est diuerſa: quoniam inuenit in loco vno aduſionem, & in loco alio lenitatem: & est quasi caliditas coleretur post rem cribellatam: quoniam phlegma viscosum est, quare diuerſificatur eius passio & eius subtilitatio à caliditate: sicut accidit in reliquis viscosis cum ebulliunt: ipsa enim disrumpuntur seu vesicantur in quibusdam locis, & non disrumpuntur seu & non vesicantur in locis alijs. Et qualiscunque si caliditas eius secundum plurimum minor est, quam vt inflamet, & angustiam faciat, & magnificet desiderium aeris frigidi, & aquæ frigidæ, neque huiusmodi caliditas declinat ad discooperturam & inquietudinem, & magnificationem anhelitus, & exufflationem. Et multoties quidem accidit caliditati eius ut stet ad quantitatem horæ unius aut duarum horarum, qua existimatur quod ipsa iam peruenit ad statum, cum ipsa adhuc sit in augmento: uidebis enim eam iam incipere augmentari: & similiter sunt ei in declinatione stationes. Et febres quidem phlegmatis sunt multæ humorositatis uel roritatis in cute propter multitudinem humiditatis, & uaporis sui, pauci sudoris propter viscositatem humoris. Et cū sudare facit, est res non exuberans. Et de prioribus significationibus eius, est paucitas sudoris, et priuatio eius. Et sitis quidē minoratur in febribus phlegmatis, niſi propter causam falsedinis, aut causam uolentiam putredinis eius: et cum hoc est minor, quam sitis quæ est in alijs. Et inflatio laterum multiplicatur in eis. Et quandoque accidit cuti lateris, ut subtilietur cum tensione. Color autem patietium phlegmatis febrem, est decliuus ad uiriditatem, et citrinatatem, currentes in albedinem: ita ut sit illud quod aggregatum est, sicut color plumbi ita ut in statu etiam. Et raro quidem rubet color in eo cuius rubedo sit rubedo in statibus reliquarum febrium. Pulsus uero eius est pulsus paruus, submersus, debilis, rarus in primis, deinde fit frequens in fine. Et frequētia quidem eius et eius paruitas, uehementior,

tior est quam frequentia quartana, & tertiana: & eius paruitas, & vehementia: frequentia eius est; propter vehementiam paruitatis ipsius: verum non est velocior pulsu quartana: & quandoque est tardior eo: aut similis ei in primis, & est vehementis diuersitatis, cum priuatione ordinis. Et parui, & debiles ex eis, sunt in diuersitate eius plus. Et significationes quidem pulsus super eam sunt de certioribus significationibus. Urina autem eius in primis quidem est alba, subtilis propter multitudinem oppilationum, & frigoris: deinde fit rubea propter putredinem, & conturbatur propter malitiam digestionis, & quandoque alteratur in ea dispositio hora post horam. Et quando remanet ex materia grossa, & resoluitur putridum, & redierint oppilationes dealbabitur urina, deinde quando putrefit res plurima post illud & expellitur, & aperiuntur oppilationes, rubet usquequo redeat ad oppilationes, quod oppilet eas vice alia de illo eodem humore. Eius vero egestio est lenis, subtilis, phlegmatica. Et de eis, quae significant quod febris est phlegmatica, est ut sit paroxysmus eius 18. horis; & dimissio eius 6. horis: & non est dimissio eius, dimissio munda, quoniam materia cum grossitudine, & viscositate est multa. Et significat ipsam aetatem, & consuetudinem, & tempus, & regio, & cibi, & aduentus causarum antecedentium ex aetate naufragia: & significant ipsam formam praedictam ex colore faciei, & inflatione eius, & lenitas tactus: & debilitas oris stomachi, & casus appetitus. Et quandoque magnificatur in ea splen, & antecedit eam eructatio acetosa in pluribus horis multoties.

Signa phlegmatica inseparabilis, & est illa, quae nominatur latica. Cap. 48.

Sunt sicut reliqua signa febris phlegmaticae, praeter eradicationem, & quod simulatur eradicationi. Et praeter inceptionem cum rigore, & frigore & horripilatione, & est res magis similis hecticae & est istic tepor in sex horis, & simile ei supra illum qui fit in continua, quoniam periodica etiam non euacuatur a tepore qui tamen est occultus non apparens. Febres, quae sunt secundum plurimum de genere phlegmaticarum, & sunt quandoque ex cholera: & non sunt ex eis, quae fiunt ex melancholia appropriata cum nominibus, & iudicijs. Et sunt febres empialos, & liparia: quae ambae sunt de summa febrium in quibus diuersificantur loca caloris & frigoris intus & exterius, propter diuersitatem loci eius, quod putrefit, & quod non putrefit. Et ipse sunt tres diuisiones, & sunt febris appropriata nomine syncopalis humerosa, & febris syncopalis minuta, & febris diuturna, & nocturna.

Febris in qua occultatur frigus, & apparet in ea calor & est empialos, i. epiala. Cap. 49.

Haec febris ut ex phlegmate vitreo, comprehenso in oculo, & profundo, quod infrigi-

dat locum ubi est. Verum ipsi accidit iam putredo quare spargitur ex ea vapor eius quod putrefit & dispartitur & inflammat in exterioribus: & illud quod non est putrefactum infrigidat in interioribus. Et eius quidem frigus non fuit apparens in huiusmodi tempore, quoniam fuit quietum consuetum, & patitur ab eo id quod occurrit ei: cum ergo incipit in eo putredo, mouetur, & spargitur sparsione quadam, quamuis non perueniat ad hoc, ut comunicet toti corpori. Signa. Signa eius sunt eadem, quae praedicta sunt. Et quod eius urina est frigida, cruda, minoris caliditatis quam urina aliarum sui generis. Et pulsus eius est rarus, rardus. Et ipsa secundum plurimum additur omni die. Verum propter grossitudinem materiae suae conuertitur quandoque in quartanam, & tertianam, quoniam huiusmodi materia in corpore est paucata & paruae putrefactionis accides raro & paucitas eius est ex causis elongationis periodi, & hoc non extrahit eam ad hoc quin sit phlegmatica, sed ipsa est phlegmatica propterea quod putredo est putredo phlegmatis, non propterea quod paroxysmus redeat omni die. Spatium vero paroxysmi eius est a quatuor horis usque ad 24. horas & secundum plurimum consumitur ante illud: quoniam haec materia non est cum illa multitudine.

Febris in qua occultatur calor, & apparet in ea frigus & est liparia, i. lipyria. Cap. 50.

Haec febris secundum plurimum est phlegmatica, & quandoque est cholericum ex cholera grossa valde. Quomodo autem est phlegmatica est quoniam phlegma intrinsecum quando inflammat & putrefit, calefacit illum locum, & quoniam non resoluitur, non calefacit exteriora corporis cum sparsione vaporis sui calefactione plurima. Et quoniam uirtus effunditur ad locum ubi est lesio, tunc euacuatur exteriora a calore: quare infrigidantur proprie quando in exterioribus sunt phlegmata cruda vitrea frigida. Et iterum quoniam resoluitur multoties ex eo vapor, qui non putrefit, sed ascendit & separatur propter caliditatem, & associatur ei caliditas spatii paruo, deinde separatur ab eo separatione vaporis aquae calefactae. Cum ergo separatur ab eo, & fuit in radice ante putredinem uehementis frigiditatis, redit & infrigidat corpus. Modus autem quo fit cholericum ea est, quoniam cholera, quando est paucata, intrinseca, & putrefit, & calefacit locum, & non resoluitur ex ea aliquid, accidit quod diximus in sua simili ex phlegmate. Et appropriatur haec cholericum nomina taburos. Verum liparia est nomen generis, & est longioris spatii quam haemorrhoeus. Et habet aliquis ut dicat, quomodo erit febris & non procedet in ea caliditas ex corde in totum corpus: illud namque quod narratur, est de genere eius, in quo non procedit caliditas ex corde in totum

totum corpus. Responsio itaque est, quod in diffinitionibus harum rerum attenditur una cōditio, ut non sit quod prohibeat, sicut diffinimus aquam frigidam & humidam, quando dimissa fuerit secundum naturam suam, & non fuerit quod prohibeat: & diffinimus graue quod est illud, quod tendit inferius, quando dimissum fuerit cum sua natura: & in istis omnibus caliditas peruenit ad cor, & procedit in arterias, & spargitur. At uero accidit prohibitio illius, in quibusdam locis, sicut accidit si ponatur pruina uel glacies super ipsum. Nocumētum uero eius necessarium est esse actu.

Febris in qua fit unaquaque duarum rerum, in uno quodque duorum locorum. Cap. 51.

SI hæc febris fuerit, non erit nisi ubi sunt duæ materiæ: frigida motæ, propter putrefactionem quarum una est in interioribus, & altera in exterioribus, & non est aliqua earum plurimæ sparsionis. Deinde cum incipiunt putrescere, mandant unaquæque earum uaporem calidum comprehendentem cum partibus suis, & ubi est frigidum. Et tū quidem iam sciuitur causam in infrigidatione humoris frigidi in dispositione motus.

Febris syncopalis humorosa. Cap. 52.

Hæc secundū plurimum est propter phlegma crūdū spissum uel grossum separatū plurimum, quod iam uincit uirtutem. Et secundum plurimum adiunat malitiam uel nocumētum eius debilitas oris stomachi. Et quando mouetur, & incipit in putrefactione uincit uirtutem plus, & facit eam hesitantem: quæ si dimissa fuerit cum materia, non sufficit cōtra materiam. Et quando occupatio fit in euacuatione eius cum facilitate, fit inobediens, aut mouetur motu præfocante uirtutem. Et quando occupatur in euacuatione eius cum solutione uentris, aut phlebotomia cum labore, non tolerat uirtus: Quomodo enim tolerabit, cum sit illic cum sua quiete syncopis? Et cum hoc toto ipsi indigent euacuatione uehementer. Et iterum ipsi indigent cibo uehementer, quoniam in humoribus eorum non est quod nutriat corpus, & uiuificet ipsum: & corpus eius est priuatum nutrimento. Quod si studueris in cibando, additur in materia aggrauante: & si non cibatur, cadit uirtus. Et accidit in inceptioe sui, ut effundatur ad cor res frigida faciens accidere syncopim, & minoratur pulsus, & tardatur, & fit rarus. Amplius, natura sollicita est in calefactione materiei, & subtiliatione eius: & putrescendo, quæ mouetur in quasdam partes eius adiunat super eam: quare euadit cor à nocumēto frigoris eius, & cadit in nocumētum caloris: eius qua-

re fit pulsus uelox, & proprie in constrictione sua, plusquam sit uelocitas aliorum: quamuis illud quod uincit cum hoc, sit paruitas, & tarditas, & raritas. Et periodus eius est periodus phlegmaticæ, & non alteratur ab ea: & est cum ea inflatio faciei, & mollities corporis. Et colores habentium eam non figuntur super dispositionem unam propterea quod materia eorum non figitur super unam dispositionem immo quandoque est cinerea, & plumbea eius materia, & quandoque fit citrina, & quandoque fit nigra: & quandoque fiunt labia eorum sicut labia comedentis mora. Oculi uero eorum sunt fusci, uirides, exeuntes ualde apud cōmotionem ægritudinis, & fit sicut squinantici. Et quod est sub hypochondrijs eorum, est uehementis inflationis, & similiter uiscera eorum. Et quandoque euomunt acetosum. Et quando est eius apostema in quibusdam uisceribus, tunc non speratur omnino. Et quandoque accidit eis in quibusdam horis ex cholera dominante grossa: & fit cum ea in uisceribus adustio, & euomunt choleam, & sunt ei periodi phlegmaticæ secundum plurimum.

Febris syncopalis minuta subtilis. Cap. 53.

Hæc febris est acuta, faciens cadere pulsus & uirtutem in paroxysmo uno aut duobus paroxysmis cum additione dissolutionis accidente in corpore cum uelocitate. Et quandoque non sufficit cum ea uirtus usque ad 4. & fit ex chymis subtilibus, quorum plurimi sunt cholericis uehementis subtilitatis, & profundationis, malæ substantiæ uenenosæ, cui iam accidit putrefactio in corporibus calidæ complexionis, sicce ualde, & plures paroxysmi huius febris sunt paroxysmi tertiana.

Febris diurna, & nocturna ex phlegmaticis. Cap. 54.

Durna est cuius paroxysmus accidit in die, & eius tepor in nocte. Et nocturna est e conuerso, & utraq; sunt malæ: sed diurna est longior, & deterior: & facit cadere multoties propter longitudinem suam, & suum euentum in calore diei, in hecticam. Et si ipsa non esset sæua, non accideret hora apertionis pororum, & resolutionis uaporis: & non accideret nisi propter multitudinem materiei, & fortitudinem eius. Et est necessarium cum hoc, ut patientes eam cibentur in nocte, & non permittantur dormire super repletionem stomachi: & præcipiantur uigiliæ, & est ex eis, quæ faciunt cadere uirtutem. Et tolerantia febris in calore diei, & uigiliæ in frigore noctis, sunt ex eis magis dignæ quæ faciunt cadere in hecticam: & ad summum est de genere febrium difficilium.

CVra huius ægritudinis diuersificatur secundum horas suas, scilicet principium, & augmentum, & statum, & declinationem. Et secundum apparitionem digestionis in ea, & eius occultationem: Et diuersificatur secundum materias suas. scilicet phlegmaticam acetosam, & phlegmaticam uitream, & phlegmaticam salinam & dulcem. Et omnes eius species communicant in hora principii in tribus rebus: in necessitate lenificationis æqualis, aut vomitus: Et in necessitate administrationis subtiliantium, & in cidentium, & diureticorum. Et cum superuenierint febris dies tres, subtiliatur in ea materia propter febrem: & si ante illud mouebis, nocebis, & non facies aliquid. Et in præseruatione ab aliquo nocimento cum subtiliatione regiminis declinante ad æqualitatem. Et fortasse est contentus aqua hordei in primis tribus diebus, sperando quod sit status eius propinquior, propter subtiliationem materiei aut paucitatem eius. Quod si certe sciretur, quod status eius esset tardus, non subtiliaretur regimen quamuis fames, & somnus super famem, & exercitium super famem, si non debilitant, sint ultima in iuuamento huius ægritudinis, immo declinaretur in principio ad ingrossationem usque ad septimum, deinde gradaretur uerum cura conueniens eger ut subtiliaretur regimen in primis. Si autem status appareret longinquus, possibile est ut succurratur illi cum ingrossatione regiminis: deinde gradetur usque ad horam status, quoniam tempus est sufferens hoc in hac ægritudine, non sufferens in acuta. Cumque pertransierit septimus, non stes tunc super subtiliationem: quoniam illa debilitat, & addit in debilitate oris stomachi. Et quoties senseris longitudinem maiorem, subtilia minus: quamuis subtiliatio eius in ipsa, omnino magis sit necessaria quam in quarta. Et similiter oportet ne festines cibare ipsum cum eis, quæ sunt sicut pulli, & panis cum meaurat nisi timeatur debilitas: aut appareat declinatio. Amplius diuersificatur cura eius, cuius causa est phlegma salinum, & dulce: & cuius phlegma est uitreum, & acetosum, & fit ex eis febris quæ dicitur ferumundus. id est alzheimerie in qua corpus non calefit. Verumtamen in duabus primis necessaria est lenificatio cum medicina leni, & in frigidatio quædam: Et in duabus secundis cum medicina magis laboriosa. Et in duabus primis indiget incisione cum subtiliatiuis, in quibus non est calefactio plurima, quamuis sit exiectio plurima. Et in duabus secundis necessarium est illud quod subtiliet cum incisione, & calefactione cum acuitate, & proprie quando phlegma est permixtum cum melancholia, nam necessaria sunt in huiusmodi ea, quæ sunt sicut diacyminum, & confectio de sulphure, & administratio salforum. Et

conuenientiores medicinæ quæ administrantur in principio, sunt geleniabin usque ad diem septimum. Et non est malum ut administraretur iterum aqua sceniculi, & aqua endiuie, & aqua apij cum geleniabin secundum necessitatem. Et syrupus acetosus est uehementis iuuamenti iterum. Et aqua mellis cum hyssopo, & est possibile ut consequatur per eam illud, quod queritur de lenificatione naturæ. Et proprie cum solutiuo facto de zuccaro & rosis rubeis nominatis perficis: quoniam est solutiuum, & lenitiuum. Et quando necessarium est, ut confortetur eius lenificatio, confricetur in aqua iuleb: & permisceatur si uoluerit cum cassia, & penidiis. Et iterum geleniabin acceptum cum melle terenabin permixtum cum aqua iuleb. Et non fiat assiduatio super ea cum solutiuo in principio, & post ipsum, & proprie quando cum materia est cholera: illud enim perducit ad corruptionem complexionis. Et multi quidem homines dant in potu in principio, sicut est medicina deturbat in omni nocte, & sicut pilule de maltice in hebdomada bis, & sicut pilule de seminibus diureticis. Descriptio medicinæ de turbit. Recip. zinziberis, & mastice amborum ana drach. r. turbit, sicut alcohol. drac. 10. zuccari zabaret. quantum omnia: & detur in potu ei omni nocte aure. 1. & illud fiat quando natura est non lenis. Si enim obedit omni die bis, non indiget hoc. Ego uero non diligo nisi expectationem digestionis, & lenificationem cum eis, quæ diximus prius: immo oportet ut euacuetur ex ea aliquid, & expectetur in reliqua usque quo digeratur: & fiat illud comacilitate paulatim, absque superfluitate, deinde perueniat ad diuretica. Et similiter abhorreo quod est simile aquæ prunorum, & tamarindorum, & similibus de illis, quæ debilitant stomachum, & solunt subtile. Et si materia fuerit declinans ad additionem frigoris, misceatur cum ea medulla cartami. Et si fuerit materia ad choleram declinans, misceatur cum eo syrupus uiolæ aut uiolæ conditæ, & siracost, aut uiolæ siccæ contritæ. Et adiuues cum clysteribus leuibus, factis ex melle, & sale, & aqua siccæ, & oleo sisamino. Et uomitus fiat cum aqua raphani, & raphano infuso in syrupo acetoso cum seminibus, & his similibus. Et si necessarius est uomitus plurimus propter multitudinem eius quod accidit ei de nausea, & alteratione saporis oris, administrantur grana raphani, & bibatur ex eis usque ad auream cum aqua frigida. Et uomitus quidem cum eo quod est in eo de debilitate stomachi, est uehementis iuuamenti ualde, & est ultimus huius ægritudinis. Oportet ergo ut expectetur in eo septimus, ut non accidat ex eo in principio debilitas apostemans corpus stomachi. Et si sit difficilis in eo uomitus, non prouoces ipsum super ipsum cum laboribus. Et si accidit uomitus, & proprie in principio periodi, non retineatur nisi superfluat, & debilitet

et, tunc enim restringatur sicut cum mīa, & syru-
po de menta, quæ dicemus post. Et si accidat do-
lor capitis, administrantur embrocæ ex chamæ-
milla cum immisione quatuor extremorum in
aqua calida, & ligatione crurium cum fortitudi-
ne. Et si indigeretur aqua hordei, administretur de-
cocta cum radicibus quantitate moderata: aut mi-
sceatur cum ea syrupus acetosus de melle, si non
acerat in stomacho: aut aqua mellis, si acerat. Et
melior hora in qua datur in potu illud, est, si fue-
rit in aqua eius in principio rei tinctura. tunc enim
oportet ut in potu detur in primis de geleniabin,
deinde detur in potu post ipsum duabus horis
aqua hordei. Et non oportet ut fiat inunctio cum
unguentis resolutiuis: & neque embrocatio fiat
cum embrocis subtiliariis: cum ægritudo est in
principio: & humor est in corpore ambulans: ipsa
enim mollescit uiscera sua calefactione humi-
da. Et alienetur aqua frigida. Et quoties uide-
ris urinam grossiorem; & rubicundiorē, non
erit malum si phlebotomaueris. Et necessarium
quidem est, ut redeas tunc ad syropos acetosos.
Et scias quod fricatio est de curationibus iuuantibus
eos: & quanto fuerit phlegma viscosius, & gros-
sius, tanto erit fricatio magis conferens. Et dicitur
quod fricatio cum tela araneæ cum oleo est iuuariua
valde. Et quando incipit ægritudo augmentari,
& post illud, tunc fit tibi sollicitudo plus de ore sto-
machi, & quod ipsum confortat. Et sint masti-
cationes factæ ex menta, & mastice, & aniso: Et
administretur vomitus cum raphano, secundum
quod diuimus cum minoratione cibi. Et sit cum
geleniabin quod in potu datur in principio. Et
post septimum permistum quod confortet os sto-
machi: Et sit in eo prouocatio plurima, sicut ani-
sam, & mastix. Et sit cum aqua calida; & pro-
pria in principio periodi: nam ipsum resistit rigo-
ri & frigori, & extinguit cum hoc situm, si excitata
fuerit. Et multoties quidem conceditur euacu-
tio phlegmatis, & humoris crudi in hac hora, sed
melius est ut expectetur in ea complementum di-
gestionis. Et quando ægritudo incipit cum calo-
re, & assiduatur, iuuatur cum huiusmodi trochi-
scis. Recip. myrobolanorum citrinorum, aloes,
succus eupatorii, succus absinthii, omnium ana drac.
5. croci, & mastice, amborum ana drac. 6. infor-
mentur trochisci, & sumatur ex eis omni die pon-
dus drach. 7. & omni nocte pondus drach. 5. Et cum
uides quod digestio apparet, adiuua eam cum eis,
quæ sunt sicut folia apij, & feniculi, & radices squi-
nanti, & capillus ueneris. Si autem scias quod ma-
teria est frigida ualde, non est malum uti pipere
paucis, & uti uino, paucis, subtili non plurimo. Et
quandoque adiuuant unguenta resoluentia ad di-
gestionem, & resolutionem cum uirtute forti: &
sunt convenientiora in hac ægitudine, quam in re-
liquis febribus. Et oportet ut consideretur in hoc
uirtus, & febris, & rigor. Quod si uirtus fuerit for-

tis, & febris non fuerit saua ualde, adde in uirtute
unguentorum, & si non, administrantur olea sub-
tilia, quæ ad æqualitatem sunt decliua. Et quan-
do pertransit. 14. tunc necessarium est administra-
re, quod subtilizat plus: sicut feniculum, & apium:
& fortasse indigemus semine amborum, & aniso,
& eo quod est sicut syrupus acetosus cum semini-
bus, in quo ponuntur hyssopus, & albaſce: & admi-
nistratione trochiscorum de rosis: & fortasse est
necessarium addere in eis propter stomachum,
tus, & mastice, & cyperum, & absinthium, & his
similia secundum quod exigit illud quod præsens
est. Et uinum subtile confert eis in hac hora cum
subtiliatione sua: & quia confortat calorem inna-
tum, & quia prouocat, & sudare facit. Et cum uide-
ris digestionem, & fortitudinem, dabis ei in po-
tu post illud trochiscos de absinthio. Et cum ui-
deris frigus in principio paroxysmorum nocere,
& ægritudo non est in principio, da in potu aquā
calidam in qua decocta sunt ea, quæ sunt sicut se-
men apij, & anisum, & ozimum: & administra bis
iterum huiusmodi, & fortiora eis embrocando, &
vaporando, & huiusmodi. Et quandoque datur in
potu ad rigorem uehementem decoctio, secun-
dum hunc modum. Recip. zinziberis, origani,
ameos, omnium ana drac. 3. coriandri, drac. 4. ro-
sarum, calamentum amborum ana drac. 3. passula-
rum drac. 7. decoquantur secundum descriptio-
nem, & sit dosis unc. 3. Et cum uideris digestio-
nem completam, tunc fiat euacuatio & prouoca-
tio cum eo in quo est fortitudo, & detur in potu
sicut de bidcheribita. Et si fuerit materia ex frigi-
diori phlegmate, dabis in potu theriacam: & den-
tur iterum in potu trochisci de rosis magni cum
aqua feniculi: & deturei omni nocte medicina
de turbit: & pilule de aloe factæ cum speciebus
uel aromatibus. Et ad illud est decoctio huius-
modi. Recip. hieræ drac. 7. turbit drac. 10. my-
robalanorum nigrorum drac. 5. eupatorii drac. 5.
salis indi. dra. 2. bedeoard, suchaha omnium ana
dra. 4. anisi dra. 3. decoquantur cum aqua apij, &
sumatur de ea in potu secundum quantitatem ne-
cessitatis. Et fortius illo est illud quod Recip. dua-
rum radicum, & radices liquiritiæ omnium ana
drac. 10. hieræ drac. 8. succus eupatorii dra. 5. semi-
nis apij, & feniculi omnium ana drac. 4. spicæ,
menta amborum ana drach. 7. fiant ex eis trochi-
sci, & administrantur. Decoctio bona. Recip.
duarum radicum ambarum ana drac. 10. passula-
rum enucleatarum drac. 7. anisi, & mastice ambo-
rum ana drach. 3. bedeoard, & suchaha, & eupa-
torij omnium ana drach. 4. decoquantur in libris
tribus aquæ usquequo redeat ad libram unam
aquæ, & sumatur in potu aliquot diebus in ie-
iunio. Trochisci homi apud chronicas febres, &
uehementiam rigoris. Recip. hieræ, succus eupa-
torij, absinthij, suchaha, bedeoard omnium ana
drach. 5. seminis apij, & feniculi, anisi omnium

ana drac. 3. sal. naptici drach. 4. seminis cuscute
myrobalanorum. rebulorum omnium ana drac.
10. agarici drac. 15. trochiscorum de ros. drach.
20. turbit drac. 30. fiant ex eis trochisci: & sunt so-
lutivi. Et iterum aloes, myrobalanorum citrinorum
& reubar. masticis, succi eupatorii, absinthii
omnium ana partem. 1. croci partis unius medietate
tem, terantur, & administrentur. Et iterum hie-
re, myrobal. rebulorum, salis omnium ana drach.
4. seminis apii, & feniculi, & anisi omnium ana
drach. 15. absinthii drach. 5. trochiscorum de ro-
sis drach. 3. suchaha, bedeoard omnium ana drac.
2. terantur, & informentur pilulæ. Decoctio bo-
na. Recip. eupatorii drach. 5. & radicis lili, & radi-
cis liquiritiæ, & ameos omnium ana drac. 3. semi-
nis apii, feniculi ana drac. 4. rosarum drac. 5. de-
coquantur omnia, & sit dosis eius omni die. drac.
3. Et iterum radicum triu omnium ana drach. 10.
seminis anisi, apii omnium ana drac. 2. suchaha be-
deoard, eupatorii, absinthii omnium ana drac. 5.
centaureæ drac. 3. decoquantur, & bibatur unc. 4.
Et iterum herbæ eupatorii, fumiterræ, bedeoard,
suchaha, absinthii omnium ana drach. 5. passula-
rum drac. 2. myrobalanorum citrinorum drac. 10.
Et hæc quidem cura est salso, & ei in quo vincit
cholera magis conveniens. Et agaricum cum de-
co fumitur in pulvere ex drac. 1. vsque ad drac. 1.
& tertiam, diebus continuis prohibet elongari
ægritudinem. Sumatur ergo pulvis ex eo, & com-
miscetur cum melle, & bibatur. Et semen vitiæ
post digestionem est mirabile valde, sumpium in
modum suffus, aut cum melle. Verum si volue-
rit pilulas solutivas, oportebit ut addat in eis pro-
pter debilitatem hepatis reubarbarum & semen
cuscute: & propter debilitatem stomachi masticæ,
& anisum: & propter debilitatem splenis, & gros-
situdinem eius radix capparidis, & scolopendria: nam
multoties associatur huic ægritudini splen: & for-
tasse oportet, ut addantur propter ipsum ciperi,
& grana de ben, & fenugracum: & consideretur
cum hoc dispositio vehementiæ febris, ut non ac-
cidat uehementia calefactionis. De euacuationibus
uero quæ sunt fortiora, & indiget eis in hac
ægritudine apud digestionem, est ut augmente-
tur dosis de pilulis de turbit: & administretur cly-
steria fortia. Et de illis sunt pilule istæ. Recip. ma-
sticis sextam drac. 1. succi absinthii quartam drac.
1. pulpæ coloquintidæ sextam drac. 1. hieræ picræ
drac. 5. agarici drac. 5. informentur pilulæ cum sy-
rupus acetoso mellino, & sumantur in potu. Et
de illis sunt pilulæ de masticæ, & de aloë. Quod
si materia fuerit ad caliditatem decliuus, suman-
tur de trochiscis de spodio solutiuus tres trochisci
& de turbit aure. 1. scammonæ aure. 5. succi eupa-
torii aure. 2. & dentur in potu secundum quantita-
tem uirtutis. Et iterum eupatorii, absinthii, ca-
pilli ueneris, & myrobal. fumiterræ, passularum
mundatarum æquales sumantur partes & dentur

in potu secundum quantitatem necessitatis. Et si
non suffert corpus solutionem ventris, perueniat
ad diuretica, & subtiliatiua, & sudare facientia.
Et de summa illorum quibus indiget tunc
est infusio aloes cum melle. Et quando declinat
ægritudo, non est tunc introitus balnei ante ci-
bum malus. Cibi autem eorum sint subriles, sicut
acerum & oleum: & quandoque ponitur in eis pa-
rum almuri, & proprie in sine eius. Illi autem qui
sunt fortiores, sunt altheiugi & pulli & alcebugi,
& his similia, et post declinationem. Et oportet
ut ponantur in eis, & proprie apud digestionem
ea in quibus est incisio, sicut acerum, & sinapis, &
almuri. Et si fuerit phlegma acetosum, ma-
lum, viscosum, porrum, & aqua ciceris sunt de
melioribus cibus eis: cum ponuntur in eis cym-
num, & anethum, & oleum. Et iterum beared
facta ex sicla, & almuri, & aceto, & oleo abluto,
alchamach, sicut alchamach de capparibus, &
chamach de anetho, & origano, & aniuden, &
alparagis. Et deuentur olera in quibus est infu-
gidatio & humectatio. Et hora cibi est post te-
porem paroxysmi, & eradicationem eius, & ante
paroxysmum ad minus quatuor horis. Men-
tura autem somni eorum est ut sit æqualis uigilia
ut sit digestio materiei ad somnum, & resolutio
ad uigilias. Et balneum quidem est uehementis
nocumendi nisi post declinationem. Et succur-
ritur uomitui eius quando superfluit: Et oportet
ut administretur in illo quod sit sicut maza, &
syrupus de granatis cum menta simul cognitus.
Et si necessarium est fortius, sumatur de gra-
natorum muzorum drac. 10. & turis albis, &
masticis amborum ana drac. 5. mentæ drac. 7. de-
coquantur in duabus libris aquæ, in quæ sunt do-
neque ad medietatem perueniat. Et succentratrat
xui uentris eius, cum superfluit, cum retentione
eius cum eis, quæ sciuit de stypticis ægritudinis
cibalis, & medicinalis. Sed etiam quidem debilita-
tioni succurritur ut cibetur successione eius pul-
lis assatis, & in patellis coctis: & ut adhibeantur
suffumigationes, & odores uiuicantes. Et si
acciderit inflatio in facie, & extremitatibus, inuan-
tur cum administrantur huiusmodi trochisci. Re-
cip. anisi & lacæ ablutæ amborum ana pondus
drac. 5. an ygdalarum excorticatarum, croci mar-
macor omnium ana drac. 4. seminis apii, semi-
nis, feniculi, floris squinanthi uel summitatum
squinanti omnium ana drach. 3. succi eupatorii
drac. 3. 5. spicæ drac. 5. hieræ picræ drac. 7. rosarum
drac. 10. fiant ex eis trochisci, et administrentur.
Et fortasse indigebis eis, quæ sunt sicut homo-
rusia, et dialacca, et medicamen de amygdali
amaris. Et ad longitudinem febris cum rigore
et frigore, Recip. rosarum pondus drac. 10. ma-
sticis, et spicæ, et feniculi, et seminis apii, et fer-
minis endiuie, et succi eupatorii, et succi absin-
thii omnium ana drac. 3. spodii drac. 5. fiant tro-
chisci

chiscij & sit dosis ex duabus drach. usque ad .v. cum drach. .10. de geleniabin in decoctionis fœniculi quantitate. drach. 2. Et ameos confectum cū melle est magni iuuamenti in huiusmodi loco. Et fortasse indiges propter longitudinem frigoris frictione; & modus in ea est, vt incipiat ab humeris; & inguinibus quando spargitur caliditas in manibus & pedibus, & calefiunt. Si autem senserit similitudinem lassitudinis, fiat permutatio ad frictionem dorsi. Et quando vehemens sit calefactio eius, non est malum tunc vt fiat fricatio cum oleo ita vt in membro vltimetur calefactio ei necessaria, & dimittatur ipsa uel permutetur ipsa ad aliud membrum. Et de oleis bonis est oleum dulce, in quo non est stypticitas, & oleum chamæmillinū, & oleum de anetho decoctum in vase duplici. Cū ergo compleueris, tūc absterge cum oleo aliquo, vt non angustietur. Et non est malum si frictionem siccam sequatur fricatio cum oleo aliquo. Et de illis, quæ seruant stomachos eorum, ut non debilitentur, sunt vnguenta inuncta capiti stomachi, quæ sunt sicut chamæmillinum, & oleum nardinum, & oleum anethinū, & fortius illo est oleū alrazachi. Et de emplastris iuuatiuis est ut decoquatur chamæmilla cum re pauca masticeis decoquendo cum vino cum duplo sui de melle. Et si ceciderit appetitus, tunc melius est ut non administretur vinum, immo almbachtegi in quo decocta sunt sicut chamæmilla, & sisymbrium, & melilorum, & absinthium.

Cura phlegmatica continua, quæ nominatur latica. Cap. 56.

Est cura facientis paroxysmum omni die: & differt ab ea quoniam oportet vt in ista sit administratio subtiliantium calidorum vel acutorum cum facilitate. Et q̄ contētur eis, quæ sunt sicut syrupus acetosus, & geleniabin, & inlebe de melle, & aqua eius, & aqua fœniculi, & apii, & radicum trium sine dubio confert. Et quandoque confert eis chamach de anetho, & chamach de capparibus & proprie cum uestigiis digestionis. Et præparentur cibi eorum in obseruatione temporum, & diuersitatis eius, & fortitudine uirtutis, & debilitatis eius regimine cuius rememoratio præterit. Et de medicinis bonis ad eos sunt trochisci de decē generibus. Et iterū de medicinis expertis ad eos est illa, quæ Recip. ros. drach. vi. succi liquiritiæ sumite rra, spicæ omnium rana. drach. 4. masticeis. drach. 3. karabe. drach. 3. anisi, drach. 2. præparentur. Et iterum trochisci eupatorii. drach. 4. rosarū. drach. 1. & tertiam, spodiū. drach. 2. & 5. Et iterū eupatorii. drach. 3. rosarum lib. 5. spodiū vnc. 4. spicæ lib. 5. Et iterum troc. absinthii quorum descriptio. Recip. absinthii assari, seminis apii, anisi, amygdalarum amatarum; suchacha, bedeoard, succi eupatorii, spicæ, masticeis omnium ana drac.

2. contundantur & cribellentur, & malaxentur, et fiant trochisci.

Cura empialos & lyparia. I. epiale, & lypiria. Cap. 57.

Cura eorum propinqua est curæ quam diximus, & sunt ambæ associatæ uni uix: & oportet ut incipiatur in primis a syrupo acetoso mellino, & zuccarino. Et precipitur in eis ambabus, vt administretur rob acreste decoctum cum melle, & syrupo ros. deinde fiat aggrauatio de ius sumendi in potu semina, & aquas eorum ad infusionem aloes, & trochiscos de ros. cum mastice, & pilulas de aloc, & hieram picram, & pilulas de eupatorio. Et oportet ut in eis ambabus simul stomachi sollicitudo habeatur, & administretur uomitiuum cum aqua fœcolorum & raphani, & aneti, & calamenthi, & diuretica. Et de solutiuis iuuatiuis est illud, quod fit ex myrobalanis nigris, & citrinis, & turbit, & zuccaro. Et de illis quæ conferunt eis iuuamentum magnū sunt clysteria decliua ad acuitatem, & in quibus ponitur medulla cartami, & centaurea minor, & anethum, & chamæmilla, & alhasceh, & melilotum, & almuri, & mel. Et regimen lipariæ indiget facilitate plusquam regimen alterius.

Cura febris syncopalis humorosa. Cap. 58.

Hæc febris est difficilis curæ. Et modus i curatione eius est euacuatio gradata ex sublimi ad fortem: & proprie quando natura nō respondet ex se: tunc enim cum clysteribus munda quod est in intestinis, & uenis propinquis eis, ex superfluitate: Et administra in residuo subtiliationem cum frictione. Et Gal. quidem dixit q̄ deficiunt plurimi eorum ab euacuatione nisi cum frictione. Et melior modorum in frictione eorum est, ut incipiat a coxis, & cruribus, descendendo a superiori ad inferius, & administretur illud cum mantili aspero, abradente cutem, deinde permutetur ad manus, descendendo ab humero ad sparulam, ita ut igneatur cutis; deinde ad dorsum & pectus. deinde redeat ad crura: & reuertatur ad ordinem primum. Et ponatur medietas temporis eorum frictioni, & medietas temporis eorum dormitioni, si possibile est. Et ad summum canon curationis eorum est subtiliatio, non calefactio ualde. Et de illis, quæ conferunt eis sunt subtiliantia, sicut aqua mellis cum uirtute hyssopi, & seminis apii in matutinis, & similibus eis. Quod si fuerit illic fluxus uentris superfluus, decoque aquam mellis decoctione uehementiore, & non soluet nisi parum, temperate cum iuuamento. Et syrupus acerosus mellinus iterum confert eis, in ista

te quidem & cum consuetudine potus aqua frigida, permixtus cum aqua frigida, & in hyeme oportet ut non sumat eam in potu penitus, & sit contentus aqua calida. Et assumere calidum ex potibus est melius eis, nisi apud necessitatem estus æstatis & vehementiam caloris plurimi. Et convenientius quo potantur ad sitim est syrupus acetosus mellicus. Et vinum aquosum confert eis in principio, & proprie si fuerint febres eorum fortes & raro fiunt, & proprie in senibus. Et necessarium est eis vinum post cibum. Et tibi quidem necessarium est ut consideres pulsum habentium hanc ægritudinem semper, & cum videris eum incipere debilitari, & cadere, subito ciba eum pane infuso in vino commisto, & si non prohibet apana in visceribus. Cui ergo associatur ei huiusmodi ægritudo, non est curationi modus, neque fiduciar locus, scilicet quando accidit huiusmodi alteratio in pulsu: & hæc quidem cibariorum est ex eis, quæ necessaria sunt, quando vehemens sit syncopis, verum oportet ut sequatur illam frictio. Cibus autem super quem fit dormitio est aqua hordei super quam non addatur, nisi cum cadit virtus, & si additur, tunc sit panis infusus in iuleb, aut aqua mellis. Et balneum quidem est de rebus nocibilius istis: Et calidum, & frigidum valde ex aere: cum calido enim non sit securitas de cursu humorum ad pulmonem, & ad cor, & ad cerebrum: & frigidum prohibet digestionem eius, & addit in oppilationem eius. Quod si fuerit in ea humor cholericus aliquis, tunc si facilis est uomitus, & lenis est iuuatius valde: & ad ultimum dignus est, ut iuuet in ea.

Cura febris cum syncopi minuta. Cap. 59.

Oportet ut emplastrum pectus eius cum sandalis, & aqua rosæ, & vivificetur cum cibo paulatim. Et sit cibus eius, sicut panis de simila infusus in aqua granatorum infrigidata si desiderat ipsum, & similiter in aqua de fructibus. Si autem indigeat ad virtutem alimonie fusat facis ex pullis, cum aceto & aqua acreta, & oleribus frigidis, & proprie coriandro, erit iuuamentum in hoc si exhibeatur.

Regimen nocturnum & diurnum. Cap. 60.

Regimen earum ambarum est regimen phlegmaticarum, neque est diversitas in eis.

De quartana periodica. Cap. 61.

Plurimum quartana est periodica: & minoratur casus quartanæ inseparabilis. Causæ vero quartanæ sunt ea, quæ generant melancholiam, postea quæ putrefaciunt eam: & tu iam sciisti totum illud. Et sciisti quod melancholia alia est, quæ est sanguinis, & alia quæ est adustio eius,

& cinis humorum. Et sciisti quod de illa est sanguinea, & de illa est phlegmatica, & de illa est cholerica, & de illa est adustio ipsius melancholiam naturalis. Et existimaverunt quidam hominum, quod quartana non generatur ex melancholia naturali, quoniam ipsa non putrefcit. Et huiusquidem sermo non oportet ut auscultetur: immo de proprietatibus omnis humiditatis est, ut putrefcat quamvis diversificetur in preparatione. Et plurimum quidem evenit successione ægritudinum diversarum, & successione febrium putridarum propter diversitatem humorum ex quibus generantur, & ex eorum putrefactione. Quando enim incinerati fuerint & non euacuantur, multiplicatur melancholia, deinde cum putrefcit, est quartana. Et multoties quidem accidit successione splenis: & cum hoc ipsa secundum plurimum non euacuatur ex dolore splenis, aut duritie eius. Et saluior quartana est illa, quæ non accidit ab apate splenis, aut aliis: aut cum qua non est apate splenis. Quartana enim quæ evenit ab apate splenis, aut cum qua est apate splenis, multoties perducit ad hydropsim, & perniciem. Et quartana quæ salua est, liberat ab ægritudinibus malis melancholicis, sicut melancholia, & epilepsia. Et in ea est securitas a spasmo, quoniam humor est siccus. Et secundum plurimum est ægritudo salua. Et quædo non accidit in ea error, non addit supra annum & quandoque perdurat. 2. annis: & quod est infra eos. Et quæ ex ea longa est, perducit ad hydropsim. Et scias quod autumnus est inimicus quartanæ.

Signa. Cap. 62.

Sunt quæ quartana incipit in primis cum frigore parvo: deinde incipit frigus eius addi, postea minoratur parum apud statum, sicut in phlegmate. Cumque calefit corpus, non est caliditas vehemens, licet sit maior, & magis apparens quam illa quæ est in phlegmatica: ipsa enim cum difficultate sua in inflammatione non inflammatur: inflammatione de qua curatur, sicut ignis in lignis grossis: Et non comprehenditur super corpus totum: immo est illic caliditas cum horripilatione & gravitate: & causa in hoc est grossitudo humoris. Et est cum frigore aliquid ex dolore quasi frangat ossa: & est illic rigor & concussio uel commotio propter quam strident dentes: verum non sicut in phlegmatica, & perducit illud ad debilitatem visus: verum lenitur apud digestionem, quoniam malitia minoratur, sicut fuit in principio parumper. Et de signis quartanæ, sunt causæ eius antecessores ex febribus quæ prolongatæ fuerunt: & ex splene, aut dolore. Et de signis quartanæ etiam sunt dispositio complexionis, & significationes melancholiam, & ætas, & tempus, & cibus, & forma, & consuetudo, & quæ sunt his similia. Et periodus eius est. 24. horarum. Et multoties est febris tertiana in

ria in æstate quidem, & fit quartana in hyeme. Et multoties perducunt febres diuersæ ad febres per mistas, in quibus non est ordo propter diuersitatem residui humorum remanentium post febres. Cum ergo cōfirmatur super incinerationem, cōfirmatur super quartanam. Et illius quidem, quæ est a phlegmate adusto, sunt paroxysmi longiores: Et accidit plurimum illius successione quotidiana: & est sudor tardior, & vrina grossior, & durities venarum minor: & fit secundum plurimum successione febrium phlegmaticarum. Et illam quæ est a sanguine adusto, antecedunt signa sanguinis, & febris eius, & rubedo vrinæ, & significant ipsam formam, & ætas, & tempus: & fortasse erit post febres sanguineas. Et in illa quæ est a cholera adusta, est pulsus vehementioris velocitatis, & frequentia: & incipit cum horripilatione, & frigore in carne, & siti, & sudore. Et quandoque, fit ira, quædam & sitis, & inflammatio: & significant ipsam formam, & tempus, & ætas, & quandoque significant ipsam quod ipsa fit successione febrium cholicarum. Et pulsus in quartana est decliuus ad duritiem propter siccitatem humoris. Ipse enim trahitur ad interiora, quasi ipse esset pulsus senis: & ad æqualitatem, dum non mouetur: & si moueatur, diuersificatur pulsus valde propter grossitudinem superfluitatis: & fit raritas eius appa-rens apud teporem: & est significatio completa super quartanam. Et multoties accidit in eo diastole inæqualis, & systole vehementis uelocitatis, secundum contrarium eius quod est in tertiana. Et pulsus quidem quartanæ melior est pulsu phlegmaticæ in paruitate, & frequentia: sed est similis ei in tarditate: Et apud inceptionem paroxysmi additur tarditas sua, & raritas eius, & diuersitas eius est maior diuersitate reliquarum febrium, deinde incipit magnificari, & fieri frequens, & uelox. Et vrina in quartana est similitum horarum in priuatione digestionis, propter frigus materie, & grossitudinem eius, nisi apud statum bonum. Verum dispositiones eius, & colores eius diuersificantur: & illud ideo, quoniam melancholia generatur ex humoribus diuersis. Et de signis digestionis quartanæ est lenitas rigoris. Vrina autem in principio est alba ad uiriditatem decliuus, cruda, cui non est digestio. Et post principium diuersificatur eius dispositio & coloratio, propterea quod melancholiæ generatio est ex humoribus diuersis & fit apud declinationem nigra. Et sudor in quartana est plurimus per comparisonem ad phlegmaticam, & non multiplicatur per comparisonem ad alias: & sitis minoratur in hac febre, nisi sit melancholia cholerica.

nea, aut melancholia cholerica, aut melancholia melacholica. Deinde rege unamquamque earum cum eo quod ei est conueniens, de illis, quæ dicemus. Verum omnibus speciebus suis sunt iudicia in quibus cōmunicant: & illud est quod ipsa minuuntur in principio. quare necesse est ut attendatur an sit sanguis dominans in ea, & proprie quando quartana est a melancholia sanguinea, tunc enim phlebotometur, & extrahatur sanguis secundum quantitatem necessitatis: & fortasse exigit multitudo eius & spissitudo, seu sæcalitas eius ut extrahatur de eo res plurima: Et quando non est necessaria phlebotomia, tunc phlebotomia est nociua, in quantum debilitat, & in quantum educit contrarium melancholiæ: & in quantum mouet humores ad exteriora. Et si oportet, euacuetur a principio de humore faciente febrem aliquid, propter alienationem non propter mundificationem uel eradicationem. Illud enim apud digestionem fit secundum quod innuam ad ipsum. Et fit post paroxysmum per diem. Et non oportet ut fiat prouocatio in primis cum fortitudine: Et oportet ut administrentur mollicantia. Et si tibi non uideatur bonum uti potionibus, administra locum earum clysteria conuenientia: sed oportet ut sint lenia & non conceditur confortatio eorum, nisi quando consequitur ægrotudo statum. Et si medicus iam præsumperit, & solutione eduxerit melacholiam in principio, aliquoties solutione forti, & prohibuit ægrotudinem penitus: sed melioratio est facta ab errore. Et oportet ut prohibeatur in die paroxysmi a comestione: & præcipiatur ieiunium. Et prohibeatur ab aqua frigida illa die, Et est necessarium in reliquis diebus uti carne teiugi, aut pulli: in primis teiugi usque ad tres uel quatuor periodos, deinde pulli, tunc enim pullus est melior. Et sit medicina in die alio a die paroxysmi geleniabin cōmixtum cum aqua calida in die bis, aut tres drach. geleniabin cum 3. x. syrupi acetosi. Et tu quidem scis quod quando melancholia est cholerica, tunc oportet ut administretur in ea, quod soluat eam ex genere myrobalanorum, & uiolæ. Et si est phlegmatica oportet ut administretur quod soluat eam in primis aliquid in quo sit uirtus turbit. Et si est melancholia, oportet ut administretur in ea aliquid in primis in quo sit uirtus polypodii, & epithymi, & similitum. Et scias quod aqua casei est bonum uehiculum ei, quod administratur de uirtutibus prædictis: & fortasse cōfert administratio eius solius quando est caliditas uiolenta, & geleniabin quidem & aqua eius colata a decoctione sua forti, est loco ipsius: proprie cum est in stomacho debilitas, aut est illud quod uincit humor frigidus. Et uomitus iterum & proprie ante cibum, & post cibum est conuenientior etiam: & proprie in die paroxysmi, & ante paroxysmum: & proprie quando melacholia est phlegmatica est de rebus iuuantibus in ea, & non in principio tantum, immo & in omni

in omni hora. Oportet ergo ut non laboretur in principio, & in principiis digestionis vsq; ad aduentum complementi digestionis. & fiat euacuatio superfluitatum cum eo quod non calefacit cū fortitudine, neque cum eo quod exccat cum fortitudine ex medicina, & dimissione ciborum, neque cum eo quod debilitat ex solutione ventris: neque iterum cum eo quod debilitat in principio ex subtiliatione regiminis. Et scias q; quando incipit quartana in æstate, aut hyeme, tunc oportet ut in potu detur in primis de aqua hordei, & fecanabin, ut aperiat vias oppilatas propter prouocationem, & consumatur velociter: & illud est post periodum antecedentē tribus horis, aut quatuor. Et cum accidit quartana in hyeme, tunc est curandum cum facilitate & non est modus ut dentur in potu trochisci. Et scias q; res frigida, & humida facili digōis, boni chymi sunt cōuenientes huic ægritudini ex parte febris, & ex parte sunt contrariæ uni duarum qualitatum melancholiæ, quæ est siccitas, quare oportet ut administrentur iterum, ubi non timetur nocumētum digōis: aut sit eius quantitas ex qua non timeatur nocumētum in digōe: aut misceatur cum eis aliquid quod earū frigiditatem temperet, & non minuat earum humiditatem: & istæ sunt res calidæ cum æqualitate. Et alienetur omne frigidum, & siccum. Et res humida, & frigida huic ægritudini cōuenientes sunt sicut endiuia, & lactuca, & melon, & persica quandoque. Et non oportet ut deuantur huiusmodi, nisi aut propter uehementiam frigoris, & est illud inuentum sicut in lactuca, & non est inuentum sicut in melone dulci: aut propter uehementiam prouocationis perducens ad ingrossationem sanguinis, & illud est inuentum in melone dulci: aut propterea quia preparata sunt ei quod permisceat ad putredinem: & est illud inuentum in persicis: & oportet ut obserues huiusmodi. Cibivero calidi cum æqualitate, cum additione humiditatis, sunt iuuantes ualde: & proprie cum volunt æquationem caliditatis eorum, ubi non diligitur ut per ea fiat iuuamentum ad digestionē cum frigidis & humidis, sicut commistio ficuum cum endiuia. Et non est malum in primis sumere ea in quibus est salsedo, & acredo, & incisio, cum non timetur incrementum caliditatis; In fine autem ægritudinis non est excusatio illius. Et trochisci de absinthio iuuatiui sunt usque ad finem ægritudinis. Et de illis quibus fit iuuamentum est fessio in aqua calida dulci ante cibum omni die: & balneatio, quæ humectat, & non facit sudare, neque excitat caliditatem, & continuatio deliriorum & quietis, & abhorre exercitium, & motus corporeos, & animales. Et omnes istæ febres indigent humectantibus: & diuersificantur in quantitate infrigidationis, & calefactionis. Et necessitas sua qua indigēt exiccationis, est propter illud quod est in eis de uirtute incisionis, & absterisionis, &

solutionis, & non propter exiccationem. Et oportet ut obseruetur stomachus cum emplastris bonis, confortantibus, quæ sunt inter uirtutem caliditatis, & subtilitatem eius secundum quod exigit dispositio: Et obseruentur splen & hepar: & regantur, ut non indurentur & apostementur. Et fortasse est necessarium ad prouocandum vomitum uti aqua raphani cum semine suo, quæ misceatur cum syrupo acetoso. Et fortasse iuuatur cum ante celsione commestionis sicla, & eius q; salinum est de piscibus, & sinapis, & his similibus ante ipsum. Et adiuuatur post illud cum potu aquæ mollior, deinde fiat successio cum syrupo acetoso, & euomat. Et de illis quæ conferunt ei est ut sumat ipsum in die paroxysmi: deinde euomat super ipsum. Et securitatem facit a nocumēto frigoris, & rigoris, & acuitatis febris si sumat allia & mel, & bibat syrupum acetosum mellinum, & impletur cibo: deinde sumat aquam calidam & euomat. Cum ergo consumitur paroxysmus, cetera rem paruam, & balneetur in mane. & si sumat ante paroxysmum. v. horis cibum, ut euomat, fortasse iuuabit illud, licet non euomat totum. Et vomitus ante paroxysmum quicumque humor sit, aut alleuiat paroxysmum, aut eradicat ipsum. Et de regimine bono est quod ieiunet in die paroxysmi, si non est quod prohibeat: & non sumat cibum, donec consumatur paroxysmus. Et ingrediatur balneum die secundo siquidem fuerit digestio secundum discreptionem: & si non fuerit digestio, non fiat in eo nisi effusio aquæ calidæ quantitate qua delectat corpus, & humectat, minus quam ut perueniat ad hoc, ut moueatur ex ea humor. Et in die tertio administretur vomitus propter illud quod superfluit de cibo, & quod resoluit uel subtiliat balneum: quamuis oporteat ut administretur uomitus in die paroxysmi iterum. Quod si melancholia fuerit sanguinea, inuabitur cū phlebotomia ex basilica, deinde per euacuationē subtili cum eo in quo ponuntur de mundificantibus sanguinem, sicut uirtutes suchaha, & bedeoard, & polypodii, & fumiterræ, & myrobalanorum reborum: & hoc quidem genus uelociter recipit curacionem. Et si fuerit melancholia cholericæ, tunc tibi inest ut administres infrigidationem & humectationem ultimas ex medicinis, & cibis. Et administra aquam temperatam sedendo in ea & abluendo: Et fiat lenificatio nature in principio cum eis, quæ sunt sicut illud quod fit ex viol. & quod fit ex aqua casei cum uirtute polypodii: aut syrupus acetosus cum epithymo, & syrupus rosæ & aqua iuleb, & casia fistu. At uero solutio eius integra speratur post 20. dies, quoniam digestio apparet in eo. si quando materia est melancholia cholericæ: deinde fiat gradatio ad illud, quod subtiliat, & incidit. Et si necessaria est rectificatio stomachi, tunc fiat cum inunctionibus, & oleis, & epithymatibus, quæ nō pertranseant uirtutē chamæmilie.

mazmilla, & absinthii, & meliloti, & similia. Et ieiunium plurimum etiam in die periodi. Quandoque est ex eis, quæ non conueniunt eis. Et si sit ut in die periodi, sufficiat eis de cibo parum modi cum. Et de mundificationis iuuantibus sunt ea, in quibus est decoctio myrobala, & epithymi, & seneg in syrupo acetoso, in quo decoctæ sunt violæ. Et fortassis sumitur in potu assa in ieiunio proprie in die paroxysmi, & euomat ipsam, si nauseat cum ea anima eius. Et si fuerit melancholia phlegmatica, properet ad geleniabin mellinum cum aqua apii, & feniculi, & similia. Et si necessaria fuerit lenificatio, miscetur cum eo in principio virtus solutiva phlegmatis de virtutibus turbit, & polypodii, & fiat gradatio pauca ad virtutem agarici. Et fiat ut vomat cum syrupo acetoso mellino de seminibus, & his similibus, usquequo incipiat digesti. Et sit vaporatio stomachi, & eius emplastratio cum eo quod est fortius: ita ut cum dactylis, & fici, & similibus. Et similiter inunge ipsam cum oleis calidis perueniendo usque ad oleum de castoreo. Et fortasse est necessarium in eo prouocare vomitum cum syrupo acetoso. & sit in eo virtus ellebori albi: immo quandoque est necessarium ut in potu derur elleborus albus in raphano, aut virtus ellebori in raphano, aut elleborus cum dispositione sua, cum non timetur dispositio debilitatis virtutis. Et si fuerit melancholia melancholica pura de genere facis sanguinis, tunc rectificatur solutio eius in primis cum aqua iuleb, & penidus, & est conueniens administratio geleniabin mellini, & zucarini. Et in fine eius euacuetur eis, quæ sunt sicut decoctio myrobalanorum, citrinorum, & nigrorum, & sumiterra, & passularum. Cum ergo agritudo digesta est, tunc bonum est phlebotomare ex basilica. Et administretur vomitus super cibum cum fortitudine aut leuiter secundum horam, & necessitatem. Et oportet ut assidue ipsam, quoniam est radix. Et euacua cum medicinis & clysteribus fortibus. Et medicina quæ administrantur in huiusmodi hora, sunt epithymum, & polypodium, & agaricum, & stichados, & lapis armenus, & lapis lazuli abluti, & non abluti, & succus foliorum pentaphyllon cum syrupo mellino. Et fortasse necessarius est elleborus niger, & fortasse sufficit in cholericis seneg, & sumiterra cum epithymo, & in syrupo acetoso. Deinde prouoca tunc apud euacuationem, & da in potu phlegmaticæ & melancholicæ ex ea theriacam, & myrridatum, & medicamen de assa, & sulfur, & piper solum bibatur in aqua. Et de illis est sinapis, quæ administretur non assidue, immo in omnibus tribus diebus: & in primis, & ante illud in spatio longiore, & similiter diapedeion, & similia illi de electuariis. Et non festines cum aliquo horum ante digestionem: nam si in dederis in potu theriacam & similia illi in primis, compones quartanam cum quartana: & fortasse attrahes agritudines alias, &

proprie in hyeme. Et in fine eius si necessaria fuerit phlebotomia, aude super eam. Inquit Gal. sanari gentem plurimum a quartana ita: Dedi eis in potu post digestionem solutiuum: deinde dedi eis in potu succum absinthii: deinde dedi eis in potu theriacam. Et dico quod assa, & piper singularia sunt inuatiua valde, quando apparet digestio, & peruenit status. Et ciba illum sabanæ, & chamach de capparibus, & sinapi, & almuri, & omnibus in quibus est virtus subtiliatiua cum fortitudine. Et fortasse erit tibi necessarium urdes et in potu post xl dies, omni mane quantum est nabaca una de eis, quæ sunt sicut medicamen de assa, & omni sero similiter cum febris non fuerit acuta, & materici radix non fuerit cholera. Et de trochiscis iuuatius in hac hora, & apud declinationem, sunt trochisci secundum hunc modum. Recip. succi eupatorii, & troci amborum ana pondus drac. 3. scolopendriæ, & laccæ, & reubarbari, & spodii omnium ana drac. v. & se. acetosæ, & se. portulacæ, & ros. & spicæ, & se. cuscute, & anisi, & semi apii, & radice capparis, & granorum alben, & semi feniculi omnium ana drac. 4. conficiantur cum aqua apii, & fiant trochisci, & dentur in potu cum aqua feniculi, & endiuæ, & cuscute, & hæc quidem medicina iuatina est modis pluribus. Et quando materia fuerit digesta, tunc fac istud. Recip. myrrhæ drac. 15. spicæ pyrethri costi sumitaram squinanthi drac. v. petroselini drac. 5. anisi drac. 10. conficiantur cum vino antiquo aut melle zinziberis. Et sit dosis eius quantum est aux. Et quandoque dabis in potu in fine, & conualescentibus, & apud paucitatem nocenti in ea, & multitudinem caliditatis cum subtiliatione materię medicinam huiusmodi. Recip. seminis hyusquiami albi, mandragoræ amborum ana siliquamia, & assa circiter fabas tres. Et de hoc genere est ut sumantur iterum calamenti domestici aure. 4. & seminis urticæ aure. 20. & epithymi aure. i. fiant trochisci parui ualde, & sit dosis drach. 1. Et ex eis quæ bona sunt eis, est ut administretur post apparitionem digestionis usque ad finem eius istud. Sumatur passularum de semi, & passularum alheruy, & alii syluestris, & myrti recentis omnium ana pars. i. & decoquantur in aqua dulci postquam infusa sunt in ea, deinde bulliant exquisitè, & coletur, & detur de ea unc. 1. Et iterum seminis apii, & anisi, & cordumemi omnium ana drac. v. origani syluestris, eupatorii omnium ana drach. 7. ameos drach. 4. suchahæ drac. 3. passularum drac. 10. decoquantur in tribus libris aquæ usquequo redeat ad lib. 1. Et de illis quæ bona sunt eis est, ut sumantur ameos, spicæ, & calamenti omnium ana drac. 10. & carui & anisi amborum ana drac. 7. & assa pondus drac. v. & zinziberis pondus drac. 4. & cassiæ pondus drac. 3. conficiantur cum sufficientia mellis. Et sit dosis eius pondus drac. 1. cum aqua apii, & feniculi, & trochisci huiusmodi. Recipe succi eupatorii drac. 10. scolopendriæ,

scolopendria, spodi, feniculi, spica, croci, omnium ana drac. 5. lacca, & reubarbari omnium ana drac. 3. seminis cucumeris, & seminis portulacae omnium ana drac. 6. fiant trochisci cum aqua apii, & sumantur in potu cum syrupo acetoso. Et iterum ad phlegmaticam. Myrrhae drac. 5. & tertianae croci, petroselinum amborum ana drac. 5. spica drac. 4. castorei drac. 3. anisi drac. 3. seminis apii, & karui amborum ana drac. quatuor, amomi, corticum casiae, storacis omnium ana drac. 2. & 3. sileleos, adriani cofectionis omnium ana drac. 1. & tertias duas. Et quando vehementer sit rigor, est uomitus cum aqua tepida, & syrupo acetoso ad illud iuuatiuum. Quod si virtutes eius non obediunt, tunc fortifica eas cum eis quorum rememoratio praecessit secundum horam. Et fiat uaporatio cum embroca, in qua decocta sunt sccha, & chamamilla, & similia homine cooperto cum pannis laneis aggregantibus calefactionem.

Rememoratio solutiuium, quibus indigent post digestionem. Cap. 64.

Rebulorum, drac. 6. epithymi, absinthij amborum ana drach. 5. myrobalanorum citrinorum, succi eupatorii, emblici omnium ana drach. 4. seminis apii, & anisi, seminis feniculi omnium, ana drac. 2. fiat ex eis decoctio, & soluat cum eo cum facilitate. Aut sumatur passularum sine alijis drac. 10. myrobalanorum rebulorum, & epithymi omnium ana drac. 8. & fumiterrae pondus drac. 7. & fuchaha, & centaureae maioris amborum ana pondus drac. 6. eupatorii, & radices squinanthi amborum ana pondus drach. 5. decoquantur cum quinque libris aquae, donec redeat ad lib. 1. Pilulae leues, quae quando administrantur in omnibus quinque diebus semel sunt iuuantes in ea, & sunt expertae. Recip. epithymi, & turbit amborum ana drach. 10. carui, anisi amborum ana drach. 7. ameos 8. seminis apii, & feniculi amborum ana drac. 3. polypodij, drac. 6. agarici albi quod facile teritur drac. 8. salis indi drach. 5. hierae picrae drac. 15. fiant pilulae cum aqua mentae, & sit dos drac. 1. f. Et cum materia est phlegmatica, conferunt istae pilulae. Recip. epithymi, agarici, ameos omnium ana drac. 8. seminis apii, anisi, feniculi omnium ana drac. 3. salis naptici drac. 5. hierae picrae, turbit amborum ana pondus drac. 10. conticiantur pilulae, & sit dos pondus drac. 2. f. Et quando est cum dolore splenis, iuuatur hoc medicamine, & soluit cum cum facilitate. Recip. scolopendriae drac. 15. agarici drac. 12. myrobalanorum nigrorum, hierae ana drac. 10. rebulorum, absinthii omnium ana drac. 8. fuchaha, bedecord, chamaepitys, succi eupatorii omnium ana drac. 7. fructus tamarisci, radicem capparoitum amborum ana drac. 5. seminis apii, anisi, seminis feniculi omnium ana drac. 3. fiat cofection, aut pilulae.

Cibatio patientium quartana m. Cap. 65.

Rectius est ut inclinetur regimen eorum in primis septimanis usque ad tres septimanas ad subtiliationem quandam, praeter quod destruat uirtutem: & illud est, ut abstineant a carne, & aliumet: hoc enim minorat eorum materias, & est leue super eos: & abbreviat spatium aegritudinis eorum. Et post illud necessarium est uirtutem uiuificare cum eis, quae sunt sicut pisces atradradi, & oua sorbilia, & pulli, & altheiugi. Cum ergo peruenit ad tempus in quo prohibetur in ea aliumet, & non minoratur aegritudo, tunc necessarium est custodire uirtutem, & cibare cum eo, quod est fortius ex carnibus gallinarum, & pullorum, & arietum, & haedorum, & auium mollis carnis, sicut sunt pulli, & alduragi, & pisces boni, qui non sunt magni. Et scias, quod conditio in eo, ex quo tribuitur habes quartanam, est quod sit aggregans proprietates, quarum una est, ut non sit crudum, immo resoluens uentositates quam facit accidere melancholia. Et secunda est ut non sit grossum, immo subtilians grossum. Et tertia est, ut non sit coctum, immo soluens uentrem. Et quarta ut sit sanguis ex eo generatus laudabilis. Et plurimum quidem est in ea illud, quod habet caliditatem & humiditatem. Et tu iam sciisti quomodo cibetur ante paroxysmum, & per quot horas, & quare sit illud. Et sciisti iterum, quod quandoque necessarius est cibus in paroxysmo, & in proximo eius propter causam praedictam. Verum rectius est ut eneniat febris uentre uacuo, ut non occupetur natura cum materia alia: nisi cum materia aegritudinis, donec expellat eam. Et uinum clarum subtile album est iuuatiuum.

Cura quartana continua. Cap. 66.

Dispositio huius febris est, secundum quod enunciauimus ante ipsam. Et canon uerba est homogeneus canoni quartanae interposita: & non diuersificatur ab ea, nisi in rebus paucis. De illis est, quod declinatio in illa ad aequalitatem in calefacientibus, & ad infrigidationem in hac est melior propter adhaerentiam febris: quare oportet ut administrent in curatione eius ea quae sunt sicut syrupus acetosus & geleniabum & syrupus acetosus cum seminibus, & aqua de radicibus aequalis; & suppositoria cum melle. Et de illis est, quod phlebotomia in hac est magis necessaria, quoniam materia est comprehensa in uenis. Et de istis est, quod licentia in carnibus in hac aegritudine est minor, ideo caue hoc.

De febre sextana, & septena, & similibus

Cap. 67.

Et nominatur phitanos: et quidam nominant huiusmodi febres reuolubiles. Ista generantur ex materia homogenea materiei quartanae

tanæ, sed est minor, & grossior. Et plurimum quidem sunt ex melancholia phlegmatica. Sextanam autem & septenam, & quæ sunt post illas. Hipp. dixit: & Gal. dixit. Ego non uidi in vita mea aliquam ex eis, immo neque uidi quintanam apparentem fortiter, & neque est febris, nisi quasi occulta. Inquit, & non est longinquum quin sit causa in septena huiusmodi, & nouena regimen, quod quando administratur, & procedit super ipsum, facit febrem. Et cum reiteratur, facit necessario in huiusmodi hora illa febrem, & si dimitteretur, & rectificaretur, non faceret. Est ergo causa in periodis eius, & in ipsius iterationibus, reiteratio regiminis & periodi eius non sunt periodi materiarum, quæ confundantur, & eius redictiones. Inquit, oportet ergo ut obseruetur in experientia huius ægritudinis hæc intentio, ita ut non accidat error: quamuis Gal. sit quasi negans aduentum harum febrium, & quasi quidem sit necessarium ut non sit huiusmodi febri alia radix. Verum Hip. iam uerificauit sermonem in intentione septenæ, & nouenæ, & non est illud manifestum mirabile, neque manifeste impossibilitatis, ita ut sit necessarium redire in eo ad manifestandum. Et sermones quidem quos locutus est Hip. in c. harum febrium sunt, quod septena est prolixa, & non est mortifera, & nouena est longior, & non est mortifera. Et dixit, quod quintana est deterior febrium, quoniam sit ante phthisim, & post ipsam. Et dixit Gal. in ea sicut senas. Et ego quidem opinor huic sermoni modum quendam, & est ut per phthisim intelligatur hectica: & sit sermo eius quintana subiectum propositionis indefinitæ non significantis communiter, ergo est quasi dicat, quod de quintana est una species deterior febrium: quoniam ipsa est ante hecticam, & post eam, & est intentio sermonis eius hæc, quod cum febres prolongantur, & læsionem fecerint, & fuerint permixtæ, & diuersæ, perueniunt plurimum ad inflammandum membra principalia, & ad hecticam: & de proprietate harum febrium est ut sentiant in fine suo secundum ordinem unum. Et plurimum illius super quartanam. Etiam testificari sumus eam quintanam, uerum ipsa perducit ad quartanam quando in humoribus est exuberatio, & in humiditatibus multitudo. Cumque liquefactio iam multiplicatur, & euacuationes sensatæ, & insensatæ frequentes fiunt, non remanet in humoribus cineritas, nisi illud, quod minus est & grossius, & illud facit esse necessarium ut sit paroxysmus tardior: & fiat illa, quæ fuit quartana, quintana. Et in huiusmodi quidem dispositione rectius est, quod sit corpus præparatum, ut inflammetur, & fiat hectica. Et iterum hectica quando antecedit, non est longinquum quin faciat accidere in humoribus cineritatem quandam propter paruitatem suam uel paucitatem suam in postremis hecticæ: & accidit illi cineritati putredo, quare accidit febris: & iam destruxit febris hectica corpus: est ergo mala ex-

hoc, quod ipsa est signum adustionis humoris, de quo non remansit nisi parum: & sit adustus parum. & ex hoc, quod ipsa est causa additionis febris, & duplicationis eius. Et non oportet ut negentur ægritudines quas non contingit uideri in tempore quodam, & quadam regione: nam hoc genus non comprehenditur per multitudinem. Neque iterum oportet ut dicatur, quod si est quintana, tunc necesse est ut sit materia quinta: nam melancholia generat quartanam, non propter hoc ipsum, quod ipsa est melancholia, immo propterea quod ipsa est pauca, grossa. Et iam non est longinquum sit in quibusdam corporibus melancholia grossa, pauca, cui accidit putredo. Et non conuenit alicui, ut dicat possibile est in phlegmate, ut fiant ei paroxysmi alii, quando ingrossatur, & minoratur: quoniam concessio est res ampla, & raro sit possibile, ut necessario consequatur eius contradictio. Amplius non est dispositio in concessione eius, quod nunquam uidetur, & non auditur, neque de quo testificatur experimentator, aut sapiens sicut concessio eius, quod testificatur qualis Hipp. Et iam retulit mihi fidelis quidam se uidisse nouenam. Quintanam uero nos multoties uidimus: & non cogimur propter hoc dicere, quod illic sit humoralis.

Cura specierum huius febris. Cap. 68.

Appropinquat huius febris cura curæ quartanæ phlegmaticæ: & indiget in curatione eius superfluo ieiunio: & subtiliatione cibi, & regiminis, & somno digerente ut resolueretur per illud materia grossa, & digeratur. Et iterum indiget ingrossatione regiminis, ut non destruat in eo uirtus: & sunt ista duo sicut duo contraria. Et propterea, quod febres istæ non faciunt accidere læsionem uirtutis, non curamus si subtilemus regimen, & faciamus ægrum uti ieiunio uno tempore & succurrimus illi sicut ostendimus, ita ut cibemus cum eo cuius bonum est nutrimentum, & velox sit, & multiplicatur: & in quo non est ingrossatio materiei, neque additio in ea. Et de curationibus magis conferentibus ad illud est uomitus cum elleboro, & semine raphani, & raphano, in quo sit uirtus ellebori, & nōce uomica, & euacuatio cum hieris. Et post illud administratio theriacæ, & eis similibus. Et confert tunc sudatio cum medicinis, & cum balneo calido absque administratione aquæ, & absque administratione humectatiui.

TRACTATUS III

De hectica. Cap. 1.



IAM sciuit, quod in membris sunt humiditates diuersarum specierum, de quibus sunt humiditates præparatæ ad nutriendum, & humectandum iuncturas. De illis ergo est illud, quod est repositum in uenis & de

& de illis est illud, quod est sparsum in membris, sicut ros. Et istæ sunt duæ diuisiones, & prima earum est materia febris putredinis, & febris ebullitionis, sicut sciisti, cum nutrimentum non totum expendatur seu distribuatur in cibum sicut aduenit, immo remanet de eo illud, quod est in semita expendendi, in cibum seu in nutrimentum, & remanet, quod est in semita thesauri vel in semita ut recondatur tanquam thesaurus repositus administrandus tempore necessitatis. Et de illis sunt humiditates proximi temporis coagulationi: & sunt humiditates, quæ sunt actu nutrimentum, scilicet attractæ ad locum, quæ sunt loco eius, quod est de eo resolutum: & sunt additio similis illi: verumtamen tempus fluxibilitatis earum propinquum est: quare sunt non coagulata. Et de eis sunt humiditates, cum quibus continuantur partes membrorum similium partium à principio creationis: & per ipsarum destructionem perueniunt ad separationem. Et similitudo humiditatum primarum est oleum lucernæ effusum in lucernâ. Et similitudo secundarum est oleum imbibitum in corpore lychnij. Et similitudo tertiæ humiditatis est humiditas qua continuantur partes cõtræ de quo factus est lychnius. Et cum inflammantur membra radicalia, & proprie cor, est illud ipsa ægritudo, quæ est hæctica secundum quod sciisti. Et caliditas quidem hepatis quandoque perducit ad hæcticam: verum non est ipsa hæctica, immo hæctica est illa, quæ est causa cordis: & similiter dispositio pulmonis & stomachi. Verum dum ipsa permanet finiendõ humiditates diuisionis primæ membrorum, & proprie cordis, sicut finit candela oleum infusum in lucerna, tunc est gradus primus appropriatus nomine generis, quod est hæctica: & græce hæcticos, cum non habeat in speciebus suis nomen. Et cum finiunt humiditates, quæ sunt diuisionis primæ, & incipit resolvere humiditates, quæ sunt diuisionis secundæ, & finire eas, sicut cum finiunt flamma oleum euacuatum in lucerna, & incipit finire imbibitum in corpus lychnij, erit gradus secundus, & nominatur debul, & marasmus, & habet latitudinem, & principium, & medium, & statum. Amplius non sanatur ille, qui consequitur statum, alidubul, & parum recipit curationem, nisi Deus uelit: & proprie quando peruenit ad hoc ut caro consumatur uel liquefiat. Cum ergo finiuntur istæ, & incipit finire humiditates, quæ sunt diuisionis tertiæ, sicut incipit flamma adurere corpus lychnij, & humiditates eius radicales: est ægritudo gradus tertij, & nominatur almefetet, & ryhas græce. Et hæc quidem ægritudo est ex febribus, quæ non habent paroxysmos, neque horas paroxysmorum. Et quidam dixerunt: febres hæcticæ aut pendent cum humiditatibus propinqui temporis cum coagulatione. Aut cum eis, quæ sunt sicut caro. Aut cum membris radicalibus duris, sicut sunt ossa, & nerui. Et si ex sermone isto intel-

ligitur, quod pendent secundum semitam, quod finiunt quod in eis est de humiditate continuata cum eis, erit hæc: & intentio prima æqualis seu unum, & idem, & si significat, quod primum, quod finit hæctica est humiditates propinqui temporis cum coagulatione, non erit sermo sanus. Et hæctica quidem quandoque accedit post febrem ephimeram. Et quandoque accedit post febres putridas: & apostematam. Et longinquum est ut accedat hæctica incipiendo: quare sunt membra radicalia iam inflammata, & non inflammatur humor, neque spiritus ante illud: immo oportet ut calefiant illa in primis, deinde secundum processum dierum calefiant membra radicalia vel principalia nisi accedat causa fortis ualde. Et causa quidem una quandoque est causa febris hæcticæ: & quandoque est causa febris ephimeræ, secundum uehementiam suspensionis uel dependentiæ ipsius & debilitatem suspensionis uel dependentiæ suæ sicut ignis: nam ipse obuiat lignis secundum duos modos quorum unus est secundum modum, quod calefacit ea, & facit ex eis evaporationem: & secundus est secundum semitam inflammationis. Et febris quidem putredinis, & apostematis permittitur multoties ad hæcticam propter uehementiam febris & uehementiam sublationis cibi in ea, & prohibitionem aquæ frigide, & paucitatem obseruationis lateris cordis cum unctionibus, & emplastris, & epithematibus, & proprie in ægriudinibus membrorum uicinarum cordi, sicut diaphragmatis. Et multoties facit cadere in eam necessitas medico propter casum uirtutis, & frequentiam syncopis ad dandum in potu uinum, & aquam carnis, & medicinam de muscho, & his similia. Et quandoque componitur hæctica cum febribus putredinis, & apostematam. Et hæctica quidem in principio rei est difficilis cognitionis, & facilis curationis. Et in fine sui est facilis cognitionis, & difficilis curationis. Et finis, alidubul, non recipit curationem prius.

Signa. Cap. 2.

Pulsus quidem est minutus, durus, frequens, debilis, fixus secundum dispositionem animi. In tactu uero eorum est illud, quod sentitur de caliditate minus caliditate synochi, & ei simile, inflammatarum in materia: & in principio dum tangitur est magis suauis: & cum remanet super eum manus, hora, una apparet cum fortitudine, & mordicatione, & non cessat augmentari: & est calidius, quod est in eo locus uenarum, & artiarum. Et est eorum caliditas similis: non enim minuitur, uerum ipsa quando superuenit ei cibis augmentatur uelociter: & fit fortis pulsus ualde, & incipit magnificari: & propter illud accedit ignorantibus medicorum, quod prohibent eis cibum propter illud, quod accedit eis de eo ex accidentibus,

bus, quare perdunt eos. Sicut augmentatur flamma propter iniectionem olei, & frictio sartaginis cum effunditur aqua super eam. Et ista quidem significationes eius sunt fortes. Et cibus in reliquis quidem febribus proculdubio non incendit hac incensione, sicut inuenitur huic: quamuis necessario faciat diuersitatem motus naturæ: & hæc inflammatio non est sicut incensio reliquarum febrium post coarctationem, neque secundum periodos notas, immo cum comedunt, & in quacunque hora sit. Et est habens ægritudinem non vehementer discernens illud, quod est in eodem de caliditate: quoniam facta est complexio membro conueniens: & iam sciisti in libro. I. qualitatem dispositionum in huiusmodi: verum ipsa apparet apud susceptionem alicuius ciborum propter exacerbationem suam. Et de significationibus permutationis febris ephimeræ ad febrem hæcticam est vehementia fortitudinis caliditatis in. iij. valde: nam secundum plurimum incipit febris post. xij. horas declinare. Cum ergo pertransit febris. xij. horas, & non apparent signa declinationis, immo continuatur usque ad tertium omni die, & sit fortis: tunc illa est hæctica. Et de significationibus compositionis hæcticæ cum febribus putredinis est remissio caliditatis sicæ post finem declinationis, & post sudorem exuberantem: & additio in arefactione, & extenuatione secundum illud, quod facit necessarium illa ægritudo: & vinctuositas in vrina, & egestionem. Et si fuerit hæctica apparens, & alia occulta tunc significat ipsum coarctatio accides in paroxysmis: huiusmodi enim est non inuentum in hæctica omnino. Et scias, quod quandoque incipit hæctica accensa cum stomacho, quare corrumpit complexionem hepatis per viciuitatem.

Signa aldubul, id est, marasmi. Cap. 3.

Signa vero aldubul sunt, quod quando febris expellitur vel permuratur ad dubul, uehemens fit durities pulsus, & eius debilitas, & paruitas ipsius, & eius frequentia: & proprie quando causa casus in hæcticam est apostema, quod non resoluitur: nam illud scilicet frequentia additur ualde, & similiter uelocitas: & fit pulsus eius de genere eius, qui nominatur cauda muris. Quod si fuerit ex poru calidi uini, erit loco caudæ muris similis acui magnæ, & non erunt accidentia aldebul uehementia ualde: non enim dat ei spatium usque ad huiusmodi. Et apparent in vrina vinctuositas, & petala, & incipit oculus profundari. Cum ergo aldubul peruenit ad statum, fit fortior profundatio ambrorum pectorum: & multiplicatur lipitudo sicca, & crescunt extremitates ossium omnis membri: & in facie: & planguntur tempora: & tenditur cutis frontis: & destruitur color cutis: &

fit quasi sit super eam puluis quidam & adustio solis: & perducit ad grauedinem eleuandi supercilia: & fit oculus somnolentius, & clausus absque somno, & subtrahitur nasus, & elongantur pili, & apparent pediculi: & videtur uenter iam minorari, & adherere cum dorso, quasi sit cutis sicca, quæ iam attracta est: & attrahitur cum ea cutis pectoris. Cum ergo curuantur lingue, & arcuantur, tunc iam uenit ad statum: & incipit alme feter, & cum peruenerit in alme feter liquefunt cartilagines.

Cura hæctica. Cap. 4.

Intentio in curatione febris hæcticæ, est infrigidatio, & humectatio. Et unaquæque earum cõpletur cum approximatione suarum causarum, & expulsionem causarum sui contrarij. Et fortasse est causa unius earum, causa contrarij alterius: sicut causa infrigidationis, ipsa enim quandoque est causa exiccationis, quæ est contraria humectationi: sicut infrigidatio cum trochiscis camphoratis, & illis, quæ sunt ex spodio, & his similibus. Et fortasse humectatio iterum est causa calefactionis, quæ contraria est infrigidationi, sicut vinum: nam ipsum humectat, sed calefacit: quare oportet ut obseruetur illud. Et si necessitas uocet ad fortem infrigidationem, & non fit nisi cum siccis, coniungantur cum eis, aut procedat ad ea, aut succedat res in qua est uirtus humectationis. Et similiter cum vocat necessitas ad fortem humectationem uelocem in ea, sicut aqua carnis, & uinum, tunc oportet ut adiungatur ei, aut antecedit eam, aut sequatur eam illud in quo est infrigidatio. Et si fuerit causa hæcticæ apostema, aut lesio in membro, tunc necessarium est curare ipsum in primis. Et qui diligit componere regimen eius ex diuersis modis conuenientibus ei, in quo febris fit uehemens ualde, tunc necessarium est ut incipiat, & det in portu trochiscos camphoratos, & quæ currunt cursum eorum cum syrupo acetoso diluendo, et in portu Solis aquam hordei cum cancri, si non abhorret eos, aut cum iuleb, aut cum aqua granatorum: & apud somnum mucilaginem psyllij, si non fuerit prohibens aliquid propter stomachum, & alia. Et regimen infrigidantis est per illud, quod sciisti de potibus infrigidantibus, & de oleis infrigidantibus, & trochiscis, sicut trochisci de camphora, & emplastris, & vntionibus, & his similibus, & infrigidatione aeris eorum, ita quod in hyeme. Si autem non tolerat, attenuetur super ipsum coopertura: infrigidatio namque aeris eorum est melior res: & sicut uestire eum cum sandalaris, & camphoratis, & facere ipsum odorare illud in quo sunt rose, & camphora, & sandali, & fructus frigidi, & alia hęc frangaspersa cum aqua rosata. & sit alienatio sudoris, &

balnei. Et oportet ut non prolongetur retentio emplastrorum infrigidantium ualde super membra propinqua ualde membris anhelitus: fortasse enim infert illud anhelitui, & uoci nocuum magnum. Et oportet ut declinet ad quietē, & somnum, & tranquillitatem, & gaudium. Et custodiatur aeger ab eo, quod facit ipsum irasci, & quod facit ipsum tristari, & quod facit ipsum angustiari, & à fame, & siti longa. Emplastra infrigidantia quibus oportet eos uti, sint aromatica, nam ipsa sunt propinquiore iuuamenti: & proprie super pectus, & quæ sequuntur ipsum: & sint infrigidata, & non sit in eis stypticitas. Stypticitas enim cum hoc, quod ipsa facit accidere exiccationem, prohibet uirtutem medicinæ profundari. Et oportet ut absiductur permutatio, ut non remaneat medicamen, quare calefiat & calefaciat cum obseruatione uehementiæ infrigidationis eius: nam cum ipsum infrigidat uehementer, non elongatur quin debilitet membrum. Et quando est prope membra anhelitus, non est longinquum quin impediatur diaphragma, & alia ab emissionem anhelitus cum facilitate. Et de regimine humectante sunt cibi facti ex lacte & fructus, & tinæ, & vnctiones, & emplastra, & odoramenta, & caputpurgia, & quies, & tranquillitas: & ut non inferatur ei uiolentia in fame, aut siti.

Rememoratio medicinarum infrigidantium eos. Caput 5.

Illæ uero quæ de eis sunt infrigidautes, aut humectantes, omnes sunt nutritiue: aut vincit in eis nutritibilitas: sicut aqua hordei decocta cum cancri ex parte cancri. Et oportet ut euellantur extremitates cancrorum ex corporibus eorum & addita tamenta eorum, & abluantur cum aqua frigida, & sale bono, cum cinere vicibus tribus, & supra, donec mundificentur, & purgentur à Zheumet ipforum: deinde decoquantur in aqua hordei, & sicut aqua lactis vaccini de quo extractum est butyrum: & sicut succi olerum notorum prædictorum in capitulis febrium acutarum: Et sicut mucilago psyllij. In aceto autem est uehemens exiccatio, & uirtus resolutionis: quare oportet ut bibatur cum eo, quod resistit: duabus proprietatibus. scilicet per commistionem aquæ multæ, aut cum quibusdam humectantibus & lenificantibus. Et lac asinæ quidem existimatur, quod sit cum humectatione sua infrigidans, ita ut quidam faciant meliorem infrigidationem eius super infrigidationem lactis vaccini, de quo extractum est butyrum: uerum ipsum conuenit ei, qui non habet nisi febrem hecticam, & ei qui non habet materiā, neque humorem præparatum ad putredinem. Et oportet ut caueatur calefactio lactis, & ex eis, quæ prohibent ipsam est zucarum: Et cum times putre-

dinem accidentem ex lacte, tunc solue cum facilitate. Et si timueris calefactionem, tunc abstinere ab eo aliquot diebus: & cura in ea cum trochiscis, & aquis fructuum, deinde itera lac. Medicinæ uero infrigidautes, quæ non habent humectationem sunt, sicut trochisci noti narrati, scilicet trochisci camphorati & trochisci de corallis frigidi, & sicut trochisci humidi. Recip. spodij boli armeni ana. 3. iij. rosarum. 3. vi. seminis portulacæ, & citruli, cucurbitæ, & Karabe omnium ana. 3. iij. fiant ex eis trochisci, & sit dosi pondus. 3. vi. & sunt boni ualde. Et iterum alij proximi eis. Recip. arnoglossæ, amyli, & gummi dragaganthi animum ana. 3. iij. boli armeni, spodij ambou ana. 3. iij. papaueris 3. v. rosarum, & seminis cucurbitæ, & citruli, & portulacæ omnium ana. 3. vi. & norum cydoniorum, excorticorum, & seminis melonis, & cucumeris longi arcuati omnium 3. vij. succi liquiritiæ pondus. 3. x. conficiantur cum mucilagine psyllij. Vnctiones uero, & epimata, & emplastra infrigidantia, & odoramenta caputpurgia infrigidantia sunt illa, quæ sunt scilicet. Et meliores vnctiones sunt cum oleo de cucurbita, & de papauere, & nucifera, & alchalcis violis. Stratus autem infrigidautes, & humectantes sunt, qui sunt plani ualde de corijs asperæ aqua rosæ aut de lino de genere eius, quod sit in brasten, & sit impletio eius illud, quod non calidum facit, immo sit de genere lini pectinati, & renouatur absidue. Aut sit stratus de corijs, quæ iam sit impleta aqua postquam sint super ea rectificauimus, quæ applanentur aqua bene, & prohibeant eis sphericitatem uel rotunditatem, & sint stratus præparatus aquas, & cursus earum, & sub eis folia arborum frigidarum, & humidarum, scilicet de salicibus, & semperuium, & olera humida, & odorifera frigida, sicut rosæ, & folia arborum frigidarum, & putia uitæ, & his similia.

Rememoratio medicinarum humectantium eos. Cap. 6.

Illarum quidem quæ sunt cum infrigidatione rememoratio iam præterijt. Et restat nunc considerare in qualitate dandi in potu genera lactis & lac de quo extractum est butyrum, & in qualitate administrationis tinæ, & balnei, & administratione unguentorum, & oleorum, & epithematum, & reliqui regiminis. Et nos quidem iam de cuiusmodi dandi in potu genera lactis in capitulo phthisis, & siccitatis stomachi, quare oportet ut sit illud canon. Et non est lac post lac mulieris, sicut lac asinæ, postea lac caprarum, cuius pascuam oportet esse ex herbis, & oleribus frigidis humidis, sicut scis: nam ipsum, & proprie lac asinæ eradicat hecticam, si fuerit ei eradicatio: & non est electio super ipsum, nisi prohibeat putredinem accidens, aut expectatio materiei comprehensæ.

lac quidem iuuatiuum est eis à principio hecticae usque ad finem eius. Et lac mulieris sugendo sumptum conuenientius est omnibus. Et canon in dando in potu lac de quo extractum est butyrum est proximus illi iterum. Et melius quidem est ut incipias à 3. x. usque ad xxx. & quod est supra eas, si fuerit virtus adiuuans. Et tibi inest ut commisceas eum eo aliquid de trochiscis infrigidantibus. Et tibi inest ut addas supra summam prædictam in potione prima, & postrema, si fuerit potens virtus super digestionem. Tina autem illa est melior, quæ est tepida, in qua non est caliditas multa, & est cum hoc cum uirtutibus oleorum, & herbarum infrigidantium, & humectantium, & non sit ita verorificet, necdum quod sudare faciat, & non licet ut uapor tinx sit calidus: & si non esset, quod prohiberet administrationem tinx frigida, non eligeretur super eam: uerum quod prohibet ab hoc est debilitas corporum eorum, & eorum extenuatio. In principijs uero rei ipsorum fortasse sanat eos illud, uerum debilitatem corporis sanat quandoque illud cum infrigidatione pauca quam facit in complexione eius, quæ possibile est ut curetur. Quod si fuerit debilius illo, timetur, quod cadat in hecticam senilem: & illud secundum minus. ueruntamen cum illo tardatur magis tempus mortis, & fortasse uiuit cum ea tempore cui est quantitas. Et multoties quidem est rectificatio seu curatio permuratio eius ad illam hecticam. Illud autem in quo sumus de resolutione tinx, rectius est ut fiat inceptio in ea cum aqua, quæ est calida ad terminum: & fiat gradatio ad frigidam, & ad temperatam frigidam tolerabilem: hæc enim gradatio facit corpus suscipibile aq. frigide, cum læso non fiat nisi per aduentum contrarij in complexione subito. Et iterum corpus acquirit ex aqua calida similitudinem teneritatis, & tolerat cum ea frigidam. Et si iteretur tina in die tribus uicibus, erit rectum. Et oportet ut administretur cum facilitate, ut non cadat uirtus. Et si sumpserit aquam hordei ante tinam duabus horis, erit conueniens. Et si præmittat ante emulsionem lactis super corpus eius, secundum q. dicemus, ut dilatat tina meatus cibi, deinde suscipiat aquam hordei, & quæ sunt ei similia, postea expectet, deinde administretur tina ut dilatur cibis: erit bonum. Et administretur post tinam, & balneum inunctio cum oleis infrigidantibus, & humectantibus, sicut oleo uiol. proprie: quando factum est ex oleo de cucurbita. similiter oleo nenufarino, & oleo de cucurbita. Et si permulentur post tinam ad illud, quod est declinius ad frigus parum tolerabile, deinde inungatur: erit melius. Et si præmittatur inunctio, & festinet eam, deinde ingrediatur aquam frigidiores parum, erit rectum: & illud secundum tolerantiam: & non est malum gradari in eo. Et melior quidem horarum huius actionis, est post digestio-

nem cibi. Et si possibile est ut submergatur post tinam calidam in aqua frigida subito, absque gradatione, est magis uitimum ex parte curæ: & magis forte ex parte timoris. Et effusio eius cum facilitate est minoris timoris, quam submersio infirmi in ea subito, & minoris iuuamenti. Et sit frigus secundum quantitatem frigoris aquæ æstatis, quæ est inter tepidam, & illam quæ est uehementis frigoris. Et si præmittatur emulsio lactis super membra sua, si non fuerit debilis, aut eius quod mistum est aqua si fuerit debilis, deinde si administretur tina: erit rectum. Nam emulsio lactis super corpus est uehementis humectationis. Et genera quidem lactis bona ad emulgendum, sunt prædicta. Et oportet ut emulgeantur ex ubere. Et dignius est, ut fiat fixio super inunctionem fricando ex oleis prædictis corpori toti, & iuncturis. Ingressio autem balnei non conceditur ei, nisi fuerit ita, ne sudare faciat, neque igniat, neque alteret anhelitum, & sit calidum aquæ eius minus calido sui aeris: & sit caliditas aquæ eius ita, ut deleat, & non lædat, & non faciat sudare: & quando non est in corpore eius materia præparata putredini, & proprie cum illud est, & non digestus est cibis: immo oportet ut sit illud cum uoluntas est ut expandatur digestum eius in corpore. Et non prolonget moram eius in eo, immo separatur ab eo uelociter. Et quando separatur ab eo, sumat aliquid de humiditatibus, & de sorbitionibus, quæ non nocent ei factis ex hordeo, & lacte. Et quando accidit ei in balneo sitis, sedet eam cum aqua hordei, & aqua albaib. Et lac sit lac albinæ. Et oportet ut sit introitus in balneum, deinde exitus eius ab eo secundum modum, ut non sit labor in eo omnino. Et iam enunciamus illud in locis alijs, & iterabimus de illo conditionem. Oportet ut permuetur ad balneum in lectica portata in qua sit lectus stratus æqualiter planus, donec perueniat cum ea ad primam domum: & tunc permuetur ad stratum lenè ex eis, quæ sunt conuenientia balneo. Et exuatur uestimentis suis in ea aut in media domo, si non fuerit calida. Et non moretur in aliqua earum, nisi quantitate permutationis, & anhelitus pauci, & quantitate qua exuatur uestimentis, deinde ingrediatur ad domum tertiam: ueruntamen non sit uehementis caliditatis: & stet in ea quantitate qua tolerat tinam. Hoc est illud, quod dictum est, & quod magis est dilectum mihi est, ut sit tina eius in domo media temperata. Cum ergo separatur à tina frigida, cooperiatur mantili, aut chlamyde habente duas tunicas, & permuetur ad stratum seu lectum suum & lecticam seu sbaram suam, & exiccetur seu sugatur sudor eius cum mantili, & inungatur, & cibetur.

Oportet ut separetur in eis cibus: & non cibentur in saturitate eorum uice una. Amplius melius quo cibantur est aqua hordei, & hordeū. s. fax eius, & panis tritici abluti infusus in aqua frigida. Et genera lactis, cum ab eis non prohibet aliquid eorum, quæ diximus: & lac vaccini de quo extractum est butyrum, quoniam est plurimi nutrimenti. Et almes, & cucurbita: & de fructibus melones felestini, & sunt melones alachi cognominati apud nos indi. Et quando sentit rectificationem, tunc non est malum cibare ipsum caseo humido non salito. Et si virtus debilitatur, non est malum ut cibetur iure isfidabegi cum coriandro humido, decocto cum eis, quæ sunt sicut alduragi, & alteiugi. Et fortasse oportet, ut detur eis in potu aliquid uini subtilis permisti cum aqua multa. Et fortasse est necessarium, ut cibus cum mosos ex carne alduragi, & alteiugi, & alcubugi, & pulorum & helaman acetoso & alcharis acetosa facta ex carne hædi, aut carne bouis, quando est illic fortitudo digestionis: & acetum almosos, & alcharis est iuuatiuum eis, & confortatiuum in hac dispositione. Et fortasse non est excusatio ab aqua carnis permista cum syrupo de fructibus frigidis, acetosis, aut vitello oui sorbilis. Et quando prolongatur cum ea debilitas ad syncopim, est necesse ut cibentur aqua carnis accepta ex costis hædi cum sale pauco, quæ coletur, & fundatur super eam quantum totum eius est de aqua malorum, & quantum est decima eius de vino odorifero, & potetur tepida. Aqua uero frigida, quæ non est ualde uehementis frigoris, non est malum si in potu detur eis, si non fuerit debilis, aut aliquid prohibens: & illud prohibens, aut erit apostema sub hypochondrijs, aut erunt in corpore toto chymi putridi, & chymi crudi, qui omnes digestionem indigent, & non apparet signum digestionis: quod si appareat, timor erit minor. Et similiter si fuerit hectica permutata ex firslen aut birslen: nam cum hac melius est, ut interdicator potus aquæ frigide, quam cum alijs. Hectica enim cum superuenit ægritudinibus destruentibus virtutem, mollicianribus eam, arefacientibus ossa, & carnem, superuenit debilitati. Cum ergo coniungitur ei super debilitatem post sumptionem aquæ frigide, non moratur quin cadat in genus alterius hectice, quæ communicat huic generi in siccitate, & diuersificatur ei in calore, & frigore: & nominatur hectica senectutis, & hectica senij. Et illa quidem est ægritudo sæua, in qua innatus calor iam destructus est. Et similiter aqua ultimi frigoris, & plurimi nocet eis in omni dispositione, & corrumpit innatum calorem membrorum eorum radicalium. Et fortasse festinat mortem eorum, aut permutat eos ad modum alium hectice.

DE illis est syncopis: & iam diximus regimē in hoc multoties. Et de illis est fluxus ventris. Et oportet ut curetur, & succurratur ei. Nam in hoc est timor magnus. Et de curis eius in primis est, ut sit aqua hordei eorum aqua sauich. Et ponatur in aqua hordei eorum milium torrefactum, & gummi, aut lentes elixatæ iteratæ, aut lac decoctum cum lapidibus, aut cum igne solo, donec consumatur eius aquositas: & proprie cum milio: & potent hos trochiscos. Recipe boli armeni 3. v. castaneæ torrefactæ, ros. omniū ana. 3. iij. spodij, karabe, amborum ana. 3. iij. seminis acetosæ excorticati, granorum berberorum oīum ana. 3. vj. fiant trochisci cum succo cydoniorū: & detur in potu cum aqua pirorū in mane, & apud somnū. Et detur in potu psyllium torrefactum: & similiter suffus de spodio in quo est bdelliū de mecha, est iuuatiuum ualde. Et si peruenit ad excoriationem, curetur excoriatio cum clysteribus, quæ scis: quoniam illud est conueniens.

Currit consuetudo ut dicant hecticam senectutis post febrem hecticam. & nos etiam incedamus uia consueta. Intentio itaque hectice senectutis est dominium siccitatis super complexionem absque febre. Et quandoque fit cum æqualitate in calore & frigore, & illud est secundum minus. Et quandoque fit cum frigore, & nominatur hæc dispositio hectica senectutis, & hectica senij: quoniam corpori accidit in non hora senij illud, quod accidit in illa hora ex debili seu infirmitate & siccitate. Et senes quidem sunt uelocioris casus in ea, quam iuuenes. Et iuuenes uelocioris casus in ea, quam pueri, licet accidat in iuuenibus, & pueris. Et causa faciens cadere in eam, aut est frigus dominans cum debilitate corporis, quare prohibet uirtutem nutritiuam ab operatione sua integra: sicut accidit iterum in senectute. Et de hoc capitulo est potus aquæ frigide non in hora sua, aut super debilitatem corporis cum febre, & in dispositione eruditatis aut successione exercitij resoluentis uirtutem, & experientis poros, & quod uocat ad attrahendum aquam frigidam ad uiscera subito. Aut uapores mali, frigidi, qui eleuantur ad cor, & infrigidant complexionem eius. Aut caliditas, quæ resoluit, & liquefacit humiditates, quare caliditas innata debilitatur, & succedunt frigus, & siccitas. Et quandoque sequitur euacuationes. Et quandoque attrahit hanc ægritudinem superfluitas in infrigidando patientes febres, cum eis, quæ bibuntur, & emplastrantur. Et hæc quidem ægri-

æritudo quando confirmatur, non curatur: & si esset ei ingenium, esset morti ingenium.

Signa. Cap. 10.

IN illis videntur signa aldubul, & exsecationis: & non uidetur in eis incensio, & inflammatio, immo fortasse inueniuntur frigidi tactus. Et eorum pulsus non est sicut pulsus habentium febres heclicas, immo est tardus, paruus, & rarus, nisi fortis fiat debilitas: quoniam tunc incipit pulsus fieri frequens, & proprie in illis quibus aduenit hoc ex potu aqua frigida. Et est urina eorum alba, subtilis, aquosa, & sunt in dispositionibus suis sicut senes.

Curatio heclica senectutis. Cap. 11.

Non adhibetur hæc cura nisi cum nondum confirmata est: & speratur, quod non confirmetur: & cum confirmata est, speratur ut postponatur perditio parumper. Et canon quidem in curatione eorum est calefactio, & humectatio. Et ex humectatione sunt balnea secundum quod sciisti, quæ non administrentur nisi post digestionem: nam si ipsa administrentur succensione comestionis, faciunt cadere uirtutem. Et clysteria facta ex capitibus, & pedibus, & cicere & tritico uehementer decocto & sicibus cum hasech & chamæmilla de quo administretur quantitas medietatis lib. cum vnc. 2. olei sisamini, & aliquantulo olei de ben: & administretur fricatio super cibationem. Et lac succum ab ubere est uehementis inuamenti eis. Et mel est ultimum in inuamento eorum, sicut est ultimum in nocumento habentium febrem heclicam. Et omnis cibus humectans, facilis penetrationis, uelocis descensionis in quo non est uiscositas, sicut aqua carnis, & uittellorum sorbilibus, & pinum subtile odoriferum, paruæ quantitatis, est uehementer conueniens eis. Et oportet ut obseruetur humectatio prædicta in capitulo heclicæ: & misceatur cum ea quod calefaciat ex odoribus, & emplastris, & unctionibus fricando, & cibis & alijs.

TRACTATUS IIII.

De febribus pestilentialibus, & quæ sunt eis homogenea, & uariolis, & morbillo.

De febre pestilentiali. Cap. 1.



QUANDOQUE accidit aeri quod docuimus te in libro uniuersalium, sicut accidit aqua de conuersione in qualitate sua ad calorem, & frigus: & de conuersione in natura sua ad alterationem

uel transmutationem aqua, & scætet, & putrescit. Et sicut aqua non putrescit secundum dispositionem suæ simplicitatis, immo propter illud, quod admiscetur ei de corporibus terrenis malis, quæ permiscetur ei, & accidit toti qualitas mala: similiter aer non putrescit secundum dispositionem suæ simplicitatis, immo propter illud, quod admiscetur ei de uaporibus malis, qui permiscetur ei, & accidit toti qualitas mala. Et quandoque est illud causa uentorum deferentium ad locum bonum fumos malos ex locis longinquis in quibus sunt loca stagnosa uel paludosa alterata ad putredinem, aut in quibus sunt corpora cadauerum corrupta in prælio aut corpora mortua ex peste non sepulta aut non combusta. & quandoque est causa propinqua loco in quo currit. Et quandoque accidunt putredines in interioribus terre propter causas quæ ignorantur cum suis particularibus: quare perueniunt ad aquam & aerem. Et febres quidem accidentales causa aeris sicci minus sunt, quam huiusmodi accidentales ex aere humido, nisi quod cholera multiplicatur in aere sicco: quare est ille etiam causa ut eueniant febres cholicæ. Pestilenciales uero sunt ex aere turbido, & humido. Et febres in aere humido sunt pluris euentus, sed sunt minoris acuitatis, & longioris spatij. In æstate uero sicca, pauca pluuia sunt minoris euentus & maioris acuitatis, & uelocioris separationis. Et meliora tempora sunt, quæ seruant naturam suam. Et principium omnium harum alterationum sunt formæ ex formis celi facientes esse necessarium illud, cuius aduentus ignoratur: licet sint quidam, qui dixerunt in eo aliquid non proportionatum ad causam eius: immo oportet ut scias, quod causa prima longinqua ad illud sunt figuræ celestes, & propinquæ dispositiones terrestres. Et quando faciunt necessario uirtutes agentes celestes, & uirtutes patientes terrestres, humectationem uehementem aeri, eleuantur uapores, & sumi ad ipsum, & sparguntur in ipso, & putrescunt eam cum caliditate debili, & quando fit aer secundum hunc modum, uenit ad cor, quare cor rumpit complexionem spiritus, qui est in ipso, & putrescit quod circundat ipsum de humiditate, & accidit caliditas egressa à natura, & spargitur in corpore causa fluxibilitatis suæ & fit febris pestilentialis. Et communicat multitudini hominum, qui iterum habent in seipsis proprietatem præparationis. Agens enim solum cum peruenit, & patienti non est præparatio, non accidunt actio & passio. Et præparatio corporum ad illud in quo fumus de passione est, ut sint plena humoribus malis: nam munda non forsitan patiuntur ex illo, & corpora debilia iterum patientia sunt ex ea, sicut illa, quæ multiplicant coitum, & corpora dilata torum pororum humida multa balneationis.

Signa. Cap. 2.

HAec febris est quæta exterior, conturbans interior, secundum plurimum perdens, ex qua percipitur caliditas & inflammatio fortis. Et est cum ea magnitudo anhelitus, & eius exaltatio, & constringitur multoties, & fit foetidus & frequens, & uehementia sitis, & siccitas linguæ. Et quandoque fit cum nausea, aut casu appetitus: & si non resistitur ei cum comestione uolenter, interficiet eum. Et dolor oris stomachi. Et magnitudo splenis. Et angustia uehemens: & inquietudo. Et fortasse erit tusus sicca. Et casus uirritus, & peruenitur in ea ad syncopim: & commisionem rationis. Et tenditur, quod est sub hypochondrijs. Et fiunt cum ea uigilæ. Et mollificatio corporis, & tepor. Et quandoque accidit cum ea bohor flaua seu subalbida, & rubea: & quandoque est uelocis apparitionis, & uelocis occlusionis. Et accidunt cola; & ulcera. Et sitipulsus secundum plurimum frequens, paruus, & fit uehemens secundum plurimum in nocte. Et quandoque accidit eis dispositio sicut hydropisis. Et fluxus uentris cholerae, & aliorum; & est egestio eius lenis, foeda, non naturalis, & quandoque est melancholica: & plurimum eius est spumosum, & foetidum: & est in illa aliquid de genere eius, quod liquefit. Et est urina eius aquosa, cholerica, melancholica. Et multoties euomunt melancholiam, choleram uero plus illa. Et sudant sudore foetido. Et hæc quidem febris incipit cum accidentibus prædictis cum fortitudine sua, & uenit res eius ad syncopim, & frigus extremitatum, & lithargiam, & spasmus, & alcuzex. Et quandoque est de his febribus pestilentialibus in qua non percipit æger, nec tangens propinquus multitudinem caloris, & non alteratur pulsus, & aqua magna alteratione, & cum hoc ipsa est interficiens uelociter, & hæsitant medici in esse eius. Et plurimi quorum anhelitus foetet ex istis, & ex primis, moriuntur: nam putredo est iam confirmata in corde.

Signa pestilentia. Cap. 3.

DE illis quæ significant pestilentiam, de rebus, quæ currunt cursu causarum, est ut multiplicentur alragium, & alseheb. i. apparitiones ignea sicut fydera cadentia & similia in principiis autumnii & in ailul. i. in mense Septembris: nam indicat pestilentiam euenientem indicatione cause, & quando multiplicatur auster uentus orientalis in chanun. i. in mense Decembris diebus aliquot. Et quoties uideris turbiditatem aeris & nebulositatem eius, & existimaueris pluuiam, & inueneris eum puluerulentum siccum non cum pluuiæ: tunc scias, quod complexio hyemis est corrupta. Pestilentiam autem æstiuam malignam, ma-

lam significat paucitas pluuiæ in uere cum frigore deinde multiplicatur auster, & conturbatur ær aliquot diebus, deinde clarificatur post hebdomadam unam & quod est supra eam: deinde accidit frigus in nocte, & in die calor est uehemens, & præfocatio; & conturbatio, & caliditas, tunc iam uenit pestilentia, & expectantur febres pestilentia, & uariola, & his similia. Et similiter quando æstas non est uehementis caloris, & est uehementis conturbationis, habens maturina alterata, puluerulenta: & iam præterierunt in autumno alseheb. i. apparitiones ignea & ignea & niazech. i. stella comata, est signum pestilentia & aliorum. Et similiter quando uideris aerem alterari in die uno multis uicibus, & clarificatur ær die aliquo, & oritur sol clarus, & conturbatur die alio, & oritur in uelaminibus nebula, quæ est ut puluis, tunc iudica, quod pestilentia accidet. Signa autem, quæ sunt secundum semitam societatis causæ sunt, uerbi gratia ut uideas ranas iam multiplicari, & uideas reptilia generata ex putredine iam multiplicari. Et de eis, quæ significant illud est ut uideas mures, & animalia, quæ habitant sub terra fugere ad superficiem terræ, & pati sedar. i. commoueri hinc inde, sicut animalia ebria: & uideas animalia sensibilibus naturæ, sicut allechalach & eis similia fugere ex nidis suis, & ire ab eis, & fortasse dimittunt oua sua.

Curationes febrium pestilentialium. Cap. 4.

Summa curationis earum est exiccatio: & illud cum phlebotomia, & solutionis uentris: & oportet ut incipiatur in ea ad euacuandum. Si autem materia uincens fuerit sanguinea, fiat phlebotomia: & si fuerint humores alij, euacuentur. Et oportet ut infrigides domos eorum, & rectifices aeres ipsarum. Domorum autem infrigidatio fit, ut uallentur fructibus odoriferis, frigidis, & extremitatibus arborum frigidarum, & linimentis, & rorationibus sumptis ex fructibus frigidis, odoriferis, & ex camphora, & aqua rosacea, & sandalis: & roretur domus eorum omni die aliquoties, & proprie cum aqua rosacea, & de Kalc, & de nenufare: & si fuerint in domo manationes, & rorationes aquæ, erit melius. Aeris uero rectificationem dicam. Et administrentur eis trochisci de camphora, & robur frigida, & aqua lactis acetosi, & lac acetosum ablato butyro, & aqua rosacea, in qua dissolutum est serum uel aqua lactis acetosi boni & acetum cum aqua iterum. Et aqua frigida plurima subito est iuuatiua valde: pauca autem consequenter exhibita fortasse excitat caliditatem. Quod si res prolongetur ad hoc, ut tendantur hypochondria, & infrigidentur extrema, & prolongentur uigilæ, & permistio mentis, & uides pectus, & quod est super ipsum eleuari, & descendere, tunc necesse est administrare cooperturam trahentem calidi-

caliditatem exterius. Et quando cadit appetitus, cogantur ad comestionem. Nam pluri eorum, qui uiriliter agunt super illud, & comedunt uiolenter, absoluuntur, & uiuunt, quare necesse est cogere eos ad cibum. Et oportet ut sint cibi eorum ex acetosis, & desiccatiuis: & sint pauca quantitatis. Cibi nanque eorum sunt iterum mali, quare nocet eorum multitudo, ex parte repletionis, & nocent in quantum sunt mali. Rectificationis autem pestilentiae pars est secundum sanes, qui sunt in ea, & pars eius est secundum sanos & aegros. In illa uero, quae est secundum sanos intentio est, ut exiccetur aer, & fiat boni odoris: & prohibeatur eius putredo cum quacunque re sit: & rectificetur cum xyloaloe crudo, & ambra, & thure, & muscho, & costo dulci, & storace, & sandaracha, & asfisa, & gariophyllis, & mastice, & glutine albotin, & laudano, & melle, & croco, & sechi. galia, & cupressi, & iunipero, & alusne, & lauro, & cyperis, & squinantho, & fauina, & acoro, & alfababech, & amygdalis amaris, & assaro. Et quandoque fiunt ex istis composita. Et aspergatur domus aceto, & asfa. Secundum sanos uero, & iterum febricitantes, & aegros est suffumigatio cum sandalis, & camphora, & corticibus granatorum, & myrto, & malis, & cydonijs, & hebeno, & alsagi, & tamarisco, & ribes: & oportet ut multiplicetur suffumigatio.

Præseruatio à pestilentia. Cap. 5.

Oportet ut extrahantur à corpore humiditates superfluae: & inclinetur regimen eius ad exiccationem ex omni modo, & ex minoratione cibi, nisi exercitio. Oportet enim ut non administraretur, neque balneum, neque bibitiones, neque toleretur sitis. Et rectificetur aer cum eis, quae diximus. Et declinet cibis ad acetosa. Et minoretur ex eo. Et sit caro, quae administratur decocta in acetosis. Et summatur de alhelam & alcharis, & almosos factis cum aceto, & absq; aceto cum sumach, & aqua acrestæ, & aqua limonis, & aqua granatorum. Et condita in aceto iuuatiua sunt: & proprie capparitis aceto condita. Et althæa. asfa ex illis est, quae conferunt, & prohibent ab eis putredinem. Et de illis quibus ex ea fit euasio, est administratio theriacæ, & mithridati ante eam cum reliquo regimine bono. Et de medicamine facto ex aloë, & croco, & myrrha sumatur omni die circiter drach. i. quoniam est iuuatiuum.

De variolis. Cap. 6.

Quandoque accidit in san. ebullitio secundum semitam putredinis cuiusdam, de genere ebullitionum quae accidunt succis: & talia quidem accidentia fiunt per eam, ita ut partium ab inuicem discernantur. Et de hoc est cu-

ius causa est res quasi naturalis faciens ebullitionem sang. ut expellatur ab eo illud, quod admisceatur ei de reliquijs nutrimenti sui mēstrualis, quod erat in hora imprægnationis, aut generatur in ea post illud ex cibis fœculentis, & malis, de illis quae rarificant substantiam eius, & faciunt eam ebullire, donec fiat ei substantia recta fortior prima, & magis apparet: sicut illud, quod natura efficit in succo uiræ, ita quod rectificat ipsum, faciendo uinum similis substantiae: & iam expulsa est ab eo spuma aerea & fax terrena. Et de hoc est, cuius causa est res adueniens extrinsecus, ebullire faciens, occulta quae permiscet humores cum sanguine, commistione existente in dispositione ebullitionis, & stationis sub Sole, sicut accidit apud alterationem temporis, & proprie ueris ab eo, quod per rinet ei de qualitatibus & ordine. Et uariolæ quidem, & morbillus sunt de summa ægritudinum contagiosarum. Et multiplicantur in successione austrinorum, quando multiplicatur eorum per flatio. Et corpus quidem variolis præparatum est illud, quod est calidum & humidum, & conturbat humiditatis, proprie quod parum extrahit de sanguine per phlebotomiam. Et de cibis sunt cibi, qui faciunt cadere in uariolas uelociter, & proprie quando non sunt consueti, & administrantur super eos medicinae, & cibi calefacientes, sicut lac, & proprie camelarum & equarum: cum multum repletur ex eis ille, qui non assuetus est eis: deinde bibit uinum plurimum, aut medicinas calidas. Et uariolæ quidem sunt quasi modus quidam crisis. Et plurimum quidem accidunt uariolæ infantibus: deinde iuuenibus: minoratur earum euentus in senibus, nisi propter causas fortes, & in regionibus uehementis caliditatis & humiditatis. Et earum euentus in corporibus humidis est plus, quam sit ipsarum euentus in corporibus siccis: & earum euentus in uere plus est, quam ipsarum euentus in hyeme. Et post uer in fine autumnus: & proprie quando præcedit æstas calida, & sicca, & fuerit ille autumnus calidus & siccus. Et uariolæ non accidunt in cute solum, & in eo quod sequitur illud, quod apparet, immo accidunt in omnibus membris similium partium apparentibus, & occultis, ita quod uelaminibus, & nervis. Et quando apparent uariolæ, faciunt incurrere pruritum, deinde apparent res sicut capita acuum similia milio, deinde egrediuntur, & impleantur sanie, deinde ulcerantur, & fiunt crustæ diuersorum colorum, deinde cadunt. Et fortasse permutantur uariolæ ad phlegmonem, & massere, & ad dubellati, quae aggregat saniem. Et plurimum quidem cum apparent, habent colorem phlegmonis, ueruntamen quandoque egrediuntur secundum colores diuersos cineritiæ, & uiolaceæ, & nigræ. Variolæ enim sunt species, & colores: nam de eis sunt albæ, & de eis citrinæ, & de eis sunt rubæ, & de eis sunt uirides, & de eis sunt uiolaceæ, & de eis sunt ad nigredinem

dinem decliues. Et uirides quidem, & uiolaceæ sunt malæ: & quanto plus additur declinatio ad nigredinē, tanto est deterius: & quanto plus sunt decliniores ad illud, tanto plus sunt decliniores ad malitiam. Et albæ quidem sunt meliores: & proprie quando sunt pauci numeri, magnæ quantitatis, facilis exitus, paucæ angustię, debilis febris: & uides febrem minui cum earum apparitione, & ipsarum egressione: & est principium exitus earum in tertio, & quod ei approximat: & post illas sunt albæ, magnæ, pluris numeri propinquæ absq; continuatione. Nam illæ, quæ continuantur ad inuicem, ita ut continuentur in frusto magno carnis habentes costas aut rotundam formam, sunt malæ. Et similiter iterum duplices magnæ, in uentre unius quarum est uariola alia. Albæ uero parua, duræ, propinquæ, difficilis exitus, licet faciant existimari in principio rei salutem, tamen timetur in eis, quod difficilis fiat earum maturatio, & fiat cum eis mala dispositio ægri: & perueniat per eas ad perditionem, quoniam causa in eis est grossitudo materiei. Et de speciebus malarum timorofarum, quæ plerumque interficiunt, sunt illæ, quarum diuersificatur egressio: nam quandoque apparent, & quandoq; occultantur, & proprie quando apparent uiolaceæ: & similiter tenaces, quarum operatio non cessat à debilitate uirtutis & uiridificatione membri & nigricatione eius perdunt. Et si uiriditas, & nigredo, quibus post succedit declinatio, non faciunt cadere uirtutem, immo additur cum eis uirtus, non sunt mortiferæ: sed fortasse cadere faciunt in ulcera, & quæ currunt cursu eorum. Et ut sit febris, deinde uariolæ, saluius est quam sint uariolæ præcedentes, deinde consequatur eas, & accidat super eas febris. Et illud quidem, quod plurimū considerare oportet in esse patientis uariolas, est eius anhelitus, & ipsius uox. nam ipsa duo cum remanent bona, est res salua. Et cum uideris anhelitum patientis uariolas consequentem, & similiter patientis morbillum, tunc existima casum uirtutis, aut apostema diaphragmatis: deinde cum uides firim uehementem fieri, & angustia assiduam, & ea quæ apparent infrigidantur, & uariola & morbillus uirides fiunt, tunc iam percipitur æger mori: & uerificatur illud, si uariolæ fuerint de genere earum, quarum egressio, & apparitio tardantur. Et plurimi eorum, qui moriuntur per uariolas moriuntur præfocati ex synantia. Et quandoque moriuntur per casum uirtutis cum rasura intestinorum, & fluxu uentris. Et cum uideris uiolaceas de uariolis & morbillo profundari, tunc scias, quod super ueniet ægro syncopis. Et quando festinat ad mingendum sang. & succedit ei urina nigra, tunc est mortiferum, præcipue quando est illic casus uirtutis. Et fluxus uentris uiridis, sanguineus, aut lotius cum casu uirtutis. Et alhamica est aliquid inter uariolas & morbillos, & est saluior ambo-

bus. Et multoties quidem uariolatur homo duabus uicibus, quando aggregatur materia ad expellendum bis. Et alium coloris plumbini sunt uariolæ, quarum borhor in facie, & pectore, & uentre sunt, plusquam in cruribus, & pedibus: & sane malæ, & significant materiam grossam, quæ non expellitur ad extremitates.

Signa apparitionis uariolarum. Cap. 7.

Quandoque antecedunt apparitionem uariolarum dolor dorsī, & pruritus nasi, & timor in somno, & punctio uehementis in membris faciei, & grauitas communis, & rubedo in colore faciei, & oculi, & lachrymæ, & inflammatio, & multitudo alicui & ositationum cum constrictione anhelitus, & raucedo uocis, & grossitudo sputi, & grauitas capitis, & dolor capitis, & excario oris, & angustia, & dolor in gutture, & pectore, & tremor pedis apud resupinationem, & declinationem ad ipsam. Et cum hoc toto febris conclusa.

De morbillo. Cap. 8.

Scias quod morbillus omnis est uariola cholerica: & non est differentia inter ea ambo in plurimo reliquarum dispositionum nisi quia morbillus est cholericus: & quod ipse est minoris quantitatis, & quasi ipse non pertransit cutem: & non est ei altitudo de qua curetur, proprie in principio sui. Variolæ uero in principio suæ apparitionis est eminentia, & altitudo: & morbillus est minor uariolis, & minus accidit oculo, quæ uariolæ. Et signa apparitionis eius proxima sunt signis apparitionis uariolarum, uerum subuersio stomachi in eo est plus, & angustia, & inflammatio uehementior, & dolor dorsī minor: quoniam causa eius in uariolis est repletio sang. extendens uenam positam super dorsum: nam generatio uariolarum est propter multitudinem san. corrupti: & morbilli propter uehementiam malitiæ san. corrupti, pauci. Et morbillus secundū plurimū egreditur subito: & uariolæ aliquid post aliquid.

Signa salutis eius. Cap. 9.

Sunt sicut signa salutis uariolarum: nam illæ, quæ est uelocis egressione, & apparitionis, & maturationis, est saluus. Et durus, & uiridis, uiolaceus, est malus: & qui est tardæ maturitatis, frequentis syncopis, & angustia, est perniciosus. Et qui occultatur iterū subito, est malus faciens syncopim.

Cura. Cap. 10.

Oportet in uariolis ut incipiatur, & extrahatur sang. sufficienter, cum conditiones fuerint.

Et similiter si morbillus fuerit cū repletionē sang. Et spatium illius est usque ad quartum. Sed quando egrediuntur uariolæ, non oportet tunc ut administratur phlebotomia, nisi inueniatur uehementia repletionis, & dominium materiei: tunc in phlebotometur quantitate, quæ alleviet seu minoret. Et convenientius quidem, quod in hac administratur ægritudine est phlebotomia. Et si phlebotometur uena nasi, confert iuuamentum fluxus sang. narium, & tuetur partes superiores à malitia uariolarum. Et est magis facilis super infantes. Et quando necessaria est phlebotomia, & non phlebotomatur iterum complete, timetur super ipsum corruptio extremitatis. Et similiter timetur quandoque simile illi super illum cuius assiduatur extinctio. Et oportet ut fiat in eis cibatio in primis cum eis in quibus est confortatio cum percussione & extinctione absque constrictione nature, & inspissatione sang. sicut cibus, qui fit de iuiubis cum tamarindis, & cibus factus ex thalhai. ex floribus dactylorum uel ex dactylis immaturis cum primo exire incipiunt, & ex lentibus præparatis in asidbegi. i. præparatis istis floribus dactylorum & lentibus in modum fereuli liquidi. Et lenificatio uehementis. Et similiter oportet, ut sint cum istis tamarindis, & ex illis, quæ conueniunt, eis sunt cibus factus ex cucurbita & melon batheca alraki: immo oportet ut sit natura lenis in principio, & melius cum quo fit lenificatio, est tamarindi. Et si non obedit cum eis, additur super eos siracost cum facilitate, & cautela, aut tereniabin, aut infusio prunorum. Et confert quandoque si in potu detur in principio apparitionis uestigiorum uariolarum pondus. 3. iij. de rob alchedar cū uno de trochiscis camphoratis & syrupus de floribus dactylorum seu de dactylis paruis immaturis est uehementis iuuamenti in huiusmodi hora. Cum ergo additur & pertransierit ægritudo diem secundum, & incipiunt uariolæ apparere, tunc fortasse erit infrigidatio causa erroris magni, ex eo quod retinet superfluitatem interius, & defert eā ad membra principalia, cum eo quod non sit eis possibile exire, & apparere, & accidit inquietudo, & angustia, & fortasse accidit syncopis: immo oportet ut inueniatur superfluitates in huius dispositione cum eis, quæ faciunt ebullire, & aperiant opilationes, sicut fœniculum, & apium cum zaccaro, & succus eorum, aut decoctio radicum, & seminum. Et fortasse odoratur aliquid de croco. Et aqua ficuum est bona ualde: ficus enim sunt uehementis expulsionis ad exteriora: & illud est una de causis euasione à nocumento earum. Et de illis, quæ conferunt ualde in huiusmodi hora, est ut sumatur laccæ ablutæ. 3. v. lentium excorticatarum. 3. vij. dragaganthi. 3. iij. deinde coquantur cum lib. 5. aquæ usquequo remaneat quarta lib. unius, & detur in potu. Et de illis, quæ sunt uehementis iuuamenti ad faciendum apparere uariolæ,

est ut sumantur ficuum citrinarum. 3. vij. lentium excorticatarum. 3. iij. laccæ. 3. iij. dragaganthi, & minis fœniculi ana. 3. ij. decoquantur cum lib. 5. aquæ donec remaneat ex ea fere tertia, & coletur, & detur in potu de ea: expellit enim caliditatem à partibus cordis, & prohibet pulsus cordis. Et oportet ut nō approximet ei in hac hora oleum ali quid omnino. Et oportet ut cooperiatur, & elongetur ab aere frigido, & proprie in hyeme: & fiat cum illo illud, quod fit cum sudante: frigus enim oppilat poros, & redire facit materias retro. Et multitudo potus aquæ frigidæ cum niue. Et introitus in domo uenti mala sunt ualde. Et fortasse phlebotomia est mala: propterea, quod repellit, & conuertit illud, quod egreditur, quare caueatur post duos dies, aut tres. Et quando accidit ex coopertura pannorum, & calefactione quasi syncopis, aut existimatur, quod accidit syncopis, tunc non est excusatio ab infrigidatione aeris, qui attrahitur proprie, & properatione ad odores camphoræ, & sandalorum. Et si non fuerit excusatio quin detegatur corpus domi uenti, aut aeri frigido, paulatim fiat: & similiter quando adiutorium est cum calefactione aut dimissione infrigidationis. Et quando incipiunt exire, & non inuenitur cum exitu earum alleviatio, immo inuenitur caliditas inflammata, & lingua ad nigredinem deliquis, tunc caue ne calefacias. Et oportet ut tu alienes ab habentibus uariolæ, & morbillum, emplastrationem uentris: in hoc enim est timor constrictionis anhelitus subito: & quod accidat fluxus uentris malus, & mixtus sanguinis. Et in fine eius oportet ut consumetur natura, & cibetur loco lentium sicut sunt lentibus elixatis duabus elixationibus cum renouatione aquæ: & loco lentium acetosarum cum tamarindis, dentur lentes factæ acetosæ cum aqua granatorum, & sumach, aut acresta, aut similibus. Medicinæ autem ingrossantes sang. & infrigidantes eum, prohibentes eum ab ebullitione, quæ in initio præcipiuntur, sunt sicut rob ribes, & acresta, & aqua fructuum frigidorum, & syrupus alchedar proprie & syrupus althalha. i. de floribus dactylorum uel de dactylis immaturis & flores dactylorum ipsi seu dactyli ipsi immaturi cum primo exire incipiunt & algemar. Et syrupus quidem alchedar habet descriptiones plures, quas diximus in antidotario, & dicemus hic descriptionem fortem, mirabilem: & est illa, quæ fit cum aqua lactis acetosi iteratis: & uirtus eius est uehemens ualde. Descriptio hæc est. Sume rob alchedar partes. ij. si autem non fuerit tibi præsens, accipe alchedar, & fac ferrare ipsum, & accipe ferraturam eius: aut mole ipsum, & misce molitum eius cum medietate sui de sandalis in aceto distillato, aut in aqua acrestæ puræ diebus aliquot: deinde decoquatur in eo decoctione cū facilitate, eum longitudine, donec dissoluatur: deinde exprimatur, & sumantur de succo, & quanto acetum,

acetum, aut aqua acrescit est plus, tãto est melius: deinde sumatur aqua adog abstracto butyro, mūdificata à sua caseitate adog, aut cum colatione ultima, quæ sit dimittendo residere, aut cum decoctione, sicut est decoctio aquæ casei, donec separetur aquositas, deinde sumatur farina hordei, & fiat ex ea & aqua lactis acetosi focha, & fiat acetosum illud focha, deinde coletur, postea de nouo fiat focha uel renouetur focha ex eo & farina hordei & fiat acetosum, & quanto plus iteratur, tanto est melius. Sumantur ergo de eo partes.v. & sumatur aqua pirorum de semi. & aqua cydoniorum acetosorum plurimæ aquæ, & aquæ granatorum acetosorum, & aquæ pomorum acetosorum plurimæ aquæ, & aquæ alzarur, & aqua limonis, & aqua prunorum acetosorum, & aquæ dactylorum in primis cum incipiunt apparere expressorum, & aquæ alchondes recētis, & aqua mororum de semi. quæ non maturantur integræ, & aquæ chryso-melorum immaturorum, & acetosorum, & succi agrestis, & succi ribes, & succi præputiorum uitis, & succi rosæ persicæ, & succi nenufaris, & succi viol. omnium ana tertiã partis unius, & succi acetositis citri. & succi acetositis citranguli ana duas tertias, partis unius, & succi coriandri, & lactucæ, & foliorum papaueris humidi, & endiuiz, & portulacæ ana quartã partis unius succi foliorum salicum, foliorum malorum, & foliorum pirorum, & foliorum alzarur, & foliorum ros. & foliorum uirgæ pastoris ana quartã partis unius, succi barbæ hircinæ, & ro. siccarum, & nenufaris sicci, & semi. berberis sicci, & seminis endiuiz, & semi. lactucæ, & balaustiarum, & nenufaris ana medietatē decimæ partis unius, & succi mentæ humidæ sextam partis unius, & succi. berberorum humidorum medietatem partis: aggregentur medicinz, & succi, & componantur super ignem, & ponantur in eis de lentibus partes quatuor, & de hordeo excorticato partes. iij. & de sumach partes. iij. & de granis granatorum partes. iij. & decoquantur omnia ad ignem; donec remaneat medietas, deinde dimittatur, donec infrigidetur, & confricetur fortiter, & coletur: & sumatur de camphora ad omne pondus. ccc. drach. pondus aurei. & teratur camphora: & puluerizetur super fundum uasis dicti cucurbita, aut super fundum ampullæ, & fundatur super ea medicina cum facilitate: deinde ligetur caput eius cum re uehementis fortitudinis, deinde ponatur super prunas donec sciat, qd forsitan feruet, & concutiat, & ponatur in uitreata, & stringatur caput eius ut non perdatur camphora, & lutetur: & dosis eius sit usque ad. 3. x. Et de hominibus est, qui ponit in ea spicæ, & zinziberis, & semi. foeniculi, & anisi, & ciperi, & piperis partes æquales secundum quantitatem, quæ euidentur. Et quando egrediuntur uariolæ cum complemento, & pertransit septimus, & apparet in eo maturatio, tunc necesse est ut rumpantur cum fa-

cilitate cum acubus de auro, & auferatur humiditas cum cortio. Salitio autem necessaria est: & cum uolueris salire, tunc elonga salitionem ab eis quas erupisti de magnis dolorosis ex propinquo: illud enim facit dolorem: immo sali illas, quæ sunt preter eas, & dimitte eas ut non claudatur à sale uia seu orificium ipsarum donec sugant salem suum: & non saliantur ante complementum maturacionis: illud enim fortasse faciet accidere dolorem uehementem, & apostema. Et salitio quidem est res, quæ est necessaria, postquam maturantur: & illud quidem fit cum aqua salis, in qua est uirtus croci. Et si aqua illa est aqua ros. tunc est melius. Et aqua in qua decoquantur tamariscus, & lentes, & rosæ, deinde salitur, est ultima: & proprie si ponatur iterum in ea camphora, & sandali: hæc enim salitio maturat, & exiccat, & facit cadere cum uelocitate. Et suffumigatio cum tamarisco, est iuuariua ualde. Et in hyeme oportet ut applicetur æger incensionem ex tamarisco. Et quando uariolæ sunt uehementis humiditatis, tunc necessaria est suffumigatio cum myrto, & folijs eius. Et de regimine bono apud maturitatem uariolarum & magnam uoluntarem exiccationis earum, est ut dormiat patientis uariolas super farina rizi, & milij, & hordei, & fabarum: & magis conueniens est ut ponas ipsam implendo stratum uel culcitram, quæ sit ex tela rara in qua penetret uirtus. Et folia liquiritiæ sunt bona in hoc. Et oleum malum est in hac hora, quoniam prohibet exiccationem. Et quando incipiunt uariolæ exiccare, tunc oportet ueliniatur cum adiuuantibus super ipsam, quæ sunt ex medicinis prædictis cum uirtute croci. Et quando accidunt ex uariolis vlcera, confert ynguentum album: & proprie permixtum cum aliquantulo camphoræ, & rasura radicum cannæ cum aqua rosæ, aut rasura venarum arboris salicis, aut arboris alzarur. Et quandoque confert super aspergere cerussam & lithargyrium. Et quando sunt in naso crustæ, confert ceratum factum cum oleo rosæ puro, cum uirtute cerussæ, & clymiz. Et administratio alicuius olei post exiccationem, & apud ulcerationem est bona apud exiccationes quidem cum eo, quod facit cadere cum uelocitate, & apud ulcerationem: propterea, quod ipsum est materia emplastri & unguenti. Et unguentum quidem rubeum bonum est ad ulcera uariolarum.

De obseruatione membrorum, & defensione eorum & nouimento uariolarum, & morbilli.

Cap. II.

Membra quæ oportet custodiri à nouimento uariolarum sunt, sicut guttur, & oculi, & partes superiores narium, & pulmo, & intestina: hæc enim membra sunt illa, quæ ulcerantur. Fortasse enim oculus destruitur, & fortasse

fortasse accidit in eo albugo. In gutture uero fortasse accidit prafocatio: & fortasse accidunt ulcera, quæ prohibent deglutionem in meri: & fortasse perueniunt ad hoc, ut sit illic corrosio pernitiola. In superioribus uero partibus narium fortasse accidunt ulcera, quæ stringunt mearus odoratus. In pulmone autem accidit fortasse ex bothor uariolarum, & morbilli, constrictio anhelitus vehemens: & fortasse faciunt cadere in phthisim, cum ulceratur. In intestinis fortasse accidit excoariatio cui succurrere est difficile. Conseruatio autem oculi melior est ut fiat alcohol oculo cum almuri, & aqua coriandri, & aqua ros. in qua iam posita sunt sumach, & caphora, & proprie in primo die, & cum almuri solo. Et similiter fiat alcohol cum alcohol nutrito ex aqua coriandri, & aqua sumach posita in ea camphora, & succus pulpæ granatorum est bonus iterum in principio. Cum uero apparent, tunc facere alcohol cum aqua ros. & camphora est magis conueniens. Et dictum est, quod facere alcohol cum napa alba est bonum in hoc. Et oleum de fisticis est de eis quibus utuntur mulieres in regione nostra, post uariolas, & euentum nocuenti in oculo, & eradicat caliginem si fuerit, & rectificat oculum. Et collyrium album est bonum ualde apud apparitionem bothor. Conseruatio autem oris, & gutturis est sicut succio granatorum, & succio granorum eius in principio: & succio mororum de seni, & gargarizatio cum rob eorum: & proprie quando conueritur de dolore in eis: & tunc oportet ut lambatur de rob eorum aliquid post aliquid. Sed superiores partes narium cum epithematione ex menthe, & sandalis, & rob acreste, & aceto. & nariibus attrahere acetum solum est vehementis iuuamenti. In conseruatione uero pulmonis non est, quod sit sicut hoc ex lentibus lene cum semine papaueris. Intestina autem plurimum quidem oportet ut conseruentur post inceptionem cum styptiis. Et cum incipit solutio uentris in fine ægritudinis, curetur cum trochiscis de spodio in rob ribes & trochiscis de semine acetosa.

De eradicatione uestigiorum uariolarum. Cap. 11.

IN hoc quidem loquemur uice alia, cum loquimur de decoratione: nunc uero dicemus illud, quod est magis conueniens & magis pertinens. Et de eis, quæ eradicant uestigia uariolarum sunt radices arundinum exiccatarum & farina fabarum & rasura ligni Kalef, & rasura arundinis sarcocollæ, & semen melonis, & cortices eius exiccata, & rizi ablutum, & aqua hordei, & albumen oui, & creta rara uel lutum, & lithargyrium: & zuccarum tabarzet, & amyllum, & amygdalæ dulces, & amygdalæ amaræ. Et de oleis oleum de lilio, & oleum de fisticis, & adeps asini cum oleo ros. & quæ sunt ei similia: & aqua quæ fit in ungu-

la arietis, quæ assatur est ultima. Et de illis, quæ sunt fortiora, est spuma maris, & lapis piperis, & costus, & amoniacum, & thus, & sapo cum baurach, & ossa uetusta adusta, & semen raphani. farina raphani exiccata, aristotlochia, lupini. Et de cibis rectificantibus colorem sunt granata dulcia, & cicer, & uinum bonum, uitelli ouorum forbilius, ius gallinæ, & aleubogi, & alduragi impinguati. Et oportet ut assiduer habens ea balneationem. Et de compositis est ut sumas ossium adustorum, & stercoreis ouini antiqui, & testarum seu uasorum ex terra nouorum, & amyli, & seminis melonis, & rizi abluti, & ciceris omnium ana partes. x. & granorum alben, & lupinorum, & costi, & aristotlochiae longæ omnium ana partes. v. & radices arundinis sicca partes. xx. fiat ex eis linimentum cum aqua melonis, aut cum aqua cucumeris syluestris, aut cum aqua hordei, aut cum aqua fabarum, & liniatur cum eo membrum, & abluatur in mane cum decoctione uiol. Aliud testarum seu uasorum ex terra nouorum, ossium antiquorum, radices arundinis persicæ, lupinorum amyli, seminis melonis, rizi abluti, granorum alben costi partes æquales. fiat ex eis gamera. Et iterum lupini, & cicer nigrum liniatur cum eis.

De febribus apostematum. Cap. 13.

IAm scimisti dispositiones febrium, quæ sequuntur apostemata apparentia: & quæ sunt secundum plurimum de genere febrium diei, cum apostemata ista secundum plurimum non perueniant ad cor, nisi cum calefactione sua absque sua putredine: & plurimum quidem horum est à causis primitiuis. Cum autem peruenit putredo eorum ad cor, propter suam magnitudinem, aut propter suam propinquitatem, fit febris fortasse non de genere febris diei. Et plurimum quidem similium horum non fit nisi à causis antecedentibus corporeis, & repletionalibus. Et quandoque sunt ex ulceribus, ad quæ attrahuntur materiæ malignæ: & retinentur in carnibus mollibus. Febres autem, quæ sequuntur intrinseca apostemata non existimantur, quæ fiant ex applicatione calefactionis ad cor sine putredine. Et deteriores quidem febres sunt ab apostematibus intrinsecis quando sunt ex genere erysipelæ in quibusdam uisceribus, & uehemens sit dolor, & sitis, & inflammatio: & significant ea significationes permissionis cholæræ plurimæ cum sang. Et hæc apostemata intrinseca sunt sicut apostemata cerebri, & uelaminis eius, & samachauris, & gutturis quandoque, & in uelamine, quod sequitur pectus, & hepate, & rene, & uesica, & matrice, & intestinis, & quæ sunt eis similia. Et diuersificantur febres eorum in uehementia & debilitate, secundum propinquitatem cordis, & longitudinem. Et eorum iterum febres, quæ sunt in membris carnis est febris uehementior.

tior. Et eorum febris, quæ sunt in panniculis, & eorum similibus, est debiliior. Et eorum, quæ sunt in uicinitate arteriarum febris est uehementior. Et eorum quæ sunt in uicinitate uenarum solum, febris est debiliior. Et non euacuantur istæ febres à periodis secundum materias, quæ effunduntur ad apostemata earum. periodi nanq; earum sunt secundum generationem earum, & secundum motum ipsarum, & secundum attractionem caliditatis, & doloris ad ea: unicuiq; enim humoris est periodus, quæ sibi conuenit. Et scias, quod multoties sanatur apostema in pleureth, & alijs, & remanet febris: & significat tunc, quod mundificatio non accidit. Et istæ quidem febres quando prolongantur, perducunt ad hecticam: & proprie quando apostemata sunt in hepate. Ille uero, quæ sunt in uelaminibus cum confirmantur, non expectant usq; ad hecticam.

De signis earum, & ipsarum indicijs. Cap. 14.

Cum febribus ex apostematibus intrinsecis inueniuntur tres species signorum, & accidentium. scilicet signa, & accidentia significantia membrum infirmum: & signa, & accidentia significantia materiam: & signa, & accidentia significantia dispositionem infirmi. Prima autem signorum, & species est sicut pulsus ferinus, & dolor pungitiuus apostematis in partibus pectoris. Et similiter tussis sicca in primis, & humida secundo, & quæ sunt illis similia ex accidentibus pleureth significantibus apostema in partibus pectoris. Et ad summum dolor, & grauitas in membro: & est calidius reliquis membris addita calefactione non consueta. Et sicut spasmus, quoniam ipse multoties associatur apostematibus calidis in membris neruosis. Species uero secunda est, sicut significatio uehementiæ febris tertianæ significat, quod materia est cholericæ. Accidentia uero infirmi sunt dispositiones, quæ indicant eius salutem, aut indicant ipsius mortem. Et apostemata quidem roculi diuersificantur in faciendo febres, & fortitudine earum, & continuatione earum, & ipsarum temporibus secundum magnitudinem eorum in seipsis, & magnitudinem uenarum eorum, & secundum membra sua. Nam in membris intrinsecis sunt, quæ sunt propinqua cordi, & uehementis communitatis, sicut uelamen, & pulmo: & de eis sunt, quæ sunt longinqua à corde, & debilis communitatis sicut renes: ipsi enim non semper faciunt propter apostemata sua febres fortes, neque continuas, immo multoties quidem sunt interpolatæ, & sunt de genere febrium comistarum, & febrium tertianarum, & quartanarum, & sextanarum: & sunt cum eis rigor, & horripilatio: & & ambiguum sit esse earum: & significat ea grauitas in loco renum, & in partibus alchatin, & dolor, & proprietates caliditatis in membro maioris

consueta. Cum autem aggregatur in membrum sit proximum principali, aut fortis communitatis cum eo, aut uehementis sensus, & est neruolum: tunc cum uehementia febrium comistarum apostemata eius accidunt ei inquietudo magna, & spasmus: & fortasse comitantur ipsum accidentia extranea: sicut apostemata matricis afficiatur enim ei cum febre soda, & dolor ceruicis. Et caliditas quidem quamuis inflametur in his apostematibus, tamen non est ualde uehementis acuitatis, sicut est in caufonide, nisi sit res magna: & causa in eo est, quoniam putredo non est sparsa, neque mota ad exteriora. Et pulsus quidem in febribus apostematum intrinsecorum est pulsus febrilis putredinis paruus in principio, uelocis contractionis apud statum, deinde magnificatur, & fit uelox, & spissus secundum membrum, & materiam, & secundum quod sciisti: deinde erit uidosus, & ferrinus, secundum membrum in neruositate & carnositate sua. Et urina secundum plurimum est ad albedinem decliuis, & paucitatem tincturæ, propter declinationem materiei ad apostema secundum quod sciisti.

Cura earum. Cap. 15.

Curatio harum febrium est curatio febrium acutarum posturationem apostematum. Radix enim eis est cura apostematis, cum obseruatione curæ febris de infrigidatione, & humectatione. Et istæ febres diuersificantur in curatione earum à febribus caliditatis puræ, quoniam in his febribus non conceditur potus aquæ frigida, neque introitus balnei. Et si fuerit apostema erisipyla, licet ut fiat positio rerum frigidarum, & infrigidatarum actu de foris super ipsum: sicut succus lactuæ, & semperniua, & portulacæ cum aliquantulo de sauch hordei albi, quæ sine cessatione infrigidentur super niuem, & permulentur: & fortasse permiscetur cum eis oleum omphaciorum aut oleum rosaceum. Et si comederit lactucas ablutatas infrigidatas, pertransit, & iuuatur cum eis.

De dispositionibus febrium compositarum. Cap. 16.

Febres quandoque componuntur adinuicem. Fortasse enim componuntur ex eis species ingredientibus in genera elongata, sicut compositio febris hecticæ cum febre putrida. Et quandoque componuntur species ex eis in genere proximo conuenientes, sicut est compositio specierum febrium putredinis: sicut tertiana cum phlegmatica, ut potest febris nominata hemitritæus: & sicut compositio febrium apostematum. Et quandoque componuntur de eis species conuenientes in specie, sicut compositio duarum tertianarum, & duarum quartanarum, & trium quartanarum. Quare sunt duæ tertianæ in apparitione dispositionis secundum

cundum paroxysmos phlegmaticæ: & tres quar-
tantæ in paroxysmis phlegmaticæ. Et quandoque
componuntur tres de febribus tertianis. Si igitur
fuerint secundum coalternationem, erit pa-
roxysmus in die. iij. uehementior: quoniam per-
tinet ei periodus diei primi, & inceptio diei ter-
tii: & similiter in die quinto. Et similiter hæc hæ-
mitritæ, sicut compositio duarum tertiarum,
similatur paroxysmis phlegmaticæ. Et propter
huiusmodi non oportet, ut tota occupatione oc-
cupetur cum paroxysmis, immo oportet ut occu-
petur cum accidentibus. Et ex eis, quæ accidunt
quando fuerint febres istæ tertianæ puræ sunt ut
festinent paroxysmi earum ad breuitatem ita ut
destruatur uel diminuatur debilior earum prius.
Et quandoque significat compositionem reditio-
horripilationis post quietem. Et turpe quidem
est medico sciētī, significationes cuiusque febris,
& accidentia eius, ut non percipiat compositio-
nem à primo die, aut secundo. Et compositio fe-
bris hæc cum febre putredinis, est ex illis, quæ
ualde ambigua sunt: quoniam ipsi uident inter-
polationes, & inceptions rigoris, & horripila-
tionis, & reditionem sudoris si fuerint, & horas
particulares, quare existimant, quod sint illic fe-
bres putredinis tantum inseparabiles, aut com-
positæ ex continua & interpolata. Et quandoque
continuatur cōpositio ita, ut appareat febris una
continua similis, quæ similatur synocho: & tunc
quidem non est excusatio reditionis ad signifi-
cationes. Et si fuerint paroxysmi breues, non conse-
quitur eorum continuatio, nisi propter rem ma-
gnam de multitudine numeri eorum & proprie
in eis in quibus eorum interpolationes sunt lon-
gæ. Et quando componuntur febres diuersæ, si-
cut hemitritæ, eradicatur acutior ex eis, & re-
manet chronica pura, siue sint duæ interpolatæ,
aut duæ continuæ: aut interpolatæ & continuæ.
Et quandoq; componitur cū hemitritæ alia ter-
tiana, & phlegmatica, & melancholica. Nam si
est cum tertiana, eradicatur tertiana, & purus fit
hemitritæ: & si est cum phlegmatica, aut me-
lancholica, eradicatur hemitritæ, & deputatur
phlegmatica, & similiter melancholica. Et quic-
quid accedit compositio in eis secundum modum alium:
& est, ut componatur interpolata & continua di-
uersi generis: aut conuenientes ambæ in eo: aut
conuenientes in specie, sicut tertiana periodica
cum tertiana inseparabili: & sicut componuntur
duæ interpolatæ, similiter componuntur duæ con-
tinuæ. Quidam autem existimauerunt, quod duæ
continuæ non componuntur, sicut duæ tertianæ:
quoniam quādo materia est intra uenas, non est
possibile ut diuersificetur illud in quo accedit pu-
tredo: putredo enim est sparsa in toto. Et hæc sen-
tentia non est de illis, quæ necessaria sunt procul
dubio apud me, quoniam putredo incipit procul
dubio ex loco, deinde spargitur, deinde curret in

dicia uehementiæ, & teporis secundum uiam ueh-
tēpus putredinis primæ: & secundum eam sunt:
ei motus, & non elongatur quin accidat putredo,
secunda, cui sit dominium cum illa, quæ sequitur
aliud, immo aggregatur intra ut incipiat, & ut se-
quatur simul: quare erit ei gradatio teporis &
uehementiæ secundum inceptionem eius. Et species
quidem compositionis febrium sunt tres: intras,
& coalternata, & communicans. Et intras est, ut
ingrediatur una earum super alteram. Et coalter-
nata, ut ingrediatur post eradicationem eius. Et
communicans est, ut incipiat cum ea. Et cum ui-
deris febrem conclusam, & est in ea rigor, & non
sudor, & fortasse accidit in rigoribus pluribus su-
dor unus: tunc testifica compositionem in ea. Et
similiter cum uideris in conclusa superfluitatem
in frigore extremitatum, & retractione caloris
ad intra, sed parum de eis ambobus fortasse acci-
dit inconclusa.

De hemitritæ. Cap. 17.

Hemitritæus est febris composita ex duabus fe-
bribus, quarum est una tertiana, & altera est
phlegmatica: & fit in die uno paroxysmus tertianæ,
& quotidianæ simul. Aut secundum semitā com-
munitatis, & inuentionis. Aut secundum semitā co-
alternationis, & uicinitatis. Aut secundum semitā in-
troitus. Et de diuisionibus difficilius ad cognoscendū
est prima, deinde secunda. Et quicquid sunt fe-
bres duæ continuæ, quā duæ putredines sunt intrin-
secæ: & quicquid duæ sunt periodice, quæ eradicantur,
quā duæ putredines sunt extrinsecæ: & quicquid est
continua cholericæ, quæ eius putredo est intrinseca:
& phlegmatica est e contrario: & quicquid est e con-
trario. Et quidā ponunt hemitritæū purū febrem
compositā, quæ sit ex tertiana extrinseca, & phleg-
matica intrinseca: & illā, quæ est præter eam, no-
minant non purā: & non est illud de illis in quibus
superflua occupatio sit habenda, & fortasse
antecedens ad putredinem est cholericæ: & fortasse
antecedens ad putredinem est phlegmaticæ: &
fortasse ueniunt simul. Et iterum quicquid est materia
faciens febrem phlegmaticam magis dominans, &
quicquid est materia faciens febrem cholericam magis
domans: & quomodo quicquid sit materia phlegmaticæ
ponit paroxysmos cholericæ longiores, & tardio-
res: & materia cholericæ ponit paroxysmos
phlegmaticæ e conuerso. Et fortasse extenditur he-
mitritæus longo tempore, usque ad vii. menses, &
supra. Et quicquid sit ex hemitritæo & gritudo acuta.
Et quandoq; est hemitritæus de febribus magis in-
terficiētib; quoniam perducit ad hæticam, &
ad ægrotudines chronicas, & difficiles.

Signa hemitritæ. Cap. 18.

Magis propriū signorum eius, & primum eo-
rum, licet necessaria sint signa alia est ut sit
spatium huius febris in uno duorum dierum lon-
gius

gius spatio tertianæ, & magis quæta: deinde sit in die alio leuioris paroxysmi, & paucorum accidentium. Et quandoq; iteratur in ea horripilatio secundum plurimum aliquoties: propter illud, quod accidit de pugna duarum materierum, aut introitu unius earum super alterâ. Et fortasse accidit hæc iteratio tribus uicibus, aut quatuor: & iam calefiunt membra aliqua horripilatione fixa adhuc. Et ex hac quidem, quæ est hemitritæus, corpus non mundificatur integre. Et quæq; sunt principium eius, & augmentum ipsius uehementis commotionis: & proprie quando fuerit communicatio: aut fuerit intrans in huius hora, tunc. n. sunt horripilationi reditus. Et est status longinquus. Et cum existimatur, quod corpus iam calefactum est, & febris habet statum, inuenis horripilationem redeuntē: & ista accidentia sunt propter pugnam humorum. Et status quidem huius ægritudinis in horis particularibus, & uniuersalibus est ante statum phlegmaticæ, & uelocior statu eius, & tardior statu cholericæ, quoniam caliditas non expanditur nisi cum labore, & proprie in primis. Et fit fortis eius acuitas apud statum. Et similiter fit declinatio longa propter illud, quod accidit de stationibus quas efficit reluctatio unius duarum materierum cum alia. Et parum quidem tepescit cum sudore. Et in hac febre dies tertius de diebus eius est similis primo, & quartus secundo. Et quæq; cadit significatio super hemitritæum ex modis diuersis: nam quandoq; accidit ex consuetudinibus: & quandoq; accidit ex accidentibus. Et casus consuetudinum est, sicut si in corpore hominis multiplicetur cholera, & putredo eius, deinde utatur delictis, & dimittat exercitia: & utatur cibis de speciebus regiminis generantibus phlegma. Aut multiplicetur in corpore hominis phlegma, & putredo eius, deinde exercitetur plurimum, & utatur eo, quod generat choleram de speciebus regiminis, aut fecerit necessarium ætas illud in eo, ita ut fiat adolescens uel iuuenis post pueritiam, & dominium humiditatis: aut fiat senex post inuentum, & acuitatem complexionis. Ex accidentibus uero sicut est pulsus, & urina, & egressio eius, quod egreditur ex vomitu, & egestionē, & dispositio digestionis: & signa eius, & dispositio sitis, & dispositio tactus, & dispositio horripilationis & rigoris: & dispositiones horarum & paroxysmorum. Pulsus autem fit in ea minoris magnitudinis, & uelocitatis, & frequentior, quam ille, qui est in tertiana, & contrariæ earum sunt minores, quæ illæ, quæ sunt in phlegmatica. Urina uero est tardæ digestionis. Et uomitus est permixtus ex cholera, & phlegmate. Et egestio est permixta ex cholera, & phlegmate. De dispositione autem calefactionis, & frigoris, & sitis, & horripilationis, & horarum paroxysmorum iam locuti fuimus, quod oportuit. Et non expectatur statio super dominantem duorum humorum nisi per uincentem

ex significationibus; nam si dominatur phlegma sunt paroxysmi longiores, & horripilatio minor, & coarctatio, & proprie in pulsa fortior, & extremitates sunt uelociorē ad suscipiendū frigus in principijs ægritudinis, & tardioris mundificationis a suo frigore, & sitis est minor, & uomitus cholere minor, & urina uehementioris albedinis & cruditatis, & sudor minor, & ætas pueritia, aut senectus, & complexio corporis significat eam, & similiter consuetudo, & quæ currunt cum ea. Et si dominatur cholera, sunt paroxysmi breuiorē, & extremitates uelociorē ad calefactionem, & sitis, & uomitus cholere plus, & sudor magis exuberans, & fortasse declinat ad horripilationē, quæ est sicut rigor, & sit urina uehementius tincta, & ætas est iuuenis, & complexio corporis quandoq; significat eam, & similiter consuetudo, & quæ currunt cum ea. Et quando æquantur duo humores æquantur significationes: & est horripilatio pura completa, non diminuta neque perueniens ad diminutionem. Et quando compositio est inter interpolatam, & continuam, & est illa quam plures hominum appropriant nomine hemitritæi puri, & est continua ipsa phlegmatica, tunc est rigor debilis, quoniam materia extrinseca est cholerica, & non est ei contrarietas ex parte phlegmatis extrinseci cum ea, in eo quod necessarium est de rigore, sed est debilior, & fortasse iteratur in ea frigus & horripilatio ita, ut faciat errare in statu, sicut scis. Et multiplicatur in ea caliditas uiscerum, & uentris, cum frigore extremitatum. Et fit pulsus uehementioris paruitatis & raritatis. Si autem continua est ipsa cholerica, non fit rigor, neque magna horripilatio: & fit pulsus maior, & uelocior: & angustia uehementior. Et si componuntur duæ continuæ, non erit rigor omnino. Et accidit tertianæ continuæ ut alienetur ante alleuiationem phlegmaticæ, licet non sit eius reditio ante eius reditionem.

De cura hemitritæi. Cap. 10.

Necessarium est in hemitritæo, ut uehementem habeas solitudinem in euacuando materiam secundum species euacuationis ex solutione uentris, & vomitu, & prouocationē, & sudatione, plusque uehementia, quæ est perextinctiua. Et cum solutionis oportet ut conueniat digestio, nisi sint ex genere, quæ leuiunt naturam, & soluent, & non inquietant. Sicut aqua lulob cum geleniabini, si fuerit illud, quod superat phlegma. Et sicut tereniabin, & siracost, & infusio tamarindi, & syrupus uiolæ dominans fuerit cholera. Et sicut quod componitur ex istis, si fuerint duo humores quasi pares. Et post apparitionē digestionis, si euacuatio fiat humoris cum fortibus, pertransit. Et uomitus oportet ut sit iterum secundum humorē dominantē, aut ex aqua phani cum syrupo acetoso calido: aut syrupo aceto

fo cū aqua calida. Et prouocatio oportet ut fiat cum eis in quibus est æqualitas. Et cum festinatur in potando decoctiones ante digestionem, timentur sursum. Medicinæ uero iuuatiuæ in uia perueniente ad statum, ad rectificandam materiam, & maturandam ipsam, & succurrendū nocuentis eius, ex singularibus est absinthium: uerū post septimum, & apparitionem digestionis, ita ut sit romanum, quod ex ipso bonum est. Et cum tu festinas cum eo, mouet humores, & non euacuat eos: & facit accidere angustiam, & tristitiam, & nauſeam. deinde reuertitur super eos cum sua amaritudine, & exsiccat eos, & stypticat eos, quare facit eos pigros. Et Gal. quidem & qui ante eum fuerit curauit eos cum aqua hordei in qua est uirtus piperis. Et dixit quidā primorum medicorum, quod Gal. cecidit in errorem maximum, & permansit, ubi oportet. ut miretur de eo: & non scuit, quod piper inflammatur febre, & aqua hordei pigram efficit materiam. Et iste quidem contradictor errauit errore, qui non appropriatur in hac intentione, immo canon datus in adiutorio nature, quando præparatur ad resistendum huiusmodi materijs, est cum medicinis compositis ex infrigidantibus, & calefacientibus, ut discernatur natura inrer duas uirtutes, quare occupatur infrigidarium cum febre, & partibus cordis: & calefactiuum cum materia. Et quis est, qui curet hemitriteum absq; hoc? Et si natura non est fortis ad discernendum, tunc non prodest curatio quocunq; modo fiat. Et errant in alijs modis, in allatione quorum non est necesse nos incedere uia prolongantium. Et iste quidem contradictor dixit, qd oportet ut administrentur subtiliantia in quibus non est fortis calefactio, sicut apium, & anethum, & non scuit, quod possibile est, qd per piper uoluerit cum paucitate eius: ut frangatur eius calefactio, & non abbrevietur eius subtiliatio à subtiliatioe apij plurimi: & sit aqua hordei adiuuans ipsum in faciendo peruenire uirtutem eius, & destruendo superfluitatem eius, & in fundendo seu lenificando materiā ut alleviatur uel facilis fiat penetratio uirtutis eius in eis. Amplius mirabile fuit, quod ipse posuit. Galenum de illis, qui ignorant, quod piper inflammatur febrem, & nominat ipsum de illis, qui obliuiscuntur ab hoc, ubi iudicat de hoc. Composita uero

de medicinis quibus oportet uti in hac hora, sunt sicut trochisci de absinthio, & trochisci de rosis. Trochisci leues boni ad hemitriteum. Recip. ros. radicem liquiritiæ amborum ana. 3. iij. tereniabip. 3. iij. spicæ, succi absinthij, spodij omnium ana pondus. 3. ij. fiant ex eis trochisci. Trochisci alij ad inflammationem. Reci. ros. 3. vi. seminis acetosæ, gummi omnium 3na. 3. iij. amyli pondus. 3. iij. berberis, spodij, seminis portulacæ omnium ana pondus. 3. ij. dragaganthi, croci, spicæ, reubarb. omnium ana. 3. i. camphoræ pondus tertius. 3. i. fiant trochisci. Trochisci alij boni habentibus hanc febrem, & proprie quando conqueruntur cum hoc de solutione uentris, & tussi. Recipe spicæ aromaticæ, xyloaloes, croci, berberis, & succi eius omnium ana. 3. iij. reubarbari. 3. iij. spodij, ros. cum capitibus suis, lacæ, gummi torrefacti, Karabe omnium ana. 3. v. se. acetosæ torrefacti. 3. vi. luri romani. 1. i. eorū sigillatæ. 3. vii. fiant trochisci. Descriptio alia bona. Reci. ros. rubearum. 3. vi. berberis, gummi, seminis acetosæ omnium ana. 3. iij. spicæ, eupatorij, spodij, amyli, seminis portulacæ, granorum cucumeris omnium ana pondus. 3. ij. seminis endiuiz, seminis cuscute omnium ana. 3. i. f. succi liquiritiæ. 3. i. lacæ, reubarbari, amborum ana. 3. i. aggregentur illa, & fiant trochisci. Pilula bonæ ad hanc ægritudinem, & omnes chronicas, & febres ledentes uirtute scitæ, & proprie quādo materiā phlegmatica est magis uincēs. Reci. aloes, masticeis, myrobalarum, citrinorum, reubarbari, succi eupatorij, succi absinthij, ros. rubearum omnium ana partes æquales, croci partem mediam, fiant pilule cum aqua endiuiz: & sic dosis. 3. iij. cum syrupo acetoso. Descriptio bonæ conueniens post digestionem. Reci. aloes, masticeis, succi eupatorij, succi absinthij, ros. omnium æqualiter, croci 3. i. formantur pilule cum aqua endiuiz: & sic dosis. 3. iij. cum syrupo acetoso. **De reciduatione.** Cap. 10. **R**ecidiuatio est deterior radice: & consilium quidem est ut in ea non fiat festinatio ad curandum, donec manifestus sit modus ægritudinis: nam secundum plurimum est sanæ.


D E F E B R I B V S

R A S I S

L I B E R

De prologo tractatus.

Cap. 1.



FEBRICITANTES & præcipue acute, nõ solũ necesse est, ut medicus sepe videat: sed etiã ut ei semper assistat. Nos tamẽ in hac parte posuimus summas, & aggregationes vicem pũdo

rũ, & extremitatũ cõtinẽtes, quæ utiles erũt prũdẽti, & vigilãti, licet in hac doctrina nõ studuerit ne sit secũdũ eã operatus. In pluribus enim medicorũ cõsilio nõ indigebit, atquẽ erratiũm per eas cognoscet errorẽ, & perfectionẽ; nec non diuiniũ diminutionẽ. hæc tam paucis comprehendimus verbis, & distinguẽs ac compẽditose; quẽ ad arduũ in aliis partibus huius libri peregrinũs; & dimittimus valde subtilia, & profunda huius doctrinæ persequari: hoc enim indiget, qui multa vult inuestigare. Ad hoc uero persequendum diuino inuabimur auxilio.

De febre aphorica. Cap. 2.

Hæc febris non habet periodos, sed est unius periodus tantum. Cuius propria significatio est, quod neque cum rigore, neque horripilatione incipit: & quod antequam accedat præcedens causa diuersa ab eo secũdũ quod currit cõsuetudo: sicut superfluous labor, aut ira: aut angustia; aut sollicitudo; aut uini puri, uel multi potatio; aut quia diu stetit ad solẽ aut sub ære frigido; aut in aqua frigidissima; aut quia calidũ apostema quod accidit propter casum, uel percussione in corpore præcessit; aut sit propter dolorẽ qui in aliquibus contingit membris; aut propter repletionem ciborum multi nutrimenti, aut crosorum opilantium; aut uehementis caliditatis; aut propter fontem fastidium, uel propter frequẽtem uentris fluxum, & uehementẽ, aut propter multam moram in balneo; aut quia balneauit se in aqua inconuenienti, ut fuit aqua naturaliter calida; aut quia non balneauit se ut consueuerat; aut quia medicinas calidas sumpsit: uel quia multum comedit; aut propter corizã, & rheumatismum: aut quia diu a comestione abstinuit. Urina quoque in hac ægritudine, neque in colore, neque secundum substantiam, neque secundum odorem multum mutatur ab hoc quod consueuerat. Calor etiam cum corpus ægri tangitur: neque superfluous, neque mordacius sentitur. Cum autẽ ægritudo minui incipit sudoris prouenit multitudo; aut si non aliud: cutis saltem humectatio aut resudatio, deinde sedatur perfecte. In hac præterea febre, neque multus est timor:

neque est malũ. Quicquid tamen in alias malis transiit febres cum & ipsius regimine, & curatione error contingit. Cum ergo aliquis hanc febrem causa laboris incurrit, oportet ut cum minui febris eius coeperit eger balneum ingrediatur, & in domo media sedeat iuxta porta: per quam reditur ad domũ primam quæ ante faciem ipsius apertenda est. Ad ultimum quoque locus sit talis in quo delectetur, & ne ullo modo sudeat si possibile est: neque inflammetur, neque æstuet, neque cogatur anhelare uehementer. Sit autem locus talis in quo ipsum diu morari sit possibile, ubi & semicupium tepidam continens aquam in qua delectetur ingrediatur. Corpori uero ipsius aquæ repide multitudo superfundatur, & præmatur molliter: deinde corpus ipsius abstergetur, & ex oleo uiolato reperfuso inungatur, & maxima sollicitudo adhibeatur præcipue circa iuncturas, & colliculos, & dorsũ. Postquam autem hoc aliquibus horis factum fuerit: iterum in aqua tepidam mixtendus est: ex ea super ipsum aliqua hora fundendum; deinde redeundum est ad inungendum. Longitudo quoque; sicut de aqua super eũ, & inungendi ex oleo, & breuitas sint secundũ laboris uehementiã ac ipsius debilitatẽ. Post hoc uero eger diatur balneũ: & nutriatur ex oleribus, & fructibus recentibus, & carne pullina, & hædina, & piscibus quæ vocantur ezie, & ipsi sunt boie, & abstineat a cibis calefacientibus. Et si nõ cõsueuerit bibere uinũ: sumat in potu iulep factũ de zucchero taberzet, & aqua rosata. Si aut solius fuerit bibere uinũ: sumat ex eo minus solito, quod tamen plus solito sit mixtum aqua. Lectus quoque; eius mollior sit quã prius, & plus solito dormiat. Et si post aliquid de uestigiis laboris, & lassitudinis supfluerit: ad balneũ, ut diximus, & totũ regimẽ redeundũ est, donec se habet ut solebatur. Si autẽ hæc febris cã uigiliarũ aut multæ sollicitudinis cõtingat eger postquã ipsa minui inceperit balneũ ingrediatur, & sit in loco balnei. scilicet qualẽ supra diximus, nec cibetur oĩno, sed aqua tepida proprie super dorsum ipsius fundatur, & nutriatur ex cibis similibus his quos prædiximus, ut uinũ si bibere cõsueuerit, mensurate sumat, & remoueat ab himo solitudine interpositione uerborũ, & alius cuius iocunditatis, atque alicuius ludicri. Oleum quoque uiolatum olfaciat, & dormiat in locis suauiter redolentibus, & in strato molli. Quod ex multa tristitia; aut ex multa ira fiat hæc febris balneum cum minui ceperit ingrediatur, & in-

& intret semicupium aquam continens calidam in qua delectetur, & aqua etiam super ipsum in domo balnei existētē copiose fundatur. Ipse præterea in loco balnei moretur ubi neq; a uetō neq; a frigore tangatur, aut moretur in prima domo balnei in qua tandiu sit donec cutis mollescat, & rubeat parum: deinde aquam frigidam subito ingreditur: & ab ea citissime egrediatur. Cumque egressus fuerit: aqua rosata ipsius capiti superfundatur; & pectus ex sandalis & aqua rosata & camphora liniatur: & in potu granati muzzi succum sumat & ei similes potus: aut rob quod sit de ribes, & macianorum acetosorum & acetositis citri: & nutriatur ex oleribus frigidis & aceto: & ex oleo confecto cum zucchero: & ex oleo amygdalino. A uino autem omnino abstineat: nisi maximum inde consequatur nocu-
mentum. Quod si inde consequatur cum succo granati misceatur, & super niuem infrigide-
tur: & ex aqua frigida multum bibat: & cum bi-
berit uinum: granata acetosa in aqua frigida
abluta comedat, deinde aqua rosata super ipsum
roretur: & ingenietur qualiter eius ita quantum
cunque possibile fuerit sedetur. Cum autem
hæc febris ex multi vini potatione superueni-
rit, aut fortis & puri. Aegro aliquid de potibus
quos nominamus simplices, scilicet absque ali-
tenus rei commixtione dandi sunt cum aqua frigi-
dissima mixti ex quibus non impetose sed
paulatim bibat. Cumque febris sedata fuerit bal-
neum ingreditur, in quo moram faciat in domo
temperata stando: sicut ostendimus: & multa
aqua super ipsius caput fundatur. Et nutriatur
ex raphis adelia curina infrigidatis, & his simili-
bus ex rebus frigidis mixtis cum succo granato-
rum, & succo ribes: & uiz acerbæ & succo & ex
piscibus qui uocantur aziz coctis cum aceto &
olfaciat oleum uiolarum: & dormiat diu. Cum-
que expergefactus fuerit, balneum iterum ingre-
diatur, & ad prædictum redeat regimen. A vi-
no autem omnino abstineat: & in potu rob de
fructibus sumat. Si autem in capite fuerit gra-
uitas, & in oculis rubedo & extensio: sanguis ex-
trahatur cum phlebotomia, & uentosis. Eiusque
regimen totum sit ut diximus. Venter quoque
ex succo fructuum soluator. Cum uero aliquis
hanc febrem incurrit ex multo motu aut deam-
bulatione nimia sub sole: aquæ rosatæ pars una
sumatur: & olei rosei pars mediæ aceti partis
unius quartæ, & in ampullam uitream mittan-
tur: & consutiantur donec inspissentur, & ex
eis in niue infrigidatis super ipsius linciput pau-
latim fundantur. Panis quoque eis infusus in ni-
ue infrigideatur & a principio accessionis usque
ad quietem capiti superponatur. Post uero quie-
perit febris æger balneum ingreditur: & sit in
loco tepurato ut diximus; ubi aqua tepida super
totum corpus ipsius, & præcipue super caput

fundatur. In potu autem sumat frumentum fra-
ctum coctum in aqua: quod tamen prius sit
multotiens ablutum cum aqua calida; cui post-
quam coctum fuerit multa aqua in niue infrigi-
data admisceatur ex qua æger usque ad satietatē
sumat. Cumque febris cessauerit, ex cibis quos
prædiximus nutriatur. Cum autem aliquis hanc
paritur febrem eo quod sub frigido aere longam
fecit moram, totum corpus eius a principio fe-
bris usquequo sedetur sepe fricandus est, non
tamen duriter. Cumque febris cessat domum ca-
lidam balnei ingreditur, in qua moram faciat,
donec sudor egrediatur. Postquam autem sudor
egressus fuerit, corpus ex oleo tepido cum frica-
tione inungatur: donec sudoris multitudo egre-
diatur: deinde ex aqua calida locus abstergetur,
& indurus egrediatur: & eo usque dormiat do-
nec iterum fudet. Post hæc in comestione cibos
sumat subriles ex quibus, quod leue est, i. parum come-
dat, & cum mensura sumat. Vinum uero forte bibat,
& si ex febre, & fractione aliquid redierit ad bal-
neum, & ad totum regimen quod prædiximus redeat diu-
est, & quis uero hunc febrem propter aquas natura-
liter calidas patiat: si fuerit aque ille tales ex
commixtione azegi, aut salis, aut ferri, aut aliarum
rerum quæ corporis superficiem exasperare, &
constrahendo rugare consueuerunt: eodem est re-
gendus regimine quo is qui hanc incurrit ex fri-
gore. Oportet tamen ut locus balnei in quo hic
in domo calida moratur sit temperatus antel-
ponatur suam: & sit porta secundæ domus coram
faciem ipsius aperta: & aqua calida super ipsum
fundatur: & in eam ingreditur & inungatur cum
oleo, & iteretur effusio aquæ calidæ & introitus
in eam: & fricetur multum micissim donec poræ
aperiantur & corpus tumescat & febris sedetur
& corpus rubeum fiat. Quod postquam factum
fuerit egrediatur, & indumentis suis indutus dor-
miat, deinde ex his quæ prædiximus nutriatur.
Cum autem aliquis hanc febrem incurrit ex com-
estione calidorum ciborum: oportet ut post-
quam febris quieuerit, ex aqua ordei multum bi-
bat. Cuius nutritio sit post febris sedationē
cibus cum aceto conditis, in quo non est caro.
Et est ingeniandū qualiter eius uenter solui pos-
sit ex prunis & tamarindis, & zucchero tabarzete
syrupum quoque acetosum simplicem de zucha-
ro bibat: & comedat granata muzzi & acetosa: &
omnia alia poma his similia. Ab omnibus uero
cibis, qui corpus calefaciunt abstineat: febris
enim hæc propriæ, & illa quæ ex fortis uini pota-
tione accidit utraq; in putridam cito mutatur
febrem. Cum uero aliquis hac febre laborat, eo
quod plus solito comedit, aut cibum multum nu-
trientem, aut crassioris nutrimenti sumpsit: quia
hæc species æphimeræ plerumque adeo per mul-
tos dies sit mansura, ut synochus esse uideatur: non
est expectandū donec febris a corpore recedat.

immo uenter agridico ex succo fructuum sicut nominauimus est soluendus, & syrupus acetosus est sumendus, & ex prisana tantummodo nutriendus. Sed postquam febris alleviari videtur aliquantulum aeger in balneum est mittendus: in quo non longam faciat moram: & sit in aqua tepida & ex ea super ipsum fundatur: cuius etiam corpus ex sulphure diu fricari conuenit. deinde ex aqua lotus egrediatur. & sic ad suum redeat regimen, ad uentris scilicet solutionem ex succo fructuum & ad syrupum acetosum in potu sumendum, & ad nutriendum ex aqua ordei: cumque febris parum alleviari ceperit balneum iterum ingrediatur in quo longiorem quam prius faciat moram: & plus balneetur secundum quod febris diminui uisa fuerit. In principio tamen huius febris absque magna cautela balneum minime ingredi debet: Obseruandum est enim ne in eo laborem patiatur & ne corpus calefiat. Quod si contingat ipsum in balneo horripilationem pati illico est extrahendus: quod etiam in omnibus quibus post febrem ephimeram in balneo huiusmodi accidit horripilatione est obseruandum: hoc namque accidens non eam a phimera pati: sed putridam portendit. Ex his autem per quas singulatim & absque ulla ambiguitate febris cognosci potest a phimera cum alijs significationibus, quas praediximus, est ut aegro cum se balneauerit, non superueniat horripilatione. Cum enim haec species ephimerae cognita fuerit, & uenter solutus, & urina prouocata, & nutritio subtiliata fuerit: & ordo intrandi balneum, & balneandi secundum febris diminutiones obseruatus fuerit adeo bene sanabitur: quod in febre putrefactionis minime transibit. Si autem in regimine error acciderit in febrem mutabitur putrida: quae erit acuta, & sinocham scilicet conclusam. Si quis uero hac patitur febrem quia in comestione una aliquid comedit ex quo grauare ceperit: si grauitas in superioribus sentitur uentris, euomat illud, aut supponatur collirium: si in inferioribus sentitur grauamen. Cumque passio minui ceperit, balneetur & somnus augmentetur, & nutritio subtilietur: & per aliquot dies a labore abstinere, & ex aliquibus cibis qui uentrem parum soluant moneatur. De his quos in hoc nominauimus libro, ubi de sanitatis custodia tractauimus. Qui autem hanc incurrit febrem causa apostematis quod in aliquibus fieri contingat membris ex parte contraria minuendus est, & apostema illud infrigidandum, quemadmodum in capitulo de calido apostemate ostendimus. Balneum nullo modo ingrediatur: neque bibat vinum, donec apostema illud sedetur, & eius igneitas reprimatur. Venter uero soluator, & calor extinguatur, sicut docuimus, & cibis infrigidantibus nutriatur. Cum autem aliquis hac febre laborat causa doloris, qui in quibusdam contingit membris: quae

sit causa doloris considerandum est. Si enim est apostema calidum aut crocilla uentrositas, aut humor mordacior, aut quia multum comeditur aut siccitas magna quae loco dominatur, aut complexio mala calida: aut frigida simplex: aut cum materia ad ipsam causam remouendam est omnino intendendum quemadmodum in capitulo de causis dolorum & earum curis docuimus. Febris enim illico sedabitur cum causa remota fuerit. Cumque febris quieuerit: eger leuiter balneetur: & ex cibis quorum fecimus mentionem nutriatur. Qui uero hanc incurrit febrem: quia balnei usum ut consueuerat praetermisit: in balneum mittendus est, donec febris reprimatur: ubi multitudo dulcis aquae tepidae super eum fundenda est. Ipse quoque ex fursure & semine melonum & pauco nitro diu est fricandus: deinde egrediatur: & ex cibis extinguentibus nutriatur: & uinum album & clarum bibat: ualde temperatum. In mane quoque iterum ad balneum eatur: deinde ab eo egrediatur, & sic ad consueta redeat. Qui autem hac laborat febre: quia multum famem aut sitim passus est: si cum sola dolorositas & lassitudo & fractio cum inuaserit antequam febris in eo sit confirmata inueniatur: triticum fractum multa aqua ablutum & coctum & in niue infrigidatum dandum est: & zuchiarum tabaret. Si autem non inueniatur nisi postquam febris in eo inflammata fuerit: praecipendum est ei sepe ex aqua frigida paulatim bibere: donec febris reprimatur: deinde per aliquantulum in tempore in aquam tepidam est mittendus: & aqua super eum fundenda frigiditate cuius non laedatur: postea prisanam bibat, & ex cibis humectantibus nutriatur: & a labore abstinere donec sanitati restituitur. Cum uero aliquis hanc patitur febrem ex coriza quae ei accidit phlebotomandus est licet paruum a praecedenti minutione intercesserit spacium: aut etiam phlebotomiam pati non poterit cum uentosis sanguis extrahatur & a carne & a uino abstineat: & aquam hordei bibat: & uenter ex his quae in capitulo de coriza nominauimus soluator. Pectus quoque eius mollicetur & tussis sicut ibi docuimus sedetur. Cumque ad salutem peruenierit reumatismus digestus fuerit, & tussis sedata, & febris quieuerit, in balneum est mittendus: & ordinatim ad consueta paulatim reducendus: huius autem febris cura non est negligenda. Ex ea enim plerumque peruenitur ad pleuresim, uel ad peripleumoniam. Sed quia haec tenetur febre propter fastidium: haec enim febres cum ructus fuerint sumosi & fetidi inuadere solent: & uix accidunt cum acetosi fuerint: & uenter postea solutus fuerit per se alia non indiget cura: nisi ut parum aquae calidae sorbendo traiciat: & balneetur & ex cibis infrigidantibus, qui neque cito corrumpantur, neque conuertantur, nutriatur: sicut sunt ea quae ex succo uiae acer

hæ & sumach, & granis granati, & his similibus præparantur. Potus quoque bibat quæ his inueniuntur similes. A labore autem, & statione ad solem, & coitu absteineat. Quod si uenter per se non solutus fuerit ex medicinis quas in capitulo de custodia sanitatis nominauimus soluendus est. Si autem hæc febris, superuenerit alicui in cuius stomacho aliquid contineatur, quod euomi possit: ex aqua calida sorbeat, & cum ea ipsum euomat. Et si grauitas in inferioribus uentris partibus sentitur, collirium aliquod supponatur. Cuius uenter prout oportet mundificatus fuerit: & cum hoc neque fuctus fumosus, neque grauitas neque mordicatio in uentre sentitur: neque nauſea: balneandus est æger, & nutriendus, & regendus eo regimine, quod prædiximus. Is quoque, cui hæc febris accidit causa frequenter astellandi: ex his, quæ in suo nominauimus capitulo curandus erit. Cumque ipsius febris repressa fuerit: in balneum mittendus erit, & ex rebus quas in hoc libro nominauimus nutriendus. Sunt præterea ex hominibus quidam qui cum cibos multum trimenti frequenter comedunt, ut sunt carnes, graues cossæ; & pultea ualde spissæ, & frumentum coctum, & uinum cossum: hæc incurrunt febrem. Quapropter hi a cossorum ciborum assiduatione abstinere debent, & ex carne hædina & pullina nutriendi, & syrupum acetosum bibere debent, & de uino sumere debent: quod iam peruenerit ad subtilitatem, & claritatem, & in profundum penetrare potest. Is quoque, qui a prædictis læditur, ante comestionem uti exercitio debet; & uentris solutionem & phlebotomiam assiduare. Si enim nihil negligens affuerit ægritudines incurreret acutas, & pessimas. Sunt etiam ex hominibus alii qui cum laborem aut uigilias patiuntur, aut eorum tardatur comestio, aut ex cibis subtilibus, aut siccis nutriuntur ad febrem deueniunt. Quapropter huiusmodi hominum genus ab his rebus abstinendum est. Cumque febris eos inuaserit succurrendum est, cito cum eis quæ corpus humectant. Ex hoc enim si neglectum fuerit, ad hæcticam deuenient.

De febre hæctica. Cap. 3.

Cum febris tribus diebus aut amplius permanserit, neque se mouerit, neque calor eius, neque inflammatio uehemens fuerit neque accidenſia quæ febres acutas comitari cõsueuerunt, cum ea affuerint ut est pulsus magnitudo & caliditas, & inquietudinis uehementia, & anxietas, & lingue siccitas, atque eius nigredo: ipsa tamen sic uno modo perseverauerit, neque potest in ea deprehendi dimissio aliqua: neque paroxysmus, præter hæc etiam ipsa inuenitur quicra, & quasi repida: tunc hæctica adesse creditur. Est itaque ipsius ueritas sic experienda. Aegro ut in diuersis come-

dat horis, est præcipiendum. Quod si inuentus fuerit semper post comestionem a febre magis instari hæcticam proculdubio esse pronuntiandum est. Quod si cum hoc etiam facies eius iam extenuata esse uideatur, & oculi concavi & caro imminuta atque cutis desiccata fuerit hæctica iam non est in eo in principio, immo in ipso confirmata est, & operata, & diu est ex quo ipsum inuasit, hæc autem febris in principio sui cum nodum, scilicet ad ariditatem peruenit, curabilis est. Phtisis itaque signa cognoscenda sunt ut dum aliquis de ægri sanitate confidit ad eam curandam properet. Dicemus igitur, quod cuius quidem hæcticam in phtisim transit: tempora uehementer plana sunt & oculi concauantur, & nares subtrahantur, & sunt tornatiles, & aures minorantur, & earum corpus subtiliatur; faciei quoque ac frontis tenditur cutis; ac si esset corium quod super ossa faciei desiccatum foret; & totum corpus similiter a carne nudum existit. Collum præterea tenue fit, & epiglottis foris prominet. Cumque pectoris ossa tactu aut uisu considerata fuerint; unumquodque eorum cum suis extremitatibus notari poterit, & postremo corpus non uidetur nisi corium & ossa. Eiusque uox ex illis auditur, & debilis, & uirtus omnino destructa uidetur, & pulsus subtilis, & debilis, & cum hoc etiam durus. Cordæ quoque manifeste apparent, quia caro dissoluta est, & uenæ similiter. & cum hoc a sanguine uacua; neque earum concauitas magna rei capax existit. Pulchritudo quoque atque claritas ab ipsius corpore omnino recesserunt; & cutis desiccata est: & cuti existentis in senio similis facta est. Venter etiam eius attenuatur & debilitatur donec uideatur ac si costis adhereret, & quod nihil in se contineat. Mirach præterea uentris in tantum subtiliatur, ut non uideatur esse nisi solummodo corium, & præter hoc spasmatur & desiccatur. Ossa quoque raschere, & pectinis manuum plerumque appareret & ungues curuantur. Eum uero capili cadunt alicui, & uenter soluitur, mors ei propinqua est. Cumque corpus ad hunc diminutionis, & debilitatis uenerit terminum nunquam sanari poterit, neque meliorari. Sed dum carnis, & sanguinis pulchritudinis ac uirtutis reliquie in eo inueniuntur, & quod ex prædictis significationibus apparuit neque uehemens est, neque confirmatum; sanari potest, & ad suam redire dispositionem si ei, ut oportet, subueniatur. Cum autem non fuerit multa debilitas neque multa macies, neque longum intercesserit spacium ex quo pati cepit nec etiam ex signis hæcticæ aliud apparuit, nisi quia febris lenta adest quæ iam per aliquos perseverauerit dies, & postea parum siccitas, & maciei inceperit: huiusmodi patiens leuiter, & cito sanitati restituetur, si Deus uoluerit. Hæc igitur febre laboranti in primis aqua hordei danda est, &

est, & postquam ipsa de stomacho descendere ex piscibus qui etiam uocantur, super prunas assatis, aut in ueru nutriendus est, & ex oleribus frigidis, & humidis, & portulaca, & moluchia, & lactuca, & cucurbita, & cucumeres, & citruli, hic quoque quotidie antequam comedat balneum ingredi debet. ubi in loco moretur, in quo a calore laedi non possit, & in aquam tepidam per aliquod spacium similiter mittendus est, deinde ex oleo uiu. inungendus. Domus uero, in quamoratur talis sit. Cuius aer frigidus sit & humidus, ipsiusque pauimentum ex rebus uiridibus quae frigidae sint, & humidae sit stratum. Panni quoque aqua rosata infusi in niue infrigidata, in qua camphora, & sandali dissoluti sunt, pectori superponantur. Quod tamen fieri conuenit cum stomachus alleuiatus fuerit, & cibus ab eo descenderit, & etiam antequam comedat. Cumque praedicti tepesfacti fuerint, panni mutandi sunt. Quod tandem fieri conuenit, donec frigiditatem sentiat aeger iam ad multam sui corporis profunditatem peruenisse. Quod si propter huiusmodi curam superueniat ei prius horripilatio, & postea accedat ei caliditas, tepesfiant parum, & postea pectori superponantur, neque remoueantur, nisi cum deliccati fuerint aut multum calefacti. Oleum praeterea uiu. & oleum de seminibus cucurbitarum in potu danda sunt, & lectus solito mollior fiat, & quantum plus poterit, longo tempore dormiat. A vigiliis autem atque cogitatione, & a motu, & coitu, & a statione in locis calidis, & sic. & fame abstineat. Si aut cum hac febre fuerit nocumentum, & acuitas atque calor trochisci de camphora quotidie in matutinalibus horis in potu tribuantur. Cum aut sol ortus fuerit, aquam hordei bibat. Aque uero quam in nocte bibiturus est, iulep cum mucillagine psyllii admisceatur, neque cessandum est, immo importune instandum in pectoris infrigidatione. Unde ex frigidis epithimatis, & ex oleribus instanter epithimandum. Cibaria uero non semel sunt tribuenda, sed ad multas uices partienda, & praecipue si aestas fuerit. Ex quibus aeger non tantum semper sumere debet, quantum est ei necessarium & sibi caueat, ne semel tantum comedat quantum id est quo aget. Ex aqua quoque frigida paulatim in potu sumat, neque famem aut sitim ullo modo patiaur, & ab omnibus quae calefaciunt, & desic. omnino separetur. Cum autem hectica iam meliorata fuerit, & obfuscatio ac carnis diminutio manifeste apparuerint, ueruntamen ad terminum, secundum quem ipsam diximus esse insanabilem nondum peruenit, ea laborans eodem indiget regimine, quo & praedictus. Oportet tamen, ut super eum fiat assiduatio, & perseveratio, & frequentatio, & perueniatur cum eo ad ultimum, & mittatur in balneum, & in tinam bis aut ter in die, nisi in tali disponat manere loco,

in quo caliditas nullo modo eum sedere possit, neque horripilatio inuadere. Non enim nequaquam uolumus ipsum intrare balneum, nisi cum semicupium inuenire non possumus, neque aquam super eum fundere ubi horripilatio eum inuadat. Sudare autem, & aerem attrahere eum, aliud omnino ei deterius existit. Hanc itaque patiens febrem in balneum mittatur, & semicupium postquam duarum horarum spacium praeterierit, ex quo aquam hordei in potu sumpsit, & eum de semicupio egrediat, ex oleo uiolarum inungatur. Cumque uenter ab aqua hordei alleuiatus fuerit, neque in ructu sapor villus remanserit iterum ad balneum ducatur, ita tamen ut in eundo minimi labores, deinde mittatur in semicupium, & de aqua tepida tam diu super eum fundatur donec ipsius corpus incroscatur, & prae-rumper rubere incipiat. Postea uero in aquam frigidam semel submergatur. A cuius tamen frigiditate non ledatur, deinde ipsius corpus ex oleo uiolarum, & ei similibus oleis inungatur. Vt praeterea regendi ipsum in balneum, incrementum recipiat. Cumque ab eo egressus fuerit, ex eis quae diximus & secundum mensuram quae diximus, cibetur, & iaceat in domibus tranquillis humidis bene olentibus, in quibus sit aeris paucitas. Ante ipsum uero panni frigida infusi aqua, & parapsides magnae ex ea plene ponantur, aut lacunae sint coram eo. Polia quoque uitis & salicis, atque rosarum & uiolearum, & festibium & his similia coram eo sternalur. In tempore uero hyemis non sit in eius mansione ignis, neque fumus, sed frigidum attrahat aerem, haec enim maior eius existit cura. Quia propter hoc ita conseruatur, quod non oportet eum implastra & epithimata frigida, quae praediximus exterius ad cordis confortationem apponere. Ex pannis quoque calidis & in pondere leuibus cooperiatur corpus & praecipue caput, ne cotiza aut catharrus ei superueniat, & extremitates leuiter comprimantur, patiens quoque oleum de cucurbitis cum oleo benusafarino conditum, olfaciat & dormiat diu. Quod si magnum diu superfuerit spacium, uolueritque iterum antequam cenet tinam ingredi faciat, quia conferret ei. Et si non comedat & ante comestionem non ingrediatur balneum, & dormiat diu. Si autem siccitas & macies iam vehementer eum occupauerunt, lac caprinum super ipsius corpus mulgeatur, ex eo liniatur. Atque aque quae est in semicupio ex ipso aliquid admisceatur. Cumque de semicupio egressus fuerit, ex oleo uiolarum aut de cucurbita, aut de benusafarino inungatur. Si uero neque caliditas, neque acuitas fuerit, vinum album & subtile, quod tam aqua frigida habeat admixtum ut sapor vini abscondatur, bibat. Sed si acuitas fuerit manifeste iulep de zucaro cum aqua frigida in potu ei tribuatur.

ur: & ne venter eius solvatur, summopere est cauendum: ad cuius constrictionem si solui ceperit, est festinandum. Huic præterea plerumque calor fuerit fortis, confert lac vaccarum iuuenilis ætatis de quo butyrum vehementer extrahum est si fuerit acetosum, & aqua hordei in potum est tribuenda. Et si venter solutus fuerit ipsam cum torrellis sumat. Et est necesse cum hoc quod diximus, ad infrigidationem & caloris extinctionem stupium impendatur. Cum autem huius vrina fuerit oleagina aut in eius superficie petala apparuerint vinctuosa, aut frustra carnis filis similia aut aliquid simile fursuri in vltimo in huius regimine est insistendum. Sed si quis hac laboras ægitudine corpus habuerit vehementer siccum, & vehementer macrum neque fortis calor in eo fuerit, lac calidum ut ab uberibus extractum fuerit si in potum sumatur aut cum eo micæ panis comedere conferretur. Omni vero lacte ad hoc aliquid melius existit. Et post ipsum est caprinum. In lacte vero recente duo sunt obseruanda: ne scilicet in caseitatem transeat, & ne conuertatur. Lac autem quod prædiximus cum in stomacho fuerit, non transit in caseitatem, nisi raro. Quod etiam nunquam in caseitatem mutabitur, si parum zuchari cum miscetur. Cum autem a lactis conuersione quis agrum custodire uoluerit, eius dispositionem in caliditate quotidie tangendo consideret, & qualiter aerem attrahat, attendat: eiusque pulsum inspiciat, & urinam, atque sitis ipsius quantitatem. Si enim inuenerit hæc omnia maiora quam prius essent antequam lac bibere, & vehementer augmentata fore à lacte prædicto erit abstinendum, & lac acetosum absque butyro, aut aqua hordei in potum erunt tribuenda: & troisci de spodio, & his similia. Venter quoque si striccius fuerit cum apozimate, aqua prunorum, & tereniabin erit soluendus. Quod eo usque fieri conuenit, donec prædicta remoueantur accidia. Post quorum remotionem: ad lac redire est ei præcipiendum: hæc est eorum summa quæ hæctica patientibus adhiberi conueniunt. Cum autem aliqui hæctica laborantes ad hoc deuenierint ut ossa rascet, & pectinis manifesta apparent, & pulsus deficiat, & mira ex uentris costis abhæreat, omniaque eorum ossa manifesta uideantur, & subtilia, non est in eis laborandum ut ad sanitatem perueniant: sed ut quoquo modo sustinerentur. Quod fit ex nutrientibus quæ uelociter penetrant, & ex bonis odoribus. Caro quoque pullina sumenda est, & in parua frustra incidenda, & succus ab ea paucum salem habente extrahendus quemadmodum ab alia carne succus extrahi consuevit, aut fiat hoc ex carne rubea quæ collo hædi repetitur. Deinde huic succo parum de succo pomorum, aut citoniorum, & parum uini admisceantur aut torrella benè trita ei admisceantur, & sic bibatur, aut sorbeat. Camillas præterea tin-

das induant quæ ex sandalis, aut musco, si non capitis dolorem fecerint, sint infectæ: fumigium quoque ante eos fiat ex xitholoe, & nere, & ante eos, & in eorum circuitu ponantur odorifera, & confectioes odorifere, & aqua rosata super eos roretur, & olfaciant cibos odores habentes desiderabiles: sicut est cibus qui fit de carne hepatis, & pulmonis minutim incisa, & postea in frixorio cum ouis, & croco, & aceto cocta, & intestina ex carne frustatim incisa plena, & cusabegi, pulli quoque assandi sunt, & coram ipsorum facie scindendi, ex quorum pectore carnem masticando succum solum traiciant. Carnem autem proiciant si multum fuerint debiles. Quod si quis ex his aliquantulum fortior fuerit, pulli cum aqua, & sale coquantur, quorum pectora postea contusa cum iure exprimantur, quorum succus cum coriandro, & pauco cinamomo conditus, & uinum atque torcellas habens admixta in potum tribuantur. Vnus autem ex ueteribus medicis retulit, se uidisse unum uirum, & multos pueros, qui postquam ad hæcticam ad hanc deuenierant dispositionem, sanati fuerant. Ego tamen nunquam hoc uidi, neque credo uerum fore, & præcipue postquam puerilem transierit ætatem. Troisci de camphora qui cum sint cordis, hepatis ac pectoris infrigidatiui hæctice quæ est cum ardore conferunt. Recipe rosarum rubearum. 3. x. spodi albi quod sit magnum frustum, seminis cucumeris, aniborum ana. 3. v. seminis lactucarum. 3. ix. seminis portulacæ. 3. vi. seminis endiuiz. 3. ii. seminis dulcis cucurbitæ. 3. vi. tereniabin. 3. x. camphoræ. 3. f. Ex his omnibus cum mucilagine pulli confectis informantur troisci: quorum quisque duas ponderet dragmas. Quod si uenter solutus fuerit, ex istis aliis troiscis de spodio qui sunt constricuiui dantur. Recipe puluis rosarum rubearum, spodii, amborum ana. 3. v. boli armeni, gummi arabici. amborum ana. 3. 2. succi berberis, succi sumach, amborum ana. 3. 3. balaustræ. 3. i. & f. seminis coriandri in aceto infusi, & postea torrefacti. 3. 2. seminis acetosæ ex corticati. 3. 3. fiant troisci, quorum quisque duas ponderet. 3. ex quibus unus in mane, & alius post solis occasum cum rob simplici de citoniis, aut de granatis aut de ribes sumatur.

De febre que duobus diebus inuadit, et unum intermittit, & vocatur tertiana. Cap. 4.

H Vius febris principium cum forti accedit rigore, & paucio frigore sicut est dispositio pedis cum obtupescit: sed non prolongatur diu sicut frigoris spacium prolongatur: sed corpus cito calefacit adeo uehementer, ut si corpus ægrit agatur, manus mordicationem sentiat caloris: accedit autem plerumque ut æger in tempore uehementiæ caloris huius febris, & in eius fine: inapente

niter loquatur, & præcipue si calidæ fuerit complexionis. Plerumque etiam ex ea accidit nauſea, & æſtuatio, & uomitus colera rubra. Venter quoque quandoque ſoluatur, & egreditur cholera citrina. Pulsus in ſtatu huius febris inuenitur magnus, & uelox, & frequens: ſed tamen æqualis. Vrina quoque in colore eſt ignea: ſed ſecundum ſubſtantiam non eſt ſpiſſa, habet tamen fetorem, & odorem malum ex putrefactione. Hæc autem febris ſæpius euenit complexionem habentibus calidam, & ſiccā, & qui multum perpeſſi fuerunt laborem, & nigilias, & ieiunium, & ex cibis calidis nutrimentum ſumpſerunt, & vinum forte, & vetus biberunt: in regionibus, & temporibus in caliditate diſtemperatis. Hæc præterea febris non infeſtat ægrum ultra horas duodecim: quinimmo ſæpe in horis paucioribus iſtis ipſius remouetur paroxiſmus uſque ad octo uidelicet horas. Cumque hora reſceſſionis aduenierit, cum ſudore remouetur, & quando ſeparatur a corpore, pulſus ab ea mundificatur. Cum igitur hæc accidentia cum febre inueniuntur, aut ex eis plura ſciendum eſt febrē eſſe tertianam. Quod ſi cum prædictis accidentibus aut pluribus ex eis contingat, tertianam in illa hora multis euenire abſque omni dubitatione ſciendum eſt ipſam eſſe tertianam, ac ſi uidiffet eam una diei infeſtaſſe, & alia quieuiſſe. Cum igitur æger taliter diſpoſitus fortis inuenitur, fueritque diu ex quo non fuit ſolutus de mirabolantibus citrinis. 3. x. in aqua fermentante die, & nocte inſundatur, deinde manibus fricatum coletur, cui 3. xx. ex tereniabin miſceantur, & in mane in potu tribnatur. Scamoneæ quoque recentis anthiochenæ, & bonæ quarta. 3. unius in tanta quantitate iulep, & aquæ quæ ſemel ſorberi poſſit diſſoluatur, & ad bibendum tribnatur, donec uel ſemel ſoluatur. Cum enim hoc factum fuerit aut febris nullo modo accedet, aut parumper alieuiabitur: deinde ex toto regimine quod narro regendus eſt. Si autem æger fuerit delicioſus aut debilis, & tempus fuerit æſtas, circa unamquamque noctem pondus. 3. x. tamarindorum, & pruna ſicca, & croſſa nigriti ſumantur, & in duabus libris aquæ uſquequo ſunt diſſoluta coquantur, deinde manibus fricata coletur, & miſceantur huic colaturæ zuchari tabarzet. 3. detem, & in potu antequam dormiat ſumantur. Cumque mane factum fuerit, & ſol eleuari ceperit ex aqua hordei ſecundum magnam quantitatem bibat, & in loco bene quieto uel oſente moretur, donec cibus digeratur, deinde ex oleribus frigidis, & muſaguarat in quibus non eſt amaritudo, nutriatur. Et a cibis in quibus eſt caro abſtineat, & comedat medullam cucumeris, & citulli, & de ſucco cucurbitæ in tempore ſuo bibat, de ſucco cucumeris ſaraceni, & ſumat in potu aquam cum iulep, & ſirupum acetofum ex zucharo

aqua bene temperatum. Modus quoque infeſtigandi, & extinguendi ſecundum febris calorem obſeruetur. Venter præterea ſi per ſe ſemel aut bis aut ter quotidie ſoluatur, apozima prunorum non eſt dandum: ſed ex aliis eſt regendus. In loco quoque apozimatis prunorum ſuccus granati muſi cum mucillagine pſilli eſt tribuendus. Hepati præterea in nocte in horis ſcilicet uenter a cibo vacuus eſt, panus ſandalis, & aqua roſata inſuſus eſt ſuperponendus. Sitque inter comefſtionem, & inuaſionis principium longum tempus, uidelicet nutriatur tribus horis uel duabus antequam febris accedat aut poſtquam reſceſſerit. Hic autem æger ab omnibus calidis eſt abſtinendus, & in loco frigido ſit ſemper eius moratur. Quod ſi febris cum magno ardore, & calore eſſe videatur, & ſucco cucumeris ſaraceni, aut cucurbitæ, aut citroli, & ex mucillagine pſilli cum malis granatis, aut iulep plus erit dandum, & de aqua hordei plus bibendum. Si uero dies propius fuerit, aut eius cibus non cito digeritur, non euenit tibi ut ex aqua hordei iterum ei tribuas poſt ſolis occaſum. Trociſci quoque de camphora quotidie cum ſirupo acetoso de zucharo in potu ſunt dandi in mane antequam aquam hordei ſumat per duas horas, aut ad minus per unam horam. Cumque febris ægrum dimiſerit, adhuc eodem regimine quo prius poſt febrē pentes dies erit regendus. Quibus tranſactis pullinacaro, aut hedina eſt danda. Interim tamē a balneo, & ſole, & uino eſt abſtinendus: deinde ad conſuetam reduendus.

De cauſonide.

Cap. c. v.

Hæc febris de genere eſt tertianæ, ea tamen fortior exiſtit, & maioris caloris. Quæ quidem una die ſit ualidior. Alia uero minus calida. A corpore tamen non ſeparatur, neque horripilatio cum ea accidit neque ſudor niſi cum reſcedit. Alia autem tertianæ accidentia ſuper eam eſt, uehementiora tamen, & firmiora. Lingua præterea ac labia citrina ſunt, aut denigrantur, aut abſque dubio exaſperantur ſi febris non ualde fuerit fortis. In huius uero febris curatione, tali indigemus regimine. quale in tertiana prædiximus. Eſt tamen in ea plus ſtudendum, & diligentior cura eſt ei adhibenda, ſecundum quod eſt fortior illa, & maioris incendii. Aegro igitur in nocte ex apozimate prunorum, & tamarindorum quod prædiximus eſt tribuendum, uſquequo uenter quotidie bis aut amplius ſoluatur, trociſci quoque de camphora, aut ſuccus citroli, aut cucumeris ſaraceni, aut piſana ſemper in mane dentur. In die uero omni hora aſſidue, cucurbitæ aut citroli ſuccus citribus ſit, & ex mica panis abluta lacti a quo butyrum ſit ſublaturum cum zucharo admixta regatur.

Quod

Quod si parū comederit: aqua hordei iterum sumat: sicut ostendimus: aquę autem quę illi in potu ministratur parū psili admisceatur, & ex ipsius mucillagine cū iulep aut succo granati, in potu sumat. Asperitas uero lingue cum pāno lineo fricetur: deinde psili mucillagine cum zucchero lambendo hauriat. Nucleus quoque prūpi parum adhuc carnositatis retinens in ore retinendus dētur, & pāna quę rosata infusi hepati, & cordi pluribus superponatur horis. Et si eger in interioribus apostema non habuerit: neque stomachus neque hepatis debilia erant dum esset in colicis: ex aqua frigida super niuem in frigidata multum in potu sumat cum calor ualde accensus fuerit de qua ad co. usque bibat, donec facies eius uiridis fiat, & tremat. Calor enim febrilis ex hoc ilico extinguetur: deinde sudabit, & euadet aut forte liberatus erit. Venter autem si uehementer soluat, hordeum confectum, & ablutum, & aqua coctum, cum trociscis constrictiuis de spodio dandum est. Sirapum uero acetosum, & iulep, & zucharam iter: Rob autem simplex de granatis acetosis, & malis, & citoniis acetosis, dandum est, & ex omnibus quę in capitulo de uentris constrictione diximus est regendus. Quod si a uigiliis, & capitis dolore sedatur, sicut in earum ægitudinum capitulis continetur, medicandus erit. Nos enim in hoc nostro libro non ponimus curas ægitudinum, nisi simplicium. Ideoque cum ægitudines composite fuerint, ex propriis capitulis sunt earum curationes sumendę. Sit præterea in hac febre, & in omnibus cōtinuis febribus nutriendi tempus, tunc cum ægee aliquam sentit alleviationem, aut si alleviationem non sentit, sit in hora quę solitus erat comedere dum esset sanus, aut in hora quę dies in frigidatur, & temperatur. Interpolatis uero oportet ut sit hora comedendi longe antea rati accessione quāto plus possibile fuerit, aut post earum recessionē. Nos tamen ostendemus quo modo sugnurationis regimen obseruari debeat cum de acutis tractabimus ægitudinibus si Deus uoluerit.

De synocho. Cap. 6.

Hæc febris cum incipit sine tremore ac horripilatione accidit, immo cum calore incipit, & est cum ea in facie, & in oculis & auribus, & naribus rubedo, & tristitia, & inquietudo, & inflammatio fortis, & inspiratio magna, & frequens. Hanc præterea febrem, antequam accedat, hæc signa præcedunt: Aegro namque adest in corpore grauitas & extensio, & pigritia, & dispositio quę lassitudini similatur, & in somno superfluitas, & amentia, & in capite grauitas, & præcipue in fronte, & tympanibus. Venarum quoque exuberatio, & quidegiuidetur, & pruritus in na-

ribus, & in locis ubi uentosas apponere consueuit sentitur. Hæc quoque febris accidit adolescentibus corpora bonę habitudinis habentibus, & eis qui ex carne, & confectionibus de melle multum comedere, & multum uinum bibere consueuerunt, contingit autem sæpius in hyeme, & uere. Cumque corpus hanc ægitudinem patientis tangitur simile corpori de balneo exeuntis sentitur. Aut qui super corpus suum multum ex aqua calida fudit. Pulsus in hac febre magnus sentitur & frequens, & urina rubea, & cossa. Cū ergo in hac febre signa apparuerint, aut plura ex eis festinandum est ad ægri minutionem faciendam, in quā ex sanguine multum est extrahendum: Ex hoc enim extingetur hæc febris. Si autem non prius subueniatur quam lingua nigra fiat: & superuenerit accedētia causon, æget ut diximus regatur. In hac tamē febre ea quę sanguinem reprimant magis sunt danda, sicut rob quod fit de succo uipę acerbę, & de acetositate citri, & ribes, & acerum, & malum granatum præterea ad regimen ægri subiliandum est diuertendum, & ad multum ipsius comestionem minuendam. Si quis etiam ægrum in suę ægitudinis principio inuenerit, & flebotomi fecerit hæc quę prædiximus cibus ipsius admisceat. In potu præterea aqua frigida tribuatur, & trocisci de camphora: Et si necesse fuerit venter ex apozimate prunorum, & tamarindorum, & zucchero soluat, aut ex succo granatorum acetosorum cū pulpa sua, & zucchero tritorum. Postquā uero febris recesserit, a carne confectionibus quę ex melle sunt, abstinēat, & a uino, donec ipsius sanitas sit confirmata. Hæc quoque febris est continua, & non interpolata, neque uocatur tertiana, neque cum ea est aliquid ex igne, & inflammatione, & acuitate quę cum causon sentiuntur sæpe nisi in principio extingatur. Hæc præterea tres habet species: Vna est in qua a sui principio non cessat augmentari malitia, usquequo ueniat crisis, aut æger moriatur. Alia uero est quę semper in una moriatur dispositione. Tertia quoque est quę quotidie a sui principio minuitur: Illa autem quę semper augetur plus indiget minutione quā alię. Postquam ea quę uilis est tenoris, secundum æget licet etiam tertia ea non sit priuanda. Ille tamen duę plus indigent, & præcipue ea quę cū augmento semper.

De febre quotidiana quę uocatur phlegmatica. Cap. 7.

Hæc febris cum horripilatione, & uero frigus in dorso, & extremitatibus incipit, & tempus frigoris in corpore prolixum fit, & uix calescit, neque cito peruenit ad inflammationem, & calorem sicut tertiana: Quinimmo corporis calefactio in hac febre cum prolixitate, & labore accedit,

accedit, & plerumque calefit, & iterum infrigidatur, & post etiam calefit. Quod postquam multoties factum fuerit manifestatur calor, & erit in toto corpore æqualis post laborem tamen. Cumque calor incipit per totum corpus spargi, & equari non est fortis neque purus neque in corpore ægri sentitur incendium neque mordicatio ut in tertiana: & caustionide neque sitis est cum ea neque uehemens inspiratio. Et si cum ea fuerit uomitus, aut uentris solutio, humores albi, & pure phlegmatici egerunt, aut cum pauca cholera rubra. Facies quoque in hac febre tumere aliquantulum uidetur, & corpus arefcit, & uirtus appetitiua deprimitur. Pulsus quoque in hac febre secundum uelocitatem, & spissitudinem, multo minor inuenitur quam in tertiana, & præter hæc est diuersus. Accidit autem hæc febris sæpius pueris, & mulieribus, & euuuchis, & corpora habentibus humida, & eis qui multum comedunt, & parum euacuatur, & parum exercitatur, & in teporibus, & in regionibus frigidis, & humidis. Urina uero in hac febre, alba est, & subtilis, aut rubra, & spissa, & turbida. Et secundum maius in principio est in prima dispositione, sed postea succedente tempore in aliam mutatur dispositionem. Eiusque interpolatio in pluribus in recessione dici contingit, & iuxta noctem. Neque cum sudore separatur, & præcipue in primis diebus. Sudor, & si cum ea fuerit, erit paucus, & viscosus. Venæ autem cum recedit febris, non omnino ad diuersitatem purificantur, neque corpus à neutralitate, immo reliquæ ex ea remanent quæ in corpore sunt usquequo alia ueniet accessio, hic rursus quotidie inuadit in qua tempus paroxysmi prolixius inuenitur tempore interpolationis, & sit longa, & mansua. Quæ plerumque multis moratur mensibus: præter hoc quoque est mala, & mortis suspicionem secum habens. Cum igitur in febre hæc signa inueniuntur, aut plura ex eis sciendum est ipsam esse phlegmaticam. Quod si in tempore huius multi hanc pati febrem inueniatur, iam certius credendum est, eam esse phlegmaticam: Festinandum est igitur, & a prima accessione huius febris sirupus acetosus de melle cum aqua tepida est dandus ad bibendum. Quem si potest hortandus est uomere; non tamen cogendus. Ideoque ex eo multum bibere debet. De uomitu uero, ita sit ut res se habuerit. Aeger autem non est fatigandus, ut hoc modo omnino mundificetur, & ut prorsus inuestigetur. Ex medicina quod sit exturbat quæque nocte est ei dandum, quod. Recipe turbit fricati, & cribel. cum panno sericino qui uocatur orale. 3. i. mastice 3. i. zibetis amborum ana. 3. i. zuchari quantum de omnibus. Ex hoc quæque nocte pondus auri unius in potu detur, nisi uenter a natura bis aut amplius inter diem & noctem soluat. Cumque mane factum fuerit, zeluagebin, de zucharo. 3.

vi ei danda sunt; & ilico post hæc sirupus acetosus de melle collati. vnc. i. est tribuenda. Hora quoque comestitionis ab hora accessionis: quanto plura possibile fuerit, est elonganda. Nutriendus uero est æger ex aceto, & oleo abluto, & zucharo, & pauca menta, & ex oleribus huic similibus. Ea cucumeris, & citrulis, est abstinentias. Salus uero in comestitione utatur quæ ex aceto, & almuris sunt, & regatur ex radicibus sicle, & eius extremitatibus, conditis ex aceto, & oleo, & almuris, & sinapi, & aliis his similibus. Regatur quidem æger sic per hebdomadam unam. Et si febris ingitudo, & eius accidentia immorari inueniantur, & hora suæ inuasionis retardari comperiat, ita erit regendus. Si autem inueniatur augeri agitare, Aeger ex hac confusione soluitur quæ. Recipe turbit sani. 3. i. succi absinthij. 3. i. uonis quartam, colloquintide. 3. i. unius sextam, agari. 3. i. s. hieræ pigre. 3. i. mastice. 3. i. unius sextam. Conficiantur cum sirupo acetoso, mellito, & deorsus ægro. deinde ad ipsius regimen est redeundum. Quod si ægri uirtus debilitata fuerit, polli assari, & præparati in patella detur, & separatim a ure, & micis. Et si stomacho superuenierint aliqua accidentia, aut fortis nausea ex eis quæ in eorum capitulis nominauimus curetur. Similiter quoque si mala acciderit complexio, ut diximus subueniatur. Si autem febris quartæ transierit hebdomadam de trosciscis rosarum completis in potu tribuatur. Troscisci autem complexi de rosis sunt qui. Recipe pulueris rosarum ru. 3. i. succi eupatorii. 3. i. succi absinthij. 3. i. iij. mastice. 3. i. & spicæ assari. Floris squinanti, anisi omnium ana. 3. i. Informantur troscisci quorum quisque sit. 3. i. iij. ex quibus unus cum vnc. i. huius apozimatis detur, quod. Recipe corticum radic. api, & radic. feniculi, amborum ana. 3. i. semipis utrorumque ameos, cuscuthæ, anisi, bedeguart, suchahæ omnium ana. 3. i. Coquantur cum aquæ libra. i. donec ad medietatem redeat, & misceatur ex eo cum vnc. i. sirupi acetosi, & detur cum prædicto troscisco. Aegro quoque inter omnes duas noctes medicamē de turbit semel detur, ut uenter moueatur. Si autem febris adhuc fortis fuerit, cum alia confusione soluat. Carnes quoque caligine & mutagenat dentur, ne uirtus dissoluatur. Amicis uero, & ab unctuosus, & confectiōnibus quæ ex melle sunt, custodiatur. Et obseruandum est ne aqua frigidam in niue infrigidatam patiens in hac febre bibat; neque aliquid eorum quæ ei similia sunt ex rebus frigidis. Ex hoc enim si neglexerit febris fiet longissima.

De febre quartana.

Cap. 8.

Hæc febris cum tremore adeo uehementi incipit ut dentes constringere faciat, & concutere. Iundure quolibet arque ossa dolent, & si aliquid

si aliquid super ea foret appensum quod ea grauiaret & percuteretur. Estque dispositio tremoris huius febris sufficiens ad ipsam significandam. Non est enim talis tremor in alijs febribus. Pulsus autem in inceptione huius febris; ex paruitate ac debilitate raritate quoque & tarditate; ad mirabilem peruenit dispositionem. Et si quis recordatus fuerit pulsus infirmi qualis erat dum sanus esset; non indigebit alio signo in cognoscendo quod febris quæ incepta sit quartana; nisi illud quod ex actu venæ ei manifestabitur; de superfluitate paruitatis & tarditatis; & debilitatis ac minorationis; & quod valde sit contrarium tempori pulsus febris phlegmaticæ. Hæc quoque cum calefit & accenditur; valde calidior existit quam phlegmatica. Non tamen ad calorem peruenit tertianæ; neque tanta sitis; neque tanta inflammatio; neque tanta æstusio; neque tanta inquietudo; neque tantus dolor capitis; neque tantum alienationis inuenitur in hac febre quantum in tertiana. Hæc autem post longas febres quarum circuitus planetæ fuerunt sæpius contingere consuevit; & in autumno, & in fine ætatis; & complexionibus habentibus siccas. Urina vero in hac febre alba apparet & subtilis; aut appropinquat rubedini; & plerumque est clara valde, & cruda & cossa; & nigra aut rubea. Præterea si in hoc tempore multæ febres quartanæ multis accidunt; secure credendum est febrem esse quartanam. Cumque urina in hac febre rubea & spissa visa fuerit; & corpus rubeum & venæ plenæ; æger ex basilica minuatur; deinde totum regimen, quod conuenit ei adhibeatur. Si autem hoc non fuerit visum aliquæ medicinæ quæ cholera expellunt nigræ ex his quæ in capitulo de melancholia nominauimus dentur. Medicina quoque mouens in sequenti die post febris laborem; danda est. Cumque accessio incepta; sirupus acetosus cum multa aqua tepida est tribuendus; & æger ut ipsum euomat; hortandus est. Quod si uomere non poterit sicca, & sinapi, & salsa & eis similia; danda sunt. Quibus sumptis uinum multa aqua mixtum bibat desuper; deinde sirupum acetosum in quo raphanus fuit infusus in potu sumat. In alijs quoque diebus uomat & regimen ei amplificetur & de carnibus pulorum, & hædorum, & agnorum annualium mensurate edat. Ante tamen comedat olea cum almuri, & oleo condita, & aquam calidam super se fundat, & in ea sedeat antequam comedat. In balneum quoque mittendus est. In quo quidem tamen non sudet. Laborem præterea atque uigilias minus solito patiat. Somni uero & quietis augmento assuescat; uinum subtile & ualde tem-

peratum bibat. Solatio quoque uentris assidue per unum diem antequam accessio ueniat; ei adhibenda est. Sed uomitus in die accessionis; est dandus. Aliis uero diebus qualiter nutriatur & corpus ipsius humectetur; est pensandus. Et est considerandum an febris, & in suis accidentibus; & suæ accessionis longitudine minuatur, & quæ currunt in ea; quia hoc bonum erit. Si autem non multum inueniatur minui æger uementer est euacuandus. Quod si in ultimo factum fuerit; non permanebit febris. Quod si ultra .xl. dies perlongata fuerit; ægro cum reliquis istius medicationis quæ diximus ad magnitudinem nucis de diatrion pipereon quotidie in mane est tribuendum; & ex medicamine quod fit ex asa ad auellanz magnitudinem dandum. quod est. Recipe asæ foliorum ruta, sicca; piperis omnium æqualiter; mellis quod sufficit ad conficiendum. Sumat ex hoc medicamine quantum est auellana in hora dormiendi, & æger post ipsum dormiat. Balneum præterea ingrediatur & sudet in eo; non tamen in die accessionis. Vinum quoque uetus & purum bibat; & si fuerit tempus ætatis & corpus macrum & calidum melius erit ne aliqua ex calidis medicinis detur. Sed serum cum zucchero tabazet ei sæpe tribuatur. Apozima quoque de epithimo & mirabolanis indis interdum detur; & ex cibis nutriatur hamestatiuis. Vomitus etiam in principio accessionis in die qua eum infestat febris; cum sirupo acetoso; & aqua tepida prouocetur.

De Febr. bus continuis. Cap. IX.

Tertiana, quartana, & quotidiana plerumque fortasse non remouentur; sed permanent semper. In hora accessionis fiunt fortiores; postea reprimuntur; non tamen separantur, ita ut corpus ab eis omnino sit liberum; deinde iterum ut prius in hora accessionis inualescant. Accidentia uero harum febrium; eadem sunt quæ & prædictarum; excepto quod cum tremore non incipit; neque sudor in toto corpore est cum istis; nisi cum recedunt; materia enim illarum; istarum etiam est materia. Sed est in quantitate maiori; & in qualitate deterior; & plus timorosa. Eadem igitur cura istis subueniendum est & illis medicinis, tamen in harum curatione magis studiosus, & frequentius debet esse sollicitus quam in prædictis.

De Febribus commixtis quæ accidunt de quinto in quintum diem uel de sexto in sextum uel amplius.

Cap. X.

His febribus laborantes; in singulis accessionibus per unam diem ante sunt solvendi. & in die accessionis ut euomant laborandum; & præter ista regimen quod in capitulo de febre phlegmatica nominatum est circa eos observandum est; si æger fuerit crosus; & comedendi avidus; & gulosus. Si autem fuerit siccus & macer; ex eis quæ chole-ram purgant nigram; est solvendus. Et præter hoc regimen; quod in quartana dictum est circa cum observandum. Mixta uero quæ certos non observant paroxysmos fiunt aut propter apostemata quod in aliquibus membrorum sit; & præcipue in renibus; aut quia in quartanam transitura est. Differentia tamen inter eas est; quod cum prima est dolor in aliquo ex membris; aut inferius sub dorso. Aut in suis operationibus est læsio. Cum alio uero nihil horum inuenitur. Primæ quidem curatio est membrum infirmum sanare; quod fiet observando ea quæ declarauimus in locis ubi de his tractauimus. Secunda autem curabitur semel euacuando; & alia uice calorem reprimendo. Quod ideo fieri conuenit ne humores omnino integre adu- rantur.

De Febribus ex quibus accidit frigus & calor simul. Cap. XI.

Si cum febre caupon in lingua fuerit nigredo & inspiratio magna; & sitis multitudo & æstus; fueritque corporis superficies frigida erit significatio mala. Similiter quoque si extremitates & corporis superficies fuerint frigidissimæ; & fuerint propter apostema quod est in interioribus. Ego tamen non in hoc sermone de hac tamen specie loqui uolo; immo de omni febre in quocunque corporis superficie; fuerint frigida. Cum quæ æger fatigationem; & fractionem & febrem; & alices; & ositationes sentit. & pulsus est uelox; & inspiratio similiter; & calor continuus sentitur interius; nec interpolatus ex regimine febris phlegmaticæ erit regendus. Quod si in superficie corporis fuerit calor uel calor febrientis; in pulsu tamen non sit uelocitas neque inspiratione sit spissa nec magna; neque æger ex calore febri- li aliquid magnum senserit interius; immo totum calorem & incendium; & fractionem in corporis superficie senserit; fueritque hoc

cum interpolatione; sirupus acetosus; & geleniabin de zucharo ægro dentur; & ex aceto; & oleo amigdalino nutriatur; balneum quoque quotidie ingrediarur in quo parum sudet et multum ex aqua calida super eum fundatur. Quæ si suffecerint; bene erit. Et si non uenter exapozimate mirabola. erit sol- uendus; et ad regimen erit redeundum. Quod si æger horripilationem cum inflam- matione mixtam senserit; et inspirat præter hoc inspirationem calidam et passus fuerit alices; et senserit calorem prius; et ilico post frigus; aut prius frigus et post statim calo- rem; ex apozimate mirabolanorum citrino- rum; et indorum; et turbith; et zucharo est solvendus. Trocisci quoque diarodon par- ui; et trocisci de spodio quotidie pondere duorum aureorum cum sirupo acetoso; de zucharo; et succo granatorum dandi sunt. Descriptio autem trociscorum de rosis qui parui dicuntur ista est. Recipe pulueris ro- sarum rubearum drag. x. spice nardi succi li- quiritiæ amborum ana. drag. j. seminis citro- lorum; seminis endiuie; amborum ana. drag. ij. Ex his cum iulep confectis informentur trocisci; et sumantur in potu. Descriptio trociscorum de spodio. Recipe spodij. drag. x. rosarum rubearum. drag. ij. seminis ci- trolij; seminis lactuce; seminis eucurbitæ om- nium ana. drag. v. succi liquiritiæ terentia- bin amborum ana. drag. v. ex mucillagine pli- li conspergantur; & fiant ex eis trocisci; & bibantur.

De frigoribus ex quibus non calefit patiens. Cap. XII.

Cum consueat alicui tremor cum inter- polatione superuenerit neque calefit im- mo corpus ad primam redibit dispositionem post aliquot tempus; ab inchoatione sua ad dispositionem suam præter quod non sequatur ipsum febris; æger & ex eis quæ prædixi- mus in capitulo de febre phlegmatica est euacuandus; & ipsius regimen subleuandum; & omnia quæ phlegmatis sunt generatiua sunt prohibenda. Hic præterea æger pa- rum dormiat; & in hora ipsius tremoris de- ambulatione utatur. Et si egritudo diu per- seuerauerit ex medicamine de assa ad avel- lanæ magnitudinem ante horam tremoris dan- dum est; deinde pannis cooperiendus & præ- ciendum est ei; ut uehementer morctur coopertus; neque sæpe uoluatur. Quod ideo fieri conuenit ut sudet; & tremor remouea- tur. Ex oleo quoque de costo est inungend- us; & aqua calida in potu multotiens est et- tribuenda.

tribuenda: Aeger quoque coopertus deorsum & caput ex antiquo crosso panno facie super aquam calidam ponat, cuius uaporem in facie recipiat: ut sudor prouocetur, & tremor remoueatur. Vinum itidem forte & purum cum pipere in potu tribuatur, & tremor remouebitur.

De Febre syncopali qua fit ex malitia humorum & eorum acuitate.

Cap. XIII.

Quandoque febris alicui superuenit quæ secundum maiorem partem in die tercia paroxysmum facit cum qua facies ægri citot fit tornatilis, & corpus inarescit. Virtus quoque quæ in pulsu attenditur cadit post vnam aut duas accessiones. Quod si accessio amplius aduenerit: perducetur æger ad syncopim post ipsam, & fortasse morietur ex illa syncopi: hæc verò febris in corporibus semper generatur quæ sunt complexionis in ultimo calide & sicce. Cumque hoc visum fuerit: ægro succurrendum est aquam hordei in potu tribuendo cum qua aliquid granati muzzi est miscendum & dandum. Aeger quoque in loco dormiat ventoso & camisiâ induat: quæ aqua rosæ & sandalis sit infusa. Venter etiam & latera ex sandalis & aqua rosæ liniantur, & aliud paruum somat nutrimentum ex mica panis simulaginei in succo granati muzzi infusa, & fructuum ei similium. Ex pullis quoque cum succo uisæ acerbæ conditis, & cucumeribus & citrolis ac cucurbitis & fructibus frigidis in niue infrigidatis nutriatur. aquam etiam frigidam bibat. Ante vero quam accessionis sit principium: succum in potu sumat: aut aquam hordei. Quod si cum circuitus inceperit, antequam aliud detur supernenerit syncopis, quæ ægri in illa hora erit aperiendum & elaborandum ut aquam in qua pulvis tortellarum sit infusus. Aut prisanam trahat. Si autem syncopis fuerit fortissima insistendum est ut parum ex tortellis puluerizatis cum uino subtili habente aquam frigidam sue quantitatis admixtam trahat. Custodiendus est præterea ab aere calido, & balneo, & labore, & uigilijs, & ab omnibus quæ euacuare possunt. Ex aqua uero frigida est lauandus, & omnitempere nutriendus etiam si accessionis hora affuerit. Si uero febris caliditas cum inceperit, uehementissima fuerit cum siccitate, Lac de quo butyrum sit extractum cum trochiscis de camphora in potu sumat.

De febre syncopali qua ex multitudine cruditate humorum fit.

Cap. XIII.

Sæpe febris aliquem inuadit; quæ secundum maius paroxysmum ut phlegmatica facit. In qua corpus mollicatur, & facies rumere incipit. Et si corpus non fuerit nutritum sed euacuatum; superueniet ægro inde syncopis. Et si nutrimentum adhibeatur mollicies consequetur & febris fiet ualidior, & in longum pro trahetur tempus. Cuius itaque febris curationis principium est; ut crura ægri à genibus usque ad pedes cum pannis qui inter lenitatem & asperitatem sint medij fricentur donec rubete uideantur; deinde ad coxas tendendum est in quibus similiter fricatio fieri conuenit incipiendo superius, & descendendo usque ad genua; donec parum rubere incipiant, & sit fricatio in uehementia æqualis; post hoc quoque manus eorum ab ascellis usque ad uolam ad prædictorum similitudinem sunt fricandæ; deinde pectus & dorsum. Postquam omnia ad pedem ac aliorum membrorum fricationem sicut prædiximus est redeundum. Cumque huiusmodi patiens sit passus fuerit; oximel in potu sumere conuenit. Famem quoque cum habuerit, aquam hordei, & panem atque hydromel mixtum cum zuccheroumat. Cauendum quoque est ne aqua frigida detur. Tempus autem inter fricationem & somnum partiendum est: ita ut medium deputetur fricationi, & medium somno & quieti. Hæc uero ægro si cum sola prisanâ sumit non debilitatur, Aliud non est dandum nisi ipsa, & panis cum hydromelle. Si autem debilitatus fuerit cum cibis quos in febre prædiximus phlegmatica erit nutriendus, & si uenter constingatur collirium ex succo ficule & nitro supponendum est. Aegro quoque omni mane præter supradicta pondus duorum aureorum seminis apij cum sirupo acetoso est dandum. Quod modo hoc usquequo sanetur regendus erit.

De Febris qua concomitantur apostemata.

Cap. XV.

Febis quæ sequitur apostema quod accidit ex percussione; aut casu; aut horum similibus; de genere est ephimeræ. Non est enim putrida neque habet in se nocumentum neque malitiam. Quæ uero committatur apostema quod alicui membrorum incipiendo innascitur; mala est. Timoris enim magnitudo aut paruitas qui post de ea habendus est: existit secundum illud membrum. Febris quoque quæ

ipsum sequitur est secundum apostematis magnitudinem, & ipsius quantitatem. Febbris vero quæ concomitatur apostema quod sit in pāniculis cerebri est mala. Ipsa namque est febris frenetis. Cuius significationem & eorū iam prædiximus. Illius vero quæ accidit propter apostema quod in gutture & suis partibus oritur, & vocatur sinanchia iam etiam nominauimus. Febrem vero quæ sit in apostemate in instrumentis anhelitus, aut quod sit in earie quæ est inter costas & in panniculis qui ibi sunt, & in diaphragmate, & ex pleurē, & quod oritur in pāniculo qui pectus in longitudinem diuidit, & ex peripleumonia iam in prædictis demonstrauimus. Ex eo tamen quod principaliter generatur in pulmone: prouenit anhelitus maior, & spissior, & genarum rubedo. Tussis quoque cum eo accidit: cum quæ excreatio spūi spūali ad est: quam etiam iam nominauimus. Cum febre vero quæ sit propter apostema quod generatur in meri: est dolor cum scapularum grauedine qui in hora transglutendi grauior sentitur. Et febre quoque quæ propter stomachi apostema accidit prouenit dolor & inflammatio in anterioribus partibus ventris & inferioris thoracis. Vbi plerumque dolor & apostema cum est magnum sentiuntur. Sed si non est magnum dolor in loco illo ventris sentitur cum præmitur. Ad sunt etiam cum hoc apostemate sitis & appetitus casus. Similiter quoque si in aliquo intestini fuerit apostema: locus ventris in quo est tactu sentitur calidissimus. Cum quo sepe ventris constringi contingit. Cum autem contingit apostema in hepate generari sequitur febris fortissima & sensuum turbatio, & vitæ constrictio. In matrice quoque cum calidū sit apostema febris comitatur acutissima scilicet causon & sensuum perturbatio. Omnes autem febres quæ propter apostemata generantur, remouenda sunt ex curatione apostematis quod sit aut minutione uel iunctione emplastri superpositione. Et præter hoc ex curatione quam in proprijs scripsimus capitulis. Febbris enim sequitur illud apostema dum est calidum & ardens. Remouetur vero febris, aut cum calor ipsius sedatur, aut cum sanies adunatur.

De febribus quæ ex pestilentia accidunt.

Cap. XVI.

Febribus quæ ex aeris corruptione generantur non videtur in principio multā in esse acutā neque caliditas cum tangitur eger. Sunt tamen in oculis corporis partibus & in ipsius profundo magni nocumenti, & sunt deceptorie, & uehementis operationis, & sunt febres lente & repide, sed concluduntur. Cum quibus anhe-

litus & quicquid à corpore egreditur valde fœda sentiuntur. His vero febribus laborantes tribulationem magnā & sitim uehementē patiuntur: eorūq; anhelitus augmentatur & fit spissus. Et quorum corporibus cum vomitus & egestionem res fœda egreditur, & insoluit deinde incipit eis superuenire syncopis, & moriuntur. In hac igitur febre directe incidendum est aquam frigidam dando, & robore frigidus acetosis & stypticis: ut est rob quod sit ex granatis, & ex succo vitz acerbe, & ex piris, & macianis & citri acetositate. Quod si nullum istorum habeatur acetum cum aqua agris dandum est, & lac acetosum cum farina hordei, atque lac valde acetosum ex quo nutriuntur. Hac præterea laborantes passionē: aliquid comedere sunt cogendi. Plures enim ex eis nil sumere volunt. Et mitte eos in domos fridas, & regende sunt ex omnibus quæ in capitulo de hectica diximus, excepto quod balneum non sunt ingressuri; neque aquam calidam neque lac recens in potu sunt sumpturi. Domus autem in quibus moraturi sunt cum hoc quod frigida sunt, sint ventosa, & ex aqua & aceto rorentur; patientes uero herbas fridas & bene redolentes olfaciant. Troisci quoque de camphora cum rob de citris quotidie dentur, & pectoribus eorum emplastrum ex sandalis & caphora, & aqua rosata superponatur. Sint quoque eorum mansiones ex folijs salicis, & vitis, & malorum, & omnium aliarum rerum in quibus est frigiditas, & stypticitas plenas. Et ex sandalis & camphora suffraginentur, & ex aqua rosata mulctentur in die rorentur.

De febribus compositis.

Cap. XVII.

Plerumque superueniunt ægro diu aut tres febres quæ quandoque sunt ruius generis tertiana quadoque diuersorum ut cum ægro superuenit quartana cū tertiana; aut phlegmatica cū ethica; & sæpe etiam una ex eis continua, & alia interpolata, & sæpe accessuum principia vicinatur: ut in una sine hora & sæpe elongantur. Quapropter ordo periodorum ipsarū corrumpitur & accidentia commiscentur: & cognosci nemine queant nisi ab eo qui cognoscendi species simplicium peritiā adeptus est. Ideoque genus febris non solum ex interpolatione sua sciri debet, sed ex accidentibus ipsam comitantibus quæ sunt eis propria. Contingit autem duas haberi tertianas: quotidie interpolationē pati. Unde si hæc nō cognoscitur nisi ex interpolatione iudicabitur esse phlegmatica. Cui si se cūdū hoc regimen adhibitum fuerit æger interficietur. Quapropter species ex accidentibus quæ sunt

sunt ei propria cognoscenda est: & non ex circumstantiis. Sitque cura quæ huiusmodi adhibetur febri secundum accidentium fortitudinem: & debilitatem: & eorum simplicitatem: ac permixtionem. Neque attendatur interpolatio: nis ordo: cum accidentium testimonium ab interpolatione diuersum fuerit: licet. n. cum aliquis duabus infestatur tertianis quotidie à febre: ledatur: non tamè curatione quotidianæ ei subueniendum est: sed tertianæ. Adhuc etiam præter supradicta omnino nitendum est: & in curæ eius studiose: elaborandum. Si autem febris una die accadat: & alia non accidentia tamè quæ tertianæ sunt propria non sint fortia: neque pura: imo debilia: & commixta: non est medicanda cum sola tertianæ curæ: immo ipsius curatio temperanda & secundum accidentium declinationem. Vniuersaliter autem dicimus febrium compositarum curationem compositam debere esse: ex curis simplicium: & quod duarum curationum commixtio: secundum duarum febrium commixtionem fieri debet: plerunque tamen oportet nos studere ut ad vnā febrem curandam intendamus: cum ipsa fuerit magis timēda. Cuius exemplum est: quod si aliquis febrem pateretur quartanam & supernueneret ei alia febris propter apostemata in hepate: aut stomaco: aut aliquo ex mēbris in instrumentis aphelitus: dico quod in hoc loco cū hoc accideret: studiose esset attendendum ad febrem curandam quæ taliter accederet propter timorem ipsius magnum: licet in medicina aliquid contineretur quod aliam febrem faceret validiorem. Et si contingeret febrem vnā die infestare & alia non: sed accidentia huius tertianæ non apparerent pura neque fortia. neque tremor eius esset. pungitiuus neque calor cito post ipsum accensus foret: neque sitis multa: neque aestuatio: neque calor febris: neque dolor capitis: neque inanis locutio: neque sudor: sed forent omnia hæc debilia cum comparentur eis quæ in pura tertiana videri solēt. Et ponamus etiam quod præter hæc febris ista prolongaretur: donec ad xiiij. horas pertingeret: diceremus quod hæc febris non esset curanda puræ tertianæ medicatione: sed huius curatio: ex phlegmaticæ febris cura cōmiscenda foret: & deberemus dirigere intentionem nostram ad id quod phlegma atque cholera ab egro educere posset. Eiusque nutritio ac totum regimen secundum hoc essent ordinanda. Nos quidem omnes compositas febres nominare non possumus neque cuiuslibet illarum propriam subijcere curam. Oportet autem vt huius disciplinæ inspector simplicium febrium formas & earum curas optime cognoscat: & post compositarum cognitionem bene mensurare: & earum curam ex duarum simplicium curis temperare sciat.

De Variolis & Morbillo. Cap. XVIII.

Cum febris acuta & conclusa pueris præcipue: aut iuuenibus euenire cœperit: fueritque cum ea dorsi dolor & narium plurius & in somno timor ac capitis grauitas: & oculorū rubedo & in corpore sentitur punctio: sciendum est quod egro aut variolæ: aut morbillus citissime superuenient. Quapropter si antequam apparere incipiant: medicus egrum inueniat minuere eum faciat aut cum ventosis sanguis extrahatur. Minuat equidem sanguinis multitudo. Consequenter vero troscisci de spodio cum succo granati acetosi in potu tribuantur. Ager quoque non nutrietur nisi ex præsana: & hoc in mane & propè nocte fiat. Quia si ipse largiorem appetierit nutritionem: fueritque ipsius virtus debilis: alia nō dentur nisi lentes: absque corticibus cum paucō acetō conditæ. Aut sorbitiones quæ sunt ex amilo & zucharo & oleo amigdalino & epulum quod ex oleribus frigidis quæ haberi possunt præparatur. Rob quoque quod fit ex fructibus acetosis aut stipticis ad bibendum detur. Venter autem si strictus fuerit: infusiones quotidie in potu sumantur. Ex hoc enim aut omnino prohibebitur pustularum egressio aut si quid egressum fuerit: paruum erit. Si vero eger à medico non prius fuerit inuērus quā passio egredi incipiat non erit tunc minuendus neque troscisci de spodio erūt dandi: sed corpus ipsius erit bene cooperiendum: vt sudor prouocetur. Ex hoc enim leuis fiat materia ad exēdū. Si autem videatur passio dura esse ad egrediendum: & ager videatur esse vehementis nausæ: & cum multa aestuatio: & accidit ei leuitas in aliquibus horis: apozima de ficibus & vīs passis lentibus absq; corticibus & semine feniculi & fistibus de lacta in potu sumat: quod hoc modo fit. Cuius prædictorum pugillus vnus sumatur: deinde omnia in aqua coquantur: & colentur quorum apozima multotiens in die sumatur. Aqua præterea rō in qua sumac infusum fuerit: aut succus qui ex carnositate granati exprimitur: oculus inquinatizetur. Aqua et frigida cum paucō acetō mixta in potu tribuatur & gargarizemus similiter ex ea fiat. Quod ideo fieri conuenit ne in oculis: aut naribus aut gutture ex ea aliquid egrediatur. Antimonium quoque cum succo coriandri frietur & in oculis multotiens in die mittatur. Cūque tota passio egressa fuerit & matura eger super folia salicis ponendus est ad dormiendum: aut lectus eius ex rosistris est puluerizandus. Si quid autem ex prædicta ægritudine non cito siccatur quod sit magnū: & cum multo humore ex aqua salsa cum coto imbibatur. Et si fuerit hyemis tempus ligna tamarisci ante egrū sunt comburenda. Si vero æstatis tempus fuerit: ex sandalis ex folijs rosarum:

& mirri suffumigatio faciēda est. Hęc quōq; omnia cum aqua coquenda sunt : in qua eger si siccitas prędictarum tardata fuerit : mittendū est. Cunque illud quod prędiximus beneficiatus fuerit & remanserit desuper cortex sedus & habens escaras : ex oleo tepido cum coto multotiens in die inungatur. Cunque omnes cortices ceciderint, & æger ex toto sanus fuerit : sed signa quę remanserint remouenda fuerint ex eis quę in capitulo de remotione signorū prędiximus liniātur sepe. Balneo quoq; & regimine quod ad huius curā uidelicet, utatur. Quia si variolę & morbillus egrediantur modo minuto sanguine : succus duorū granatorum cum trociscis de spodio datur & ex omni regimine quod potest infrigidare regatur. Pullos pręterea non comedat nisi postquam omnes cortices : qui sunt super loca variorum remoti fuerint, febris à corpore atque om-

nis calor separatus fuerit. Sumopere etiā est cauendum : ne aliquid quod ventrem soluat egro postquam variolę aut morbillus apparere ceperit tribuatur. Quod si vëter multum solutus fuerit pīfana cum spodio & gummi arabico & bolo armeno atque rosīs sicut in capitulo de fluxu ventris prędiximus in potu tribuatur. Omnibus vero variolis ille quarum colores sunt violarū : & quę sunt paruę & durę & non maturantur : deteriores existunt. Morbillusque cuius color est vt violę color similiter est malus. Si autē variola & morbillus duritē egredi & maturari videantur : neque febris neque estuatio sedantur : neque alleuiātur & supervenerint pręter hoc syncopis & cordis tremor : eger proculdubio moriturus est. Quid si variolarū egressio velox fuerit & maturitas velox, febris quōq; atq; calor sedatur, nō erit egro timendū : quia nihil mali inde patietur.

ABIMERON AVENZOAR

D E F E B R I B V S

L I B E R.



Quod est de Febris ephimeris.

Cap. I.



DICIT feruus Auenzoar quoddā consuetudo est medicorum nō minare vnumquemque calorem exeuntē à corpore pręter naturam, febrem : sciēdo, quoddā ex febribus quędam sunt in spiritibus : & cum dico spiritus, intelligo substantiam subtilem, quę est in corde : quę quidem substantia in intellectu nō fito brevis est ad intelligendum. Sed viuimus donec ipsam habemus : & morimur, quando deus ipsam à nobis vult remouere : & quędam febres oriuntur in humoribus : & alię generantur in substantialibus membris. Et nunc incipio ab ea, quę ortum habet à spiritibus. Et dico quoddā hęc febris parte generatur a causis extrinsecis sicut à forti ira, & à superfluis vigilijs : aut ab intenso, & forti labore, & exercitio exiēs à natura vel ex cōtractione superflue morę in sole, aut ab intensa frigiditate, aut ex balneatione in quibusdam aquis stipticis, sicut in aqua uirioli, vel aluminis, & suis similibus. Ita autem procreat febrem : eo quoddā ab ipsa inflammantur spiritus cordis, & totius corporis : & inde sequitur ephimera, quę cum recedit à corpore non

redit amplius. Et hoc intelligendum est, dummodo humores temperati fuerint, & equales in corpore, in quantitate. f. & qualitate : interdum durat per tres dies : & hoc est raro. Et hęc febris dicitur ephimera. si uero humores non fuerint in corpore temperati æquales, sed exeunt ab æqualitate & temperie in quantitate, & qualitate vel substantia : tūc ad putridam leuiter poterit deriuari : vel ad aliam speciem febrium : de quibus rememoratus ero cum de putridis pertractabo. Cura autem huius ephimerę quę ab ira procedit est infirmum letificare donec remoueatir ira : & nō subtilies eius regimen multum : & dā ei bibere syrupum mitigatiuum & refręnatiuum irę : sicut est syrupus de buglossa : cuius dosis sit vnc. j. cum vnc. v. aquę rosacę & quiescat absq; excitatione aliqua : & uideas urinam eius. Quia si signa laudabilia in ipsa apparuerit attestantia sanitati : scias quoddā liberabitur ab ipsa : ita quoddā non redibit : & signum certissimum huius est hypostasis alba pīcata & lenis, & equalis : ita quę in motu uasis cito ascendit sursum : & cito redit inferius ad suam debitam dispositionem : & in isto signo nūquam cognoſci errorem temporibus uitę meę : quare cum vides hoc certissime scias quę non redibit. Et si cum tali hypostasi vrina fuerit in colore & in substantia similis vrinę sanorum, adhuc certior esse poteris quę non redibit.

bit. In illa etiam quæ fit ex cogitationibus & vigilijs seruabis prædictum regimen præter quod in illa quæ fit ex vigilijs debes infirmum sollicitare, ut dormiat diu: & confert odorare flores nenupharis, & ungere nares eius cum oleo seminum cucurbitarum uel cucumeris: & potus eius sit syrupus violaceus, uel de buglossa: quoniam conferunt: & cum videris signa laudabilia cibabis eum pullis vel carne hœdi lactâtis. Et hæc cura sufficit in illa quæ fit ex ira & solitudinibus & cogitationibus & vigilijs. Ephimera autem quæ fit ex fatigatione & labore indiget maiori cura: quoniam oportet ut ponas eum in tinâ plena dulcis aquæ tepidæ: ita quod balneetur corpus totum præter caput: & fricetur corpus eius totum in exitu cum interioribus melonum, uel pulpis ipsorum quando sunt bene maturi: & si non reperiantur melones recipiantur semina eorum & pistentur optime: & cum ipsis fricetur corpus perfecte ut exeant vapores fumosi qui resoluuntur uel resoluti sunt à caliditate febrili: & postquam videris signum certissimum quod tibi iam nominavi, habere debes pro constanti quod non redibit febris amplius: & potus istorum sit sicut potus prædictorum. Et ille etiam qui incurrit ephimeram ex contractione moræ in sole balneatur similiter, & regatur regimine dicto: quod si causa solis habuerit dolorem capitis intensum: infunde caput eius oleo rosaceo aromatizato si tempus, & ætas, & regio, & complexio consenserint: & infunde sic. conquassetur cum isto oleo tantundem aquæ dulcis: & distilla eam ab alto per cannulam, uel cum aliquo uase habente orificiû strictum: faciêdo quod infirmus sit sedens & taliter super caput distilletur ut spargatur pertotum: & in camera ipsius sperge: & suspende folia cannarum seu arûdinum & vitis, & myrtelle: roscando optime domum cum aqua, & hoc etiam confert prædictis ephimeris: & cõsidera yrinam: quod si videris in ipsa hypostasim residentem in fundo albam & subtilem & regulatam in omnibus sicut dixi: scias pro certo quod non redibit febris. Sed ille qui cã frigoris patitur ephimeram est balneandus in aqua dulci similiter frigando eum cum semine melonis: & detur ei omni mane de syrupo squinzabin. vnc. j. cum. vnc. iiii. aquæ calidæ: & cibetur pullis si videris quod in vrina sit hypostasis alba residens in fundo & continua atque lenis & cæteris bonis dispoñibus regulata. Sed illi, qui patitur eam causa balneationis in aquis stipticis aperiantur pori ipsius: & hoc ponendo in eum balneo dulcis aquæ tepidæ frigando eum cum melonibus uel cum seminibus ipsorum. Et si videris signum laudabile prænominatû in vrina: cibabis eum pullis elixis in raspea cum modico aceti. Si vero cum ista febre non apparuerit in vrina dicta hypostasis laudabilis: sciat proculdubio quod redibit febris & transibit ista fe-

bris ad aliam speciem febris: & hoc secundum est quod corpus fuerit dispositum & preparatum: quod si hypostasis non residet in fundo: sed est pendens & nigra vel tendit ad rubedinem, innue ei dietam subtilem prohibendo pullos omnino: & rege eum cum pulibus farinæ ordeï: & cum pane abluto quamuis antiqui non habuerint istam pro subtili dietam: immo secundum ipsos subtilis dieta erit nihil dare. Et temperata apud ipsos erat dare mellicratum tantum: sed pro certo dico quod omnes præter Hippocratem: tunc temporis erant idiotæ & medicinam penitus ignorantes, sed illud non tamen eis inferebat nocumētum causa consuetudinis. Sed ille qui non est assuetus caueat ne faciat istud regimen.

Quod est de febre cholericâ, seu tertiana. Cap. II.

Et iam feci scire quod hæc febris leuiter couertitur ad putridam: quod si complexio patientis fuerit simpliciter cholericâ febris erit de genere cholericæ quæ putrescit in uenis vel extra uenas. Si autem fuerit in uenis erit tertiana continua quæ fit absque rigore & typo aliquo. Et si extra uenas extiterit: erit simpliciter tertiana: quæ quamuis magnam habeat alleviationem: tamen ex toto non depuratur perfecte: & cum redit paroxysmus mouetur cum acuitate maxima & furore ualido, atque forti: & pro maiori parte non accidit hæc febris nisi iuuenibus & habentibus complexionem calidam & sic. & in æstate: & eius paroxysmus durat a vi. horis usque ad xij. & permanet tandiu dicta febris quousque materia seu humor à natura digeratur: & postea expellatur ab ipsa: & scias quod in ista ægritudine non erit salus perfecta: nisi prius in die indicatiua signa digestionis apparuerint sicut in vrina apparet hypostasis alba tali modo. videlicet. quod in aliqua die laudabili primo appareat hypostasis pendens in medio vasis, tendens ad rubedinem: & in alia die indicatiua sit dealbata, & in fundo: & cum sic fuerit. scilicet. quod primo in aliquo die indicatiuo incipit hypostasis in medio apparere cum aliqua rubedine: cum ante nullatenus uisa fuisset, & postea in sequenti die cretico vel indicatiuo in fundo reperitur esse cum albedine, certum est atque firmum signum liberationis omnino: cognoscendo quod dicti dies iudicatiui uel cretici non sunt neque sunt in omnibus diebusque qualiter: sed sunt secundum ordinem atque decursum secundum quem deus sublimis uoluit eos ordinare. & ego de eis rememoratus ero cum adiutorio Dei.

Quod est de febre quotidiana phlegmaticâ.

Cap. III.

Et potest etiam esse quod dicta febris ephimera couertatur ad phlegmaticam secundum preparationem

tionem corporis & suæ complexionis & dispositionis; & hæc febris habet paroxysmum in oī die. & eius putredo est ex phlegmate quare longior existit ualde quā tertiana, & eius paroxysmi si m iliter longiores existunt quā ipsius tertianæ, & propter humiditatem huius phleg. citius, & facilius recipit putredinem. vnde paroxysmi sunt in omni die, & patiens modicam percipit alienationem vel requiem inter unum paroxysmum & alium. Consulo ergo vt medicus sit studiosus in dirigendo hunc humorē. sin subtilian do ipsum & incidendo & diuidendo, & hoc cum syrupo squinzabin composito dādo ei omni die de ipso vnc.ij. cum ista decoctione. Rec. radicis lilii, & radicis sceni. ana pondus vnus denarij: semina melonis & folij polii montani. ana. partes tres denarij vnus; centaureæ minoris quarta pars aure. j. liquiri. mundatæ ad pondus omnium: cōquassentur quæ sunt conquassanda & ponantur ad ignem cum vnc. x. aquæ, & bulliant lento igne vsque ad consumptionem tertiar partis, & colentur & cum ista decoct. distempera prædictum syrupum, & propina ei omni mane in ieiunio; cum autem syrupus descenderit de stomacho cibæum pullo decocto cum aceto, & cū pane bene fermentato. & conuenit cuilibet medico vt faciat scire patienti q̄ hæc febris est longa ita q̄ durata. xxj. die vsque ad. xl. & potest peruenire vsque ad. lx. & hoc totum prouenit secundum grossitudinē & viscositatem humoris. Et scias, q̄ hæc febris multotiens perducit ad hydropisum: quare difficilis curationis atq; grauius existit, & infirmus remanet in periculo grauissimo atque forti.

Quod est de sanguinea febre. Cap. llll.

ET possibile est q̄ supradicta ephimera conuertatur ad febrem sanguineam: cuius tres sunt species; quia aut incipit à principio sui ascendere, & non cessat sic ascendere usque ad finem, seu usque ad creticam sui determinationem, & alia e contrario, quæ incipit à summo & semper proeedit descendendo vsq; ad creticam sui determinationem. & tertia est quæ permanet in uno tenore seu statu usque ad finem. & hæc febris continue & semper affligit usquequo infirmus moritur cum ipsa uel liberatur, & pro maiori parte non accidit hæc febris nisi iuuenibus. Cura huius est flebotomia subtrahendo de sanguine usque ad syncopim: cum sciueris pro certo q̄ febris sit ex sanguine: quoniam si sic certissime fuerit liberabis in una die vel in una hora: aut ante ligationem brachij; cum hac conditio ne q̄ patiens sit euacuatus à cholera ante phlebotomiam duas uel tres fellas.

Quod est de melancholica febre.

Cap. V.

T potest etiam esse q̄ ephimera conuertatur ad melancholicam febrem, & efficitur quarta; quæ est grauioris & difficilioris ac tardioris digestionis quā quotidiana phlegma. sed ista nō est ita deceptibilis & maliciosa sicut quotidiana; quamuis sicut diximus sit longioris & difficilioris digestionis ipsa quotidiana & pro maiori parte non curatur nisi in æstate, & paroxysmi ipsius sunt de quarto in quartum diem, & duobus diebus est inquiete, & paroxysmi huius prolongantur diutius quā paroxysmi phlegmaticæ, & hæc febris naturaliter multum prolongatur; quoniam pluries uidi eam incipere in æstate, & non dimittere vsque ad aliam æstatem, & quandoque prolongatur usque ad duos annos, & interdum plus. & hæc pro maiori parte non accidit nisi senibus, & illis qui utuntur carnes grossas ualde & caseum salitum atque vetus; & qui utuntur comedere carnes arietum magnorum, & hircorum & castratorum, & etiam qui assuescunt comedere pisces magnos & ueteres ualde, & carnes salitas quoruncumque generum sint, & oliuas, & melongenæ. Et in summa dico q̄ hæc febris accidit illis in quibus melancholia prædominatur, siue à complexione sua radicali, aut à cibis malis generantibus illum humorem, & cum incipit paroxysmus huius uidetur infirmo q̄ grandis cadat super dorsum eius, & incipit cum tusu, & cum recedit paroxysmus remanet mundus omnino longe plus quā in quotidiana; quia in quotidiana non deporatur patiens perfecte nisi post uniuersalem liberationem; & hucusque rememoratus sum, & rememoratus ero de istis simplicibus febribus particulariter, ut per simplices intelligas compositas, cognoscendo tum q̄ pro maiori parte vix reperiuntur febres ex humore uno simplici; ita q̄ possis dicere q̄ ex pura cholera fiat febris; cū sit calida & sicca ualde, & subtilis substantiæ, q̄ si occidit hoc est in minori parte, sed denominatio sit à maiori; ita q̄ quando cholera dominatur in aliqua febre, dicitur cholerica; quæ cum putrescit intra uenas facit febrem absque rigore; sed cum æstuatione & calore ualido atq; forti, & cum multa siti. Cum autem putrescit extra uenas sit cum rigore forti, & sudat infirmus in declinatione, & remanet quietus; & duæ hæc febres si tertiana continua uel interpolata cretiscant pro maiori parte à. xiiij. die vsque ad xvj. diem; nisi error superuenerit ab infirmo uel ab alijs. Sciendo tamen q̄ secundum mixtionem cholera remittuntur accidentia, & prolongatur febris plus uel minus.

Quod est de febre que fit ex cholera vitellina praslina aut aruginosa. Cap. VI.

ET potest etiam fieri febris ex cholera que in Eulima caliditate & siccitate existit cum substatia spissa atque grossa; sicut est cholera vitellina & praslina & eruginosa. Et potest esse quod hec cholera sit admixta phleg. sed denominatur cholericæ à dominio; & secundum quod elongatur à simplicitate & puritate cholere; secundum illud prolongantur paroxysmi; & acedentia sunt quietiora; & ista febris tertiana quando fit ex cholera vitellina quæ est mixta phleg. facit paroxysmos longiores quam quæ fit ex simplici cholera atque pura.

Quod est de cura febris tertiana non pura que fit ex cholera mixta phlegmati. Cap. VII.

CVra huius est potare infirmum cum rebus temperate frigidis & absteruis, & his quæ habent prouocare urinam & sudorem; sicut sunt ista. Rec. semina melonis & cucumeris, & florum camomillæ. an. aur. x. seminis, & lini, & fenu greci, & orobi. an. aur. iij. squinati, sparagi, spicæ nardi, masticis, & seminis feniculi. an. aur. x. conuassentur quæ sunt conuassanda & ponantur in duabus lib. aquæ dulcis, & bulliant vsque ad consumptionem medietatis, & colentur in hac colatura ponantur lib. ij. zuccari, & lib. ij. mellis, & lib. j. aceti, & bulliant internam simul vsque ad spissitudinem syrupi, & de isto dentur infirmo omni mane. huc. ij. cusa. y. uac. aquæ, & ciba cum pullis paruis decoctis in agresto vel cū aceto. Sed febris illa quæ fit ex cholera praslina vel eruginosa est fraudulenta & deceptibilis multum, & eius accidentia sunt difficillima & perniciosiora atque fraudulentiora, valde accidentibus predictis quæ sunt in illa; quæ fit ex cholera vitellina, & pro maiori parte non euadunt infirmi ab ipsis quin moriantur; & qui euadunt liberantur cum difficultate, & post longum tempus. Et cum in adit paroxysmus huius febris angustatur patiens multum, & habet inquietudinem magnam cum sit valida atque forti, & habet alienationes varias atque magnas, & iactat se per legam huc & illuc, cum instantia vigilarum, & pulsus patiens in febre est durus parvus atque diuersus, & pro maiori parte finis huius est malus, & in maiori parte liberantur, & qui euadunt cū difficultate euadunt & post longum tempus. Et accidentia quæ superueniunt in hac febre sunt pessima & fraudulenta, atque deceptoris, quia urina talium est pertinens ad viriditatem vel nigredinem, & hypostasis etiam eius est talis, & cum pendet hypostasis talis in medio, moritur patiens in huius, & quando est in fundo, adhuc citius. Quod si in die critica incipiat apparere urina ni-

gra absque hypostasi; est signum fortitudinis virtutis expulsiue, quare bonum est; & signum salutis. Sed hypostasis nigra est mala quia significat lassitudinem virtutis in digerendo hunc humorem; eo quod quando natura est fortis & boni esse; conuertit hypostasim ad albedinem; & cum deficit natura; color hypostasis fit niger & moritur patiens velociter; si fuerit dicta hypostasis in fundo natis, & si fuerit pendens in medio tardatur mors. Et est elongatio necis secundum elongationem ipsius hypostasis à fondo.

Quod est de febribus compositis. Cap. VIII.

SCias quod diuersitas febrium compositarum est secundum diuersitatem humorum qui adinuicem componuntur; & accidentia etiam ipsarum diuersificantur secundum varietatem dictarum commixtionum; & medicus qui perfecte cognoscit simplices, ex ipsis sciet & cognoscet compositas.

Quod est de signis febris tertiane. Cap. IX.

Febbris aut tertianæ signa sunt; calor est uosus & fortis & sitis intensa cū instantia vigilarum & uigilationes, quæ cū est intra uasa; est continua & absque rigore. Sed cum est extra uasa, fit cū fortis rigore, & hoc ideo quia cholera spargitur exterius ad membra sensibilia, & mordicat ea; & accidit ei sicut illi cui spargitur subito aqua calida super eam qui contrahitur & patitur rigorem; & sicut accidit vulnerato quando percussitur super idē vulnus, & paroxysmi istius sunt breues & inuadunt de tertio in tertium.

Quod est de signis febris sanguineæ. Cap. X.

Modus nero sanguineæ febris est, quia cōtra naturam affigitur, & patitur sitis & vigilias; & habet perturbationem mentis. Sed vapor qui procedit ab hac febre non est tantum mordax sicut ille qui exit à tertiana.

Quod est de signis febris quotidianæ. Cap. XI.

Signa autem quotidianæ sunt; quia & absque rigore; sed habet frigus & specialiter extrema infrigidantur ualde, & habet alices & oscitationes, & lachrymantur oculi eorum, & interdum patiuntur syncopim propter reuocationem & constrictionem caloris naturalis ad interiora corporis. Et paroxysmi huius sunt longiores predictis febribus; & corrumpitur seu destruitur appetitus stomachi eorum, & sunt absque forti sitis, & pulsus non est durus neque multum diuersus uel variabilis, neque tantæ velocitatis sicut pulsus cholericæ, & urina eorum est spissa, &

non depuratur perfecte inter unum paroxysmum & alium.

Quod est de signis febris quartana. Cap. XII.

Signa autem quartanae sunt haec scilicet frigus magnus cum oripilatione, & uidetur patiens quod grando cadat super eum undique, & paroxysmi istius sunt longiores quam quotidianae; sed depurantur perfecte magis quam quotidiana, & omnes isti humores diversificantur & uariantur & secundum diuersitatem suarum specierum; eo quia plures sunt species cholerae, & plures similiter sunt species phlegmatis, & melancholiz et sanguinis. Et non rememoratus sum haec nisi signa simplicium febrium in quibus nulla est admixtio alterius humoris; quam quis uix reperiantur omnino simplices atque pure sine aliqua admixtione in rei ueritate, sed intellectu solo apprehenduntur. Cum autem perfecte cognoueris simplices febres & signa earum; ex ipsis habebis notitiam compositarum & suorum accidentium. Et iam superius commemoravi & sufficienter declarauimus curam uniuscuiusque humoris. Cum autem uidebis febrem compositam ex duobus humoribus; compone medicinam secundum illam commixtionem: agendo plus contra humorem praedominantem. Et cum sic feceris habebis consuetudinem inde, & erit tibi leue curare has febres & agnitionem.

Quod est de febre haetica & signis & cura eius. Cap. XIII.

Et est adhuc alia spes quae dicitur haetica, & haec pro maiori parte non accidit nisi post alias febres chronicas quae debilitant corpora & excant humiditates, & inde corpus acquirit siccitatem & caliditatem, & ista febris proprie fit in radicalibus membris, & pro maiori parte fit post ephemeram, & hoc quando corpus praeparatum est ipsam recipere & maxime cor. Et haec febris permanet, & generatur in radicalibus membris propter siccitatem eorum; sicut ignis permanet & reseruatur in rebus siccis multum, quoniam uidemus quod lapis calcis quando tangitur semper frigidus, & cum tangitur ab aqua incenditur, & ardescit ardore valido atque forti: ita quod manifestissime percipitur & sentitur. Et sic est de illo qui patitur hanc febrem; quia cum tangitur corpus eius sentitur esse calidum non forti calore, & cum cibatur siue illa cibaria sint calida seu frigida; post duas horas uel tres inflammatur corpus eius totum, & anhelitus eius fit frequens & magnus, & pulsus eorum est durus & tensus; & remanet in hac dispositione usque ad complementum tertiae digestionis; & postea

paulatine diminuitur dicta inflammatio atque calor. Et haec febris in principio sui leuis est ad curandum. Et cura eius est ponere infirmum in balneo dulcis aquae tepidae pluries in die. Et da ei quolibet mane in diluculo de lacte caprae recentem mulctum: & sit capra parua quae generet multum lac, & moretur capra prope lectum patientis, ita ut incontinenti post mulctionem ipsum recipiat ne corrumpatur ab aere, & mala inde fiat digestio. Et istud fieri debet tam in calido aere quam in frigido, eo quod lac uelociter corrumpitur & alteratur, & enim est corruptum non facit laudabile nutrimentum. Et incipiat bibere de isto ab unc. j. & gradatim ascendat usque ad lib. v. quia, si inciperes dare quantitatem magnam in principio coagularetur in stomaco, & inde mala & corrupta fieret digestio, & quod hoc habet remouere est, ut ponatur aliquid mellis dispumati in fundo uasis, & super illud murgatur lac, & misceatur simul & propinetur infirmo secundum mensuram & ordinem praedictum & post potum lactis non comedat aliquid omnino donec digeratur. Facta autem digestionem si uis iterum dare sibi de lacte ad comedendum da, & si non est assuetus ciba cum pane frumenti bene fermentati; & carnibus assuetis, tamen omni mane da ei lac secundum ordinem dictum, & carnes eius sint gallinae elixae & praeparatae in rasphrea. Et omni hora quando stomachus est uacuus a cibis pone eum in tina aquae dulcis tepidae, & post exitum cibabis eum, & sic remouebitur febris cum adiutorio Dei. Et scias quod haetica habet tres gradus, primus est facilis curationis, eo quod nondum finita est humiditas in radicalibus membris. Gradus autem secundus est quando calor profundatus est in humiditate rorida, quae imbibita est in radicalibus membris, & hoc etiam bene curatur, si perfecte regitur. Et gradus tertius est, quando calor profundatus est in ipsis radicalibus membris, & hoc postquam humiditas eorum ex toto est consumpta atque finita, & hoc ex toto est impossibile ad curandum. Sciendo similiter quod quilibet ex istis gradibus habet alios gradus ita quod aliqui sunt qui citissime curantur, & quibusdam eorum prolongatur sanitas plus uel minus, & sic etiam aliqui cito moriuntur, & quibusdam eorum mors dilatur & prolongatur. Testiculi autem gallorum qui impinguati sunt ex lacte sunt optimi in hac passione, & etiam qui non sunt impinguati ex ipso sunt satis boni. Potest autem esse quod haec febris haetica coniugatur alteri febri, cuius cognitio est difficilis ualde nisi illi qui assuetus est ualde & longo tempore experientatus, quoniam possibile est quod haetica coniugatur febribus cholericis & phlegmaticis & sanguineis, & etiam melancholicis. Et si quis quae erit dicere quomodo hoc esse potest: quod haetica

cum sit calida & sicca iungatur febribus sanguineis & phlegmaticis quæ sunt humidæ. Respon. quod ex membris quædam sunt siccæ complexionis, & quædam humidæ, & aliqua frigida & aliqua calida, & etiam in uno singulari membro quamvis sit calida & sicca complexionis est possibile, quod in eodem commoretur humior frigidus & humidus, sicut apparet, & manifestè reperitur in stomaco & in vulua: quia cum sint in aliquibus calida & sicca complexionis coadunatur in ipsis phlegma, quod est frigidum & humidum, & potest similiter esse econtrario. scilicet quod aliqua membrum sit frigida & humida complexionis, & in ipsis reperitur cholera quæ est calida, & sicca complexionis. Et ex febribus sicut dixi quædam sunt quæ sunt in spiritibus quæ dicuntur ephimeræ, & quædam putridæ, quarum species sunt quatuor. scilicet quod aliquæ sunt ex cholera, & aliquæ ex phlegmatæ, quædam ex sanguine, & aliæ ex melancholia. Et componuntur etiam hæc febres interdum adinuicem diuersis compositionibus. uidelicet. quod cholericæ potest componi cum sanguinea & cum melancholica, & aliquando cum phlegmatica. & est possibile quod compositio fiat ex uno eodem humore. scilicet quod cholera fiat & sit putrefacta intra uenas & extra, & sic erit continua & interpolata ex eodem humore. & potest esse quod cholera sit putrefacta intra uenas & phlegma extra uel econtrario. & possibile est quod in omnibus istis compositionibus paroxysmi iungantur simul, vel incipiant simul: quare accidentia sunt confusa & mista adinuicem: unde sunt difficilis cognitionis ualde, & non potest haberi ista cognitio absque studio & labore uehementi cum magna præuisione, quoniam graue est & difficilis res ualde cognoscere compositionem interpolatæ cum interpolata, & compositio nem continuæ cum interpolata, & etiam quando sunt ex diuersis humoribus & componitur interpolata cum interpolata, uel interpolata cum continua, & propter hoc ad cognoscendum ista indigemus studio magno cum præuisione & sollicitudine uehementi. & hac de causa non possunt perfecte scribi in libro, & est possibile etiam ut componantur duæ febres ex uno humore, ita quod interpolata erit multæ putredinis extra uasa, & continua pauca putredinis intra uasa, & aliquando reperitur quod ambæ sunt magnæ ualde, uel econtrario. scilicet quod ambæ sunt paruæ multum, & commisceantur paroxysmi adinuicem, ita quod unus subintrat alteri, & commisceantur simul accidentia, & erunt hæc febres, aut omnes magnæ uel omnes paruæ, uel aliquæ magnæ & aliæ paruæ. Et cum dico magnam uel paruam, intellige per magnam multam quantitatem putredinis, & per paruam modicam quantitatem eiusdem. Et est possibile quod

cholera quæ est materia febris sit grossa substantia & phlegma, subtilis substantiæ, uel quod melancholia sit subtilis substantiæ & sanguis grossa. Ergo considerandi sunt paroxysmi & eorum cursus, & considera iterum quomodo componuntur in interpolatæ cum continuis unius speciei uel diuersarum specierum, & quomodo componuntur magna cum paruis, uel econtrario interpolatæ & continuæ, & cogita similiter quod una febris potest componi cum duabus uel cum pluribus. Et est possibile iterum quod aliquis humor putrescit extra uasa, & cum hoc habebit pleuresim ac peripneumoniam, aut apostema in diaphragmate quare paroxysmi adinuicem componuntur, & unus alteri subintrat, & propter hoc cognoscere ista difficile est ualde, nisi illis qui multum assuescent in his. Sed illi qui non sunt assueti & per longum tempus approbati nunquam ad istam cognitionem poterunt peruenire: Quia de causa medici multum reperiuntur errare in his. Ergo medicus primò studere debet diligenter in cognoscendo febres simplices. Et postea attendere debet solcite si una ex compositionibus est eum aliqua ipsarum febrium uel plures ex compositionibus. Quod si sic studiose & attentè studuerit leuiter ad cognitionem dictarum compositionum poterit peruenire, & quanto febris fuerit simplicior tanto dies indicatiua & critica erit facilius cognitionis, & quanto fuerit magis mista tanto dies indicatiua & critica erunt magis confusi & difficilius cognitionis. Et ego intendo nunc remembarare de diebus indicatiuis & criticis postquam dixero hunc sermonem super febres. Esto certus quod multæ febres sunt propter debilitatem uirtutis & stulticiam medici, & hoc quando medici consentiunt eis comedere plura cibaria quam uirtus eorum sufficiens sit coquere & digerere, & hac de causa sunt febres; quare necesse est ut propinentur eis cibaria ad pondus donec febris ex toto remoueatur: nec post recessum febris incontinenti debes addere in cibis: sed expectare debes usquequo transcant. v. dies & tunc addere debes pondus aure. de cibis, & sic gradatim ascendere debes donec fuerit recuperatus, & si sic non feceris recidiuabit egritudo. cognoscendo quod omnes species carniū febricitantibus citissime conuertuntur ad putredinem. Et est impossibile quod post crisin aliquid putredinis non remaneat in aliqua parte alicuius membri quæ potest uigorari & augeri ex regimine malo uel inconuenienti. Et si regitur sicut debet ordinate: natura confortabitur & uigorabitur donec ipsam consumet, & perfectissime expellet. Completus est tractatus de febribus cum laude Dei; secundum quod mihi sufficiens esse uidetur.



Quod est de signis Febris ephimeræ.

Cap. I.



N C I P I E M V S

à mala cōplexione vniuersaliter totum corpus ambiente quæ febris nuncupatur & incipiemus à febre dici. Et dicimus, quod ipsam semper præcedit aliqua ex extrinsecis causis efficientibus: excepto quod hæc in ipsa non est ex signis propriis, quod est, quia cum feb. dici semper hoc inuenitur. Sed non conuertitur, ut semper talibus causis stantibus necessario febris addit. Et propterea instandū est ut signa propria cognoscamus & etiā communia ad credulitatem fortificandam adducamus, & etiam quia valent ad contrarium remouendum. Et huius febris signa propria sunt duo. Vnum est quod pulsus in hac febre varius non est, quod est quia varietas non fit in putridis febribus; nisi propter humorum multitudinem aut malitiam. Secundum est quod vrina suum naturale sedimen non mutat, quia in hac feb. vrina non mutat nisi colorē, & hypostasis non egreditur à solito, nisi propter humorum putredinē. Et ob hoc necesse est ut in hac febre hypostasis à solito non mutetur, & ex significationibus aliquando erit ut in hac febre accidentia fortia non sint, & est lenis calor non inflammātis & ut plurimum semel accidit vel forte ter aduenire potest, & dicitur quod quando patiens intrat balneum & horripilationem non sentit quod tunc est ephimera. Et hæc sufficiunt significationes in febre dici.

propter quod hæc in ipsa non est ex signis propriis, quod est, quia cum feb. dici semper hoc inuenitur. Sed non conuertitur, ut semper talibus causis stantibus necessario febris addit. Et propterea instandū est ut signa propria cognoscamus & etiā communia ad credulitatem fortificandam adducamus, & etiam quia valent ad contrarium remouendum. Et huius febris signa propria sunt duo. Vnum est quod pulsus in hac febre varius non est, quod est quia varietas non fit in putridis febribus; nisi propter humorum multitudinem aut malitiam. Secundum est quod vrina suum naturale sedimen non mutat, quia in hac feb. vrina non mutat nisi colorē, & hypostasis non egreditur à solito, nisi propter humorum putredinē. Et ob hoc necesse est ut in hac febre hypostasis à solito non mutetur, & ex significationibus aliquando erit ut in hac febre accidentia fortia non sint, & est lenis calor non inflammātis & ut plurimum semel accidit vel forte ter aduenire potest, & dicitur quod quando patiens intrat balneum & horripilationem non sentit quod tunc est ephimera. Et hæc sufficiunt significationes in febre dici.

Quod est de febribus putridis & de earum signis.

Cap. II.

ET dicamus de putridis: harum febrium vniuersaliter duæ sunt species; vna in omnibus uenis fit, & alia fit in humoribus digestionis membrorum. Et differentia quæ est in his duabus speciebus talis existit, quod est, quia febris quæ fit ex materia existente intra uenas; interpolationem non habet neque typum: quamuis paroxysmus aliquādo plus fortificetur alijs diei temporibus: Sed febres quarum materia est extra uenas ha-

bent interpolationem circuitus & typos. Et causa propter quā habent circuitus est, quia humor qui putrescere debet non putrescit simul & semel, quod est. quia in eo præparatio putrefactionis non est cōpleta, sed paulatine in putrefactione procedit, & hic sequitur modus ordinationis, quod est. quia hæc operatio secundum aliquem modum est naturalis, quod est, quia natura in hoc regimen habet, eo quod est putrefactio cum digestionē, & propterea varietas ordinationis in circuitibus signū est malum, & non est hæc operatio attribuenda calori putredinali simpliciter, sed calori naturali, eo quod in materia non naturali operatur sicut in multis uisnaturæ reperitur. Et rationes Galeni quibus conatur attribueri ordinem circuituum substantialiter calori putredinali hic infranguntur, & nostras radices naturales non sequuntur quæ super philosophiam & metaphysicam inscribuntur, & qui illas non intelligit hoc non constabitur. Et propterea mea sententia penitus est quod natura istos circuitus cum calore intrinseco operatur, quamuis superuenerit huic calori aliquid extra naturam in quantitate aut qualitate, in eo quod est agens in materia non naturali, uidelicet in humore ægritudinem faciente. Et accidens quod cum humore aduenit est simile in hoc accidenti quod ei aduenit cum cibo, quod est. quia incontinenti sumpto cibo infrigidamur. Et non est inter hæc duo differentia nisi quod accidens quod aduenit propter cibum est naturale: quia cibus est naturalis: sed quod aduenit cum humore est præter naturam: quia calor cum materie primo obuiat sepelitur, & postmodum assumit victoriam super ipsam, & augmentando ad suum reuertitur esse quando ipsius digestio fuerit perfecta. Et iam bene exposuimus omnia in tractatu quæ fecimus super libro de febribus Gal. Et ille ordinationes circuituum diuersificantur secundum naturam humorum, & quantitatē facientis febrem secundum quod infra dicemus. Et causa quare febres quæ sunt intra uenas interpolationem non habent: est quia quando in partem humoris putridi calor accenditur non potest ipsum natura dissoluere: donec alia particula accedatur. & hoc propter solidationem uasorum contingit & propter eandem causam etiam typus non fit.

& etiam quia illud quod ex eo dissoluitur à mèbris sensibilibus non sentitur. Sed putrefactio quæ in humore fit qui extra uenas est: huius contraria existit propter euaporationem quæ per porositate membrorum fit, & propterea sunt in istis circuitibus typi propter sparsionem humoris punitiui super membra sensibilia aut humoris uentosi: propterea quia typus magis appropriandus est humori mobili uentoso quam fixo. Et signa propria februm putridarum sunt duo. unum est quod urina in principio hypostasin non habet: propterea quia calor est impeditus propter humoris digestionem, aliud est quia pulsus est uariis & diuersus. Item alia sunt signa istarum februm à signis significatibus duas species repletionis: hoc est secundum uasa & secundum uirtutem. Ista sunt propria signa uniuersalitatis februm putridarum.

Quod est de signis febris cholericæ.

Cap. III.

Sed signa propria unicuique febr. sunt hæc. Scias quod signa febr. quæ fit ab humore extra uenas, & in febre cholericæ sunt typus fortis punitiuus. Et pulsus in principio istius febr. est par uisus & debilis, & hoc est propter humorem qui calorem obruit naturalem, & propterea refrigeratur corpus in principio paroxysmorum: ex eo quod calor naturalis ab humore opprimitur putrido. Et quando calor extraneus generatus in humore putrido calori naturali admiscetur, tunc crescit & per totum corpus augmentatur, & propter hoc pulsus in eodem statu non permanet: sed propter caloris clementiam crescit & fortificatur. Et urina in hac fe. pro maiori parte est ignea, & patiens penitus affligitur siti, & alio quando his iungitur amaritudo oris. Et dicitur quod quando hæc febr. dicitur pura quod ipsius paroxysmi ad plus usque ad duodecim horas prolongantur, & circuitus huius febris est tertianus, sed tamen non conuertitur, quia non est necessarium quod omnes febres quæ habent circuitum hunc sint de cholera. Sed possibile est ut sint duæ quartanæ aut duæ quintanæ, & hoc non accidit nisi in principio egritudinum. Ista sunt signa propria huius febr. & aliquando significationes istæ rebus communibus fortificantur. hoc est quia complexio, ætas, & aliud regimen huic humori comparantur. Et ætas cum hoc humore comparisonem habet modis duobus, unum est secundum suum tempus naturale, ut est ætas quæ est calida & sicca, alius est quando egreditur suum cursum naturalem ad caliditatem & siccitatem, quamuis tempus per sui naturam debeat esse frigidum: Sed febres quæ paroxysmos non habent istis communicant

exceptis circuitibus & typo. Et in hoc genere ingreditur febris quæ causon nuncupatur cuius materia intra uenas est, & maxime circa os stomachi, & hepar posita est, propterea in hac fe. non est rigor. Et sitis fortis huius febr. proprium signum est. Et peior specierum causonis est illa quæ fit à cholera zinaria aut prasinæ. Et illius paroxysmus longus est propter inobedientiam humoris illius ad digestionem recipiendam.

Quod est de signis febris phlegmaticæ.

Cap. IIII.

Accidentia magis propria huius febris sunt, quia in principio extrema in frigidantur & est tempus frigoris longum, sed paulatim inualefcit. Et quando incipit calor apparere redit frigus & fortificatur super eum. Et tempus paroxysmi istius febr. xviij. occupat horas, & calor istius febris non est mordacius nec furiosus, & propterea prinitus tactui non manifestatur. Et huius febris pulsus rarior & minor est pulsu febris tertianæ in quolibet. iij. suorum temporum. Et urina in hac febre est subtilis & alba, aut spissa & obscura, & si calor putredinalis est fortis, & phlegma purum non est, tunc possibile est ut urina sit rubea, & palpebræ patientis tumidæ erunt. Et in pluribus horum patientium os stomachi est frigidum. & si uomitus eueniet phlegmaticum uomcat. Et aduentus ipsius paroxysmi omni die signum proprium non est, quia duæ tertianæ hunc eundem faciunt paroxysmum. Paroxysmus longus est propter ipsius humoris tarditatem, & paroxysmi ipsius plus continuantur quam cholera paroxysmi, quia iste humor putrefactioni magis est appropriatus. Et adhuc propter longitudinem paroxysmi aduenit humori non corrupto preparatio putrefactionis propter longam moram caloris extranei in corpore diu permanentis, & hoc propterea accidit, quia calor febris huius est temperatus & subiectum habet humiditatis. Sed in febre cholericæ quia calor extraneus cum ea accensus cito transit non est tempus præparans ad putredinem in parte non putrefacta & uniuersaliter in hac febre calor intrinsecus est ualde sepultus, hæc enim est causa ad plus continuandos in hac febre paroxysmos. Et deterior harum februm est illa quæ ex phlegmate fit uitreo. Et similiter etiam aliquando cognoscitur hæc febris, ære, ætate, & consuetudine & complexione, quia hæc comparisonem habent cum humore hanc faciente febrem.

Quod est de signis febris quartana.

Cap. VII.

HAec incipit cum frigore graui, ita quod tunc accidit patienti stridor dentium. Et pateriens tunc sentit membrorum contractionem, & hoc fit propter frigiditatem ipsius humoris & grauitatem. Et pulsus istius febris est rardus, rarus, & paruus, plusquam fit in phlegmatica, hoc dico in principio paroxysmi. & dicitur quod in augmento maior est quam in phlegmatica, quia calor in hac febre manifestatur & febris fortis existit. Et colores urine in hac fe. uariantur, nam aliquando est alba & subtilis ad uiriditatem declinans, & aliquando nigra & grossa ad rubedinem declinans, & ut plurimum hec febris aliquas sequitur febres. Et tempus huius febris est longum, & tempus reuolutionis ipsius est dimittens duos dies, & inualefcit tertium. Et quartanae circuitus est quasi sicut proprium signum in hac febre, propterea quia non inuenitur talis circuitus in aliqua alia febre simplici uel composita. Et maior pars hanc patientium sunt splenetici. Et fortificatur significatio in hac a rebus communibus secundum quod in alijs dictum est, ut ab aere & ab etatibus, & a complexionibus, & a signis significantibus dominium istorum humorum.

Quod est de signis feb. quae in arabico nominatur michabecha, & est sanguinea.

Cap. VIII.

HAec febris typum non habet, eo quod sanguis eam faciens est in uenis, excepto si fieret propter apostema nominatum phlegma, quod in aliquo membrorum principalium esset generatum, sicut in hepate & etiam diaphragmate, quia tunc in hac febre essent paroxysmi tertianarij similes cholerae paroxysmis, quia sanguis quando supercalescit ad naturam declinat cholerae, & propterea in hac febre non est differentia inter febr. cholericam quae habet materiam intra uenas & istam nisi in magis & minus, quia non potest in corpore fieri febris de cholera pura solum, quia talis febris de cholera de necessitate mortifera esset, quod est, quia cholera non est apta recipere aliquam digestionem, nisi in hoc quod cum sanguine est admixta, aut cum materia qua nutriuntur membra radicalia, hoc est sanguis dealbatus. Et signa quae significant hanc febr. sunt signa dominium sanguinis significantia, & iam nos narrauimus ipsa. Et pulsus hanc patientis est in ultimo magnitudinis & fortitudinis. Urina est rubra & grossa. & suspiria, & inquietudines sunt propria in hac aegritudine & in cholera. Excepto quod in

aegritudine illa fortiora existunt. Et alienatio mentis propria est in febribus acutis. Et uerba Galeni uaria sunt in hac febre, quia aliquando dicit quod est cholericam continua, & aliquando dicit quod est aliud a cholericam, & quod non debet attribui cholericam, nisi quia non habet putrefactionem perfectam, quia natura istius febris est media inter febrem diei & febrem putridam, & sententiam meam tuam nouisti. Item febris ista non habet nisi unum periodum, & in illo aut soluitur aut occidit. Et aliquando incipit lenta & semper ad ultimum fortitudinis erefcit, & aliquando est contrarium, & aliquando in uno permanet statu, & causa huius paroxysmi alias per alios multotiens dicta est. Ista sunt signa cognitionis febris simplicium, & qui simplices cognouerit, compositas cognoscere poterit. & ista exempla non fuerunt data nisi per modum similitudinis, quia raro inueniuntur. Et adhuc quia maior pars accidentium quae in his febribus tibi narrari non verificantur nisi in febribus quae sunt de materia humorum naturalibus propinquorum: uerbi gratia quia paroxysmus febris cholerae maior, i. e. occupat horas, quando cholera naturalis est putrefacta. Sed quando uittellina aut zinnaria putrefcit, tunc sapor erit paroxysmus, & accidentia erunt pessima, & pauci euadunt & maxime ex zinnaria, eo quod aptitudinem digestionis non habet, quod est, quia quodcumque humor adeo contrarius est ut complexio corporis non possit agere digerendo super eum, tunc febris deteriores mentum habet, & quodcumque potentia propinquior est, tunc febris salubrior est.

Quod est de compositione febrium.

Cap. VII.

ET scias quod compositio febris est a causa locali, aut a causa materiali. Item causa materiales tres habent modos. Unus est quando duo miscentur humores, & tunc materia febris fit inter illos duos humores simplices qui singulas possunt facere febres, & etiam accidentia tunc ex his mixta erunt. Item alius modus est ut una sit putrida, & alia haerica. Tertius modus est ut unus modus faciens febrem sit cum apostemate & alius sine. Et aliquando componuntur duae febres & miscentur earum paroxysmi absque eo quod materiae misceantur, & hoc propter causas locales accidit, sicut possibile esset ut una esset intra uenas, & alia esset extra, & in hoc genere locatur feb. quae emitriteus nuncupatur. Et aliquando humores febrem facientes erunt vicini, sed non mixti. Et possibile est etiam ut omnes istae species adinuicem componantur. Et etiam potest unus modus compositionis dici ut secundum magnitudinem & paruitatem secundum fortitudinem

nem & debilitatem, hoc est ut causarum efficien-
tium una sit fortis; alia debilis.

Quod est de signis febris hæcticæ.

Cap. VIII.

Hæc febris tres habet secundum quod ab alijs
dicitur, & accidentia in hac secundum plus &
minus diuersantur, & accidentia eius occulta
sunt in principio, & quandoque uidebis cor-
pus cum calore continuo lento ultra dies tres:
quando non in corpore incipit manifestari: tunc
vni lente continuè assimilatur. Et si patiens
eam quasi non sentit: nec habet putridarum fe-
brium significationem opinandum est ipsam ef-
se hæcticam. Itē post horas tres ab assumptione
cibi patientis pulsus considerare debes, & calo-
ris quantitatem, & si calorem inueneris augmen-
tatum, & pulsus uelocem: aut in aliqua dimen-
sione magnificatum: tunc istam febrem hæcticam
iudicabis: quod est propterea quia membra ma-
lam complexionem acquirunt calidam: de natu-
ra nutritibilis est sibi nutriendi assimilare, necesse
est ut cibis corpori adueniens calorem extra-
neum debeat adipisci: quamuis cibis ille frigi-
dus sit aut non; & propterea tunc febris fortifi-
catur, & accidentia augmentantur, quod in putri-
dis non conuenit, propterea quia calor extra-
neus in illis radicaliter non est fixus in mem-
bris quæ in cibum agere debent. Et causæ quæ ab
alijs medicis dantur accidentales sunt sicut fabu-
la cantatorum, quia dicunt quod cibus in tali-
bus patientibus & corporibus est secundum si-
militudinem aquæ super calcem proiectæ: quia
impossibile est ut uirtus nutritibilis à nutrien-
te tantum sit elongata ut ipsam eidem sit con-
trarium. Sicut aqua calci. reperitur enim quod
vnumquodque istorum alteram corrumpit. Et
raro hæc febris accidit nisi post alias febres sicut
post ephimeram in corporibus ad hanc paratis
aut post aliquando ex febris putridis. Et quā-
do fortificatur hæc febris marcescit corpus in-
firmi & siccat pellis eius, & deformatur facies
& profundantur oculi. Et cum uenerit ad vlti-
mum gradum hæcticæ uidebis oculos eius quasi
asperos cinere sicut uidetur in oculis eorū qui
tangunt puluerem & contrahuntur palpebræ in
ferius sicut accidit patienti subeth & pellis fron-
tis est tensa & sicca quasi corium præparatum,
& tempora habet tensa: auriculæ & palpebræ ci-
trini sunt coloris. Et pellis myrach uentris fit sic-
ca & rugosa, & pulsus eius estensus sicut chor-
da uelox, & debilis, & urina est oleagina. Alia-
uero signa istius febris manifesta sunt & in li-
bris spicatorum plene enarrata. unde non est ne-
cessarium ea reiterare.

Quod est de cura febris ephimeræ in generali.

Cap. IX.

ET dicimus, quod intentio medicationis in il-
la duæ res existunt: una ad remouendum calidam,
& sic malam complexionem, quæ est in ipsius sub-
stantia, & hoc fieri debet infrigidando, & hume-
ctando. Et alia, ut causæ extrinsecæ febrem fac-
ienti resistatur: ob hoc quia hæc fe. nihil aliud
est, nisi mala complexio non materialis, quæ ut
plus à causis extrinsecis causatur: Et mensura in-
frigidationis, & humectationis in hac fe. est se-
cundum mensuram rerum particularium, sicut
est complexio, ætas, consuetudo, & regio, &
causæ ipsam facientes. Et scias, quod refrigera-
tio in febris per se, & per accidens fit. per se
sicut per medicinas, & cibos frigidos, per acci-
dens uero, sicut balneari in aqua calida, aut te-
pida, & maxime in hac fe. fit, eo quod per ip-
sam in spiritualibus vapores dissoluntur, qui ni-
si resoluenterentur, corpus nimis inflammaretur,
& fortasse ad putridam conuerteretur, & pro-
pter hoc balneum est omnibus cura vniuersalis.
Sed inter aquam existit diuersificatio secundum
diuersitatem causarum facientium feb. & hæc fe.
secundum plurimum accidit propter cutis densa-
tionem, quod pluries accidit propter frigus, aut
propter in aquis stipticis balneationem, aut pro-
pter necessariam balnei negligentiam, aut pro-
pter totius corporis siccitatem, sicut illis accidit
qui in aere calidissimo degunt. Et uere plurim-
um hæc feb. accidit habentibus complexionem
calidam, & siccam.

Quod est de cura febris ephimeræ in speciali.

Cap. X.

ET de hac prima loqui uolumus, & postea de
complexione ca. & hu. & ultimo de cal. solum.
Et dicimus, quod quando accidit propter cutis
inspissationem, aut propter aquarum stipticarum
balneationem medicatio per contrarium
illis erit balneatio in calida, aut tepida aqua
post declinationem paroxysmi, & fricatio uti-
lis existit in exitu balnei cum oleo tepido, in
quo nulla stipticitas reperitur, non est neces-
sarium balneum reiterare ultra semel, sicut Ga-
len. faciebat, qui infirmum faciebat intrare bis,
& ter, eo quod hoc regimen non conuenit, ni-
si hominibus assuetis multum balneari, sed em-
brocatio post balneum cum aqua frigida, ut mi-
hi uidetur iterata cōclusionē faceret pororū, nisi
pori nimium forent aperti, aut corpus esset ni-
mis calefactum. Et melior cibus, qui post
balneum est propinandus si erit complexionis
calidæ, & siccæ, & tempus fuerit ca. est pri-
sanæ hordei, eo quod infrigidat, & humectat,

& adiuuat ad expellendum superfluitates per omnes suas uias, & post huius digestionem dandi sunt pisces petrosi, carnes perdicum, & similia. Et si alium fecerit paroxysmum, balneum, & dietam hanc reiterare debes. Et aliquando propter nimiam tristitiam, & multam iram fit, & propter multam in sole moram. Et quæ propter iram accidit, maiori indiget refrigeratione quàm illa, quæ propter vigilias, aut propter tristitiam prouenit, & nulla istarum indiget fricatione: sed balneo solum. Et quæ propter vigilias, & tristitiâ fit, maiori indiget humectatione somno, & gaudio. Et quæ propter moram plurimam in sole accidit, indiget refrigeratione, & ut longam in aqua calida contrahat moram, & facta fricatione cum oleis frigidis, & inungatur cum oleo uiol. & similibus. Et quando propter multam accidit frigiditatem, balneum intret calidum, & balnei calidus aer utilior existit balneo aquæ. Et cibi temperati esse debent aut ad caliditatem declinantes, ut turturæ, coturnices, & similes, & aqua mellis ualde utilis est, caput uero talium oleo ro. inungatur, & alijs actu calidis: quem ad modum alijs frigidis in actu inungi debent. Et scias, quod uniuersalis medicina omnibus patientibus ephimeram existit balneum exceptis patientibus reumia propter frigus. Et in ephimera ab apostematibus inguinum, aut subascellarum causata, & si causa reumatis calida fuerit, dicit Galen. quod balneum intrare debet, & hoc non dicit, nisi quia sufficiens est in humorum subtilium digestionem, sed grossos disperget per totum corpus, nec balneari debet nisi post digestionis complementum. Et uina aquosa alba aromatica omnibus istis utilia sunt si bibere afflicti fuerint, ita quod post digestionem bibantur. nam plura habent iuuamenta, quàm aqua, nam uinum natationem cibi in stomacho uetat, ventositatem resoluit, urinam prouocat, & sudorem, animam lætificat, & adiuuat naturam ad expellendum superfluitates quædæ patientes hanc feb. debilitatem incurrunt digestionis, & maxime habentes ipsam ex uigilia uel tristitia. Sed quæ à fessitudine est, tantum in sua curatione indiget diæta, uersus frigiditatem tendente, & ut cibetur quantitate tali, quæ nauseam non inducat. Sed illi, qui hanc febrem patitur ex fame propinanda sunt cibaria, ualde & cito digestibilia, tendentia ad frigiditatem, & humiditatem, & propter hoc si cibaueris tales in principio paroxysmi, non febricitabunt. Sed si propter cutis fuerit constrictionem, in primis tribus diebus erit sufficiens frictio, sicut cum semine melonum, milij, aut hordei farina, aut fabæ uel orobi, & quæ appropriantur, propina sicut squinzibin cum aqua ireos, & capill. uene. & uiol. & si hæc sufficere non uidentur, & feb. tertium transierit diem, aut tu arbitratus fueris à principio,

ut tanta fuerit in corpore repletio, ut propter fricationem, & apercionem sine uniuersali euacuatione agrum lædere posses, ob hoc quia tale medicamentum in corporibus plenis plus oppilat, quàm aperiat, tunc medicatio talium media inter ephimeram & putridam esse debet. hoc est in phlebotomia, & corporis molificatione, & hoc facias secundum excessum à signis consideratum. & secundum quod ab experientia, & bonitate æstimatione poteris perscrutari, quia propter solam doctrinam certificari non posses. quod in unoquoque indiuiduo faciendum sit in quantitate & qualitate in hac arte. & necessaria est in hac arte præter uniuersalium rerum cognitionem experientia, propter quam particularia principia habeantur, in eo quod in unoquoque indiuiduo fieri debet. Et scias quod ista principia scribi non possunt omnia, quia sunt infinita. & ista pars scientiæ medicinalis nobis uetat perfectionem habere in hac arte, eo quod magis est appropriata experientiæ quàm rationi, & propter hoc dixit Hipp. ars longa & uita breuis. Et egomet non studui in hac scientia ut uideatur mihi ut sim sufficiens: sicut uidetur multis medicis nostri temporis, qui multum elongati sunt ab eorum iniectione, exceptis filijs Auenzoar & maxime Aboli & filio eius Abenariam, cui deus conseruet uitam: nam isti ueri magistri sunt in scientia medicinali. Reuertamur ad dictum nostrum & dicamus quod maior pars istius feb. à stipticitate prouenit & siccitate, & maxime in complexionibus calidis & complexionibus siccis habentibus. Et hæc eis non peruenit: nisi quia cibi permixti sunt in eorum stomachis ad fumositatem, & quibus superuenit eis fluxus uentris, & pluribus eorum quibus hoc accidit, accidit propter corruptionem ciborum & ipsorum mordicationem. Et aliquando accidit illis uentris constipatio. quod prauum existit, & constipatio hæc accidit propter caliditatem & siccitatem, & uirtutis expulsiuæ debilitatem. & sic dicendum est de medicatione uniuscuiusque istorum per se.

Quod est de cura febris ephimeræ quando est cum fluxu uentris. Cap. 10. & 11.

ET dico quod illi cui accidit fluxus uentris in ipsius curatione consideratio est habenda. Ita quod si humor eductus est & fluxus cessauit: fac ipsum ingredi balneum, & ipsum ciba cum confortantibus stomachum, & ipsum stomachum cum uiguentis confortantibus unge. Sed cum fluxus est in statu melius est ut in balneum ipsos ire non permittas. hoc G. dicit: sed noni medici medicantur fortè fluxu cum balneo, quia dicunt quod attractio non facit ad oppositam partem, & quamuis ita sit non est propria medicina, sed est per accidens. & ideo quia est per similitudinis uiam. Et tu scis

q̄ contrarium debet expelli per suum contrarium. vnde hoc quando possumus est dimittendum. Sed patiens est cibandus absque positione ipsius in balneo, immo debes conseruare ut rectifices ipsius stomachum euacuatione cessante cum lana infusa in oleo absinthij & oleo ros. & si masticeem contritum acceperis & cum oleo ros. miscueris, & prædictę lanę infuderis: multo fortius operabitur. Et vniuersaliter scias q̄ in membris principalibus non est superdonenda medicina actualiter frigida, quamvis potentia interfrigida existat. Et si fuerit multa inflammatio in ore stomachi misceas cum istis oleis succum extremorum vitium & succum cydoniorum. & aliqui apponunt ceram & faciunt inde cerotum. Et aliqui ex hac medicina mirantur, & dicunt cum æger os stomachi habeat mala complexionem calidam viciatam, cur. G. ponit masticeem cum oleo ro. & nos respondemus q̄ significatio hæc recepta à mala complexionem sola est alia à significatione recepta à complexionem membri. Ob hoc quia intentio medicationis istius membri est ut fortificetur cum medicinis habentibus aliquid stipticitatis cum amaritudine & aromaticitate. Et propter hoc primi experimentatores non curabant debilitatem stomachi: nisi cū his supradictis. Et possibile est ut multis hominibus nocebat: eo q̄ malam complexionem nõ considerabant, sicut dicit. G. vñ accidit qui malam complexionem habebat in stomacho calidam & siccam. Multum ergo considerandū est si mala complexio est tanta ut ipsam nimium timeamus, studebimus solum in horis stomachi confortatione. Et si non admiscebimus cum his frigidis medicinis obseruato ut sint illis similes in stipticitate, & tales medicinz sunt multæ. Sed si fluxus non cessauerit non desistas ipsum cibare cum rebus stipticitatem habentibus, & secundum quantitatem fluxus ipsum regere. Nam si paucus sit fluxus sufficit panis biscoctus cum zucchero uel sacco ro. confectus, aut cydoniorum succo. Et si multus sit fortioribus vtere uel pane biscocto hordei cum succo cydoniorum, & uinū pomorum granatorum est bonus cibus secundum G. Sed si cessauerit fluxus mica panis conueniens est. Et si superuenerit casus appetitus sumat electuarium cydoniorum cum aliquantu lomastice cum succo extremorum vitis. Et Gal. vñtur hoc electuario cydoniorum quod composuit in fine regiminis sanitatis. Sed medicina in qua intrat piper aut res calidæ tunc est uitanda, & maxime in climate nostro tempore calido & calida complexionem. Et quando istis accedit ventris constipatio, tunc considerandum est in quo loco sit cibi retentio. vtrum in stomacho aut in intestinis. si est in stomacho. G. præcipit dari confectionem trium piperum, sed non de forti in qua intrant medicinz, sed de debili quanta

posuit in libro de ingenio sanitatis. Et hæc medicina non est conueniens: nisi illi in quo cibus permutatur in stomacho ad acetositatem: quia stomachis calidis & nauseam ex caliditate habentibus hæc non erit vtilis medicina. Et est dictum Gal. quod iam declaratum est in ægritudinum libro q̄ virtus membrorum æque debilitator per complexionem calidam malam sicut per frigidam; quia aliquod membrorum non habet suam accidentiam nisi per mensuratum calorem. Et si debilitatur per complexionem frigidam est hoc substantiale, eo quod est ei necessarium. Et propter complexionem calidam erit per accidens sicut sol fortis qui extinguit ignem, & calor fortis fornacis extinguit candelam. Similiter potest dici secundum Gal. de debilitate stomachi quæ sit propter causas calidas & nauseas calidas, ergo Gal. non respexit nisi ad frigiditatem quæ stomacho accedit per accidens in hac arte, & hoc curare intendebat. Sed providendum est super complexionem malam, & sic medicinz misceri debet. Sed credo q̄ clima suum ipsum in hoc sustentauit. Et mihi videtur q̄ electuarium cydoniorum mixtum cum ligno aloes & mastice, gar. multum valet si sit taliter compositum ut frigiditas cydoniorum uincat ipsorum caliditatem. Et non est tradendum obliuioni de modis compositionis harum compositionum; quoniam si uoluerimus frangere uirtutes ipsarum medicinarum absq̄ cydoniis potes hoc facere cum extremitatibus vitium, uel cum aliis rebus frigidis & stipticis, & medicus in hoc pronus esse debet ut resistat ei quod plus est timendum. Et melius est q̄ calor qui ex hac prouenit mixture sit in primo gradu. Et quando fuerit necesse frigiditatem stomachi remouere diminuat res frigidas: sicut nos diminuimus in aliquibus quantitatem calidarum quando non oportet complexionem calidam procurare. Et Galenus præcipit embrocari ventrem istorum cum aqua calida, & iniundis per hoc ventrem mollicicare, sed quia mollicicatio nocet stomacho, oportet q̄ fiat cū timore, & quāuis mollicicatio sit huic congrua ægritudini nature membri contraria existit. Ob hoc est necesse has duas res miscere aut fortiter rem conuenientem ordinare. Sed cum cibus ex stomacho descendit, tunc embrocatio ualde utilis existit, hoc obseruato ne cibus indigestus ad membra trahatur embrocata, & hic elidere melius est omnibus quæ fieri possunt, & si nõ est mordicatio aut uentositas tunc sufficit elidere factum ex melle, oleo, & aliquantulo sale, & si mordicatio fuerit, tunc admisceantur pinguedines anseris & gallinæ. Et si uentositas affuerit necesse est ut in oleo coquatut parū rutæ, & seminis resoluētia uentositatem: sicut semē apij & ei mini & similiū. Et uentositas cum nausea in hoc loco significat quod naturalis calor debilis est,

& propter hoc non est calefaciendū nec refrigerandum; sed vtrisque utendum erit, & aliquando hæc febris tribus diebus perdurat, sed non timeas & rege ipso post exitum paroxysmi, & post euacuationem ventris ponendo ipsos in balneo, & ciba ipsos cibis conuenientibus. Sed ex nausea acetosa hæc febris non fit ob hoc: quia ex illis substantia fumosa non generatur quæ spiritum inflammet. Et scias quod in complexionibus frigidis & humidis raro hæc febris accidit si militer neque in frigidis & siccis. Sed calida & sic omnibus paratio ad hoc existit, & propter hoc illud quod plus nocet corporibus sic dispositis est fames, & exercitium temperamentum excedens & negligentia balnei. Sed qui febricitant febre quæ fit propter bubonicum apostema quod fit in subscellis & inguinibus vitium medicamen illius apostematis est curatio. Et si propter rheumata hoc accidit medicinæ purgantes necessarie existunt. Et si fuerit propter sanguinis abundantiam minutione indiget: quia hæc præseruat ne in ultiores egritudines cadat. Et Gal. præcipit ut has febres patientes ponantur in balneum sed mihi non placet ut fiat nisi in declinatione. Et hoc sufficit in medicatione ephimerarum: cōiuncto tamen hoc causis exterminatis in libro ægritudinum.

Quod est de curatione febrium acutarum arduarum.
Cap. XII.

Deinceps volumus loqui de febribus arduis vel acutis quæ dicuntur arduæ: ideo quia istæ febres sunt mediet inter putridas & ephimeras. Et dicimus quod iam dictum est in libro ægritudinum, quod hæc febris fit ex multo sanguine, & sunt species duæ, una est dum sanguis non est putrefactus, & alia est dum sanguis iam putrefieri incipit. Et vnaqueque istarum trino disponetur modo. Vnus est ut homotenus continue affligatur à principio usque ad finem æqualiter, & hoc fit propterea quia id quod dissoluitur est æquale ei quod resoluitur. Secundus modus est ut à principio augmentetur usque ad finem, & hoc accidit propterea quia illud quod dissoluitur est plus eo quod resoluitur. Tertius modus est ut à principio usque ad finem decrescat, & hoc fit ideo quia illud quod dissoluitur minus est eo quod resoluitur. Et quia hæc febris fit propter oppilationem secundum uasa: medicatio ipsius erit per phlebotomiam, & maxime cum non est sanguis putrefactus. Et Gal. hic dicit quod quando natura fortis est extrahamus usque ad syncopim, & dicit quod propter hoc corpus refrigerationem habebit, & possibile erit ut cholera abijciatur per partem superiorem aut inferiorem. Et dicit hanc medicationem in hac febre esse necessariam. Et ego dico quod hæc quantitas

euacuationis artificialiter non existit: immo valde est erronea: eo quod hæc ars imitatur naturam, & nunquam fit crisis laudabilis per euacuationem sanguinis usque ad syncopim perducet enim immo hæc provenit à crisis malis: in quibus virtus expulsiua plus quam conueniens est, expellit. Adhuc non est intentio euacuationis in quantum est euacuatio, nisi ad remotionem superflui sanguinis peccantis quantitate, & ad conseruationem quantitatis naturalis: ergo quomodo potest sanguis euacuari usque ad syncopim: nisi cum detrimento sanguinis nominalis, hoc impossibile esse uidetur. Et Gal. non intellexit per hoc nisi subitam corporis refrigerationem: ergo hæc medicina accidentaliter est periculosa, unde melius est ut aliquantulum ex calore remaneat extraneo: quam calor naturalis diminuat. Adhuc non est credendum ut in tali corpore quale est istud non sit putrefactionis alicuius humoris preparatio, ergo si diminuis calorem naturalem corrumperetur humor & virtus diminueretur, & non erit qui huius erroris faciat correctionem. Signa ergo per quæ cognoscimus febrem esse à putrefactione exemptam, sunt signa commutativa & non fixa. Considera ergo quod in hoc loco eminent pericula. Et cum in hac febre appareant signa putrefactionis per urinam aut pulsum phlebotomia non fiat usque ad syncopim perducens: quia impossibile est ut post minutionem non remaneat putrefactio usque ad septimum diem, & propter hoc est necesse ut remaneat virtus sufficiens digestionem. Et dicit Gal. quod quando medicabis hanc febrem sanguinis cum putredine: tunc non est expectandum usque ad digestionem mature. Et ex hoc intelligere debemus quod in principio phlebotomare debemus, & deinde potare aquam frigidam in niue frigidatam tandem donec corpus ipsius ad frigiditatem deueniat. Et hoc fieri debet consideratis certis considerationibus. Prima est ut ægritudo sit digesta, & ut in visceribus non sit apostema, & ut in ore stomachi non sit debilitas neque frigiditas: nec quando infirmus non est assuetus aquam frigidam bibere, & sic esse debet: quoniam illud quod hic inducit ad malam complexionem contrarium existit eiusdem rei quæ causam habet remouere: quoniam aqua frigida humorem incrudat & impedit digestionem. Et impossibile est hanc febrem integre remouere donec causa ipsam faciens in corpore reperiatur, eger quomodo potabit aquam frigidam habens stomachum debilem & frigidum quin ei accidat timor & stupefactio & conuulsiles ægritudines ex mala complexione frigida. Et iam inuenti sunt homines qui biberunt aquam frigidam semel in quantitate multa, & inde ad contractionem anhelitus deueniunt propter frigiditatem musculi uel nervi & diaphragmatis, & taliter quod non potuerunt aliquid deglutire, & qui ipsam

ipsam bibunt iam facta digestionē, tunc naturā optime adiuuant, eo q̄ tunc ibi iam aliud non remansit, nisi mala complexio calida, & illa tunc remouetur ab aquā frigida bibitione, & sic natura meliorem facit operationem in humore tali. perficiendo digestionem & malam materiam expellendo, quoniam ipsa mala complexio hoc facere prohibebat, & hic est tractatus. G. in potatione aquā frigida in hac ægitudine. Et debes scire q̄ hæc febris latitudinem habet magnam in suo calore secundum magis & minus, & propter hoc quæ fortioris caloris est dicitur arsiua. i. causon. Et hæc latitudo diuersificatur secundum climata. Et quando omnia particularia concordant cum febre quæ est arsiua, & infirmus multum desiderat aquam frigidam: non in hac est digestio expectanda, quia æger ante digestionem cōsumetur, & si feceris ipsum pati usque ad digestionis aperitionem, tunc erit ipsius digestio mala, quæ in modum est nebula nigra, aut hypostasis nigra: propter nimietatem combustionis, & tunc aquæ frigida exhibitio non ualebit. Et propterea melius est in principio sine etiam digestionis signorum apparitione exhibere & non curare, ex dictis aliquorum, quoniam hæc res est ueracissime probata, nam materia quæ talem facit febrem qualis ista est cum sit in ultimo caliditatis nō est priuata digestionē nisi propter malam qualitatem acutam, nō propter grossitiem, nec propter viscositatem, & quando hanc infrigidabis, tunc statim erit materia digesta, & melius est ut conueras talem febrem ad febrem letam & longam quæ curari potest, quàm eger subito moriatur. nam error qui fit in alteratione complexionis febrium facilius est quàm mora. Et ego credo q̄ illi quibus digestio debet expectari si detur aqua frigida citius curaretur si eius uirtus extiterit fortis, quamuis ægitudine fuerit longa. Dicit. n. Rasis q̄ duo iuuenes in diebus canicularibus iter agebant, quorum unus erat dominus & alter seruus, & ambo hanc inciderunt febrem, & medicus domino aquam præbuit frigidam & seruo non propinquit dominus euasit, & seruus mortuus fuit. Et terræ istę nostrę mediz sunt inter terras Gal. & Rasis in temperamento, & egressi sumus ex eo quod nostrę intentionis erat. & propterea quia tractatus curationis istius febris est una partium tractatus feb. putridarū, & propter hoc bonum fuit narrare medicamentum quod utrisque commune existat.

Quod est de cura febrium putridarum, & primo de ea in generale. Cap. XIII.

Sed dico quod febrium quæ sunt ex mala complexione materiali, prima illarum intentio duas considerat res: hoc est ut malam remoueat complexionem, & malam euacuet materiā. Et quia

materia est cum calore putredinali accidit hæc intentio, hoc est ut remoueat causę iuuantes ad faciendum putrefactionem, & est superflui diminutio & pororum apertio oppilatio nis. Et pororum oppilatio accidit propter res stipticas, aut frigidas, aut desiccatiuas; aut propter humorum grossitiem, aut viscositatem, & aliquando hæc omnia aggregantur. ergo tertia intentio est, ut vnum quodque istorum remoueat per ipsius contrarium. Ergo ut plurimum accidit ut contrariantur hæc accidentia medicationi, & maxime quando superuenit accidens quod est contrarium significationi medicationis febris. Sed quando fuerit significatio recepta ab essentia febris & causis ipsius, & unum erit contrarium alteri, tunc oportet medicum considerare super accidentia si fortissima sint. Et si non cogatur medicus a feb. vel accidentibus, tunc in stare debet remotioni causę, & per hanc artem remouebitur febris sicut est in febribus de frigida causa, ut est feb. melancholicæ & phlegmatis. Et si feb. fortior causa fuerit, tunc opponat se febrī, saluo ut causę non obliuiscatur, & possibile erit ut cogantur ambę considerare equaliter. Et nos uolumus in primis narrare febres quæ non habent accidentia resistentia eorum medicationi, & postea narrabimus illas quæ habent accidentia contraria, eo quod tractatus resistentię accidentium est alius a medicatione ægitudinum, & etiam alius a medicatione accidentium. Quod est, quia eorum medicatio est per remotionem causarum sicut in ægitudinibus. Sed resisterent accidentibus sit cum rebus quæ cito ea remouent, & subito per contrarium: quamuis ut aliquando augmentant accidentium casus sicut opiu in summis doloribus. Dicimus quod frigiditas, & humiditas in omnibus febribus ingressum habent per modum medicine & cibi, & hoc in rebus assumptis in corpus, & hoc fit per primas ipsarum uirtutes solum, & aliquando fit ut aerem in frigidemus, & aliquando ut ipsum calefaciamus, & aliquando ægrum remoueamus de uno climate ad aliud, sicut fit in peripneumonia cœni præstamus ut uadat in ethiopiā uel ad arabiam. Sed euacuationis in febribus per phlebotomiam vel pharmaciam fiunt per uirtutes secundas aut tertiās; aut per proprietates, & aliquando fiunt per balnea aut fricationes. Sed euacuationes per exercitium in febribus non fiunt, & est considerandum in quo sit vnum quodque istorum faciendum, aut plus vno, & in quo tempore, eo quod tempus est una ex rebus valde necessarijs in hac arte. & propterea dixit Hipp. quod tempus sit acutum; hoc est quod tempus medicine latitudinem paucam habet. Et dicimus quod phlebotomia fieri nō debet, nisi signa multi sanguinis apparebunt: sed melius est ut fiat quando non est malicia nisi quantitatiua sicut superius dictum

dictum est. Et tempus faciendi sequitur fortitudo, quia secundum plurimum fortitudo virtutis plus est in principiis egritudinum: propter hoc ordinauerunt quidam fieri phlebotomiam in principiis egritudinum, & multi sunt egrorum qui phlebotomia patiuntur usque ad ultra septimum diem. Et ad remouendum illorum errorem dicit Gal. quod debilitatem virtutis aut fortitudinem non sequitur numerus dierum. Et quantitas phlebotomationis recipitur à fortitudine egritudinis, & à complexione & aetate, & tempore anni, consuetudine, digna & conditionibus alijs. Sed bonitas uirtutis & eius malitia sequitur malitiam complexionis & eius bonitatem, & propter hoc ponitur à medico in uno genere. Sed euacuatio quæ fit aperiendo oppilationes fit incidendo humores, & subtilizando ipsos, & digerendo ipsos, & rectificando illud quod potest rectificationem accipere, & expellendo illud quod non potest rectificari, & hoc fit in omnibus febribus & maxime in illis quæ non sunt incensuæ, & etiam in omnibus horis seu temporibus egritudinis; eo quod materia putrida non rectificatur, nisi his duabus rebus scilicet expellendo illud quod rectificari non potest, & rectificando quod potest rectificari quemadmodum fit ab hominibus volentibus putrefactioni obuiare. Et necesse est régerenaturam continue in promouendo urinam. Sed quia maior pars harum medicinarum est calida & sicca complexionis vè est semeq apij, & feniculi & similia, & possibile est ut ex tali operatione febris augmentetur, & propter hoc necesse est ut frangantur earum uirtutes primæ cum rebus frigidis ex natura sui adiuantibus illam operationem, & talia sunt semina melonis, cucumeris, & horum similia; & sunt etiam ex medicinis harum operationum quæ sunt temperatæ uel pauce caliditatis: quas damus febricitantibus, sicut capillus ueneris & endiuia & similia. Et in summa intelligere debemus quod quando operari uolumus medicinas calidas quod frangere debemus earum uirtutes, & in his prædictis medicinis inueniuntur duæ res scilicet incisio & subtiliatio. Et scias quod euacuatio per urinam est ex medicinis magis manifestis in febribus. Et hæc medicinæ aliquandam inducunt angustiam & inquietudinem & corruptionem stomachi & hepatis, & proprie in fine febrium chronicarum, & propter hoc conuenit ut eis admisceantur ea quæ habent confortare membra principalia sicut bulliêdo in aqua prædictarum aliquid mastice, uel ut bibat aquam illam cum zucchero ro. & in his conuenit nobis magna exercere. scilicet in confortando, subtiliando, & incidendo. Et si materia huius febris fuerit humor frigidus & sic oportet ut abstineat ab his scilicet calidis & sic eo quod ista sicca non debes quartanariis exhibere, & si uis ei propinare debes hoc fa-

cere frangendo siccitatem earum cum radice liquiritiæ & zucchero viol. Sed quia zucchero viol. habet uirtutem relaxatiuam prohibere poteris cum passulis, quoniam optime existunt in hoc casu, & sunt necessariæ scilicet passule in remouendo siccitatem superfluum squinzibin scilicet syrupi acetosif eo quod habet mordicare membrum nervosa scilicet yso-phagum seu merij & stomachum & carnem pulmonis, & aqua siccis confertur maiori parte febrium. Et quamuis aqua hordei sit frigida & humida habet modum care uias à superfluitatibus, & abstergit & lanauit absque inflammatione, & est ex medicinis laudabilis valde in hoc casu. Et propter hoc squinzibin & aqua hordei laudata sunt in curis febrium. Sed aqua hordei interdum ori stomachi habet inducere nocumentum, & propter hoc indiget rectificatione scilicet ponendo in rotulo dimidio aque hordei characterem unum ex mastice, scilicet pondus quatuor granorum hordei, & hæc omnia indigent consideratione scilicet opponendo se periculosiore & fortiori secundum plus & minus. Medicina enim laudata in relaxatione naturæ sunt quæ habent has secundas uirtutes scilicet relaxare & qualitati febrili obuiare, & tales sunt tamarindi & benefeg. i. uiolæ & zereniabin seu manna & medulla bathæ. Sed oportet ut vitemus dare myrcabolanos ante digestionem propter siccitatem ipsorum: sed alubleb. i. corrigiola optima est in principio febris, quamuis aliquam habeat caliditatem. Ordo autem medicinarum in mollificando naturam est quem diximus scilicet zereniabin primo: secundo benefeg. viol. tertio tamarindi; postea alubleb. post medulla cucumeris saracenici scilicet anguinæ, & postea charbasar. scilicet castiasiftula, deinde mirabol. & conueniens est omnibus febribus uti contrariis à tota specie putredinis febrilis. Sed quia hæc medicinæ pro maiori parte calidæ existunt sicut sunt species, ideo in modica quantitate de ipsis ponere debemus, & frangere debemus earum uirtutes primas. Sed medicinis quæ hanc exercent operationem absque calefactione uti debemus ut in hoc loco, sicut est uinum pomorum granatorum, & sandali albi & rubei, & tabazir. scilicet populeum. Sed in sandalis aliqua existit oppilatio, & cum rectificata fuerit medicina materia utilis existit. Sed medicinæ quæ habent infrigidare & humectare sunt diuersæ uel uariæ uel multæ secundum diuersitatem & multitudinem febrium in quantitate calidarum & paucitate earundem. Et ordo harum medicinarum est talis; quia primo danda est aqua hordei, & postea syrupus inlepis, & est syrupus secundum quosdam factus ex aqua rosæ & zucchero solum, sicut laudauerunt aliqui noui. Sed propter siccitatem aquæ rosæ ponendum est tantundem aque simplicis, & plus & minus secundum quod uidetur conuenire, & qui

magis fortis existit est syrupus factus ex succis frigidis & humidis, sicut est succus cucurbitæ, & cucumeris saracenici, & citrulorum & melonũ, & sunt exterius coloris citrini, & interius sunt cõrinni & albi, sed quod fortius existit est bibere succum prædictorum absque zucchero, & maxime succum anguinẽ. s. cucumeris saracenici, eo quod contrariatur cholera à tota substantia sua. Sed tempus in quo de necessitate debemus purgare materiam peccantem cum medicina attractiua est hora in qua exuberat malicia humoris exeuntis in qualitate, & iam declarauimus superius, & hoc facere debemus forti existente uirtute, & tunc est certum quando signa digestionis apparerent, quoniam eo tempore collaudatur euacuatio facta à natura, eo quod uireus expulsiua non monetur ad expellendum superfluitates per uiam naturalem nisi facta digestionem, & in hac arte imitari debemus opera naturæ toto posse. Et scire debes quod facta digestionem sit descensio & expulsio absque aliquo impedimento grossitudinis uel uiscositate uel oppilationis. Sed quando non apparet digestio, tunc dissensio inter medicos reperitur, eo quod Gal. & maior pars medicorum dicunt quod minime purgare debemus nisi materia sit digesta, nisi ægrotudo fuerit in ultimo acutatis. Et hoc intelligere possumus ex dictis Hipp. quoniam quando ægrotudo est in ultimo acutatis, tunc humores sunt in ultima furiositate, & non est securitas, quin descendant ad quædam membra principalia, & lædant ipsa nisi sint euacuati in principio ægrotudinis, eo quia humores qui acutissimi existunt sunt subtiles, & quia ibi non est grossicies nec viscositas quæ prohibeat operationem medicinæ laxatiuæ. Et non potest inde prouenire nisi unum solum nocumentum. Quod est, quia medicinæ laxatiuæ suis qualitatibus primis augmentant febrem, & illud potest remoueri miscendo cum eis frigida & humida secundum quod conuenit. Sed quando ægrotudo non est peracuta valde, sed est quiesca, tunc expectanda est digestio. Et scire debes quod ægrotudines quæ acutæ sunt in terris Hipp. in terris nostris peracutæ sunt, & hoc manifestatur, quia Hippocra. non curabat ægrotudines acutas nisi cum aqua hordei & melicrate. & postquam ita est, ægrotudines acutæ nostræ regionis & aliarum calidarum terrarum medicandæ sunt cum medicinis attractiuis, uel laxatiuis in principio ægrotudinis. Et in ægrotudinibus peracutis pro maiori parte humores corrumpuntur circa orificium stomachi. & propter hoc quando apparet abundantia sanguinis, licet non sit superflua euacuare debemus, quoniam inde magnum prouenit iuuamentum, & incontinenti quiescit ualitudo ægrotudinis, nisi sit quod prohibeat ex rebus supradictis. Sed quando ægrotudines non sunt acutæ, sed sunt ex humoribus mucillagino-

sis & uiscosis & indigestis ipsas euacuare & purgare debemus post subtiliationem & incisionem, & hæc est digestio eorum, alioquin non oportet cum medicina purgari. Sed ægrotudines quæ non sunt acutæ & sunt ex humoribus subtilibus, sicut est uera tertiana quæ non transit ultra septem periodos, dicit Auicenna. quod expectare debemus digestionem, eo quod digestio humoris subtilis est eius ingrossatio, & grossus est eius subtilis, & sicut difficile est uirtuti expulsiuæ expellere humores grossos propter sui grossiciem, sic difficile est uirtuti expulsiuæ expellere subtilem, quia disrumpitur & dispergitur propter sui subtilitatem, quare difficile existit naturæ expellere humores grossos, eo quod oppilant meatus & transitus, & subtiles, quia disrumpuntur & sparguntur & imbibuntur, tamen medicinæ laxatiuæ citius expellunt & facilius humores subtiles quam grossos. Et propterea quidam medici dixerunt quod nunquam dederunt aliquam medicinam laxatiuam ad purgandum aliquem humorem quin cholera prius purgaretur propter sui leuitatem & subtilitatem, & adhuc magis quod quando dantur medicinæ laxatiuæ quæ trahere & purgare debent melancholiam, aut phlegma grossum & uiscosum à proprietate & sui natura prius illæ eadem trahunt choleram & expellunt. Et hoc idem manifestat intellectus quod subtiles humores habiliores sunt ad purgandum & expellendum grossis, quamuis hoc non sit ex opere naturæ, quoniam si sic faceret natura, illud quod prius exiret in ægrotudinibus acutis esset cholera, eo quod tales ægrotudines pro maiori parte sunt ex humoribus subtilibus, & quanto sunt subtiliores tanto difficilius à natura expelluntur. Et propter hoc dicimus quod minime tradere debemus in peracutis exhibere purgationes, neque expectare ad perfectam digestionem, quia non est tutum quin mala qualitas prædominetur naturæ, & tunc etiam mala digestio expectanda cum diffiducia liberationis. Et postquam ita est quod purgare debes non facias illud nisi primo frangas suam caliditatem & siccitatem. Sed in febris phlegmaticis & melancholicis Rasis in principio earum purgabat, & hæc erat eius opinio omnino. s. purgare in principio febris, tamen Gal. dicit contrarium manifeste. s. quod minime debemus in principio febris melancholicarum. & illud idem dicit in epistola ad Glauconem. Et illud est quia finis harum ægrotudinum est securus, nec expectatur digestio mala, sed phlegmatica est male determinationis. & propter hoc necessarium existit ut infirmus euacuetur præterquam expectetur digestio perfecta, & propter hoc medicus prius incipere debet à medicinis subtiliariis & incisiuis per hebdomadam unam, quia non timemus calorem huius febris cum sit debilis ut magnum inferat nocumentum. & cum hoc fecerit tunc medicus

dicus purgare incipere debet. Et demonstratio huius est illud quod uides fieri in apoplexia & etiam in similibus egritudinibus timorosis frigidi. Quia incipimus in talibus ab euacuatione ponendo in medicinis laxatiuis incisua & subtilia tria. Et mihi uidetur impossibile recipiendo syrumpum squinzibin per hebdomadam unam. Etiam ex decoctione radicum lilij celestis, & seminis apij, & liquiritia quin praparet humores, & digerat, & leuiorem faciat exitum à corpore, & quamuis totus humor non euacuetur à corpore tamen natura inde alleuiationem suscipiet omnino. Et inde redire debes ad incidendum & subtiliandum per aliam hebdomadam, quemadmodum diximus, & postea purgare, quia taliter operando humores habiles reperiuntur ad expellendum. Et simile hoc est homini ferenti graue pondus: quoniam quando ferre non potest ipsum, & diuidit ipsum in partes facilius tolerat ipsas, & postquam natura fuerit alleuiata: tunc digestio laudabilis apparebit, & rectificabitur domino cōcedente. Et hoc melius existit valde quam infirmum dimittere egritudini & naturæ. si uidebis naturam egritudini preualere: tunc dietam & regimen infirmo iubebis, & hoc in arte minime collaudatur: quoniam nisi naturæ violentiā feceris vel adiuuando ipsam nihil boni ei feceris, nisi quod uerba ei dederis retinendo ipsum. Et istud idem regimen facere poteris in febribus melancholicis, & sic facimus hominibus sanis quando uolumus ipsos purgare. scilicet quia ipsis digestiuium propinamus primo ad subtiliandum humores & uias aperiendo: sic & in egritudinibus oportet facere, tamen in egritudinibus maior diligentia est adhibenda, eo quod earum humores difficilius recipiunt digestionem. Et hoc manifestatur in opere Gal. in labore spontaneo febri propinquo, quoniam ipse purgabat omnes humores facientes hunc laborem preter humores viscosos mucilaginosos: eo quod omnes eorum cordare uidentur quod tales non sunt purgandi. Gal. autem uidetur quod euacuare debemus habentes hanc febrem per fricationem solum. Ego autem affirmo quod climata in hoc multum sunt considerata: propter hoc non est danda regula generalis, quoniam mihi uidetur quod etiam humores viscosi & mucilaginosi purgari possunt in his nostris regionibus: facta tamen incisione & subtiliatione per longum tempus, & tunc tempus digestionis abbreviabis, & natura inde alleuiabitur, & ex tunc uidebis digestionem laudabilem. Et te oportet has res multotiens experiri, quia experientia in his rebus non modicam uirtutem habere uidetur. quod scripsimus de hoc in hoc loco sufficiat.

Quod est de cibatione & fricatione & balneatione febricitantium. Cap. XIII.

Dico quod cibus dari non deberet febricitantibus usque ad statum egritudinis. & hoc ut natura tempus habeat digerendi humores facientes egritudinem & ipsos expellendi, sed quia uirtus non est sufficiens omnibus, te oportet considerare egritudines, quoniam si fuerit ex egritudinibus peracutis, cuius status est propinquus & crisis debet esse in septimo, & natura fortis existit, tunc illud facere debes, & si uirtus debilis fuerit nullatenus facere debes. Sed si uirtus mediocris fuerit, & ætas fuerit iuuentutis cibabis ipsum aqua hordei, & mica panis lota etiam cum aqua calida ad quantitatem uincij, uel ij. ponderis. & istud est subtilius regimen in nostro climate secundum consuetudinem nostram. Sed regimen antiquum subtilius erat nihil dare per hebdomadam unam, & quando uolebant ingrossare dabant aquam melis solum. Sed hoc ferre non possunt illi qui sunt nostri climatis propter complexionem aeris & consuetudinem. Sed in climate illorum corpora habent minorem resolutionem, & cum hoc bibunt uinum non in multa quantitate & comedunt carnes porcinas, quæ duo sunt plurimi nutrimenti. Et generaliter consideranda est consuetudo, quoniam qui consueuerunt comedere ter in die non possunt prædicta sustinere, & maxime habentes complexionem calidam & resolubiles. Et si cognoueris statum egritudinis esse longum, & uirtus infirmi fuerit debilis cibus est plus quam diximus in principio, & cum status appropinquabit minuendus erit, & totum hoc est intelligendum forti existente uirtute, & fortitudo uirtutis existit in complexione fortiori. Sed qui habent complexionem calidam & siccas pauci ex his famem possunt sustinere, & maxime in egritudinibus sibi consimilibus & in temporibus calidis: eo quod quando talibus pati famem fecerimus, febres eorum ad incensuam declinare faciemus: quamuis debiles existant in radice uel ad hæcticam: quia in complexionibus consimilibus multiplicantur qualitates male sui naturæ, & magis quando eis facimus sustinere famem, multiplicantur & aduruntur humores. Et hora cibandi eos est in declinatione paroxismi primi, & ante principium secundum ut natura habeat spacium digerendi humorem in tempore paroxismi, & hoc melius existit. si confortare uirtutem ne accidat accedens periculosum, cui necessarium sit cibum propinare ut in syncopi ex resolutione. Sed si timuerimus aliquod ex his cibabimus eos in principio paroxysmorum, quoniam inde eos à syncopi taliter liberabimus quemadmodum recitat Gal. de puero qui præcepto medicorum sustinuerat famem tribus diebus. Et aliquando conamur cibare ipsos in medio paroxysmorum. In febribus

febris autem continuis horam cibandi eligere debemus in qua maioris existunt quietis: considerando ramen consuetudinem. Et ex horis di ei meliores sunt frigida: s. mane & sero. Et scias quod balneum in declinatione febrium collaudatur, quoniam superfluitates euacuat subtiles. In principiis vero minime, quia rigores habet pronocare, & dissoluit humores & multiplicat oppilationes, & spargit superfluitates per corpus totum, & non est tutum quin inde proveniat apostema in aliquo principali membro, & quamvis humores euacuet, multiplicatamen caliditatem & siccitatem febrilem, siue fuerit ex aqua calida factum, siue ex aere calido. Et necesse est ut corpora talium non tangantur aqua frigida, quoniam humores efficit crudos, & propter hoc balneum fieri non debet nisi post factam declinationem, & in febribus quae non sunt acutae. Vinea quoque aromatica & leuia quae modicam aquam sustinere possunt pnegmaticae & melancholicae exhibere possumus, sed in incensu uino omnino elongare debemus. Gal. quoque curabat febres quae erant ex humoribus mucilaginosi frictione, & hoc indiget consideratione, quoniam non est tutum quin humores spargantur ex frictione per totum corpus. Et ipsemet precipit in libro de conseruatione sanitatis quod ille qui habet laxitudinem & corpus eius fuerit plethoricum uel plenum humoribus mucilaginosi ut minime moueatur uel exercetur, neque balneum intret, neque faciat frictionem & similia, eo quod fricatio non euacuat ex humoribus nisi qui sunt subcutanei & inter musculos, qui autem sunt in uenis nullatenus euacuari possunt nisi cum medicis laxatiuis. Et etiam uidetur quod si sanus faceret frictionem praecipit ab ipso in laxitudine scilicet ita magna, de necessitate cutis apostemaretur, eo quod fricatio haec in ultimo grauatis existit, & illis maxime qui hanc patiuntur egitudine cum in laxitudine semper uideantur esse. Iam ergo sufficienter scripsimus siue nobis uideatur generaliter curas febrium putidarum, nunc autem redibimus ad curam unius cuiusque particula riter.

Quod est de cura febrium cholerarum, & primo de cura tertiana. Cap. XV.

HAec febris si fuerit pura tertiana erit secuta absque periculo. Et scimus certissime quod natura habebit dominium super hunc humorem, & propter hoc non debemus eum mouere cum medicinis attractiuis sicut est scamonea, eo quod restificando eam quantum plus possumus semper membris principalibus habet inducere nocuum, & propter hoc uirtutem debilitat, & auget etiam caliditatem febrilem & siccitatem suam, & si aliud non induceret nocuum ni-

si conamen surgendi & decumbendi modicum non inueniretur, quia complexio inde supercalefit & debilitatur. Sed apparete signo digestionis non est malum dare aliquam medicinam attractiuam in hunc modum scilicet quia primo dare debes ea quae primo habent lenite materiam & humectare sicut syrupum viol. & tamarindum, & ad reperimendum nocuum stomachi adde ali quid ex mastice, & reubarbarum in hoc loco optimum existit, quoniam reprimendo nocuum praedictum laxat. Et quantitas quam dare debes ex reubarbaro est a duabus drag. usque ad tres miscendo ei syrupum iulep & squinzibin. an. unc. j. cum v. partibus aquae frigidae, & infra diem potabis cum aqua hordei, & hoc faciendum est omni die nisi natura moueretur bis in die ad assellam, sicut conuenit, & si natura moueretur ex hac medicina ultra quantitatem minue secundum portionem ex ea. Et sumus contenti in hac febre ex infrigidatione & humectatione cum aqua hordei & syrupo iulep, eo quod haec febris non existit intense caliditatis cum sit ex cholera naturali. Et sumus contenti oppilationes ipsius remouere cum aqua ordei & squinzibin. solum cum modica in ea reperiat oppilatio & forsitan nihil. Et facta digestionem si sufficit dare myrabola nos citrinas bene quidem, sin autem propina infirmo ex scamonea characteres, ipsi cum tantundem mastice, & cum unc. j. syrupi de nenufere, & un. s. syrupi malorum. Syrupus de nenufere, quia frangit qualitates ipsius scamoneae primas scilicet eius caliditatem & siccitatem, & cum hoc confortat aromaticitate sua membra principalia. Et syrupus pomorum, eo quia frangit eius siccitatem, & remouet nocuum principalium membrorum ab ipsa, & mastix quia confortat & remouet nocuum principalium membrorum, & medici iam ipsis uisi fuerunt ad occultandam malitiam scamoneae. Et si timebis debilitatem infirmi cibabis ipsam mica panis lora, & ita restificauit Hip. quod nisi fuerit ex errore quod haec se non transit. 14. diem etiam si fortissima fuerit. Sed si haec feb. non fuerit ex pura cholera, sed erit ex uitellina, uel prasina, uel arginosa non euadit hic absque periculo magno, & maxime quando fuerit ex prasina uel arginosa, & mihi uidetur impossibile quod aliquis ab eruginosa euadere posset. Et haec febres longos habent paroxismos & pessima accidentia, & propter hoc indiget purgatione cum medicina attractiua quam suprascripsimus, prius ablata caliditate, & siccitate ipsius. Et non est malum ut miscas ipsi medicinae aliquid de polypodio quod arabice dicitur belbeg, eo quod purgat cholera adustam, et grossam & melancholicam, postquam frangeris siccitatem eius cum oleo amygdalarum dulcium, & aperire oppilationes in hac febre proprium existit nisi fuerit excedentis caliditatis, quod

quod si fuerit, tunc intendere debes solum ad in-
frigidandum & humectandum.

Quod est de cura caustionis. Cap. XVI.

HAec febris est intensi caloris & prauorum
accidentium, & dicitur incelsiva, & impossibile
est qd hoc ex cholera naturali generetur. Et in
ista conueniens existit purgare cum medicina
attractiua à principio ipsius, & minuire ex san-
guine si signa sanguinis apparebunt dādo ei om-
ni die x aureos tamarindorū infusorum in aqua
simplici absque syrupo & aliqua alia re dulci, &
post dabis ei bibere aquam hordei, & postea per
totum diem potabis cum aqua angurię, & hoc
regimē proprium existit omnibus febribus quę
sunt in ultima caliditate, & non dimittas aquam
angurię & aquam super niuem infrigidatā: quo-
niam si conuerteris hanc febrem in lentam &
chronicam melius longe existit, quā ut eger
moriatur. Et hoc etiam dixit Abumeron Auen-
zoar de quodā puero quem ipse medicauit: cui
dabat omni die aquā angurię, & quotidie cho-
leram uomebat, & tamen taliter fuit operatus
donec illa febris conuersa fuit ad chronicā, & in-
de liberatus fuit. Et mihi uidetur qd aqua angu-
rię lōge melior existit quā aqua in niue intri-
gidata in hoc casu: eo qd aqua in niue intri-
gidata est in ultima frigiditate, uelociter ta-
mē recipit caliditatē & adhuc magis: quia aqua
cū sit simplex nihil restituit neque pręstat, cor-
pori nisi frigidam qualitatem solum: sed aqua
angurię restituit & addit in sanguinem facien-
do frigidam substantiam & qualitatem. Sed quā-
do febres erunt lentę & longi erunt paroxysmi,
& certus eris quod non ex cholera pura erunt:
sed erit ex vitellina quę naturali frigidior exi-
stet: tunc studere debes plus in aperiendo oppi-
lationes quā in infrigidando contrarium eius
quod fieri debet illa quę fuerit ex cholera pura:
quāuis raro tales inueniantur. Et laudabiles
medicinę in hac parte sunt quę habent uirtutem
aperitiuam absque forti caliditate sicut capillus
nene, & radix apij, & semen feniculi frangendo
siccitatem eorum cum radice liquiritię, & calidi-
tatem cū uiolis, & flore nenupharis, & seminibus
cōibus. Et studeas ponere in medicinis res quę
habent membra principalia confortare, sicut
est mastix & spica nardi componendo ista cum
syrupo squinzibin. Et esto studiosus ponere in
medicinis solutiuis quę habent cholera euacua-
re cū quantitate phlegmatis sicut est semen bru-
lei, semen chartami, frangendo tamen calidita-
tem & siccitatem eorum. Et hac est cura omniū
februm cholicarum.

Quod est de cura febris phlegmatica.

Cap. XVII.

HAec febris cū fuerit ex phlegmate simplici
& naturali, & de hoc fueris certus: tūc studiosus
esse debes in incidendo humores, & in subilian-
do & oppilationes aperiendo, plusquam in frigi-
dando & humectando, & sufficit tibi in hac in-
tentione squinzibin cum iure cicerum, occultan-
do siccitatem eorum cum radice liquiritię. Et
adde huic compōn aliquid ex spica & mastice
quoniam in hac febre stomachus debilis reperit-
ur, & conuenientior operatio in principio hu-
ius febris est lenire naturam cum semine charta-
mi & semine uiscarum fracta siccitate eorum
prius cum tereniabin. Et seruato hoc regimine
per hebdomadam uiam propinabis ei medici-
nam laxatiuam quę habeat illum humorem eua-
cuare, & melior illarum medicinarum est tur-
bith, quia à proprietate habet trahere & expelle-
re humiditatem quę in hore stomachi est, & aga-
ricus etiam cum eo: quia eradicat humorem gros-
sum, & aperit oppilationes, & si addideris ali-
quid ex hierapigra non est malum, confidendo
magis in agarico & turbith, & aliquando occul-
tando & frangendo siccitatem eorum cum oleo
amigdalaru dulcium. Colloquintidam autem in
tuis medicinis uitabis ponere quantum plus po-
teris. Et si apparuerit tibi qd humor sit tanta di-
riciei, qd non possit euacuari absque ea, adde ex
ea aliquid in prædicta compositione occultan-
do maliciam eius cum chachina, & credo qd sit
dragantum & cum amigdalis. Et dosis eius est
media pars aurei, & tales purgandi sunt his quo-
niam in una vice non possunt purgari propter
grossiciem humoris, & hoc non facias assidue
fuerit fortis, consideratis alijs conditionibus in
prædictis medicina uero facta ex turbith in prin-
cipio huius febris non est mala. Cibus uero in
principio huius febris sit puilla parua, secura, eo
qd status eius non est minor trium septimanaru,
& est possibile ut ipsa duret usque ad xl. dies &
ultra. Rasis autem dicit quod transacta septima-
na quarta nō est malum infirmo exhibere troscis-
cos de rosis completos cum aqua cicerum, eo qd
hanc febrem priente in fine leniter deueniunt
ad debilitatem stomachi & hepatis, & cadūt de
facili in hydropisim. Et ego meo tempore uidi
quosdam habentes febres chronicas quibus me-
dici nostri propinabant eis syrupum squinzi-
bin solum, & ceciderunt in hydropisim, & mor-
tui sūt. Et quod dico de trosciscis de rosis in hoc
loco nō dico nisi cā exēpli & similitudinis, tamē-
tu debes dare ex similibus medicinis secundum
plus & minus prout tibi melius uidebitur conue-
nire, etiam qd simile huic intentioni reperitur
est zucharum rosatum, præterquam frigidita-
tis magis uidetur pertinere quā troscisci dicitur.

Et si uidebitur tibi conueniens miscere cum iure cicero syrupum squinzibin facit illud, & si inflatio in pedibus aut in palpebris apparebit tibi, caueas a syrupo squinzibin, quoniam habet perducere ad hydropisum quemadmodum diximus. In febris uero phlegmaticis non recipientibus digestionem, quorum facies & uenter tumescunt, & colores eorum plumbei uidebuntur, Galenus uidetur quod tales sunt euacuandi per frictionem donec vigilant dimidando tempus eorum ita quod dimidium tempus eorum sit fricando, & dimidium sit dormiendo. Et dabimus ei bibere aquam mellis cum hyssopo & liquiritia. Sed Galenus potabat eos aqua hordei, sed eam ego non laudo in hoc casu, eo quia nocet stomacho, & facit horripilationem, nisi cum ea fuerit parum mastice, & piperis, & radicem feniculi, & non debemus eos diu dimittere absque cibo, quia inde recipiunt nocumentum, quamuis leuiter patifamen possint, quoniam quando iste humor mucilaginosus multiplicatur in corpore, talis humor cum difficultate maxima potest ad sanguinem conuertere, & propter hoc uisus eorum debilitantur donec ad syncopim habent prouenire, & ideo eis dare debemus micam panis lotam cum aqua mellis, uel curat uino aromatico. Et hic est modus frictionis qui preceptus est a Galeno in hoc casu scilicet quod habere debes gansapia aliquantulum grossa & uetusta, & in primis incipere debes a superioribus etiam descendendo inferius ad pedes, & postea frica gentia, & postea superiora coarum descendendo ad gentia. Et postea incipiens frictionem ab humeris uel spatulis descendendo per brachia ad manus, deinde fricabis dorsum incipiendo a summitate eius ueniendo usque ad pedes, & sic fiat per totum diem. Et si infirmus senserit laxitudinem in ungue cum oleo non habente stipticitatem, sicut cum oleum camomellinum & anethinum, quoniam est bonum. Et dicit Galenus quod postea abstergere debes oleum, eo quod angustiam prestat, & hoc est quod Galenus uidetur dicere de huius aggritudinis regimine. Et quia in hac febre accidens syncopis consuevit peruenire, ideo memoratus ero eius curam ubi tractabo de curis accidentium obmittendo eorum causas.

Quod est de cura Febris quartanæ.

Cap. XVIII.

Ubi autem quo plus indigemus in hac febre est aperire, incidere, & subtiliare, & modicum in ipsa indigemus frictione, in frigidatione, & humectatione, quasi nihil, & cura huius febris quasi contraria existit curæ causon-

dis eo quod in causonibus attendimus ad febrem solum, & in hac causâ. Et propter hoc eligere debemus medicinas incisivas, subtiliativas, & spleni appropriatas sicut radix capparis, & scolopendria, & tamariscus eo quod istud membrum potens est ferre medicinas fortes & aperitiuas absque nocumento. Et potes conficere has medicinas cum syrupo squinzibin facto ex uua passa. Et oportet in principio te euacuare materiam cum belbeg, id est polypodio extracta uirtute eius in iure galli ueteris, & oleo amygdal. & si nis digestionem expectare in hac febre potes facere propter ipsius modicum periculum quod ferre potest. Et si uis purgare ante perfectam digestionem poteris facere facta incisione cum syrupo predicto per duas septimanas uel tres. Et medicinarum que habent trahere hunc humorem, & purgare sunt iam manifestæ & etiam habent gradus, & quæ in primo gradu reperiuntur sunt myrabolani, di & emblicæ & postea polypodium, & tales sunt qui dimittunt myrabolanos propter eorum stipticitatem, & post polypodium est epithimum. Et operatio istius fortior est operatione polypodij & maiorem corpori infert angustiam, & hac de causa indiget occultatione illarum duarum rerum scilicet remittendo ipsius qualitates primas, & eius remittendo malitiam, & propter hoc non est malum miscere istarum medicinarum medicinarum quæ faciat ipsam uelociter festinare sicut ponendo cum predicta medicina Karacta duo scamoneæ uel tria cum tertia parte unius aurei de maiorana, & hoc non facimus causa expellendi ipsum humorem, sed propter debilitatem & tarditatem ipsarum medicinarum ordinamus dictam additionem ut recipiat inde principium expellendi, post epithimum est lapis lazuli. Sed ab elleboro nigro cauere debes toto posse, completa autem digestionem huius febris a Galeni theriaca collaudatur, & ante digestionem recepta posset ipsam ad causonidem conuertere. Sed si tempus fuerit frigidum, & ætas senectutis existeret diatrion pipercon facta digestionem mirabiliter confert, & maxime in frigidis regionibus. Et indiges in hac febre circa splenem studere, scilicet emplastrando ipsum cum rebus remouentibus ipsius tumorem & eius duriciem resoluentibus quemadmodum in cholericis solliciti esse debemus circa hepar, & in phlegmaticis in orificio stomachi, quoniam membrum istud in quo maxime talis humor putrefcit, & ardet sicut ignis in hac febre melancholica est splen, & in cholericis est hepar, & maxime continuas ex cholera patientes, & in phlegmaticis circa stomachum existit, quare in istis tribus generibus febrium conueniens est dicta membrum confortare & humorem digerere & rectifica-

re. Et si cognoueris in prædictis sanguinem exuberare in principio eos minuere debes. In phlegmatica uero mihi uidetur quod cum timore magno phlebotomia sit facienda. quia in ea multa quantitas humorum crudorum reperitur. In febre autem acuta quæ dicitur muthabecca, & in latino synocha uocatur, scire debes quod quando putredo præualuerit, tunc purgatio existit melior phlebotomia, & si quantitas sanguinis plus ipsa putredine reperitur, tunc melius est phlebotomare quam purgare. Et sic iam finitus est tractatus omnium febrium putridarum generaliter & specialiter. Et postquam curas simplicium cognoueris perfecte ex ipsis scire debes leuiter curas compositarum uelut hemitriteorum & suarum similium.

Quod est de cura hæctica. Cap. XVIII.

Nunc autem mihi remanet de hæctica determinare. Hæc febris cum sit mala complexionis sine materia calida & sicca, ideo intentionis una existit scilicet infrigidare & humectare, & plus indigemus in hac humectatione quam infrigidatione, quare infrigidare debes & humectare cum omnibus rebus quibus potes. Et hoc dupliciter fieri potest, uno modo cum rebus intrinsecis, & alio cum extrinsecis, sicut cum balneo unctionibus & emplastris. Hæc quidem febris tres gradus habere uidetur qui uariantur secundum plus & minus, quorum quidem primus leniter curari potest, secundus difficilis existit, tertius uero minime curari potest. Et cura quidem primi gradus & secundi eadem existit, nisi quia diuersificatur secundum plus & minus. Cibus autem qui maxime conuenit in hac ægritudine est lac, & melius ex eo est lac mulieris, & post ipsum est lac asinæ, & post illud est lac capræ, & est necesse ea à quibus recipitur lac nutrire cibus optimis secundum suam naturam & facientibus digestionem laudabilem, & ipsum in ieiunio dare debemus in ea quantitate qua digeri possit, & conuenit tibi studere ut bene digerat, eo quod lac in sto macho de facili caseari consuevit, quare incipere debes à modico, dando ei primo, uel .j. & sic addendo donec deuenias ad dimidium torulum. Aqua quidem hordei eis magnam habent necessitatem, quamuis corpora eorum maiori indigent nutrimento cæteris corporibus, ideo quia uirtus eorum nutritiua debilis existit, conueniens est studium adhibere in præbendo eis cibaria digestibilia & boni chimi. Quare de canibus laudabiliores quæ eis existunt sunt pulle gallinarum quæ nutritæ sunt ex frumento. Et uitellum oui similiter eis est optimum nutrimentum, capones nutriti ex amygdalis & frumento

eis collaudantur optime. Et si in corporibus eorum calor fortis reperitur non est malum eis propinare aliquid exoleribus aliquibus frigidis, & quæ ex eis magis laudabiliores existunt sunt lactuca, quia somnum prouocant, & ipsi indigent ipso plus cæteris hominibus, & quia uirtutes eorum sunt debiles ideo cibaria eorum debemus diuidere in vicibus pluribus sicut in sequenti dicturi sumus. Sed in balneando eos debemus magnam habere considerationem, eo quod isti non uidentur habere necessitatem calefaciendi, resolvendi, nec euacuandi, quid enim proficies ex infrigidatione accidentali acquisita ex balneo, cum humores inde euacuentur, & hoc non confert nisi mala complexionis materiali. Et postquam ita est mihi uidetur quod ipsi non indigeant aliquo ex aere balnei, & quamuis aqua calida habeat humectare, cum hæc tamen facit resolutionem. Sed balneum aquæ frigida mihi uidetur esse melius si possit ipsum conuenienter sustinere. Et scias quod Galenus manifeste dicit quod ipsi non indigent balneo nisi causa præparationis suorum corporum ut aquam frigidam ualeant sustinere cum aqua balneari debeant in fine balnei. Et balneum secundum ipsum taliter debet præparari scilicet quod infirmum ferre debemus cum lecto suo ibi, & cum fuerit in camera prima ipsius balnei extendere debemus plumarium paruum & cum superponere ibi debemus, & si illa prima camera tepida esse reperiatur ibi cum à pannis expoliare debes, & ordinare debes quod à quatuor hominibus capiendū à quatuor angulis plumarii feratur ad cameram secundam, & ibi ipsum reponant nudum. Sed temperantia camerarum balnei una alteri comparari debet scilicet quod eadem proportio esse debet secundæ ad tertiam quæ primæ ad secundam, & cum fuerit in camera secunda inungi debet oleo tepido, & postea ponendus est in camera tertia, & ibi ponendus est in balneo uel tina aut pila, quod idem est. Et in unaquaque camerarum tantum morari debet quantum ipse infirmus posset incedere suapiter ab uno capite earum ad aliud. Et ex tunc ipse infirmus debet poni in balneo uel tina seu pila aquæ tepida plena, & illic morari debet temperate, & postea balneandus est aqua frigida, & istud est regimen quod aperuit Galenus in hoc casu de balneo. Sed Rasis sentire uidetur quod tales infirmi non indigeant nisi balneatione aquæ tepida. Sed quia impossibile est ut tales quando expoliantur ut eis non eueniant horripilationes, & specialiter in exitu ab aqua calida, ideo necesse est ut tina uel balneum eorum sit in camera temperata quæ non excedat in caliditate uel frigiditate, & aqua similiter temperata esse debet, & sic uidetur ei ut inde aliquod

aliquod iuuamentum recipere debeant. Sed iuuamentū appositionis focus picus est eo quod uirtus istorum attractiua debilis esse reperi-
tur, & propter hoc ponendi sunt primo in aquam calidam, eo quod in illa principium attractionis esse reperitur, & in eadem tantum morari debent quousque membra eorum undique tumescere uideantur. & pori per totum aperiantur, & deinde pix est apponenda. & hæc omnia recitat Galen. ubi loquitur de cura mali-
lie complexionis calidæ & siccæ stomachi. A-
bumeron Auenzoar autem uelle uidetur quod nos eos in tina aquæ tepidæ solum ponere de-
bemus absque intratione stupiæ, & in exitu ti-
næ propinandum est eis lac, & cum digestum fuerit iterum ponendi sunt in tina, & postea dabis eis aquam hordei, & facta digestionem ip-
sius dabis eis micam panis lotam cum rebus prædictis. Sed ex rebus quæ exterius fiunt sunt bal-
neum, & balneatio secundum quod diximus, & etiam aer, quod si fuerit calidus, debemus eum infrigidare abstergendo domum, & sub-
sternendo in ipsa folia frigida, sicut sunt rosæ, & folia falicis, & flores nenupharis, & folia uitis cum suis floribus, studendo uel ingeniando, ut aqua frigida à superioribus ad inferiora de-
scendat. Et ut domus septentrionalis existat. Et quod illæ fenestræ sint apertæ unde sol mini-
me possit penetrare, & illæ claudantur unde po-
test intrare. Et quando aer fuerit frigidus non indigebunt prædictis, nisi ut ipsum trahant si-
cut est, & maxime quando principium malæ complexionis fuerit à stomacho uel à pectore uel ab intestino ieiuno uel à renibus, & ab istis ipsa mala complexio deinde derivatur, & possibi-
le est et quod illa mala complexio incipiat à corde, & inde ad prædicta, & ad totum corpus derivetur. Quare studere debes ad sciendum unde habeat
prouenire febris ipsa, & cum sciueris membrum à quo primo procedit hæc mala qualitas febrilis studeas ipsum infrigidare & humectare absque trahendo ipsum à sua naturali complexione & specialiter si membrum fuerit maximi iuamen-
ti. Et emplastra conuenientia his membris sunt emplastra facta cum rosæ & sandalis & herbis frigidis aromaticis, uel cum cera sicut dicit Ga-
lenus. Et cum infrigidare uolueris principa-
lia addas aromatica & stiptica. Et istud est re-
gimen hæctice cum fuerit in ultimo, sed quan-
do fuerit in principio cum leuioribus curari poterit.

Quod est de syncopi & suis particulis, & omnibus
accidentibus impediendis curationem.

febris. Cap. XX.

Postquam locuti sumus de febribus abs-
que accidentibus prohibentibus curationes ex-

rum nunc tractare uolumus de febribus secum
habentibus accidentia. Dicamus ergo quod
ista accidentia generaliter proueniunt ex om-
ni re dissolvente uirtutem, & hæc resolutio syn-
copis nominatur, & prouenit necessario à ma-
la complexione cordis calida uel frigida. Com-
plexio autem mala calida aut prouenit ex re-
bus extrinsecis, sicut ex acre calido, ut sæpe con-
tingit diu moranti in balneo calido, aut ex re-
bus intrinsecis sicut ex mala complexione to-
tius calidæ corporis ut contingit in causone.
Frigida uero contingit aut ex rebus extrinse-
cis, sicut accidit ambulanti per loca frigi-
dissima, aut ex complexione frigida membro-
rum intrinsecæ plurimi iuuamenti, sicut acci-
dit ex ore stomachi, & ex suffocatione matri-
cis. Aut ex mala complexione totius corpo-
ris frigida ut contingit in febribus putridis quæ
sunt ex humoribus grossis & viscosis, & mu-
cillaginosi, & hæc complexio frigida quan-
doque acquiritur ex superflua euacuatione di-
minuente calorem naturalem quoniam quan-
do calor naturalis superflue diminuitur, im-
possibile est ut possit regere corpus, & omnes
operationes frigidiores debito existunt, qua-
re prouenit syncopis. Non dico tamen quod
ipsa diminutio quantitatis inducat syncopim
sed inæqualitas qualitatum, eo quod cu-
iuslibet generabilis, & corruptibilis causa est
proportio quatuor qualitatum, scilicet calidi-
tatis, frigiditatis, humiditatis, & siccitatis,
quemadmodum in libris naturalibus declara-
uimus. Species autem euacuationum quæ ali-
quando præabundare consueuerunt sunt sicut
superflus fluxus uentris & uomitus, & super-
flus fluxus sanguinis narium, & hæmorrha-
rum & aliorum membrorum, & in mulieribus
superflus menstruum, & etiam quando in
partu superflue exuberant. Et potest etiam syn-
copis prouenire ex ruptura seu crepatura, uel
ex apertura magni apostematis subito, & ui-
gilæ similiter hoc facere possunt. Et etiam ac-
cidentia animæ sicut excedens gaudium & tri-
stitia, quoniam hæc faciunt spiritus exhalare
superflue dilatando, & constringendo, & in-
de in substantia membrorum anhelitus spiri-
tus malam acquirit complexionem. Et etiam
fortis dolor est una ex rebus quæ ducunt ad syn-
copim, & hoc accidit aut ex mala complexio-
ne acquisita ex dolore aut superfluitate motus
uirtutis expulsiuæ facientis dolorem, sicut di-
cit Galenus. Hæc autem quæ dicta sunt, sunt
omnia accidentia quæ habent syncopim facere
& promouere. Et summarie scire debes quod
quando syncopis fuerit cum febre, studendum
est tunc in remouendo & rectificando seu eu-
rando syncopim, quamuis contrarium febri
deatur. Et nos dicturi summa modum eius.

cum ipsis curam tractabimus. Et nunc incipere intendimus tractare de syncopi procedente ex causa crudorum humorum. Dicimus itaque quod curatio huius est regimen prae dictum in curatione harum febrium. quare si ex negligentia, uel defectu ipsius in syncopim inciderint, iuuabimus eos in primis propinando cibum, etiam si in medio fuerint paroxysmi, quamuis nostrae intentioni contrarium uideatur, cum intendamus quod natura aegritudini debeat praeualere, & in hoc casu nihil uino melius reperitur. quare dico quod quamuis uinum sacracenis bibere licitum non sit, tamen in hoc loco ita licitum esse uidetur uinum bibere, quemadmodum eis licitum est comedere carnes morticinas. scilicet quae per se moriuntur uel suffocantur habentibus necessitatem, quare incipere debemus eis dare micam panis infusam uino. Et uinum quod melius reperitur est aromaticum, cuius caliditas penetrare potest per totum corpus, quod sit sine amaritudine & stipticitate, & est illud uinum quod est uinosum pungituum in principio, & post delectabile sine aliqua amaritudine & ponticitate. Et mihi non placent uina in nostris partibus assueta sicut sunt uina picis, ideo quia sunt uina medicinalia & non nutritiua & nocent principalibus membris sua siccitate & acuitate. Diamus cum autem in talibus propinatum cum uino non nocet, & in principio syncopis rorare faciem & aspergere cum aqua rosae, uel saltem conueniens est cum frigida, & si syncopizans habuerit apostema hepatis uel stomachi uel similibus membrorum, non sperare eum curare cum exhibitione cibi, quia cibus plus multiplicat apostema quam fortificet uirtutem. & fricare extrema in hora syncopis conueniens existit. Illis uero quibus prouenit syncopis ex caliditate uel acumine renium, quod scire poteris ex signis dictis ab Hippo: quae sunt nares acutae, oculi concaui, tempora plana, & similia, cura illorum est contraria supradictae, quia ad conseruationem illorum non indigemus abstinentia cibi nec respicere diem ceticam neque statum aegritudinis aliquo modo. Et ex cibis conuenientioribus omnibus est mica panis, uel kist hordei cum granis granatorum, quia in granis granatorum proprietas reperitur resistendi putrefactioni, & ut cibus in fumositate malis conuerti minime possit. & ex cibis etiam qui ipsos habent confortare sunt uitellae ouorum, & testiculi gallorum, & pullae paruae. Et si syncopis fuerit ex errore cibi cibandus est ex pane infuso in uino, & sit uinum aquosum lenius, odoriferum, album, sicut dicit Hippo. & lymphatum sit cum aqua frigida. quod si syncopis prouenit ex humoribus uiscosis macillaginosus, uinum lymphatum esse debet cum aqua

calida, quoniam aqua frigida illis magnum infert nocumentum. Et tu scis quod syrupus pomorum & cydoniorum cum medicinis mulcatis conferunt syncopi, sed non inuamem pro ni, quia natura necessario dominari debet super ipsas ad ipsarum conuersionem. Vinum autem digestionem citius preparatur omnibus alijs cibis & medicinis, ita quod dicitur quod in stomacho non moratur ad digerendum nisi in hepate solum, & in talibus tantum indigemus restoratione & nutritione: quod si inueniri non possit aliud quod nutrire possit absque digestionem illud melius ceteris diceretur, & uilius propter eorum debilitatem, & quia intendimus ipsos citius iuuare quam esse potest. aer autem in quo infirmus iuari debet frigidus & stipticus debet esse, & generaliter tibi necessarium existit, ut talibus ordines omnia quae habent resolutioni obuiare, & emplastrando super uentres eorum & stomachos res stipticas & aromaticas, & si forte in talibus esse fortis reperitur, propinabis eis res stipticas & aromaticas. Et habes syncopim causa apostematis aliquorum membrorum principalium nulla, eius de ipsius liberatione considerare debemus.

Quod est de syncopi proueniente causa stomachi.

Capitulum XXXI.

Syncopis quidem ex stomacho procedens si ex cholera quae in ore stomachi abundauerit fuerit in primis uomitum prouocare debemus, ponendo pennam eis in ore, & si cum hoc eijcere non poterit naturam tunc mollicare debes. Et Galienus dicit ut talibus in hoc casu oleum tepidum dare debemus, quoniam si uomitum non habuerit ab eo saltem natura mollicabitur inde. Sed quia haec medicinae quae habent uomitum prouocare de sui natura est & proprietate stimulare uirtutem, plus eo quod facit humorem efficiens syncopim, & addit in eadem aegritudine, & propter haec dico quod longe melius est confortare eorum stomachos cum mastice & spica nardi, & succo cydoniorum & foliorum uitae, quia taliter uirtus eorum expulsiua confortatur & humorem expellit, & si uomitus a se prouenerit in hoc casu ualde laudabilis existit, in syncopi quidem facta ab humoribus frigidis dabis de electuario diatrion pipereon, studendo extrahere humores quemadmodum dicturus sum in curis cuiusque membrorum.

Quod est de syncopi accidente causa doloris.

Capitulum XXXII.

Dico quod si potes remouere dolorem remouendo causas ipsius non intendas curare cum rebus existetibus contrariis aegritudini, & hac curam iuuenies febris male complexiois quae accidit in unoquoque.

vnouaque membro; eo quod dolor aliquando procedit à mala complexionē calidā vel frigida, materiali vel non materiali, & accidit aliquando à mala complexionē sicca absq; materia sicut accidit dolor in spasmō sicco. Sed quando dolor intantum fortificatur, quod non est tempus expectandi, tunc curare debemus etiam cum rebus augmentantibus causam, stuporificando membrum dolorosum, & hæc cura nō confert nisi per accidens, si priuando sensum illius membri in quo mala complexio reperitur causa humoris ibi existens, & inde dimittitur motus eius expulsiuus. Sicut uirtus expulsiua absque tamen resolutione & spiritu aliqua. Quando autem sensus superfluus membri esse reperitur, tunc certissime si perfluas resolutionis spirituum reperitur. Et quando facimus hanc spem curationis in doloribus à causa frigida prouenientibus in fine, tunc sequitur magnum nocumētum. Sed si causa fuerit calida, tunc non tantum sequitur nocumētum, neque operari debes illam curam in causa frigida, nisi cum infirmus in articulo mortis esse reperitur causa doloris. Et ex huiusmodi medicinis quæ in hoc casu magnam habet proprietatem est philonium, & est rationale propter opium receptum in ipso. Et hæc cura generaliter in omnibus doloribus acutissimis operatur, & in quibus magis necessaria existit est in doloribus oculorum, auris & dentium & intestinorum. Et Gale. præcipit quod minime exercere debes hanc curam nisi postquam pronosticatus fueris infirmo quod in fine ex ea læsionem habere debet, tamen conari debes in remittendo nocumētum quod ex eo cognoueris esse futurum, & in partibus nostris quando uolunt opium operari non faciunt nisi miscendo cum alijs medicinis, sicut est in philonio. Et melius philonium est illud quod non est uetustum superflue, quia in eo uirtus opij est consumpta non recens nimis, quia in eo uirtus opij superflue abundare reperitur. Cura uero cum theriaca in doloribus remouendis est cura causæ remotionis, quemadmodum faciunt illa quæ habent remouere malam complexionem facientem dolorem, & propter hoc in illo casu opus theriacæ laudabilius existit opere philonij. Et cum uolueris remouere dolorem remouendo causam ipsius considerare prius debes quis humor est in causa, quoniam si ex humore calido fuerit, sicut dicit Galen. de illo qui patiebatur dolorem uentris, & extimabatur quod causa illius esset ex humoribus frigidis, sicut pro maiori parte accidere consuevit. Et quandoque dabantur et calida per os aut clysteria ponebantur, dolor in eo semper augmentabatur, & sic cognitum fuit quod dolor erat ex humore calido cholerico imbibito in pelliculis intestinorum, & tunc cibus fuit cibus non facilis conuersionis, & bis eadem propinata fuit medicina

facta cum oleo, & sic fuit liberatus ab ipso. Sed si fuerit dolor ex humoribus frigidis, tunc curabis eum euacuando humorem dictum sicut fecit Gal. in seipso cum clysteri, cum extraxit humorem uentrem, & inde liberatus fuit. Et quandoque etiam fit dolor causa ventositatis fumose quæ resolutur ex corpore ipsius humoris. & talis dolor non est curandus cum medicinis ultimæ caliditatis, eo quod quamuis resoluant ipsam, faciunt oriri iterum ex ipso humore aliam fumositatem, quare cura istius doloris esse debet cum medicinis modicæ caliditatis, & quæ cum hoc habeant uirtutem digerendi. & theriaca etiam in hoc casu magis existit in damenis. Huiusque iam elongatus sum ab intentione materiz, eo quod curam remotionis causæ memoratus ero cum tractabo de crisi remotionum accidentium, & nunc redire intendo ad illud quod prætermisi de mea præscripta intentione superius. Dico ergo quod in doloribus aliquando sunt loca illa remedia, sicut cum pinguedine anseris & gallinæ & anatis, & aliquando sunt cum embrocatione aquæ calidæ & olei & ponendo eos in balneo & cum his similibus. In doloribus uero factis ex uaporibus calidis solum apponimus yentosas cum igne, & hoc tandiu est faciendum donec medicus tempus uel spatium habeat causam remouendi, eo quod maior pars illorum dotorum qui ex uentosis remouentur redire consueverunt, nisi medicus temporis spatij fuerit studiosus ad remotionem ipsius causæ, quia uix esse potest quin error cadat in regimine ipsius infirmi, & inde uidebitur recidiuare, & sic rationabiliter esse debet, quoniam uapores istius humoris semper faciunt paroxysmum donec ex toto sit resolutus, uel ex toto euacuatus.

Quod est de syncopi proueniente ex superflua euacuatione. Cap. XXIII.

SCias quod cura istius syncopis fit pluribus modis. Primus est uel fit trahendo materiam ad partem oppositam. Secundus fit confortando illud membrum unde fuit materia ne ipsam superflue spargere possit. Tertius modus fit stringendo uias unde fluunt humores ad locum. Quartus modus fit impediendo uirtutem expulsiuam quando superflue expellit sicut fit in illa passione quæ cholerica nominatur, & in arabico dicitur almayda in qua uomitus & secessus simul sunt, quæ curatur stringendo & ligando crura & brachia, & ponendo eos in balneo, & cum hoc etiam in eadem necessitatem habemus ponendi stipitica inius & extra. Sed quia balneum superflue habet soluere & euacuare, ideo cum timore magno tales in balneo ponendi sunt, etiam exhibendo eis stipitica, & etiam de istis adhuc locuti

erimus quando tractabimus de cura male complexionis. materialis dum euacuatur de membro ad membrum. *cap. q. XXIIII.*

Quod est de syncope superueniente ex superfluo fluxu sanguinis natum vel aliorum membrorum. Cap. q. XXIII.

Cura sanguinis natum si fuerit ex nate dextra ponenda sunt uentosa. hypochondrio dextro superhepar, & si fuerit ex sinistra ponenda sunt super splenem, & similiter si ex menstribus super fluxerit ponimus uentosas super mammillas, & cum hoc propinanda sunt stiptica quae habent constringere orificia uenarum.

cap. q. XXIII.

I S A A C I S

D E F E B

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

Quod est de syncope proveniente ex superfluo fluxu sanguinis. Cap. q. XXIIII.

Vigilijs subuenimus cum cibis quorum proprietates sunt inducere somnum, & cum actionibus prouocantibus somnum, sicut est oleum nenupharinum & uiol. & oleum de seminibus cucurbitarum, & cum odofatinijs inducentibus somnum, & etiam debemus dare eis nimum lymphatum si fuerit sine febre. Hae autem omnia supradicta diximus ad rectificationem seu curationem prauiorum & periculosoium accidentium febribus superuenientium. Cura autem remotionis causae rememoratus ex quo tractabo de curis accidentium & malorum apostematum.

cap. q. XXIII.

R A E L I T A E

R I B V S

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.


cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.



De genere feb. & diuersitate & causa & significatione eius. Cap. I.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

cap. q. XXIII.

comparauit. Quia aqua enim ea, cum frigidum vas impleuerit, ipsam ex calore suo calefacit. Similiter circa cor faciunt hu. & alias partes corporis. Hæc itam febris uasis comparauit calidis frigidæ aqua plenis, aqua enim in his ex calore uasorum calefit.

De ephimera fe. et causa eius et significatione.

Ephimera febris in corpore permanet, 24. horis, in integra die & in integra nocte sicque uidetur recedere, aliquando tamen in hoc tempore diutius uidetur immorari, aut 48. aut 76. horis, huiusmodi oritur fuit causa aliqua primitiua, cuius primitiua quatuor sunt genera. Vnum genus est eam in triplicem corpus patitur & calefit, aut actualiter, sicut calore solis & ignis & ære balnei cum quis immotetur ibi, aut potentialiter, sicut aqua sulphurea lauati & similibus, aut constipatione pororum æquali, sicut ex frigida aqua, contingit quæ foris in interiora claudit corporis, aut ex constipatione potestatiua sicut aqua lauati aluminosa. Non autem omne corpus constipatum ephimeras patitur feb. sed tantum illud a quo fumus calidus, aut siccus adunatur, cuius cum poti oppilerit, fumus exire & dissolui prohibetur, & ita calor coadunatur. Si autem materia humorum corporis non preparata sit putredini, ephimeras febris facit, quod si preparata sit febris ex putredine facit secundum qualitates humoris intus inclusi, uel oppilati, huiusmodi febris acuta est & molesta, sicut dicturi sumus. Secundum genus primitiua ephimeræ est quæ ab interioribus accedit corporis, sicut de cibis & potionibus calidis. Tercium genus ex nimio est motu, aut in corpore sicut nimia exercitia & laboriosa, aut in anima sicut ira, angustia, tristitia, & uigilia. Quartum est causa quam exteriora patiuntur membra, sicut a postemate calido in inguinibus & pedum uulneribus, cum n. ab inguinibus calor membratim ascendit ad cor, à corde ad cetera corporis membra uenit. Est autem significatio feb. ephimeræ cum præcesserint causæ iam dicendæ. Infirmus nimium non patitur dolorem in initio, pulsus eius equalis parum tamen diuersus & absensus. Diuersitas cito in æqualitatem redigitur, & in tactu calor est quietus, lenis & non pungitiuus, sed sicut balneati est tactus. Infirmus uero facilis est in patiando morbo. Vitia autem habet hypostasini in fundo & lenem in morbi tempore toto, neque nimis fetet urina, cum uero fe. discesserit, aut cum sudore perfecto descendit, aut cum parua quadam infusione, quæ cum recesserit nullum signum sui infirmo relinquit, sicut feb. putredinum facit, quæ & in pulsu, & in urina remanet. Si uero post ephimeram æger balneetur in balneo, neque

sensit rigores neque punctiones, sed in priores reuertitur duas qualitates. hæc sunt significationes feb. ephimeræ. Significatio uero unde fiat est huiusmodi, quæ de solis est incensione, uel de calido aere, oculos in tactu calefacit, caput incendit, entem & faciem exiccat quibus si manus apponatur, calidæ inueniuntur, pulsus paruus & uelox, ex constipatione nascens pororum, cutem facit conueniam & solidam, cui si manus apponatur in initio paruus calor sentitur. Sed si mox recur calor augmentari sentitur, calor enim non apparet propter poros constipatos, sed cum manus diu inhiereat sui calore poros laxat, & ita calor demum emergit, qui se prius occultauerat, oculi eorum & facies parum tument, pulsus non est paruus, quia uirtute custoditur & calore naturali intra corpus, parum tamen est diuersus & occultus, horum urina aut citrina est, aut al. quia humores aquosi qui de corpore solent dissolui, cum claudantur ex constipatione cutis urine commixti suo colore mutati, rubore quoquo modo sunt commutati, hæc tamen fe. aliquando in feb. putridas mutatur, si in corpore sint hu. apparatus ad feb. putridas, Oportet ergo discernatur inter ephimeram & apparatus putredini. Siigitur recedit cum sudore laudabili & pulsu equali, significat præculdubio ephimeram. si autem moretur in corpore, neque à calore totum corpus mundificauerit, & pulsus fuerit diuersus, & urina non digesta & fetida, mutatio in feb. putridas designatur. Cum uero feb. moratur, neque in prima periodo discesserit, sed quasi continua fit, uel synochus, & pulsus fuerit diuersus, & ex urina nulla putredo significatur, oportet te male suspicari, & hæc itam rem expectare, & ex parte plurima mutabitur in acutissimam, hu. enim putridi, neque sudore, neque dissolutione euanescent propter conclusionem pororum, unde festinandum est in medicanda hac feb. medicamine quod dicturi sumus, antequam putrescant hu. & pessima nascantur feb. Febres nascentes à rebus mutantibus corpus, sicut cibus, aut ex eorum sunt quantitate, sicut fastidio & saturitate, aut ex qualitate utpote ciborum siue potionum calore. Nascentium à saturitate significatio est talis, fumosa ruuatio & fetida, sitis nimia, ardor ex cibi corruptione, aliquando habet solutionem ventris, aliquando constipationem, sed constipatio in his est molestior propter conclusiones malorum chymorum in interioribus corporum, Quæ ex ciborum siue potionum nascuntur calore, huiusmodi notatur significatione, facies & oculi in tactu sunt calidissimi, & rubicundissimi, hæc par similiter in tactu calidum & infirmus in stomacho & hepate quasi sentit incensionem & siccitatem, & in ore amaritudinem & similia, quia calor in hac feb. à spiritu incipit naturali, & cibus calidus in primis stomachum & postea calefacit hepar qui illius

lius sunt fundamēta. Urina autem in feb. ista ru-
bea est alihina; Febribus autem modo nimio la-
bore uel motu corporis nascentibus, si labor sit
fortis dura & sicca redditur cutis, & post recessu-
m feb. permānet pulsus parvus, quia ni-
mius labor dissoluit uirtutem, sed si labor nō sit
moleus, cutis duriciēs remanebit dum febris se-
cesserit. & post de cute fumus exiens humectat
cutem. porosa perit, pulsus magnus est, quia uir-
tus in hac feb. multa est; & calor augmentatur,
quia non fuit labor molestus. Si enim labor non
molestus fuerit, augmentatur calor corporis, ta-
ctus in laborio sa feb. secundum qualitatem est
aeris si labor præcesserit. q. si aer sit calidus sicut
calore solis & similibus: non multum cutis exic-
catur, & si aer sit frigidus, tactus cutis erit frigi-
dus, neque sicca multum erit cutis. Si feb. ex mo-
tibus animæ nascitur, sicut ex ira & similibus tali-
ter notabuntur, multum exeunt oculi, facies ru-
bet & tumet, calor enim in hac feb. experit exte-
riora corporis dum uindictam homo sibi qua-
rit, pulsus magnus, urina exiens punctiones facit
& ardores propter calorem. Si ex angustia sit
& tristitia, oculi sunt concaui, facies sicca & citri-
na, quia spiritus & calor fungiunt in interiora.
pulsus parvus propter caloris diminutionē eius
demque occultationem. urina rubea ardorem fa-
ciens cum exeat. Febris ex uigilijs oculos conea-
uos facit & humidus dormitioni cōgruos, pal-
pebras graues & dure mouentes, facies & totū
corpus sunt inflata, & citrinitati uicina, quæ om-
nia contingunt ex debilitate digerendi cibum.
digestio. n. cibi molestatur uigilijs. cibis uero in
digestus non generat spiritum, uel sanguinē ani-
malis, & sanguis si non generetur necesse est co-
lor mutetur. Item ex indigestione sequitur albe-
do urinae. Si feb. propter apostema in inguini-
bus uel alijs corporis membris nascatur, taliter
significabitur, facies rubet & inflatur propter sā-
guinem & calorem corporis non pungentem.
Cum autem in statu progreditur, ascendit suauiter
fumus calidus corpus, magnus sit pulsus &
uelox atque spissus, urina albedini pertinet, ma-
gnus & uelox atque spissus erit pulsus ex uirtute
& multitudine caloris. Infirmus enim duas pati-
tur infirmitates calidas. 1. apostemata & feb. ip-
sas. albedo urinae: quia chole. urinam tingentia
tendunt ab apostema. omnis enim dolor pro-
priae habet humores sibi trahere. Hæ sunt signi-
ficationes unde ephemeræ febr. omnes intelli-
guntur species.

De putredine febrium & causa earum, & causa
periodorum earundem. Cap. III.

Febres putredinam ex putredinibus nascun-
tur quatuor humorum, quia hu. calefacti cale-
fiunt membrum calefacientes ubi putrescunt, &

postea alia illi membra uicina, sicque membra
tota ad cor, de corde ad arterias peruenit calor,
& de arterijs in omnia membra corporis. Et cau-
sa unde putredo nascitur est: quintupla: multitu-
do quantitatis humorum, grossitudo eorum, co-
clusio humorum ab oppilatione nata, humores
enim qui dissolui non possunt putrescunt, sicut
humiditate in ydemus putrescere exteriorum quæ
non habeat aeris capacitatem. Species autem fe-
brium ex putredine nascentium multe sunt, Sūt
enim simplices, sunt & cōpositæ. simplices quia
palam sunt, sicut & hu. quatuor sunt. non quod
uocatur synochus quæ ex putredine nascitur, hoc
autem molestationem facit: quia quiescere in fir-
mum non permittit. Secundum genus excho. mi-
nascitur & citreus uocatur: qui una die accipit
& alia die permittit qui est salubris & brevis. Sa-
lubris qui corpus una die quiescit. brevis: quia
humor unde nascitur subtilis est & uelox & cito
digeritur, citoque dissoluitur. Tertium ex pu-
tredine nascitur cho. vi. & uocatur quartana
una die incipiens duabus quiescere permittens:
sed salubris est & longa salubris: quia corpus deo-
bus diebus quiescit, longa: quia materia uade na-
scitur dura est ad digerendum & grossa, & ad dis-
soluendum inobediens. Quartum genus ex pu-
tredine phlegmatis nascitur, & amphimeria
dicitur omni die inuadens, est autē longa & mo-
lesta. longa quia materia est grossa. & uiscosa:
unde non est digestibilis dissolubilis, molesta:
quia p. die inuadit nec corpus quiescere per-
mittit, unaqueque harum multipliciter diuiditur.
Febris enim quæ ex putredine sanguinis nasci-
tur in tres partes diuiditur. Est enim quedam ab
initio usque in finem æqualis, & uocatur æqua-
lis. hæc autem est cum tantumdem finitur sangui-
nis quantum habet putredinis. Est & altera quæ
in initio est debilis, sed postea crescit, cum au-
tem in finem peruenierit, molesta fit: postea mi-
nuitur quoad debilitetur, hoc est cum plus san-
guinis putrescit quam finiatur. Est & altera in in-
itio fortis, & postea debilitatur quoad omnino
deficiat, hoc est cū plus finitur sanguinis quam
putrescat. Febris quæ ex putredine nascitur hu-
morum aliorum, unaqueque in duas diuiditur,
una est continua, altera interpolata, sicut iam di-
ximus. Cum enim hu. qui febrium sunt materia-
les, intra arterias sunt & uenas, & in ipsis putre-
scant, feb. continuas necesse est fieri, quod si ex-
tra uenas & arterias sunt & putrescant, interpo-
lata feb. faciunt, unde feb. ex putredine nascentis
sanguinis continua fit, quia intra uenas & arte-
rias est sang. & interdum cum putredo sangui-
nis in parte sit perforat per totum & comburit
ipsum, & feb. non dimittit quoad pars finiatur
quæ putrescit & digeratur, atque dissoluatur. Fe-
bris ex alijs nascentis humoribus est continua,
quia humores intra uenas & arterias putrescen-

tes nō cito possunt dissolui propter constipationē, & suam viscositatem. unde postquā finita sit primatemanet pars sui caloris quoad secunda succedit, & à secunda ad tertiam, & ita fit continua. Si autem hu. extra uenas & arterias putrescant febres interpolatas faciunt, quia quæ putrescit eum in nō loco sit. paulatim ad putredinis locum accedit, cuius collectio in tempore illo est cum interpolatur inter duas accessiones. Aliquando quoque putrescit sanguis intra uenas & arterias, & febr. facit continuas quia cum in uno membro multa adunetur quantitas, & purridum apostema faciat, & ex constipatione pororum quam facit apostema propter putredinem calefacit membrum, necesse est ubi est apostema, & calor membrati uadi per arterias, & à corde per eas ad omnia membra, & ita febr. non dimittit donec apostema digeritur & mundificatur. hæc est causa cuiusdam feb. continuæ, & cuiusdam interpolatæ. Diuersitas periodum febrium ex causis tribus est. Vna est putrescentium humorum uelocitas uel eorum tarditas. Secunda collectionis humorum qui putrescere debent. uelocitas uel tarditas eiusdem. Tertia purgationis eorum uelocitas uel tarditas unde amphimerinus omni die accidit propter uelocitatem suæ collectionis quæ contingit ex multitudine suæ quantitatis, & facilitate suæ putredinis propter humiditatem & tarditatem suæ purgationis propter viscositatem. Cholera ni. facit febr. una die accipientes & duobus non, quia tarda est ad collectionem propter suæ quantitatis paruitatem ex dricicie putredinis propter frigiditatem & siccitatem, & ex uelocitate purgationis: quia non est materia ipsius melancholiæ multū viscosa. Cholera rub. febres unius diei, & alterius non, facit, quia est media inter cholera nigra, & phlegma, minoris etiam est quantitatis quàm phlegma, maioris uero quàm cholera nigra, & phlegmate est sicior: cho. uerò ni. humidior substantia: quoque eius leuior est his duobus. hæc est causa diuersitatis peryodicæ feb. & ex hac causa temporis sue passionis est diuersitas; quia amphimerinus ad multum 18. horis permanet propter grossitudinem & viscositatem phlegmatis non cito dissolubilis, quartana ad plurimum. 24. est horarū propter materię suæ grossitudinem, & viscositatem, quæ cito non putrescit, & si cito putrescat, non cito tamen dissoluitur, similis enim est lapidi uel ferro. ignis enim hæc non cito calefacit: quæ etsi calefiant, cito tamen refrigescunt. Vera tertiana ad multum 1. 3. durat horas, quæ ex lenitate sit materię, & viscositatis suæ paruitate. ut cito putrescat & dissolui queat. Aliquando harū feb. tempus in quibusdam est longius, in quibusdam uero breuius, quod ex tribus causis consequitur. Vna est materię natura, quæ si grossior

& uiscosior & frigidior sit longior erit. Si autem subtilior & calidior & minus viscosa sit breuior. Secunda secundum quantitatem uirtutis infirmi. Si autem est fortis ut materiam eijcere & purgare cum sudore possit breuior fit, quod si defecta, longior. Tertia est ex figura corporis, quia si corpus est rarum & pori aperti sunt leuior est, materia enim cito dissoluitur & exit, si uero corpus est uiscosum & constipatum, & pori non sunt aperti est longior, quādo autem eadem breuitatis suæ totam se coadunat, fit breuissima, si autem extra sit longissima. Cum autem febr. sit brevis infirmus quiescit post recedente peryodi, donec altera succedat, & corpus à febribus mundificatur, si autem febr. longa sit infirmus non mundificatur à febr. quoad altera subsequitur, neque interpolatur ut quiescat infirmus, & ita se habet febr. ista quāsi continuā. Oportet autem te intelligere, quia febr. periodis sit semper stabilis in ordinatione sui donec putredinis materia in qualitates mutetur alias, neque cum alijs humoribus se misceat ne in ordinatione infirmi peccatum fiat. Quando autem ista materia à sua qualitate in species mutetur alias, neque cum alijs humoribus se misceat, ut si quis sanguis mutatus incendatur & putrescat, subtilis autem pars in cholera mutetur rubeam, grossa uero in nigram, aut si alij hu. putrescant & febres secundum suam naturam faciant. aut si infirmus fecit pessima, unde generentur hu. febres diuersas secundum sui naturas facientes, unde omnia ordinationem periodi sunt corruptentia & mutantia ut ante suum tempus festinent, aut in alias periodicas feb. quàm prius fuerit se immutet. Est autem multitudo & minoratio in hac causa secundum quantitates humorum se mutantium & actiones eorum, hæc sunt species febrium ex putredinibus simplices, & causa diuersitatis suarum periodum.

De significatione putredinis febrium.

Significatio putredinis febrium aut est secundum genus suum, aut secundum species earum. Genus significatur cum ex putredine febres esse denunciantur, quod ex tempore accessionis earum intelligimus, cum debilitate incipiunt, & postea augmententur & confortentur, quæ cum recedunt partem caloris in corpore dimittunt neque perfecte recedunt. Item ex caloris substantia, quia calorem oportet esse pungentem & corpus inflantem, sicut flamma ignis rarificantem. Item ex accidentibus feb. comitantibus, quia hanc rigor & tremor in initio sequuntur, & diuersitas in pulsu, ablatio digestionis in urina per hypostasis non appareat lenis, quæ omnia cum videantur feb. ex putredine esse intelliguntur.

Significationes specierum singularium, quia feb. periodis tertiana, aut de re naturali, aut non naturali, aut de re cum extra naturam nascitur. De re naturali cum ca. & sicca est natura infirmi, cui cho. dominatur ru. aetas est iuuentus, tempus anni est estas, aer calidus, & sic. De re non naturali, cum infirmus antequam feb. inciderit ca. & sic. comederit, & habet angustiam & tristitiam vigiliis, laborem nimium longi temporis ieiunium ars eius ferraria, aut fornacina, quae omnia corpus calefaciunt, & deficiant & cho. ru. generant. De re extra naturam, quia quaedam feb. ex calore est forti, & sicut acus cuspis est pungibilis, quae ex cho. ru. ex acumine, calor eius in tactu fortis & acutus atque pungitius, pulsus in initio peryodis parvus & defectus atque rarus, & tamen non permanens nisi paruum tempus, & in magnitudine & diuersitate mutatur. Magnitudo eius quia cho. ru. est leuis, neque grauat uirtute, & tunc ex magna necessitate refrigerandi calore. Diuersitas enim fe. est propria maxime eius quae ex putredine est, sed tamen hac non diuersitas est multa quia eius leuis est materia, neque uirtutem grauat. Urina huiusmodi fe. est ignei coloris putrida, & cum siti nimia, angustia, abominatione, uomitu cho. ru. nimio sudore propter subtilitatem materiae, aliquando quoque succedit egestio cho. ru. Cum has significationes inuenias, aut earum plurimas, iudicanda est esse uera tertiana, maxime si haec feb. multos fatiget in tempore ullo anni. Quartanae autem significatio aut de re naturali, aut non naturali, aut de re extra naturam. De re naturali ex complexione infirmi frigida & sic. & sibi dominatur cho. ni. aetate senili, tempore anni autumno, aere frigido & sicco. De re non naturali, cum infirmus ante cibos acceperit unde cho. ni. genita sit, sicut lentes, caules, carambiam, carnes caprinae, & bouinae, & similia. De re extra naturam cum aut res antecedit, sicut ante hanc alia feb. sit composita, & durities splenis, aut cum praesens sit, res apparet quando est accessio. In initio rigorem habet vel nimium tremorem cum grauitate & nimia fatigatione & totius corporis forti frigiditate, pulsus raro & tardo atque multum diuerso, cum autem augmentetur habet calorem non acutum, neque pungitium, non ergo sicut calor est tertianae, pulsus mutatur in uelocitatem & spissitudinem quam in initio fuerit maiorem, sed tamen ad comparationem tertianae rardior & minor, si res parua. Urina putrida & indigesta. Feb. declinante sentit infirmus frigiditatem, & cum recedat pulsus est tardus, rarus, diuersus, & urina colore diuersa & non digesta. Cum has significationes inuenieris, aut plurimas, quartanam ueram esse iudica, maxime si in illo tempore anni quartanam patiatur plurimam. Significatio quotidiana febr. aut de re naturali, aut non natu-

rali, aut extra naturam. De re naturali, sicut si complexio infirmi frigida & humida sit & sibi dominetur phlegma, aetas eius aut pueritia, aut senium, pueritia propter gulositatem, senium propter multitudinem phlegmatis in corpore eorum, tempore anni hyeme, aere frigido & humido. De re non naturali cum infirmus in sanitate sua gulosus & bibosus sit, multum quiescens, piger sepe balneans post cibum. De re extra naturam cum infirmus sentit dolorem in ore stomachi, & humiditatem in lingua, inflationem in latere mutato colore, siti parua, rigorem & frigus nimium habet in extremitate corporis & duri, cum autem tangas corpus in hora accessione non apparet calor nisi cum moretur manus & calefit & aperiantur pori, calor habet humiditatem propter phlegma, parum acutus est propter putredinem, aliquando sudans parum, aliquando non, durat autem in tempore longo propter putredinem, atque permanet in corpore usque ad secundam accessione, pulsus minor est pulsus quartanae & spissior, paruitas propter phlegma, quia deficit uirtus ex frigiditate eius & dissoluitur, & angustatur propter multitudinem quantitatis eius, unde multum est diuersus. Spissitudo eius ex necessitate recipiendi magnitudinem eius. Urina quodam tempore subtilis & alba, & quodam tempore turbida & grossa. Subtilis ex coactione pororum propter grossitudinem, & uiscosam materiam, albedo ex frigiditate est phlegmatis, grossitudo & turbulencia, quia natura aliquando aperit illam uiscositate & expellit grossam & uiscosam humiditatem quae fuit causa coactionis. Rubor, quia si phlegma mouetur & putrefiat, necesse est calefiat. Quas significationes cum inuenieris ex parte plurima certificanda est uera quotidiana, maxime si multi patiantur hanc in illo tempore. Oportet autem te intelligere, quia feb. amphimerinos cum materiam habeat uitreum phlegma in initio habet paruum rigorem. Si autem sit ex falso, in initio est multus rigor. Si ex acido frigescit in initio. Si ex putredine sit dulcis phlegmatis, nihil horum habebit. Ex his ergo significationibus intellige feb. ex putredine peryodicas esse & simplices. Oportet item intelligas, quia rigor in feb. incipit a dorso mulieribus, uiris ab extremitatibus manuum & pedum. Feb. autem continue significatio uniuersalis est, quia post 24 horas non recedit, neque rigorem, neque tremorem habet, neque sudorem, nisi cum tota recesserit, pulsus multum est diuersus, urina indigesta. His significationibus conuincitur intelligitur. Significatio uniuersalis quae species est, quia in ea quae sit ex putredine tanguntur inueniuntur graue corpus infirmi, & fatigatum, flatus, pulsus cum angustia & siti, oculi rubicundi eorum pleni, & rufa facies & totum corpus pertinet rigori & quasi inflatum est, pulsus nimium diuersus,

diuersus, urina rubra, alihina. Quæ ex putredine aliorum hu. est hanc habet significationem quiescit infirmus, sicut in febribus continuis. Quæ nascitur ex putredine cho. rub. vocatur caufon, ex mollicie & mitigatione doloris intelligitur in die habes remissionem & fortitudinem & augmentationem in die accessionis, & sequuntur eam nimius calor, atque sitis maxima, & angustia & acumen, propinquitas ad perditionem alienationis mentis, cum molestior sit & acutior, tanto crispis est uelocior, nascitur plurimum his quibus in corporis venis cho. multa adunatur, & maxime in his quæ in contanitate sunt hepatis, & in pulmone & in ore stomachi, unde sitis semper sequitur. Oportet autem hæc omnia refrigerari plusquam alia. Feb. continua nascens ex phlegmate habet remissionem quando dimittit, & confortatur cal. quando incendit. Quartana continua nascens ex cho. ni. habet duorum dierum remissionem, & in die accessionis caloris confortationem. cum his significationibus quas diximus certificatur simplices species ex putredinibus.

De febribus compositis & causis earum & significationibus. Cap. V.

Febres compositæ sunt multæ & diuersæ, quia aliquando componitur tertiana cum quotidiana, aut tertiana cum quartana, aut tertiana & quotidiana cum quartana aut quotidiana, cum quotidiana, aut quartana cum eadem continua, aut tertiana peryodi cum tertiana continua, aut quotidiana continua cum quotidiana peryodi aut quartana peryodi cum quartana peryodi, aut tertiana peryodi cum tertiana peryodi, & aliquando componuntur sibi inuicem tres ex his febribus, aliquando quatuor, & compositiones aliæ sunt plurimæ. Hæ compositiones sunt bifformes, aut secundum uiciniam, aut secundum similitudinem. Si autem ambæ materię quæ ambas feb. faciunt commisceantur & complectantur se accessiones & recessiones eiusdem sunt temporis, si secundum uiciniam, & unaqueque locum habet propriam, accessiones earum in duobus temporibus sunt diuersæ, & si militer recessiones earum. Omnes hu. qui compositi sunt, aut æquales in quantitate sunt, aut quidam plus, quidam minus habent. Et feb. compositæ, quædam habent proprium nomen, quædam uero non, habens proprium nomen est hemitriteus, i. media tertiana. Hæc enim feb. componitur de feb. phlegmatica continua & peryodi tertiana, si sit uera, quando non est uera componitur aut de tertiana continua & phlegmatica continua, aut de tertiana peryodi, & phlegmatica peryodi, & aliquando ex duabus feb. in uirtute equalibus. Hæc etiam feb. componitur aliquando ex duabus quarum una maior est altera. Hæ autem sunt significationes specierum compositarum feb.

Significationes unde unaqueque possit intelligi, sunt hæc. compositæ secundum uiciniam faciliores sunt intelligi de tempore suæ perseverationis. Quod si fe. continua componatur cum febribus peryodibus: peryodes intelliguntur de rigore quæ habent in actionis tempore, continuæ ex sua stabilitate. Si uero compositio sit secundum compositionem, intellectus harum durus & molestus est propter diuersitatem suarum significationum, maxime si complexio sit æqualis durus & molestus est, si autem una ex materiis in complexione dominetur, sit leuior intellectus, quia significatio dominantis apertior erit. Oportet autem acuas discretionem, tuamque in his subtilem intelligentiam, & non confidas in peryodi compositæ feb. neque credas interpolationi suæ significationis, aliquando enim duæ sunt retentiones quæ accipiunt quotidie, quas multi medici putant esse continuas. Aliquando etiam duæ componuntur quartanæ accipientes omni tertia die, & putantur esse tertianæ, in quibus non secundum quod oportet solent medicari, unde fe. confortantur & augmentantur, & aliquando perit infirmus, quia medicina necessitati est contraria, & propter hoc oportet te ingeniare ut intelligas fe. de essetia suæ naturæ & de actionibus proprietatis suæ secundum quod meminimus nos dixisse ut certificatis significationibus comperat medicina febrientibus neque confidas in duratione feb. Feb. composita ex phlegmate & cho. ru. quæ uocatur hemitriteus si uera sit, significationes habet quatuor, unam qui est continua, aliam quia quotidie interpolatur, & una die leuior accipit & facilior, altera uero durior atque molestior, facilitas eius propter feb. phlegmaticam omni die inuadentem. Rigorem non habet propter materiam in uasis contentam. Molestatio eius & duricies in altera die, quia in die tertianæ cum forti uenit rigore, quia in tertiana solet euenire, & mouetur feb. phlegmatica, quæ omni die solet inuadere, unde die illa molesta est & dura. Tertiam quia patitur in tempore accessionis maximum rigorem, aliquando in una die bis uel ter uel quater. Quartam quia suum tempore est æquale, dum forti assimilatur forte, & debili debile. Hemitriteus non uera est composita cum feb. in uirtute equali, quædam cum altera fortiori, sed in compositione æqualis si est cum tertiana peryodi, rigorem omni die facit, una tamen die est debilis cum rigore, & habet frigiditatem, in corporis extremitatibus. Vna die cum forti rigore & tremore, punctione quam & acumine. Quæ autem est composita cum tertiana continua, & quotidiana continua, non habet rigorem neque tremorem, composita cum tertiana continua, & peryodi quotidiana similis est ueraci, sed tamen feb. huius rigor non est fortis, quia est phlegmatica feb. & ideo neque pungit neque acuta est, quando

quādo hęc febris componitur cum febribus nō equalibus significatio dominantis palam plus erit, & debilior occulta. Hęc sunt significationes febrium ex putredine quę sunt composite. Aliquando quędam accidentia sunt in febribus cōpositis & simplicibus. Vnde inter se diuersantur ex calore suę materię & diuersitatibus. Idem unaqueque à simili denominatur, quędam enim commixta nimię humiditati uocatur eloidis, quędam cuius calor nimium est incensus & uocatur caufon, quām semper nimia sitis sequitur, & in lingua nigredo, & in stomacho punctio, in qua cum tangatur corpus nimia incensio sentitur, & est feb. in qua infirmus sentit calorem & frigiditatem simul in corporis interioribus & exterioribus. Hoc autem in phlegmatica contingit cum ex putredine nascitur phlegmatis, calor enim in feb. ista propter putrescens est phlegma frigus ex nondum putrescenti, & uocatur ytelus & est in qua sentit infirmus nimium calorem in corporis interioribus & tepiditatem in exterioribus, quod ex grossitate & uiscositate est materię, & propter hęc calor non potest exire ab interioribus ad exteriora. Et est in qua sentitur nimia frigiditas in interioribus corporis quę ex phlegmate frigidissimo cōtingit, & uocatur euiliados. Et est in qua habetur nimius calor in corporis interioribus, & de calore illo ascendit furus acutissimus in corporis extremitatibus, & consequitur, quia non est uiscosa materia unde efficitur, & propter hoc cito est dissolubilis & furus exit, uocatur autem feb. ista tynoros. De sunt omnes species quę de putredinibus nascuntur humorum.

De febre hæctica & causa & significatione eius.
Cap. VI.

Feb. quę uocatur hæctica, diuiditur in duas species. Vna uocatur senectus in qua naturalis humiditas finitur, & succedit siccitas dominans per omnia corporis membra quę deficcantur, & rugantur, & calor naturalis dissolutus finitur. Senectus ideo uocatur, quia cum senes ætatem decrepitam ingrediantur, calor eorum naturalis est extinctus & siccitas illorum membris dominatur, quia humectatio eorum finitur, unde hoc nomen huic febre datum est à simili. Secunda species phthisis uera est. phthisis uero est collectio caloris extra naturam in solidis membris quę humectatio corporis finitur, & in tria diuiditur. Vnum est quo humectatio deficcatur quę in paruis uenis habet per unicumque membro pertinentibus, unde tenerorum caleat humectatio membrorum, sicut est pinguedo & crassitudo, & hęc uocatur phthisis absoluta. Secundum est quo humectatio finitur quę in teneris est carnibus, & incipit calor ab humectatione quę in mēbris est similibus, quę humectatio est sicut ros

aut aeris umbra, hęc est quę uocatur hæctica cōsumptiua. Tertium est in quo hęc humectatio finitur, & illa humectatio incipit calefieri quę in cōiunctionibus est fundamenti cuiuslibet membri, quę uocatur phthisis & consummatio. Phthisis uocatur propter consumptionem humectationis in membrorum fundamentis, & propter siccitatem eorum quę molliem quę ex finita sequitur humectatione ea membra solidat, sicut uidemus in terris nascentibus quę cum deficcari incipiunt emollescunt & ita consumuntur. Causa unde hęc febris nascitur, aut antecedens, aut primitiua esse comprobatur. Antecedens est si feb. putredinis in morans incensa fuerit, & calor ab humectatione incipiens cordis, membrorum quę fundamentis eam finit, quęcumque autem febris est huiusmodi in initio cōsumptiua sit se. sicut hæctica nascens ex hemitriteo, & apostema calidum in pectine natum cuius calor propter uicinitatem suam tendit ad cor, & arteriarum humectationem consumens, & membrorum humectationem deficcans. Aliquando hęc eadē nascitur ex defectione quām infirmus ex acutis patitur pas, unde medicus cogitur dare syrupum. In hac deficcatur cor primum, deinde fundamenta membrorum. Causa primitiua est angustia, ira, tristitia, labor, uigilie, ieiunia maxime si iuuenilis est ætas, cōplexio ca. tempus æstiuum, & ordinatio infirmica. quę de huiusmodi causa nascitur, phthisis & consumptio uocatur. Significatio unde intelligitur, quia se. ab initio molesta & dura non inchoatur, mala enim cōplexio quę est ca. equalis est per totum corpus & nō diuersa nec infirmus sentit in corpore suo calorem febrilem, neque dolorem & fatigationem, neque aliquam significationem quę ad febrium attineat putredinem, sed calor igneus est transiens toti cordi dominatur æqualiter, neque membrum aliquod est sine calore, quod calorem sibi sentiat contrarium esse. Calor enim nondum ad plenum incipit augmentari ut significationes possunt perpendi. unde hęc dura est sanari, cum non in initio ualeat intelligi quę medicina ualeat subueniri, cum tamen ad consumptionem perueniat, aperta sui monstrat indicia, sed tamen impossibile est sanari, quia corpus propinquat perditioni. Eius tamen significatio talis est in initio, si febrem inquam inchoantem tres dies uidemus continuantem, neque calorem habentem fortem, neque aliam etiam significationem caloris febrium ex putredine atinentem utpote rigorem & tremorem, sitim, angustiam, siccitatem, & in lingua nigredinem, fatigationem, capitis dolorem, urine putredinem, pulsus magnitudinem, & eius diuersitatem, aliāque signa quę febrem ex putredinibus sunt comititia, calorem quoque quietum & mansuetum, & tribus uel amplius diebus continuum, sed tamen

men confortatum cum cibum accipiat, in nocte dormiat. febris hæctica proculdubio est intelligenda, eius talis ab initio debet esse significatio. cum uero augmentatur ab humectatione uenarum inchoatur, unde infirmus consumitur, calor eius minuitur, cutis desiccatur, facies tenuatur, oculi concuantur, imo totum corpus consumi- tur, calorq; ab alia incipit humectatione. quod intelligitur, quia oculi concuantur, lipiuntur, palpebre pendunt inferius ac si dormiretur. hæc aut omnia ex uirtute sunt defecta, totum corpus exiccatur, & rugatur. splendor & flos uitæ auferuntur. cutis faciei siue totius corporis sit thetinosa sicut corium super ossa extensum, tempora planiora, auriculæ contractæ, color citrinus, spatula eleuata, uenter siccus. q; si tangatur sub diaphragmate, omnia uiscera sicca inueniuntur, & quasi non apparent exterius, uenter thetinofus, & cum dorso iunctus, calor corporis in initio tactus debilis, & cum immoretur manus fit acutus, pulsus durus & extensus quasi chorde debiles & firmatæ. hæc sunt significationes feb. hæctice, & eius causæ.

De cura febris ephimeræ quæ fit propter calorem solis. Cap. VII.

Febri itaq; ephimeræ quæ fit propter calorem solis differt ab illa quæ fit propter calorem æstiuæ aeris, quia illa quæ est de calore solis maiorem capitis infert calorem quam toti corpori. Illa uero quæ fit propter æstiuum calorem aeris plus calefacit corpus quam caput. unde huius febris utilior hæc est cura, ut aerem qui subtilis est, & cibum infrigidemus & humefaciamus & in pavemento domus sternamus flores refrigerantes & frondes calidosque fumos extinguentes sicut uiolâ rosam nenufar frondes philij semperuiam, salicis frondes, & frondes basilicon, hæc omnia semper sunt cum aqua frigida uel rosata infundenda. Et licet basilicon sit calidum in tergo gradum tamen proprietatem habet inducendi frigiditatem aquæ per nases. Sed oportet nos patientium nases sæpe humectare cum oleo viola. & nenufarino in aceto mixtis & similibus. Vngenda sunt tempora de sandalis camphora & aqua ros. si non habent reumata. Quod si habuerint reuma cauendi sunt ab aceto & camphora. Ad nases eorum apponamus fumum aquæ calidæ ubi cocta sint uiolâ & camomilla, caueant ab omnibus olei inunctionibus. Quod si non habuerint capita de humorum fumositatē plena, neque reumate bonum est ut capita eorum roremus post declinationem febris aqua in qua decocta sint uiolâ & camomilla, quia si capita eorum plenitudinem habuerint abstineant se ab hac aqua & solummodo fumum eius odorant. Succum vtriusq; gene-

ris malorum granatorum accipiant. Comedant melones palestinos, uuas hyemales, medullam tritici & cucumeris omnia cum niue refrigerata si niue fuerint assueti. Vinum bibant mixtum cum sirup. malorum gran. & uiol. Si egestio eorum fuerit sicca humectanda erit cum sirupo uiol. uel de prunis & oxifenicia factis & his similibus. Post febris declinationem bonum est si balneentur in temperato balneo aerem & aquam habentē temperatā. Manducant in initio prandij medullas citruli & cucumeris cum zúccaro, & micam panis in aqua lotam. Mundificatio autem stomacho de humorum copia & febris fumositatē expulsa, demus pullos gallinæ ceos perdices coctas cum iure condito de succo maligna, & aceto uuarum agrestium & cum ramis potulacæ, & similibus.

De cura feb. ephimeræ propter aeris frigiditatem.

Cap. VIII.

Patientes ephimeram propter aeris frigiditatem oportet eos ante omnia cauere a balneis priusquam morbi fiat digestio & uiolentia febris sit declinata. Cumque morbum uideris digestum esse & febrem declinatam, mittendi sunt pedes eorum usque ad genua in aquam calidam in qua cocta sunt camomilla, sanfucus, yfopum, sisymbrium, abrotanum, & similia. Inclinentur super fumum eius, deinde balneum temperatum ingrediantur & fricentur ibi, ut pori eorum sint aperti, & calor qui ad corporis interiora coadunatus fuerat dispersitus sit & dilatatus, quædam pars etiam eius sit ad exteriora corporis egressa, sanabimus capita eorum cum aqua calida in qua cocta sunt camomilla, anetum, & misceantur in aqua quædam olea uirtutem dissolutiuam habentia, ut sunt camomileon, yfleon, anetileon, & cauendi sunt ab epithimatis, nisi cum omnis sudor fuerit egressus, ne causa epithimatum pori claudantur & materia quam necesse est cum sudore exire, non possit exire, sed permanens in interioribus corporis maximum generet nocementum, & ducant patientem ad magnam molestiam perditionis. Cauent ne diu in solio morentur quia aqua licet sit humectatiua magis cæteris rebus, eius tamen caliditas perforat corpus usque ad interiora, unde fumum cum sunt in corpore exstantes calefiunt, repugnat eis grossities aquæ, & ideo melius est si in aere morentur quam in solio, quia solium implent poros & claudit eos cum humiditate aquæ. Aer uero balnei poros aperit & fumositatem corporis dissoluit. Idcirco exercitia sunt istis conuenientia, quia exercitia temperata dissoluant & rarificant corpus sunt & uia qua fumi eorum transeunt. Oportet illos accipere subtiles cibos & laudabilem chimum generantes, & nullam eis frigidationem facientes,

facientes, sicut sunt hedulina caro & annu-
agnus & similia. Et quia secundum nostram in-
tentionem oportet eorum corpora non hume-
dari cum artificio conuenienti, & iura sint con-
dita cum albumine oui paucis cœpis, & modico
cimino carni cinamomo & similibus, abstineat
se a grossis cibis & uiscosis, potent uinum cum
aqua calidum, multis operiantur indumen-
tis, & iuxta eorum latus apponantur carbones
ignis ut repugnent aeris frigiditati. Naribus
odorifera applicentur, quæ temperatæ sunt, cale-
facientia sicut sunt sanfucus, yreos, simbrim,
& de fructibus sicut sunt citruli & similia. Qui-
cunque eorum reuma habuerint, caueant sibi à
balneo nisi morbo cessante.

De cura ephimera propter balneum.

Cap. IX.

SI ephimera sit propter balneum aquæ stipti-
cæ, sicut vitreæ sulphureæ aluminosæ, etsi cutem
habeant sicciorem & magis oppilatam quam
superiores, tamen eius feb. curatio similis est su-
periori. Oportet enim sicut diximus ne balneen-
tur nisi febre declinante, sed postquam declina-
ta fuerit deponant pedes eorum usque ad genua
in aqua quam diximus, deinde in temperato bal-
neo balneentur. Cauendi sunt ab omni olei in-
unctione, bonum est si aliquantulum exercitiis
utantur. Cibus leues accipiant qui sunt faciles ad
digerendum & bonum generent chimum, & ali-
quantulum frigiditati pertineant, ut ualeant
fumorum ad interiora coadunatorum acumen
extinguere. Vinum non bibant nisi corporis ple-
nitudine careant, & cum omnis fumositatis à cor-
pore fuerit expulsa.

De cura feb. ephimera propter cibos & potus.

Cap. X.

Oportet patientes ephimeram propter cibos
& potus calidum hæpar in initio curari cum ox-
zaccara & succo maligna cum aqua rosæ & cam-
phora & cibos accipiant, s. portulacam atriplicem
scariolam pullos gallinæ, cucurbitam & similia.
Cataplasma hæpar stomacho, tamen cibus
inanito, de sandalis, rosas, farina hordei, aqua ro-
camphora & similibus. Comedant melones pale-
stinos mala granata, citrini pomi medullam co-
ctam mespila, uas muzas & similia.

De cura ephimera propter ieiunium.

Cap. XI.

IN statu ephimera quæ sit propter ieiunium
nullum cibum oportet dari, sed succum accipiat
malorum gr. & uuarum, hyemalium succum sor-
beant. Quod si hæc eis non sufficiant & fames

eos percutiat, dandus erit succus mices panis cum
zuccara loræ. Declinatæ itaque febre si uiderimus
succum esse digestum, dabimus puiscanam cali-
dam & expectabimus quousque sit digesta, dein-
de mittemus eos in balneum, & cum corpus ca-
lesceri incipiet & sudorem emittet omnino un-
gendus erit oleo uiol. ut claudens poros repu-
gnet humiditati corporis ne extrinsecus exeat,
deinde dietentur leuibus cibis & subtilibus &
ad digerendum facilibus atque sanguinem tenuem
generantibus.

De cura febris ephimera propter laborem.

Cap. XII.

SI ephimera sit propter laborem, sicut æquita-
re, laborare, ambulare, oportet ingenari ut re-
quiescant. Deinde oleo uiol. uel nenufarino un-
gantur. Quod si labor modicus extiterit, fricen-
tur corpora eorum multum, si autem multus fri-
canda sunt parum, postea in temperato balneo
sepe lauentur, neque ullam moram in eo faci-
ne substantialis humiditas eorum consumatur
& in hæticam incidant. In solum descendant ut
corpora eorum humefiant, exeuntes autem so-
lium cum oleo uiolæ. uel nenufarino ungantur
ut clausis eorum poris humiditas accidentaliter
acquisita intus in corpore eorum permaneat.
Caueant coitum ne corpora eorum desiccetur,
accipiant starnas, perdices, pullos, gallinas, heda-
los annuales, agnos, pisces laudibiles digestionem
obedientes. Potent uinum subtile & multum mix-
tum quod membra eorum humefcet. Vinum
enim corporis penetratiuum est, quo eum te a-
qua cum eo dirigitur & membra humefacit.
De fructibus comedant malagranata, uas, pri-
na, mala, & similia.

De cura febris ephimera propter bubones.

Cap. XIII.

Ephimera quæ sit propter bubones oportet nos
ante omnia studere ad curandas pustulas & apo-
stemata, quæ cum bubonibus fuerunt. Deinde
balneentur, in acre balnei morentur ut humo-
rum copia paulatim dissoluatur, nec aliquo o-
leo ungantur, qui uolentes in solum descendere,
nec in eo morentur, dietam accipiant subti-
lem & ad digerendum facilem, & substantiam
laudabilem habentem.

De cura febris ephimera propter uigilias.

Cap. XIII.

IN ephimera propter uigilias oportet magnam
impendi studium, ut prouocemus somnum cum suau-
fricatione pedum; hoc enim trahit humores in capite
existeres, & repugnat fumo ad caput ascendenti.
Cibum

Cibum accipiant modicum qui sit facile ad digerendum quia natura propter defectionē non multum suffert cibum, uinum bibant temperatum in quantitate & uirtute, & à coitu omnino sibi caueant quousque ad proprium eorum statum & usum conuersi fuerint.

De cura febris ephimera propter iram.

Cap. XV.

QVando ephimera sit propter irā, necesse est ut in eius initio ingeniemus quō cor eorū cōfortetur & calor extingatur, quod sit cum expulsionē irē quam ipsi obtinent, deinde in temperatum mittantur balneum. s. prout eorum fuerat consuetudo, & post sudorē ungantur oleo uiol. & camomil. & postea descendant in solum ibi tamen diu non morentur. Egrescentes à balneo comedant frig. & hu. abstineant à uino quousq; calor eorū declinetur, sin autem multum mixtum illud accipiant, Caueant sibi à coitu ne putrefactis eorum humoribus in putridas incendant febres, aut ne humores ab eorum capite descendentes apostemata generent.

De cura febris ephimera propter angustiam.

Cap. XVI.

INter angustiam & tristitiam est differentia, quia tristitia ad rationalem pertinet uirtutem in cerebro existentem, angustia uero ad spirituale uirtutem in corde existentem, ideo angustia sit magis causa phthyfis quā tristitia. Igitur, quia perfecta medicina est quæ causam ægritudinis tollit, necesse est ab ea incipiamus & ingeniemus quomodo possimus ab eis auferre cogitationem & suspensionem cū diuersis generibus musicorum, & cum omni causa lætitiæ prouocāte ut obliuioni tradant tristitiā, & quiescat anima eorū à labore, quia anima præ cogitationis nimietate debilitatur atque infirmatur. Similiter & corpus infirmatur propter animam, sicut dicit Aristoteles, uitium animæ sequitur complexionem corporis, & corporis complexio animam comitatur. Proinde oportet non negligere corpus, sed adiuuemus illud cum rebus humefaciētibus. Caueant sibi ab omnibus cibis desiccatis ne causa eorum ueniant ad phthyfim, quia hæctica magis pertinet ad istam quā ad ceteras ephimeras. Siccitas enim istorum corporibus dominatura, & corda eorum sunt calidiora: unde oportet illos humectari, scilicet cum balneo temperato & descendāt in solum, deinde ungantur ex oleo uiol. Dietam accipiant frigidam & humidam quæ sit facilis ad digerendum sicut prisaia, hæbuli, cucurbita, atriplex, portulaca, blitis. Vinum bibant quod non sit uetus & multum mixtum. De fructibus uero

humectantibus concedatur sicut sunt uua, melones palestini, & similia.

De phthyfi & hæctica & eius cura.

Cap. XXVII.

Ostenso uniuersali disputatione de omnibus ephimeris, omnimodo expedit ut de cura phthyfis & hæctice disputemus. Sed quia phthyfis alia naturalis & sit in senibus decrepita ætate, alia nō naturalis quæ duobus modis sit, aut cum febre, aut sine febre. Sine febre aut calida aut frigida. Frigida phthyfis consumit corpus, & sit uel propter diuturna apostemata, uel propter alios diuturnos morbos. Hi enim morbi qui sunt diuturni nimium de substantiali corporis humiditate dissolunt, unde in frigidato corpore uirtus digestiua debilitatur. Ideoq; cibaria cruda & indigesta permanent. Phthyfis quæ est calida & sine febre sit propter calidos chimos cordi oppositos, quorum fumus ad cor ascendens mutat eius complexionem eique accidentalem parat calorem, unde sanguis corrumpitur, & membra ab eo non nutrita consumuntur. Oportet ergo ut in frigida phthyfi primitus hæpar confortemus ut cibaria digerantur, & hoc cum rebus digestiua adiuuantibus uirtutem sicut ligno aloes, galanga, & zinzibere, pipere longo, cinamomo, spica, gariofi, & similibus. Dieta similiter uirtutem digestiua adiuuet sicut caro pullorum, perdicum & huiusmodi. Vinum bibant roseum uel dactylicum uel palmecum uel cum supradictis rebus factum. Balneentur aliquando post cibum quia digestiue conuenit uirtuti. Nonnunquam exercitentur ante cibum ut uirtus fortior sit in digerendo.

De signis & causis hæctica & phthyfis.

Cap. XXVIII.

CUm in theorica de hæctica & phthyfi sufficenter disputauimus, placet hic de ea parum differere ut in eius cura non erremus. Phthyfis itaque quæ est cum febre duobus modis est, aut ipsa est per se morbus, aut per aliud. Quæ uero per se est morbus sit à rebus calefacientibus, & desiccantibus. Altera uero causa eius est ephimera, maxime si propter animæ accidentia fuerit sicut propter uigilias & cogitationes tristitiæ aut angustiam legere & inuestigare. Phthyfis uero quæ cum febre sit & propter alium morbum quatuor sit modis. Aut de ephimera cum proprio terminum transit, aut propter acutam febrem cum calefacit, & ultra modum exiccat, aut propter putridas febres, aut propter diuturnas ægritudines sicut tussim, dolorem pectoris diaphragmatis & his similia, quæ si prolixæ fuerint corpus calefaciunt & desiccant.

De diuisione hæctica. Cap. XVIII.

Hæctica tribus fit modis. Vnus est in uasis sanguineis & in uenis humorum existens, & dictus rosaceus. Secundus est humiditas in membrorum concavitate in quibus nondum natura per fecit tertiam digestionem & dicitur cambium. Tertius est substantialis humiditas qua reguntur & custodiuntur membra quæ in uasis sanguineis existit, & dicitur glutæ siue humiditas spermatica. Est prima species leuior hæctice, proinde hæc species est ad curandum facilis si patiens in sapientis manum incidat. Medicus enim si incipiat calorem extinguere uelociter cum frigidis & humidis, sicut cibis, & potibus aere & similibus, citissime sanabit infirmum. Quod si calor humiditatem membrorum desiccet quæ coagulationi est uicina, fit secunda species hæctice quæ dura est ad sanandum. Quod si calor membrorum iam perfectorum humiditatem exiccet, fit tertia species hæctice quæ incurabilis est; quod possumus perpédere ex calore solis & ignis qui in longo tempore humiditatem lignorum exiccat & separat. Calor. n. ignis humiditatem lapidis exiccat & in calorem convertit, hæc sunt causæ hæctice propter aliū morbum. Causa hæctice quæ non est propter alium morbum humiditas est in concavitate cordis uenis & arterijs inhabitans; quæ si calefiat & in caliditate & siccitate propter aë exercitia mutetur, fiet prima & simplex spēs hæctice quæ per se est morbus; hæc itaq; facile curatur. Sed si calor augmentetur, ut humiditatem cordis arteriarum atq; uenarū desiccet, fit secunda pars hæctice quæ nō cito curatur. Quod si calorem substantiale cordis arteriarum & uenarū humiditatem desiccet, fit tertia spēs hæctice eritq; incurabilis. Oportet aut intelligi quia si oīa membra fuerint desiccata & infrigidata, nullam faciemus eis curam quia molestum est. Sed si hæc fe. cōposita fuerit cum febre de putredine difficilis est & dura sanandum, quia sunt contrariæ & oppositæ, febris. n. putridæ necessaria est res lauatiua & colatiua & desiccariua ut lauet corpus & desiccet humores qui sunt cā putredinis, & hæctice cōuenit res refrigerans & humefaciens ut infrigidet & humectet calorem febris & laudabilem corpori præstet humiditatem, unde utraq; cura est inter se opposita. Bonum est ergo ut cura hæctice auferatur per contrarium sicut labor cum quiete, uigilia cum somno, tristitia cū lætitia, ira cum patientia. Danda est sola aqua calida cum accessio putridæ febris uenerit uidelicet cum rigore incipit. Quod si uomitus sponte veniat bonum est, sed si nō cū leuistico prouocemus. Acumine cessante & angustia infirmi quiescente & appetitu cibi surgenti damus ptisanā & panem bis uel ter lotū in aqua frigida cū zucca. Damus ordeū cum lentibus coctum, sed lentes sint mūdæ &

elixate & prima decoctionis aqua auferatur, deinde cū hordeo misceatur. Similiter ramis portulacæ; lactucæ cum modico coriandri recentis aut ueteris cū aceto & zuc. & modico croco. Si uero sit febr. de putredine phlegmatis ponendū erit in uice portulacæ & lact. parū mēthæ & apij & blitis, sūmo mane acipiant rodozacarā & uio lam cū zuc. mixtā. Sed si ca. f. feb. hæctica nōdum uenerit ad humiditatem quæ coagulationi est uicina, demus succum scariolæ lupuli & apij, sed tamen raro ne affuescant illos sepe maxime succo apij, quia calorem hēt & siccitatē. Dandi sunt trocisci de rosīs & de berberis, quandoq; mastix & maratrū cū rodozacara. raro tamen tribuatur. Oportet ab aqua frigida oīno cauēri. Sed si necesse fuerit coquatur cū modico mastice, mixta cū aliquo syrupo detur. Quod si apostemata patiuntur in uisceribus omnino abstineā ab aqua fri. & prohibeant eā ne ad cor ueniat quoniam si ad cor ueniret cum sua frigidi. extingueret calorem naturalem. Oportet iterum ne cibus in accessione putridæ febris tribuatur neq; parum ante, quia angustia dabit infirmo & fe. augmentabit. Sed si accessio sit mane ea. aquam damus rigore incipiente, & præcipiēmus infirmum malumg. fugere in tempore accessionis, accessione uero cessante dabimus ptisanā, digesta ptisana offeremus cibū. Sed si fe. in medietate diei incipit augmentari, mane dando erit ptisana, sed rigore incipiente ca. dabimus aquam ut uomitus prouocetur. Recedente quidem fe. damus ptisanā. cūq; digesta fuerit cibum donamus prout oportet, sed tamen minorem quantitatem cibi quam natura digerere ualeat incipiente quidem rigore, uomitum cum aqua ca. prouocabimus.

De hæctica simplici & eius cura. Cap. XIX.

Si hæctica sit simplex bonū est ut curam illius causæ incipiamus per contrariū, sicut tristitia cū lætitia, ira cū patientia, uigilia cum somno, labor cum quiete, & similia curat suis cōtrarijs. Deinde expellamus materiam putrefieri incipientem cum medicaminibus mundificationibus absq; caliditate & siccitate sicut est succus lupuli cum rodozacara uio. zuc. myrobala māna, casta fist. & similibus mixtis. Materia uero purgata ordinemus aerem, quia necesse est ut sit fri. & hu. & locus sit septentrionalis. Indumenta sint fri. & hu. sicut linea, & sint lota & aromatizata cum sandal. & aqua. ro. Cibaria sumant infrigidantia, & extraneum calorem extinguentia, & naturalem confortantia, & substantiale corporis humiditatem custodientia, sicut sunt ptisana; panis lotus bis aut ter in aqua frigida aut panis albusissimus infusus in uino albusissimo & bene mixto, & olera sint sicut lactuca, portulaca, cucurbita, bleta, arriples

plex, omnia condita cum amygdaleo. De fructibus sicut sunt malag, utriusque generis, melones palestini, mala, muza, pira, uua hyemales & similia. De syrupis, syrupum malorum gra, & iulep accipiant, mittamus in aquam quam bibere uoluit spodium, sandalos albos, semen portulacae & similia. De aromatibus sicut sunt frondes & flores confortatiui, refrigeratiui sicut sunt rose, salices, myrra, uiole, nenuphar & sandal. Caucant camphoram propter siccitatem quam habet, nisi sint herbae in suis capitibus substantiam humidam habentibus quae repugnent siccitati camphorae. Non enim humiditas capitis siccitati ualet repugnare camphorae nisi cum maioris quantitatis fuerit quam siccitas camphorae. Cataplasma uero quae hepatis sunt apponenda concedamus ut habeant camphoram, quia naturalis humiditas hepatis repugnat siccitati camphorae & conuenientiam ad temperamentum. Sed de hoc recipiendum a sophistis, quare inquit humiditas cerebri siccitati camphorae non repugnat, cum cerebrum naturaliter sit humidius ceteris membris corporis. Quibus ita respondemus: Cerebrum semper moueri propter imaginationes & rationes, quia est fundamentum sensuum & uoluntarij motus, & fumi semper ascendunt ad illud, & calorem etiam aeris plus patitur quam hepatis, & ideo cerebrum accidentaliter est siccius quam hepatis, licet ceteris membris sit humidius naturaliter. Quandoque damus troiscos de spodio & bolo quoniam syrupis quos diximus damus pituitum si egestio sit humida. Solutio enim uetris in hac passione pessima est, quia membra defecta humores non possunt expellere per poros qui in interioribus corporis clausi renouantur ad intestina, & in eis duas faciunt actiones ut lubricationem ut egestio nequeat retineri, aut exoriant ea & nascitur dysenteria. Si autem tempus fuerit hyemale & frigidissimum panis cooperiantur, ne frigiditas aeris cutem desiccet & fumos claudat in interiora. Sed si tempus sit aestiuum domus infirmi sit spaciola & septentrionalis, & portae sint septentrionales, & in pavimento domus sternamus rosas uiole, nenuphar, salices, basilicam, semperuiam, ramos nitium, & carui, modicum aquae super eas roremus. Quod si corpus eorum inducit materiam ad putredinem preparatam, unguamus corpora eorum de succis lactucae, portulacae, uuarum solater, cum oleo rosato mixtis. Haec tamen inunctio super eorum pectoribus non diu moretur, quia instrumento tum spiritus est percussus. Quod si uirtus eorum fuerit defecta & membra dissoluta & uenae apparent albae propter sanguinis inanitionem, ossa quoque brachiorum subtilissima, eorumque concatenatio inanita proxima portenditur mors.

De haetica qua fit propter alios morbos. Cap. XXV.

Sed si haetica fuerit propter alios morbos sicut frenesis, tussis, acuta febris, & huiusmodi prohibemus patientes ab aqua & frigidis, & ab inunctione succorum quos superius diximus, nisi cum apostema per quod est febris futura sit calidissimum, quia calidum apostema trahit ad se humiditatem aquae & prohibet eam ne uadat ad cor & noceat calori naturali. Unde Galen. aqua inquit frigida in haetica quae est propter alium morbum pessima est, praecipue si morbus fuerit diuturnus. Palam est ergo quod non debet dari aqua in haetica. Debiles cauant aquam, necesse est ergo ut festinemus ad restauranda eorum corpora in uirtute nutrimenti cum cibis & potibus qui sint faciles, & subitici & multum nutritibiles, sicut est tritum album & grossum, aut rubrum grossum, sicut Hippo. in apho. facilius est repleti potu quam cibo. sed tamen non dandum est purum in ieiuniis, quia membris & maxime stomacho praestaret caliditatem & siccitatem, nec subito & inultum dandum, quia sic uelociter membrum non nutrit, si sit multum & grossum faciendo moram in angustis locis oppilationem generat, unde oportet nos illud negare in agnitione existentibus uel eam excurrentibus, & maxime haeticis. Cibum accipiant mediocre, facile nutritantem & quiddam grossiciei habentem ut permanens in membris nutriat & confortet. Intentio Hip. non fuit de potu absolute, uel humidis cibis absolute, sed de rebus natura corpora facile & leuiter nutritantibus sicut sunt uina, quaedam grossitatis habentia & in membris permanentia, nutrimentum eis inferentia, inferunt ergo nutrimentum de cibis facile nutritantibus & naturae obedientibus sicut sunt, lac, pituita, panis lotus, & similia. Sed si cognouerimus corpora eorum nullam habere materiam seu humores qui sint ad putredinem parati, cauendi erunt à lacte, & solummodo pituitum & panem lotum accipiant. Vniuersaliter dicimus quod lac & uinum poticum, perdices & similia non sunt danda, nisi certissime sciamus febrem ab eis esse ablata. Haetica uero extincta damus: mane lac caprinum statim emulsum, misceatur tamen cum aqua calida, ad suauem ignem coquatur usque ad aquae consumptionem, deinde calidum prout ab uberibus emulsum fuerit accipiat, quo digesto de mus istamos, perdices, pullos gallinaceos omnia infcellata, uinum album & poticum mediocre mixtum. Sed si non potuerint lac bibere miscendum erit cum hordeo uel similia tritici. Deinde balneemus eos in balneo aquae lapide in temperato aere, & calor aquae sit quasi calor lactis cum ab uberibus est emulsum. Et quoniam in istis potri sunt clausi & oppilati naturaliter, & nostra intentio est ut aperiantur, & cum nulla res possit in

ueniri quę poros deoppilet & dilatet & cutem mollicet sicut aqua calida, ideo de balnei utilitate & quo tempore & qualitate ipsius & de folio balnei & quantum morari debeat est differendum.

De balneo aquę calidę. Cap. XXI.

Oportet autem diu in folio morari & aqua folij sit temperata & folium sit spaciosū, & ostium balnei uicinum, & aqua non sit multum calida, quia cum suo calore nimis cutem indurat, neque multum frigida quia in corporibus debilibus calorem extinguit naturalem & cutem oppilabit. Mora balnei, quia si uidemus rubicunda & inflata corpora fieri & incipiant minui eos a balneo extrahemus, quia si dimittamus eos plusquam oportet, consumuntur. Ideoque si uolumus carnem in corpore augmentare dimittamus in balneo quousque fiant rubicundi, & inflati. Si uero eam minuerē uolumus post inflationem dimittamus eos in balneo donec inflatio transeat, & ipsi ad suam naturam fuerint reuersi. Egredientibus itaque a balneo ungamus eorum corpora cum oleis frigidis & humidis ut custodiantur humiditas quam ab aqua susceperant ne aer illam consumat. Rursus oportet ut in diuersis temporibus balneentur. primum balneū sit mane, priusquam lac aut prisanum accipiant. Secundum uespere postquam lac & cibus sunt digesta sed si amplius balneentur optimum est si uirtus eorum sit fortis. Bonum est autem si lac super infirmum fuerit emulsum priusquam in folio descendat, & huiusmodi flores & frondes mittantur ut uiola lactuca & similia. Si autem infirmus est ab humoribus mundificatus ad putredinem se preparantibus, demus eis balneum exeuntibus lac asininum cum ab uberibus fuerit emulsum. Hoc enim lac huius passioni optimum est, quia ceteris est subtilius & tardius ad coagulationē. Alina sit iuuenis & sana, lac sit album mediocriter inter liquidum, & spissum. lacte digesto iterum ad balneum mittantur. Quod si in eo delectentur eo quod eis assuetum fuerit, tertio ad balneum dirigantur, sed spacium unius alio septem sithoris, postea cenent perdices, pullos gallinæ & alas gal. Sed si uidemus eorum corpora multa refectionis quantitate carere, dabimus lac vaccinum, butyrum tamen ab eo prius sit extractum prima uice duas vnc. & sic ascendendo usque ad decem. Sed quia lac ceteris cibis facilius omnia corporis membra nutrit, erit omnibus laudabilius ad phthysim maxime mulieris puellam lactantis, post hoc asininum, tertio loco caprinum. Capra uero nutriatur cum hordeo, lactuca, endiuia, coriandro frondibus celsi & his similibus. Si solutionem patiantur extinguatur lapis calbis uel ter in lacte ut aquositas eius consum-

matur. Quod si uirtus eorum confortata fuerit demus canculos fluuiales coctos in hordeo uel similia uel tri. Palam est ergo quod si hæctica sit simplex & corpus sit absque ulla putredinis materia damus aquam frigidam & cetera in frigidatiam & humiditatem maxime si uirtus imbecillus non fuerit. Si hæctica sit propter aliquod supradictorum prohibemus aquam frigidam, & cetera in frigiditatem uinum tamen eis concedimus, quia naturale confortat calorem, sit tamen mixtum & album & lene. Sed quia phthysis est consumptio totius corporis & maxime pulmonis, oportet ut de cura pulmonis parum disputemus.

De cura pulmonis ulcerati. Cap. XXII.

Primo si vulneretur ex cholera & emitat sanguinem da farinam hordei conditam cum lacte amygdalę dulcis uel uvis purgatis passis. Aristoteles in libro secretorum aureis literis scripto, dicit quod non solum pulmonis defectionem & siccitatem, uerum, & totius corporis humiditatem possumus restaurare. Hordeū excoctum ponamus super regulam siccam, donec rubere incipiat, deinde laua & pugillum plenum cum galina crassa pone in magna olla & tam diu bulliat donec caro separetur ab ossibus, & aquam illam da bibere, & fac etiam syrupum de succo cucurbitę in pasta inuolutę & coctę cum zaccara.

De phthyfi sine febre. Cap. XXIII.

In phthyfi quę est sine febre damus syrupum factum de zucca & iringi radices, pecorinam carnem non multum ueterem, uinum non multum uetus. Sedeant in aqua ubi cocta sint sanlicus basilicon yreos frondes citruli, fumigantur de ligno aloes, caueant a coitu, pronocentur eis somnus.

De phthyfi calida. Cap. XXV.

In phthyfi calida si habuerint tussim & screant album & uiscosum & grossum phlegma, damus apozima de hylopo, & electuarium, quod. Rec. sebesten. liiubas. 30. liquiritiæ vnc. i. uarū passarum enucleatū. dr. 25. capil. ve. vn. i. ficus. 10. omnia in 10. lib. aquę coquantur, donec redeat ad duas, deinde da. vnc. 4. ad bibendū cū. vnc. 10. dozac. postea comedant ius frumenti & seugre ci. Accipiant ex hoc elect. Rec. maratri radi. apij radi. an. vnc. i. seminis maratri anisi ana. dra. 2. malue sem. dr. 3. lini sem. iuiube an. dr. 20. ficus siccas septē, uarū passarum enucleatū. dra. 5. omnia in 6. lib. aquę coquantur, quousque ad duas redierint, dabis omni die ad bibendum. vnc. 3. cum rodo zaccara viol. zuccara an. vnc. i. Quod si calorem non habeant tempusque fuerit hyema.

le cum melle dr. 5. accipiant illud. Trocisci qui valent ad phthysicos hepaticos cardiacos. Rec. gummi arab. berberis boli ana drag. 4. basilicon amoglossæ ana. drag. 2. coriandri sicci. drag. 2. & sem. infusi in aceto, & ad solem siccati, dragag. 2. amidi seminis citroli cucu. an. drag. 2. seminis mirtæ dra. 4. seminis malorum citoniorum seminis herbæ acetosæ. ana. drag. 2. liqui. dra. 3. reub. dra. 1. & sem. karabe geminæ non perforatæ an. drag. 2. Omnia trita cum aqua ro. temperentur & trocisci ex eis fiant, dabis ex eis drag. 2. Eleuarium conueniens phthysicis tussim habentibus maxime quibus in pulmone & pectore humores descendunt grossi & viscosi. Rec. sebesten centum in iubar. l. vuarum passerum enucleatarum dra. 20. capilli ueneris amoglossæ an. dr. 5. liqui. drag. 2. omnia in 7. lib. aquæ coquantur tandiu donec redeant ad duas, deinde. vnc. 4. sap. adde & zucari. 4. & omnia coquantur ad spissitudinem mel. deinde adde puluerem istarum serum. Rec. gummi dragaganti seminis citoniorum. vnc. 8. sem. cucur. drag. 1. amid. dulcis. dr. 8. sem. port. drag. 6. amidi. drag. 7. semi. papaueris al. drag. 5. fac puluerem tempera cum aqua ros. munda.

De febre qua dicitur causon. Cap. XXXI.

Disimus in theorica, quia cho. ru. alia naturalis, alia innaturalis. Cho. rub. habitat in felle & virus eius in hepate. Hæc cum dominatur corpori generat febrem quæ dicitur causon. i. incensum, huius enim materia est ignea acutissima in concavitatibus coadunata uidelicet arteriarum uenarum cordi uicinantium, & maxime uenarum ori stom. & in concanitate hepatis & pulmonis. Sed quia ut dicit hipp. in apho. acutorum morbo non omnino certæ sunt sanitatis pronuntiationes de signis huius febris placet hoc repetere ut in curis non erremus. Rigor in initio morbi guttæ sanguinis per nares maxime in secunda die, singultus, dolor in uisceribus, hæc omnia signa timorem in causon nuntiāt, quia rigor in secunda die timorem in 6. longinquitatem morbi significant, subita sitis & ablatio, omnia ista signa timorem in causon nuntiant. Palam ergo est quod ubi sanguis per nares exit non est rigor, & ubi rigor non est sanguinis fluxus per nares in acuta febre. Sed quia pulsus in hac febre aliquando est magnus & uelox, significat apostema in cerebro, aut in diaphragmate esse. Differunt inter utraque, quia apostema cerebri sequitur alienatio mentis & rubor oculorum. Apostema diaphragmatis habet angustiam spiritus & pectoris stricturam. Sudor frigidus in quarta die appareat, aut longitudinem morbi aut mortem in sexta die pronuntiabit. Medicus licet sit peritus, tamē sit studiosus ad cognoscenda quatuor tempora morbi. scilicet principium, augmentum,

statum, & declinationē, & uideat quomodo possit dietare & curare morbos secundum quatuor tempora. Si enim uidemus quod crisis in quarta die ueniat, negetur cibus in his quatuor diebus nisi contrarium ei aliquid accadat sicut pueritia ca. complexio infirmi pori rari consuetudo multum comedendi, in his complexionibus non oportet multos cibos prohibere. unde Hipp. In tenuibus dietis peccant ægrotantes. Si ergo crisis sit in quarta die, damus mellicratum si complexio stomachi patiens sit frigida. Si autem ca. syrupum rosatum concedamus eis aut uiol. succum malorum gra. & his similia. Quæ si eis non succederint ad virtutem regendam, dari conuenit ptisanom colatum, sed tamen non multum, quia natura defesta nequit eum degerere, unde dimittit eum, sitq; causa pereundi infirmum. Nā si infirmus sit rari corporis nel puer, aut sit complexio calida, vel sit consuetus multum comedere, accipiat ptisanum colatum primo & secundo die, in tertio & quarto prohibetur. Quod si crisis sit in septima die, damus ptisanum collatum à prima die vsq; ad quintā, in sexta & septima negamus & solos syrupos eis tribuimus. Simili modo facimus in omni statu acuti morbi, licet sit longus aut breuis. Eodem modo in periodicis faciendum est. nec tribuamus cibum in die accessionis, neq; concedamus cibum nisi quiescente febre. Sed quia utriq; morbi molesti sunt & suspecti secundum uerba Hipp. dicentis. Oportet inquit non solum seipsum prebere quæ oportet facientem, obliuioni ne tradamus. Medicus ergo si in initio morbi uiderit quod necessaria sit pharmacia uel phlebotomia, festinaret ea agere priusquam morbus confortatus augmentetur, & natura debilitetur. Si uero fuerit necessitas purgandi inferius fiat purgatio cum oxifenix prunis iuib. viol. cassia fist. māna rodozac. & similib. Si materia leuis & natilis appareat, & dolorem in capite, & imaginationē ante oculos habeat, prouocanda erit cum vomitu uidelicet cum succo a triplicis & oxizaccara, & modico salis & ptisana cum oxizaccara. Quod si febris leuis fuerit & virtus fortis accipiant hoc catarticum quod. Rec. dra. septē myr. citrinorum mundatorum, hæc. n. non fiant nisi in morbi initio. Quod si impediunt nos aliqua sicut virtutis debilitas, demus dietam ad digerendum facilem & laudabilem chimum facientē & uirtutē infirmi custodientem sicut ptisana, & mica panis lota. hæc tamen faciendā sunt in extremitatibus diei & maxime in aurora propter aeris frii & ca. feb. in illa hora repugnantem. Sed cum hæc febris ab initio vsque ad statum uenerit, fueritq; acuta & dura, necesse est ut in omnibus eius temporibus subtilem demus dietam, sic. n. conuenit fieri in omni morbo qui uelocem habet motionē & statum breuem. Grauior autem & tardior si fuerit, ingrossemus dietam in initio ut uis-

ens custodiatur, appropinquante quidem statu subtiliamus eam. Bonum est etiam si ca. ex-tinguamus in illis temporibus uidelicet cum succo maligra. uua hyemali melone palestina & similibus. Quod si stiptice fuerit nature, humefaciamus eum ante statum cum mēna uiola, zuccara solutus in aqua ca. aut in succo cucurbitę assata. quod si fortius uolumus humectare, damus vnc. ij. casiasit. mundatę. Si autem hęc non sufficiant clystere faciamus humidu quod Rec. spinę egyptiacę maluz. hordei mundati. an. un. j. fursuris frumenti quantum in utraque manu. potest capi, sicla. i. blez frondes duas cucurbitę agrestis frondes. 10. sebesten. 30. iuiubas. 20. omnia coquantur in. 4. lib. aquę usque ad. 3. Deinde colatis in. 8. cius uncis mittantur. vnc. 2. olei violati vel vnc. 1. oxizaccarę obfomogare vnc. 1. sal. dra. 2. nitri. dra. 1. & fac clystere. Damus et ad refrigerandum stomachi calorem psilium cum succo maligranati; aut cum succo melonis palestini. Si autem dolorem capitis patiantur humectamus nares cum viol. & nenusarino. Similiter cura & plantę pedum fricentur cū plantis manuum puellarum unctis de oleo nenusarino & viol. In temporibus ponimus cataplasma quod. Rec. sandali albi ro. farine hordei aslati. omnia puterizata cum succo semperuiuę temperentur aut cum aqua ros. aut oleo ros. cum modico aceti mixto torandum est fronti & temporibus. Cataplasma ponimus super hępar & sto. quod. Rec. sandali albi & ru. ana drag. 2. ro. drag. 2. & sem. corticum cucurbitę drag. 4. frondium uiridum uiolearum. dra. 3. campho. dra. 1. tempera cum succo semperuiuę. Similiter in pauimento frigide frondes ponantur ut salicis mirtę rosę & similes; & sæpe rorem super eas aquam. Ponimus ante infirmum uasa magna argillosa & clarissima aqua plena; & mittimus aquam unius in aliud. Cauendum est quoque ne ungatur aut cataplasmetur caput de oleo alijue cataplasmati bus. Quod si uigilias habuerint iungimus in cataplasmatē quod super frontem ponimus & temporibus semen papaueris & lactucę. Si autem dolor capitis non cessauerit neque infirmus rema aut tussim habuerit; fomentemus caput cum aqua calida in qua cocta sint uiola. camomilla ro. hordeum mundatum. Quod si adhuc dolor non quieuerit infundimus super caput eorum lac capriuum aut asinimum; postea fomentemus illud; cauendum est tamen ne aliqua istam fomentationum aut aliquam rem quam superius diximus in statu faciamus; neque cum sentimus caput humido fumo plenum. hæc autem si fecerimus augmentatur & generatur dolor in capite. Possimus etiam scire utrum fumus sit humidus aut siccus. Si humidus sentiunt dolorem & grauedinem; Si siccus sentiunt dolorem cum uacuitate capitis & leuitate & inde negamus fo-

mentum lac & unctiones. Hęc enim omnia non desinunt in fumos humores dissolui & maxime oleum, quia poros cum sua uiscositate oppilat. Infundimus autem manus & pedes in aqua calida in qua cocta sint uiola. camomilla. Fricamus plantas pedum positas in hac aqua cū oleo viol. fricamus etiam & crura, & ligamus ea a superiori usque inferiori, hoc enim sæpe fiat quia deponit materiam & dissoluit. Bonum est etiam si dolor capitis non cessauerit, ut ligemus fundamentum testiculorum. Descendente autem materia & dolore capitis quiescente ponimus caput infirmi super fumum aquę superius dictę. Sed si dolor capitis sit cum leuitate & acuitate, scimus illum fumum esse acutum & siccum, unde ponimus in capite oleum ros. & acetum. Acetum autem attenuat & aperit, oleum aut refrigerat. Quod si dolor non cessauerit, frigidiora in capite apponamus; sicut succum semperuiuę, & ea quę superius diximus. Cauenda est tamen camphora in cataplasmatationibus frontis & temporum; sed in cataplasmatationibus stomachi & hępatis est ponenda. Quod si ardorem & calorem nimium senserint in stomacho & primitus pectus habuerint sanum, & tussim careant, damus syrupum malorum grati aut de oxiseniua aut de prunis. Si pectus habuerit infirmum & tussim damus syrupum pio. cum psilio. Sed si patiantur siccitatem & asperitatem in lingua; lauamus eam cum psilio & succo cucurbitę assata hoc modo; innoluatur in folijs eiusdem, & sub cinere coquatur calidissimo deinde munderetur a cortice & exprimatur, competit in omnibus acutis febribus. Damus etiam si sitim habent magnam syrupum squilliticum cum succo factum. Damus & electuarium psiliticū, & huiusmodi. Si autem dietam necesse fuerit ingrossari damus psisanum non colatum & panem non lotum. Cauent amygdalas, quia ut Ga. dicit, cerebrum petunt, damus quoque prunamora celsi, omnia tamen sunt concedenda in auctora dici febre mitigante. Quod si patiantur cordistremorem tribuamus psilium cum succo cumeris & syrupo acetoso pomi citrini & de succo uianim agrestium. Si tussim habuerint damus eis hoc electuarium. Rec. gummi dragagati seminis citoniorum mundati ana. drag. 2. amidi. drag. 1. & sem. seminis cucumeris. drag. 2. & sem. temperetur cum syrupo viol. si consumptus fuerit; Si solubilis est cum rosato. & fac pilulas in modum fabę & unam sub lingua teneat. Vngimus pectus cum hoc unguento. Rec. dragaganti drag. 2. succi maluz & uioleariz quantum sufficit, ponantur in mortario & agita quousque ad mellis spissitudinem redierint, deinde cerę albę drag. 4. olei viol. vnc. 1. liquefac super cinerem & misce omnia & agita. quousque ad modum unguenti fiant. postquam nero status transierit & febris declinauerit, damus cucurbitam carnes pullorum

pollorum perdicum & huiusmodi. Si aut. crisis non uenerit oportet debet primam retinere dietam qua diauerat ante statum donec alia crisis ueniat. Oportet autem intelligi quia alienatio quæ sit propter apostema diaphragmatis non est continua, sed alienatio quæ sit propter apostema cerebri incipit in augmento sui tota modicum continuatim, neque febre cessante & mitigata quiescit ipsa, quia passio est in essentia cerebri. Ideoq; status eius insensibilis paruissimus, facies & caput eorum nimium patiuntur dolorem & calorem. oculi lachrymantur. nares aqua distillant & os eorum emittit liquorem. Dicunt quidam qd fumus de ebullitione sanguinis qui ascendit ad caput sit calidus & humidus, quod falsum, quia fumus ad caput ascendens si fuerit humidus eliquabitur in pectoris concavitate descendens & de pectore in diaphragma. & ibi apostema generabit quod uera pleuresis nuncupatur, pars uero fumi quæ in capite remansit dissoluta per poros cum sudore & fumo egreditur. unde dicimus qd fumus qui sit ex ebullitione sanguinis est calidissimus & siccissimus de genere cho. ru. unde non potest eliquari inferius ad diaphragma, sed in cerebri pelliculis inuiscatur & generat ibi apostema quod frenesis dicitur. Aliquando est ex incensione cho. ru. in uentriculis cerebri. existentis quod peius est & molestius. Palam itaque est qd causa frenesis est de fumo igneo & sicco. Causa uero pleuresis est ca. fumosus & sanguinolentus, idcirco antiqui febrem frenesis appellauerunt caufon, & febrem pleuresis acutam. Quandoque sit frenesis propter colligantiam neruorum quam habet cerebrum cum diaphragmate. Aliquando propter passionem matricis. Quandoque sit propter putredinem quæ est de phlegmate. Nonnunquam sit propter adustionem cho. ru. & mutationem eius ad cho. ni. hoc genus frenesis pessimum est & difficile ad curandum. Si autem frenesis sit ex incensione cho. ru. in uentriculis cerebri, sequitur cordis tremor, stupor, defectio, mutatio faciei a naturali ad non naturalem colorem sicut ad citrinitatem. Quod si sit ex ebullitione sanguinis cordis sit naturalis mutatio faciei ad ruborem. Medicus licet sit perfectus, tamen dicta apud se non negligat, & maxime in hac ægritudine, siue enim in diaphragmate siue in cerebro ualde sunt timenda. Sed si queratur quid intersit inter febrem caufon & febrem sinocham quæ inflatiua dicitur. Respondemus urina caufon est luccentissima & rubicundissima, sed urina sinochæ siue purridine est subtilis althima. hanc febrem igitur curemus, scilicet caufon sicut superius diximus, frenesis uero curetur sicut in suo loco diximus. Sed si ex ignorantia medici & inordinatione dietæ siue ex materiæ malignitate. 14. die uel 21. transierit, & scotomia, aut uertigo,

aut lethargia sequitur, medicetur sicut infra diximus. Si syncopis & ictericia sequatur, ita curentur.

De syncopi & eius cura. Cap. XXVII.

Syncopis est cordis defectio & totius uirtutis in se coadunatio & fumosæ emissionis ablatio. Syncopis autem huic febri non accidit nisi ex plenitudine, uel inanitione. Si ex plenitudine, aut in stoma. aut in intestinis, aut in toto corpore. Si fuerit in stoma. habet imaginationem ante oculos, dol. in stom. & capite, unde prouocamus uomitum cum oximelle aqua calida & sale & succo crisolocannæ, aut ptisano cum oxizaccara. Si in superioribus intestinis, sentimus dolorem & punctiorem & torsionem si cholericæ fuerit materia, cum grauitate & inflatione, si fuerit melancholica. i. purgetur cum succo lupuli viol. zaccara casia sit. oxifenitia prunis & similibus. Quod si materia fuerit in inferioribus intestinis. clystere faciamus humidum quod. Rec. viol. camomillam ordeum maluam, sebesten, iuiubas, oleum vio. zucca, nitrum & similia. Si autem syncopis sit propter inanitionem necesse est fieri aut ex nimio uomitu, aut nimio sudore, sanguinis fluxu per nares, uel nimia solutione. Si ex uomitu, damus succum malorum gra. aut eorum sapam, sirupum de succo uuarum agrestium, & damus summitatem uitium rosam spodium lignum aloes masticem æquo pondere puluerizata cum syrupis superioribus, cataplasmam stomachum cum sandal. ru. laudano ligno aloes camphora, omnibus cum aqua ro. uel cum succo mirte temperatis. Quod si sit propter nimium sudorem unguimus corpus cum oleo mirtino salicina ro. & similibus. Si autem sit propter sanguinem de naribus fluentem stringatur sicut in suo loco diximus, uel pannum infusum in succo myrtæ portulacæ uuarum agrestium malorum gra. acetosorum capiti imponimus, manus & pedes a genu usque ad inferius ligamus. Quod si fortis febris non fuerit, accipe gallas non pertusatas missas ad ignem & acetum extinctas, deinde puluerizatas misce ibi modicum camphoræ & licinium lineum in encausto infusum & illi pulveri inuolutum naribus inijce. Si uero sit propter solutionem cho. damus psilium assatum & spodium cum syrupo citoniorum & aqua frigida. Quod si non habuerint uentrem sanum tribuimus syrupum mirte, damus & ptisanam cum oleo uel hordeo assato & amygdalas cum suis corticibus assatis, panem lotum cum amygdalis assatis. Succum accipiant mespilorum pirorum citoniorum. Utantur hoc electuario quod. Rec. citoniorum purgatorum interius & exterius li. 2. malorum & pirorum mundatorum an. lib. sem. coquantur cum aqua ro. li. simplici lib. 2. omnia coquantur

coquantur ad spissitudinem. Deinde adde puluerem berberis. vnc. 2. da drag. 4. cum sirupo uuarum agrestium. Quod si egestio fuerit quasi lotura carnis, significat contentiuam uirtutem in hepate esse defectam. Da hunc puluerem. Rec. berberis spodij ana. drag. 2. coriandri infusi in succo uuarum agrestium, aut malorum gra. assatorum, drag. 4. gummi, boli ana. drag. 2. feminis herbæ acetosæ. drag. 4. se. mirtæ. drag. 2. & sem. omnibus puluerizatis da. drag. 3. cum sirupo citoniorum & aqua frigida. Sed si ad disenteriam uel hienteriam uel diarriam deuenerint, curentur sicut in suis locis dicturi sumus.

De ictericia & eius cura. Cap. XXVIII.

Nomen ictericiæ sumptum est à quadā aue aureum colorem habente in monumentis & locis desertis habitante, & in nullo tempore apparente, nisi in media æstate, quæ tota die dormit & somnum terribilem facit. Omnis ictericia cum febre pessima est nisi cum in die cretica sit. Illa uero quæ est propter passionem fellis aut hepatis pessima est, cui succurrimus cum diætâ & medicina cho. ru. mundificante sicut cartatico de prunis oxifanicia succo malorum gra. oxizaccara, pûsana & similibus. Cunque febris declinauerit purgetur cum succo lupuli cuscute solatri māna uiola zuccara. Quod si uomitus ei acciderit damus succum malorum gra. cum spodio & oxifanicia cum modico lactis & aceto maligranati. sorbeat mespila citonia sorbas & huiusmodi, cataplasmata & diætâ sint cōpetentia sicut in septima practicæ particula dicturi sumus.

De febre inflatiua & eius cura & de frenesi.

Cap. XXIX.

Peracuta febris de puro calidoq; nascitur sanguine intra uasâ. intra uenas & arterias absque ulla putrefactione, proinde facies patienti est mollis rubicunda & humida quasi facies balneû egredientis, proprium huiusmodi febris est semper generare inflationem, ideoq; faciunt spiritum angustum anhelitum & orthomiam. Ideoque hanc febrem antiqui vocant inflatiuam, quia causa inflationis spiritus est calor pectoris pulsusq; defectio, huiusmodi febris materia cum ascendit ad caput, & à capite in diaphragma descendit, generat apostema quod dicitur pleuresis, quandoque eadem materia à capite ad pulmonem descendit. quandoq; ad lacertos quibus consistunt induit quod abusiue dicitur pleuresis. Vera pleuresis. i. diaphragmatis habet duritiem febris angustiam spiritus & punctiōem dolo-rem lateris continuum & tussim & orthomiam. plurimum enim apostemata sequuntur frenesis & alienatio propter colligantiam neruorum

quam habet diaphragma cum cerebro. Sputum in initio huius morbi exiens in tertio aut quarto die est laudandum præcipue si fuerit paucum lene iunctum, album, & facile ut cū una aut duabus tussibus exeat, quia significat perfectam salutem in die septima esse uenturam. Sed omnibus coloribus laudabilior est rubens, quia materia eius est sanguis. Sputum igitur rubeum cum albedine mixtum melius est quàm citrinum. Si autem citrinum in initio appareat sputum, demonstrat uel crisi esse futuram in. 40. uel 60. diebus. Quod si infirmus nil screauerit & siccitatem oris habuerit duritiā spiritus anhelitum orthomiam febrem incensam inter mortuos computatur. Si autem screauerit saniem neq; prout oportet mundificetur ante 40. uel 60. ab illo die quæ apertum fuerat apostema, futura est mors aut periplemonia. Non uera pleuresis habet grauitatem lateris absque tussi & sputo. Quod si apostema sit in hepate & sit calidum cognoscitur per citrinitatem uultus infirmi & sicce tussis quia est fundamentum sanguinis. Quod si apostema sit in pulmone, labra sunt plumbea, supini iacent, grauiter somno detinentur, os habent apertum, de quorum signis satis in theorica disputauimus. Hec itaq; febris curatur cum minutione sanguinis de media uena brachij priusquam incensio augmentetur, si sanum pectus habuerit. Si autem infirmus de basilica uena minuatur, ubi passio est, hoc enim facto febris extinguitur, proinde antiqui hanc febrem ephimeram uocauerunt, quia multotiens in uno die dissoluitur. unde Galen. dicit in megategni, se multos homines sanasse cum minutione sanguinis usq; ad defectionem & inuestigata tamen uirtute & ætate & huiusmodi. Virtus enim si in initio imbecillis sit, negetur phlebotomia, minus tamen est mala quàm si in statu sit. q. si in initio fiat perditio infirmi longa erit in. 7. die uel. 14. in statu uero nūciat perditionem in illo die aut in tertio. Quod si ex naribus emanabit sanguis, & si uirtus fuerit bona, quiescit infirmus maxime si fuerit in die cretica. Quod si uirtus sit debilis morbus augmentatur & natura debilitatur, unde periculum ostenditur maxime si non fuerit in die cretica. Quod si propter hoc sanguinem minuere non audemus, extinguamus acumen sanguinis cum succo malorum gra. prunis oxifanicia. & bona est aqua frigida si ieiuno dabis, sed tamen non temere nisi cum scimus pectus & uiscera & membra principalia esse sana. Sed si apostemata tanti fuerint caloris ut frigiditati aquæ ualeant repugnare, damus parū aque, prius tamen egestionem necesse est fieri liquidā cum rebus acumen sanguinis extinguentibus. Demus psilium cum succo malorum gra. syrupum uiu. quæ si non profuerint, & sanguis in sua permanferit uisione, demus catarticum de oxifanicia

fenicia & prunis, si tamē pectus habuerit sanum quia acetositas nocet pectori & nervis stomachi. Quod si sanguis non fuerit multum vltus aut calidus, negemus aquam frigidam, & hume faciamus uentrem cum manna casia fistula. an. vnc. i. temperatis cum succo cucurbitę assatę. Si sudorē capitis pariantur, medicemur cum oleo, & cataplasmatibus in temporibus ponendis in causo dictis, ligemus crura cum fascia. Sed quia in hac febre sapē euenit tarditas anhelitus capiti nullum cataplasma aut fomentum faciamus. Si patiantur stuporem mētis & gravitatem oculorum, aut os non possint aperire, nec loqui valeant, non est faciendū aliquid cataplasma vel inunctio capiti, neq; naribus aliquid fomētum appropinquatur, sed manus & pedes in aqua mittantur, in qua cocta sint camomilla & viola. fricentur quoq; manus & crura fortiter & plate pedum intus in aqua cum oleo & sale fricentur: deinde panem lotum cum succo malorum gra sumant. Quod si infirmus exciteretur a stupore subito & uertat se ad sinistrum uel dextrum, ueter etiam sonet quasi tonitruum, & post uentris solutionem illa inflatio non soluitur, mortem pronūciat. Sed si hac febris apostema fecerit in diaphragmate, sit spiritus leuior & dolor est fortior. Si in pulmone erit dolor leuior spiritus autem angustior. Quod si materia apostematis fuerit sanguinolenta & dolor ascendit usq; ad furculas, ante omnia cum phlebotomia occurre. deinde cataplasmatibus acumen sanguinis extinguentibus & dissolutiuam uirtutem habentibus, sicut est succus malua uisci, succus uolaru, hordeum mundatum omnia cocta & colata. deinde oleum uiol. misce & pannus infusus loco patienti apponatur, si tempus fuerit frigidum, & si calidum & febris non est fortis, addimus cataplasmati camomillam. Item si uirtus sit fortis, & complexio infirmi, regio, consuetudoq; conueniant, fiat phlebotomia postquam morbus incipiat augmentari. Si uero uirtus sit debilis, molestissimum est, quod si minuatur, caue ne sit de basilica uena de latere infirmo. Sed quia de huiusmodi passionis cura sexta practica particula disputaturi sumus, ideo ad aliam transeamus. Est & alia pleuresis que non est cum febre acuta: est enim de materia phlegmatica uel melancholica, hac curetur cum cataplasmatibus. Rec. seminis lini. dra. 4. fenug. dra. 5. radice malue. dra. 3. hordei mundati. dra. 2. Omnia coquantur & colentur. deinde misceantur cum amygdaleon aut iuleon. Spogia infusa in illo cataplasmate loco patienti superponatur. Quod si 40. dies transierint & apostema non mundificetur, mutatur in peripneumonia, unde accipiat hoc apozima mundificatiuum. Re. cancerorum flumineoru mundatoru. vnc. i. sebesten. 30. iuiubas. 20. liquiritia. dra. 5. ficus. 5. radice maratri apij graminis ana. vnc.

se. seminis malue. drag. 2. amygdala amara & dulcis ana. drag. 5. ylopi. drag. 2. capill. ueneris. drag. 5. yreos. drag. 4. seminis lini assu. drag. 3. folij pinearum ana. drag. 2. grana mali granati, medulle seminis bombacis. drag. 3. & se. Omnia coque in 6. lib. aque ad medietatem, quæ colata cum. drag. 6. penidiorum potetur. Pilula. Rec. succi liquiritie. vnc. i. croci. drag. 1. amidi seminis lini assu. ana. drag. 2. & se. medulle seminis bombacis. drag. 2. tepera cum lacte asinae, & fac pilulas in modum ciceris, quarum vnam sub lingua teneat, donec fuerit eliquata, deinde aliam accipiant. Cataplasma valens contra pleuresim que est ex febre acuta. Re. malue polinis hordei ana. drag. 5. uiol. sandali al. ana. drag. 2. seminis portulacę. drag. 10. omnibus puluerizatis accipe cere alba. drag. 5. olei ro. drag. 15. qua liquefacta pulueres misceantur, diata sit succus orizæ zuccara uel alicuiusmodi.

De putridis febribus & earum curis. Cap. XXX.

Quia de curis acutarum febriu ex pura cholera & ex puro sanguine nascentium disputauimus, consequens est ut de curis febriu ex putredine nascentium tractatus habeatur, & prius de causa putredinem generante, ut in curis non erremus. Vnde dicimus qd maior causa putredinem generans est constipatio corporis & oppilatio pororum, & in eis humorum conclusio. Constipationis pororum causa est bifariam. Vna de exterioribus, sicut balneum stiptice aquæ ut sulphureæ, nitreæ, aluminosæ. Secunda est de interioribus quorum causa est quinararia. Prima causa eius est coadunatio grossorum humorum & viscosorum in interioribus corporis ex nimia requie, quia nimia requies corpora refrigerat. Secunda est ablatio exercitij ante cibum. Tertia est exercitium post cibum. Quarta est assiduitas ciborum grossorum & viscosorum & multa quantitas, & non secundum ordinem acceptorum, neq; cum stomachus est inanitus. Quinta est balneum post cibum antequam cibus digeratur, hæc omnia poros claudunt & constipant, unde sanguis & alij humores in interioribus corporis clausi putrescunt. De his enim in theorica in tractatu accidentium & causarum sufficienter disputauimus.

De sincho ex putredine sanguinis.

Cap. XXXI.

Sanguis cum putrescit in toto corpore facit febrem sincham, quam curare debemus cum phlebotomia, & hoc ante statum, nisi aliquid nobis obuiauerit sicut debilitas uirtutis & huiusmodi, quam doctrinam satis apertam ostendimus in tractatu de sincho sine putredine. Quod si debilitas

bilitas uirtutis nobis obuiauerit, aut aliquid aliud ad minuendum sanguinem, exinguamus, acumen sanguinis cum succo mal. gra. oxifenicia & similibus. Demus ptisanum cum amygdaleon & zucca. Quia hæc febris licet sit acuta, putredo tamen sua oppilationem generat, unde nisi attenuatiua dissolutiua & refrigeratiua dederimus, putredo augetur & morbus necessario augmentatur & confortatur. Si autem materia sanguinis fuerit acutissima, demus refrigerantia sicut psilium succus mal. gra. oxifenicia syrupus de prunis & uiol. casiafist. manna & his similia: hæc enim acutum sanguinem extinguunt, dā dū est ptisanum colatum & panis lotus. Quod si sanguis fuerit mediocris danda sunt iuiube in uice oxifenicia, & ptisanum, & panis lotus. Si autem sanguis grossus & phlegmaticus fuerit, demus succum lupuli & succum endiuia cum manna casiafist. & similibus. Si dolorem capitis patientur humectemus nares cum oleo viola. nymfarino. temporibus imponamus oleum rosarum cum aceto. pedes in aqua calida imponamus, in qua cocta sint camomilla & uiol. Si uigilias patientur fronti roremus aquā ubi cocta sint cortices papaueris semen lactuce uiol. & similia. Si uero habuerint angustiam spiritus infundendū est caput hac aqua. Quod si senserint in uentre acumen aut punitionem accipiant succum cucumeris & mal. gra. Damus etiam succum melonis palestini eiusq; carpem. Doloze capitis non cessante fundamus in eo lac mulieris cum oleo uiolato mixtum. Pedes eorum & crura mittantur in aquam in qua cocta sint camomilla viola, ligentur eorum crura, quia trahit materiam a superioribus ad inferiora. Si habuerint stuporem mentis neq; oculos aperire ualuerint, calefiant eorum capita cum aqua in qua cocta sint camomilla centaurea mellilorum uiolæ & similia. Si uirtus fuerit defecta & calor fortis cum uiola & camomilla solummodo fiat calefactio. Fiant iuxta infirmum sonitus delectabiles de musicorum generibus ut animā delectetur & confortetur. Quod si patiens a stupore mentis surgens uertit se ad dextram siue ad sinistram, & hoc cum magna angustia, pessimum est signum & mortis nuntiatiuum. Quod si habuerint inflationem quasi tympanum habentem post uentris solutionem inflatio non cessauerit, sit certius & uelocius signum mortis, maxime si in corpore uescicæ uideantur liuide aut nigre & principalibus membris uicinæ. Si istis accidentibus careant & patientur fluxum sang. de naribus & uirtus fuerit bona febrisq; mitigetur & morbus extiterit in declinatione cephalicam uenam incidimus. Quod si sanguinis fluxus fuerit nimius, stringatur sicut in causone diximus. Si autem patientur cordis tremorem, ponamus super stomachū sandalos & farinam hordei maluanam camphorā

cinerem fornacis sabrosum omnia tempera cum sacco protulacæ semper uiuæ citruli arnoglossæ & aceto. In eorū mansione sternantur frondes & flores frigidi, & uasa ponantur aqua plena, sicut in causone diximus. Quod si hæc febris fuerit propter apostemata ut herisipillas, accipiant succū solatri. uel cucumeris coctum & dispumatum cum casiafist. manna uiol. zucca. ponantur super apostemata sandali ro. malua. memithæ solatri coriandrum. Si calor non fuerit fortis aliquid de croco misceamus. Quod si apostema fuerit de actione nature fecū dum crismū ponimus dissolutiua, sicut memithæ maluanam camomillam, crocum solatrum & similia. Si autem hæc febris fuerit propter uariolas & desudationes, quod potest cognosci ex signis in theorica dictis, rigetur oculi cum oleo oliuæ aut succo mali granati acetosi, & mundi ficeretur eorum putredo, deinde lauentur cum aqua rō. & sumac. & caridimo & camphora cum succo coriandri temperata. Ad iuuetur etiam natura ad expellendas uariolas in exterioribus cum hoc apozimate. Rec. lacce drag. 3. lentis mundate drag. 7. dragan. drag. 4. omnia coque in tribus lib. aquæ usq; ad tertiam & da potui guttatim. Et quia in hac febre solutio uenit sponte, cauendum est ne artificialiter fiat. Quod si tempus hyemale & frigidum fuerit, facimus focum in hospitio infirmorum delignis uitium & thamarisci. Quod si uariolæ deficientur necesse est infirmum balnari, lauetur cum farina hordei rizi milij & similibus.

De tertiana febre & eius cura. Cap. XXXII.

Febrister tiana molestior est ceteris putridis propter acumen materiæ eius, & quia causone est uicina, unde oportet medicum in hac febre libi cauere ab initio ut non det infirmo rem calefacientem ne materia calefacta cum sui acumine ad caput saliat & frenesim generet. Bonum est etiam si uirtus infirmi sit fortis & materia furiosa ut demus catarticum cho. ru. purgans eiusq; acumen extinguens, sicut est oxifen. pruna mirrob. citrini casiafist. manna & similia. Si autem necesse est egestionem eorum humefieri, aliquantulum diagridij oportet admisceri. Caue tamen in die accessionis ne catarticum detur, sed aut in secunda aut in quarta die de cibo des, sufficit autem in die accessionis psilium cum succo malorum gra. uel aliquis syrupus conueniens. sed hæc non sunt danda nisi cum calor fuerit nimius & fortis, & sitis nimia, quia psilium aliquando coagulat & indurat materiam unde sufficit solus syrupus. Si autem accessio fuerit post prandium, sufficit syrupum dare in mane. Febre autem tractata ptisanum detur, & uespere panis lotus cum zucca. Quod si accessio in medio die inceperit, nihil sumat nisi febris cessauerit, prætereunte quidem

quidem febre panem cum zuccar. lotum accipiat. Si autem febris in vespere, aut in prima hora noctis inceperit, mane sumat ptisanū & cū febris cessauerit panē lotū. Sed cauere oportet ne in hora accessioneis aliquid ei tribuatur, neq; tribus horis ante accessioneis, quia si tunc aliquid acceperit stomachus euomit illud. Stomachus non mouetur in tēpore accessioneis ad expellendā putridam materiam in eo contentam, unde si tunc aliquid datum fuerit, caloris febris augmentatiū erit & materiam ingrossabit. Est enim febris quasi oleum in lampade ardenti. Si autem dolorem capitis patiātur, aut siccitas capiti augmentetur & infirmus alienationem patiatur fac vntionem & cataplasma in temporibus cū oleo & lacte sicut diximus in alijs acutis. Oportet nos etiam mitigare incensioneis stomachi cū syrupo malorum gra. aut succo corū & spodio.

De quotidiana febre & eius cura. Ca. XXXIII.

Amphimerina. i. quotidiana, quia nascitur de phlegmatica materia & quia phlegma naturaliter frius est & hu. necesse est ut hæc febris curetur cum rebus hu. attenuantibus & dissoluentibus. Sed quia phlegma aliud naturale, aliud acetosum, aliud salsum, aliud vitreū, aliud dulce. Acetosum frigidius ceteris, salsum calidius. Similiter & attenuatiua sunt diuersa, quia quædam cū nimio calore & incensione sunt attenuatiua sicut radices origani calamenti zinzin. & similia. Sunt & quædam quæ extenuant absq; calore & fri. quæ admodum maratrum apiū lupulus & similia. Sunt & quædam quæ attenuēt acumen cal. extinguentia sicut ptisanū oxizac. & his similia. Si igitur hæc febris ex frigidityte & grosso phlegmate sit, medicetur cum re attenuatiua calefactiua & dissolutiua. Si phlegma fuerit calidius & lenius, curetur cum re extenuatiua & refrigeratiua. Febrē mitigari incipiētē curetur cum re attenuatiua & non calefactiua, aut aliquantulū caliditati atineat. Bonū est et ut medicina sit mediocris. i. attenuans sine calore, & cū modico calore, & hoc fiat ab initio usque quō materia sit digesta. Cumq; signum coctionis in urina aliusue locis apparuerit, festinandum est ad expellendam materiā. Si autem phlegma fuerit salsum, dāmus catarticū de mirob. ciirinis Kebul. absinth. bedegare succaha cucusta eupatorio casia fistu. manna, & cum pill. de hierap. & similibus. Quod si acetosum fuerit phlegma purgamus cum pilulis stomachicis, sed tamen non omnino. sed paulo post purgetur materia, quia si omnino purgetur conuertitur potio ad substantialem corporis humiditatem & natura iterum repugnat ei ex quorum certamine perit infirmus. Eo modo est faciendum in omni passione de graui materia & dura ad dissoluendum. Salua materia cognoscitur ab acetosa his signis, quia si fuerit acetosa parua

erit sitis, grauitas in uentre & stomacho, uentre habent cōstipatum. Si fuerit falsa sit sitis nimia, uenter solutus, punctio in stomacho, & dolor habent os siccum & salsum cum nimia siti, frigiditytas sit minor, calor fortior & accessio breuior propter leuitatem & acumen materiæ ecōtraria sunt signa, si fuerit acetosa. Quod si uirtus infirmi nequeat pharmaciam tolerare oportet ingeniari ut extenuetur materia absq; ullo labore naturæ, ver. gr. Si materia fuerit in hepate donetur medicina hepatis mūdificatiua cū urina, sicut trocisci de rosīs, berberis & oximelle cū succo herbarū, si materia fuerit acetosa, quia si falsa sit donentur trocisci de spodio cū oxizac. Sed si materia fuerit aggrauata erga stomachum mūdificetur stomachus cū lupulo melle rosato, si fuerit acetosa, si falsa cū rodozaccara.

De particulari cura febris. Cap. XXXIIII.

Diximus de uniuersali cura, nūc dicendum est de particulari, unde dicimus quod si materia fuerit falsa ab initio morbi, demus oxizaccaram cū aqua calida ueniente quidem accessioneis & frigore incipiente ponantur pedes patientis in aqua cal. in qua cocta sunt camomilla uiola anetum, fricentur plantæ pedum cū oleo uiol. & sale. Quod si uomitus sponte uenerit bonum est signum, si autem non, cogatur in initio morbi, quia magnum infert stomacho nocumentum, proinde non debemus facere curam stomacho lationem inferentem, sed dare conuenit rodozaccaram cū calida. Aqua enim calida in hac febre est ebullio & putrefactio materiæ, unde cum fuerit extenuata propter aquam calidam sitis extinguitur. Deinde demus ptisanum cū oxizaccara. Si autem febris septimam diem transierit & materia digeri inceperit, demus in initio accessioneis oxizaccaram cū apozimate aneti, & prouocabimus uomitum sine angustia. Quod si uenter fuerit cōstipatus clystere facies de uiol. camomilla spinis egyptiacis ana. vnc. i. seminis croci hortensis. dra. 20. furfuris bletę centaureę maioris sebesten omnia coque in. 4. lib. aquæ donec ad unam redeant. Quibus colatis adde olei uiol. zucc. obsomogari ana. vnc. i. salis communis uitri ana. drag. 2. Si autem febris. 14. diem transierit & patientis sentit fumum calidū de corpore exeuntem, aut patitur abominationē naturæ aut uentris rugitum, significat quod materia est commota, & uult exire per sudorem si fumitas sentitur, cū uomitu si abominationē habet cū egestiōe si rugitū passus fuerit. Expellatur ergo materia cū hoc catartico. Rec. myrob. Keb. ciirini ana. vn. 7. bedagar. dra. 7. succaha absinth. eupatorii ana. dra. 3. uuarum passarū enucleatarum, vn. i. iuiubas. 20. pruna. 20. oīa in tribus li. aquæ coquantur ad mediū, deinde mane rodozac. ana. vn. i. adde & colatis oībus potui dabis. Quod si

materia fuerit acetosa in initio morbi dabis mel licratum, aut oximel cum calida, multum enim prodest. Caueant aquam fri. quia materiam ingrossat & congelat, accipiant pisanum coctum cum radice maratri, aneti, calamenti, & modico piperis. Cūq; frigus accesserit ponantur pedes in aqua calida in qua cocta sint camomilla anetum sansucus abrotanum & similia. Quod si frigus sit quasi glacies epithima facinus dorso & uentri cum oleo in quo cocta sint piretrum staphisagria nitrum & calamentum, damus etiam oximel cum calida. Si uomitus non sponte uenerit, prouocemus cum oximelle de radicibus aneto & apozimate saleleorum sale communi, quæ omnia ca. accipiantur. Damus has confessiones. Rec. ciperi, spic. mastice. an. drag. 2. fac puluerem da. drag. 1. Rec. galliæ ligni aloes ani. an. drag. 2. fac puluerem da. dra. 1. cum odorifero vino. Si patiantur grauitatem capitis, inclinetur caput super fumum aquæ calidæ in qua cocta sint camomilla mellilotum & sansuccus. Caueant ab omni infusione lactis uel aliarum rerum ut olei in omni parte corporis. Dicta sint iura ciceris bletæ, parum comedant. Si febrem accipiant ad mediam diem mane accipiant pisanum. Incipiente uero frigore oximel cum calida fumant. Si mane febris accesserit nihil accipiant quousque febris cessauerit. Vniuersaliter dicimus qd inter cibum & accessionem. 6. horarum sit spatium. Quod si uirtus patientis defecerit in accipienda pharmacia, da ei rem suauiter extenuatiuam & mundificatiuam, yerbi gratia. Si materia fuerit hepatis uicina dabis rem hepar mundificantem. Quod si fuerit in stomacho dabis apozima de absinthio de aloe de hierapi. & similia. quemadmodum uideris materiam esse grossam aut subtilem. Bonæ autem sunt cataplasmata, aut epithimata calefactiua & dissolutiua in stomacho & hepate, sed tamen post mundificationem cum certissime nouerimus materiam esse dissolutiua & liquefactiua, apparente si gno coctionis in urina dabis inuicem oximel rodozacca. & medicinam cum sirupis miscemus. Et quia huius febris proprietas est dolor stomachi, oportet stomachum confortare cum cataplasmatibus quæ sint facta de mastice spica, absinthio, cinamo. & his similibus. Quod si stomachus defecerit ut careat appetitu, confortabimus eum cum oleo nardino & absinthino. Si duriciam splenis habuerit, curetur cum medicina spleneticorum. Si patiarur in stomacho frigiditatem & acetositatem, mundifica stomachum cum his pilulis eum de corruptis humoribus inanientibus. Rec. Kebul. dr. 3. hierapi. dr. 2. & sem. turbit. drag. 3. agarici. dr. 1. & sem. succi eupatorii succi absinthij ante dra. 2. fac puluerem & cum aqua calida tempera & pilulas, fac. Quod si uis eas fortiores fieri adde modicum scamoneæ. Quod

si minus in hac febre rigor fuerit epithima super dorsum. frigore ascendente imponatur cum oleo ubi cocta sint piretrum staphisagria piper calamentum. illud similiter. Rec. masculi thuris piretri æquale pondus, fac puluerem tempera cum oleo ex quo ungas dorsum.

De hemitriteo & eius cura. Cap. XXXV.

Hemitriteus quia de materia cho. & phlegmatica est commixta, necesse est ut sit curamenrum eius medicinæ inter rem calefactiua & refrigeratiua. Et quia omnis commixtio aut est in potetia, aut in actu, aut una est fortior altera, oportet utranq; huius hemitritei materiam aut esse æqualem aut inæqualem. Si autem equalis sit, sit uerus hemitriteus, cuius curatio est cum rebus attenuantibus & dissoluentibus nullam caliditatem aut frigiditatem facientibus, sicut cum succo lupuli maratri apij manna uiol. zucca. rodozaccara pisanum cum oximelle. Quod si cho. fuerit maior, sit facilius & leuior quam curari decet cum rebus mundificantibus & modicum refrigerantibus sicut cum endiuia succo maratri rodozaccara uiolis zucca. manna. prunis. Si autem phlegma uideatur dominari sit hemitriteus molestior, qui medicetur cum mundificatiuis & dissolutiuis & aliquantulum ex phlegmate plus calefactiuis quemadmodum mellicrato cum aqua calida syrupo de absinthio pisanum in quo cocta sint radices apij & maratri, anetum calamentum oximel accipiant & troiscos de rosas de berberis omnia cum succo maratri & oximelle. Samat mel ro. cum mastice maratro aniso & aqua ca. Si uideris materiam attenuari & moueri & signum coctionis in urina apparuerit, dabis pharmaciam suauiter solutionem facientem. Etiam bonum est si post cibum uomitus prouocetur & diuretica tribuantur, sicut sunt troisci de absinthio de lacca cum succo maratri apij & endiuiz. Pilule ualentes. Rec. hierapi. calamenti ana. drag. 5. anisi, maratri, apij, succi absinthij succi eupatorii ana. drag. 4. tempera cum succo fumiterræ, & fac pilulas, dabis potui drag. 2. cum aqua calida.

De febre quartana & eius cura. Cap. XXXVI.

Quarta febris quia fit de materia grossa & dura, oportet medicum præuidere quattuor res. Prima, quarum est quod in initio non debet dare rem nimium calefactiua, ne calefacta materia duæ generentur febres, una uidelicet interpolata & diurna, & alia acuta continua, quibus uirtus patientis deficiat, & infirmus ad periculum deueniat. Natura enim non est tantæ uirtutis ut possit morbi acumen, eiusque prolixitatem tolerare; Secunda ne det refrigeratiua

frigeratiua, ne congelet materiam, unde induretur & moretur ad digerendum & dissoluendum fiatq; causa prolixi morbi & eius pessimitatis. Tertia ne consumat & debilem corpus faciat cum subtilitate digere & abstinencia quæ causa faciat mutari patientem ad hecticam uel phthisim. Quarta ne confundat corpus cum pharmacia maxime in initio morbi priusquam materia morbi eliquatur & si obediens actioni nature. Tribuat ergo medicus rem maturantem & digerentem & cito eicientem, & ingeniet purgare materiam acutam modicum leni uomitu studeat & in regimine, & in confortatione hepatis & splenis ne deficiant, quia hepar generat sanguinem, splen mundificat eum. Quod si defecerit eumq; non purgauerit, permanet commixtus cum aliis humoribus putridis unde putrefit ipse & incenditur. Splen uero qui trahit feces sanguinis & turbiditatem si defecerit permanet fex in sanguine & corrumpitur unde idem sanguis corrumpitur putrefit & incenditur. hæc de causa uilissima huius febris est curatio ut donetur oximel cum apozimate radicum & herbarum & syrupus absinthij, trocisci de cupatorio de scolo pendria, aut de zeubarbano. Oportet ne huiusmodi trocisci in initio dentur, ne desiccant & inducent materiam ad obediendum nature, sed continet dari postquam materia fuerit maturata. Abstineant a pullis gallinis starnis perdici bus per tres hebdomadas in initio febris. Vnde osum est febris quasi ut oleum in lucerna. Quod si materia non fuerit maturata per illas tres hebdomadas abstineant usque ad 40 dies si uis patientis hæc pati ualeat. Quod si hæc febris fuerit de adustione sanguinis, da in initio rem dissoluentem & attenuantem, tamen non calefacientem sicut pisanam cum oxizaccara, rodozacca, viol. zoeta. cum aqua calida. Vnde nitum prouocabis in initio accessionis cum frigiditas incipit. Infundantur etiã pedes in aqua calida ubi cocta sint camomilla & viola. Accipiant succum malorum gran. & uas hyemales. Quod si materia incipit digeri festinanter extrahere sanguinem de basilica uena sinistri brachij aut de mediana, & minime quousque clarum & purum sanguinem egredi uideas uirtute hoc patiente. Prouoca egestionem si necesse est cum hoc catartico. Rec. mirabolanos citrinos Kebulos iaiubas pruna uas passas enucleatas semina fumi terre casianfistu mannam rodozaccaram radices maratri apij & endiuia. Quod si febris elongabitur, ut 20 transeat dies ieiunet infirmus per oem diem accessionis, & in alio die non multum comedat, quia sanguis propter abstinenciam extenuatur. Utatur dicta subtili quæ facillime digeratur. Quod si quartana de infectione cholere fuerit, dabis in initio tã refrigerantia, quia materia propter calorem ingrossata nõ at

tenuatur nisi cum frigidis, proinde in initio dabis succum malorum gran. cum oxizaccara & pisanano. Quod si constipata fuerit egestio humefaciat eum manna rodozaccara prunis succo endiuia casianfistu. Quod si nondum per hæc fuerit humefacta, cane ne donec catarticum priusquam materia digeratur, sed fac clystere. Quod si materia incipit digeri & de loco in locum moueri, purgetur cum catartico de mirab. citrinis Kebulis oxifeniã, prunis, eupatorio, uiola, casianfistu. manna, rodozacca, absinthio, cuscute, semine fumi terre & radicibus endiuia. Quod si materia fuerit extra uasa purgabitur bis uel ter cum catartico. Bonum est etiam si phlebotometur de basilica uena sinistri brachij, cauendum tamen est ne fiat ante quàm materia digeri incipiat. In fine autem morbi lauetur in aqua calida in qua cocta sint mellilotum camomilla, absinthium. Quod si dolorem capitis patiantur humefiant nares eorum cum oleo uiol. Si uigilias habuerint, lauentur pedes eorum & erunt cum aqua in qua cocta sint papauer laetuce, viol. & his similia. Quod si incensua fuerit materia phlegmatica, dabis in initio mel ro. & uiolatum cum calida apparense coctionis signo de succo maratri & apij cum semine croci hortensis & succo lupuli. Si egestionem uis humefacere fac clystere de ficibus siccis spinis egyptiacis camomilla semine croci hortensis si famelico obfomogaro zacca, nitro sale communi coloquintida & his similibus. Nutriantur de iure cicercis & lactucis. Quod si febris 40 dies transierit accipiat carnem, sed tamen cauant uiscosam carnem & unctuosam & multum pinguedinis habentem, abstineant in die accessionis a cibo, in die tranquilla consuecum accipiant cibum, sed tamen non multum, cauant igitur a frigidis & humidis. Da etiam gallinam hoc modo præparatam. Rec. folium petroselinum drag. 7. ouis crudi totam substantiam unius excepto cortice, sanguinis porci masculi lib. sem. salis quantum sufficit. Omnia terantur & in corpore gallinæ unam aunum non habentis mittantur & sumatur, deinde inuoluatur in pasta & optime sub testa coquantur. Cõpetit enim tertianarijs quotidianarijs & quartanarijs urinam prouocat febrem aufert, uirtutem confortat. Similiter potest fieri de folijs basilici, i. ozimi, quia appetitum irritant, cor & stomachum confortant. Cane tamẽ ne totam una uice comedant, sed paulatim & solũ modo plenum & carnem, de pasta minime, expertum est hæc tamen accipienda sunt in die tranquilla. Potent subtili uinum in calore temperatum, de auibus comedant eas quæ teneras habent carnes & facile digeruntur, uomitus prouocetur, & post cibum sumant diaciminum diatrion piperon. Statu morbi accedentem & coctionis signo in urina apparense subtiliter digere, purgetur cum pharmacia

pharmaciaz, clysteribus. dabis deinde diuretica, & uomitum omni die accessionis stomacho inuito prouocabis, & in die qua non uenerit accessio prouocetur uomitus post quam comederint, abstineant a pullis & omnibus uolatilibus per tres hebdomadas & plus donec materia fuerit digesta. deinde si uirtus permiserit, dabis annualem agnum. Quod si febris non fuerit fortis, neque uirtus defecta da helleborum album cum pitisana, & prouoca uomitum cum succo radicis aneti, & oximelle, assuefaciat thyriacam magnā, diatrion piperis, diasulphur & similia. Trocisci ualentes contra dolorem hepatis & splenis & febrem quartanam. Rec. lacte reubi. maratri anisi ana. dra. 4. eupar. absinthij succi amborum spodij. an. dra. 3. cuscute dr. 6. scolopendritæ. dra. 6. seminis portulacæ spicæ anisi apij seminis an. dra. 3. tempera cum succo maratri. Rec. maratri. drag. 3. croci piperis albi mundi an. dra. 4. se. mali gran. capparis radicem an. drag. 4. tempera cum succo apij. Antidotum contra quartanam quæ fit de incensione plegmatibus. Rec. myrrhæ. drag. 7. spicæ. drag. 3. amomi. dr. 4. aristolo. rotun. reub. an. dr. 6. opij. dr. 4. anisi apij sem. petroseli. an. dr. 1. castorei dr. 5. squinanti piperis al. caliceli. an. dr. 4. piperis nigri. dr. 7. ameos dr. 1. storacis. drag. 6. croci. 10. melliloti drag. 8. suseleos drag. 4. ydiocri. drag. 5. mellis quod sufficit, dabis; drag. 1. & sem. cum calida. Trocisci ydiocri. Rec. florum herbæ policariz albe & citrinæ mirrhæ an. dr. 2. dauci calami aromatici ciperi xilobal. assari ligni aloes an. dra. 4. rubæ costi spicæ croci masticeis an. drag. 5. tempera cum odorifero uino & fac trociscos. Pilule uilisimæ. Rec. hieræ pi. epithi. an. drag. 5. agari ci dr. 4. turbith. drag. 6. absinthij drag. 3. sulphuris albi ameos an. drag. 4. polipodij. drag. 3. maratri anisi apij an. dr. 1. & sem. tempera cum succo mēthæ & fac pilulas, quarum duæ donentur in die tranquilla.

De epialos & eius cura. Cap. XXXVII.

EPialos quia de uitreo nascitur phlegmate, necesse est ut curetur sicut amphimerina, sed tamē phlegma quod est in epialos quia est frigidum, oportet medicinam fieri calidiorem secundum materiam est frigida. Sed decet ab initio incipi a medicinis quæ debilititer sunt calefacientes donec eas assuescat, deinde paulatim ad calidiores ascendi. Plurimum nostra intentio est in hac febre, ut mundificetur stomachus cum repugnatiua & colatiua. purgetur etiam materia per uomitum & urinam cum oximelle & aqua calida in qua cocta sint spica anisum & similia. Quod si materia inceperit se mouere, & signum coctionis in urina apparuerit, purgetur materia cum apozimate de aloë, & apozimate de hierapi &

pillulæ de stomati, & pillulæ de fetida. Clystere fiat eis in quo intrabit semen croci hortensis & taurea anetum abrotanum herba policaria ameos bdellium serapinum coloquintida & his similia. post purgationem materie assuescant antidotum ubi assarum & castoreum ponantur, & pilulæ in quibus eupatorium mastix absinthium aristol. ro. & longa spica crocus & similia intrat. Dietam accipiant quæ sit lauatiua & diuretica si cur est ius eiceris cum oblongo garo cimino amig. blitiis radice sparagi porris omnibus conditis. Potent oximel squilliticum cum aqua calida. Accipiant post cibum diaciminum diatrion piperon diacalamentum & similia.

De lipario & eius cura. Cap. XXXVIII.

Liparios autem quia materia eius cholera est cum phlegmate mixta, dari oportet minus calidā quā in epialos sicut mel ros. oxizaccara apozima de aloë de hierapigra oxizaccara cum succo maratri apij mastice & similibus.

De febre quæ alios morbos sequitur.

Cap. XXXIX.

Aliquando est febris propter hepatis dolorem aut splenis cerebri lateris pulmonis renum aut similibus, & cessante morbo qui est causa febris cessat & ipsa, unde huiusmodi febris uilis curatio est ut certissime causam eius curemus, sanemus membrum cuius occasione est febris generata, sed prius oportet intelligi quia hæc febris quæ alios sequitur morbos, aliquando est debilis, aliquando est fortis. Debilis sicut ea quæ fit propter splenem, aut renes, aut propter uesicā. Aut est fortis & molesta sicut ea quæ fit propter cerebrum hepatis & lateris, & nonnunquam est debilis sicut & aliquando fortis sicut ea quæ fit propter pulmonem, dolor enim pulmonis si fuerit propter sanguinem aut cho. fit eius febris molesta. Quod si dolor fuerit propter phlegma & cho. nig. febris erit lenis. Molestatio autem febris quæ fit propter hepatis est propter materiam quæ est sanguis, leuitas autem eius quæ fit propter splenem est propter chol. nig. quæ est eius materia. Molestatio autem febris quæ fit causa cerebri est propter nervos & sensuum acumen. Lateris autem molestatio fit propter sanguinem qui est eius materia propter uiciniam cordis.

De dispositione interpolatarum febrium.

Cap. XXXX.

Omnis complexio quæ est extra naturā & temperamentum est quadruplex. Prima calida & humida. Secunda cal. & sicca. Tertia frig. & humida. Quarta frig. & sicca. Quarum nulla putredinem generare

nerare potest, nisi calida & humida. Hic queritur quomodo cho. ru. & nig. suscipiunt putrefactionem cum eorum natura non sit parata ad putredinem suscipiendam. Solutio. Siccitas tribus modis fit, aut enim est res sicca in natura & substantia eius liquida sicut mel uinum chole. nigr. aqua salsa & similia. Quædam in natura humida & in substantia sicca, sicut piper longum crocus zinzib. & similia. Sunt & alia in natura & substantia sicca sicut ferrum lapis & similia. Quæcunque autem in substantia sunt sicca & in natura humida, recipiunt putrefactionem. Quæ autem in natura & substantia sicca sunt, nunquam recipiunt putrefactionem. Palam itaque est quod cholera nigra & rub. non recipiunt putredinem propter earum complexionem & naturam, sed propter substantialem humiditatem illarum atque liquoris. Sanguis enim quia cum utraque qualitate conuenit putrefactioni, extraneo obedit calori unde fit febris continua. Cholera rubea quia cum una qualitate conuenit putredini i. cum caliditate, & cum alia, i. siccitate non obedit extraneo calori, unde habet 12 horas in labore & in requie. 36. Quod si eius accessio 12. horas transierit, & 7. periodos quæ sunt. 14. dies, dicitur notha. i. non uera. Febris quartana, quia cum duabus qualitatibus non conuenit putredini, durat. 24. horis & quiescit. 48. Quotidiana febris quia cum una qualitate, i. humiditate conuenit putredini, habet. 18. horas in labore & sex in quiete. Hic queritur quare terminus sit in quartana. 24. horis & non plus aut minus. Respondemus quod omne quod constituitur sub lunari circulo fit propter repugnantiam. 4. elementorum adinuicem oppositorum. Destructio enim nihil aliud est, nisi conuersio unius rei ad aliam, uerbi gratia. Elementa mutantur in cibum cibus in membra. Corpus cum destruitur humores ad aquam spiritus ad aerem, ossa ad terram conuertuntur. Hæc. n. actio elementorum adinuicem facta non est nisi propter motum solis & lune & omnium stellarum motum habentium, & sol est causa cæterarum & earum dominator, & cursus eius a loco procedens quo oritur & rediens usque ad eundem, non est nisi. 24. horis, proinde fit ultimitas accessionis quartanæ. 24. horis. Rursus si fuerimus interrogati quare calor extraneus in quartana. 18. horis moretur ad unam qualitatem, i. siccitatem & 24. permaneat. Respondemus siccitas corporis duobus modis fit, aut cum calore, aut cum frigore. Calor desiccatur corpus, quia illud rarificat & humores desiccatur, frigiditas autem non sic, quia materiam coadunat & congelat ad quam extraneo calore accedente materia congelata aperitur & fit perflua & obediens putredini. Siccitas vero quæ fit propter calorem, quia non in ea hum. sunt clausi uel coagulati necessario calor extraneus tardatur in eo quod liquefacit. Inter-

polatio nil aliud est quam qualitas materiam impediens cum sua duricia. Quod si prædicti humores intra uasa putrescant, faciunt febres continuas sine interpolatione, quia sunt cum sanguine in uasa, neque patiuntur rigorem ut in tertiana, neque frigorem ut in quotidiana uel quartana. Rigor enim non est aliud nisi materia membra pungens sensibilia. Rigor differt à frigore, quia in rigore sentit patiens punctione quasi acus uel spinæ sint in eo fixæ. quia causa ipsius sunt acuti funi. Frigus sentiunt egri quasi niuis congelatio, quia causa eius sunt graues funi & tardi ad mouendum. Item si dixerit quare chole. ru. in lipario calefacit exteriora & interiora minime. In tertiana uero simplici non simili modo agit chole. rub. Respondemus chol. ru. in tertiana est simplex, in liparios est mixta cum phlegmate. Item queritur quare uitreum phlegma & liparios non generant febrem sicut in epialos. Respondemus quia phlegma non est in toto corpore æquale, sed in epialos est phlegma per totum corpus æquale. Merito ergo ex præmissis inferitur quia qualitates non sunt nisi quattuor. i. calida, frigida, sicca & humida. Humana enim corpora non uidemus mutari nisi ad eas, & non sanantur, neque restaurantur, nisi per eas. Quia medicina nil aliud est nisi repugnatio unius contrarij ad aliud contrarium. Nos quoque non inuenimus nostra corpora mutari ac conuerteri, nisi ad calida, frigida, sicca, & humida, neque uidemus ea restaurari nisi cum calida, frigida, humida, & sicca. unde Aristoteles in quarta particula microscomi, per contrarium inquit curamur, per simile augmentamur. Quattuor igitur sunt qualitates, neque plures, neque pauciores, quarum duæ sunt actiue calid. & frigid. & duæ passiuæ, scilicet humid. & sicca. Quia calid. semper facit sicc. frigid. uero humiditatem, quam sententiam Iohan. Damascenus non approbavit, Aristoteles econtra. Palam intelligimus quia caliditas fortior est actiua & sicca, fortior passiuæ. Hac de causa tertiana febris habet 12. horas in requie, quia siccitas repugnat calori ut non fiat febris continua, & tardat eam usque ad tertiam diem. Et quia in quotidiana est debilior & actiua, idest frigiditas & debilior passiuæ, idest humiditas est modica interpolatio i. sex horis. Ac quia cholera nigra debilior est actiua, scilicet frigiditas & fortior est passiuæ, i. siccitas, necessario induratur unde requies est. 48. horis ad minus. Materia enim cholerica quia pauca est in quantitate, & quia fortiolem habet actiuam, idest calorem naturalem uel actiualem facit febrem continuam, idest sinocham. Materia enim cholerica, quia pauca est in quantitate, & quia fortiolem habet actiuam, i. colorem & fortiolem passiuam, i. siccitatem

facit febrem interpolatam. Materia enim phlegmatica quia est multa & grossa & humida, partem facit interpolationem. Melancholica vero materia, quia est pauca in quantitate & habet unam fortem activam .i. frigiditatem, & fortem passivam .i. siccitatem habet longam interpolationem. Omnis enim calor aut est naturalis aut nonnaturalis vel accidentalis. Calor naturalis cibum digerit, subtiliat, mundificat feces per propria loca, sed calor febris operatur cum sua natura in materiam quae est putrefacta per unamquamque exacerbationem ut eius humiditatem per unamquamque accessionem consumat. Ideoque cessante materia transit & febris.

De tertiana interpolata & eius cura. Cap. XL I.

Igitur si tertiana febris non sit continua, cum vomitu facile curatur. Rec. se. atriplicis. vnc. i. & sem. tritū. vnc. in panno raro mislum & in aqua ca. mollificatū fricetur in citho. Lac vero quod egreditur sumatur cum syrupo acetoso, vel semen infundatur in aqua in qua coctae sint radices cucumeris agrestis, aut cum oximelle. Rubea ad tertianā probata. Rec. opij. drag. 4. croci anisi cardamomi, storac. rubez, iusquiami, baccarum lauri ana. vnc. i. confice cum melle da duabus vel tribus horis ante accessionem. Si tertiana fuerit continua medicetur sicut acuta febris.

De tertiana notha & eius cura. Cap. XL II.

Si tertiana notha fuerit, cum hoc vomitu medicetur, misce mel & acetum seminis atriplicis, drag. 3. huic misce frica & cola & da patienti. Si tertiana fuerit duplex, dabis hydrocopion panchristum cum balsamo, & rubea & musa. Si solutionem patiat, dabis mel citoniatum ita confectum. Rec. succi mali citonij partem unam, mellis unam coque lento igne ad spissitudinem mellis. Si autē tertiana in autumno venerit, curabis eam cum diatessaron distemperato cum vino calido & cum rubea, aut musa. Cibi dandi sunt temperati, ut far graum bene coctū lactuca spinachia cucurbita assata & similia.

De cura quotidiana febris. Cap. XL III.

Quotidiana haec febris curetur cum vomitu.

Rec. tapfia lib. i. elasterii lib. sc. cinamomi vñ. 3. da cum oximelle dr. 2. vel secundū virtutē patitis. Si stomachus plenus sit humoribus detur oximel ut uomant. Rec. aceti phialas duas, mellis unam, seminis radic. raphani seminis atriplicis ana. vnc. sem. & coquantur ad medium & bibant ante accessionem & ieiunent una hora postea. Si vero non uomuerint accipiant aquam cal. Si vero quotidiana sit acuta, ferant usque ad septimum diem, diēta sit ptisanum. Si quotidiana admisceatur tertianae, detur panchristum & rubeatro. & ydropion quasi portione una utantur. Si vero non profuerit detur tyriaca. Si quotidiana in tempore veris fuerit, euacuabis panchristo rubea & esdra. Cataplasmata vero. Rec. micis panis fel terra aquo pondere confice cū ovo. molli affo cum oleo cypresino aut laurino & panno induto super viscera pone, probatum est.

De cura quartana febris. Cap. XL IIII.

Si quartanam nullus morbus praecesserit, in principio tribus diebus vinctis dabimus tyriacam magnam in modum auellanae cum oximelle squillitico, postea dabis laxativum sicut pigram, theodoricon, aut hieralogodion, aut nomitium superius scriptum. Corpore purgato mittatur in tinam aqua plenam in qua coctae sint nepita, pulegium, laurus, absinthium, ibique bibat tyriacam magnam cum oximelle squillitico, aut diatessaron, aut adrianum, aut diatriopion pereon, aut unum illorum quod in antidotario sumus dicturi. In die accessionis nihil manducet, & in duabus horis ante accessionem inuret tinam.

De cura duplicis quartana. Cap. XLV.

In duplici quartana detur panchristū & adrianum temperatum cum succo balsamite. In hyeme curetur cum esdra mixta cum portione sancti Pauli & musa enea. In aestate cum portione mixta rubez cum tyriaca mundissima & vino temperata, & fumigium facimus. Rec. gipsi spoliij serpentis pellis vituli marini hyeme cum melle adriano & cum trociscis ad quartanam probatis. Oleum petroleum dabis bibere, & vogatur dorsum cum calidis oleis & unguentis.

ISAAC ISRAELITAE

FILII ADOPTIVI SALOMONIS

REGIS ARABIAE.

DE FEBRIBVS

LIBER.



Prologus in eundem Constantini Monachi.



QUONIAM te charissime fili Iohannes lachrymas miesto cordis dolore perpetim effundere prospexi eo qd exilio nimioq; calamitatis merore extenuatū in ultima paupertatis inopia te persistere fatebaris, praesertim cum in litterarum ualitudine imbecillis permanens, quaecumq; medicinae artis solida longo temporis interuallo penetraueras, ignauiter in breui obliuioni traditurum te manifestabas. Vnde ego Constantinus Cassianensis monachus magao pietatis amore commotus, te paterna charitatis dilectione familiariter suscepi, & quae medicinae artis uilia scripta seu in mente imaginata habui, proculdubio tibi anhelanti animo concedere non negaui. Atque quoniam generum & specierum febrium diuersitates tibi super omnia difficiles uidebantur esse, neq; humilibus petitionibus & dulcium uerborum precamine indefinenter oraueras, ut in modico uolumine omnium febrium differentias tibi plantissime dictarem, tanti licet operis laborem hesitās diu facere denegaueram, multo tamen ac supplicii praecamine monitus, quia tu nullo modo cessaueras, tuus flexus petitioni hunc librum transfuli ex Arabica lingua in latinā, cuius uerba quisquis legēdi summa assiduitate perfectē intēderit, causas & accidentia uniuersas febres ostendentia agnoscere poterit. Quibus itaq; cognitis, curas earum leuissime impendere sciet.

De libri diuisione. Cap. I.

Liber ista in quinque diuiditur partes. Prima est de essetia febris eiusq; diffinitione, febris naturā & causam uniuersaliter ostendente. Secunda de ephemeris in tribus spiritibus generatis. Quorū primus uitalis spiritus dicitur, cuius fundamentum est cor a quo procedit ad totum corpus omnia eius membra uiuificans. Secundus

autem animalis spiritus nuncupatur, cuius fundamentum est cerebrum, & ab eo in totius corporis membra uenit, sensus ei praestans & uoluntarium motum. Tertius spiritus naturalis uocatur fundamentum, cuius est hæpar, & ab illo ad totum corpus tēdit, omnibus membris quatuor uirtutes dans naturales, quæ uidelicet sunt appetitiua, retentiua, digestiua, & expulsiua. Vnicuiq; membro necesse est qd sit uirtus appetitiua, calida, & sicca secundum naturam cholerae rubrae, ut desiccet humiditatem cibi, & attrahat eam ad se. Necesse est etiam qd unumquodque membrum uirtutem habeat contentiuam, cuius natura sit secundum cholera nigram, ut contineat cibum quousque digestio sua compleuerit suam actionem in eo. Conuenit iterum in eis uirtutem habere digestiuam secundum sanguinis naturam existētem, quatinus digerat cibum contentum, & in suam mutet essentiam. Virtus autem expulsiua phlegmatica naturæ existens, sit necessaria, ut per eam superfluitas & fex cibi expellatur a mēbris. Tertia pars est hæctica, quæ nuncupatur phytis quæ innascitur in solidis mēbris sicut in carne, uenis, lacertis, cartilagine, & his similibus. Quarta de acutis est febribus & accidētibus eas cōcomitātibz, sicut phrenesi pleuresi, uariolis, desudatione, & his similibus. Quinta de putridis febribus quæ sunt in humoribus, in sanguine uidelicet & phlegmate, & in utraq; cholera. Omnis enim cibus corpus ingrediens cum non totus sit laudabilis clarum quæ creans sanguinem, necesse est ut a natura digeratur & mudificetur eiusq; fex cum egestione expellatur. Si de prima digestionē fuerit, quæ constat in stomacho, aut per secessum, aut cum urina. Si de secunda sit in hepate existente, aut cū sudore, aut cum sputo alijsue modis per oculos, per nares, & per alia loca egredientibus, eiciatur. Si de tertia digestionē in omnibus membris existente, sit humor unicuique parti corporis præparatus. Sunt & alia quæ licet separentur a sanguine, quodam tamen modo regimentum sunt corporis, quamuis non sunt nutrimentum aut cibus sicut utraq; cholera & phlegma. Ideoq; naturā quēdam

dam eis preparavit loca, scilicet uidelicet cholera ru-
bea, splenem cholera nigra, stomachum pectus
& pulmonem phlegma. Ideoque quodcumque ho-
rum augmentatum fuerit, siueque qualitatis mo-
dum excederit, egreditur a loco suo, natura enim
illud odio habens deserit nec regit ipsum. Per-
manens ergo in concavitate membrorum, seque
conculcans calescit & putrescit generatque febrem
putridam secundum naturam putredinis gene-
ratam. Nasitur hac febris cum quilibet humo-
rum quantitate augmentatur, sed non propter
detrimentum alterius qui ei oppositus est, non
enim ipse a loco suo proprio egreditur, aut pu-
trescit in humore ei contrario diminuto, sed tan-
tum cum virtus eius corpori dominetur, conuer-
tit illud in suam qualitatem, atque morbus gene-
ratur secundum suam naturam. unde Gal. phleg-
ma inquit in corpore augmentatum si putrescat,
febrem generat, si autem non putrescat, rigorem
sine febre facit aliquantulum.

De quatuor inquirendis. Cap. II.

Oportet eos qui uolunt aliquid inuestigare,
primum hac quatuor ante animum suum pone-
re, id est an sit, quid sit, quale, & quomodo sit, &
quare sit. At quia omnis interrogatio fit qua-
tuor modis, necessario & responsio est quadru-
plex, uerbi gratia si queratur utrum medicina sit,
debet responderi utrique si credatur medicinæ.
Econtrario respondendum est si non ei creda-
tur. Quid sit inuestigatur de rerum essentia, ideoque
non potest responderi nisi data diffinitione sua
naturam ostendente, quemadmodum interro-
gari quid est medicina, dicendum est, medici-
na est scientia regendi complexionem naturalem
& conuertendi eam quæ est extra naturam ad na-
turalem. Qualis & quomodo sit ostendatur ex
subsequenti descriptione, sicut si dicatur qualis
est medicina, respondendum est rerum natura-
lium rationabiliter comprehensua, & cum eis pro-
ut necesse est comparatiua. Quare sit medicina
si interrogemur necesse est ut respondeamus pro-
pter quatuor hanc fuisse quæ dominantur medi-
cinæ, id est materiam formam artificem & perfe-
ctionem medicinæ, uidelicet pertinentes. Que-
renti ergo quare sit, dicemus medicinam esse cau-
sa necessitatis integritatis corporum, quæ cum sint
temperata cum nutrimento custoditur, & ser-
uat se in propria sua sanitate, & reuocat ea ad sa-
nitatem cum a temperamento sunt egressa. In
hac ergo responsione sunt illa quatuor quæ me-
dicinæ pertinere diximus, materia enim medici-
næ sunt humana corpora, ei uidelicet subiecta.
Forma medicinæ temperamentum est comple-
xionis corporis suæque compositionis perfectio.
Artifex est cibus & medicina, & medicus cum
eis operans. Perfectio regimentum est sanita-

tem custodiens & infirmitatem ad sanitatem re-
ducens, hæc est intentio & causa quare sit medi-
cina. Palam ergo est quid sit, quare sit qualis sit,
& quomodo sit medicina. Si queritur unde sit me-
dicina, necesse est ut inuestigetur rerum essentia
in eo quod sunt ex natura. Sed tamen qualis & quo-
modo sit non est inuestigandum nisi tantum ex
sola rerum essentia, proinde sufficit responderi
de materia & forma. Quare sit, & si non solum
inuestigari conueniat ex rerum essentia, sed etiam
perquiri ex sua causa, necesse est responderi de
quatuor rebus quas superius diximus. An sit
quoniam non interrogatur nisi ad sciendum utrum
inuenta necne, sufficit hæc responsio, si illam ha-
buerit naturam, econtrario si caruerit. Quod si
reprehenderint nos sophiste dicentes, quare ta-
cueris qualis sit cum eius inuestigatio non esset
nisi ex rerum essentia uidelicet utrum esset nec-
ne, quemadmodum dicimus homo est animal
rationale mortale an non. Respondendum est
eis non sequitur, uestra interrogatio falsa est &
corrupta. Vnam enim propositionem & perfe-
ctam & necessariam essentialiter inuestigatam
quæ nullo modo potest destrui nisi ablatis re-
bus quibus est inuenta opposuistis alij imperfe-
cte superficiali quæ etiam est possibilis poni &
non poni cum suis rebus. uerbi gratia. ratio est
essentialiter in homine, quia impossibile est ab
eo rationem separari nisi ablata sit humanitas,
propterea nequimus hominem dicere non esse
rationalem nisi abusive. Necesse est igitur re-
spondeamus de quali quomodo & qualiter sunt
ex substantia rerum: hæc enim interrogatio nil
aliud significat nisi de quali sit abusu sua uel abso-
luta interrogatio ex sequentibus rebus & eius
proprietas inuestigata, unde conuenit respon-
dentibus multis modis reuoluere questionem
donec securi fuerint & firmi de proprietate quæ
interrogatur, quæ uidelicet interrogatio fructu-
uideatur esse, affirmetur, si falsa negetur. Vna-
quæque enim res multas & diuersas habet pro-
prietates, quia quedam proprietates a substantia
est inseparabilis, ut calor ab igne, risus ab homi-
ne. Sunt & aliæ proprietates rerum assequentes
quemadmodum canities in homine. Sunt & aliæ
proprietates rerum accidentia ostendentes si-
cut uisio ignem, litteræ & artificia hominem.
Quod cum ita sit, necesse est non responderi de
qualis sit nisi questio prius reuoluatur & inuesti-
getur ut proprietas de qua fit questio pateat.
uerbi gratia. Si fuerimus interrogati qualis sit ho-
mo, respondemus homo est compositus ex mul-
tis qualitatibus ac diuersis rebus, sicut risu iure-
ris arte canicie, & his similibus. De qua igitur
harum qualitatuum dixerint uideamus quam si
uiderimus esse ueram, oportet nos eam affir-
mare & falsam negare. Palam ergo est quod omnis
questio debet esse responsioni opposita, & secun-
dum

dum numerū questionis debet esse numerus responsionis. Interrogatio autem est quatuor modis; & eodem modo necesse est responsio fieri, quod palam ostendit Aristoteles cum dicit: Investigatio rerum inquit cum æquali sit numero. quod optime dicit, æqualis enim numerus quatuor habet angulos, verbi gratia, quatuor longitudo sunt duo & latitudo duo: quoniam latitudinem si secundum longitudinem multiplicauerimus sunt quatuor. Sed reprehendimus ut Aristotelis discipulis, cur Aristotelicam intentionem non dixisti esse de nouem; inuenimus enim nouem quatuor habere angulos quia eius longitudo sunt tres & latitudo tres, & si multiplicata fuerit longitudo cum latitudine sunt nouem. Quibus respondendum est corruptam propositionem duobus modis opposuisse. Primum quia si Aristoteles intentio non esset de quatuor oporteret eum monstrare de quo alio numero quatuor angulos habente sua fuerit intentio sicut sexdecim-viginti sex; & iterum triginta sex. hæc omnia quatuor angulos habent. Rursus si eius intentio non fuerit de quatuor oportuerat eum dicere quadrangulo secundo; uel tertio; uel quarto. Alioquin quatuor est prior & dignior omni quadrangulo & per eum totius numeri fit complementum, verbi gratia: incipiamus ab uno qui est elementum & causa numeri, cui si iungimus duo quæ sunt initium numeri sunt tres; quibus si addimus tres quæ sunt ei uicinantes sunt sex. Deinde si ponamus quatuor quæ sunt ei naturaliter uicini sunt decem, fit itaque numerus completus. Palam igitur est quod si Aristotelica intentio de numero non fuerat nisi de quatuor. Et licet dixerimus omnem questionem fieri quatuor modis, dicimus tamen quoniam tunc fit quadruplex cum essentia rerum est sensualiter incomprehensibilis, sed cum sensui patet non est necesse ut prima questio dicatur, id est an sit, interrogare enim utrum homo sit necne maxima stulticia est, nam si insipientibus est hoc cognitum, quanto magis & sapientibus palam enim patet sensui, quod testatur Aristoteles, in libro qui dicitur apodexia; omnem inquit scientiam quæ nostro cognita est intellectui accepimus ab alia scientia, sic. n. una ab alia procedens uenit ad eam scientiam quæ non habet mediocritatem in se & nostrum intellectum. nulla ergo est querendi necessitas utrum sit homo an non, quia sensualiter potest hoc inueniri sicut cum dicatur omne duo est par, & omnis numerus aut par aut impar, & omne æquale si minuitur ab æquali necesse est quod ex eo permanet sit æquale. huius scientiæ nulla est mediocritas inter se & nostrum intellectum, sed conuenit inuestigari quid sit & quomodo sit & qualis sit & quare sit. Igitur si fuerimus interrogati quid sit homo, homo est animal rationale mortale, hæc itaque definitio est ei propria,

& suam ostendit naturam, atque facit eum differre ab aliis animalibus, quoniam animal est sum genus & elementum; & eius formæ subiectum, ratio autem & mortalitas sunt eius species & forma. de qualis sit sit est respondendum; homo est compositus ex anima immortalis & sempiternali & de corpore destructibili & dissolubili. testatur autem sempiternalem esse animam post corporis separationem, contrarietas quæ ipsa in æternum non indiget & mortis eius quæ sit per se substantialiter & non per aliud, omne inquit quod per se mouetur est indestructibile & infinitum. Sed corpus monstratur esse destructibile & finitum per motum eius qui sit de contrariis oppositionibus, & de eius operatione unius in alium, & quia semper naturaliter uolunt conueniri ad sua elementa, Sed potest à quibusdam nobis obijci dicentibus, quoniam contrarietas est ablata ab anima cum illam sensualiter uideamus contrarium recipere. Videmus enim mutari de scientia in stultitiam & e conuerso quæ utique sunt contraria. Quibus sic fiat responsio, scientia & stultitia non accidunt anime substantialiter sed qualitative, quia anima essentialiter est una, id est substantia incorporea & corporis complectiua, naturalis uidelicet & instrumentalis uitam in potestate habentis, anima ergo essentialiter nullam habet contrarietatem, quare sit homo si fuerit interrogatio, fiat illa responsio. Homo enim cum sit de naturali corpore constitutus, est organum rationalis animæ, ut cum eo rerum ueritatem discernere valeat, & cum eo operetur secundum quod rationi uinet. Sed si dicatur quare sit homo rationalis. Respondendum erit hoc modo, ut discernat bonum à malo, uerum à falso. Ratio enim nihil aliud esse conspicitur nisi discretio boni à malo. Igitur quia compleuimus de quo sit homo & quo modo & qualis sit & quare sit, subsequens est ut incipiamus de febribus quid sit & qualis sit & quare sit, supernacuum & magna stultitia est interrogare an sit cum ipsa sensui pateat. Est ergo incipiendum de febre quid sit: hac enim inuestigatione essentia rerum ostenditur.

De febris diffinitione. Cap. I. 111.

Febris est calor præternaturam in initio petens corpus mediocritatem, deinde subito se diuidens cum calore naturali per totum corpus naturali nocetractioni. Extraneo enim calore ad eum accedente naturalis egreditur à temperamento, cumque ipse per totius corporis membra diuiditur ut eis uitam tribuat, quia est egresus à suo temperamento; necesse est ut membra eum recipiant in ea qualitate qua est. unde calefacit & urit ea, generatque toti corpori febrem actioni naturali subito nocentem. Palam ergo est quod febris

febris nisi aliud est nisi calor extra naturam prius actioni nocens naturali. Sed cum absolute dicimus calorem, ostenditur calor febrilis & alii calores sicut naturalis corporis regitius & alius calor extraneus, sicut solis ignis balneorum & his similibus. Cumque dicimus calorem extra naturam, discerni oportet à naturali calore corporum regitius, quia calor naturalis semper est ab animalibus inseparabilis & calor febris est extraneus & ab eis separabilis, sed cum diuiditur per totum corpus, licet naturali nocet actioni, differt tamen à naturali & ab alijs caloribus sicut à calore solis balnei ignis & his similibus. horum enim calor quamvis sit extra naturam, infirmis tamen exteriora & interiora corporis, non calefacit, neque actioni nocet naturali & postquam ei noceat, tamen lesio non est primitiva, quia primum mutatur ad febrem, deinde febris nocet actioni. Illud ergo nunc documentum est propter febrem & non propter solis calorem. Cum naturalem dicimus actionem, intelligenda sunt cibi appetitio, somnus & uigilia sedere ambulare, & alia multa his similia, hæc enim minima deficiunt & mutantur propter febrem. Ideoque febris est morbus molestior, eiusque disputatio dignior, quia omnes morbi præter febrem unquam membrum eueniunt, & permanentes aliquo temporis intervallo, nec subito actioni naturali nocent sicut podagra, hydropisis, melancholia & his similia, nam unaqueque agitudine huiusmodi corporis membro accidit & non omnibus febribus autem e converso, quoniam per eam corpus intus & extra patitur. Nocet etiam spiritibus & virtutibus animatis actionibusque naturalibus. Et licet dicamus febrem actioni naturali esse nocitivam, non tamen eam destruit. Actio enim naturalis nunquam destruitur nisi cum sit separatio animæ & corporis. Quod si reprehendant nos quidam sophistæ dicentes, quare calor extra naturam prius ad corpus arterias teneat, quam ad cerebrum per nervos, & ad hæc per venas? Respondendum est, eorumque sciunt naturaliter calidius & siccius cerebro & hepate, quia fundamentum caloris naturalis est, & ab eo ad totius corporis membra procedit. Arteriae etiam calidiores & sicciores sunt venis & nervis naturaliter, & sunt viæ caloris naturalis, præcipue si aliqua harum sanguinem habuerit & spiritum levisima est, & velocissimam habet motum. Cor ergo & arterie, quia sunt calidiores & sicciores naturaliter, necesse est ut calor extraneus citius adhaereat eis quam nervis & venis propter siccitatem & similitudinem quam habent, ut gratia ignis citius in siccis lignis quam in humidis & viridibus incenditur propter siccitatem quam utraq; habent cum siccitate. Similiter hac ratione credendum est, quia calor præter naturam accidit velocius cordi & arterijs, ca-

lorem & siccitatem habentibus naturaliter quam alijs membris. Sed tamen quandam huiusmodi caloris viationem cor citius & citius opacitur, & quandam tardius secundum quod est materia febris, quemadmodum sanguis, & cholera rubra, sanguis enim augmentatus & sua uasa egrediens, & à natura spretus mox putrescit, quia sanguis est calidus & humidus, cholera rubra, licet cum una qualitate putredini repugnet, id est cum siccitate, cum calore tamen illi convenit. Sunt & aliæ materiae quæ sunt tardiores, sicut cholera nigra putredini repugnans cum utraq; qualitate, & phlegma cum frigiditate. Sed reprehendimur à sophistis nobis dicentibus, si utridicus est sermo quem dicitis ut nulla putredo fiat nisi cum materiae regimentum à natura relinquitur, sanguis enim quomodo à natura dimittitur cum omnibus pateat quod sanguis sit eius fundamentum & ab eo ad totum corpus procedat, & per eum confortetur, atque ipse sit eius nutrimentum. Quibus respondendum est, sanguis licet sit amicus naturæ, tamen cum fuerit temperamentum egrediens augmentatur, & naturam aggravans odio tenetur ab ea, qui quoniam ab illa non regitur nec custoditur, necesse est ut putrescat, sicut videmus patrem filium spernere & se expellere cum ei sit inobediens, & tamen dilectus est. Qui iterum si dixerint quomodo febris possit fieri de phlegmate cum phlegma natura hæret oppositum febrili. febris enim est calida & siccæ, phlegma vero frigidum & humidum. Respondemus ita, diximus febrem non posse creari de phlegmate in sua natura existente, sed cum egredietur à suo naturali loco suaque natura, & ebulliens putrescit, ex ebullitione vero accidenti sumit calorem, quod plenius sumus scriptum in suo loco cum de putridis febribus disputabimus. Cōpleta vero hac disputatione, oportet nos investigare utrum possit esse febris aut aliquis morbus de qualitatibus tribus necne, cum de dicamus quia impossibile est trium qualitatuum febrem fieri coniunctione, quarum due sunt oppositæ. Est ergo impossibile, ut febris de tribus qualitatibus iunctis generetur, quemadmodum de calore & siccitate & frigiditate. Frigiditas autem repugnat calori & destruit eum. Similiter de humiditate & siccitate & calore fieri morbum impossibile est, quia siccitas humiditati repugnat & destruit eam. Quod si aliqui sophistæ dicant, aut negasti morbum esse ortum de tribus qualitatibus, & dixisti unam esse complexionem de quatuor qualitatibus, cum quatuor magis sint repugnantes quam tres, tres enim in uno loco repugnant & quatuor in duobus, quia calor repugnat frigiditati & humiditati & siccitati. Respondemus quod humana corpora sunt composita de quatuor qualitatibus æqualiter ad invicem repugnantibus, & una alteri non dominatur, quæ-

cum agrediuntur à temperamēto suo ut una superet aliam, impossibile est ut duæ qualitates duabus alijs dominentur ac eas destruantur, quia non est dominatio nisi in una. nam destructa est ea quæ sibi fuerat opposita. Sed febrem dicimus habere tres qualitates. eius enim genus est triplex. Causa est, quia humana corpora tribus modis composita sunt membris uidelicet, solidis humoribus, & spiritibus. cumq; sint ex tribus composita, necesse est ut eius genus febris sit triplex, unum in solidis membris sicut carne, pinguedine nervis, venis, cartilagine, & similibus. Aliud in humoribus sicut sanguine phlegmate & utraq; cholera. Tertium in spiritibus. i. vitali qui est in corde, quod est fundamentum caloris naturalis, & in spiritu animali qui est fundamentum sensus & voluntarij motus, & naturali qui est fundamentum quatuor naturalium uirtutū, appetitiuæ retentiuæ digestiue cibi & expulsiuæ. Vnum quodq; enim membrorum corporis has quatuor habet, sed tamen stomachus & hæpar fortius habent has uirtutes, nam sunt eis familia res plus quam cæteris membris; quia licet cum eis operentur propter nutrienda semetipsa, illa tamen faciant operationem propter omnia corporis membra. Proinde quidam antiqui naturam sulto & iniusto regi assimilaerunt dicentes, quædam enim membra fecit esse delectantia aliorum membrorum actione, quædam etiā fecit esse laborantia causa iuuandi alia. Ipsi etiā arbitrati sunt stomachum & hæpar duas & diuersas habere actiones, quarum una sit propria ad eius nutrimentum, alia uero sit cōmunis etiam omnibus corporibus membris. Fecerunt argumentum de harum actionum diuersitate, & de remotione earum non in uno tempore venientium, dicunt enim stomachum in initio uniuersalem facere actionem & cibum mutare in chylum quasi in prisanum. deinde suam prout oportet particula riter facere actionem cum proprietate quam habet ad digerendum cibum, & conuertit eum ad nutriendum suam essentiam. Hac de causa æstimaunt illum duas actiones habere, propriam scilicet & cōmunem. Quorum intentio sic est destruenda, quia argumentum eorum duobus modis est corruptū. Vno modo si duas uirtutes digestiuas propriam uidelicet & cōmunem prout dixerant stomachus habet, necesse est ut sint remotæ ac diuersæ, una scilicet operans in uno tempore, & altera in alio. aut sunt commixtæ ut utreq; in una hora faciant actiones. Quod si unius actio ab alterius differat actione, & utraq; in uno fuerit loco, atq; in uno membro, impossibile est non mutari cibum secundū illius mēbri naturam, sed conuertitur & assimilatur essentia illius membri, quemadmodū uidemus cibum omnibus membris corporis assimilari. Naturalis enim actio in omnibus mem-

bris nihil aliud operari uidetur nisi conuerrere ad essentiam eorum illud quod fuerit eis simile. Stomachus igitur quoniam est unum membrum: vnā uirtutem necesse est habeat digestiuam. Quod si illæ duæ uirtutes, propria uidelicet & communis duo stomachi loca habuerint, necesse est ut illæ stomachi partes cibū pro toto corpore digerentes permaneant absq; nutrimento, propria enim indigent uirtute qua cibus possit mutari & geri & ad eorum similitudinem conuerti, quoniam membra omnia propriam habent uirtutem per quam cibus conuertitur ad eorum essentiam. unde reguntur nutriuntur & augmentantur. Rursus si fuerimus interrogati, utrum uirtus digestiua sit unius naturæ, calidæ uidelicet & humidæ, aut diuersæ, ut in quibusdā membris sit calidæ & siccæ complexionis, & in quibusdā frigidæ & siccæ, in alijs calidæ & humidæ, in alijs frigidæ & humidæ. Respondebimus uirtus digestiua in omni corporis membro, ea est & huius naturæ. Sed tamen ab unoquoq; membro quandā sumit proprietatem, per quam cibum mutat ad eorum similitudinem, quia si aliter esset, omnia corporis membra fuissent æqualia in forma & substantia. ossa scilicet caro essent, & caro ossa sic cetera. Item si dixerint, quomodo sensualiter actionem stomachi uidemus esse diuersam, si est una. Nam modo conspiciamus cibum in prisa non mutari, & postea uidemus ipsum conuerti in substantiam stomachi. Responso fiat huiusmodi, quanquam actio uirtutis digestiue in stomacho uideatur esse diuersa, una tamen est & eadem, quoniam digestio cibū in stomacho mutans in prisanum, est quædam præparatio cibum conuertens ad stomachi similitudinem, deinde finita digestionem, quandam accipit partem stomachi quæ est ei similis & nutritur ex ea, ceterum autem quod ex cibo restat, finit abire qd est sibi superfluum. & ideo non dimittit ut alia mēbra nutriat. sed quoniam stomachum aggrauat neq; ab eo potest retineri. Vnde Gal. causa inquit nutrimenti quinque modis est. Prima est causa secunda & secunda tertiæ, & sic alia. Prima. inquit inanitio hamidicaris membrorum & dissolutio eius quæ fit per corporis poros. Secunda est naturale desiderium omnibus in membris existens, quod cogit membra ut appetant cibum. Tertia conculcatio substantiæ stomachi, aut intestinorum propter mōseraicas eum sugentes. Quarta sensualitas stomachi cibi inanitionem sentiens. Quinta est uirtus appetitum faciens, quæ fit propter choleram nigram à splene ad os stomachi ascendentem, qua os stomachi mordente fit appetitus. Quod si quidam sophistæ dixerint, cur non dixit quod causa appetitus sit inanitio. & paupertas cibi in stomacho existens, quemadmodū dixisti sensum membrorum inanitionem cibi sentientem esse causam euacuandi uenas,

uenas, & uenarum euacuationem esse causam pramendi stomachum. fames etiam similiter quare stomachum non constringit. Respondendum est si appetitus sit in stomacho propter uenarum & membrorum inanitionem, necesse est ut eius actio non sit naturaliter, sed rationaliter, quia cum eius actio fiat propter aliud, & desiderat aliquod aliud remotum longe ab eo, necesse est fieri cum ratione, quare si possibile est fieri in una qualitate, necesse est ut fiat in omnibus. Oportet ergo ut ignis non ardeat nisi cum uolumus, aliquid urere. Cuius quaestionis falsitas palam patet intellectui. hoc testatur Hipp. cum dicit. Omnis inquit digestionis complementum fit cum attractione rei attrahenda & imitatio ne eius & causa attractionis omnis est desiderium omnis etiam desiderij causa est paupertas eius rei quam desiderat indigentia, cuius sermonis intentio talis est. uirtus digestiua non digerit, nisi prius operetur uirtus appetitiua quae semper est ante digestiuam, similiter appetitiua non operatur nisi prius sit inanitio cibi. Appetitio ergo cibi & inanitio & sensualitas appetitus quae est in stomacho, non est propter aliud, nisi propter se, causa uidelicet se nutriendi.

Propter quid sit febris. Cap. V.

Febri fit propter aliquod accidens humorem & spiritum calefaciens & eos faciens extra temperamentum exire, quod tribus modis fit. Est enim causa febrem generans, & est alia custodiens eam, & est alia qua febris crescit & augmentatur, si cur uidemus in igne esse tria. Est n. causa quia ignis generatur, est & alia causa qua custoditur, est & alia per quam augmentatur. Causa quidem ignem generans est putredo aut uehemens motio, quemadmodum aliquid cum putruerit, sicut cum sordities quae se se concutiat & constringit calescit & putrefit uritur ac ignem generat. Similiter uidemus fortem & uelocem motu loca calefacere eum circundantia, & ignem generare. hoc testatur molendinus qui cum suo motu calefacit aerem sibi uicinatum, quam si in motu suo multum augmentetur in sua motione feruendo ignem generabit. Causa ignem custodiens res est eum operiens ab aeris percussione. Et quoniam aeris ictus dupliciter fieri potest, necesse est duo in igne faciat, quia si aer fuerit mobilis ignem cum suo suscitatur motu uel ictu. & eius adeo confortat actionem in corpore quod est ei subiectum donec illud diuidat atque consumat, deinde quia caret subiecto extinguit. Si uero aer fuerit quietus & immobilis cum sua naturali humiditate, & accidentali frigiditate, ignis superficiem percussiens extinguit, quae extincta enecat alteram, sic quae pars partem destruit, & sic omnino ignis extinguitur. Sed reprehendimur a quibusdam de

uentis dicentibus, quare inquirunt ueni super ignem perflantes eum suscitatur & confortatur, cum etiam si cum flabellis mouetur aer ignis ilico excitatur. Quibus sic fiat responsio, perflatio uentorum non est causa custodiendi ignem, sed consumedi eum quia uenti super ignem inflantes expellunt eum cinerem & terrestrem partem corporis quod est ei subiectum, proinde augmentatur & confortatur. Sed si uenti super ignem plus moti fuerint, omnes partes corporis in quo ignis constat aperiuntur, unde uirtus ignis multo magis augmentata deuorat & consumit partes corporis, deinde carens subiecto extinguitur. Venti ergo non sunt ignis custoditiui, nulla enim causa custodie ignis nisi ea quae regit eum ab aere ne extingatur ab humiditate naturali, & accidentali aeris frigiditate, sicut diximus. Illa tamen res qua regitur ignis, necesse est ut habeat uacuum inter se & ignem, in quo aer permanens fiat calidus causa caloris ignis, & custodiat ignem cum sua similitudine, propter hoc ignis extinguitur magis in hyeme quam in aestate, propter frigiditatem aeris hyemalis calori ignis repugnantem. Res uero augmentans est ea quae nutrit eum sicut oleum cera pix & similia. Simili modo intelligenda est haec ratio in feb. Tres enim causae in feb. continentur, una feb. generat, aliam eam custodit, tertia eam augmentat. Causa uero feb. generatiua est nimia corporis & animae motio & putrefactio atque humorum ebullitio. Causa autem qua febris custoditur ut non dissoluatur, corporis est oppressio, & pororum constipatio, per quos clauditur fumus in corporis interioribus. Causa uero eam augmentans calida sunt cibaria & potus & calida medicina. Febris causa generaliter est triplex generatiua scilicet, custoditiua & augmentatiua. Sed generatiua duobus modis est, aut praesens aut praeterita. Dominus est sicut est ea corpus extrinsecus percussiens, quae tripliciter diuiditur, una nimis est feruor solis & ignis, secunda est nimia frigiditas sicut niuis & similia, tertia est putridus horribilis & corruptibilis odor, sicut cadaueris, bestiarum reptilium & similia. Praeterea quemadmodum est aegritudo quae fit propter angustiam & tristitiam & humorum copiam ad putredinem praeparatorum sicut diximus de actione naturae, quia autem natura cum non est inueniens cibum laudabilem humano corpori similem, illam partem cibi quae est corpori inconueniens ac dissimilis separata simili & congrua & claudit eam in quibusdam corporis locis. Pars uero quae est conueniens corpori & modificata bene nutrit totum corpus. Superfluitate cibi itaque augmentata ac in loco ubi clausa fuerat multiplicata, egreditur foras implens locum cum sua multitudine, quae a natura dimittitur & non ab ea regitur, quia cum fuerat in loco in quo natura eum posuerat rexit & custodiuit eam.

Egressa uero inde odio tenetur nec ab ea regitur, sed permanet in membrorum concavitate. Vnde quando aliquod euenit sibi accidens sicut à natura temporis regionis loci aeris & his similibus illa superfluitas mutatur contra naturam & putrefaciens generat morbos. Hac de causa antiqui assimilauerunt naturam temporum anni absolute humanæ complexionis & compositioni, & naturam regionum atque locorum humanæ ætatis, & naturam aeris non existentem secundum complexionem temporum anni assimilauerunt humanæ naturæ quæ non est secundum suam complexionem. Oportet autem in corpore sit actio suæ complexionis & compositionis, quæ in eo operantur. Reperierunt etiam regionis complexionem. i. aerem qui non est secundum complexionem temporum anni facere in corpore: sicut in eo actio complexionis agit temporum anni, quæ non est secundum corporis complexionem uel compositionem, ac ætatem, quoniam si humana corporis complexio est secunda uel prospera ad similitudinem anni regionis augmentatur & regitur. si autem fuerit e contrario minuitur & destruitur. Et quia in hoc loco nostre disputationis est finis & nostram absolutam compleuimus intentionem, dicendo quid feb. sit & qualis sit & quare sit, oportet nos dicere disputationem uniuscuiusque feb. sigillatim. Incipiendum est igitur ab æphimera, quæ fit in spiritu quod propter quatuor res facimus. Vna quia hæc cito ad corpus uel ad cor de parua uenit occasione. Secunda quia eius disputatio & significatio ad aliarum febrium comparisonem facillima est & planissima. Tertia quoniam curatio eius lenissima, si secundum quod oportet fiat, caret enim materia unde medicus expectet digestionem & solutionem. Quarta quia plurimum hæc fe. est causa aliarum durarum. Spiritus enim non habet materiam per quam calor permaneat causa feb. cessante. Sed febris quæ est in humoribus & in solidis membris, quia habet materiam, permanet in corpore calore qui est causa feb. prætereunte. Ideoque feb. ephimera causa est duarum aliarum febrium, quæ fit duobus modis quia aliquando humores sicut diximus in corpore augmentati suis exeuntes locis, sunt quæ præparati ad putrefactionem. Vnde cum ephimera feb. accedit ad spiritum, necesse est illam calefaciat materiam, & eam putrefaciat, qua putrefacta feb. necessario ex ea generatur aut quia medicus nonnunquam errat in cura ephimeræ feb. & facit sumere infirmum cibum ante congruum tempus, aut quoniam iubet ei abstinentiā habere, quousque status febris transit, deinde cibum donat & balneare eum fecit, priusquam cibus digeratur. vnde calor balnei cibi digestionem, secundum quod oportet non præualens perficere & crudus circa corporis exteriora egrediens cu-

tis poros cum sua claudit cruditate atque insensitate. vnde illic permanet illius cruditas & superfluitas non potens per poros exire. Similiter fit in solidis membris, quia aliquando quandam habent humiditatem non naturalem ad insensibilem calorem præparatam, aut siccitatem. quæ si calefiunt per ephimeram & deficiunt non ualent illum calorem à se expellere, permanens ille calor in eis febrem hæcticam generat.

De ephimera febre. Cap. VII.

Ephimera est abusuuum nomen, fuit enim à quadam bestia maris translatus quæ non uiuit nisi per unum diem quæ feb. quia non permanet nisi per unum diem, hoc nomen est ei à simili impositum. Sed tamen Gal. dixit se eam uidisse usque ad tertiam diem & quartam procedere, quod raro contingit cum pori corporis sunt clausi, maxime cum fumus qui ab eo dissoluitur fuerit grossus, quia pororum corporis opilatio naturalis siue accidentaliter grossum fumum non sinit resolui. vnde fit causa elongandi febrem, quæ si quartum diem transierit, & sanguinem calefacit & incendit, à sua natura egreditur & mutatur in causam, quæ iterum si multo plus morabitur, ut naturali corporis humiditati coniungatur, in hæcticam feb. mutatur. ideoque diximus quod ephimera est causa aliarum febrium, & nulla alia est causa ephimeræ. Sed reprehendimur à quibus sophistis dicentibus. quare Galen. dixit ephimeram unius diei & postea dixit eam posse uenire usque ad quartum diem? Quibus respondemus Galen. diuisit feb. generaliter in tria. scilicet in spiritibus humoribus & solidis membris. Quia igitur ephimera in spiritu moratur plurimum non transit nisi unum diem & raro ad quatuor dies ascendit, ne quid aliud nomen inuenire quod ei imponeret, unde appellauit eam ephimeram, sed tamen non diuisit eam absolute, quia determinauit eam cum dixit sic. si ephimera transierit diem quartum mutabitur in causam. possibile est enim ut causa ephimeræ diu in corpore morantis uratur sanguis & febris nascatur continua. Causa uero ephimeræ generaliter in duo diuiditur, aut enim fit propter alium morbum, aut ipsa est morbus. Illa autem quæ non fit propter alium morbum in duo partitur, aut fit intrinsecus aut extrinsecus, quæ iterum diuiditur in tria. Vnum est calor solis & æstatis magnum incendium facientis. Aliud est nimietas algoris & congelatio & balneatio in stipticis aquis, sicut est aluminosa nitrosa & sulphurea. Tertium est animæ siue corporis exerciticia. Animæ sicut ira tristitia angustia cogitatio. Corporis uero sicut nimius labor ambulantium & equitantium. Aut sit intrinsecus sicut ex cibis & potibus & medi-

cina omnibus calidis. Feb. itaque facta propter aliud quædam est febris apostemata semper sequens in inguine in collo sub ascellis & sub axillis nascentia, his enim præcedentibus febr. est eorum accidens, licet morbus sit accidens corporis, quia accidens duobus modis est, aut simplex, aut compositum. Simplex sicut febr. non facta causa alterius, sed ipsa sit morbus. Compositum quemadmodum est febr. propter aliud creata. Sed Galen. diuidit accidens duobus modis, unum inquit est uniuersale, & aliud est particulare. Particulare uero est sicut illud quod non est propter aliud, sed propter ipsum est morbus. Uniuersale uero quemadmodum accidens aliquod morbum subsequens, quod est duobus modis, aut est inseparabile sicut dolor capitis sitis, spiritus angustia, quæ semper accidunt febribus neque ab eis separantur, quæ licet sint in quibusdam fortiora in quibusdam debiliora, fe. tamen sine istis nunquam potest esse, sicut corpora nullo modo inueniuntur quæ umbra omnino careant, aut est separabile ut sit aliquando quandoque non, sicut nigilia alienatio stupor in quibusdam accidunt febr. quibusdam non. hæc enim feb. eueniunt pessimis aliquando. Sed potest nobis obijci à quibusdam dicentibus, quare feb. de causa inguinis per apostema factam dixi sit esse de ephimeris, cum Hipp. in Apho. dicat q. omnis fe. de inguinis apostemate nata est pessima. Quibus respondendum est, gloriosissimus Hipp. suam intentionem determinate dixit, cum dixit si non est ephimera feb. Apostema enim in inguinibus duobus modis fieri potest, aut cum illud sit per se morbus, aut cū sit propter aliud, propter aliud cum est palam ostensum sensui, sicut cum sunt vulnera in talo pede & in simili quæ sunt salubria, & eorum feb. cito dissoluitur proinde etiam eam posuimus in genere ephimeræ feb. Sed si ipsum est per se morbus sine causa sensui comprehensa sit feb. eius molesta & pessima, significat enim aliud apostema esse de humoribus grossis & putridis & in inferioribus corporis existentibus & pestilentialibus morbis creatis, hæc de causa determinauit illud Hippo. cum dicere si non est ephimera feb. Rursus si opponant nobis dicentes multos uidemus homines animæ & corporis laboribus utentes, tamen in ephimeram non incidunt. Respondebimus accidentia corporis eueniunt quatuor modis, aut propter eorum complexionem, corporis simulantem sicut est oleum cera, pix, adeps quæ sunt igni similia, aut propter corpus ad recipiendum accidentia præparatum sicut calamus pili & similia, quæ sunt præparata ad recipiendum ignem, aut propter eorum accidentium uirtutem corporis dominantium sicut est uirtus opij, quæ dominatur omnibus corporibus multam eius quantitatem accipientibus, aut propter illorum acci-

dentium idem continuatum per longum tempus corpora percutientem, sicut sensualiter uidemus aquam guttatim lapidem percutiendo perforare propter continuationem longi temporis. Quod cum ita sit, necesse est ephimeram generetur in corpore ad causas febrium generari præparato sicut corpori calido & sicco, quæuis ipsæ causæ sint multum fortes, aut sint multum debiles uel multum continuæ. Quibus ergo tribus causis si corpus careat, impossibile est ut in ephimeram incidat.

De significationibus ephimeræ. Cap. VI.

Ephimera habet significationes quibus differt ab hæctica, habet & alias quibus differt a tertio multas etiam habet alias cum quibus febr. putredinis non conuenit. Differentia uero quam habet cum hæctica, hæc est, quia causa ephimeræ est ex paucis temporibus. Causa uero hæctice ex longo. In hoc ergo differunt, sed & in calore conueniunt. Causa enim ephimeræ febr. est ex duobus uel tribus diebus, causa uero hæctice ex duobus uel tribus mensibus uel pluribus est. Sed febr. putredinis nullam concordiam habet cum ephimera. Hæctica quidem est cum ephimera concordans tribus modis. Vno quia causa ephimeræ & hæctice est una, sicut angustia tristitia fortis cogitatio & his similia. Secundo quia ephimera & hæctica sunt de simplicibus qualitatibus materia carentibus. Tercio quia calor ephimeræ & hæctice non est multum fortis. Sed febres putredinum sunt istis oppositæ, quia causa earum est qualitas cum materia, & illæ sunt simplices, istæ uero compositæ. Amplius quia cal. & causa istarum est fortis & putrigitius propter ebullitionem & incensionem putredinis humorum quæ est earum materia. Distantia uero ephimeræ & tertie hæc est, quia si ephimera fuerit secundum q. oportet, nec infirmi nec medici aliquod acciderit peccatum, determinabitur in primo, tertius uero non similiter, quoniam ephimera sicut diximus, si nullum habuerit impedimentum, in primo die erit dissoluta quasi à balneo egredientium, & admietate urinae & sudoris. tertius uero licet raro habeat sudorem, in primo tamen die non est secundum crism, sed propter lenitatem materię & subtilitatem inter cutem & carnem latrantis, nectantus calor feb. fuerat ut omnino posset illam desiccare, proinde debiliter eam calefaciens eam exiccat modicum. Quod si reprehensum erimus à quibusdam sophistis dicentibus, si ephimeræ feb. est de sola qualitate materiam non habente, quare determinatio eius sit cum sudore, & fumo. Respondebimus recte ephimeræ feb. sudorem & humorem esse negauimus,

mus, quia de tertiz digestionis superfluitate est hoc quod dissoluitur per corporis poros cum sudore & fumo & urina propter febris calorem & uirtutem actionis nature, quemadmodum uidemus homines semper pati propter nimium motum uel propter aeris uel balnei calorem. Inuenimus enim hanc humiditatem sub cute existentem dissoluere nonnunquam & usque ad corporis interiora perforantem, & interiorum humiditatem excoquendo eliquantia cum urina expellere eam, propter hoc saepe uidemus: quia qui balneum temperatum habent calorem ingredientur, si sitim habuerint propter corporis eorum siccitatem curantur a siti, quoniam calor balnei cum sui subtilitate dissoluit humores & sicca humectat membra quæ sunt causa sitis. Febr. iterum ephimera tres habet significationes quibus à febribus putridis differt. Una quia calor ephimeræ est leuis & suauis, quæ cum ad statum uenit nullam facit angustiam & laborem, quia caret materia in qua natura laboret ad digerendum & ad expellendum. Secunda quoniam urina ephimeram habentium est quasi sanorum in colore liquore & hypostasi, quæ licet inter se differant, modica tamen earum erit discordia, uidelicet in colore & rubore. Tertia, quia pulsus ephimeram patientium non distat à sanorum pulsu, nisi in dilationis uelocitate & constrictionis tarditate. Tarditas enim constrictionum pulsus significat materiam non esse in corpore partem arteriarum constringentem ut illa exterius expellatur, quia uelocitas dilationis pulsus acutam & calidam innuit qualitatem. Vnde necesse est ut natura organorum partem uelociter dilataet, ut multam aeris quantitatem attrahat per quam illius qualitatis acumen refrigeretur. Ephimera igitur febr. quæ fit ex sola qualitate id est calore sine materia non est sibi necessitas ut constringat uelociter partem organorum, quia non habet quid expellatur, proinde fit motus pulsus in dilatione ad attrahendum aeris subtilitatem qua calor refrigeratur plus & uelocius quam cum pulsus constrictione.

De ephimera quæ fit propter calorem solis, & eius cura. Cap. VII.

Ephimera quæ est propter solis feruorem, intelligenda est si capita patientium toto corpore sint calidiora, quia calor solis spiritum calefacit animalem & uitalem fortiter & uelociter sine mediatore. Spiritus animalis calefit causa feruoris solis caput percutientis, & propter solis feruorem cito ad eum per flatum uenientem. Sed tamen illa quæ est de calore solis, maiorem capiti infert calorem quam toti corpo-

ri propter solem capiti repugnantem & ei oppositum, proinde nimium capitis patiuntur dolorem, & in facie feruorem, & uenarum plenitudinem in temporibus existentium. Nonnunquam etiam rheumate exagitantur cum nimio calore & naribus incensione. Subtilitas enim caloris tenuis calefacit & eliquat capitis humores, & facit eos ad nares descendere. Illa uero quæ est propter æstium aeris calorem, plus calefacit corpus quam caput, quia calor aeris per flatum facilius ad cor ascendit quam ad caput. Cuius significationes hæ sunt. Corpora enim patientium sunt incensa & sicca propter aeris calorem, unde magnam habent sitim & aerem desiderant frigidum. Vtile huius febr. curamentum est ut in frigidemus & humefaciamus aerem, & in pauimento domus sternamus frondes & flores infrigidas, & calidos fumos extinguentes, sicut uiol. rosas nenufar frondes psilij semperuiuam salicis frondes flores basiliconis & huiusmodi, & semper sunt cum aqua frigida uel rosata infundenda. Et licet basilicon sit cal. in primo gra. tamen proprietatem habet ducendi frigiditatem aquæ per nares. Sed oportet nos patientium nares saepe humectare cum oleo uiol. nenufari. & similibus. Vngenda sunt tempora camphora & aqua ros. si non habuerint rheumata, & si rheumata habuerint capitis de humorum fumositate, cauendi sunt de aceto & camphora. Ad nares eorum apponemus fumum aque calidæ in qua decocta sint viola & camomilla. Cauent ab omnibus olei unctionibus. Quod si non habuerint capita de humorum fumositate plena, neque rheumate, bonum est ut capita eorum roremus post declinationem febris aqua in qua cocta sint viola & camomilla. Quod si capita eorum plenitudinem habuerint, abstineant ab hac aqua, & solummodo fumum eius odorant. Succum utriusque generis malorum granatorum accipiant. Comedant melones palestinos, uas hyemales, medullam citruli & cucumeris, omnia cum niue refrigerata, si niue fuerint affuerint. Vinum bibant mixtum cum syrupo granatorum & viol. Egessio eorum sicca si fuerit, humectanda erit cum syrupo viol. facto de prunis oxifenitia & similibus. Post febris declinationem, bonum est si balneentur in temperato balneo aeris & aquæ temperamentum habente. Manducent in initio prandij medullas citruli & cucumeris & micam panis lotam cum zuccaro. Mundificatio autem stomacho de humoris copia & febris fumositate expulsa, demus pullos gallinaceos, perdiges coctas cum iure condito de succo malorum grana. & aceto uuarum agrestium cum ramis portulacæ lactucæ, & similibus.

De ephimera que fit causa frigiditatis & congelationis, & eius cura. Cap. V. 111.

PAtiētes ephimeram propter frigiditatem & congelationem, cognoscuntur cum significatio- nibus oppositis ephimerę propter solis & aeris calorem generate, quia hi qui patiuntur ephime- ram de solis & aeris feruore creatam, habent ex- teriora corporis calefacta, unde cutis rarifica- tur. Isti uero qui causa frigiditatis ab ephimera molestantur, habent suorum superficiem corpo- rum frigidam & siccam, & poros cutis constipa- tos & oppilatos, quare calor ad interiora corpo- ris clausus sanguini dominatur, & uenit ad hæ- par & naturali uirtuti dominatur priusquam ui- tali & animali, propter hoc color cutis eorum mutatur in plumbeum & obscurum colorem. fa- cies eorum est tumida, & sentiunt nimiam frigi- ditatem & grauitatem in capite. Nares eorum aut nihil emittunt, aut si aliquid ab eis currit, est frigidissimum & viscosum. Pulsus eorum est paruus & uelox. Causa paruitatis est oppilatio pororum. Causa uero uelocitatis est conclusio caloris ad corporis interiora. Sed tamen parui- tas & uelocitas pulsus minor est istis quam eis qui in stiptica aqua & nitrosa se balneauerint. Il- li enim plus istis oppilatos habent poros, & cu- tem siccam. Urina eorum alba est & cruda duo- bus modis. Vno quia fumus qui solitus erat per poros exire est clausus ad interiora uenarum, qui cum fuerit augmentatus (alias humectatus) sanguinem humefacit, etiam eum adiuuat aer qui per flatum intrat. unde in frigidato & hume- ctato sanguine calor eius deficit, proinde san- guinis color mutatur in albedinem. Et quia uri- na est coamentum sanguinis, necesse est ut sit alba & cruda. Alio modo quia humores ad inte- riora corporis coadunati naturalem impediunt calorem ad digerendum urinam, unde merito urina est alba & cruda.

De cura prædictę febris. Cap. IX.

OPortet hos ante omnia cauere sibi à balneis priusquam morbi fiat digestio, & uiolentia fe- bris sit declinata. Cum cuius morbum uideris di- gestum, & febrem declinatam esse, mittendi sũt pedes eorũ usq; ad genua in aqua calida in qua cocta sint camomilla sãfucus hyssopus sũmbriũ abrotanum & similia, & ipsi inclinentur super fumum eius, deinde balneum temperatum in- grediantur, & fricentur ibi, ut pori aperiantur, & cutis eorum humefiat. Igitur eum cognosci- mus qd pori eorũ sint aperti, & calor qui ad cor- poris interiora coadunatus fuerat, sit dispersus & dilatatus, & quædam sit pareius ad corpori- bus exteriora progressa, lauabimus capita eorũ cũ aqua calida in qua cocta sint camomilla ane-

tum & miscebinus eom aqua quædam oleum, eum dissolutiuam habentia sicut camomil- leon anetileon yreleion nardileon. Et cauendi sunt ab epithematibus nisi cũ omnis sudor fue- rit egressus, ne causa epithematũ pori claudan- tur, & materia quæ necesse est cum sudore exire exire nõ possit, sed permanens ad corporis inte- riora maximum generet nocumentum, & ducat patientes ad magnam molestiã perditionis. Ca- ueant ne diu in balneo morentur, quia aqua li- cet corporis sit humectatiua magis ceteris re- bus, eius tamen calor perforat corpus usque ad interiora. Vnde cum fumi fuerint intus in cor- pore existentes calefiunt, repugnat eis gros- sities aque. Ideoq; melius est si in aere morentur quàm in solio, quia cum solium implet poros & claudit cum humiditate aquæ, aer uero balnei & poros aperiens est, & fumositatem corporis dis- soluens, idcirco exercitia istis sunt conuenien- tia, & quia exercitia temperata dissolunt & rari- ficiant corpus & uias per quas fumi eorum tran- seant, oportet illos cibos accipere subtilis uide- licet laudabilem chimum generantes & nullam eis frigiditatem ingerentes. sicut hedylina caro annualis agni & similia. quia secundum nostram intentionem oportet corpora eorum humecta- ri cum artificio quo aptata sunt iure condito, ut uidelicet cum albumine oui & succo parue cepe & modico cymini carui cinamomi & similibus. Abstineant a viscosis cibis & grossis. Potent ui- num cum aqua calida mixtum, multis operian- tur indumentis, & iuxta eorum latus ponendi sunt carbones ignis ut repugnent frigiditati ae- ris, naribus eorum odorifera applicentur quę temperate sunt calefacientia, sicut sanfucus pteos & sũmbrium & de fructibus sicut sunt citruli & similia. Quicunque etiam rheuma habuerint ca- ueant sibi à balneo nisi cessante morbo.

De ephimera que fit propter balnea aqua stiptica. Cap. X.

QUicunque ephimeram patiuntur causa bal- neorum stipticam aquam habentium & deficca- tiuã sicut est nitrosa & aluminosa & sulphurea cutem habet sicciorem & magis oppilata quàm superiores, propterea quia calor clausus est ad interiora corporis eorum, & dominatur sangui- ni, & ueniens ad hæpar prius actioni nocet na- turali quàm uitali & animali, quorum he sunt si- gnificationes. Si tangatur cutis eorum inuenitur extensa & aspera, quemadmodum coria in lon- go tempore infra gallas & cortices mal. grana- posita. Quod si manus alicui parti corporis im- posita diu moretur ut cutis calefiat, causa calo- ris palme manus fumum sentiet, qui de illo cor- poris loco dissoluitur, calidum & acutum esse

De punitium. Pulsus etiam eorum in initio febr. minor est & uelocior. pulsibus superiorum; quia cutis eorum est sicciore & magis opprobriata. vnde cum siccitas contingit usque ad interiora corporis membra, fit pulsus eorum tardus & largus. Causa tarditatis est siccitas organorum, quoniam frigiditas in interioribus & exterioribus corporis dominatur. Causa largitatis est multitudo & coadunatio eorum humorum quæ in organis est non dissolutorum. Urina eorum est multa & turbida & aliquantulum pertinens ad albedinem & candidatem. Multa uero est propter humiditatem ad corporis interiora conclusam, quæ solita fuerat per sudorem exire & fumum. Cruda est & alba duobus modis. uno quia urina non permanet in loco coctionis ut coquantur & rubei fiat coloris, alio propter nimiam humiditatem sanguini commixtam.

De eius cura. Cap. XI.

Huius febris curatio similis est superiori. Oportet etiam sicut diximus: ut balneentur, sed non nisi declinante feb. & deponantur pedes usque ad genua sua in aqua quam supradiximus. deinde in temperato balneo balneentur. cauendi sunt ab omni unctione, bonum est si aliquantulum exercitijs utantur. cibos leues accipiant, qui sint faciles ad digerendum, & bonum generent chimum, aliquantulum frigiditati pertinentes, ut ualeant humorum ad interiora coadunatorum acumen exinguere. Vinum non bibant nisi corporum careant plenitudine, & cum omnis fumositatis a corpore expulsa fuerit.

De ephimera quæ fit propter cibos potusque calidos & eius cura. Cap. XII.

Ephimera quæ fit propter cibos & potus calidos in initio ad spiritum peruenit naturalem. Omnis enim cibus siue potus uenit ad stomachum, & ab eo ad hepatis, qui cum fuerint calidi, necesse est ut calefaciant sanguinem & spiritum naturalem. Deinde uenientes ad corpus totum corpus diuiduntur. Ideoque urina eorum rubicundior est ceteris omnibus ephimeras patientibus, augmentata igitur febr. sentiunt dolorem & calorem in hepate. vnde oportet studiose hepatis curari cum oxizac. & succo malorum granat. iuleb. & aqua ros. & camphora, cibos accipiant portulacam uidelicet atriplices scariolam pullos gallinaceos cucurb. & similia. Cataplasma hepatis & stomachum a cibo inanitu de sandali. ros. farina hordei, aqua ros. camphoras & similibus. Comedant melones palestinos mala granata mala poma pira poma cirrino medullas coctana, melle spila uuas mōra & similia.

De ephimera quæ fit propter ieiunium, & eius cura. Cap. XIII.

Ephimera quæ est propter ieiunium differt ab omnibus ephimeris, quia facies patientium est macilenta citrina quasi facies agnitudines exuntium oculos habent concauos pulsusque debiles & ueloces, urinam acutam & rubicundam. Causa debilis pulsus est defectio uirtutis eorum. Subtilitas eius est propter inanitionem organorum. Velocitas eius est propter necessitatem aerem attrahendi ad cordis calorem mitigandam & acutos fumos abintus exterius expellendum. Rubor urinae fit causa paucitatis naturalis humiditatis & siccitatis corpori dominantis. Vnde oportet in statu feb. nullum dari cibum, sed succum accipiant malorum grana. & potum accipiant aqua palestinae uuarum hyemalium succum forbeant. Quod si hæc eis non sufficiant & famem eos percipiat, dandus erit succus melle panis cum zaccara lotæ declinante itaque feb. si uideatur succus esse digestus damus ptisanam calidam, & expectabimus usquequo digesta erit, deinde mittamus eos in balneum & cum corpus calefieri inceperit, & sudores emittere unguendum erit cum oleo viol. ut claudens poros repugnet humiditati corporis ne extrinsecus exeat, deinde dietetur cum cibis lenibus & subtilibus, & ad digerendum facilibus atque tenuem sanguinem generantibus.

De ephimera quæ fit propter labores & eius cura. Cap. XIII.

Ephimera quæ fit causa laborantis corporis fit propter equitare, ambulare, & cetera subito tribus uirtutibus accidit spiritualibus, sed tamen ad spiritum animale magis est pertinens, quia in exercitijs membra fricantur & calefiunt, quibus necesse est ut lacerti & nervi sint calefacti, ut calor ad cerebrum priusquam febris accedat. unde febr. ueniente & calore cerebro dominante, necesse est quod spiritus caloris cerebrum percutiens dupliciter fiat, cuius significationes hæc sunt, corpora eorum sunt debilia & sicca. Quod si labor eorum multus fuerit, & sudor eorum acutissimus, aut nihil sudat, & hoc duobus modis. Vno, quia sudor qui debet exire cum febre est finitus causa laboris. Alio quia spiritus solens per poros emittere sudorem est defectus. Qui etiam si parum laborauerint, sudant tamen paruissime, quia humiditas eorum ex labore dissoluta & quasi finita est. Proinde pulsus eorum paruus subtilis uelox, & duplex in dilutione propter necessitatem attrahendi aerem ad interiora, ut mitigetur acumen caloris corporis eorum. Paruitas & subtilitas pulsus est propter membrorum

defectionem, & paupertatē spiritus uitalis. prae laboris enim nimietate dissolutus est. Ideoque magnum in articulis, & in concatenatione dolorum patiuntur, qui ut curētur oportet aliquid requiei ingeniari, deinde cum oleo ro. uel nenupharino ungantur. Quod si labor modicus extitit, fricentur corpora eorum multum, si autem multus, fricentur parum. Post ea in temperato balneo lauentur saepe & nullam moram in eo faciant, ne substantialis eorum humiditas consumatur, & in hæticam incidant. In solium descendant ut corpora eorum humefiant. exeuntes autem solium cum oleo uiolaceo uel nenupharino ungantur ut clausis eorum poris humiditas accidentaliter intus in corpore acquisita permaneat. Coitum fugiant ne corpora deficcantur. Dietam accipiant. starnos, perdices, pullos gallinaceos, hedulos agnos annuales, pisces laudabiles digestionī obediētes. Potent uinum lene & aqua multum mixta, quæ membra eorum humefcet. Vinum enim corporis penetratiuum est, coeunte aqua cū uino digeritur & humefacit membra. De fructibus comedant mala granata uuas pura mala & similia.

De ephimera quæ fit propter bubones in inguine, collo, & sub ascellis & eius cura. Cap. XV.

Ephimera ex bubonibus in inguine collo & sub ascellis accidentibus duobus modis est, aut enim causa eius est in propatulo, aut est e contrario. Ea uero cuius causa est non in propatulo, ab Hippoc. in aphorismis testante cognoscitur. In bubonibus inquit feb. omnes male exceptis ephimeris. Quæ autem est manifesta fit propter pustulas uel apostemata & uulnera in manibus uel pedibus siue capite nascentia. Causa uero horum bubonum hæc est, natura enim nascētibz his pustulis uel apostematibus currit ad regenda & custodienda eorum loca, similiter & sanguis & uitalis spiritus cum ea portantur, sanguis ergo per mollia & lacertosa loca præteritis replet ea & morans in eis generat apostemata, nomina à locis sumentia, qui diu ibi permanens calefit, cuius calor ad cor perueniens febrem generat. Vnde pulsus eorum est magnus uelox & spissus, urina cruda & alba, facies eorum rubicunda & turgida, febre quoque cessante quædam in superficie apparet infusio. Causa magni pulsus est multitudo sanguinis & caloris uitalis spiritus nimietas, uelocitas & spissitas fuit ex necessitate naturæ multum aerem ad cor attrahentis, ut refrigeretur & extinguatur caloris acumen. Albedo & cruditās urinae est propter sanguinem & calorem naturalem à coctionis loco remorū, & ad loca infirma exeuntem rubor faciei propter sanguinem superficiei corporis dominantem, tumor propter sanguinis plenitudinem, su-

dor declinante feb. euenit, quia natura abundantiam humorum interius coadunatorum excludit uel expellit. Vnde oportet nos ante omnia studere, ad curandas pustulas & apostemata quæ causa bubonis fuerant. Deinde balneentur & in aere balnei morentur, ut humorum copia paulatim dissolvatur, neq; quolibet unguento ungantur, qui uolentes in solio descendere in eo morentur. Dietam accipiant subtilem ad digerendum facilem & substantiā laudabilem habentē.

De ephimera quæ fit propter uigilias & eius cura. Cap. XVI.

Ephimera quæ fit propter uigiliam, in spiritum constat animali, quæ his signis cognoscitur. Patientium facies & totum corpus est citrinū omni concaui, palpebre molles & graues ad mouendum tardæ, pulsus eorum est paruus, urina subtilis & indigesta, uulnus tumidus. Citrinitas propter cholera est se ad exteriora propter uigilias mouentem, tumor faciei est propter uentositatē & ciborum cruditatem, quia propter uigilias calor naturalis ad exteriora egreditur, unde locus coctionis absque calore permanens cridam & fumosam uentositatem facies, facit cutem tumescere. Concauatio oculorum duobus est modis. Vno quia spiritus uitalis uisibilis solens implere substantiam oculorum defectus est. Alio quia carent nutrimento propter uigilias. Paruitas est pulsus propter uirtutem causa uigiliarum deficientem. Subtilitas urinae est propter solitudinem quam patitur anima in uigilia. Cruditās eius est propter uigilias naturā in coctione urinae impediētes, & actionem sensuum eam ad exteriora prouocantium. Vnde cum fit huiusmodi feb. uirtus in animali spiritu in cerebro existente, necesse est ut turbetur cerebrum propter nimietatē sui motus, proinde oportet impedire magnum studium, sicut promouemus somnum cum frictione pedum, hoc epim trahit humores in capite existētes & repugnat fumo ad caput ascendenti. Cibus accipiant modicum, qui sit facilis ad digerendum, quia natura propter defectionem non multum suffert cibum. Vinum bibant temperatum in quantitate & uirtute. A coitu omnino caueant quousq; ad priorem usum eorum conuersi fuerint.

De ephimera quæ fit propter iram & eius cura. Cap. XVII.

Ephimera quæ fit propter iram, uirtuti animali & naturali dominatur. Animalī propter impetum animæ ad faciendum uindictam se mouentis, naturali uero propter naturæ solitudinem ad corporis exteriora exeuntis. Proinde oculi eorum sunt rubicundi foras exeuntes, citrosi; hunc & illuc

& illuc se mouentes palpebrę eorum sunt siccę, pulsus magnus & fortis, rubor faciei & oculorū eminentia, motusque eorum uelocitas propter sanguinis ebullitionem, & propter naturam ad corporis exteriora exeuntem, & propter animę furorē se uindicare uolentes, sicut Arist. dicit. Ira inquit ebullitio est sanguinis natura ad exteriora tendente propter animam se uindicare uolentē, sed tamen si ira cum timore fuerit mixta, erit color eorum modo rubicundus, modo citrinus, quia cum natura mouetur ad exteriora cum anima causa uindictę faciendi sanguine cum eis egrediente facies fit rubei coloris. Anima uero & natura ad exteriora redeuntibus, ut prę timore cor custodiant, conuertitur cum eis sanguis, quocirca facies citrina fit, siccitas est palpebrarum propter nimium earum motum anima sollicitate illas. Vnde desiccatur eorum humiditas. Magnitudo pulsus duobus modis fit. Vno propter fortitudinem cordis, natura illud sollicitante. Alio propter uirtutē corpus in essetia fortitudinis sue permanentis. Non enim prius aliquem morbum habuit quo uirtus corporis debilitata sit, unde necessario urina eorum sit digesta nullum habens acumen. digestibilitas eius fit, quia calor naturalis est in loco coctionis. indigentia acuminis est propter extraneum calorem ad interiora intrantem & cito exeuntem. Oportet ut in initio curę ingeniemus quomodo cor eorum confortetur, & calor extingatur, quod fit cum expulsiōe irę quam ipsi obtinent, deinde in temperatum mittantur balneū scilicet prout fuerat horum consuetudo, & post sudorē ungantur cum oleo uiol. cal. Postea descendant in solium, ibi tamen non egrediētes a balneo, comedat frigida & humida & abstineat a uino. quo usque calor eorum declinabitur, uinum autē mixtum accipiant, caueat sibi a coitu ne putrefactis eorum humoribus putridas incidant feb. aut qui dam ab eorum capite humores descēdentes apostema generent.

De ephimera que fit propter angustiam & tristitiam ac earum differentia.
 Cap. XLIII.

Differentia est inter angustiam & tristitiam, quia tristitia ad rationalem pertinet uirtutē in cerebro existentem, angustia uero ad spirituale in corde existentem, ideoque angustia plurimū fit causa phrys quā tristitia, sed tamen quia causa utriusque & curatio est una, necessario dispositio earum est una. Dicimus igitur quod ephimera quę fit propter angustiam & tristitiā habet has significationes. Oculi patientium aliquando foris eminent, & ueloces sunt ad mouēdum, & aliquando concaui & difficile mobiles, non uquam enim neque concauantur, neque

foris sunt eminentes. Causa diuersitatis est tristitia, aliquando enim est tristitia propter magnam filiorum uel parentum cogitationem, & quandoque propter magnam suspicionem & timorem, & aliquando est neque timorosa, neque suspecta. Igitur cum sit cogitatio de rebus lætificantibus, oculi eorum sunt foris eminentes huc & illuc, nonnunquam mobiles, quia anima desiderat uindicare (alias uidere) quod amat. Vnde natura egrediens ad corporis exteriora exit sanguis cum ea. Ideo facies & color eorum est rubicundus, & urina eorum minus habet acuminis solito, & pulsus eorum magnus est. Quod si tristitia & cogitatio fuerit propter aliquē timorem & suspicionem, sunt oculi eorum concaui & quieti, quia natura conuersa est ad interiora ad custodiendum cor. Idcirco splendor faciei mutatur, & corpora eorum sunt macilentia, pulsus subtilis & urina acuta. Si uero tristitia fuerit inter rem amabilem & odibilem me diocris, erūt oculi eorum quieti neque concaui, neque foras exeuntes. Diniditur tristitia iterum duobus modis. Vno in cogitatione & inuestigatione laudabilium rerum ad rationem pertinentium, sicut est cogitatio diuinę bonitatis seu clementię iustitię naturę rerum & similium, quę naturaliter ad animam pertinent. Alio in cogitatione pessimę & immundę rei atque illaudabilis apud animam sicut est amor, qui her eos dicitur, ludus & carnalis lētitia. Quęcunque uero cogitatio sit de laudabilibus erit cogitatio semper laudabilis & acceptabilis apud animam. Cogitatio uero de pessimis & uituperabilibus rebus profert uerba corrupta & pessima animęque inconuenientia, igitur quia perfecta medicina est quę & causam tollit egritudinis, necesse est ut ab ea incipiamus, & ingeniemus quo possimus auferre ab eis cogitationem & suspicionem cum diuersis musicorum generibus, & cum omni causa lætitiā prouocante, ut obliuioni tradant tristitiā, & quiescant animę eorum a labore, quia anima per cogitationis nimietatem debilitatur atque infirmatur, similiter & corpus debilitatur propter animam. sicut dici Aristot. uitium animę sequitur complexionem corporis, & corporis complexio animam concomitatur. proinde oportet nos non negligere corpus, sed adiueamus illud cum rebus humefacientibus. Caueant sibi ab omnibus cibis desiccatiuis, ne causa eorum ueniant ad phrym, quia hæc ea magis pertinet ad istā quā ad ceteras ephimeras. Siccitas enim istorum corporibus dominatur, & corpora eorum calida sunt. unde oportet illos humectari, scilicet cum balneo temperato, & descendant in solium, deinde ungantur cum oleo uiolato, dietam accipiant frigidam & humidam quę sit facilis ad digerendum sicut prūsana, caro hadulina encurbita atriplex portulaca

laca blitus. Vinum bibant quod non sit vetus & multum sit mixtum; de fructibus uidelicet huiusmodi comedant, sicut sunt vix melones palestini & similia.

De hætica & phrysi & cura eorum.

Cap. XIX.

Priusquam de hætica & phrysi disputemus, necesse est ut eius diffinitionem dicamus. Dicitur ergo phrysis esse corporis humiditatis consumptionem, quæ est naturalis uel non naturalis. Naturalis est sicut patiuntur senes uel decrepiti cum naturalis eorum uirtus in digerendis cibis, & in humiditate nutritiua attrahenda deficit; ut restauretur corporis humiditas, quæ per frum & sudorem dissoluta est. Hæc est causa consumptionis decrepitorum corporum arborum & terrenaſcentium. Causa uero consumptionis est tribus modis. Vnus est nimius calor substantialis humiditatem desiccans sicut calor solis facit in æstate. Secundus humorum nutritiuum ablatio, sicut in hyeme non pluuioſa. Tertius humorum nutritiuorum est corruptio, & eorum ad malas qualitates permutatio, sicut ad nitrositatem uel sulphureſcitatem, aluminositatem & similia. Sic & in humanis corporibus contingit, consumuntur enim ablatis humoribus ea nutritiuis, & natura prout oportet in digerendo cibos deficiente, neque membra quæ dissoluta sunt restaurare ualente, sicut senibus euenire diximus. Vnde antiqui uocauerunt hanc speciem phrysis decrepitam. Corpus etiam calore extraneo dominante, & substantialem membrorum humiditatem desiccante, consumitur, sicut fit causa acutarum ægritudinum eam præcedentium, similiter de angustia & diuturna tristitia. Præterea corpus aliter consumitur, cum sanguis corporis nutritiuus à sui dulcedine & saporositate mutatur quemadmodum propter longam ægritudinem mutatur, quia sanguis in diuturna ægritudine corrumpitur & proprium perdit saporem. Vnde membrorum natura odio tenetur, nec ex eo nutriuntur, membra igitur nutrimento carentia inſrigidantur & desiccantur, & consumuntur. Consumuntur quia non nutriuntur, inſrigidantur, quia sanguine qui est calidus & humidus cessante necesse est membra inſrigidentur quæ solebant de sanguine caleſcere. Quod si reprehendant nos sophistæ & dicant, quare antiqui seniores dicuntur sicca habere corpora cum sensus ostendat contrarium, inuenimus enim seniores maioris esse humiditatis quàm iuuenes. Respondimus in prima huius libri particula diximus quod humiditas decrepitorum fit accidentaliter propter defectionem caloris naturalis eorum cibaria prout oportet digerere nequeuntis, & propter debilitatem membrorum tertia digestio-

nis superfluitatem expellere non ualentiu, quod testantur hydropici, corpora enim eorum plena sunt multitudine citrine aquæ, membra tamen habent macilenta & consumpta. Non naturalis itaque consumptio duobus modis est, aut cum feb. aut sine feb. sine febr. est aut calida aut frig. fri. uero consumit corpus, uel propter diuturna apostemata, uel propter alios diuturnos morbos, humidi enim morbi quia sunt diuturni nimium de corporis humiditate dissolunt. Vnde inſrigidato corpore uirtus digestiua deficit, ideo quæ cibaria cruda & indigesta permanent, quæ cum ita sint membra corporis abhorrent ea, neque eis nutriuntur, quam quidem molestiam patientes pulsum habent debilem, tardum & strictum, urinam albam & subtilem & crudam. Pulsus est debilis ex dissolutione uirtutis corporis propter ægritudinis diuturnitatem, tardus propter caloris naturalis defectionem, sui quæ congelationem. Cruditas urine propter frigiditatem complexionum corporis dominantem, & propter calorem naturalem in loco coctionis deficientem. Subtilitas & claritas sunt propter corporis siccitatem, & naturalis humiditatis indigentia urinam ingrossare solentis. Consumptio quæ est ea sine feb. fit propter calidos humores cordi appositos, quorum fumus ad cor ascendens eius mutat complexionem eique accidentalem præstat calorem. vnde sanguis corrumpitur, & propria eius saporositas mutatur & membra illam odientia nec ab alio nutrita consumuntur. Vnde Gal. uidi inquit hunc chimum sensualiter uolens enim corporis interiora perſcrutari sicut scio machum intestina & similia, præcepit in spacioſo loco poni simiam simul & sæpe perquiri ut qualiter corpus eius consumeretur, tandem per medium diuidens eam inueni ad cor eius humores corruptos, quorum fumum ad cor ascendisse, & suam complexionem corrupisse credidi, quo circa antiqui hanc consumptionem uocauerunt phrysim decrepitam. At quia complexiuis diffinitionem phrysis naturalis & non naturalis oportet incipiamus de accidentali quæ est cum feb. Phrysis igitur quæ cum febr. fit duobus modis est, aut ipsa per se est morbus, aut propter alium. Quæ uero per se est morbus, fit ex rebus calefacientibus & desiccantibus, plurimum tamen causa eius est ephimera, maxime si propter exercitia animæ fuerit, sicut propter uigilias, cogitationem, tristitiam, angustiam, legere & inuestigare, ex omnibus enim istis animalis spiritus fatigatur & spiritalis, & accidentalem accipit calorem, qui calor cum morabitur substantialem consumeret & desiccabit humiditatem, maxime si corpora fuerint ad hoc præparata, sicut sunt calidam & siccam habentes complexionem, macilenti stricta habentes pectora, & capita spicularum foras exeuntia sicut aly auim stantes

in ætate iuuenili, videlicet quæ est à 18. annis usque ad 35. præcipue si æstas fuerit uel calidus aer, aut regio calida. Nonnunquam etiam fit propter corporis exercitia, sicut propter equitare aliosque labores facere, aut propter calida cibaria & potum & medicinam. Phthisis uero, quæ est cum feb. quæ fit propter alium morbum est quatuor modis, aut est de ephimera quæ moratur, maxime & proprium terminum transit & sanguinem calefacit, aut est propter febrem acutam cum calefacit & extenuat sanguinem & dominans consumit substantialē humiditatem, aut est propter febriles putredines cum cōmiscetur & suas mutant interpolationes, aut est propter diuturnas egritudines consumentes membrorum humiditatem, sicut cum uenit ex tussu dolore peitoris pulmonis dyaphragmatis renū & ylij dolore qui est de calore & apostematibus omnibus apparentibus, quæ sunt proluxa corpus calefaciētia & consumētia. Significationes autem phthisis uniuersaliter sunt quatuor modis. Vno quia feb. totum corpus circumdat, & omnibus membrorum humoribus & spiritibus æqualiter dominatur, membrum tamen solidis multo plus est familiarior, proinde antiqui hanc feb. naturali calore non in temperamento, sed in continuatione assimilauerunt, quia membrum est inuiscata, nec ab eis seiungitur, sed miscetur naturali colori & ei assimilatur, quia ipse est a membrum inseparabilis sicut calor naturalis, neque enim augmentatur, neque decrescit spiritus ipse, si tamen declinat nonnunquam ut febris putrida intra uasa existens. Differt tamen ab ea, quia febris hæctica sine causa manifesta declinat, sicut putrida feb. sed feb. putrida intra uasa permanens, aliquando declinat in initio cum uomitu. Secundo quia calor licet totum corpus circundet, est tamen lenis neque pungitius. unde infirmi se nullam pati feb. estiunt. Tertio quia calor plumbeus est & liquidus, & citrinus, splendido enim sanguine indiget. Quarto quia tempora eorum aspectu oculi concaui siccam comitantem cachexiam, nutritiua enim humiditas ablata est ab eis, hoc testatur totius corporis siccitas. Hæ sunt significationes uniuersales hæctice, particulares uero diuersæ sunt. Hæctica uero quatuor modis est, causa est, quia humores sunt quatuor. Vnus est in uasis sanguineus, scilicet humor in uenis existens sicut humiditas arborum terre quæ nascentium permanens in summitatibus eorum, uelut humiditas in ramis uitis existens. Secundus est humiditas existens in concauitate membrorum, in quibus natura nondum tertiam fecit digestionem, nec eam membrum assimilauit, sicut est aquosa humiditas quæ est in arboribus & terrenaescentibus, & uelut humiditas quæ est in frumento & uitis nondum maturis. Tertius humiditas est membrorum in quam natura incepit operari, sed ta-

men non coagulauit neque perfecit eam sicut est caro generata quæ non est membrum assimilata, & sicut humiditas frumenti quæ cepit coagulari & saporisfera fieri, & mollis tamen adhuc permanet & humiditas uis coagulari & dulcis fieri incipiens, sed tamen non est desiccata nec ad duriciem conuersa. Quartus est humiditas membrum regens & custodiens, sicut humiditas in membrum coagulata, & ad duriciem conuersa & cum membrum unum effecta, sicut humiditas frumento assimilata, illud ne putrescat custodiens, & sicut humiditas uarum passerum substantiam earum ne putrescant obseruans. Igitur quia corporis humiditas quadruplex est, necessario species hæctice tres sunt. Vna est humiditas in membrum permanens, in qua natura nondum tertiam digestionem operata est, neque membrum eam assimilauit. Secunda membrum est humiditas qua operari natura iam incepit, sed tamen non coagulauit neque eam perfecit. Tertia est substantialis humiditas qua reguntur & custodiuntur membra. Causa primi hæc est, humiditas enim sanguinis si augmentetur, & naturam superet, odio tenebitur, nec ab ea regetur nec mundificabitur, quia amplius demorans maxime calefit & putrescit ex corporis calore, & feb. putrida secundum suam materiam intra uasa generabitur. Quod si non augmentabitur, neque a natura dimittatur, sed solummodo propter id quod in ephimera feb. diximus calefiat, & calor, usque ad mundificationem sanguinem qui est in arterijs deueniat, coniungatur cum eo & confortabitur, & uenarum & articularum substantiam calefaciet, calor etiam usque ad humiditatem quæ est in raritate membrum permanente accedet, & eius unctuositatem desiccabit, qui quia unctuositatem & saporem amittit merito a membrum non suscipitur, membra igitur nutrimento carentia consumuntur. Hæc est prima species hæctice, proinde hæc species ad curandum facilis, si sapientis manus patiens inciderit. Medicus enim si inceperit uelociter calorem extinguere cum frigidis & humidis sicut cibus potu odore aere & similibus, citissime illum calorem exstinguet, & infirmum sanabit. Cui nisi succurratur, & calor in corpore sit permanens & augmentans, & usque ad humiditatem membrum quæ coagulationi uicina est, deueniat, eorumque desiccet unctuositatem & saporositatem membrum non assimilatur ipsi eadem odieribus, unde consumptio & siccitas eorum augmentata fiet. Ex hæc secundum species hæctice quæ dura est & molesta ad curandum. Quod si calor magis augmentetur & substantiali membrum humiditati dominetur & eam siccet, & ueniens usque ad humiditatem membrum quæ fuerat cum eis ab initio cōplexionis desiccabit eam, & fit tertia species hæctice quæ incurabilis est. Calor enim extraneus humiditatem mem-

bra custodientem desiccavit operans in ea sicut calor solis in lapide & ligno operatur. Calor enim solis longo tempore lapidum & lignorum humiditatem desiccavit & eorum unduositatem separat, & quasi cinerem eam facit. Causa est, quia lapis & lignum sunt de quattuor elementis composita, proinde calor in eis hæc operatur, quod testatur actio ignis in lapide frigido, desiccavit enim & ad caleem illum convertit. Est ergo possibile ut simili modo operetur calor solis longo tempore, nulla enim differentia est inter calorem solis & ignis, quia ignis nisi velociter, iste vero tardius operatur. Possumus enim intelligere quod lapis habeat substantialem humiditatem, cum arbores & herbe in montibus & lapidibus oriatur, quod si humores non habeant nutrir & augmentari minime possent. Completa igitur hæctica disputatione quæ est propter alium morbum, oportet nos sequi ordinem hæctice quæ non est propter alium morbum existens.

De hæctica quæ non fit propter alium morbum.

Cap. XX.

CAUSA hæctica quæ non est propter alium morbum humiditas est in concavitate cordis & venis & arterijs inhabitans, quæ si calefit, & a sua natura in calorem & siccitatem, propter animæ exercitia prout diximus, mutetur sine ulla diminutione sui fiet prima & simplex species hæctica quæ per seipsam est morbus. Hæc itaque facile causatur, quia calor extraneus non est nisi in humiditate sanguinis quæ in corde est & in suis venis & in arterijs, nihil enim in eo facit nisi solummodo calefactionem & ebullitionem. Quod si calor augmentetur & calefaciat substantiam cordis & arteriarum atque uenarum, & siccetur humiditas eius quæ est vicina coagulationi, fit secunda species huius hæctica. Quod si plus augmentatus fuerit calor hæctica, ut desiccet substantialem humiditatem cordis & suarum uenarum & arteriarum illum custodire & regere solentem, fiet tertia species huius hæctica, fiet quoque incurabilis sicut diximus. Et quia complevimus causam hæctica quæ est propter alium morbum, & causam eius quæ non est propter alium morbum, sed propter se, necesse est ut dicamus uniuscuiusque speciei significationes. Dicamus igitur quod hæctica quæ propter alium morbum fit sicut propter ephimeram, intelligenda est ita, quoniam cum videmus aliquem ephimeram habentem de angustia, tristitia ira & similibus animæ exercitijs, & feb. permanet usque ad tertium diem consistens in una qualitate, sicut non augmentetur neque minuatur, & apparent in cute infirmi obscuritas lividitas, duritia & consumptio, & manu super infirmum posita sentitur calor pungens & acutus, & nulla hora augmentatur neque minui

tur aut declinatur, est prima species hæctica feb. Quod si appareat cum his signis augmentum feb. cum infirmus manducauerit, intelligimus secundam speciem huius feb. esse. Sed tamen subaliquo oportet investigari, quod si damus ei cibum temperatum & laudabilem tribus diebus in diversis temporibus, in prima videlicet die mane, in secunda ad sextam in tertia vespere, & in unoquoque horum dierum feb. augmentari viderimus, & ad corporis exteriora exire, pro certo credendum est hanc esse secundam speciem. Causa est, quia calor infirmorum est intra corpus quietus, ad quem cum cibis & potus venerit, suscitatur & dividitur exiens extra corpus, quod testatur de calido lapide vel calce, aqua enim super eos incidente mox calor in interioribus eorum reconditus extra corpus egreditur. Causa est, quia aqua cum frigiditate & humiditate calori opposita est, eaque calcem percutiens humefacit eam cum sua humiditate. unde facit aperiri porum, & veniens aqua usque ad calorem, calor suscitatur eique repugnat & fugit ante illam exteriora petens. Eo modo intelligendum est de cibis & potibus his infirmis facere. Quidam vero arbitrati sunt calorem febrilem sulce pro cibo augmentari, cibi enim in augmentum feb. accipiuntur. unde feb. materiam inveniens crescit extra corpus egrediens, & lucernam ad testimonium dederunt, quæ dum habet oleum crescit & augmentatur ignis. Sed postea eam destruxerunt intentionem cum hac probatione. cibo enim in diversis temporibus oblato febris videtur augmentari equaliter, unde estimati fuerunt quod color fe. in cibo augmentatur propter cibi humiditatem cui calor repugnat, sicut diximus in calce fieri & calidis lapidibus, hæc est secunda spes hæctica. Tertia vero plus palam patet sensui, quia facies infirmi est mutata in plubeum colorem aut lividum, quæ significatione ostendit substantialem humiditatem esse desiccaram, & virtutem naturalem defectam esse, nares subtiles sunt & acutæ, oculi concavi siccam cachexiam habentes, quia nutrimentum ad oculos veniens non est bonæ qualitatis, quod virtus digestiva quæ defecta est minime potest digerere, permansens ergo clausum in oculorum angulis calore aeris & feb. desiccatur, os solum quoque compositione oculos circumdantium mutatur, & tempora sunt aspera, motus palpebrarum & superciliorum fit gravis propter siccitatem eorum, quia iacentes claudunt oculos sine ulla voluntate, quasi a somno sint gravati propter virtutis defectionem & dissolutionem, sed & manu super eos imposita frigidi & sicci inveniuntur, & manu ibi morante donec eorum corpora ex calore manus calefiunt, calor sentitur a corpore eorum paulatim ascendere. Quod si ventrem discooperiant, apparent quasi non habentes viscera & tactus eorum

rum est quasi tabula, & si cutem eorum tum digitis constringas aliquantulum extendens, exte-
sa permanebit minime inferius descendens, ca-
ret enim humiditate qua mollis fiat, & ad suum
locum conuertatur. Quam feb. speciem si quis
inuenit mortem proculdubio indicet. Pulsus
eorum est debilis parvus durus & spissus, tactus
eorum quasi chorde. Causa debilis & parui pul-
sus est defectio & consumptio virtutis, spissitas
uero est propter multitudinem fumi cogentis
exire. Urina eorum est sicut oleum in liquore
habens squamas, quæ si super petram fundatur,
sonabit quasi oleum. Causa eius est propter con-
sumptionem substantialis humiditatis in solidis
membris existentis, & hæc causa consumptionis
& dissolutionis & propter siccam complexionem
membris dominantem uocatur decrepita senec-
toris morbus. neque sanabitur nisi cum natura
conuersa fuerit ut ante fuit. Stomachus eorum
est quasi stomachus decrepitorum, cui impossi-
bile est ut conuertatur in ipsa qualitate qua fuit.
Si inueniuntur. unde stomachus eorum semper
est defectus, & parua occasione digestio eorum
impeditur. Similiter patientis siccitatem in qui
busdam membris solidis, cum substantia cordis
aliquantulum paritur siccitatem cito consumit-
ur. Si uero siccitas fuerit multa, mors erit pro-
xima. Post hoc hepar & stomachus si in siccitate
mutantur periculum significant, sed tamen non
cito mortiferum sicut sunt priora. Oportet etiã
intelligi, quia si omnia solida membra fuerint de-
ficcata & multo tempore taliter permaneant,
necesse est ut infrigidentur, quia siccitas cum so-
la uenit, non permanet longo tempore, quoniã
membra nutrimentum non inuenientia refrige-
rantur & deficcantur, nutrimentum enim eorum
calidum & humidum est, i. sanguis. Unde cum
uidebimus membra deficcari & nullam habere
humiditatem & frigiditatem humectemus ea, si
autem fuerint infrigidata, nullam faciamus ei cu-
ram, quia molestum est.

De hæctica composita cum febre putrida.

Cap. XXI.

GAlienus dixit se hanc febrem uidisse esse co-
positam cum alia febre de putredine, & uidisse
eam solam nullus habere commixtionem. Cu-
ius compositæ significatio hæc est, interpolatio
s. febrium putredinis, & continuatio hæcticæ
feb. illa interpolatione præterente, & nos nul-
lam de antiquis uidimus, disputationem, de eius
cura cum est composita, difficilis enim est & du-
ra, quia sunt contrariæ oppositæ, febre enim pu-
trida necessaria est res lauatua & colariua etiã
deficcatiua, ut lauet colet & deficcet humores
qui sunt causa putredinis. Et hæctica conuenit
refrigerans & humectans ut refrigeret & hume-

ctet calorem febrilem & laudabile corpori præ-
stet humiditatem. unde utraque causa est sibi op-
posita, proinde conuenit medico ut inuestiget
& studeat ne aliquam incurrat fallaciam. Vtilior
igitur est hæc cura si feb. fuerit commixta, ut cu-
stodiatur naturalis humiditas & expellatur pu-
tredinis materia, sed prius oportet ut causa hæ-
cticæ auferatur per contrarium, sicut labor cum
quiete, & uigilia cum somno, tristitia cum læti-
tia curetur. Similiter necesse est substantialis hu-
miditas corporis membrorum regitiua custo-
diatur, & calor extinguatur accidentalis & na-
turalis confortetur, sicut cum cibis & potibus chi-
mum laudabilem generantibus & refrigeranti-
bus, & humores extenuantibus, quemadmodum
est præsana & similia, quæ dicturi sumus. Caueat
à medicinis quanto plus possint nisi cum magna
fuerit necessitas, deinde eligant medicinam quæ
est leuis & facilis naturæ, & inuestiget uirtutem
medicinæ utrum sit attenuatiua absque calefa-
ctione & deficcatione. Danda est ergo aqua cal.
cum accessio fe. putridæ uenerit. s. cum rigor in-
cipit fieri. Quod si uomitus sponte uenerit bo-
num est, quo non ueniente si uis eum prouoca-
re, necesse est ut fiat cum leuissimo uomitu. Ac u-
mine autem febris cessante & angustia infirmi
quiescente & appetitu cibi surgente dabimus pri-
sanum & panem bis uel ter lotum cum aqua fri-
gida & zuccara. Damus hordeum coctum cum
lentibus, sed lentes sint mundare & elixare & pri-
ma decoctionis aqua auferatur, deinde miscean-
tur cum hordeo & ramis portulacæ & lactucæ,
cum modico coriandri recentis aut ueteris & cum
aceto & zuccara & modico croco. Si uero febr.
putredinis sit de phlegmate sunt ponenda inui-
cem portulacæ lactucæ aliquantulum menthe &
apij & blitis. Summo mane accipiant rodozacca-
ram cum zuccaro mixtam. Quod si cognosci-
mus pro certo calorem hæcticæ non esse mem-
brorum raritatem, & nondum uenisse ad humidi-
tatem quæ est coagulationi uicina, & necesse e-
rit dare infirmo succos scariole lupuli & apij dā-
di sunt, sed tamen raro, nec illos sæpe assuefaciāt
maxime succum apij, quia calorem habet & sic-
citatem. Similiter si necesse habent troscisci de
rosis accipiendi sunt siue de berberis, aut si sint
necessaria mastix & maratrum cum rodozacca-
ra raro tribuantur, & cum necessitas fuerit agro-
tantem oportebit omnino ab aqua frigida absti-
nere. Iterum si fuerit necessitas magna coctam
ei dabimus cum modico mastix mixtæ cum ali-
quo utili syrupo. Quod si apostema in uisceri-
bus fuerit omnino abstineant ab aqua frigida ni-
si cum calidissima fuerint apostemata, quia cali-
da apostemata trahunt ad se frigidam aquam, &
prohibent eam ne ad cor ueniat, quoniam si ad
cor uenerit cum sua frigiditate naturalem extin-
guat calorem. Oportet etiam ut caueamus ne ci-
bum

bum in accessione feb. putridæ tribuamus, neq; parum antea, quia angustiam dabit immo & febrem augmentabit, tempus etiam exacerbationis elongabit, quia si uiderimus accessionē manē fieri calidam dabimus aquam rigore incipiente & impediēmus infirmum sugētem mala gra. in tempore accessionis, accessione uero cessante dabimus ptisanam, digesta itaque ptisana offerimus cibum secundum quod natura expetit. Si autem febris in medio diei inceperit augeri, manē danda erit ptisana, rigore uero incipiente calidam dabimus aquam ut uomitus pronocetur. Recedente quidem fe. acumine & infirmo quiescente cibabimus eum secundum quod oportebit. Quod si fe. à vespere incipiet manē dabimus ptisanam. Cunque digesta fuerit, cibum dabimus prout oportebit, sed tamen minorem quantitatem cibi quam natura digerere ualeat. Incipiente itaque rigore uomitum cum calida pronocabimus. Sufficit quantum disputauimus de hæctica quæ est cum putrida febre commixta. hæc autem est regula per quam medicus potest addere & minuere dietam secundum quod uirtutem patientis & feb. cognoscit.

De diata simplicis hæctice. Cap. XXII.

Simplex hæctica duobus modis est. scilicet aut corpus est mundificatum ab humoribus ad putredinem se præparantibus, unde oportet nos incipere curam causam hæcticæ expellentem per contrarium sicut diximus sicut tristitiam cum lætitia, iram cum patientia & similia cum suis contrariis, deinde expellamus materiam putrefieri incipientem cum medicinalibus cibis attenuantibus & mundificantibus absque calore, & siccitate, sicut est succus lupuli, cum rodazaccara & uiolis zuccara myrobāl. manna casia fistula & similibus commixtis. Cunque certi sumus quod materia corporis sit purgata, ordinabimus aerem loca & indumenta cibum & potum odores cataplasmata & similia, & mutabimur ea ab inutilitate ad utilitatem, quia necesse est ut sit aer frigidus & humidus, locus septentrionalis, indumenta naturaliter sint frigida & humida sicut linea uetusta & loca aromatica cum sandalis & aqua rosæ. Cibaria sumant infrigidantia & extinguentia extraneum calorem & naturalem confortantia & substantialem corporis humiditatem custodiētia sicut sunt ptisana panis lotusbis uel ter in aqua frigida aut panis infusus in uino albisimo leuissimo & bene mixto lactuca portulacæ cucurbitæ blitis atriplices, omnia condita sint cum amygdaleon. De fructibus sicut sunt utraque malagra, melones palestini, mala, pira, uæ hyemales, & similia. De syrupis sicut malorum gra. & iulep accipiant. Mittamus in aquam quam bibere uolunt, bolum, spodium, sandalos

albos, semen portulacæ & similia. De aromatis sicut sunt frondes & flores confortatiui & refrigeratiui, sicut rosa salices mirra uiola nenuphar & sandali. Caueant camphoram propter siccitatem quam habet nisi cum certi fuerimus habere in suis capitibus substantiam humidam, quæ repugnet siccitati camphoræ. Sed si humiditas capitis est parua & accidentalis humiditas, camphoram caueat quantum plus possint, quia rheuma licet sit calidum, camphora tamen nocet eis licet sit frigida, quod est duobus modis. Vno quia frigiditate sua accidentali humiditati repugnat quæ est in capite & eam ingrossat, unde fit causa agnoscendi rheuma. Alio quia cum sua siccitate naturalem desiccet capitis humiditatem, non enim humiditas capitis siccitati camphoræ ualet repugnare, nisi cum fuerit maioris quantitatis quam siccitas est camphoræ. Cataplasmata uero quæ hepatis sunt ponenda cōcedimus ut habeant camphoram quia naturalis hepatis humiditas siccitati camphoræ repugnat & conuertit eam ad temperamentum. Sed reprehendi uidemur à quibusdam sophistis nobis quæstionem opponentibus de cerebri humiditate, quare inquirunt humiditas cerebri siccitati camphoræ non repugnat cum cerebrum naturaliter sit humidius ceteris membris corporis. Vnde respondendum erit cerebrum semper mouetur propter imaginationem & rationem, quia est fundamentum sensuum & uoluntarij motus, & fumi semper ascendunt ad illud. calorem etiam aeris plus patitur quam hepatis, ideoque cerebrum accidentaliter est siccius hepate, licet ceteris membris sit humidius naturaliter. Nonnunquam dabimus trociscum de spodio & bolo cum syrupo quem diximus, & aliquando dabimus psilium si egestio non sit humida, solutio enim uentris in hac passione est pessima, quia materia eius acuta est & pungitina, & humores in hac ægritudine soliti sunt ad intestina descendere, quoniam membra sunt defecta ad dissoluendum & expellendum eos per poros qui ad interiora corporis clausi resoluntur, descenduntque ad intestina & eis duas faciunt actiones, aut lubricitatem faciunt ut egestio nequeat retineri, aut excoquant & nascitur dysenteria. Decurā igitur quia usque ad hunc locum nostram diximus disputationem, & monstrauimus plane, quia curatio huius febris est cum ordinamento aeris loci indumentorum cibi & potus aromatum balnei unctionum, necesse est ut plane dicamus quomodo & ubi ordinanda sunt hæc omnia. Incipiendum est ab aere, quia nobis familiarior est. Igitur si tempus fuerit hyemale non tamen multum sit frigidum non debet illud aliquo ingenio ingeniari bonum est. quod si multum fuerit frigidum necesse est illud ingeniari uide licet pannis operiantur ne frigida aeris uirtus corporis exterioribus dominetur & cutem desiccet

ficet atque fumos ad interiora claudat. Si autē fuerit estiuum, coaptari oportet illud ut infrigidetur & humefiat, scilicet ut mansio infirmi sit spaciola & septentrionalis & porta septentrionalis. in pavimento sternamus rosas, uioles, neparas, basilicum, semperuiuam, ramos nitium, & modicam aquam super ea roremus. Quod si corpora eorum indicant materiam ad putredinem preparatam, bonum est ut ungamus corpora eorum de succis lactucae portulacę vuarum amararum solati cum oleo rosaceo mixtis. hæc tamen inunctio non dia super pectora moretur, quia instrumentorum spiritus est percussiuus. Inueniemus etiam prout possumus melius ne humiditas eorum dissolatur: quod si uirtus eorum fuerit defecta, & membra dissoluta, & uenę apparent albę propter sanguinis inanitionem, ossa quoque brachia subtilissima & eorum concatenatio inanita, proxima portenditur mors.

Cumq; feb. aliquādo per se est morbus, & aliquādo per alium sicut fręncis & alij morbi his similes, aut est pp putredinē febris in quibusdā membris existentē, sicut in diaphragmate pulmonē, aut pp diuturnatūssim, propter hepatis dolorē renū illij necesse est ut cum eā cognouerimus esse in aliquo istorū, prohibeamus patientem ab aqua frigida, & ab unctione succorum quos superius diximus, nisi cum apostema per quod febris fuerit sit calidissimum. Deinde ex ea modicum dabimus, quia cali. apostematis trahit ad se humiditatem aquę, & prohibet eam ne ueniat ad cor & noceat calori naturali. Quod si apostema non fuerit calidissimū, abstinemus eos ab aqua frigida, & mitigabimus calorem eorum cum aere cibo frigidisq; aromatibus. Vnde Gal. aqua inquit frigida in hæctica quę est propter alium morbū pessima est, præcipuē si morbus diuturnus fuerit. Causa quia morbus qui eā est hæctice necesse est ut sit calidus sicut fręncis & similia, aut diuturnus sicut putrida se. erratica cōmixta & similia. Si uero morbus fuerit acutus morans paruo tempore percussit substantialem corporis humiditatem & desiccauit eam & dissoluit uirtutem membrorum. vnde calor cordis est defectus & nequit humiditati aquę repugnare, sic ergo humiditas aquę causa est caloris naturalis extinguēdi. Si autem morbus fuerit diuturnus, consummauit sanguinem membrorum & emundauit eum a carne. vnde membris infrigidatis calor deficit naturalis, necessario igitur calor cordis sit defectus. proinde frigiditati aquę calor cordis nequit repugnare aut resistere maxime si fuerit materia in uenis & arterijs ad putredinem preparata, quia humiditas aquę illā augmentat & materiam indurat ut nequeat digeri. præcipue si in urina nullum signum decoctionis appareat. Palā ergo intelligimus, quod nullo modo danda est aqua in hæctica nisi cum ipsa

morbus per se fuerit, si uirtus eorum custodita sit. quod si uirtus eorum debilis sit caueant aquam. Vnde oportet arbitrari qualiter corpora eorum humefiant & confortemus uirtutem eorum cum cibis qui sunt faciles ad digerendum & multum nutritibiles, quia sanguis corporū eorum licet sit laudabilis, tamen modicus est. similiter spiritus animalis, & uitalis, & propter sanguinis paruitatē membra minuuntur quę sunt totius corporis fundamenta & pp paruitatē aialis & uitalis spiritus deficit calor naturalis. vnde necesse est festinemus ad restauranda eorum corpora & in uirtute & nutrimento cum cibis & potibus qui sunt faciles & subito & multum nutritibiles. sicut est uinum album & grossum & rubeū grossum. Sicut Hipp. in Aphu. Facilius est repleti potu q̃ cibo, sed tamen prout oportet dandum est ei & quod oportet, hoc est non purū nec ieiunis ut præstet membris maxime stomacho calorem & siccitatē, sed non debet accipi multum & subito ut intras uelociter exeat nec membra nutriat. nec multum grossum ut morans in angustis locis oppilationem generet, ideoq; oportet nos illud negare & egritudinem exeuntibus & maxime hæctics, cibū accipiant mediocrē, facile nutrientē & quidā groslicij habentem ut permanens in membris nutriat & confortet ea. Neq; intelligere debemus ut Hipp. intentio esset de potu absoluto uel de humidis cibis absolutis, sed cōuenit nobis noscere, quia eius intentio fuerit de rebus nutritiuis leniter & faciliter sicut sunt uina grosstatis aliquid habetia & in membris permanetia ut nutrimentū eis inferat. De cibis similiter facile nutritiuis & naturę obedientibus sicut sunt lac pti. sana panis lotus & similia. Hæctici uero cū pro certo noscūt febrē cessauisse, nec alia re indigēt nisi augmentatione & nutrimento corporis, accipiant mane lac caprinū in quo statim emulso misceatur in eadē quantitate calaqua & ad suauē ignē coquatur quousq; tota aqua cōsumatur. deinde potui detur calidū: prout ab uberibus emulsum fuerit: quo ebibito tempus expectetur quo digestū fuerit. deinde dabimus starnū perdices pullos & similia: oīa in scellata. uinum album & poticū mediocriter bibant. Quod si non potuerint solum lac bibere miscendum erit cum hordeo & simila tritici & similibus secundū quod uirtus digestiua eorum fortis fuerit. Sed tamen si cognoscimus corpora eorū nullā habere materiā seu humores qui sint ad putredinē preparati, cauendū erit ab eis cibis & dabimus solummodo ptisanam & panem totum. maxime si in eorum egestionē cholera appareat. Vniuersaliter etiam dicimus quod non debemus dare lac perdices & his similia, aut uinum ponticum nisi cum certissime cognoscimus febrē ab eis esse ablatam, quod cum palam nouerimus balneabimus eos in balneo aque sapide temperato in aere, & calor aquę sit

quasi calor lactis cum ab uberibus est emulsum, & ingeniemus ut balneum mansioni eorum sit uicinū. & ducatur in culcitra aut in lecto ne motio eorum pedibus euntium duo nocumenta faciat, aut faciat eos sicciore, aut calefaciat & debilitet eos ut in balneo stare nequeat, quia necesse est eis in solio balnei diu morari, quia aqua solij quæ est temperata præstat corporibus eorum humiditatem augmentum & uirtutem. Oportet uero ut sit solium spaciosum & hostio balnei uicinum, ut nō ambulēt per aerem balnei ne parua eorum humiditas substantialis desiccetur. & oportet ut aqua balnei maxime temperata sit, quia calida si plusquam oportet fuerit, coadunabit cutem plusquam oportet & indurabit eam. Si uero frigida plusquam oportet debilibus corporibus tribuet frigiditatem, & calorem extinguet naturalem, cutem claudet & oppilabit, & secundum nostram intentionem horum pori debent aperiri & cutis mollificari, quia sunt in istis clausi & oppilati naturaliter, quia sine consumptione humiditatis res nulla potest inueniri dilatans & aperiens poros corporis eorum sicut facit aqua quæ est temperate calida: quia membra corporis delectantur in ea, & natura excitatur. & per totius corporis membra dilatatur propter aque delectationem quæ est eis similis. unde natura se delectante sanguis eam sequitur, & ueniens usq; ad corporis exteriora poros mollificat aperit & dilatat: quia actio naturæ in hoc loco quo delectatur est opposita actioni loci quem odit. quoniam a re nocitiua fugit natura ad interiora corporis. unde extremitates de sanguine & naturali inaniuntur calore. proinde patiuntur oppilationem & duritiem in cute. Oportet igitur iterum nos inuestigare ut diffiniamus quantum patientes morari in balneo debeant, quæ mora talis sit, quia si uiderimus rubicunda & inflata fieri corpora priusquam consumi & minui incipiant eos a balneo extrahimus, quia si dimittimus eos plusquam oportet consumabuntur. Ideoq; cum uolumus carnem in corpore augmentare, dimittimus eos in balneo quousq; fiant rubicundi & inflati. Si autem eam minuire uolumus post inflationem dimittimus eos in balneo donec inflatio transeat, & ipsi ad suam naturam fuerint conuersi, sed cum decet inuestigari illa tempora, quia sunt multum stricta & acuta præcipue si carnem uolumus augmentare, propterea uerus terminus cum a balneo debet egredi, est rubor corporis ne ipsi ultra permanentes ad deterius ueniant. Egredietibus itaq; a balneo ungamus corpora eorum cum oleis frigidis & humidis, uel unguentis ut custodiant humiditatem quam ab aqua acceperant ne aer illam consumat. Rursus oportet ut diuersis temporibus balneentur. Primum balneum sit, mane priusquam accipiant lac aut prisanam ut in frigidet & refrigeret corpora eorum, secundo die uespere postquam lac & cibus sint digesta.

Quod si uirtutem infirmi forte prospexeris esse ut possit amplius balneari bonum est, bonum etiam est si lac super infirmum fuerit emulsum priusquam in solium descendat, & mittatur in balneo frigidæ & humidæ sicut latuæ ne uisaria uola & similia. Si autem infirmus est ab humoribus mundificatus ad putredinem se præparandis, damus eis balneum exeuntibus lac asininum cum ab uberibus fuerit emulsum. hoc enim lac huic passioni est optimum, quia cæteris subtilius & tardius ad coagulationem, sed oportet eligi asinam iuuenem & sanam, & probare eius lac utrum sit albus, neque naturaliter liquidum neq; spissum multum, & nutriamus eam cum lactuca semperuiua coriandro & bono hordeo, & bona aqua. lacte uero digesto iterum ad balneum mittatur. Quod si balneo patientes delectantur eo quod eis assuetum fuerat, tertio ad balneum deducantur. sed spatium sit unius ab alio quinque horis, postea comedant perdices pullos gallinaceos & alas gallinarum. caueant ab omni cibo graui, sed oportet cibi quantitatem fieri talem quæ stomachus non grauetur. quod contemplari possumus hoc modo, quasi uiderimus cibum & patientis stomachus extensionem patiatur & acidum & fumosum rictum faciat, cognoscimus eos non bene digerere. unde cibi quantitatem decreuimus adeo donec prospiciamus eam optime esse digestam. Rursus si uiderimus eos multa quantitate refectionis carere, dabimus lac uaccinum, prius tamen butyrum ab eo sit extractum. Deinde prima uice dabimus ei. 2. uel sicq; ascendamus usq; ad quatuor. Et quoniam lac nominauimus. illud determinare uolumus cui horum conueniat & cui non. Unde dicimus quod cum lac cæteris cibis est facilius & omnia corporis membra nutriat, erit omnibus nutritibilis & laudabilis ad ptychismum maxime qui alium nequeunt sumere cibum. & laudabilis est lac muliebri, maxime si puellam lactauerit, post hoc est asininum. sed tamen quidam odium utrumq; & quia eis abominabile est, oportet dari caprinum. Est enim mediocre inter subtile & grossum, sed priusquam demus illud, decet poni capram in loco puro, & nutriamus eam cum bono hordeo & herbis si cut coriandro lactuca frondibus celsi & his similibus, & caueamus ne infirmi patiantur solutionem. proinde oportet bis uel ter calidum lapidem in lacte extingui ut aquositas eius consumatur. Quod si uirtus eorum fuerit confortata dabimus eis cæcos fluuiales coctos cum hordeo uel prisa & similia. Igitur quia sufficienter de lacte disputauimus, oportet nos quibus conueniat aquæ frigidæ potus monstrare, uel alia res frigidæ. Sed priusquam disputationem eorum incipiamus, monstrabimus quæ sint frigidæ aut calidæ absolute sine alicuius rei comparatione. Physiici itaque concordant dicentes nullum corpus esse calidum, frigidum, humidum aut siccum absolute

solute sine alicuius rei cōparatione nisi elemēta solum. Dicit enim se reperire ignem calidū nō ad alterius rei cōparationem; quia si esset calidus ad cōparationem alterius, necessario esset frigidus ad alterius cōparationem. Nosq; nullam rem inuenimus igne calidiorem. Ergo cum dicimus calidum frigidum humidum aut siccum, non dicimus nisi ad cōparationem humanorum corporum quę sunt temperata; quia humana corpora ceteris corporibus sunt temperatiora. propter hoc cū aliquam rem inuenimus nullam passionem nostro sensui inferētem, sed eo delectantem eiq; cōuenientem cum quadā similitudine, intelligamus eam esse temperatam, quasi humani corporis tēperiem. Rursus si aliā reperimus qua noster patitur sensus, sed tamen sine illius doloris horribilitate, intelligimus eā temperamentum humani corporis trāsgressam esse uno gradu. Iterū si aliqua res maiorem sensui faciat passionē, & tamē eā tolerare ualeat, dicimus eam duobus gradibus ultra tēperamentū esse. Si autem adeo sensui dominetur ut dolorē generet, in tertio gradu cognoscitur esse. Si uero magnum faciat nocumentum ut destruat sensum & seingat membra sensualia, in quarto uidetur esse. Palam est quia calidum & humidum frigidum & siccum sunt ad cōparationem humanorum corporum temperieri exceptis solis elementis, vnde conuertamus stilum ad eos qui bus conuenit aqua frigida & alia frigida & qui bus non. Cum hætica si per se morbus simplex & corpora patientiū sunt absq; ulla putredinis materia, optimum est ut demus eis cibaria infrigidantia naturaliter, eaq; artificialiter frigidiora faciamus, sicut sunt ptisana panis lotus lactuca, cucumeres palestini. Et aquam demus frigidam prout oportet maxime si uirtus eorum non sit imbecillis, & si digestio appareat in urinis. Quod si hætica propter alium morbum fuerit acutum uel diuturnum, prohibeamus aquam frigidam & alia infrigidantia prout melius possumus; maxime si nullum signum digestionis appareat in urina, & corpora non sint pura de materia putredinem generante. Causa huius morbi modis est. Vno quia membra corporū egritudinem patientium olim sunt defecta, & calor eorum debilis est & paruus unde aqua & alia frigida sunt membrorum percussura & naturalem calorem extinguunt. Quod si corpora eorū fuerint immunda propter aliquod apostema uel crudorum humorū reliquias, aqua & cetera frigida indurant & ingrossant eos ut nequeant digereri. Vini uero natura quia calefacit & naturalem confortat calorem, oportet consumpta corpora propter diuturnum morbum habentes accipiant moderate, tamen mixtum sit & album & lenē. Consumptio uero corporis quę est sine feb. & causa eius est substantialis humiditas cor-

poris consumptio; & naturalis calor eorum extinctus est propter sanguinis paruitatem, oportet ut restituantur cum corporis calefactione. Incipiamus à modico calore & cathamodice ad maiorem ascendamus ne subita corporis mutatione infirmus deficiat. Demus itaque syrupum de zinzibere & iringorum radice, pecorinam carnem, uinum non multum uetus, ne dolorem capitis faciat & corpora eorū deficiet. sedeant in aqua in qua cocta sint sāucus basilico, yreos, frondes citruli, fumigentur de ligno aloes, caueant omnino à coitu. Quorum uirtus si augmentari incipiat dabimus tyriacam & muscatam. Plus itaq; si sint confortati balneentur & balneū egredientes comedant annualem agnum, viscelatum conditum cum spica & zinziber, & bibant uinum ut prouocet eis somnum. Si aut aliquam patientur febrem modicam uidelicet aut tussim et si creant albu uiscosum & grossum, dabimus eis apozimata de hyssopo, & electuariū quod recipit sebesten. l. iuiubas. 30. liquiritiæ. unc. 1. vuarum passaram enuclearum. drag. 15. capillorum ueneris. vnc. 1. ficus siccas. 10. omnia in 10. libris aquę coquantur usquequo ad duas redeant. deinde vnc. 4. colatas ad bibendū cum vnc. 1. de rodozac. postea comedant ius frumētī & scenugreci. & accipiant electuariū quod recipe se. lini. vnc. 1. sem. orobi. vnc. 1. medullæ se. bombacis. vnc. 1. succi liquiritiæ. vnc. 2. fac puluerē & cū oleo amigda. frica, deinde adde zucca. quod sufficit. Alias Rec. succi caulium lib. 3. mellis dispumati lib. 1. coquantur usq; ad mellis redierint spissitudinē. postea medullas fistici quantum sufficit tere & cum melle tempera. deinde cum porri dare uolueris da cum lacte caprino aut asinino uel pecorino coctis cū dra. 2. leuistici. Alias Rec. maratri radici; apij radici; anā. vnc. 2. anisi. drag. 2. malū seminis. drag. 3. lini seminis. dra. 3. iuiubas. 20. ficus siccas. 5. vuarū passarū enuclearū. dr. 5. hæc omnia. in. 8. lib. aquę coquantur usquequo ad duas redierint: dabis oī die ad bibendum. vnc. 3. cum rodozac. violāzac. ana. vnc. 1. Quod si calorem non habeat tēpusq; non fuerit hyemale cum melle. vnc. 5. accipiant illud. Trocisci ualētes ad phyticos empiricos car diacos qui. Rec. gummi ara. berberis boli. ana. dr. 4. ro. spodij, se. portulacę ana. drag. 2. & sem. cancerum fluuiialium affatorum. dra. 7. basiliconis arnoglossę se. boragi. an. dr. 2. coriā dri sicci. drag. 2. se. infusi in aceto & ad solē siccari postea affari. dragaganti, amidi, semi. citruli. cūcu. ana. dr. 2. se. mirrę. dr. 4. se. malorum citoniorum. se. herbę acetosę ana. dra. 2. liquiritię. drag. 3. reub. dra. 1. se. cacabrę gemmarum non perforatarum ana. drag. 2. omnia trita cum aqua rosacea temperentur & trocisci ex eis fiant. dabis exinde dra. 2. Alij ualētes simili modo. Rec. berberis sandal. spodij. ana. dr. 3. rosarum. dr. 5. se. portu-

lacz, citru. cucu. cucur. ana. drag. 1. sem. dragagā
ti gummi ara. amidi ana. dra. 3. boli. drag. 4. her
bæ acetosæ, cacabræ, gemmarum non perforata
rum. ana. dra. 2. tempera cum succo arnoglossæ.
Alij Rec. spodij, bol. ros. ana. drag. 4. gumini ara
bi. dragaganti se. arnoglossæ ana. dra. 3. seminis
papaveris drag. 5. se. portulacæ. se. atriplicis. an.
drag. 3. berberis. drag. 2. fac puluerem & tēpera
cum aqua rosacea. Alij ualentes propter liente
riam frigidam Rec. ro. spodij ana. drag. 4. se. mir
tæ herbæ acetosæ ana. dr. 3. se. portulacæ sumac.
ana. drag. 5. se. maligranati. dr. 4. boli. dr. 5. gūmi
arabi. drag. 3. hypoquistidos. drag. 3. puluerizen
tur & cum succo citoniorum temperetur; da po
tui cum syrupo citoniorum. Alij ualentes cōtra
disynteriam cum tussi quam phytisici patiuntur.
Rec. gūmi se. citruli. ana. drag. 3. se. basiliconis.
dr. 2. se. sem. mirthæ. dr. 3. herbæ acetosæ. drag. 4.
semi. portulacæ. dr. 3. hæc omnia assata in pulue
rē redigantur. dosis eius. dra. 3. cum syrupo mir
thæ. Electuarium conueniēs phytisicis tussim ha
bentibus confectum cum syupo uiolaceo, maxi
me quibus in pulmone & pectore descēdunt hu
mores grossi & uiscosi. Rec. sebestē. c. iuiubas. l.
yuarum passarum enucleatarum. dr. 20. se. mal
uæ. dr. 3. cancrorum lauatorū & assatorū. dr. 20.
capill. ue. arnoglossæ ana. dr. 5. liquiritiæ. vnc. 1.
omnia in. 7. libris aquæ coquantur quousq; ad
duas redeant. Deinde. vnc. 4. sapē adde. & zucca.
vnc. 4. Iterum usq; ad mellis spissitudinem co
quantur. Deinde accipe gummi dragaganti. se.
citoniorum an. dr. 8. se. cucu. vnc. 1. amigdalarū
dulcium. vnc. 8. se. portulacæ. dr. 6. amidi. dra. 8.
se. papaveris. al. drag. 6. fac puluerem; & cum su
perioribus tēperetur. Pilulæ quæ sub lingua po
sitæ ualent contra tussim. Re. gummi dragagan
ti. se. portulacæ. se. citoniorum. ana. drag. 4. se.
cucu. drag. 5. amidi. drag. 3. amigda. drag. 6. fabæ
mundatæ. dr. 2. se. maluz. drag. 3. liquiritiæ. dr. 5.
omnia in puluerē redacta temperentur cum suc
co pilij. Cataplasma contra tussim pectora hu
mectans. Rec. maluquisci. radicū & frondium
maluz. an. dr. 4. dragaganti. dr. 2. ceræ albæ olei
viol. ana. vnc. 3. fac cathaplasma. Trocisci ualen
tes contra sanguinis sreatum qui sit phytisicis.
Rec. gummi dragaganti se. portulacæ. ana. dr. 5.
succu liquiritiæ. drag. 6. boli. chimolæ. ana. dr. 5.
succu hypoquistidos. acariæ. ana. dr. 3. coralli. ca
cabre. ana. dr. 4. spodij. drag. 6. rosarū. drag. 4.
se. mirthæ. drag. 4. coriandri infusi & assati dra. 7.
tempera cum aqua rosacea. Cataplasma contra
sanguinis sreatum & tussim & febris calorem.
Rec. cucurbitæ tritæ quasi. medullæ. drag. 4. cam
phoræ. drag. 1. sandal. al. & rub. dr. 2. rosæ siccæ.
drag. 2. sem. ceræ al. vnc. 30. olei rosati. dra. 1. fiat
cataplasma. Syrupus iuuans sanguinem sreatan
tes. Rec. succu arnoglossæ. succu cucur. cucu. citru
li. aquæ rosacæ. an. lib. 2. succu mirtilloz lib. 1.

succi pomorum citoniorum. li. 5. omnia coquā
tur donec fiant quasi sapa, deinde cum aqua fri
gida potui detur. Electuarium ualēs contra hu
mores sanguinolētos qui sunt in pectore & pul
mone, & calorē extinguit, vulnera pectoris sa
nat. Rec. amidi. se. citoniorum. an. drag. 5. fabæ.
boli. ana. dra. 7. se. maluz. se. melonis. ana. dra. 3.
gummi. dra. 30. dragaganti liquiritiæ. an. dra. 3.
omnia puluerizata cum sapa temperetur. Quod
si non fuerit febris nec humores grossi & conue
nit melius mundificari. iungantur orobi. dra. 7.
hyssopi. dra. 8. maratri se. apij. ana. dra. 2. & sem.
Si uero humores fuerit grossiores. putrefacti se.
fenugræci. se. lini. carui. æquali pōdere cum oleo
amigdalino & melle temperabimus. Alias Rec.
prassij orobi medullæ se. bombacis. ana. drag. 4.
se. lini. fenugræci. drag. 2. omnia in puluerem re
ducta cum melle temperentur.

*De febre accidente propter dolorem hepatis splenis
vel alterius membris. Cap. XXIII.*

QVia disputauimus de febr. in spiritu nascen
tibus & ephemeris, & de eis quæ fiunt in solidis
membris. i. hæcticis & de utrisq; acutis, quarum
una nascens est de cholera rubea. s. caupon, alte
ra uero cuius est purus sanguis materia dicitur
& vocatur inflatiua, oportet nos ordinatim de fe
bribus putridis disputare. vnde primum dicen
dum est quid sit putredo, & qua causa genera
tur, & quomodo & quæ complexio putredinem
cum suis qualitatibus recipit, & quæ non cum
una qualitate, & quæ non recipit eam nisi accide
raliter. Vnde dicamus qd omnis complexio quæ
est extra naturam & temperamentū sit quadam
pliciter. prima ca. & hu. secunda est ca. & sic. ter
tia fri. & hu. quarta fri. & sicca quarum nulla pu
tredinem recipit uel generat nisi ca. & hu. putre
do. in ea naturaliter est. Causa quia putredo ne
cessario generatur ex humiditate qua liquefit &
materia diuiditur dilatās eam ad extremitatem,
& faciens eam habere motum facilem currendi.
Item necessarium est ex calore calefiat perturbe
tur & ferueat. vnde nō naturales chimi. qui sunt
contra cal. naturalē cum ebullierint seseq; per
turbauerint, sit eorum ebullitio extra actionem
naturæ, quæ ebullitio & perturbatio cum fuerit
non ex actione naturæ eius. s. ex permanet in ea
neq; diuiditur, ut mundificetur & expellatur. vn
de sit causa materiam conuertēdi ad corruptio
nem & putrefactionē, quia putredo nō est aliud
nisi corruptio humidorum & liquidorum cor
porum propter ebullitionem & turbationem ex
tranei caloris ueniens. proinde putrefactio non
est nisi cum qualitatibus ad exteriora se monen
tibus. i. calore & humiditate. quia humiditas cū
dilatat & eliquat materiam, & eam diuidit in ex
terioribus faciens eam currere inuenit locū cal
lor quo possit bullire & turbidam eam facere
quam

quam calor perturbans, & tamē nondum suam
complens digestionem neq; partem illauidabi-
lem à laudabili diuidens se miscens utranq; cor-
rumpit eamq; putrefacit. pars enim illauidabilis
à laudabili non potens diuidit ac mundificari
corrumpit eam cito ac putrefacit. Qualitates au-
tem quarum motus ab extremitatibus ad cen-
trum reuertitur sicut frigiditas & siccitas non re-
cipiunt putredinem, quia siccitas desiccatur coadu-
nat & repugnat dilatationi & diuisioni. sic etiam
frigiditas congelat refrigerat & resistit calori &
ebullitioni. eodem modo si quaedam res fuerit
composita ex duabus qualitatibus contrarijs cum
una mouetur ad interius & cum alia ad exterius
sicut calore & siccitate humiditate & frigiditate
quæ non recipiunt putredinem, quia calor licet
materiā ad extremitates suas dilates siccitas ta-
men coadunatur & desiccatur eam & prohibet eam
dilatari & bullire; similiter & humiditas quauis
materiā humefaciat & dilates & currere fa-
ciat ad exteriora, frigiditas tamen congelat & in-
grossat eam & prohibet ne actioni humiditatis
obediat. Palam ergo est non posse fieri bullitio-
nem & putrefactionem nisi cū humiditate mol-
lificante & dilatante & rem currere faciente ad
extrema. Res ergo quarum feces non diuidun-
tur cum dilatantur & bulliunt necessario putre-
sunt, nam bullitio non est nisi propter calorem
& humiditatem. quæ enim in aqua coquuntur dis-
solvuntur & mollescantur, quæ uero assantur
desiccantur & indurantur.

De causa putredinem faciente. Cap. XXIII.

Prior causa putredinem generans constipatio
est corporis & pororum oppilatio & conclusio
humorum in eis, poris enim clausis & constipa-
tis necessatio feces terree digestionis in interio-
ribus corporis remanent, quibus nō aliquid eue-
nit propter quod defluant sicut calida cibaria &
conuertibilia, aut corruptus putridusue aer sicut
de corporibus mortuis exiens corrumpit omnium
corporum complexiones & generat pestilentiam
& pessimam in eis mortalitatem. Causa constipa-
tionis pororum generaliter in duo diuiditur, aut
de interioribus aut de exterioribus. De exteriori-
bus sicut de aere frigidissimo balneis stipticis &
sulphureis aluminosis uel nitrosis. De interiori-
bus uero sicut grossis humoribus & viscosis in-
terioribus corporis coadunatis, propter requiem
& delectationem & exercitij ablationem assidui-
tatem grossorum & viscosorum ciborum & multæ
quantitatis nō secundū ordinē acceptorū, neq;
cū stomachus ē inanitus. quia multitudo requiei
& suauitas corpora in frigidat. unde cibus nō di-
geritur sed ingrossatur, unde & humidus effici-
tur, proinde superfluitas terree digestionis ad po-
ros cutis ueniens grossa & viscosa & non potēs

egredi claudit & oppilat poros cutis, sicut feces ui-
demus uini claudere foramina colamenti & pro-
hibere grossitatem uini ne exeat, eodem modo
fit si cibus grossus & viscosus sit naturaliter. mul-
tū ē comedere uirtutem aggrauat, unde nequit
eum digerere & permanet crudus. Similiter ci-
bus acceptus priore nondum inanito indigestus
permanet, quæ oīa fiunt cā grossitatis & viscosi-
tatis humorū. balneo ē loti cibo nondū digesto
calor balnei trahit cibi humiditatem ab interiori-
bus ad exteriora. unde pro sua cruditate non po-
tens egredi constipat poros. Præterea qui comē-
dūt ultra quā uirtus tolerare queat, quo incipien-
te digeri, alius sumitur unde priore egrediente
trahitur cum eo qui nōdum erat digestus qui ne-
cessario descendens ad poros ueniens cum sua
grossicie & viscositate poros oppilat. hæ sunt
causæ putredinum feb. putridas facientiū. Signi-
ficationes aut putridarū febriū sunt. iō. Prima
est quoddā præteritū & in corpore inueteratū,
cuius feb. non nascitur de præsentibus rebus aut
exterioribus nisi fiat accidentaliter. ver. grā. ephi-
mera de præsentibus exterioribus causis nascēs
est inueniens aliquid in corpore inueteratū ca-
lescit & putrefacit illud. præsens ergo est causa
quedā accidentaliter putrefaciens rem antecede-
tē sicut uidemus nūc accidentāliter extremitates
corporis urere & eius iuncturas separare, quia
pp nimietatem suę frigiditatis calor ad interio-
ra coadunatur incidit & urit extremitates. nix er-
go est cā incensionis licet nō sit naturaliter. Secū-
da significatio quia rigor semper antecedit pu-
tridā fe. & frigus maxime si materiā sit extra va-
sa & sensibilibus mēbris uicina. sed tamē nō oēs
febres rigore uel frigore habentes sunt putridę.
quia aliquādo rigor accidit ephimerę accidentā-
liter. Nā ephimera si malos in corpore chimos
inuenerit calescit eos & fumū prouocat quo se
sibilia mēbra pūgēte rigor nascitur, talis. n. rigor
nō diu permanet. Rigor aut differt à frigore, quia
in rigore sentit patiens punctionē quali acus &
spinæ sint in eo infixæ. & nō permanet diu quia
causa huius sunt acuti sumi chimi citum exitum
habentes. Frigus sentiūt infirmi quasi niuis co-
gelatio sit in eis mixta. quia causa eius sunt chi-
mi graues & tardi ad mouēdum. Tertia quia pu-
trida interpolatur & multis interpolationibus
interpolatur nisi paruissima & leuissima mate-
ria erit. unde disputamus de causa suarū inter-
polationū & diuersitate. Vnde dicimus, quia cā
putredinis febris est materia in corpore diu coa-
dunata. quæ uel de quatuor humoribus est mixta
uel est pura. Si sit comixta interpolatur indefini-
tę. Præterea cā putrefaciens materiā. fe. calor nō
naturalis est qui si inuenit materiā putredini
obediētē cōuenientē calori obedit. sin autē actio-
ni eius repugnat, proinde sanguis qui cū utraq;
qualitate cōuenit putredini. cito extrāco obedit

calori. unde sit feb. continua. Interpolatio enim non est aliud nisi propter materiam extraneum calorem impediens eum: sua duricia quam necesse est ut calor extraneus diuidat deinde calefaciat, & eam feruere faciat: Idcirco cho. in. quia cum una qualitate putredini conuenit, & cum alia non, fit cum calore conueniens, cum siccitate uero impeditur calor donec illa siccitas suæ actioni obediat. Phlegma quoque quia cum una qualitate putredini obedit. i. humiditate, & cum alia non conuenit. i. cum frigidityte necessario calor moratur in frigidityte quousque suæ actioni conueniat. Cholera nigra quia cum utraque qualitate putredini repugnat, multum impedit calorem naturalem uel extraneum proinde interpolatio eius tardior est cæteris. Quarta significatio est quia calor putridæ feb. est fortissimus & sensum pungitius, nam manus super patientem posita cum febris ad eam sentit: punctionem caloris magnum perforantem, manu etiam ablata permanet calor. Quinta significatio est quia peryodica feb. maximam generat angustiam propter grossitatem fumi putredinis in stomacho bullientis, sed si materia sit subtilis & uirtus sit fortis fumus eius dissoluitur, & patiens quiescit, pulsus temperatur & conuertitur ad suum ordinem. Quod si sit grossa & humida tarda que ad mouendum naturam aggrauat ut præ eius dissolutione deficiat, unde fumus ingrossatur in corde & angustia augmentatur, pulsusque non conuertitur ad suam innaturalem qualitatem ad naturalem. Sexta significatio est quia in statu peryodice feb. significationes ostendunt complementum putredinis. i. dolor capitis sitis siccitas oris & angustia. Septima significatio est quia corpora in putridis non mundificantur cum feb. in unaquaque quiescant accessione, quia materia putredinis est in interioribus corporis clausa. Octaua significatio quia putrida materia si sit intra uasa fit calor inseparabilis, qui licet aliquando separetur aliquantulum tamen sentitur, quod si sit extra uasa fit cum interpolatione. Nona significatio est, quia urina in initio putridæ cruda est propter cruditatem materię. Decima significatio est, quia pulsus putridæ durus est & plenus, quia uasa sunt plena grossis & crudis fumis. nam omnis patiens hanc feb. non sudat in initio. Sed peryodica ad augmentum ueniente fit pulsus in prima accessione paruus & uacuus, cessante autem rigore & calefacta materia fit pulsus plenus se ad exteriora dilatans cuius dilatio maior est quam contractio. Sed quidam medici arbitratii sunt quod paruitas sudoris in principio feb. putridæ existens sit propter caloris fortitudinem corporis humiditatem paulatim extenuantem, quod falsum est, quia si paucitas sudoris fuisset causa caloris humiditatem deficcantis pulsus esset inanitus & uacuus. & nos in initio feb. peryo-

dice uidemus pulsus esse plenum & durum. Sudoris ergo paruitas in initio peryodice feb. est propter grossitatem materię & duriciem eius ad dissoluendum inobedientis. Sufficit itaque quantum disputauimus de causa putredinem febris faciente. Incipiamus ergo & dicamus de unaquaque specie prout ratio postulat, & quia in epidemia Hipp. insit semper medicum sequi debere actionem naturę, oportet nos suam auctoritatem seruare, ait enim, oportet medicum ministrum esse naturę. Quocirca incipiamus à synocho quę fit de putredine sanguinis, quia sanguis est principalior cæteris humoribus, & hoc tribus modis. Vno, quia est temperatior & saporosior cæteris, proinde fecit eum natura esse materiam & nutrimentum totius corporis. Alio, cum sit acceptabilior cæteris elementis sensu naturali & animali, fecit eum natura materiam & primum in adolescentia ad sui uidelicet nutrimentum, quia propter debilitatem suorum membrorum adolescentem nequeunt pati nutrimentum alterius materię quę sit longe à temperamento. Tertio propter amorem eius quę dignitatem fecit eum maioris quantitatis quam cæteros & diuisit eum per totum corpus. Igitur quia uidemus tantam naturę esse dilectionem in sanguine, ut eum dignitatem faceret, oportet ut à principaliori & naturę familiariori incipiamus. Sed si quidam interroget quid differat inter sensum naturalem rationalem & animale. Respondemus sensus tripliciter diuiditur, alius est animalis, alius rationalis, alius naturalis. Naturalis est in omnibus membris animalium, quia sentiunt materiam quę est eis similis unde eam per se trahunt, sicut felliculus amaritudinem sanguinis sentiens, & eam ad se trahens, & sic unumquodque corporis membrum suum simile ad se ducit, quemadmodum ossa quod frigidius & siccius est ad se trahunt, caro & latenti quod calidius & humidius est, cerebrum quod frigidum est & humidum. Animalis autem sensus est sicut lingua quę sentit saporem, oculi quoque qui sentiunt colorem formam & figuram, aures autem quę sentiunt sonitum, & similia. Rationalis sensus pertinet rationali animę ut comprehendat rem certam rerum uirtutem & uerum à falso discernat.

De synocho quę fit de putredine sanguinis.

Capitulum XXV.
Sanguis secundum cursum naturę existens in uenis & arterijs clauditur, quia sunt eius uiae per quas per totum corpus dispartitur, & ipsum nutrit, qui cum à suo naturali loco disgrederetur, non custoditur à natura, sed eius regimen dimittit unde corrumpitur & in diuersos morbos mutatur, maxime si ultra mensuram naturalem egreditur. Quod si in suo permanserit loco & agit quod proprie

proprie facere debet, nutrimentum & regimen-
tum omnibus membris tribuit. Sed si in quantita-
te augmentatur, mutatur à sua propria qualita-
te. vnde odit cum natura eiusque regimē deferit
vnde permanet crudus & indigestus & corpus
nō nutrit, necessario putrefit & fe. putridā gene-
rat, quæ synochus appellatur. Quod si reprehē-
dunt rōs quidam dicentes cur accidit sanguini
putredo cum sit amicus naturæ & per eum rega-
tur & nutriatur corpus. Respondemus sanguis li-
cet sit amicus naturæ, tamen cum augmentatur
aggravat naturā unde odio tenetur ab ea, sicut
pater odit filium cum ei inobediens sit: sanguis
eodem modo à suo temperamento egressus à
natura rejicitur & per nares eiicitur aut per a-
lias partes egreditur, quem quidem si non po-
terit expellere dimittit eum vnde putrefactus
febr. generat synochum. Diximus quoniam
sanguis aut est intra vasa, aut extra corpus, aut
solummodo extra vasa. Sanguis autem qui
est extra corpus, aut est actione naturæ secun-
dum crīsim, sicut videmus in diē tetrica sangui-
nem fluere per nares, per hemoroidas per men-
strua, aut non secundum naturā propter aliquod
accessionis accidens naturæ eam cogens ut ex-
tra eiiciat sanguinem. Quod autem sit interius
aut exterius, exterius sicut incisione gladii, aut
his similibus. Intrinsecus vero cum aliqua pecto-
ris vena rumpitur, aut propter multitudinem
sanguinis vel organorum suorum angustiam.
Sanguis autem qui solummodo extra vasa est,
aut est in toto corpore, aut in uno loco: clau-
sus. Si in toto corpore fuerit generat tumorem
ruborem calorem in toto corpore. Si fuerit in
uno loco & maturatus mutatur in sanie. Quod
non digeratur generat tumorem ruborem in eo-
dem loco. Sanguis vero qui est intra vasa, aut
est in omnibus vasīs, aut est in quibusquam. Si
fuerit in omnibus synochum generat si in aliqui-
bus facit in illo loco feb. & ab eo nomē accipit,
quam cognoscimus ex calore & dolore illius lo-
ci. Sed disputatio nostra non est de febre quæ
fit in parte corporis, sed de illa quæ fit propter
sanguinem in omnibus venis putrefactum. vnde
de priusquam de ea disputemus oportet nos mō-
strare causam illius caloris generativam. Qua
dere dicimus, quia causa quæ calor generatur
6: modis est, quinque sunt calorem facientes &
unus passivus. Quorum primus est calor solis i-
gnis & estus. Secundus calida cibaria & potus ac
medicina. Tertius nimius motus & labor inci-
dentes substantiam membrorum, propter mem-
bra ad invicem se fricantia. Quartus est putredo.
Quintus est conclusio pororum. Sextus est ma-
cilitas corporis & parvitas sue naturalis humidi-
tatis, quia corpus si in hac mensura fuerit fit
preparatum ad recipiendum calorem. Et quia
hic sex sunt causa caloris & febr. non est nisi ca-

lor extra naturam, necesse est ergo ut his sex sit
causa feb. Sed si fuerimus interrogati quæ sit dif-
ferentia inter feb. synochum quæ fit cum putre-
dine sanguinis, & synocham quæ non fit de pu-
tredine sanguinis quæ inflatiua vocatur. Respo-
demus synochum quæ fit de putredine sangui-
nis patientes faciunt putridam urinam propter
putredinem sanguinis & pulsum habent inordi-
natum, quia constrictio eius velocior est quàm
dilatatio propter naturam festinantem se ad ex-
pellendam sanguinis putrefacti fumositatem.
Inflatiua vero sic dinoscitur, quia urina pacien-
tis nullam habet putredinem, quia eius materia
pura est sanguis non putrefactus. Rursus si di-
xerint quæ sit differentia inter feb. quæ est de pu-
tredine sanguinis & febr. continuam quæ fit de
putredine cæterorum humorum. Respondebi-
mus, febr. quæ fit de putredine humorum, licet
videatur continua esse, bonus tamen medicus,
si bene eam investigaverit sentiet eius interpola-
tionem, quæ fit inter finem unius accessionis, &
initium alterius. Sed synocha nullam habet di-
missionem nisi aliquid tranquillitatis in extre-
mitatibus diei cum aer fuerit frigidus, quæ mix-
tio non fit propter feb. sed quia infirmus quie-
scit & gaudet de aeris frigiditate se. acumen mi-
tigante. Quæ feb. tribus modis fit quia quædam
est æqualiter ab initio usque ad finem, aliqua de-
biliter incipiens & paulatim ascendit usque ad sta-
tum. est & alia fortiter incipiens in initio, dein-
de cathamodicum descendit usque ad statum.
Causa quia materia quæ putrefit de sanguine,
aut est tanta quanta dissolvitur, aut minor quàm
dissolvitur, aut plus. Vnde si tanta sit materiei
putredo quanta eius dissolutio est nascitur illa
species synochæ quæ dicitur homotenus, quia in
unaquaque die dissolvitur idem & putrefit, quæ
cum ita sit, significat mediocritatem inter spe-
cie salutis & timorem mortis. Sed si quod de ma-
teria putrefit minoris sit quantitatis, quàm id
quod resolvitur nascitur illa species quæ dicitur
epangmatica quæ salutem significat. Nam si
quod de materia dissolvitur maius est eo quod
putrefit finitur paulatim materia vnde necesse
est ut veniente morbo ad statum vel ad crīsim,
nihil de materia illa, aut pusillum permanet quod
facillime purgabitur, quia virtus est fortis. Rur-
sus si de materia plus putrefit quàm dissolvitur
fit illa species quam dicunt augmasticam, quæ
species est pessima & timoris nuntiatiua, quia il-
lius materie multa quantitate putrefacta, & pau-
ca dissoluta, necesse est ut omni diē augmentetur
feb. angustia & molestatio, unde timoris est du-
bitas, quia in unoquoque diē augmentante ma-
teria timemus non statim tanta illius materie
quantitas augmentetur, ut nullo modo eam
natura pati valeat, quia de re natura cedente mor-
bus dominetur. Significationes autem synochæ
duobus

duobus modis sunt, aut antecedentes eam sicut fatigatio grauitas & plenitudo membrorum rubor & calor in exterioribus corporis, aut eam subsequentes sicut dolor capitis cum incensione & grauitate rubor faciei tumor temporum & extensio uenarum suarum eminentia turbatio & tenebrositas oculorum & figura ruber ante oculos apparentes pulsus fortitudo & uelocitas & eius magnitudo ac plenitudo, atque mollicies organorum facies patientis quasi balneum egredientis urina rubicunda & temperata in liquore. Causa fortitudinis pulsus est propter fortitudinem uirtutis naturalis: eius magnitudo est propter sanguinis plenitudinem. uelocitas eius est propter sanguinis calorem. organorum mollicies est propter sanguinis humiditatem. Rubor urinae rubedo & calor sanguinis faciunt. Splendor urinae est propter sanguinis claritatem. Sed cum tamen illa species de cuius materia plus putrefit quam dissoluatur augmetatur putredo in corpore, & urina fit turbida atque color eius fit arsenicus. Accidit etiam hanc feb. patientibus inflatio quemadmodum eis qui inflatiua molesta tur, non enim differunt nisi quia est cum putredine sanguinis, inflatiua uero minime. Et quia huic feb. hanc sunt accidentia: uariola & ceterae pestilenciales passionis accidunt, necesse est de eis disputare priusquam curam eius incipiamus.

De causa feb. pestilentialium. Cap. XXVI.

CAUSA pestilentialium febriu est pessima mutatio aeris & corruptio eiusdem in quatuor temporibus anni, & mutatio aeris fit quatuor modis, aut cum dominatur ei una ex quatuor qualitatibus, aut propter fumum & puluerem terre eum perturbantem & obscurantem, aut propter magnum fetorem sicut cadaveris corporis animalium quod est ceteris peius, proinde plurimi patiuntur pessimos morbos de pestilentiali genere & feb. non de genere humorum quia sicut pessimus morbus aut uenenosus, similiter & aqua nocet & destruit substantiam eam accipientium non saluantur nisi rarissimi, sicut aer si corrumpitur & putrefit, quicumque patitur non euadit nisi paucissimi. Aer etiam nocibilior cibis & potibus, quia uelociter perforat ad cor & pulmonem cum flatu attracto sine ulla corruptione, proinde omnes infirmi & sani plurimi infirmantur ex aeris corruptione. Antiqui concordati sunt maxime Hipp. quia si in quatuor annis temporibus aer corrumpitur, generantur in illo anni pestilentiae & mortales passionis. Dixerunt etiam sequenti in tribus mensibus hyemis in Decembri Ianuario. Februario, pestilent & puluis in aere augmentatur, & aeris complexio inficcitatem mutatur nullam habens pluuiam & dies in qualitate diuersantur, ut uidelicet una dies sit calida & alia frigida fuerit hanc pessima signa hyemalium

me, uere autem accedente pluuiali & turbido eius perturbatio non dissoluta. 2. 3. 4. 5. aut. 7. die raro sunt feb. pessima non secundum humores, sed plurime nascuntur uariolae & pustulae multae etiam tunc plurime oriuntur mortales pestilentiae. Dixerunt iterum si uer & hyems taliter fuerint, necesse est sit in aestate aer turbidus & humidus & non clarus & arboribus & terris nascentibus puluis dominatur, unde fit causa in corpore desudationes generans. corpora etiam non sudant nec humectantur, sicut solita sunt in aestate humectari naturaliter. Rursus inquit si aestas uer & hyeme sint, ut diximus, fit in initio accedentis autumnus mortalitas in animalibus. Cunque aequinoctium uenerit autumnale apparent in aere. uidelicet septentrionali flammae ac lampades multae ac diuersae. Quod si quidam quaerunt huius intentionis rationem, dicemus haec quae dicta sunt non posse ab eis intelligi nisi praesumpta ac intellecta motus stellarum scientia & coniunctio ne earum adinuicem quae sit circulis suis & qualitatibus cuius stellarum quae est secundum earum loca, & in circulis & in unoquoque anni tempore. Rursus si dixerint si haec quae dicitur sunt propter actionem motus stellarum, quae necessitas fuit haec in libris scriberentur a medicis cum ea defendere contra repugnatores nequeant. Respondemus corruptio aeris non accidit nisi corporibus ad ea praeparatis. Vnde cum medicus uiderit significationes aeris in unoquoque tempore anni uenturi, poterit mudificare materiam de corporibus corruptioni praeparatis priusquam corruptio accidat eis, & etiam temperamentum praestare scierit, ut uenturae corruptioni repugnare ualeat. Nam si praueiderit motum stellarum debere facere nimium calorem in aere & nimiam siccitatem & uisionem, festinat ad purgandam choleram eorum quibus inest cholerica complexio naturaliter, ne illius calore feruorem facillime propter similitudinem recipiant, dans quoque frigida & humida calori uenturo repugnancia, quia rationalis anima dignior stellis est, nam actio earum ei minime accidit nisi cum ignorantia teneatur. dum enim illam scierit eam omnino cauere, quod testificatur ab eo quod uidemus ab optimis mathematicis qui cum certissime nouerint dies periculum mortis inferentes eis qui in mare ingrediuntur satis possunt eos tueri. similiter & eos qui in bello morituri sunt in quo quidem homo differt ab animalibus, nam rationis & intellectus est semper inquirere bona & desiderare, & mala respicere eisque repugnare, quia non est subditus naturali actioni & pestilentiali desiderio nisi cum ignorantia tentus est, sed cum scit & discernit bonum a malo uerum a falso & iustum ab iniusto, querit bonam partem quae est eis similis, unde homo est, & spernit malam quae non est ei similis unde est animal.

De feb. uariolarum quæ fere omnibus accidunt.

Cap. XXVII.

CAUSA uariolarum omnibus aut pluribus nascentium materia est in cõpositione fetus in uulua existentis, quam natura in quibusdam locis clausit à principalibus membris remotis cutiq; uicinantibus propter debilitatem membrorum fetus qualitatem materiæ illius non sustinentium, quæ cum mouentur propter aliquod exteriorum, sicut propter pessimos chimos, aut corruptum aerem à suo loco egreditur cum natura repugnans expellit eam ad cutem, quia sibi vicina est. hac de causa fiunt uariolæ, nec ullus remanet quineas habeat, quia earum materia fit in conceptione fetus. & plurimum adolescentulis & pueris fiunt raro iuuenibus & senibus, decrepitis uero nunquam. impossibile est illam materiam in corpore, usq; ad decrepitam manere propter mutationem ætatis temporis. exercitiorum & cibariorum & cæterarum diuersitatum, quia natura eam assuefecit. unde non mouet illam nisi cum ipsa per se mouetur. Ideo adolescentuli & pueri plurimum hoc patiuntur, quia sunt gulosi & cibos inordinate sumunt, neq; caueant aerem aliquem neq; accidentia & istis quibus cal. & humida complexio dominatur, quæ est putredini familiaris & conueniens. signa, quarum nõdum apparentium hæc sunt dolor capitis in initio feb. rubor & tumor faciei turbulencia oculorum & lachrymæ capitis grauitas totiusq; corporis, pudor in naribus sternutatio pectoris asperitas uocis raucaitas puctio in corpore quasi ex acubus infixis, quia materia uolens egredi cutem & carnem separat ut facilius exeat. sed plurimum in tertio die egreditur, & aliquando in principio uel secundo festinat propter magnitudinem caloris feb. Sed uariolæ quatuor modis sunt, aut de puro sanguine aut phlegmatico aut cholericò, aut melancholico. Quæ de puro sanguine fiunt sunt rubæ superius acutæ, & inferius latæ citoq; maturantur, & in sanicem conuertuntur, suntq; salubres, quia materia earum & sanguis est amicus naturæ & digestionis obediens quia cal. & hum. est. Si sint cholericæ, sunt citrinatæ. pertinentes paruæ rotundæ capita eorum acuta & quasi acus pungitiua propter acumen materiæ earum, proinde signa earum sunt ad timorem & ad salutem dubia, quia si laudabilia signa eas sint concomitantia, sicut coctio digestionis in urina in die critico apparens & feb. atque fitis mitigentur & uariolæ aperientur & ab eis humiditas effluat bonum nunciant, contrariè si sint contraria signa. Si fuerint phlegmaticæ sunt albæ latæ lenes duræq; ad digerendum uel sunt indigestibiles quarum materia sub cute putrefacta nimis sub cute pudor generatur maxime si phlegmata salsa fuerint, aut prurire coeperint discoriantur & fluit ex eis

putredo eruginosa. quod nunciat mortem maxime si urina cruda sit. Melancholicæ autem in initio sunt linidæ postea uenietæ, deinde nigre in quibus nõ coadunatur humiditas, sunt enim paruæ duræ quasi duræ verrucæ, unde sunt pessimæ quia nullam habent qualitatem quæ maturari, aut humores recipere ualeant unde siccantur & finduntur, unde generatur syncopis alienatio & defectio, quibus apparëtibus nunciata est mors. Sufficit quantum disputauimus de uariolis incipiamus de cura synochiarum.

De cura synochorum. Cap. XXVIII.

Quia hæc feb. fit de putrido sanguine in uasis decet phlebotomia priusquam non putrefactus sanguis putrescat, prius tamen considerata uirtute & ætate tempore regione & cõsuetudine an sint conuenientia. deinde minuatur sanguis ante statum, quia phlebotomia omnibus curis synochiæ & synochæ est utilior, synochæ tamen cõuenientior, quia sanguis eius purus est. qd. si omnia supradicta sint conuenientia, uirtus quoq; non sit imbecilis his succurrendum est. Item omnibus supradictis bonis & uirtute existente debili ne temerarie sanguis minuatur, sicut diximus in cura synochi in qua monstrauimus sanguinem nõ debere minui in statu nec in augmento, quia inde natura impeditur. Nã uirtus licet in his uirtusq; feb. sit fortis in augmento tamen & in statu non oportet nos ea credere in initio morbi nisi uirtus obstitit minuat. Si autem in initio non audemus extinguamus acumen sanguinis cum succo mala. gran. oxifcenitia & similibus, damus ptisanum cum amigd. & zaccara. Si sint constipati humefiant cum refrigeratiuis attenuatiuis & dissolutiuis, quia licet hæc feb. sit acuta, putredo tamen eius oppilationem generat. unde nisi refrigeratiua attenuatiua dederimus & dissolutiua, putredo augmentatur, & morbus necessario confortatur. Solis enim datis refrigeratiuis, putredo augmentatur, quia refrigeratiua nõ dissolunt, demus ergo attenuatiua refrigeratiua dissolutiua putredinem cum urina & egestionem & sudorem prouocantia, nisi cum materia acutissima est, sanguis enim in hac feb. aut est acutissimus & cholericus, aut grauis & phlegmaticus, aut medius. Si est acutissimus, damus frigida & acumen extinguentia sicut psilium succum granatorum oxifcenitiam syrupum prunorum uio. casifist. mannâ & similia, ptisanum quoq; colatum & panem lotum. Si autem medius dandæ sunt iuuuæ pro oxifcenitia ptisanum panem lotum & similia. Item si sit grossus & phlegmaticus, dabimus succum lupini uel endiuie cum mannâ casifist. & similia. Clysterizentur & pessaria faciamus. Si dolorem capitis patiuntur, nares humefiant cum oleo uiol. & nenuparino temporibus,

ribus imponatur oleum ros. cū aceto, pedes quoque infundantur in aqua calida, in qua cocta sint camomill. & uiol. Si habeant uigilias, fronti roremus aquam in qua cocta sint cortices papaeris fer. lactuca lactuca uiola & similia. Cataplasmetur caput ex succo uiol. portulacæ semperuiuæ cū oleo uiol. nenufarino & similibus. Quod si sentiūt in uentre acumen aut puncturam, accipiant succum cucumeris, & mal. grana. damus etiam succum melonis palestini eiusq; carnem. dolore capitis non cessante, fundamus in eodac mulieris cum oleo uiol. pedes & crura in aqua mittantur, in qua cocta sint camomill. & uiol. crura eorum ligentur, quia trahit materiam de superioribus ad inferiora. Si stupor est mentis, nec oculos possint aperire calefiant capita eorū cū aqua in qua cocta sint camomill. centaurea melilotum uiola & similia. Si uirtus sit defecta & cal. fortis calefiat solummodo cum camomilla & uiol. fiat circa eum sonitus delectabiles & dulces ad audiendum de genere iuiscorum; quia anima delectatur & confortatur & natura ad dissoluendum materiam excitatur. Sed quidam arbitrantur naturam ex hoc impediri adeo ut materiam nequeat digerere sicut cibus & medicina; quod falsum est. natura enim non impeditur nisi ex digerenda re & mundificanda; ea igitur quibus nō impeditur confortat eam, ita dico si in eis delectet. Quod si dixerint de pharmaciamur pharmaciam accipientes prohibeas ne ad aliquid cogitandū se impediane ne ad aliquid cogitandū mentes inducant, quia dicitis naturā offendi in diuidendam materiā & eam digerendū propter eorum impedimentum. Respondemus inter hec duo magna est differentia. quia anima si in cogitatione aut aliqua re fuerit dedita coadunat in se uirtutes; unde ad actiones operandas natura impeditur. Sed sonitus delectabiles eōtra habentur. nihil enim anime aut naturæ impediunt nisi solam delectationem qua confortantur & fortiores fiunt. hoc sic testatur; uidemus enim in adolescentulis cum aliquos faciamus eis delectabiles sonitus statim furor eorum mitigatur & somnus eis protocatur. Quod si patientes surgentes a stupore huc & illuc se uertāt modo in uno latere; modo in alio, & cum magna angustia, pessimum denotat signum & mortis nunciatiuum. Quod si habuerint inflationem & sonum quasi tympani & post uentris solutionem & inflatio non cessauerit, sit certius signum ad mortem; quia significat pestilentialem fumū sicut est inflatio mortuorum cum naturalis cal. est ab eis ablatus. Quod si in corpore quedā pustula appareant liuidæ aut nigræ, sit pessimum signum, maxime si principalibus membris sint uicina. Quod si his accidentibus careant & patiantur fluxum sanguinis de naribus & uirtus sit bona febrisq; mitigata, & morbus sit in declinatio

ne, cephalica incidatur. quoniā ille morbus sanguineus est & minutionem sustinet, quibus non sufficientibus curentur ex medicina quam diximus in cura fluxus sanguinis qui est in caupon. Si patiantur cordis tremorem imponimus stomacho sand. farinam hordei maluam camphenerem fornacis fabrorum temperatum cum succis portul. semperuiuæ citruli arnoglossæ & acetor. In eorum mansione sternantur frondes uittium mirthæ salicis basilicon, & uasa aqua plena in circuitu mansionis mittantur. Cathaplasmetur uenter ex oleo ro. cucurb. cucu. & similibus. Clysterizentur ex succis cucu. cuscute uæ agrestis succo arnoglossæ cū oleo ro. Quod si hæc fe. sit propter aposte. aut erisipilas accipiant succū solatri coctum & distemperatum cum casia fist. manna uiol. zaccara. ponantur super apostema sand. rosæ maluæ memitha solatrum coriandrū. Si calor est fortis aliquid croci misceamus. Qd si apostema sit de actione naturæ & secundum critum ponimus dissolutiua sicut memitha maluam, camo. crocum solatrum & similia. Si autem hæc feb. sit propter uariolas & desudationem & potest sciri per signa quæ diximus in initio morbi oculi rigentur, lauentur ergo cum iure oliuæ & succo granatorum acetosorum. Deinde lauentur aqua ros. sumac & antimonio cum campho. temperatis cum succo coriandri ut mūdicetur eorum putredo. Apozima ad expellendas uariolas. Rec. lacæ. drag. 5. lentis mundatæ drag. 6. dragragant. drag. 3. coquantur in tribus lib. aquæ ad tertiā & dabis potui guttatim. In fe. non forti iungantur huic apozimati. Rec. succi maratri. drag. 2. detur quoq; apoz. mara. apij cimini rodozaccaræ & croci & gargarizentur. & etiam accipiant ptisanum crisoloccannæ cucurbitam portulacam bliter. humefiat uenter si sit necesse in prima hebdomada cum manna casia fist. rodozaccara & similibus. Solutio uentris huic passioni solet euenire sponte, quia materia cum sui acumine pungit intestina, unde solutio fit quibus artificiali solutione cauendum est & ab acutis & falsis, accipiant granata uuas pira coctana & similia. Si hyems frigidum uetempus fuerit habeant focum cum lignis uitium & tamariscis. uariol. autem deficcatis si necesse est balneentur cum farina hordei rizi milio & similibus. Si habent solutionem uentris accipiant trociscum spodij. qai. Rec. gummi boli ana. drag. 3. amidi. drag. 2. & sem. berb. spodij. ro. ana. drag. 3. sem. herbæ acerosæ. drag. 4. mirthæ. drag. 2. croci. drag. 1. tempera cum succo citoniz, & da potui mixtos cum succo coctanorum. Quod si uariolæ sint plumbeæ & superficietenus latæ aut nigre mortales sunt; si autem in fine synochi uis reliquias purgare & extinguere da trociscos synochi reliquias extinguentes. Rec. spodij. drag. 3. sem. portul. cucu. ana. drag. 4. de cucurb. citru-

frana. drag. 3. gum. draga. amidi. ana. drag. 2. berberis. drag. 3. liquiri. drag. 5. tempera cum aqua ro. potetur cum succo granatorum & similibus.

De causa putridæ febris. Cap. XXIX.

Quia causa feb. putridæ cal. est extra naturam operans in fece chimorum, quæ sit de tertia digestionem in omnibus membris corporis existente, quæ sæx inest, quia omnia quæ accipimus siue sit potus siue cibus non sunt omnino laudabilia, unde cibi uenientes ad stomachum facti quasi prisani, hæpat trahit colamentum eius ad se quod digestum est, & in sanguinem conuersum mandatur membris ut ex eo nutriatur quod suæ complexionis conuenit. sæx autem quia non conuenit per poros cum sudore & fumo expellitur. Quod si membra fuerint defecta ad expellendum fecem propter mutationem suarum complexio num uel compositionum, aut propter oppilationem pororum aut propter grauitatem materie, si fuerit in quantitate multa, aut grossa, aut uiscosa, sæx permanet in concauitate membrorum & raritate eorum, sicut pulmonis & splenis, & concavitate stomachi uenarum & similibus, quæ si moueantur in quibusdam temporibus, uel mala cibaria qualitatem eius augmentantia, aut propter aeris mutationem & similibus odio tenentur a natura propter suam corruptionem nec regit eam. quæ sine regimento permanens calefit interiori calore & sua fumositate proinde bullit & putrescit, sicut humores cadauerum bullientes corrumpuntur & putrescunt cum naturalem perdidierint calorem & regimentum naturæ, quæ putrefacta generat feb. secundum uiam conculcationis: unde nomen accipit à suo elemento. Si materia fuerit cholericæ tertianam, ueram generat duodecim horas tenens, & 36. quiescens. Si sit phlegmatica amphimerinam faciat, 18. se mouens horis, & sex quiescens. Quod si melancholica quartanam generat quæ 24. horis mouetur. & 48. quiescit. Causa diuersitatis harum grauitas & leuitas est materie ad putredinem conuenientis. Nam omnis putredo non fit nisi cum calore & humiditate. quæcunq; ergo materia huius fuerit complexionis, aut ei vicina sit facilius est ad putredinem, contraria uero e contrario. Vnde quartana quia materia frigida est & sicca, & causa putredinis est cal. & hu. repugnat putredini cum utraq; qualitate sui dimissio ergo eius est. 48. horis & motio. 24. necesse est enim ut calore extraneus. 24. horas habeat in mutanda alia qualitate. Quod si quidam sophiste nos reprehendant dicentes. Quare iste terminus ideo non maior uel minor est 24. horis & non plus neq; minus: quia omne quod construitur quod est sub lunari circulo est ex 4. elementis adinuicem oppositis, destruere. n. est conuersio unius in aliud.

uerbi gratia. elementa mutantur in cibum, cibus in humores, humores in membra. Item cum destruitur corpus, humores reuertuntur ad aquam. spiritus ad aerem, calor ad ignem, ossa ad terram. Actio quoq; elementorum fit propter motum lune solis omniumq; stellarum motum habentium. Sol quoq; est causa cæterorum & dominator & cursus eius ab ortu suo exiens ad eundem rediens non manet nisi. 24. horis. unde si materia in aliqua parte putredini obediat, fit tempus accessionis citius. Ideoq; tertiana, quia calidæ sicceq; materie est, & cum una qualitate. i. calore conuecit & cum alia non, necessario calor extraneus moratur. 36. horis in mutanda illius siccitate in putredinem. Vnde reprehendimur quare calor extraneus in quartana moretur. 24. horis ad unam qualitatem. i. siccitatem, & in tertiana ad eandem qualitatem moretur. 36. Respondemus siccitas corporis duobus modis est, aut cum calore vel frigiditate. calor autem deficit corpus, quia illud rarificat & humores deficit. frigiditas uero materiam coadunat & congelat. unde humor in ea clauditur ad quem calore extraneo accedente constipato aperitur materia & humor eius defluit. putredini obediens. In ea autem quæ propter calorem est desiccata, quia humores non sunt in eo clausi nec coagulati necessario calor extraneus in eo tardatur in ea liquefacienda & diuidenda. Similiter si opposuerint de amphimerino, cur amphimerinus sit facilius ad putredinem quam tertiana, cum etiam repugnet putredini cum una qualitate. i. frigiditate. Respondemus phlegma est sanguis semicoctus & in albedinem & frigiditatem mutatus. videmus enim naturam mutare materialem sanguinem in lac in mamillis & in testiculis sperma. Ideoq; natura mandauit phlegma cum sanguine per totum corpus, neq; claudit illud in aliquo membro, nec loco sicut utranque cho. quia aliquando corpus ex eo nutritur cum paupertatem sanguinis habuerit. Igitur phlegma est continuatim obediens putredini sicut sanguis, & non differt nisi propter paruitatem suæ frigiditatis in qua calor extraneus aliquanto tempore moratur in mutando illius qualitatem in putredinem. Præterea dicimus hanc se. tertianam de cholerico chimo & putrido nasci propter id quod diximus: quia cho. ru. cum dominatur corpori, aut putrescit aut non, quæ non putrescit, aut est in uno membro, aut in toto corpore. si sit in toto corpore, generat ictericam sine fe. quæ autem est in quibusdam membris facit tertianam putrefactam. Aut est in toto corpore, aut in uno membro. si sit in uno membro generat apostema quod dicitur crispila. si sit in toto corpore, est ut intra uasa, aut extra. si sit intra uasa, aut generat tertianam sine rigore, aut caufon. Si sit extra uasa facit tertianam interpositam. ea enim materia quæ est intra uasa non facit

ciet rigorem eo qd est clausa in uasis, non potes transire per loca sensibilia & pun gere ea. Rigor enim non est aliud quam materia pungens mebra sensibilia. Sed hanc se. licet intra uasa sit cum interpolatione, in die tamen remissionis no quiescit sicut ea quae sit extra uasa, quia eius materia est mixta cum sanguine & cum eo mouetur. sed tamen in die tranquilla quiescit & mitigatur ali quantulum. vnde a die exacerbationis destruitur. Quae itaq; feb. a causone differt. quia materia tertianae continuae intra uasa existens continua est in omnibus uenis corporis. sed materia causon plurimum consistit in uenis cordi uicinantibus sicut sunt uenes oris stomachi hepatis & pulmonis, proinde est acutior & molestior. materia autem tertianae feruentior est alijs in locis corporis quam in illis, sed tamen haec utraque febres concordant adinuicem. quia materia utriusq; est cho. utraq; etiam est continua, causon tamen ali quando fit de falso phlegmate sicut Hippoc. in epidimia. feb. inquit quaedam est amara & quaedam salsa. Tertianae uero quae habet interpolationem intelligitur cum tribus significationibus, quas Gal. ostendit in re naturali non naturali & contra naturam. Naturalis uero uo est etas complexio, non naturalis quemadmodum tempus aer regio. res extra naturam uelut occasiones quae creant morbi naturam quae sunt infirmi accidentia & medici significationes sicut rigor frigiditas & tarditas accessionis & alia similia. Per rem naturalem sic cognoscitur, quia plurimum patitur hanc feb. cuius complexio calida est & sicca, etas iuuentus a 25. annis usq; ad 35. maxime si fuerit macilentus & crispus pilos habuerit corpus rarum. Per non naturalem rem cognoscitur, quia plurimum oritur in aetate cu aer fuerit mutatus in calorem & siccitatem. Similiter & regio exercitium infirmi, & si in sua sanitate fuerat laboriosus & ipse studiosus ac sollicitus, quoniam natura temporum apud est quasi natura complexionis infirmi, & si complexio humana aliquid significat, necesse est id natura temporum ostendat. & natura aeris quasi natura patientis. natura regionis est quasi natura etatis, vnde quodcunq; hoc significant necessario idem illa nunciant. Similiter labor & sollicitudo sunt quasi macilentia & extenuatio: macilentia enim calorem & siccitatem significat, & sollicitudo atq; labor faciunt calpre. De re extra naturam sic intelligitur, sunt enim quaedam in quibusdam quibus haec feb. cognoscitur, quia haec feb. de materia cholericca calida & sicca est & uicina sensibilibus membris, necesse est eam precedat rigor molestissimus pungitius quasi acus aut spina. Acumen enim cholerae rubrae transiens per sensibilia membra quae non fuerant assueta pungit ea & generat tremorem qui rigor dicitur, hoc testificatur, quia si aqua calida in cholera

rica corpora incidit priusquam eis fuerat assueta tremorem patiuntur & repugnant aquae, sed eam assuefacientia utraque una res efficitur propter societatem quam habent in calore, quia si materia cholericca tanti fuerit acuminis qd membra sensibilia per eam superetur, natura fugiat interiora corporis propter illam rem nociuam, unde exteriora infrigidantur quousq; materia calefiat & ferueat eiusq; calor per totum corpus diuidatur. Cum ita sit necesse est patiantur infirmi incensionem & nimium calorem sicut uigiliam dolorem capitis siue granitatem & sentiant punctionem in hepate & acuties fumi de cute egrediuntur appetitum perdant, & aliquando eorum extremitates refrigerantur propter nimietatem angustiae & delectantur panos quibus sunt coarctati expellere aut eis in aqua infusis se induere, maxime si fuerit in quarta accessione, tunc enim est ultimitas & stat morbi. cunq; uenerit in huius quartae accessionis dissoluitur materia cum sudore si fuerit subtilis & leuis, aut cum egestionem si fuerit grossa & grauis. Solet etiam huius feb. vomitus euenire cholericus & tincta egestio maxime in tertia aut quarta accessione, proinde ca uere oportet ne in his temporibus detur phar macia, quia natura per se purgat materiam in his temporibus. Quod si haec feb. sine aliquorum humorum commixtione fuerit, haec signa apparent puta & simplia. Si autem feb. commixta & eius signa sunt composita secundum commixtionem materiae, sed si principio diei huius se. signa apparent perfectam digestionem ostendentia, finitur in tertia accessione, quae si non fuerint perfecta complentur in quarta. Rursus si digestio fuerit debilis in septima finitur accessione. qd si nullum signum coctionis demonstrantium apparuerit fit feb. diuturna & monstratur esse non uera, quae si fuerit uera eius accessio ut multae 12. horas tenet & dimissio 36. & finitur in 7. peryodis qui sunt 14. dies. qd si accessio 12. horas tran sierit & 7. peryodos intelligitur non esse uera. vrina patientium hanc feb. est rubicunda ignea subtilis. causa ruboris calor est cholerae, causa subtilitatis eius siccitas est cholerae. Pulsus in initio accessionis priusquam calor fuerit per corpus dispersus paruus & subtilis propter naturam ad corporis interiora se coadunantem, sed calore in toto corpore diuiso & accessione ad ultimitatem appropinquante fit pulsus magnus & uelox, sed tamen uirtus eius fortior est in dilatione quam in constrictione propter multitudinem fumi ad interiora corporis accumulati in qua natura laborat ut extrinsecus eam expellat uelociter. Sufficit quantum diximus de signis tertianae feb. oportet nos plane dicere qualiter & quomodo chol. ru. recipit putredinem cuius natura sit calida & sicca. Diximus quia putredo non est nisi caliditas & humiditas sint coniunctae.

inest. Item dicimus quod siccitas sit tribus modis, aut. n. sicca est in natura, aut in substantia aut in vitro; quia quedam sunt naturaliter sicca & substantia eorum est liquida sicut mel vinum cholera. ru. aqua salsa & similia. Sunt quedam et in natura humida & in substantia sicca & dura sicut piper longum zinziber & similia. Sunt & alia in substantia & natura sicca & dura sicut lapis ferrum & similia. Quod ergo in substantia est siccum, in natura humidum recipit putredinem, quia calor extraneus humiditatem in eo inueniens dilatat eam faciens eam fluere. Item diximus quod omnis bullitio & perturbatio quae sunt extra actionem naturae faciunt putredinem. Quod est in natura est siccum & in substantia liquidum, suscipit putredinem quia calor extraneus inueniens liquorem in eius substantia, facit eum fluere. Quod autem in substantia & naturaliter siccum est nunquam recipit putredinem, nam ex utraque parte siccum est, proinde calor extraneus in ea nullam recipiens humiditatem fit eam siccior & durior facere. Palam ergo intelligimus quia quod in suo corpore erit humidum suscipit putredinem, licet naturaliter sit siccum, unde cholera rubra licet in substantia sit liquida in natura tamen est sicca, recipit ergo putredinem, similiter & cholera. Palam igitur est quia cholera rubra & nigra non recipiunt putredinem propter earum complexionem & naturam, sed propter substantialem humiditatem illarum atque liquorem. Et quia compleximus causam putredinis cholera. ru. absolute oportet nos diffinire speciem cholera. ru. quae recipit putredinem, & eam quae non. Unde dicimus cholera. rubra modis diuersis esse, aut est naturalis aut non naturalis. Naturalis est rufa habitans in felle & virtus eius in hepate. Non naturalis in stomacho, est tamen diuersa, quia quedam vitellina est, alia crocea, alia prasinia, & alia æruginosa. Vitellina & crocea minoris sunt caloris & siccitatis quam rufa quae est naturalis. prasinia & æruginosa maiorem habent calorem & siccitatem quam naturalis. causa quia naturalis cholera ad stomachum ueniens miscetur cum humoribus in stomacho existentibus, qui si fuerint laudabiles & temperati sicut humores qui oriuntur de pane bene fermentato annali agnoscendo lac adhuc fugiente conuertitur in cholera. croceam naturali vicinam. Quod si humores quibus cholera est commixta ad frigiditatem & humiditatem pertinentes sint sicut eis qui nascuntur de piscibus & fructibus mutatur cholera vitellinam. Ideoque vitellina minus est calida & sicca quam crocea, & crocea minus quam rufa. Quod si inuenierit humores in stomacho calidos & acutos sicut qui generantur de pipere sinapi porris allij & similibus augmentatur calor cholera. fitque prasijs coloris. Si autem illa cholera in suo permanserit acumine & calefaciat eam calor extraneus sicut calor temporis aut aliarum rerum inceditur fitque æruginosa. Crocea iterum aliquando nasci

tur in hepate cum sanguis humidior sit quam decet, proinde naturalis cholera in iuuenibus est rufa senibus autem & pueris est crocea, senioribus est vitellina. Prasinia autem impossibile est in hepate generetur, neque transit a stomacho neque generat se. quia tanto tempore in corpore & permanet ut putrefiat & febris generetur, natura. n. semper se adiuvat ut eam a corpore expellat propter eius malignitatem: Quod si natura defecerit eam expellere nequiescens incenditur corpus & homo moritur. Igitur si talia de prasinia accidunt tanto maiora & certiora de æruginosa eueniunt, necesse est ergo ut rufa crocea & vitellina recipiant putredinem & se generent. Sed si materia febris fuerit uera cholera rufa generatur causon. si fuerit crocea fit tertiana, si est vitellina nascitur hæmitriteus.

De febre tertiana & eius cura. Cap. XXX.

Febristertiana molestior est ceteris putridis febris. propter acumen eius materie, & quia causon uicina quae cum fuerit uera fit eius crisis in septem peryodis sicut Hippocritus dixit, si non sit una trahet hunc terminum & secundum materiam cum qua miscetur sit longitudo suae determinationis, quae aliquando incipit in autumno & dimittit in uere. solent etiam patientibus euenire in nocte antequam accessio eueniret angustia & vigilia, veniente autem accessione accidit parua frigiditas & calor. prima quidem accessio. 4. horis permanet aut. 6. aut. 7. deinde dissoluitur cum aliquanto sudoris. Causa sudoris in prima accessione subtilitas est materie. Paruitas eius est duobus modis. Vno quia materia non bene digesta est. alio quia calor febris desiccatur & conuertit eum in fumum, unde sudor paucus apparet. Secundae autem accessions accidentia sunt quasi primae sed tamen longiora, quia permanet. 10. horis, ueniente uero tertiae exacerbatione molestatur, natura est. n. nuntiatur. Ideoque significationes apparent monstrantes uia feces perturbari & bulli incipiunt. idolor capitis nimia incensio angustia sitis uomitus cholericus. Veniente quidem quarta accessione induratur & augmentatur febris. quia status morbi est uicinus. Idcirco dolor capitis augmentatur & sunt sitis uomitus angustia defectio siccitas labiorum rubor oculorum & aliquid. quando cutis faciei fit liuida aut nigra, & aliquando natura cholericam prouocat egestionem secundum crism quia dies critica est & moratur accessio. 12. horis. & aliquando. 14. si materia fuerit grossa, deinde cum nimietate sudoris dissoluitur maxime si egestio fuerit ex contrario, quia hæc materia solet dissolui in accessione. Quod si materia subtilis fuerit atque leuis expellitur per poros cum sudore, si est gravis cum egestionem, medio crisi existens cum uomitu eiicitur, his itaque accidentibus transactis infirmus quiescit & confortatur. Quinta autem accessione accedente patiens est minoris molestationis quam

fuerit in quarta, licet. n. molestatio tertie accessionis malignitati vicinatur. Sexta autem accessio debilior est & modicum suorum accidentium. apparet. Septima autem accessio ut multum. 12. horis permanet, deinde ab infirmo cedit ois molestatio & angustia & ipse ualde ab agitudine egreditur. Et aliqui hac fe. i. tertia accessione finit, & nonnunquam in. 4. sed plurimum in. 7. quod intelligitur ex significatione in vrina alijsque locis sicut diximus apparentibus. quod si in prima die apparuerint erit brevis, si aut postea tardabit, sed in si uera fuerit non transit. 7. peryodos sicut Hippo. determinauit. Vnde oportet medicum in hac fe. se cauere ab initio ut non det infirmo rem eum calefacientem ne materia calefacta cum suo acumine caput saliat & frenesim generet, fiat que timor & molestatio peiores quam materia qua generatur. Rubea enim cholera acumen & velocitas non sustinet medici ignorantiam & infirmi stultitiam. Vtilius autem huius curamentum taliter est ut in primis perquiratur virtus vtrum sit fortis uel non. quare si fortis fuerit & materia morbi furiosa catarrhicum dari conuenit chole. rub. purgans eiusque acumen extinguens sicut de oxifencia. drag. 2. pruna. 20. mirabol. citri. vnc. 1. castia. drag. 5. manna & his similibus. Si autem egestio eorum stiptica fuerit & est necessitas ea liquidam faciendi aliquantulum dyagrid. oportet misceri, sed non in diu accessionis catarrhicum det, sed aut die prima aut tertia aut quarta die. Cauendum etiam est quantum plus pot fieri ne impediat natura in die accessiois volens morbo repugnare & materia eius expellere cum catarrhico aut cibo. Sufficit autem in accessione psilium cum succo mal. grana. aut syrup. aliquis sit ei conueniens, sed hac danda sunt cum nimis aut fortis sit calor & sitis. Si autem taliter non extiterint sufficit solus syrupus, quia psilium aliqui congelat & idurat materiam. Si autem accessio inceperit post prandium sufficit infirmo solus si syrupus ei datus mane, fe. quidem transacta ei ptisanum det, vespere panis lotus cum zaccara. Quod si accessio ad medium diem inceperit matutino ptisanum accipiat neque sumat aliud nisi fe. cessauerit. Pretereunte quidem fe. panem cum zaccara accipiat. Si autem feb. in vespere aut prima noctis hora inceperit mane sumat ptisanum, & cum fe. cessauerit panem lotum. Sed cauere oportet ne in hora accessiois aliquid ei tribuat nec tribus horis ante quam accessio uenerit, quia si aliquid in hora accessionis acceperit stomachus illud euomit, quia tunc reponibus stomachus mouet ad expellendum putredinis materia que in eo continetur. Vnde si tempore accessionis uicinante aliquid datum fuerit sit calor fe. augmentum & materiam ingrossat & poderosam eam facit, est. n. febris quia si oleum ardentis lampadi. Quod si in initio huius fe. non audebis dare catarrhicum propter uir-

tutis defectionem aut propter paruitatem etatis & aerem da i. die quietis mannam castiam. viol. zucca. oxifeni. pruna. rodozacca. in die autem accessiois succum mal. gra. cum psilio. quod si hac non suffecerint suppositorium necesse est fiat de licio nitro dyagridio zucca. & his similibus. his uero non sufficiencybus clystere fiat de hordeo mudato uiol. malua blea sebesten fursure obsomog. zucca. ole. uiol. nitro sale eoi dyagridio. Quod si quinque dies transierit patiens & morbus ad ultimatate uenerit prohibe cibum & da infirmo solum ptisanum mane, vespere panem lotum cum zucca. Eodem modo dicta in. 5. 6. die utatur, sicut in die accessionis fecerit, ut ueniente. 7. corpus sit inanitum & natura libera possit morbo resistere nullum habens impedimentum, & in. 6. solum accipiat ptisanum mane si accessio ad 6. est uentura. Quod si aliqua fuerit suspitio ne cibum in stomacho augmentetur propter sui inanitionem extingue cathamodicum cum succo mal. grana. & melonibus palestinis. feb. autem mitigata & angustia & incensione ab infirmo cedentibus si punctiorem in ore stomachi sentiat accipiat panem lotum cum aqua aut colatum aut solum aut cum modico zucca. Si gula siccitatem aut incensionem habuerit in palato gargarizet succum cucu. & psilium potet & apozima prunorum & oxifeni. si dolore capitis patitur humectat nares cum oleo viol. caput infundatur de muliebri lacte uel asinino uel caprino, emplastrum de psilio suppone capiti, psilium lotum & parum aqua ro. misce & diu agita donec incipiat inspissari & superpone fronti & temporibus uel sandalos albos, fricentur in testa intincta aqua ro. & ex eo quod inde elicietur. fiat troscisci. 3. admixto modico camphorae & siccati conficiantur cum aqua ro. & sterne, & cum faeces successerint aqua supernatante intingatur pannus & superponatur temporibus & fronti. & superponatur temporibus oleum ro. aut uiol. cum aceto. mixtum infundatur Si aut siccitas augmentata capiti dominetur, & infirmus alienationem patiat, sternutationem fac cum oleis & lacte que dicturi sumus, lauet etiam caput ex eis, pedes et crura mirrant in aqua in qua cocta fuerint uiol. papaueris cortex lactuca & aliquantulum camomillae, ex hac aqua si fuerit necessitas lagetur caput. Quod si in die septima solutio aut uomitus uenerit sitque ex actione naturae nullum artificiale ingenium oportet coaptari quousque solutio permanferit si fuerit unde oportet & secundum quod oportet, & quantum natura sustinuerit. oportet nos mitigare incensionem stomachicam syrupo mal. grana. aut uiol. & spodio, sed si augmentetur fe. sitis & defectione in ultimitate status & mutetur pulsus in calidum & uelocem & inordinatum. urina uero fiat rubicunda & incensa & infirmus sit pusillanimus aut timidus quousque uideris eam uenire quam tu oportet & secundum quod oportet

ret. Quod fruentis solutio augmentabitur sitq; necessitas ut cōfortet natura cū cibo, dabis ptisa nū factū de hordeo assato & panē assatū lotū farina mal. grana. cū aqua ro. & si post hoc solutio nō cessauerit da troiscū de spodio cum syrupo d succo agrestis vñe aut de aceto pōi citri. Nutri ti cōuenit de milio risi cū sumach & amigd. vstis & similibus. Bibat mane ieiunus aquā ro. de pane deciso. Quod si cholera i egestionē fuerit aug mētata, & dubium est ne discoriet intestina, & patiens disinteriā patiatur, cōfortētur intestina cū. dr. 2. & se. herbæ acetosę, & cū clysteri de suc co arnoglossę virgę pastoris ramis portu. oleo ro. terra sigillata testis ouorum assatorū & simi libus in caufon dictis. accipiat pul. gummi boli. teritę sigillatę an. dr. 4. amidi spo. an. dr. 3. se. ma lux assati. se. mirtę an. dr. 3. fac puluerē, & dabis. dr. 4. cum oleo ro. tēperatas, & cū syrupo mirti no & aqua frigi. & cataplasme stomachus de flore vitium salicis mali coctani pirorum, horū oīm flores an. dr. 4. galli. dr. 2. ro. sand. rub. panis aphricani an. dra. 4. oīa in puluerē redacta cum aqua ro. & succo mirtę distēperent. si calorē nimium habuerit modicum cāphorę admisceatur, mite in aquā quā potui dabis spodium bolum gum. ar. oīa assata cum sumach zucca. & aqua frigida mixta. sumat citonia zaccarā simplicem & diamilon. Quod si disinteriam patitur, aut sin copiam aut ictericiā cura cum medicina harum passionum quam diximus in caufon, ibi enim planē diximus quantum oportuit. vnde non est opus illud repetamus hic.

De amphimerino. Cap. XXXI.

Amphimerinus de phlegmatico chimo nasci tur, phlegma. n. si corporis cōplexioni domina tur, aut putrefit, aut minime. non putrefactum, aut in toto est corpore aut in parte. si fuerit in to to corpore generat hypofarcam aut frigid. con tinuā sine fe. Cā huius diuersitatis est fortitudo, & defectio membrorum. quia mēbra cum fortia sint expellunt paulatim illud phlegma neq; di mittunt illud coadunari ut hypofarca gene rat. qđ fuerit de frigida coadunat in corpore, vn de hypo farca nascitur. Si at fuerit in uno loco fa cit humidum apostema quod zimia nuncupat, si vero fuerit putrefactum, aut est in toto corpo re, aut in uno mēbro. Si est in uno membro gene rat vulnera aut pustulas de qbus humores fluūt saniōsi & aquosi. Si fuerit in toto corpore, aut ē intra vasa aut extra. Si est intrinsecus generat cō tinuum amphimerinum sine rigore pp cām quā superius diximus de alijs humoribus cum fue rint intra vasa. Si est extrinsecus facit amphime rinū cū interpolatione quā tribus modis cogno scimus sicut intertiana diximus. i. naturali nō na turali & extra naturā. Res naturalis est etas, cō

plexio. Nō naturalis est tēpus regio aer & artifi ciū infirmi. Res extra naturā sunt accidētia q̄ ex hac feb. generantur, quę sunt infirmi. accidētia medici vero significationes. De re naturali quia hac febris plurimum accidit frigiditas & humi das habentibus naturas etatem decrepitam aut pueritiam pp phlegma senioribus dominans & defectiōnem calorē eorum, ut cibaria non dige rant secundum q̄ oportet, neq; superfluitas ter tię digestionis ab eis expellatur. Eodem modo intelligimus de omni corpore cuius complexiō ni frigiditas & humiditas dominať. pueri vero accidentaliter sunt phlegmatici propter eorum gulositatē, quia accipiunt cibum vltra q̄ possit calor naturalis pati & cum ēt sumunt inordina te, vnde humidi chimi i eorum corporibus aug mētant accidētaliter, quia calor naturalis in pue ritia fortior est q̄ in ceteris etatibus naturaliter & in iuuenibus abundantior est qualitate, sicut Gal. calor inquit naturalis in pueritia plus est in substantiā quā in qualitate, quia in pueris est sicut sanguis tēperatus, in iuuenibus sicut cholera ru bea in acumine permanens. Palā ergo est in pue ris phlegma dominari propter gulositatē & cibi inordinationē. Sed intelligendū est in oībus gu losis cibum potumq; multum sumentibus inor dinate & maxime ebrietatē assuescentibus, & ma xime si cibo nōdum digesto hac fecerint. Palam ergo est quod hac febr. naturaliter accidit se nioribus & eis qui similes habent cōplexiones sicut glaucis aut rubeis albis crassis humidis nō pilosis, & angustos poros habentibus. Nasci tur etiam in pueris & eius qui similes sunt eius id est gulosis multum comedentibus ebriosis sa pē, & multum frigidam aquam bibentibus. De re non naturali ita intelligitur, quia plurimum hac fe. nascit in hyeme, aut cum aer mutat in fri giditatem & humiditatem. Similiter cū natura re gionis fuerit mutata maxime si patiens in sua sa nitatē fuerat assuetus requie delectatione & ne que vlla exercitatione solitudine, & labore fuerit vsus. Res autem extra naturam sic cogno scitur, quoniam hęc fe. cū sit de putredine phelg matis necesse est in vnaqua; accessiōe precedat priusquā materia putrefiat ac calefaciat nimis frigōr quāsi glacies refrigerans totū corpus vsq; ad extremitates & pmanet quāsi una hora. Cum que phlegma fuerit putrefactū & inceperit cale fieri transit frigiditas, calorq; levis est & grauis, sed tamē est diuturnus ac formidolosus. Leuitas & diurnitas fe. quia materia est phlegmatica & phlegma est durum ut digeratur. Tremor eius ē pp naturā laboratē ex cōtinuitate & propinqui tate suę interpolationis, quia tēpus suę accessiō nis ē 18. horis & requiei. 6. vñ. priusquā sētiat in firmus vnus dimissionē incipit altera neq; pfe cte mūdificat de corpore sicut tertiana, materia tū tertianę. ppter calorē & suā siccitatē cito cū

extraneo calore icēdit & cōuertit quasi ī cinerē,
vnde patiens quiescit donec altera ueniat accel-
sio, sed quotidiana nō fit similiter quia materia
eius propter grossitatē & viscositatē suā tarde
dissoluitur & annectitur corpori, eiusque calor
seruatur, proinde patiens non quiescit neq; sentit
qñ interpolatur. Ideoq; naturam fatigat unde est
molesta ac timorosa. Rursus patiens nō sudat ni-
si modicū pp grossitatē & frigiditatē materiei.
Veniet autē morbo in ultimitate laboris & si-
gnis nunciatiuis apparentibus crisiq; appropin-
quante dissoluitur materia, & nimium sudare
incipit infirmus. Habet etiā hęc feb. proprietates
quę sunt ab ea inseparabiles. i. dolorē stoma-
chi, proinde patietes euomunt phlegma, & sple-
nis, sed tñ maior ē in stomacho, quia phlegma
sc̃p ē in ore stomachi, proinde patietes euomūt
phlegma & facies eorum fit tumida & mutatur
in liuidū aut plumbeū colorē, os eorū sem̃p est
humidum & insipidū neq; vllā patiuntur sitim,
& si in statu fuerint fit modica, quę sitis nō est
propter materiā phlegmaticā, sed accidentaliter
pp̃ter calorē phlegma calefaciētē & putrefaciē-
tē sicut sitiūt hi qui pisces & melones comedūt,
hęc. n. cibaria si calorē in stomacho accumula-
tū inuenerint cito ī eius naturā cōuertuntur & si-
tim generāt, quia naturaliter sunt cōuertibiles.
Quod si vltimitas caloris in vnaqua; feb. vene-
rit mutat facies eius ī citrinitatē, vrina fit rubea
& pulsus fortis, hęc sunt propter calorē phleg-
ma putrefaciētē cessāte quidē calore cōuertit
tur facies eius in albū & plūbeū colorē & vrina
in albedinem & cruditatē, Cā quia materia eius
est cruda, pulsus eius fit latus tardus diuersus de-
bilis. Latitudo fit pp humiditatem & abundan-
tiā materię, defectio & paruitas propter parui-
tatem naturalis caloris, diuersitas eius, quia na-
tura aliqñ materię dominatur vnde pulsū facit
fortem & aliqñ materię nature pręualēt quę de
causa fit pulsus debilis, veniente aut morbo ad fi-
nem & materia digesta fit urina digesta rubea &
turbida & nunciat propinquitatem crisis. Quod
si quidā sophistę nos reprehenderint & dixerint
si natura feb. est calida & sic. & phlegma est fri-
gi. & hu. quomodo feb. ex eo nascitur. Respon-
demus non dicimus feb. de phlegmate generā-
ri secundum suā propriā naturā existente, sed di-
cimus q̃ omnis materia phlegmatica siue chole-
rica aut melancholica cum putrescit bullit & ca-
lescit vnde feb. generatur, quę si non putrescit fe-
brem nullo modo faciet licet naturaliter sit ca-
lida, hoc testatur per ictericiā quę nascitur de
cho. rub. mixta cum sanguine per totum corpus
& tamen patientes nullam febrem patiuntur
quia chol. nō est putrefacta. Palā ergo intelli-
mus quia phlegma non generat feb. naturaliter,
sed propter sui bullitionem de putredine proce-
dentem, verbi gratia, aqua cal. inceditur nō pro-

pter sui naturam, sed propter calorem quem ab
igne recipit. Sufficit quantum disputauimus de
causa & significationibus. amphimerini incipi-
mus curam.

De cura amphimerini. Cap. XXXII.

QVia hęc feb. de phlegmatica nascitur mate-
ria & phlegma naturaliter est frigi. & hu. ne-
cesse est hęc feb. cūretur cum rebus grossiorum
humorum attenuatiuis, sed tamen quia phleg-
ma diuersis modis est, quia quēdā species phleg-
matis est grossior & frigidior naturali, & quēdā
calidior, necesse est cum materia est frigidior,
dari plus attenuatiua q̃ cum fuerit calidior. Vnde
de medicum oportet inuestigare vt certissime
cognoscāt quomodo debeat curare; & fiat hoc
secundum qualitatem, res. n. subtiliātes & atte-
nuantes diuerso mō sunt in qualitate. Phlegma
iterum similiter est diuersum in qualitate, quia
est phlegma frigi. & hu. cuius species est natura-
lis quę est de colamento sanguinis aquosi, perin-
de sāguinis nō perfecte digestus est phleg. est &
phlegma frigidius, est & aliud calidius & leuius
sicut falsum, qđ ostendit calorem aquositati san-
guinis esse dominātem. Similiter & attenuatiua
diuersa sunt, quia quēdā cum nimio calore & in-
censione sunt attenuatiua sicut radices origani
calamenti zizibe. & similia, & quēdā q̃ attempāt
absq; multo calore & frigore quemadmodum
maratrum lupinum apium et similia. Sūt & alia
attenuatiua acumen cal. extinguentia ex interio-
ri sicut prisanum oxizaccara & his similia, unde
quia atternāria tali mō sunt, vtiam̃r eis tali mō,
si phlegma intelligit esse frigidius & grossius
medicetur cum re calefactiua & humectatiua. si
fuerit calidius & humidius curet. in initio cum
refrigeratiuis & attenuatiuis, feb. aut mitigari in-
cipientem cūretur patiens cum re extenuatiua
& calefactiua aut aliquanti caloris actiua. Qđ
si data fuerint refrigeratiua calore se. decrescen-
te timemus ne materia induretur & ingrossetur
Phlegma. n. licet calefiat accidentaliter, n̄ natu-
raliter retinet frigiditatem & humiditatem. Itē-
rum si calidā medicinā assuefacimus augmenta-
mus materiā plusquā prius fuerat. q̃ si calorem
cum fuerit frigidum suscepit magis prępara-
tur ad recipiendum calorem cum accidentaliter
fit calidum, propter hoc necesse est fit. medicina
mediocrius. attenuās sine calore aut cum modi-
co calore & hoc fiat ab initio vsq; dum digesta
fuerit materia, tuncq; signum coctionis in urina
alijsue locis apparuerit festinari oportet ad ex-
pellendū materiā extrinsecus. hoc. n. si neglexerit
mus timēdū est ne materia ingrosset & induretur
quia sic eius est natura. Signum etiā coctionis si
nō pateat, quēadmodū sic cruda appereat vrina
& alia signa mōstrent motā esse materiā ne cre-
datur

datur vrina; possibile enim est cruditas vrinae fiat ex cibi & potus inordinatione. vnde non tuam actionem dimittas propter vrinam, sed purga materiam cum vasis solutione secundum quod oportet. si phlegma fuerit catarticum dabis de mirabol. citri. chebul. absint. bedegari cuscute eupatorio cassia. & manna, & cum pill. de hierapig. & his similibus. Quod si fuerit acetosum phlegma purgabitur cum pill. de stomaticon, sed tunc non omnino materia expellatur subito, sed multis uicibus paulisper, quia si materia purgetur in una vice tunc forti potione timendum est ne repugnet materia potioni cum sua grossitie, & conuertatur potio ad substantialem corporis humiditatem, vnde natura iterum repugnet ei, & fiat hoc certamen cum infirmum molestans ac periclitans. Eodem modo oportet faciamus in omni passione quae fuerit de graui materia & dura ad dissoluendum. Potest itaque materia cognosci si fuerit salsa uel acetosa. his signis, quia si fuerit acetosa infirmus paruam habet sitim & sentit gravitatem & in uentre & uentre habet constipatum. Causa quia phlegma cum frigidum fuerit & grossum adharet se uiae & prohibet eam ne eiciatur, vnde patiens sentit gravitatem. Quod si materia fuerit salsa, fit sitis nimia egestio solubilis & patiens sentit in stomacho punctiorem & dolorem, & habet os siccum & salsum cum nimia siti, quia phlegma cum sua falsedine pungit stomachum & intestina & rogit ea ut expellant a se quicquid fecis habuerint. Sunt & alia signa quia si materia fuerit salsa frigiditas minor & calor fortior & actio sit breuior propter leuitatem & acumen materiae, & e contrario sunt signa si fuerit acetosa. Quod si uirtus infirmi nequeat pharmacia tolerare, oportet ingeniari ut extenuetur materia absque ullo naturae labore, uerbi gratia, si materia fuerit in hepate donetur causa hepatis mundificatio cum vrina si cut trocisci de ro. & trocisci de berberis oximelum succo vel apozimate herbarum. Radicis apij maratri scariolae scolopend. ameos. cōfice cum succo mastice, si materia fuerit acetosa. quod si salsa dabis trociscum de spodio cum oxizaccara. Sed si materia fuerit circa stomachum mundificet stomachum cum lupinis mel. ro. si fuerit acetosa. si salsa cum rodozaccara. Audiuimus quosdam antiquos referentes se uidisse aliquos quotidianam habuisse de acetoso phlegmate, deinde cum oxiremiā inciderint & vomitum, qui quando salsa dixit usi sunt sicut blitis elixatis cum obsomogaro & porris radicibus sparagis & similiter potauerunt uinum forte & vetus, & posuerunt epythima. calidum supra stomachum cum a cibis fuerit inanitus de oleo nardino & sic euasi sunt; quia materia dissoluta cum egestionem egressa est. Alij autem comederunt pices cum sinapi & forte uinum potauerunt & salui sunt effecti. Sufficit quantum disputauimus de cura amphimerini absolute & vniuersaliter, vo-

lumus modo dicere particulariter de vnaquaque specie eius, vnde dicimus quia in initio oportet inuestigari qualitates materie utrum fuerit salsa, & sic in initio morbi detur oxizaccara cum aqua calida. veniente autem accessione & frigore incipiente ponantur pedes patientis in aqua calida in qua cocta fuerint camomilla & viol. anetum, fricentur plantae pedum cum oleo viol. & sale. Quod si sponte patitur vomitum sit bonum signum, significat enim leuitatem materie eiusque facilitatem. Quod si vomitum non habuerit ne cogatur ut egrediatur in initio morbi, quia significat grossitatem & duritiam materie. vnde vomere cum fecerimus magnam stomacho nocumendum tribuimus, & ipsamet febris propria sit stomachi nocitiua, proinde non debet causa fieri stomacho laesionem inferes, sed dari conuenit rodozaccaram cum calida aqua enim calida in hac febre est utilissima, materia enim attenuat & dissoluit & sitim extinguit, quia causa sitis in hac febre est ebullitio & putrefactio materiae. vnde cum fuerit extenuata propter aquam calidam sitis extinguitur, deinde accipiat pisanum cum oxizaccara. Quod si egestio fuerit stiptica dabis mannam dra. 3. oxizaccaram vnc. 1. aquam calidam vnc. 3. Si autem febris primam transierit habdomadam & signum coctionis apparuerit in vrina & materia moueri & digeri inceperit, tribue in initio accessionis oxizaccaram drac. 2. cum apozimate aneti & pro uocabis vomitum sine angustia. Quod si uenter fuerit constipatus humefac eum cum lupino manna rodozaccara & his similibus. Quod si nondum humefactus fuerit clystere ei facies de viol. camomilleon spinis aegyptiacis malua ana. vnc. 1. sc. croci hortensis drag. 20. furfuris blitae cetaureae maioris sebestem, omnia coquantur in 4. lib. aquae donec ad unam redeant, deinde colaturae adde olei uiolarum zucca. obsomog. ana. vnc. 1. salis communis nitri an. drag. 2. Quod si se elongabitur ut 14. transeat dies & manifestabit se patiens sentire fumum cal. de suo corpore exire & patiens sentiet abominationem aut uentris rugitum, cognosce quia materia est perturbata & commota & uult exire per sudorem si fumositas sentit, aut cum vomitu si abominationem: aut egestionem si rugitum passus fuit. Vnde oportet festinare ut expellat materia cum hoc catartico quod, Rec. mirabo. cit. chebul. ana. vnc. 1. bedegar. drag. 6. rutae absinth. eupatorij an. dr. 3. uiae passae enucleatae vnc. i. iuiabas. 20. pruna. 20. oia in tribus li. aquae coquantur ad medietatem, deinde manent rodozac. an. vnc. 1. adde colatis oibus potui dabis. Pill. simili modo valentes. Rec. chebul. dra. 3. turbit. drag. 2. & se. hierapi. dra. 2. trociscum de rosas debegar an. dra. 2. absinth. eupatorij cuscute an. drag. 3. mastice. dra. se. tepera cum succo apij aut lupini & fac pill. ad modum cicoris dabis. dra. 3. aut. 4. cum aqua calida aut oximel. cum calida. quia oximel oppositionem hepatis & renum aperit, urinam prouocat

stomachū de frigidis humoribus mundificat, maxime si cum aqua cal. bibatur, quia aqua calida multū inuat. Idcirco cauēda est in hac feb. aqua frigida semper, neq; dari oportet secundum potum aut secundum medicinam, quia materiam ingrossat & congelat, accipiat pisanū quod est coctum cum radicibus apij maratri aneti calamēti cum modico piperis, cū quē frigus accesserit ponantur in aqua cal. pedes in qua cocta fuerit camomilla anetum sansuccus abrotanum & similia. q̄ si frigus fuerit forte quasi glacies epithima dorso fœmori & uentri imponatur cum calido oleo in quo cocta sint piretrum staphisagria nitrum piper & calamentum, dabis oximel cum calida in qua coctum fuerit anetum. Quod si non uenerit uomitus sponte prouocet cum oximelle de radicibus aut de aneto & apozimate raseolorum sale communi quē omnia calida accipiātur. Si egestio fuerit constipata dabis suc cū lupini cum carpobalsamo croci hortēsis dra. 7. zaccarē. vnc. 1. q̄ si hęc nondum sufficerint clystere facies cum sc. croci malua coloquintida cētaurea fursure blera obsomog. sisameleō nitro sale. Dabis pisanum cum radicibus maratri apij & oximelle coctum. Si autem pisanum in aceto sitatē conuersum fuerit negabis illud, & da mel licratum in quo cocta fuerint spica mastix cum cinamomo. Quod si uomitus in initio morbi uenerit spontaneus nō costringas eum, sed si adeo augmentatus fuerit ut uirtus patientis pati eum nequeat constringe eum cum syrupo de fructibus aut syrupo mal. gra. facto cum menta. Accipiant hanc confectionem quē. Rec. thuris mastice ligni aloes ana. dra. 1. ciperi dra. 1. & sem. cardamo. drac. 2. sem. menta sicca. dr. 2. sem. mala gra. 8. drac. omnia coquantur in tribus lib. aqua usq; ad tertiam, & dabis potui paulatim. Alius. Rec. spice mastice an. dra. 2. gal. ligni aloes anisi ana. drag. 2. fac puluerem & dabis dra. se. cum odorifero uino. Si patiantur grauitatem capitis ponatur facies super fumum aqua cal. in qua cocta sint camomilla mellilotum & sansucus, caueant ab omni effusione lactis aut aliquarum rerum, nec capiti sunt imponenda olea, etiam nec capiti nec faciei nec toti corpori imponantur: quia materia febris est multa & uiscosa & oleū constipat poros, vnde nequit materia dissolui. Dietam accipiat hanc intra uidelicet ciceris, bleta. nō multum comedat ne stomacho aggrauato cibis non possit digeri neque multum subtili utatur dieta ne prae longitudine morbi patiens deficiat, sed si febris incipiat ad medium diē mane accipiat pisanum, incipiente uero rigore oximel cum calida sumat, cumq; febr. cessauerit comedat. Rursus si mane febris accesserit nihil accipiat, quousq; cessabit. Vniuersaliter quoq; dicimus ut inter cibum & accessione sex horarum fiat spacium, q̄ si uirtus patientis defecerit in ac

cienda pharmacia da causam suauiter attenuauam & mundificatiuam. uerbi gratia. Si materia fuerit hepatis uicina dabis rem hepar mundificatem. q̄ si fuerit in stomacho dabis ea quae stomachi sunt mundificatiua, sicut absinthium apozima de aloë hierapig. & his similia quemadmodum uideris materiam esse grossam aut subtilē. bona autem sunt cataplasmata aut epithimata calefactiua & dissolutiua in stomacho & hepate, sed tamen post mundificationem cum certissime noueris materiam esse dissolutam & liquefactam. Apparēte signa coctionis in urina inuatu thiriaca magna post uomitum. Si fuerit materia mixta cum cholera prohibere ea quae sunt calida, & dabis inuicem oximel & oxizaccaram, & inuicem mel ros. rodōzaccata & materia cum frigidis misceas. & quia huius febris est proprietates dolor stomachi, oportet stomachum confortari cum cataplasmatibus & epythimaribus quae sunt facta de mastice absinth. spica & amonito & his similibus. Quod si stomachus defecerit ut careat appetitu confortamus eum cum oleo nardino & absinth. Si duritiam splenis habuerit curetur cum medicina splenetico. Si patitur in stomacho frigiditatem uel acetositatem, mundificamus stomachum cum his pilulis eum de corruptis humoribus inanientibus. Rec. Keb. dra. hierapig. drag. 2. & se. succi eupatorii succi absinth. ana. drag. 2. fac puluerem & cum aqua calida tempera & pill. fac. q̄ si uis eas fortiores facere adde medicum scamonea & euforbij. Alius. Rec. hierapig. drag. 2. coloquintida interioris. drag. 2. euforbij nitri ana. drag. sem. tempera cum succo caulium siluestrium & adde dyagridij bellij gummi an. dr. 1. Alius ualens ad mundificandum stomachum de grossis humoribus & uentositate inflatiua. Rec. Keb. salis gemme ameos apij semi. zinzibe. piretri ana. drag. 2. piperis longi. drac. 3. turbiti. dra. 7. dyagridi. scrup. 2. penid. quantum omnes species, mel quod sufficit da. dra. 3. cum calida. Apozima radice ualens contra hanc feb. si sit dura & diuturna. Rec. radices maratri apij radice an. vnc. 1. ameos, apij eupatorii ana. dra. 3. bedegar. dra. 6. origani absinthi ana. drag. 1. spine egypt. cuscute ana. drag. 4. squinantia aristologiae rotun. ana. dra. 5. omnia coquantur in tribus lib. aqua donec ad unā redeat, deinde colentur. Apozima de eupatorio ualens contra hanc febrem cum est diuturna. Rec. eupatorii & succi eius ana. dra. 3. asari ameos apij ana. dra. 4. origani. dra. 2. absinth. dra. 3. se. fumiteria. drag. 4. lactis amigdalae amararum ana. drac. 4. omnia coquantur in tribus lib. aqua donec ad unam conuertantur, deinde colatum da potui. vnc. 2. Aliud. Rec. origani. dra. 3. ameos. dra. 4. zinzibi. piretri ana. drac. 2. sem. coriandri. drac. 3. ro. drac. 4. calamenti. drag. 6. liquiritiae bedegar ana. dra. 4. omnia in tribus libris aqua coquantur

tur usq; ad tertiam partem & colatum dabis potui. Troisci Gal. ualent. cōtra febres diurnas cum nimia frigiditate. Rec. laccæ. drag. 10. succi eupatorii. drag. 4. spicæ. drag. 7. asari arist. rot. an. dr. 4. longæ dr. 3. amig. amara. maratri apij anisi mentę. an. dr. 4. croci. dr. 2. hieræ pig. dr. 6. tempera omnia cum succo lupi. dabis cum mellicrato & succo maratri apij. Alius similiter ualens. Rec. anisi. dr. 5. amig. dra. 2. squinanti. dra. 3. hieræ pig. dr. 9. succi eupatorii. dra. 3. & se. maratri apij an. dr. 3. spicæ rosarum an. dra. 4. tempera cum succo maratri & dabis ad potandum cum apozimate radicū. Alius. Rec. aloes. dr. 3. coriand. dra. 3. calamentri. dra. 5. uuarum passa. enucleata. dr. 7. coquantur in tribus lib. aquæ ad tertiam & colatum dabis potui. Troiscus alius. Recipe spicæ asari ameos folii absinth. laccæ ana. drag. 2. anisi. dr. 6. succi absinth. succi eupatorii an. dr. 3. aloes lotæ. dra. 5. apij. se. drag. 1. & sem. omnia cum succo apij aut maratri temperentur troisci informentur. dabis eos ad potandum cū apozimate superiori. Quod si nimius in hac febre frigus fuerit, epythima supra dorsum frigore accedente imponatur cum oleo ubi cocta fuerint piretrum staphisagria piper calametum. Alius similiter. Rec. thuris masculi piperis piretri equale pondus. fac puluerem & tempera cū oleo ex quo vngas dorsum.

De hemitriteo & eius materia. Cap. XXXIII.

HAemitriteus nascitur de materia cholerica extra uasa existente, & phlegmatica intra uasa quæ utraq; in quantitate est æqualis. vnde Hipp. in primo libro epidimiæ, hemitriteus inquit non dimittit. quod bene dixit, quia una suarum materiarum est intra uasa. materia enim cum fuerit intra uasa non quiescit patiens, quia non habet interpolationem quamuis fuerit interpolas naturaliter, & quia hæc febris de duabus nascitur materijs contrarijs. i. phleg. & chol. fit in die tertianæ accidentium significatio commixta & molestatio se. valida, quia molestatio est de duabus feb. contrarijs. In die autem amphimerinæ si gna apparent simplicia & aperta, & molestatio febris est mollior & leuior quia vnus febris est. Quod si quidam sophistæ nos reprehenderint & dicant, si est hemitriteus feb. de duabus febri. cōposita. i. amphimerina & tertiana, & amphimerinus palam in eo apparet, eiusq; significationes satis patent, quare accipit nomen à tertiana & non ab amphimerino. Respondemus quia amphimerinus aperte patet sensui & non est necesse sibi nomen imponatur, sed tertiana quia est omnino occulta si non in eam careret omni modo & ipsa negaretur. Si iterum dixerint quomodo possumus noscere tertianæ materiam utrum sit extra uasa, & amphimerini materiam intra uasa.

Dicimus quia si frigiditas quæ solita erat in amphimerino non apparet & rigor tertianæ apparet intelligitur materia amphimerini esse intra uasa. Preterea cum hæc febris quotidie accidit cognoscimus eam phlegmaticam habere materiam & quia frigore caret & rigorem habet, cognoscimus ei cholericā materiam cōmixtā esse.

De curâ hemitritei. Cap. XXXIII.

HAemitriteus qui de cholerica & phlegmatica materia est, necesse est curamentum eius sit mediocriter inter rem calefactiuam & refrigeratiuam, & quia omnis commixtio aut est in potestate & actu æqualis uel inæqualis, aut una fortior est altera, oportet utraque huius hemitritei materia aut sit æqualis aut inæqualis. Si fuerit æqualis sit uera hemitriteus, cuius curatio sit cū rebus attenuantibus & dissoluentibus nullum frigorem aut calorem facientibus, sicut lupino maratri succo manna mel. zaccara rodozaccara ptisano cum oximelle. Quod si cholera fuerit maior sit facilius & leuior, quam curari decet cum rebus mundificatiuis & modicum refrigeratiuis sicut endiuia maratro rodozaccara uiol. & zaccara manna prunis ptisano cum oxizaccara & similibus. Si autem phlegma uidetur dominari sit hemitriteus molestior qui medicetur cū mundificatiuis & dissolutiuis & aliquatulum calefactiuis quemadmodum mellicrare cum aqua calida syrupo absinth. ptisano in quo cocta fuerint apij radix maratri radix anetum calamentū oximel. accipiat & troiscum de berberis omnia cum succo maratri & oximelle. sumat mel. ros. cum mastice aniso maratro & aqua calida. Si uideris materiam attenuari & moueri ut egredietur & signum coctionis in urina apparuerit, dabis pharmaciā suauiter solutionem facientem. & bonum est si post cibum uomitus prouocet, & diuētica tribuantur sicut troisci de absinth. & de lacca cum succo maratri endiuia & apij. Pill. ualentes. Rec. hieræ pig. calamenti ana. dra. 5. maratri anisi apij an. drag. 2. fac puluerem, tempera cum succo apij, dabis. drag. 2. cum tepida. Aliæ pill. similiter ualentes. Rec. hieræ pig. calamenti ana. drag. 5. maratri anisi apij an. dr. 2. succi absinth. succi eupatorii ana. drag. 3. tempera cum succo sumitæ & fac pill. dabis potui dr. 2. cum aqua calida.

De tetratæo. Cap. XXXV.

TEtratæus nascitur de chimo melancholico, cuius materia aut est putrefacta, aut non putrefacta. Non putrefacta aut est in toto corpore, aut in uno membro coarctata. Si fuerit in toto corpore nigram generat ictericiā quæ sit ex defecione splenis sanguinis feces ab hepate trahere deficientis,

deficientis, quæ si fuerit in uno membrum durum generat apostema quod uocatur scilicet. Si fuerit putrefacta, aut est in uno membro, aut in toto corpore. Si sit in uno membro generatur cancer membra comedens. Si fuerit in toto corpore, aut est intra vasa aut extra. Si est intrinsecus facit quartanam sine rigore neque interpolatur. Si fuerit extrinsecus est cum interpolatiōe quā intelligimus tribus modis. i. re naturali non naturali & re extra naturam. De re naturali sic cognoscitur, quia plurimum accidit quibus frigidi & sicca dominatur complexio, cuius ætas est senectus a. 35. ad 40. annos maxime si fuerint calidi, & sicci, venē eorum angustē & occultē, & aliquando fit calidas & siccas habentibus complexiones accidentaliter, quia chol. nig. non inuenitur nisi in frigidas & siccas habentibus complexiones naturaliter, & eis quorum complexiones fuerint calidē & sicca accidentaliter, quia grossi chimi si fuerint in corpore calido & sicco clausi, & morantur ibi vruntur ex corporis calore eorumq; humiditates, deficcantur & mutantur in choleram nigram. De re non naturali sic cognoscitur, nascitur enim in temporibus frigidis & siccis & in eis qui sunt frigidi & sicci naturaliter, & diēta similiter frigida & sicca. similiter in regione & aere simili modo existentibus. De re extra naturam sic cognosci conuenit, quia hæc feb. cum incipit magnus patienti euenit rigor laboriosus & ossibus fractura, frigiditas & grossities materiei currens ad sensibilia membra aggrauat nimium membra frangens ac diiungens & longo in eis moratur tempore, non enim cito vratur quæ cum incipit vri non nimium facit calorem, sed disturbat corpus propter materiam naturę laborem facientem & aliquando materię natura dominatur & quiescit infirmus, & aliquando morbus naturę præstat, vnde patiens molestat. Calore autem febris ad summam accendit mutatur color eorum in plūbeum & nigrum colorem, cumq; febris mitigatur color eorum fit plumbeus aut sulphureus & cutis eorū fit sicca & dura, causa est siccitas chol. nig. Et sicut tertiana proprie facit dolorem capitis & hæpatis, amphimerinus dolorem stomachi, sic & tetratē dolor & duritia splenis sequuntur proprie. causa est siccitas & grossities materiei. Hæc autem feb. 24. ho. moratur & quiescit. 48. Cum autem feb. cessauerit & durities materię patiens quiescit nihil mali sentiens quia materia quasi ad cinerē uertitur. vnde nihil suæ humiditatis in corpore permanet qua calor nutritur; quia humiditas semper est caloris custodiriua in corpore, est enim suum nutrimentum. hoc testificatur, quia extrinsecus ignem uidemus sic ca comburere ligna & ea ad cinerem perducere, sed si uiridia incenderit in eis suum calorem optime uidetur seruare. Pulsus in hac feb. in initio

est paruus tardus & occultus, in ultimitate autem morbi fit magnus & plenus. Causa paruitatis & tarditatis pulsus est in initio frigiditas materię grossitudo eius. Causa magnitudinis & plenitudinis in ultimitate est fortitudo motus materię motui repugnantis. Vrina in initio febris est alba subtilis aquosa & cruda, sed febre ad finem veniente fit nigra. Causa albedinis est cruditas & grossities materię. Claritas & subtilitas duobus modis sunt. Vno propter siccitatem materię, alio quia propter suam grossitiem uiæ oppilatur, vnde prohibetur grossitudo liquoris vrine ne egrediatur, sicut feces uini. prohibent vta colamento exeat, proinde exit clarum & subtile. Causa nigredinis vrine in fine huius febris fit propter naturam digerentem & subtiliantem materiam & expellentem eam cum urina. vnde perfectam significat crissim, sed tamē vrina est diuersa in hac febre, quia materia huius febris est diuersa. Est enim quædam quæ fit de incensione sanguinis, est & alia nascēs de aduisione cholere, est & quædam quæ generatur de incensione phlegmatis. Causa huius diuersitatis est, quia humores cum fuerint, incensi & commixti generant febrem erraticam & commixtam, quæ cum sit diuturna deficcatur & in quartanam conuertitur. verbi gratia si quidam patitur tertianam in ætate & suum transferit terminum subtile suæ materię dissoluitur nunc cum vomitu nunc cum sudore & modo cum egestione & pars permanet grossa, vnde ueniente autumno & natura temporis ad melancholiam mutata, illam materiam ad suam conuertit naturam & nascitur quartana. Eodem modo sanguis si putrescat & generet febrem atque splē. deficiat ad attrahendum fecem sanguinis ab hæpate, permanet cum sanguine mixtus, & totum corpus perambulans generat febrem si putrescit quæ est indefinita cuius tempus non potest determinari, intrante autumno mutatur in quartanam simili modo intelligitur de phlegmate, phlegma etiam magis omnibus est conueniens ad mutandum se in choleram nigram quæ est in frigiditate & grossitudine. hæc ergo fuit diuersitas vrine & pulsus in hac feb. scilicet propter diuersitatem suæ materię.

De febre quartana & eius cura. Cap. XXXVI.

Quartana febris quia fit de materia grossa & dura ut perfecte curetur oportet medium inuestigare & considerare curam eius & præuidere quatuor res, quarum una est, in initio non detrem nimium calefactiuam ne calefaciat materiam & inde duæ febres generentur, vna uidelicet interpolata & diuturna, & alia acuta & continua, quibus uirtus patientis deficiat & ipse infirmus subeat periculum. natura enim non tan-

ta virtutis est ut possit morbi acumen eiusque prolixitate tolerare. Secunda ne det frigida ne coagulent & materiam coagulent. vnde induretur & moretur ad digerendum, fiatque causa prolixi morbi & eius pessimitatis. Tertia ne consumat aut debile faciat corpus cum subtilitate diete & abstinentia, quæ causa faciat mutare patientem ad hecticam & phthisim. Quarta ne confundat corpus cum pharmacia & maxime in initio morbi priusquam materia morbi eliquetur, & sit inobediens actioni naturæ. Sed oportet medicum magnum habere studium in sua actione ut det rem maturantem & digerentem & cito eiicientem, & ingeniet purgare catamodicum materiam cum leui vomitu, studeat etiam in regimine & confortatione splenis & hepatis, quia hepatis generat sanguinem & mundificat eum. Quod si de fecerit eumque non purificauerit, permanet commixtus cum putridis humoribus, vnde ipse putrescit & incenditur. Splen autem quia trahit fecem & turbiditatem sanguinis si defecerit permanens fixus in sanguine corrumpitur, vnde idem sanguis putrescit & incenditur. Hac de causa utilissima huius febris hæc est curatio vt detur oxizaccara cum apozimate radicum & herbarum & syrupo absint. trosciscus de eupatorio & scolopen. & de rheubarbaro. Oportet etiam ne troscisci in initio dentur ne desiccant humiditatem materie, & induretur ad obediendum naturæ, sed conuenit dare postquam materia fuerit maturata. Abstineant a pullis gallinaceis starnis perdicibus per tres hebdomadas initiatis febribus ne cum viciuositate carnis calefiat & vrat se, quia viciuosus in se, est quasi oleum in lucerna. Quod si materia non fuerit maturata per illas tres septimanas abstinentiam habeat usque ad 40. dies, si virtus patientium pati valeat. Et quia hæc fe. de humorum incensione generatur, sanguinis phlegmatis & cholerae rubrae oportet discerni de horum quoque humorum sit generata ut putetur prout oportet unde inuestigetur utrum ante hanc febrem fuerit sanguinolenta fe. aut sanguinei morbi, aut complexionis infirmi dominetur sanguis & uene eius sint plenæ pulsus latus spissus urina rubra & spissa & in ore eius dulcis sapor tempus ver aer calid. & humid. somnus patientis grauis sitis parua patiens mansuetus & pacificus, intelligimus enim fieri de sanguinis incensione. Quod si hæc fe. tertiana antecesserit aliusve cholericus morbus & patiens fuerit iuuenis macilentus cholericus pulsus acutus & neloxy urina rufa & ignea sitis nimia & uigilie iracundus & intolerabilis tempestas & aer & regio calida & sicca, intelligimus eam esse de incensione chole. rub. Quod si amphimerinus præcesserit aut phlegmaticus, morbus, & patiens senior fuerit & pinguis complexio eius frigida & humida pulsus latus & tardus urina grossa & cruda somnus grauis sitis par

ua tempus hyems aer & regio frigida & humida & pluuia fuerit multa, cognosce eam de incensione phlegmatis fuisse natam. his itaque signis quartanae diuersitas sensui facillime patet. Igitur si certissime noueris eam esse de vitione sanguinis da in initio rem attenuatam & dissolutiuam & tamen non calefacientem sicut prisanum cum oxizaccara rodozaccara viol. zuccara cum aqua calida uomitum prouocabis. in initio accessionis cum frigus inceperit infundatur pedes eius in aqua calida in qua cocta sint camomilla & uioia. accipiant succum maligra, & uas hyemales. Quod si materia incipiat digeri festinanter sanguinem detrahi conuenit de basilica uena sinistri brachij aut de media, & minue quousque uideris clarum sanguinem egredi uirtute hoc patiente, prouoca ergo egestionem si necessaria est hoc cathartico quod Rec. mirabol. citri. chebul. iuiub. pruna uas passas enucleatas se. fumiterræ casia fistul. mannam rodozaccaram radicem apij & endiuia. Quod si febris elongabitur ut uicesimum transeat diem ieiunet infirmus per omnem diem accessionis & alio die non multum comedat, quia sanguis propter abstinentiam attenuatur utatur dieta subtili, quæ facillime egrediatur. Quod si quartana de incensione cholerae rubrae fuerit, dabis in initio adiutoria refrigeratiua & attenuatiua, quia materia propter calorem ingrossata non attenuatur nisi cum frigiditate, proinde dabis succum maligra. cum oxizaccara & prismo. Quod si coctipata fuerit egestio humefiat cum manna rodozaccara prunis endiuia casia. Quod si nondum per hoc fuerit humefacta caue ne donec catharticum priusquam materia digeratur sed fac clystere. Quod si materia inceperit digeri & de loco in locum moueri, purgetur cum cathartico de mirab. citri. chebul. oxifenicia prunis eupatorio viol. casia fistula manna rodozaccara absinth. cuscute se. fumi terræ & radicibus endiuie. Quod si materia fuerit intra uasa & purgaueris bis vel ter cum hoc cathartico bonum est si minuatur sanguis de basilica uera sinistri brachij cauendum tamen est ne fiat antequam materia digeri incipiat. in fine autem morbi lanetur in aqua tepida in qua cocta sint camomilla mellilorum absinth. yngantur cum uino odorifero mixto cum oleo ro. galamo aromatico temperatis omnibus cum succo maratri. comedant maligra. uas hyemales melones palestinos & similia. Quod si dolorem capitis patiuntur humefiant nares eorum cum oleo uioli. si uigilias habuerint lauentur pedes & crura aqua in qua cocta sint papauer lactuca viol. & similia. Quia si de incensa fuerit materia phlegmatica dabis in initio mel ro. & viol. cum calid. Apparente autem coctionis signo da succum maratri apij cum se. croci hurtenis & succo lupini. Si egestionem vis humefacere clystere fac de ficibus succis spinis

egyptiacis camo. se. croci hortensis sisamelcon oblomoga. zaccara nitro sale communi colom. quintida & his similibus. Epithima facias cum oleis calefactiuis humectatiuis & aperitiuis. nu triantur de iure cicercis & lactu. Quod si feb. 40. dies transierit accipiant carnem, sed tamen car nem caueant viscosam & unctuosam ac multū pinguedinis habentem abstineant in die acces sionis a cibo, in die tranquilla accipiant cibum assuetum, & tamen non multum caueant se a fri gidis & humidis, potent subtilē uinum in calore temperatum, de auibz comedant eas quz tene ras habent carnes & facile digeruntur, uomitus prouocetur & post cibum sumat diaciminum diatrion piperem. statu autem accedente & co ctionis signo in urina alijq; apparente subtilie tur dicta purgetur cū pharmacā & clysteribus. dabis etiam diuretica. & uomitum omni die ac cessionis stomacho inanito prouocabis in die qua non uenerit accessio prouocetur uomitus postquam comederit. abstineat a pullis & om nibus per tres hebdomadas & plus donec dige sta fuerit materia; deinde si uirtus permiserit da bis annuale agnū ei. Quod si febris nō fuerit fori tis neque uirtus defecta da helleborum albū, & prouoca uomitum eū succo aneti radieis & oxi melle, & assuefaciāt thyracā magoam diateseron dia sulphur & his similia. Trocisci ualen tens contra hepatis dolorem & splenis & febris quartanæ. Rec. laeç reubarbari ana. drag. 4. eu patorij absinth. succi amborum pondus equale spodij ana. drag. 3. cuscute. dra. 6. scolopendrię drag. 5. semi. portulacę spice anisi apij se. ana. drag. 3. maratri. drag. 4. croci piperis. ana. drag. 3. ro. se. maligra. capparis radieis ana. drag. 3. tē perata cum succo apij. Alij simili modo ualen tes. Rec. succi eupatorij scolopen. ana. drag. 10. laeç aristol. longe. ana. drag. 2. spodij. drag. 5. se. cucumeris portol. ana. drag. 6. maratri. drag. 6. troci. drag. 4. piperis alb. drag. 3. tempera cum succo apij & da potui cum oximelle. Alij con tra quartanam quæ sit de incensione phlegma tis. Re. myrrhę. drag. 7. spice. drag. 6. amomi. dr. 4. aristol. ro. rheubar. ana. dra. 6. opij. drag. 4. ani si apij se. petrosil. ana. vnc. 1. castorei. dr. 5. squi nanti piperis alb. casielig. ana. drag. 4. piperis ni grame. ana. vnc. 1. storacis. drag. 6. croci. drag. 10. melliloti drag. 3. fiseleos drag. 4. ydiocri dr. 5. mell. quod sufficit. dabis dra. 1. & se. cum cali da. ydiocri. Rec. florum herbę policarię albę & ci trinę myrrhę ana. drag. 2. dauci calami aro. cipe ri xilobalsami asari ligni aloes ana. dra. 4. ruber costi spice croci masticeis ana. drag. 5. tempera cum uino odorifero & fac trociscum. Alius si mili modo ualens. Rec. myrrhę. drag. 17. spice. drag. 18. croci. drag. 6. castorei anisi an. drag. c. amomi. drag. 4. apij. drag. 12. squinanti. dra. 17. gummi mal. gra. drag. 5. fiseleos. drag. 4. ydio

crum. drag. 4. mel. quod sufficit. Diacostum ad quartanam & ad supradicta ualens. Rec. cina momi aliptę spice casie lignę costi an. drag. 4. myrrhę squinanti succi eupatorij anisi apij asari an. drag. 7. reubarba. aristol. ro. croci an. vnc. 1. absinthij. drag. 5. mel. quod sufficit da. drag. 1. cum aqua cali. Alius simili modo ualens. Rec. ameos. drag. 10. piperis nigri. drag. 3. zinzibe. drag. 4. asari. drag. 5. calamētri. drag. 10. casie. drag. 8. spice. drag. 10. carui. drag. 7. anisi. drag. 7. masticeis. drag. 6. maratri. drag. 4. mel. quod sufficit. Pill. utilissime. Rec. hiarapi. epichimi an. drag. 5. agari. drag. 4. turbit. dra. 6. absinth. drag. 3. sulphuris albi salis ameos ana. drag. 4. polipodij. drag. 4. maratri apij anisi an. dra. 10. sem. tempera cum succo mente & fac pill. qua rum. drag. 2. cum calida dōnentur in dietran quilla. Trocisci. Rec. croci. dra. 2. sulphuris. dra. 3. casie lig. se. costi. spice an. dra. 3. castorei myr rhę an. drag. 1. & se. rutæ amomi. drag. 4. opij. drag. 3. se. papauę. drag. 6. sigie anisi an. drag. 3. succi liquiritię. drag. 6. tempera cum succo apij dabis ad potandum cum calida tribus horis ante accessionem. Apozima ualens contra quarta nam de phlegmatica materia natam. Rec. squi nanti ameos an. drag. 4. calamētri carui apij se. anisi an. drag. 6. succi eupatorij. drag. 6. absinthij cuscute an. drag. 6. origani. drag. 7. vnz. passæ. vnc. 2. omnia in tribus lib. aqua coquantur ad tertiā & colatis ad dimidiū libram potui dabis.

De epiala. Cap. XXXVII.

E Piala est febris qua corporis interiora incen duntur & exteriora infrigidantur, quia eius ma teria est phlegma grossum & vitreum. cuius quę dam pars est putrefacta, quædam minime. Pars autem quæ putrefit generat febrem, altera autē quæ est imputrefacta facit cōgelationē cum sua natura. Causa quare non putrefit eius grossitu do est & duritia materię, quia phlegmata non naturalia sunt quatuor, vnum dulce, secundum falsum, tertium acetosum, quartum vitreū. Dul ce uero est uicinum naturali, sed tamen modicum est calidum propter suam dulcedinē, non enim est aliud nisi sanguis non perfecte di gestus, proinde natura cum naturali indiget phlegmate habet dulce in vice eius & digerit il lud cum sanguine & emollit eum eo membroru cōcūritatem & concatenationem, ut facile mo ueantur, illud etiam expulsiuę uirtutis facit esse materiam. Salsum uero & acetosum sunt in sto macho. Causa enim eorum aut est calor extra neus stomachi complexionī dominās, aut nimia frigiditudo, quia phlegma naturale ad stomachū ueniens ad mitigādum & confortādum expul siuam uirtutem si in stomacho extraneum inue nerit calorem calet & in salsum conuertitur, &

extraneam reperierit ibi frigiditatem deficit calor naturalis & sua augmentatur frigiditas, unde in acetositatem mutatur. Causa autē falsum in duobus modis est, aut est putredo phlegmatis calefaciens naturale illudque conuertens in aciditatem. unde fit falsum, aut est nimius calor phlegmatis humiditatem desiccans qua de re suam amittit saporositatem & conuertitur in falsum. Similiter causa acetosi phlegmatis duobus modis est, aut est frigiditas, aut calor, quia frigiditas si aquositate sanguinis dominetur prohibet eum ne ad coctionis perfectionem veniat. unde cum suam actionem complere nequiverit neque in sapiditatem venerit eius aquositas permanet subtilis, proinde cito mutatur in acetositatem sicut videmus frigidum aerem in musto operari cum paruitatem habet dulcedinis, quia mutat illud in acetositatem. Calor autem si sanguinis aquositatem inuenerit inspidam & inunquosam, quandam in ea facit ebullitionem & conuertit illud in acetositatem, sicut calor solis & aeris in aqua mellis & musto facit cum dulcedo eorum fuerit parua unde eam enim calefacit & excoquit, quia in eis tanta non inuenitur dulcedo ut custodiat eorum humiditatem, mutatur in acetositatem. Eodem modo videmus calorem aeris agere in priscana & lacte, cum non in eis tantam inuenerit dulcedinem ut sua custodiatur. humiditas conuertit eam in acetositatem. Phlegma autem vitreum grossissimum est & viscosum, quia causa eius nimia est frigiditas naturali dominans phlegmati, unde ingrossatur & fundū eius fit quasi liquidū vitrū. Proinde non posuit illud natura in regimento corporis, propter eius duritiem actioni naturæ inobedientem. vñ non naturalis calor cum ad illud uenerit nequit illud omnino putrefacere, sed partem eius quæ facilius est putrefacit, aliam putrefacere non ualet. Ideoque in hac febre interiora corporis calent & exteriora frigent, quia partim phlegmati interius existenti calor extraneus accidit, cui quia ipsa obediens putrefacit eam. pars autem circa corporis exteriora habitans, quoniam illi non obedit calori non putrefcit, sed in sua constat natura, unde naturaliter generat frigiditatem. Amphimerina autem differt ab epiala, quia tota materia amphimerinæ putrefcit. unde calor eius totum corpus circumdat. Epialos non est huic similis, quia tota non potest putrefieri interiora calefacit & exteriora infrigidat. Hæc etiam se. aliter ab amphimerina differt, quoniam urina in ea crudissima est & albior quam urina quæ apparet in amphimerina. pulsus similiter est paruus & debilis plus quam in amphimerina, & aliquando cum materia epialos melancholica miscetur materia, unde sua augmentatur grossitudo & eius confortatur ponderositas, suusque motus fit tardus, quia aliquando de. 5. in. 5. mouetur, & ali-

quando per. 7. nonnunquam per. 10.

De liparia. Cap. XXXVIII.

Febbris autem liparios causa est de cholerica materia incensa mixta cum vitreo phlegmate aut cum melancholica materia. unde conuertitur & à natura cholerae egreditur, quæ differt ab epialos, quia illa interiora corporis calefacit & exteriora infrigidat vsque ad corporis extremitatem & oppilans pororum foramina prohibet ne fumus dissoluatur, & accidunt patienti nimia sitis & linguæ asperitas propter calorem in corporis interioribus dominantem, sed in liparios omnia sunt contraria, quia interiora sunt frigida & exteriora sunt calida. Causa quia cum materia eius sit composita de melancholico & phlegmatico humore, chol. rubea uero licet incendatur & ingrossetur, diuiditur tamen extra corpus & calefacit illud exterius, vitreum autem phlegma & melancholicus humor naturaliter sunt ponderosi coadunati & iuncti. unde in corporis interioribus una sunt accumulati, qui quoniam in interioribus existunt, & tamen non putrefiunt necesse est ut interiora infrigident. Quod si quidam sophistæ nos reprehenderint de hæmitriteo dicentes, quare non interiora calefiunt & exteriora infrigidantur cum materia huius febr. sit cholerica & phlegmatica. Respondemus phlegma in hæmitriteo est leue & mobile, unde facile obedit extraneo calori & putrefcit & calefit, sed in liparios materia phlegmatica est dura, quia phlegma vitreum est putredini inobediens, proinde interiora naturaliter infrigidat. Rursus si dixerint si in liparios cholerica materia cum fuerit incensa calefacit exteriora interiora minime, quare in tertiana non simili modo agit cholera. Respondemus cholera rubea in tertiana est simplex non ut cum alia materia sit mixta, quæ quia est simplex equaliter suam operatur actionem interius & exterius. In liparios vero chol. cum phlegmate est mixta, unde cholera prohibetur actio in corporis interioribus, & fit ibi naturaliter frigiditas. Si iterum opposuerint quare vitreum phlegma in liparios non generat fe. sicut facit in epiala? Respondemus phlegma quod est in epialos licet sit frigidissimum & durissimum, tamen non in toto est equale, proinde cum extraneus calor ad illud uenit partem eius liquidam & putrefactioni conuenientem calefacit & putrefacit. Aliam uero duram & putredini inobedientem putrefacere nequit, in epialos uero phlegma est frigidissimum & durissimum & totum æquale. Idcirco extraneus calor non ualet ad eum accedere, neque illud conuertere ad putredinem.

De cura epialos. Cap. XXXIX.

E pialos quia de uitreo phlegmate nascitur necesse est ut curetur sicut amphimerina, sed tamen phlegma quod est in epialos quia est frigidus, oportet fieri medicinam eius calidiorem secundum quod materia eius fuerit frigida, sed decet ab initio incipi a medicinis quae debiliter sunt calefacientes donec eas natura assuefaciat, deinde paulatim ad calidiores ascendi quousque; ad illam caloris quantitatem ueniat in qua nostra fuit intentio. Plurima nostra intentio est in hac febre. ut mundificetur stomachus cum re purgatiua mundificatiua & colatiua, purgetur materia per uomitum & urinam cum oximelle & aqua calida, in qua cocta sint spica anisum & similia. Quod si materia inceperit se mouere & signum coctionis in urina apparuerit, purgetur materia cum apozimate de aloë & apozimate de hierapicra, pilul. stomaticis & pilul. de fetida, clystere fiat eis in quo intrauit se. croci hortensis centaurea anetum abrotanum herba polycaria ameos bdelium serapinū coloquintida & his similia. Post purgationem materiae assuefaciant antidotum ubi asa & castoreum ponuntur, & pilul. in quibus eupatorium mastix absinth. aristol. ro. spica crocus & similia intrauerint. Dietam accipiant quae sit lauatiua & diuretica sicut est ius cicercis cum obsomogaro & cimino & amigdaleon bilitis radicibus sparagis porris omnibus coctis & cum obsomogaro coctis. potent oximel squillicum cum aqua. accipiant post cibum diaciminum, diatrion pipereon, diacalamentum & his similia.

De cura liparia. Cap. XL.

L iparios autem, quia materia est phlegmatica cum cholera mixta, dari oportet minus calida quam in epialos sicut mel ro. & oxizaccara apozima de aloë hierapigra & oxizaccara cum succo maratri apij anisi masticis & similibus.

De causa diuersitatis febrium adinuicem interpolantium. Cap. XLI.

Quia compleuimus quicquid uoluimus dicere de humorum putredine, oportet nos explanare causam diuersitatis febrium adinuicem interpolantium, & quare quaedam non habent tranquillitatem, licet parum quiescant quod non oportet sensui, & quare alia. 18. horas teneat & sex dimittat. Alia etiam. 12. horis moueatur. & 36. quiescat. & alia. 24. habeat commotionem, & 48. requiem. Et quamuis superius in tertiana uidelicet, de hoc disputauimus, placet tamen nobis illud repetere ut firmus sit annexum memoriarum. unde dicimus causam esse duobus modis.

Vnus qualitarum elementorum est diuersitas suarumque actionum. Alius sunt quantitates & qualitates materierum. Ratio & sensus elementorum natura demonstrant qualitates esse quatuor, calorem, frigiditatem, siccitatem, & humiditatem. Humana enim corpora non uideamus mutari neque conuerti nisi ad eas, & non sanari neque restaurari nisi per eas. Quod si alia quinta esset in nostris corporibus absque his quatuor necessario ad eam mutarentur sicuti ad istas conuertuntur. Necesse etiam esset exhiberi aliam qualitatem isti quintae contrariam uicem ista curarentur & restaurarentur, quia medicina non est aliud nisi repugnatio unus contrarij ad aliud contrarium, nos enim non inuenimus quod nostra corpora mutantur ac conuertantur nisi ad calidum frigidum humidum & siccum, neque sanari & ea restaurari non uidemus nisi cum calido frigido humido & sicco sicut Aripstod. dicit in quarta particula megacosmi, per contrarium inquit curamus & per similitudinem augmetamus. Quatuor ergo sunt qualitates neque plus neque minus. Oportet iterum intelligi quia de istis quatuor qualitatibus duae sunt actiue, scilicet calor & frigiditas & duae sunt passiuae, id est humiditas & siccitas, quia calor semper facit siccitatem, desiccatur enim humiditatem corporis, frigiditas enim facit humiditatem quia claudit & coadunat eam atque prohibet ne dissoluatur. humiditas autem & siccitas nihil faciunt in calore & frigiditate. Calor ergo & frigiditas sunt facientes humiditatem & siccitatem, & humiditas & siccitas sunt illorum passiuae. Unde miror de Ioanne Damasceno quare negauit calorem non facere siccitatem & arbitratus est ut intentio Arist. de calore siccitatem faciente taliter esset ut siccitas sit instrumentum per quod calor suam operatur actionem. & fecit huic similitudinem sensualiter cum dixerit quod ignis aquae cal. sit actiuus & aqua sit ei actiua passiuae & olla quae est sicca sit instrumentum & mediatrix aquae & ignis ut per eam ignis valeat calefacere aquam. Mihi autem uidetur quod non exercitauerit se in sermonibus philosophorum neque inuestigauerit eorum intentionem, non enim similitur sapientiae Arist. qui non intendit actiuam qualitatem facere in passiuam cum instrumento, quia actiua actiuae operatur essentialiter & naturaliter in passiuam, & instrumentum est continuum accedens adiutorium actiuae praestans actionem, olla ergo non est aliud nisi instrumentum aquam ne currat retinens & custodiens ut ignis in eam operari ualeat, quod si ignis non poterit illud facere sine mediatoribus & instrumento quo incendit oleum & eliquat ceram plumbum & multa alia corpora, nisi quia actio sua est naturaliter non cum mediatore instrumento. Ego autem non paruipendo scientiam & prudentiam Ioan. Damasc.

damaſc. & dico ſuā intētiōē nō eſſe ex ignorantiā philoſophorū uerborū: ſed ſpero ī hac dictiōe irēdiſſe ſicut rhetorici dūt ī litigatione dū īge niāt qualiter poſſint vīcere aliqū, licet nō cū ue ritate. Et quia palā intelligimus calorē & frigidi tatē qualitates eſſe actionis: & hūiditatē & ſicci tatē eē paſſiuas, debemus iterū intelligere quia ca lor fortior actiuus ē & frigiditas debilior: & ſic citas ē fortior paſſiua hūiditas at debilior ē. Inue nimus ē calorē citius & fortius facere in noſtris corporibus q̄ frigiditatē: q̄a frigiditas nō facit ī noſtris corporibus niſi poſt aliqđ t̄pis ſpaciū p̄ inde plus patimur frigiditatem niuiſ q̄ ignis calo rē. Siccitas at dicit̄ eē fortior paſſiua q̄a reperimus eā duriorē & magis repugnātē ad recipiēdū calorē uel frigiditatē q̄ ſit hūiditas, hoc teſtat̄ fer rū & lapis q̄ ſūt duriora & inobediētiora ad reci piēdū calorē uel frigiditatē q̄ aqua: q̄a hūiditas partē rei dilatat & mollificat, vñ iuenit caliditas viā ad p̄forandās ceteras corporis partes. veloci ter. Siccitas aut coadunat partē rei & eā indurat. vnde caliditas in eo uelociter nequit penetrare. Actiones iterum qualitatū in quodam cōcor dant & in quodam diſcrepant, inuenimus enim actiones caloris cū humiditatis actiōe eſſe cōue nientes ad mouendas partes rei ad exteriora, vi demus. n. dilatari & expandi ac aperi corpora cū ipſe ad exteriora eā dilatauerit. Actio. n. frigidi tatis dicit̄ cū ſiccitatis actiōe eſſe conueniens q̄a coadunat res & mouet eas ad centrum, & appo pinquant partes eorum adinuicem. Quod ſi qui dam ſophiſtæ nos in humiditate & ſiccitate re prehendant dicentes, quare ſiccitatem & humi ditatem nō dixiſtis eſſe actiuas cum dixeritis q̄ humiditas partem rei dilatat & eam ad exteriora extendat, ſiccitas & frigiditas coadunat nem & eam facit ad centrum mouere & in ſuperiori bus ex dictis Ariſto. dixeras actiones ab eis eſſe ablatas & eſſe paſſiuas. Reſpondemus Ariſto. non absolute abſtulit eas actiuas eſſe niſi in calo re & frigidityte, ſed inter ſe adinuicem uidemus habere actiones, quia uidemus humiditatē rē hu meſtare & dilatare & ſiccitatem coadunare ean dem; ergo Ariſt. non humiditati & ſiccitati actio nem abſtulit niſi ī calore & frigidityte, licet cali ditas & frigiditas ſint earum actiuæ. Inuenimus enim calorem humiditatem minuere & ſiccita tem augmentare & frigiditatē decreſcere ſiccita tem & humiditatem eſſe augmentatiuā: & minui tur frigiditas quia calor humiditatē deſiccāt. vnde qualitas eius eſt coadunatiua. vnde creſcere facit eā. hūiditas aut & ſiccitas nihil faciunt in calore & frigidityte. Palā ergo intelligimus quia in elemētis calor eſt fortior actiua & ſiccitas for tior paſſiua: eodem modo intelligimus quia calor & hūiditas dilatant & mouent rem ad exte riora: & frigiditas & ſiccitas coadunant & arcent eam ad interiora ipſius corporis patientis. quod

cum ita ſit neceſſe eſt vt quęcunq̄ materia ſue rit cōpoſita de actiua fortiori & paſſiua debilio ri ſicut eſt ſanguis: febris quæ ab ea naſcitur cōti nua eſt: uerbi gratia: inuenimus in ſanguine for tiorē actiuam. i. calorē & debiliorē paſſiuā. i. hu miditatem, & quia proprietas caloris & humidi tatis eſt dilatare & mouere rē ad exteriora ſit mo tio & dilatio huius feb. ad exteriora facilis & inuenit locū cal. vt eis actio ſemper ſit: quia ca. ſanguinis eſt febr. adunatiua. humiditas eius de ſecta eſt ad repugnandū calori: eſt ē dilatatio nē & ad exteriora motionē adiuuans: proinde fe bris quæ ſit de ſanguine eſt cōtinua. Et quoniā in cholera rub. eſt fortior actiua. i. calor: & fortior paſſiua. i. ſiccitas & proprietas caloris eſt dilata re & mouere ad exteriora & ſiccitas coadunat & mouet rē ad interiora huius feb. motio naturali ter īdurat neceſſario: & dilatio eius ad exteriora aggrauat. vnde calor impeditur ad continuan dā actionē ſuā: proinde at ipſe cū ſuo calore ope ratur & eius materia circa ſuas extremitates egre diſt per vnum diē repugnat eis ſiccitas ut nō fiat feb. cōtinuatio & tardat eā vſq; ad tertiā diem, & quia in phlegmate eſt debilior actiua. i. frigidi tas & debilior paſſiua. i. hūiditas & frigiditas eſt coadunatio humorū & motio chimorū ad ex teriora, & hūiditas propriē dilatat & cōmouet eos circa extremitates faciliorem neceſſe eſt hęc fe. habeat motū & dilationem & ad extremita tes eſt debilis. & q̄a cho. rub. debiliorem habet a ctiua. i. frigiditatem & fortiorem paſſiuā. i. ſicci tatem. & utraq; cōcordant ad cōſtringendū & re tinendū materiā intrinſecus hmōi fe. materia ne ceſſe eſt īdurat & tardat ad dilatandū ſe circa ex tremitates, p̄inde eius interpolatio ſit lōgior ſua acceſſione, quia non habet in cholera nigra ulla res calorem adiuuas, ut ad exteriora dilaret & q̄ uis nō inuenimus ī cholera nigra niſi utraq; qua litatem eā ad interiora cōmouentem ī ſui tñ groſ ſitudine ac grauitate motus feruens diu moratur nec cito extinguit̄. Ideoq; tempus ſuæ exacerba tionis ad comparationem aliarum putridarum febrium eſt lōgiſſimum & ad cōparationem ſuæ tranquillitatis eſt breuiſſimum. hoc teſtificatur uidemus enim lapides & ferrū licet tarde calo rem ignis recipiāt, tamē ſuſceptus difficile extin guitur, igne uero extincto nihil caloris in eis per maſſiſſe reperiſt, carent enim humiditate in qua calor adhærete ſe ualeat. Quod ſi quidam ſophi ſtæ nos reprehēderint dicentes, ſi utraq; qualitas cholera nigre intrinſecus ſe cōmouet, quō calor circa corporis exteriora dilatatur? Reſpōdenus diximus quia febris non naſcitur de materia me lancholica niſi cum à ſuā natura egreditur & pu treſcit, ſubſtantia enim eius eſt liquida licet ſicca ſit ī natura. vnde propter ſuum liquorem putre ſcit & febrem generat. Sed tamen febre circa exte riora corporis apparente ſi natura eius naturali

er sit calida, sit motus eius uelocior ad exteriora quam ad interiora. Sed si materia fuerit frigida, sit motus econuerso.

De diuersitate interpolatarum febrium propter qualitatem & quantitatem. Cap. XLII.

Diuersitas interpolata febris propter qualitatem & quantitatem materie multiplex est. Est. n. febris cuius materia multa est in quantitatem & temperata i liquore, & fortiolem habet calorem naturaliter & accidentaliter propter sui bullitionem ad putrefactionem sicut febris que nascitur de putredine sanguinis. Est & alia cuius materia subtilem & igneam habens calorem quemadmodum feb. que generatur de sanguine. Est & alia materia cuius est subtilissima & siccissima in natura & calidissima sicut febris que fit de putredine cholerae rubeae. Est iterum alia cuius materia est multa & grossa & humida accidentaliter habens calorem propter ebullitionem & putrefactionem sicut ea que fit de putredine phlegmatis. Rursus est altera que est pauca in quantitate grossa & sicca naturaliter liquida turbida habens accidentaliter calorem & propter bullitionem & putrefactionem non tamen eam sui natura quemadmodum febris nascens de putredine cholerae nigrae. Vnde cum feb. de multa oritur materia temperata in liquore & cal. naturaliter sicut synocha feb. adharet se materiei multitudo in liquoris humiditatem, quae de re accensio eius fit continua nullam faciens remissionem ab initio usque ad materie consumptionem, sed tamen huius febris consumptio plurimum breuius est propter suam materiam quae est facilis & obediens actioni & coctioni unde haec febris plurime in septem finitur, quae si septem transierit fit propter aliam materiam quae est sanguini comixta cum ingrossans & aggrauans, hac de causa prolongatur usque ad 14. aut. 14. diem. Causa uelocitatis hanc febrem dissoluens est propter sanguinem qui licet uelociter putrescat sua tamen essentia temperata est. vnde si accidentaliter est putrefactus naturaliter tamen est temperatus, proinde cito in suam conuertitur naturam. Sed alij humores non sunt huic similes, sumunt enim putredinem & calorem in quantitate & qualitate, sed sanguis non est eis similis, non enim putredinem suscipit nisi cum sola qualitate, qualitas enim eius calida est & humida & calida complexio ceteris complexionibus est temperatior. Quod si quidam arbitrantur ut augmentatio caloris & humiditatis sanguinis sit causa qualitatem eius corrumpens, peccant, hoc enim non est aliud nisi suae quantitatis augmentatio non qualitatis corruptio. nam sua qualitas non corrumpitur nisi cum solus cal. augmentatur & egreditur a natura sanguinis sitque cholericus aut augmentata eius humiditate fit phlegmaticus. Si calor eiusque humiditas aequaliter fuerint augmentata fit augmentatio quantitatis non corruptio qualitatis. Quaecumque aut febr. de

materia subtili fuerit & sicca & igneam habuerit calorem, naturaliter festinat calor in materia & facit quasi cinerem: & munda corpus a calore quia calor non inuenit humiditatem cui adhaerere se ualeat. hoc testatur quod uidemus in siccis & uiridibus lignis, sicca. n. cito uruntur & ad cinerem conuertuntur, sed in uiridibus alligatus ignis diu seruat. Quod si quidam sophistae nos reprehenderint dicentes, quomodo calorem seruat humiditas cum utraque sint contraria: & omne contrarium semper suo repugnat contrario. Respondemus humiditas repugnat calori priusquam calori operetur in ea, sed cum humiditas incipit pati calorem custodit ac seruat enim, quia regit materiam in qua calor operatur ne cito per eum consumatur, proinde quaecumque materia febr. fuerit sicca & subtilis sicut cholera incenditur ac consumitur uelociter fitque quasi cinis & cito eius calor extinguitur & tardatur sua reuersio, quia nihil prioris materiei in corpore permanet, ut uelociter calorem incipere ualeat, sed materia febr. si fuerit humida & grossa sicut phlegma suam tardat uisionem, quae uero cum pati incipit diu sustinet eam & tarde calor extinguitur propter materiam ei repugnantem, quomodo tamen extincto omnino corpus ex calore mundificatur, quia humiditas & grossities materiae regunt calorem in corpore. unde cito in secundam conuertitur accessionem. Calor. n. primae exacerbationis alterum adiuuat qui est de secunda accessione ut cito frigidescere incipiat, propter hoc mora huius febris triplex quae sua dimissio eius. n. accessio. 18. horis moratur, sed tranquillitas sex. Materia iterum si grossa fuerit & sicca sicut melancholia repugnat calori cum sua grossitudine, quae tamen recte incipiens materiam consumens conuertit eam quasi ad cinerem & mundificatur corpus ab illa, calor. n. caret humiditate qua custodiri ualeat propter siccitatem naturalem materiei. Idcirco huius febris reciprocatio tardatur, quia frigiditas materie sui que grossitudo non obediunt calori ut cito in ea annexi possint. corpus iterum de prioris accessione est mundificatum. vnde non permanet aliquid caloris per quod calor secundae exacerbationis adiuuetur, hac de causa tempus tranquillitatis huius febris est bis tantum quantum tempus suae exacerbationis, exacerbatio. n. 14. horis permanet, sed dimissio. 48. Quod si sophistae nos reprehenderint & dicant, quomodo febr. in materia operatur & consumit eam, & aliquando cito & aliquando tarde finitur propter subtilitatem & grossitatem materiae, cum nos uidemus naturalem calorem materiam digerere & eam extrinsecus expellere. Respondemus omnis cal. natural. uel. accidentalis necesse est habeat materiam qua nutritur, quod si non habuerit cito extinguitur. vnde nutrimentum caloris naturalis est humiditas sanguinis in arterijs existens sui que unctuositas & caloris naturalis materia in qua operatur sunt cibaria ea. n. excoquit & digerit & laudabilem diuidit chimum a non laudabili, & laudabilem mandat per totum corpus ut eo nutriatur. Illaudabilem

genero exterius expellit. Sed calor febris non est
huiusmodi. eius enim nutrimentum est unctio
sa materia per quam febris generatur sed subie-
ctum ubi operatur est materia unde febris nasci-
tur, quia nisi hoc esset naturale incenderet humi-
ditate & ea consumeret, quoniam impossibile est inueniri
calore absque materia in qua operatur. Ideoque mate-
ria cessante & ipsa cessat, & materia adhuc per-
manente & febris permanet. Palam ergo intelli-
gimus quia actio caloris naturalis in humoribus
corporis secundum quod oportet & prout necesse est ad
corporis regimen operatur, quod admodum in alijs lo-
cis diximus. inuenimus. n. calore naturale cibum
subillare & digerere atque mundificare eiusque se-
ces expellere per loca quae natura ad hoc prepara-
uit, sed calor febris operatur cum sua natura in ma-
teria quae est putrefacta per unamquamque; exacerbatio-
nem, ut eius humiditatem per unamquamque; exacerbationem,
consumat. Ideoque cessante materia transit febris hic
testatur quia videmus febrem periodicam quiesce-
re & incipere multis modis exacerbationem & in-
terpolationem, & nulla actio naturae in ea appet ne-
que in urina neque in alijs supfluitatibus. Rursus
si solutio materiei facta per unamquamque; accessionem
esset ex actione naturae, non fieret in prima nec in
secunda accessione, quia natura prius attenuat diui-
dit & digerit materiam, deinde eam expellit. Iterum
quia natura non facit accessionem nisi in die nun-
ciativa aut cretica ergo dissolutio materiae aphri-
merinae tertianae facta quacumque; actione in prima
exacerbatione vel in secunda non ex actione sed ex
calore febris non est nisi secundum ordinem ut prius atte-
nuet & digerat materiam & etiam diuidat, deinde ex-
pellat in die nunciativa aut cretica. quod si festinat
ante tempus aut tardatur nunciat malum eius. n. fe-
stinatio inuit acumen materiae suaeque; qualitatis
pesimitatem naturam inuadentis ut festinet ope-
rari ante suum tempus. tarditas uero significat ma-
teriae grossitatem & naturae pigritiam. Sed differentia
actionis horum calorum est hic, quia calor naturalis
prius digerit materiam, deinde eam per congrua lo-
ca expellit aut cum sudore aut cum vomitu aut cum so-
lutione aut cum urina, sed calor febrilis depascendo
consumit materiam cum suo nutrimento neque eam di-
gerit aut expellit unde materia cum fuerit expleta
& finita febris quia caret nutrimento extinguit do-
nec aliam inuenit materiam & eam urat, propter hoc
in initio morbi interpolatione febris eiusque; di-
missione patiens nullam sentit requiem nisi quie-
scante febre, quia natura nondum excoxit mate-
riam neque eam digessit.

De duplicatione & compositione febrium. Cap. XLIII.

Febbris quae fit de putredine humorum compo-
nitur & duplicatur multis modis, aut secun-
dum complexionem aut uicinitatem, aut se-
cundum compositionem, aut secundum perfe-

ctionem quia aliquando miscentur duae feb. in
una die & in uno tempore uerbi gratia, duplex
tertiana incipit in una hora & die & in una dimittit,
quemadmodum si in prima hora diei incipiat
& in fine diei dimittat. haec enim febris ut multum
12. horis mouetur. Et aliquando componitur duae
feb. ex diuersis materijs, una uidelicet cholera, &
altera phlegmatica, quae utraque; incipit in prima
hora diei, & dimittit cholera in fine diei, & phle-
gmatica in media nocte. Unde si haec fuerint com-
mixtae, & una materia fuerit intra uasa & alia ex-
tra, sunt significationes faciles ad cognoscendum
quae utraque; si fuerint intra uasa aut extra, sunt si-
gnificationes earum duae ad cognoscendum & obscu-
re praecipue si unius fuerint materiei, & in uno in-
ceperint tempore. Sed tamen qui intente & assi-
due in hac arte laborauit & in secretis antiquo-
rum exercitatus est earum significationes eos non la-
tent, quia si bene inuestiget uniuscuiusque; mate-
rie proprias significationes, & eas quae plurimae &
modicae contingunt omnino potest cognoscere. uerbi
gratia, quis duas patitur febres, unam cholerica
& aliam phlegmaticam, quarum si phlegmatica
fuerit maior sit rigor febris frigidior, extremi-
tates corporis manus uidelicet & pedes infrigidan-
tur, & augmentum atque; febris acumen uenire tar-
dantur, neque; patiens habet acumen aut sitim, sed
licet propter choleram sitim habeat, parua ta-
men sitis est, minori etiam molestia febris uexatur,
quam si utraque; materia fuerit equalis in quantitate.
Haec itaque; species febris cuius materia phlegma-
tica est maior non facit urinam multam tinctam aut mul-
tum acutam, nec patiens sudat nisi parum in fine actio-
nis & uomit phlegma. Quod si cholera pars fue-
rit maior, sit rigor fortior & frigiditas lenior sitis
& incensio maior, & accessus febris citior sudor
multus & urina tincta & acutior, & uomit chole-
ram. Quod si utraque; materia fuerit equalis in quantita-
te, haec significationes equaliter erunt, quod admodum si
rigor & frigiditas fuisset equalia. Augmentatio fe-
bris inter uelocitatem & tarditatem mediocri-
s & uomitus mixtus de phlegmate & cholera. quae
utraque; materia si fuerit intra uasa caret rigore ac-
que frigiditate ceteras tamen habet significatio-
nes febrisque; sit continua cuius significationes ac di-
uersitates poterit quis discernere sicut diximus.
Quod si una materia fuerit intra uasa & altera extra
rigor est ablatius ab ea quae constat intrinsecus
& permanent illarum significationes prout
ostendimus, sitque febris quasi continua, sicut
uideamus in hemitriteo qui est de phlegmate
intra uasa existente & de cholera quae est extra
cum fuerint equalis in quantitate & qualita-
te, proinde est quasi continua sicut hipp. in pri-
ma particula epidimiae epmitriteus inquit nun-
quam dimittit. quod gloriosissimus hipp. sapienter
& uere dixit, quia materia cum fuerit intra uasa,
licet naturaliter sit interpolans, non tamen quie-

scit. quæ se. quia de phlegmatica & cholericâ cōponit materia & secundum phlegma sit cōtinua secundum cholera uero. una die dimittit & una minime si fuerint significationes diei ad triteū p̄tinētes cōposite de tertio in tertiu & amphimerino, sitq; sua molestatio sicut ea quæ sit de diuersis materijs In die aut̄ āphimerini significationes simplices apparēt & se. lenis. Hoc itaq; mō oportet intelligi duas se. de vna materia uidelicet cholericā & phlegmaticā, quia significationes ostendunt eas duplices esse demonstrantes. Eodem quodam modo cognoscimus si quidam habuerit tertianam continuam & quartanam interpolatam, quia necesse est ut à tertiana rigor sit ablatas. Est enim intra uasa cum sanguine mixta, & à sensibilibus membris longinqua & ceteræ significationes permanent commixtæ cum quartana, unde de signis tertianæ urinæ apparet vltio sitis cholericus uomitus acutior urinæ pulsus fortitudo & uelocitas & cita febris accensio. De signis autem quartanæ ostenduntur tremor nimia frigiditas granitas & fragmentum carniū & ofcium, quia grossities & granitas materiæ frangit membra & permanent signa tertianæ, 12. horis. deinde signa quartanæ sola apparent sine illorum commixtione & morantur quousq; eorum tempus finitur quod est 24. horis. hac itaq; decet mensura inuestigari significationes febris, ut in propatulo eius certitudo appareat, & omnis ab eo dubietas transcat. Complexio autem est coniunctio duarum materiæ diuersarum in una febre, sicut est liparios quæ est commixta de cholericâ materia cum uiscoso phlegmate, aut cum melancholica. Compositio uero sicut cum duæ febres componuntur secundum uiciniam & persecutionem in duobus temporibus una sequens aliam, horæ tamen earum sunt commixtæ. i. cum prima cedit altera incipit, & earum significationes ordinatim apparent, proinde hæc febris non habet obscuram significationem. Aliquando tamen materia utriusq; febris in diuersis locis corporis permanet, sicut cum materia est in splene dicitur quartana, & ea quæ constat in stomacho dicitur amphimerina. Præterea aliquando utraq; materia est in uno membro sicut materia tertianæ & quōdianæ in stomacho existens. Nonnunquam duæ febres fiunt de una materia, sed tamen propter eius duritiem & grossitiē partim minime. Partis itaq; quæ putrefit eius calor ostenditur, sed ea consumpta secunda incipit putrefieri, & calor eius apparet. quæ utraq; febris ex suorum accidentium facilitate cognosci potest. Sed tamen nonnunquam tres febres coniunguntur sicut diximus, quæ sunt aut secundum commixtionem aut secundum compositionem. Quatuor autem febres impossibile est coniungantur, nisi cū duæ unius fuerint materiæ &

duæ alterius. verbi gratia, sicut si fuerint duæ febres de cholera & duæ de phlegmate, tertia de cholera, quarta de melancholia. Sanguinis autem significatio impossibilis est cum aliarum signis appareat, sanguis enim plus ac abundantius in corpore est toto quàm omnes alij humores, qui si putrefit & febrem generat operit omnes febres quæ cum ea sunt commixtæ propter multitudinem suæ quantitatis & obscurat earum significationes, quia de omnibus rebus fortis debile denigrat & multum paucum, quod testatur lumen solis lumen ignis operiens, unde Hippo. in apho. duorum dolorū in uno loco factorū unus denigrat alterum. intendit Hippo. ut maior obscuraret minorem ut sensui non appareat, & dicit unum locū propter uiciniam locorum utriusque doloris qui sunt quasi unus locus, sicut temporā oculis & caninis dentibus uicinantiā. Palā ergo intelligitur, quia sanguis ceteros humores putrefactos si cum eo mixti fuerint obscurat, neque sanguis est causa alterius febris, licet aliqua febris sit causa alterius sanguineæ febris, quia aliquando putrefit cum propter alios humores putrefit & calefit, neq; ipse alios calefacit humores, eius enim complexio temperamento uicina est, proinde si putrefit & calefit non multū à temperamento egreditur, sed ceteri humores in naturali eorum cursu existentes sunt ultra temperamentum, quantomagis cum cursum egrediuntur suum.

De febre accidente propter dolorem hepatis splenis uel alterius membri. Cap. XLIIII.

Aliquando est febris propter hæpatis dolorem aut splenis cerebri lateris pulmonis renum & si miliū, & cessante morbo qui est causa febris cessat & ipsa, unde utilis est eius curatio ut certissime causa eius curetur. i. sanetur membrum cuius occasione febris generata est. Sed prius oportet intelligi quia febris quæ alios morbos concomitatur, aliquando est debilis sicut si fuerit propter splenem renes aut uesicam, & aliquando fortis est & molesta sicut cum fuerit propter hepar cerebrum & latus, & nonnunquam est debilis & aliquando fortis, fortis autem cum sit propter pulmonem. dolor enim pulmonis si fuerit propter sanguinem aut choleram febris erit molesta. Si autem sit propter phlegma aut choleram nigram febris erit lenis, molestatio autem febris quæ sit propter hepar quia materia eius est sanguis, lenitas autem eius quæ sit propter splenem est propter choleram nigram quæ est eius materia, molestatio febris quæ sit propter cerebrum est propter neruos & sensus acumen, lateris autem molestatio sit propter cholera quæ est eius materia & propter uiciniam cordis.

S E R A P I O N I S

D E F E B R I B V S

L I B E R.



De causis febris ephemeræ. Cap. I.



AVSAE quidem febris ephemeræ sunt quatuor quia quædam ex eis sunt quæ occurrunt exterius, sicut frigus, & calor, quando sunt fortes seu vehementes: aut balneatio cum aqua aluminis, aut aqua sulfuris. Et quædā ex eis sunt quæ ingrediuntur corpus, sicut cibis, & potus, & medicinæ, & quæ sunt illis similia. Et quædam ex eis sunt quæ inferunt passionem, sicut motus, qui sunt aut corporales, sicut labor cum ambulatione multa, aut equitatione assiduâ aut sunt motus animales, sicut vigilie, & metustitia, & tristitia, & ira. Et quædā ex eis sunt quæ accidunt ab extra, sicut dolor qui accidit in aliquo membro: (vel secundum aliam literam, Et quædam ex eis est dolor accidens in aliquo membrorum, sicut dolor accidens ex apostemate emunctoriorum causato à causa extrinseca.)

De febre ephemera accidente ex calore solis, & ab aere valde æstuoso. Cap. II.

SCias quod illis quibus accidit febris ephemera ex sole, & ab aere valde æstuoso, igniuntur seu inflammantur capita eorum, & cutes ipsorum, plus quam igniuntur seu inflammantur in speciebus alijs febris ephemeræ. Et capita illorum qui ambulant in sole tempore longo, igniuntur seu inflammantur plus quam corpora ipsorum. Et accidit sorda, & rubedo in oculis, & caliditas, quoniam huiusmodi febris ephemera lædit spiritus animales proprie: (vel secundum aliam literam, Et accidit in capite sorda, & pulsatio vehemens, quoniam in huiusmodi febre læduntur spiritus animales proprie, & oculi eorum rubescunt & inflammantur.) Quapropter oportet ut effundatur post resolutionem febris super capita eorum continue, aqua tepida dulcis, in qua iam decocta sint chamomilla, & viola sicca, & flores nenufaris, & rosæ: & inungatur caput cum oleo violato, aut oleo de nenufariis & rosis: & fac eos dormire in

domo frigida, in qua strata sint folia alchalef: & ciba eos cum cibarijs & potibus frigidis humidis. Quunq; redierint ad consuetudinem post resolutionem febris, oportet ut caueant sibi ab omnibus rebus quæ calefaciunt.

De febre ephemera accidente a frigore. Cap. III.

Febbris ephemera accidens ex frigore, exiccatur corpus, & arefacit, & solidum efficit, sicut illud quod fit ex balneatione cum aqua aluminis, & cum aqua sulfuris: (vel secundum aliam literam, & solidum efficit, & simulatur febris ista febris ephemeræ quæ fit ex balneatione cum aquis stypticis.) Et patientes hanc febrem ex frigore, sentiunt gravitatem in capitibus suis, & in reliquo corpore eorum. Et sunt urinae eorum albæ declives ad citrinitatem parum, quoniam caliditas quæ est in eis, non complevit iniectionem urinae. Et pulsus eorum sunt parvi, veloces, frequentes: parvi quidem propter frigus, velocitas vero & frequentia ipsorum pulsuum est, quoniam caliditas est iam submersa ad interiora. Et propter illud confert eis post resolutionem febris, balneum cum aqua calida, in qua decocta sint chamomilla, & melilotum, & maiorana: postquam sub infirmo posita fuerit hæc aqua bulliens, ita ut fomentetur cum vaporibus eius. Et inungatur patients cum oleis resolutivis & sedativis, sicut oleum camomellinum, & oleum anethinum, & oleum alchei ri. Et administretur oleum postquam sudaverit patients, quia non oportet administrare oleum ante sudorem, ut non oppilentur pori propter viscositatem olei. Quum autem patientes hanc febrem egrediuntur ex balneo, ciba eos cum cibis calefacientibus parum, sicut sunt assidbegi, id est, ferculum ex carne elixata, (vel secundum aliam literam, sicut brodium carnis elixata,) & bibat modicum aque calide: (vel secundum aliam literam, & sorbeat modicum olei cum brodio carnis.) Et ponantur coram manibus eorum pruna ignis, & ante ipsos accendantur ligna tamarisci sicca. Et confortentur spiritus animales ipsorum cum odoriferis, & cum speciebus aromaticis. & cum odore ligni aloes, & citri, & maio-

ranę, & narcisci, & alcheiri, & si symbrij, & quę sunt illis similia.

De febre ephemera accidente ex balneatione cum aquis stypticis. Cap. IIII.

Significatur super febrem ephemeram accidere ex balneatione cū aquis stypticis, sicut cum aquis aluminis, & cum aquis sulfueris, ex tactu, quoniam cutis est dura, filtrata, solida, extenuata, sicca, arida, plus quā cutis illorum quos inuasit febris ephemera ex frigore, & simulatur, illis qui manus suas submergunt in aqua gallarū, aut corticum granatorum, & quę sunt illis similia tempore longo. Et quādo ponis manum tuā in quacunque parte corporis, sentitur in primis diminutio caliditatis, & post illud quando expāditur cutis sub manu, & prolongatur tactus eius super ipsam curem, manifestatur caliditas, & sentitur vehēmentia eius plus. Et est urina declinās ad albedinem, aut ad citrinitatem, & hoc accidit quoniam superfluitates aquosę quę consueverant euacuari, retinētur propter soliditatem cutis. Et oculi eorum non sunt submersi, & quandoquē sunt inflati. Etiam & pulsus arteriarum ipsorum non est parvus, sicut in illis in quibus accidit febris ex cogitatione, & mœstitia, & vigilijs, & labore, quoniam uirtus in hac febre est remanens, & caliditas est profunda, & non resoluitur neq; finitur. Et oportet, ut scias qđ non semper accidit febris ephemera in corporibus, quādo inspissatur cutis eorum, sed illis corporibus accidit febris ephemera ex induratione & inspissatione cutis, quando ab eis resoluntur uapores humidi sanguinei, quia propter prædictam inspissationem retinentur, unde fit aggregatio ipsorum uaporum. Et inuadit etiam febris ephemera in illis corporibus quorum uapores sunt calidi & sicci, & non est materia quę in eis putrefiat. Et si est illic materia quę putrefiat, inuadit eos febris putrida. Et curatio quidem illorum quibus accidit hæc febris ephemera, fit etia cum rebus eiusdem quibus curatur febris ephemera quę est ex frigore, uerum ista tardant plus in balneo quā illi, quoniam indigent resolutione, & non tardant in tina multum. Et oleum quod ipsi administrant, sit parum, & frictio sit multa, lenis, ita ut leniatur cutis, & resoluantur superfluitates retentę in corpore. Et oportet ut utantur cibis velocis digestionis in quantitate moderata, & ut bibāt parum de uino, si durities seu inspissatio cutis fuerit pauca. Si uero durities seu inspissatio cutis fuerit multa, non utantur uino omnino, quoniam de proprietate uini est expandat superfluitates & excitet caliditatem.

De febre ephemera accidente ex cibis calidis. Cap. V.

Hæc febris plus accidit in spiritu naturali qui est in nobis, quoniam cibi & potus ledūt hæ par plus quā alia mēbra. Et propter hoc sunt urinae eorum declinues ad caliditatem, & patiens hæc febrem sentit caliditatem in hepate. Et propter hoc oportet ut exhibeantur ea quę conferunt hepati, & prouocant urinam, sicut syrupus acetosus factus cum zucchero, & aqua granatorum acetosorū & quę sunt illis similia. Et ponatur super hepar exterius epithema factum cum duobus sandalis, & rosis, & camphora, & aqua chalef, & aqua rosata.

De febre ephemera accidente ex labore corporis. Cap. VI.

Illorum qui laborant in ambulatione aut equitatione aut in pugna, igniuntur seu inflāmantur iuncturę omnes, & similiter spiritus uitaes etiā, & proprie spiritus animales, quia ad cor & ad cerebrum ex hoc quod ipsa sunt superius eleuantur uapores plus. Et secundum communitatē corpora quę laborant, sunt arida, extenuata, sicca. Secundum proprietatem uero si non est labor uehemens in corporibus, tunc siccitas apparet in eis tempore parua tantum, deinde egreditur ex eis humiditas quę est sicut ros, & uapor calidus quādo resoluitur humiditas humorum, & humectatur siccitas corporis, quod in hora declinationis febris efficitur roridum. Si uero labor sit multus, tunc corpus efficitur siccum in declinatione egritudinis etiam, & est pulsus tunc paruus. Et si labor non fuerit multus, tunc pulsus est magnus cōsequentiū seu frequens, quia febriens indiget attractione aeris, propter caliditatem & siccitatem quę comitantur ipsum, & uena est subtilis, acuta, propter laborem & resolutionem. Et eius quidem subtilitas est propter resolutionem multam, eius autem acuitas est propter motum qui igniuit seu inflāmauit corpus. Et sentitur aliquid de dolore in iuncturis, propter confricationem earum ad inuicem apud motum. Et oportet ut curentur isti in primis cum quiete & tranquillitate, & post resolutionem febris (uel secundum aliam literam, & post declinationem febris) sedeant in tina aque tepidę donec humectentur. Et non oportet ut tardent in balneo isti, nequē illi quos inuadit febris propter aerem ualde æstuosum, quia æritudo amborum simul est siccitas. Et uigantur corpora eorum si tempus est calidum siccum, & complexio infirmi est declinuis ad hæc duo, cum oleo uiolato & nenufarino aggregato cū aqua pauca. Quod si istę dispositiones sunt econuerso, ex parte aeris & ætatis & complexionis, inuigantur

gantur cum oleo de cheiri & oleo chamæmelli no, & sit fricatio lenis ualde temperata in multitudine sua donec humectet eos. Et post oleum etiam facimus eos sedere in tina aquæ tepide, donec humectetur corpus, & acquirat humiditatem loci illius quæ ex eo fuit resoluta. Et post tinam administramus oleum etiam, & conseruetur humiditas quam corpus acquisiuit ex aqua. Et præcipiamus eis ut caueant sibi ab eis quæ exiccant corpus, & proprie coitu, quoniam ipse exiccatur corpus & debilitat ipsum. Et nutriamus ipsos cum cibis humidis, paucarum superfluitatum, facili digestionis, & accipiant eos uicibus multis (uel secundum aliam literam, Et nutriamus eos cum cibis humidis facili digestionis, & huiusmodi cibi sumantur uicibus pluribus,) non uicē una, & bibat uinum non antiquum, permixtum, ut humectetur corpus.

De febre ephemera ex ira. Cap. VII.

In illis quibus accidit febris ephemera ex ira, est velox motus oculorum suorum, qui egrediuntur & eminent exteriorius, quoniam caliditas innata mouetur ad exteriora, propter vindictam faciendam ex nocentibus. Et rubet facies ipsorum propter motum sanguinis ad exteriora corporis. Et videtur corpus ipsorum plenum, pingue, propter ebullitionem sanguinis & ipsius feruorem. Et quandoque fit color citrinus ex timore permixto cum ira. Et vrina est citrina & acuta, (uel secundum aliam literam, Et vrina ipsorum est citrina non acuta.) (Alia litera habet, Et vrina eorum est citrina paucae acuitatis,) & pulsus eorum est velox, magnus, propter motum, & propter augmentum caliditatis. Et ingenium quidem ad istos febrientes, est in primis sedatio iræ ipsorum, & bonificatio anhelitus ipsorum cum delitijs, & post illud regimen ipsorum sit cum cibis bonis in complexione sua frigidis & humidis. Et non oportet ut exhibeatur eis uinum donec sedetur caliditas, quia de proprietate uini est excitare iram. Et similiter oportet ut prohibeatur etiam a balneo, quoniam balneum adiuuat materias quæ sunt in corporibus eorum ad putredinem, & facit euenire febrem, & facit resudare & expellere illas materias ad quædam membra, unde facit accidere apostema. Et oportet etiam ut intendatur studium circa cor, quoniam hæc febris non oritur & non incipit nisi ex corde.

De febre ephemera accidente ex cogitatione & tristitia. Cap. VIII.

In patientibus quidem febrem ephemeram ex cogitatione & tristitia, motus oculorum suorum & eminentia ipsorum ad exteriora, quandoque augetur, & quandoque quiescunt oculi, &

videntur quasi submersi. In illis autem qui cogitant, quandoque est eorum cogitatio in eo quod contristatur. Quoniam ergo solliciti sunt de eo quod ipsi timeant ut eis accidat, submergitur caliditas eorum innata, & sequuntur eam spiritus, & sanguis & membra quorum motus est facilis ad interiora, unde apud illud profundantur oculi eorum. Et quando cogitatio eorum est de euasione, seu est in spe euasione à timore & periculo, tunc accidit eis contrarium illius, caliditas enim naturalis tunc egreditur ad exteriora, & sequuntur eam spiritus, & sanguis, & oculi eminent & mouentur motu veloci. Pulsus autem eorum quando caliditas submergitur ad interiora, est parvus: sed quando dilaturatur ad exteriora, est pulsus magnus. Et vrina eorum est acuta, ita ut moridicet membrum per quod transit. Et oportet ut curentur isti cum contrario illius quod eis accidit, & ingenietur ut ipsi latentur & gaudeant & sperent, cum omnibus speciebus ingeniorum diuersorum, quæ solent inducere gaudium & letitiam & spem eorum quæ desiderantur. Et ingenietur etiam omni ingenio ut remoueantur ab eis multitudo cogitationis, quoniam multitudo cogitationis debilitat seu infestat animam, sicut dixit Plato. Post declinationem vero febris, oportet ut infirmus sedeat in tina aquæ dulcis tepida, donec humectetur corpus parumper, deinde ungatur cum oleo cui est virtus infrigidandi & humectandi, sicut est oleum violatum, & oleum nenupharinum. Et non sit fricatio continua, ut non exicceretur corpus. Cibatio autem istorum fiat cum cibis humidis laudabilis humoris, sicut caro pullorum, & franculinorum, & caro hœdorum, & pisces petrosi, & brodium leguminum frigidorum, & attriplex, & cucurbita, & his similia: nam passionibus animales proprietatem habent exiccandi corpus valde. Et signum huius est, quoniam uidemus plures eorum qui non cogitant, & non patiuntur tristitiam neque mœstitiam, digerere totum illud quod comedunt ex cibis. Illi uero qui cogitant & patiuntur mœstitiam aut tristitiam, non digerunt quod comedunt ex cibis, etiam si sint facili digestionis paucae quantitates. Et oportet ut exhibeatur in potu uinum permixtum non antiquum, in quantitate pauca, ita ut non exiccet corpus ex multitudine eius quod de eo administratur. Nam quando uinum exhibetur cum mensura, remouet vigilias, & facit euenire somnum, & propter illud humectat & legitificat tristes, & sedat iram & tristitiam. Et uniuersaliter dico quod oportet ut sit regimen totum infrigidans & humectans, & sit elongatio à rebus exiccantibus. Ipsæ enim nocent ualde, & proprie coitus, ut non permutetur seu perducatur febris ephemera ad febrem hæticam.

De febre ephemera accidente ex vigilijs.

Cap. IX.

SCias quòd patientibus febrem ephemeram ex vigilijs, accidunt istæ significationes, scilicet trinitas coloris propter motum cholerae accidentem ex vigilijs. Et propter paucitatem digestionis accidit corpori thebegi, id est, tumefactio similis cachexia & profundantur oculi propter multitudinem motus qui resoluit, & grauantur palpebre & motus ipsarum. Et pulsus est paruus propter debilitatem virtutis. Et vrina quamuis sit acuta, tamen est indigesta, turbida: (vel secundum aliam literam, Et vrina est pauca quantitatatis, acuta, non digesta, turbida. Oportet autem ut isti febrientes curentur cum rebus quæ contrariantur uigilijs, & sit ingeniatio in attrahendo somnum cum embrocis super caput factis cum aqua, in qua decocta sint camomilla, & rosa, & uiola sicca, & folia nenupharis, & hordeum excorticatum, & pauper. [] Et fricentur manus & pedes, ita ut attrahatur materia ad inferiora, & descendant uapores retenti in capite. Et cibatio eorum sit cum cibis humidis uelocis digestionis. Et exhibeatur eis in potu uinum permixtum non antiquum. Et prohibeant isti ab omnibus rebus quæ exiccant corpus, & proprie à coitu. Et regatur isti cum huiusmodi rebus, donec redeat corpus ad dispositionem primam cum somno nocturno, quoniam somnus nocturnus attrahit tranquillitatem plus propter consuetudinem primo, & secundo quia caliditas naturalis propter humiditatem noctis & frigiditatem eius, profundatur ad interiora, unde est causa completæ digestionis. Et tertio, quia tenebræ noctis attrahunt sensibus quietem, somnus uero diei propter contrarium harum rerum efficit contrarium illius. Et somnus quidem qui est inter mane, seu inter horam matutinam usque ad quatuor horas, est medius inter istos.

De febre ephemera accidente ex dolore inguinum.

Cap. X.

Dolor inguinum, est dolor emunctoriorum & lacertorum qui sunt in radicibus coarum. Nam quando accidit aliquod ulcus in pedibus & cruribus, tunc natura properat ad ulcus ut restitueret ipsum, & sequuntur eam spiritus & sanguis. Quumque huiusmodi in transitu suo perueniunt ad inguina, replent ipsa propter eorum raritatem & spongiositatem, unde fit in eis apostema. [] Quòd si principium huius apostematis fuerit causa primitiua, sicut ulcus in pede, tunc facit accidere febrem ephemeram. Et si apostema fuerit ex causa antecedente, sicut ex repletionem, tunc ex eo accidit febris putrida. Et significatur super hanc febrem etiam ex pulsu, quia in fe-

bre ephemera est pulsus magnus ualde frequens, & ex profundo corporis eleuatur postbullitionem roritas quædam calida mordicatiua, & rubet facies secundum plurimum, & inflatur, uerum tamen rubedo eius sequitur colorem sanguinis, & inflatio ipsius plus. Et urina est decliuus ad albedinem. Et oportet ut patientes hanc febrem, curentur incipiendo cum introitu eorum in balneo, & faciendo eostardare in eo. Et administretur eis fricatio cum equalitate, & non ungantur oleo aliquo, quoniam oleum humectat corpus, & oppilat poros eius. Deinde cibentur cum cibis subtilibus & prohibeantur à potu uini.

De febre hæctica. Cap. XI.

Febbris hæctica, quæ est febris fixa, stabilita, diuiditur in duas species, quarum una est quæ accidit ex aduersione caliditatis, & ad eam sequitur febris dach continua, vel secundum aliam literam, ex aduersione caliditatis, ad quam sequitur febris subtilis continua. Altera uero species est quæ accidit in corporibus senum absque febre, quando extinguitur caliditas naturalis quæ est in eis ex multa resolutione, & accidit absque dolore, & hæc nominatur Pylagrus medicus, & senectam ex ægitudine. Et iam nos uidimus multos, quos inuasit hæc ægitudine, ex senibus & pueris & adolescentibus, absque quòd finita fuerit caliditas eorum naturalis, & extincta ex multitudine ægitudinum, & assiduatione dolorum. Istæ igitur sunt duæ species primæ febris hæctica. Species autem prima diuiditur in tres species, quia humiditates quæ sunt in nobis, sunt quatuor, scilicet illa quæ est in uasis seu in uenis, & illa, quæ est in locis uacuis quæ sunt in nobis, & illa quæ est in carne propinqua tempori suæ coagulationis, & illa quæ continuantur membra. Quum autem calefit illa humiditas quæ est in uasis, id est, intra uenas & arterias, calefit corpus etiam. Et si calefiat & putrescat illa humiditas, tunc ipsa facit accidere febres, ex putrefactione eius quod est in uenis & arterijs. Et quando calefacta fuerit humiditas quæ est in locis uacuis, tunc accidit prima species febris hæctica quæ est facilis curationis. Quando uero calefacta fuerit illa humiditas, quæ est in carne proxima tempori suæ coagulationis, tunc accidit secunda species febris hæctica mediocris, quæ nominatur Marasmus, id est, debilis seu extenuatio, quæ est difficilis curationis. Si uero calefiat humiditas quæ continuantur membra corporis omnia, tunc accidit ex ea species tertia hæctica, & nominatur Charugas, & eius intentio est extinctio & fractio. Harum autem specierum [] prima est facilioris curationis & magis sperabilis, secunda uero est difficilior & media in spe, tertia autem species non habet curationem. Si enim resoluta est humiditas

miditas per quam membra continuantur, quomodo est possibile ut permaneat corpus? Hæc igitur est opinio quorundam de febre hæctica. Secundum vero sententiam aliorum, diuiduntur istæ tres species sic. Dicunt enim quod quando cordis complexio naturalis alteratur seu inflammatur & non finitur humiditas quæ est in eo adhuc, sed est in ipso sicut ebullitio, nominatur tunc prima species hæctice. Et quando accidit in ebullitione eius consumptio humiditatis & finis eius, tunc accidit species secunda hæctica. Et quando læduntur membra similibus parum, seu membra radicalia, scilicet, venæ & arteriæ & uelamina, ita ut in eis dominantur caliditas & siccitas, (vel secundum aliam litteram, ita ut sint obfessa seu oppressa à caliditate & siccitate,) tunc est species tertia hæctica. Signa autem quæ significant unamquamque istarum specierum, sunt ista quæ nunc dicemus & cætera. Alia littera à principio huius capituli usque ibi. Species autem prima diuiditur in tres species &c. sic iacet.

De hæctica seu de aldach. Cap. XI.

Intentio huius nominis hæctica, seu huius nominis aldach, apud Arabes est dispositio seu qualitas fixa seu stabilita in corpore: & est genus quod diuiditur in duas species: quarum una est dispositio febrilis fixa, quæ accidit ex adustione caliditatis, seu ex caliditate adurente. Altera vero species est dispositio sicca dominans & fixa, quæ accidit in corporibus senum absque febre: & hanc nominat Phylagrius medicus senectû ex ægritudine. Et iam nos uidimus multos, quos inuasit hæc ægritudo ex senibus & pueris & adolescentibus, absque quod finita fuerit caliditas eorum naturalis & extincta ex multitudine ægritudinum, & assiduatione dolorum. Istæ igitur sunt duæ primæ species huius nominis generalis, quod dicitur hæctica seu aldach. Species autem prima diuiditur in tres species &c.

Signa autem quæ significant unamquamque istarum specierum, sunt ista quæ nunc dicemus. Si incipit febris ephemera ex ira, aut tristitia, aut moestitia, aut cogitatione multa, & remanet usque ad diem secundum & non quiescit penitus, & non addit super illud in quo incepit: & apparet in colore & forma nigredo seu obscuritas, & extenuatio, & citrinitas: & tangendo infirmum, & uenas, & arterias ipsius semper sentitur caliditas: tunc scias quod hæc est prima species febris hæctica. Si autem augetur caliditas, & uehementior sit cum istis significationibus, quando datur infirmo cibus in quacunque hora fuerit, ita ut existimetur quod ipsa caliditas iam sit magis ad dita quam prius, & habeat periodos, tunc oportet

ut ut scias quod febris iam peruenit ad secundam speciem hæctica. Et tunc oportet ut cibetur infirmus, duobus aut tribus diebus cum cibis moderatæ quantitatis laudabilis humoris, & in horis diuersis, ita quod cibus uice una in mane, & uice alia in meridie, & uice alia in uesperis: & si quacunque hora cibetur, semper augetur caliditas, tunc iudica confidenter quod ista est species secunda hæctica, & non febris putrida.

Significationes autem speciei tertiæ, sunt istæ, quod oculi sunt submersi quasi positi in profundo, & uidentur spatulæ nudæ a carne, & apparet in oculis lippitudo sicca, & color infirmi est cineritius quasi iam super ipsum sit proiectus puluis, & cutis faciei & frontis est tensa, arida, sicca: & eleuantur superiora superciliorum & palpebrarum cum grauitate. Quum ergo iacent, arescunt, & clauduntur oculi eorum absque quod ipsi sint dormientes, sed clauduntur oculi ex debilitate quæ eis accidit. Et applanantur tempora, & sunt absque carne, & detumescunt seu extenuantur uentres eorum, ita ut uideantur ac si sint uacui ab intestinis & à uisceribus: & cutis corporum ipsorum est arida sicca. Et quando cum digitis tangitur, seu comprimitur, tunc uidetur quod sit sicut cutis coriata, uel sicut corium præparatum, siccum. Pulsus autem in eis est paruus, debilis, frequens, durus sicut corda. Paruitas autem eius, & debilitas ipsius, est quia uirtus est iam debilitata. Et durities eius est propter ipsius siccitatem. Frequentia uero ipsius pulsus est propter caliditatem. Et eorum urina est oleagina, in qua apparent quædam similia laminis seu squammis, propter liquefactionem membrorum radicalium, & resolutionem eorum. Et quando effunditur urina in uase, tunc auditur uox eius sicut uox olei effusi in uase: & causa illius est propter uiscositatem urinæ. In aqua uero effusa in uase, ex quo non uiscosa, non sentitur nisi sonitus fortis. Istæ igitur sunt significationes hæctica causatæ ex caliditate adurente: & huiusmodi hæctica, est hæctica febrilis quæ diuiditur in tres species, sicut iam prædiximus. Signa autem speciei hæctica quæ est ægritudo accidens ex domino frigiditatis & siccitatis, nominata hæctica senectutis, sunt ista. Pulsus enim in huiusmodi ægritudine est paruus, debilis, rarus, & urina est alba, subtilis substantiæ.

Cura febris hæctica.

Cura autem hæctica quæ est absque febre alia putrida, & absque materia præparata ad putredinem, est in primis exhibitio lactis asinæ. Et eligatur asina iuuenis, flauæ coloris, propinqua tem-

pori partus. Et sit lac eius lene, album, temperata substantia; ita ut quando distillatur super unguem aut super speculum, non expandatur ad altera. Et oportet ut nutriatur asina cum herbis frigidis humidis, sicut coriandrum humidum, & altil plana, id est, & herba graminis quæ nascitur super flumina, & endivia, & hordent album: & detur in potu aqua dulcis, bona, clara: lac enim generatur ex huiusmodi asina sic nutrita; est magni iuamenti. Et nutriatur infirmus cum mes excorticato, decocto cum attriplice, aut spinachia, aut lactuca, aut cucurbita. Et detur in potu aqua granatorum dulcium, & aqua cucurbitæ: (vel secundum aliam literam, Et detur in potu aqua granatorum mazoru, & aqua cucurbitæ.) Et facimus infirmum sedere in tina aquæ, in qua decocta sunt folia cucurbitæ, & hordent excorticatum, & nenufar & violæ, & quæ sunt his similia. Et post eius egressionem ex tina, inungatur cum oleo nenufarino, & cum oleo seminis cucurbitæ dulcis, aut oleo uiolato permixto cum cera alba dissoluta, vel cum cera abluta: quoniã huiusmodi oleum humectat corpus, & conseruat humiditatem quam acquisiuit ab aqua tinx. Quod si consentit uirtus, tunc mulge super ipsum lac asinæ, aut lac capræ, aut mulieris, antequam infirmus descendat in tina: quia lac quando mulgetur super corpus, humectat ipsum ualde. Quod si uirtus est debilis, tunc permisceatur lac cum aqua tinx, quam diximus, & non sedeat infirmus in tina multum, ut non debilitetur uirtus, neque prosternatur, neque mollescat. Et non ungetur infirmus ante introitum eius in tinam, ut non oppileant porositates corporis eius ex uiscositate olei, & ut non prohibeatur humiditas aquæ ingredi ad interiora corporis eius. Et sedeat infirmus in tina uice una post lac in mane, & uice alia post cibum & potum in uesperis, donec caliditas aquæ in tina attrahat humiditatem acquisitam ex cibis & potibus, ab interiori corporis ad exteriora ipsius. (vel secundum aliam literam, donec attrahat caliditas aquæ in tina humiditates acquisitas ex cibis, ab interioribus ad exteriora corporis,) & redire faciat illas humiditates super corpus, & spargi in membra ipsius. Si autem caliditas hætica fuerit diminuta, & corpus fuerit mundum à materia præparata ad putredinem, tunc exhibeatur infirmo machid uaccinum mundum à butyro, & ab unctuositate. Et in principio exhibeatur ex eo pondus drachmarum decem: & addatur in eo secundum gradationem usque ad drach. 30. Et si consentit uirtus & digestio, & addis super hanc quantitatem lactis, non erras. Et exhibeatur lac supra scriptum cum istis trochiscis, quorum descriptio est hæc. Recipe: spodij drach. 4. rosarum drach. 6. seminis portulacæ, seminis cucurbitæ dulcis omnium ana drach. 3. boli armeni drach. 4. charabæ drach. 3.

terantur, & cribellentur, & conficiantur cum aqua plantaginis, & fiant trochisci, & exiccantur: isti enim trochisci prohibent ne fiat febris. Quod si in infirmo sit febris putrida, aut corpus eius non sit mundum à materia præparata ad putredinem, tunc oportet ut caueat à generibus lactis, & loco ipsius lactis exhibeatur aqua hordei decocta cum cancri fluuiatilibus, aut aqua cucurbitæ. Modus autem præparandi & rectificandi cancri supra dictos est iste. Recipe cancri fluuiatiles. Recentes in uita, & abscindantur pedes eorum, & dentes ipsorum, & ablue eos cum aqua frigida & cinere & sale communi tribus uicibus, donec remoueat ab eis foetor seu alia mala qualitas ipsorum: deinde lauenter cum aqua frigida sola, & contundantur, & decoquantur cum aqua hordei excorticati, & detur in potu ex hac aqua libi sem. postquam exhibitum fuerit infirmo aut. Et ex istis trochiscis, qui conferant febri hætica, & phthisi, quorum descriptio est hæc. Recipe: plantaginis drach. 3. boli armeni drach. 1. papaueris atbi drachmas quinq; spodij drach. 4. rosarum drach. 6. seminis cucurbitæ dulcis excorticati, & seminis portulacæ, & seminis citruli excorticati, omnium ana drach. 6. seminis cytoniorum excorticati drag. 7. succi liquiritiæ drach. 10. gummi dragacanthi, amyli, omnium ana drach. 3. seminis melonis, & cucumeris, omnium ana drach. 7. Summa medicinarum est numero. 10. terantur, & cribellentur, & conficiantur cum mucicillagine psyllij, & fiant trochisci, & exhibeatur ex eis aureum unam: cum aqua granatorum, & aqua cucumeris in ieiunio. Et detur post horam aqua hordei decocta cum cancri secundum quod narrauimus. Et cibetur ex cucurbita cum attriplice & portulacæ, aut cum mes excorticato in ferculo cum oleo amygdalarum dulcium, permixto cum oleo de semine cucurbitæ dulcis. Et inungatur corpus in uesperis cum oleo nenufarino, & cum oleo seminis cucurbitæ dulcis. Et sedeat infirmus, si est tempus calidum, in domo frigida strata cum folijs chalef, seu salicis & rosæ, & myrtho, & nenufare, & sacsefran, id est, basilicone. Quod si accidat eis syncopis, tunc pone super membra eius linimentum factum ex aqua myrthi, & aqua rosata, & sandalis, & camphora, & rosæ tritis, & ligno aloes crudo: & roretur semper super faciem eius aqua rosata in frigidata. Et ingenietur omni ingenio, ut non resoluatur ex corpore eius aliquid. Et exhibeatur uitellus ouis forbilis, aut medulla panis cum uino non antiquo plurimum permixto. Et da ei etiam ex hac forbitione hora post horam, & eius modus est. Sumatur caro rubea ex collo hœdi, & ex costis eius, & incidatur in partes paruas, & decoquatur in olla noua leniter seu suauiter cum modico salis, donec egrediatur aqua eius: deinde coletur illa aqua, & fundatur super ipsam quantum est medietas

dieta eius ex succo pomorum, & quantum est decima pars omnium vini odoriferi, & exhibetur infirmo ad sorbendum: hoc enim facit aduenire infirmo virtutem multam. Quod si uides uirtutem iam debilitatam, & membra iam exicata & resoluta, & videris venas vacuas a sanguine, & costas subtiliatas & expoliatas à carne, & arundines seu focilia manuum & pedum iam subtiliatas, tunc oportet ut caueas à curatione istorum, quoniam tunc est labor vanus. Et ingenia omni ingenio ut non soluantur natura in eo qui patitur hęticam, neq; in eo qui patitur phthisim. Quod si natura ipsorum fuerit soluta, tunc loco aquę hordei exhibeatur saulich hordei, decoctum cum milio excorticato torre facto parumper, & quandoq; puluerizatur super ipsum gummi torrefactum. Et conferunt etiam isti trochisci, quorum descriptio est hæc. Rec. boli armeni drac. 5. castænearum torrefactarum drac. 4. spodij drac. 3. seminis acetosę excorticati. drac. 1. berberis. drac. 3. rosarum. drac. 4. charabz. drac. 3. Summa medicinarum est numero. 7. terantur, & commisceantur cum aqua cytoniorum, & aqua pomorum, & fiat trochisci, & exhibeantur in mane cum aqua pyrorum, aut aqua cytoniorum. Et in uesperis exhibetur semi. psyllij torrefacti aur. 1. cancrorum adustorum. drac. 1. gummi torrefacti drac. sem. boli armeni aur. sem. permisceantur omnia, & exhibeantur cum aqua pomorum. Et cibetur cum herba acetosa elixata, seu frixa cum amygdalis torrefactis, excorticatis. Et etiam lentes excorticatę torrefactę, iam decoctę duabus uicibus, à quibus effusa fuerit aqua prima, & decoctę uice secunda cum aqua granatorum, & aqua sumach, & aqua cytoniorum. Et exibeatur saulich de gobera, aut saulich de nabach, aut saulich granorum granatorum, & saulich pomorum absq; zucarato. Et si coegeris, da suffus granorum granatorum cum charad, & tharathit, & granis myrthi, si infirmo nõ est tussis. Si uero cum eo fuerit tussis, da gummi Arabicum, & bolum armenum, & psyllium, & castaneas, & granamyrthi & syrupum myrthinum purum. Si autem accidit in intestinis excoꝛiatio, tunc curamus cum clystere prædicta in capitulo excoꝛiationis. In cura autem speciei secundę hęticę, quę nominatur senecta ex egritudine, oportet ut ingenietur in primis in calefactione corporis, & incipiamus cum rebus temperatis, deinde cum rebus fortibus in calefactione. Et propter illud oportet ut exhibeatur primo mel citri conditi, & mel zinziberis conditi, & secacul. Et cibetur infirmus ex brodio carnis arietum castratorum, & columbinorum. Et exhibeatur in potu uinum non ualde antiquum, quoniam uinum antiquum proprietatem habet inducere sodam, & exiccare corpus. Et infirmus sedeat in tina, in cuius aqua decocta sit camomilla, & maiorana & quę sunt illis similia. Et confortetur cum odoratione odo-

rum delectabilium calidorum, sicut narciscus, & citrum, & iasiminum, & maiorana, & lilium, & quę sunt illis similia. Et fiat eis suffumigiũ asidue cum lignis aloes. Et si debilitatur corpus parumper, damus ei in potu theriacam, & diamuschum & mithridatum, (vel secundum aliam literã, cum ligno aloes.) Et in fine si corpus fuerit parumper fortificatum, damus in potu theriacã, & diamuschum, & mithridatum. Et oportet ut infirmus caueat à coitu. Quumq; uirtus corporis redierit, & confortata fuerit, tunc oportet ut curet cum hoc clystere. Recip. caput arietis cum pedibus suis, & projiciantur in uase mundo, & effundatur super eos lib. 10. aquę, & de frumento contuso, & ex ciceribus contusis, omnium ana pugillum unum, anethi, camomillę, & tribulorum, omnium ana vnc. 1. ficuum alborum & nigrorum pinguium numero. 10. decoquantur omnia donec remaneat ex eo tertia pars, & coletur, & sumatur ex eo lib. sem. & misceantur cum eo butyri uaccini vnc. 1. olei lisamini vnc. 2. & olei de ben vn. 1. & misceatur totum, & clysteriza cum eo tribus diebus. Et expectetur quinq; diebus, seu quiescat quinq; diebus, deinde reuertatur etiam ad hanc curam cum hoc eodem clystere, donec humectetur corpus, & impinguetur. Et inungatur corpus in nocte cum oleo de narcisso cum cera alba, & in mane exhibeatur ad sorbendum vitellum oui cum modico uini, deinde ingrediatur balneum & non dimittatur infirmus morari in eo. Et post egressio nem à balneo cibetur cum brodio carnis aromatizato cum zinzibere, & spica, & cinnamomo, & galanga, & quę sunt eis similia, deinde dormiat. Et regatur hoc regimine donec redeat corpus eius ad naturam suam.

De febre syncho, quę est febris sanguinea.

Cap. XII.

Febri quę non incipit cum periodo, sed ipsa ab inceptione sua usq; ad eius consumptionem, est sicut periodus unus, generatur ex sanguine, qui quando calefit calefactione tantum absq; putredine, facit accidere febrem ephemeram, (vel secundum aliam literam facit accidere febrem si milem ephemerę.) Quando autem sanguis putrefcit proprie in uasis, seu in uenis magnis, tunc accidit feb. acutior illa, & nominatur synochus. Et huic eidẽ sunt tres species, seu, & hæc feb. synochos diuersificatur, quia aut ipsa incipit cū quiete seu cū remissione, deinde augetur paulatim paulatim, quoniã illud quod putrefcit de sanguine, est plus quàm illud quod resoluitur. Aut incipit cum fortitudine seu cum intensione, deinde diminuitur paulatim paulatim usq; ad eius consumptionem & hoc fit quando illud quod resoluitur est plus quàm illud quod putrefcit. Aut incipit cum dispositione cum qua remanet à principio usque ad consumptionem.

sumptionem illius dispositionis, & illud fit quando quod ex sanguine putrefit, est equale ei quod resoluitur. Signa autem huius febris sunt rubedo faciei, & oculorum, & inflatio temporum & repletio totius corporis, & pigritia, & grauiras, & soda cum inflammatione vehementi, & corpora eorum sunt calida & humida, sicut illa quæ egrediuntur ex balneo. Et pulsus est magnus, fortis, plenus, lenis. Urina uero substantia est subtilis cum colore alaruiani, id est, cum colore purpureo. Et quandoque accidit infirmo asthma ex multitudine sanguinis in membris superioribus, scilicet in hepate & corde, & propter multitudinem vaporum qui ascendunt ad pectus & pulmonem.

De cura febris synochi.

Febris autem quæ fit ex calefactione sanguinis tantum, absque eius putredine, curatur curatione simili qua curatur febris ex putredine sanguinis, incipiendo in primis cum phlebotomia uenæ: & si consentit uirtus, extrahemus de sanguine donec accadat syncopis, quoniam ista euacuatio confert iuuamento magno in huiusmodi febre. Et quandoque sequitur ad illud solutio naturæ, & euacuatio cholæræ, & roritas totius corporis, & sudor unde sedatur & quiescit febris. Et non oportet ut aduertatur de numero dierum &c.

Alia litera à principio curationis huius febris, vñq; ad hanc particulam. Et non oportet ut aduertatur de numero dierum &c. sic iacet ut infra.

Febres sanguinæ si sunt ex calefactione sanguinis tantum, propter priuationem euentationis, & fuerint paucae oppilationes, oportet ut curentur curatione febrium sanguinis putredinalium. Et si humores fuerint furiosi ualde, tunc necessaria est cura fortior ista, & tunc si non festinetur ad curam, perducitur sanguis ad putredinem, & fit febris ex putredine sanguinis. Et propter hoc oportet ut fiat euacuatio cum apertione uenæ, & extrahatur de sanguine donec accadat syncopis, quoniam in huiusmodi curatione est iuuamentum magnum, si consentit uirtus, quoniam corpus reuertitur ad temperamentum cum frigidityte accidente ex syncopi. Et quandoque sequitur post illud expulsio naturæ cum solutio ne uentris. Et quandoq; euacuatur cholera cum uomitu. Et quando ad istas euacuationes subsequitur roritas & sudor in toto corpore, & febris extinguitur statim. Quod si non fiat phlebotomia in huiusmodi cura perducitur res ad timorem magnum, nisi uirtus fortificetur & erumpatur sanguis ex aliquo locorum, & currat sudor multus, unde infirmus liberetur à morte. Et non oportet ut aduertatur seu consideretur de numero dierum à principio ægritudinis, quum uirtus

est remanens, quia quum ipsa fuerit fortis, tunc non oportet ut sis contentus phlebotomare in sexto & in septimo tantum, immo in reliquis diebus alijs. Si autem cogeris in aliqua hora prohibere extractionem sanguinis, administra regimen iuuatiuum quod aperit oppilationes, & incidit, & sedat ebullitionem sanguinis & caliditatis. Et quando apparuerint signa digestionis, & non est in aliquo membrorum principalium apostema, neq; durities neq; macies corporis, neq; uides in aliquo membrorum corporis aliquid, per quod timetur quod noceat ei potus frigidus tunc conceditur potus aquæ frigida, & proprie si infirmus fuerit consuetus potare illam: quoniam membra radicalia quando fuerint fortificata cum temperamento, quod eis aduenit ex hoc potu, abtrahunt ad se humores laudabiles conuenientes, ut cum eis nutriantur, deinde expellunt quod non conuenit eis per secessum, & per id quod egreditur ex cute. Quod si natura non expellit per se, & oportuerit mundificare illud cum medicina, tunc oportet exhibere in potu decoctionem prunorum, & tamarindorum, & passularum mundatarum ab arillis, cum cassia fistula & tereniabin; post mensurationem quantitatis istorum secundum uirtutem & secundum ætatem. Quod si cum hoc non obedit natura, tunc oportet administrare clysterem lenem factum ex camomilla, & uiohis ficcis, & tribulis, & sebesten, & hordeo excorticato, & althea, & zuchcharo rubeo, & penidijs cum oleo violato, aut oleo sisamino, & sale communi, & modico baurachi. Postquam autem lenita fuerit natura, oportet ut des in potu aqua hordei. Et si natura fuerit declinis ad siccitatem, datur in potu ipsa aqua hordei cum aqua granatorum dulcium, aut cum iubel aut cum zuchcharo: & si non fuerit decliuis ad siccitatem, cum aqua granatorum mizorum, aut cum syrupo acetoso zuchcharino. Quod si fuerit conuenies ut infirmus assumat cibum, tunc oportet cibare ipsum in mane post assumptionem aquæ hordei in frigore aeris quoniam in hac hora sedatur caliditas parum per cum aspirationem aeris frigidi, & fit appetitus cibi. Quando enim aer fuerit calefactus, & patientes fuerint inflammati, & caliditas eorum fuerit uehementior tunc non oportet in hac hora exhibere eis aliquid de cibo. Cibus autem eorum sunt lentes excorticate, & spinachia cum mes excorticato, aut cucurbita cum oleo amygdalarum dulcium, aut cum oleo omphacino abluto, quoniam hoc oleum est frigidum ex hoc, quod est factum ex oliuis crudis: Si autem non potest comedere panem cum oleribus quæ diximus, tunc oportet exhibere eis fauich hordei iam infusum in aqua calida horvna, deinde ablutum cum aqua frigida permixtum cum zuchcharo, ut non inflet uentrem & non generet in eis rugitum: (vel secundum aliam literam, fauich hordei iam infusum in aqua calida per

da per horam, ut non generet rugitum & inflationem, deinde ablutum cum aqua frigida, & permixtum cum modico zuchari.) Et secundum hunc modum exhibetur etiam sauch sili-ginis, & sauch tritici, quando abluatur cum aqua calida, deinde abluatur cum aqua frigida, & datur cum zucharo in potu. Et dentur eis ex fructibus pruna recentia, & granata muza, & poma, & medulla citruli, & cucumeris, & gummar palmæ, & yua alba, & quæ sunt illis & similia. Et si natura fuerit decliuus ad siccitatem, sit potus eorum aqua prunorum, seu infusio prunorum, & aqua cucurbitæ cum zucharo, & iuleb, & aqua granatorum muzorum, & aqua citruli. Si autem natura fuerit decliuus ad lenitatem, tunc exhibeatur sechaniabin, & rob agreste purum, & rob de ribes. Quod si natura fuerit uehementer soluta seu lenis, tunc exhibeatur aqua sauch hordei cum trochiscis despodio cōstrictiuis, & elonga ab ipso iuleb & zucharum, & da in potu rob granatorum acetosorum, & rob malorum, & cytoniorum purum. Et si accidat febrienti soda, tunc funde super caput oleum rosatum tepidum, (vel secundum aliam literam, tunc uehementer inungatur caput cum oleo rosato tepido, permixto cum modico aceti fortis,) aut cum oleo de chalef cum aqua rosata, quoniam hoc prohibet materiam, & reprimat eam. Si autem uolumus extinctionem tantum absque re-percussione, tunc ponemus super caput aquam portulacæ, & aquam chalef, & aquam rosatam & oleum rosatum, & uiolatum, & oleum nenufarinum. Et ex eis quæ conferunt iuuamento magno, est succus uirgæ pastoris, & semperuiuæ, quando miscetur cum oleo rosato, & oleo uiolato & oleo de semine cucurbitæ dulcis, & modico aceti potentis & camphoræ. Quod si necessaria est emplastratio, tunc fiat emplastrum cum extremi-tatibus chalef recentibus contritis, & portulacæ, & rasura cucurbitæ, & musco aquæ, & semper uiuæ, & farina hordei, quando conficitur cum aqua rosata, & sandalis albis, & aceto pauco, & linitur frons cum linimento facto ex sandalis albis, & camphora cum aqua cucumeris, & aqua rosata, & modico aceti. Si autem febrienti accidit uigilia, tunc confice hoc linimentum cum aqua foliorum papaueris, aut lactucæ humidæ, & emplastratur etiam cum emplastro ex folijs uio-larum humidis, & nenufare humido, si reperitur, & lactuca, & papauere, contritis contritione bona cum modico farine hordei, & althææ, & conficiatur cum aqua cucumeris, & cucurbitæ, & oleo uiolato. Si autem non quiescit soda, & estimatur quod in capite sint retenti uapores acuti, sicci, tunc oportet ut administretur embroca cum aqua, in qua decocta sunt flores camomillæ, & uiole sicca, & rose, & hordeum excorticatum, & flores nenufaris, & quæ sunt illis similia. Si

autem fuerint uigilia, tunc misce cum istis medicinis papauer cum cortice suo, & semen lactucæ. Et si non quiescit soda cum embrocis etiam, & non sit febris in infirmo, aut cum eo fuerit febris lenis quæta, tunc super caput mulgeatur lac mulieris, si fuerit uirtus debilis. Si uero fuerit fortis, mulgeatur lac caprarum. Et post administrationem lactis emplastratur caput cum emplastris, quæ diximus ante, & expectetur hora una donec quiescat infirmus, deinde fiat ei caputpurgium cum oleo uiolato, aut oleo nenufarino, & lacte mulieris lactantis puellam. Quod si non sedatur dolor cum hac curatione etiam, tunc emplastratur caput cum emplastro facto ex camomilla, & uiolis siccis, & farina hordei, & althæa, & oleo uiolato, & aqua frigida. Et si sunt illi uigilia, tunc oportet ut addas in emplastri cortices papaueris, & semen lactucæ, & poma mandragoræ recentia, si inueniuntur, & conficiatur emplastrum cum aqua lactucæ loco aquæ. Et non oportet ut cures cum istis curationibus, nisi quando soda est ex uaporibus calidis siccis. Quando autem caput est plenum uaporibus grossis humidis, oportet ut caueatur lac & caputpurgia, quia iste modus sode duplicatur cum huiusmodi curationibus. Et significatur super hunc modum soda, ex granitate quæ est in capite cum dolore, quoniam si fuerit cum dolore grauitas in capite, significat quod in ipso sunt uapores humidi multi. Quare tunc oportet ut curetur cum uapore aquæ, in qua decocta sit camomilla tantum, donec resoluantur uapores per resolutionem, quam acquirunt pori capitis ex aqua camomillæ. Et si indiget embrocatione, facimus eam ex illa aqua camomillæ post uaporationem factam cum eo. Et oportet ut elongetur ab oleo, quando in capite est grauitas aut subeth, quoniam retinet materiam intus & prohibet eam a resolutione. Et effunde super pedes & manus aquam calidam, in qua decocta fuerit camomilla, quoniam hæc attrahit materiam ad inferiora, & facit descendere uapores. Quod si sentit infirmus apud effusionem huius aquæ, materiam & uapores descendere in dorsum & spondiles, tunc soda quiescit. Et si non sentit illud, non quiescit soda, quoniam materia adhuc est sursum retenta, & tunc oportet ut stringantur manus & pedes strictione forti, donec lædantur & doleant. Et si tibi necesse est stringere testiculos, fac illud. Si autem accidat infirmo angustia & inflamatio, & syncopis, tunc oportet emplastrare stomachum & uentrem cum emplastro facto ex cinere cannarum, & althæa, (uel secundum aliam literam, ex cinere foliorum cannarum, & althæa,) & sandalis albis, & camphora, confectis cum aceto. Et confert etiam rasura cucurbitæ, quando teritur & permiscetur cum farina hordei, & althæa, & aqua rosata, & aceto. Et simili-

ter portulaca, quando teritur & miscetur cum rosis tritis, & sandalis albis, & aqua rosata, & folia chalef recentia. Et uirga pastoris cum aqua rosata, & aceto. Et alta haleb, idest, muscus aquæ rosata, & aceto. Et alta haleb, idest, muscus aquæ quando permiscetur cum sandalis albis, & camphora, & aceto. Et iaceat infirmus in domo frigida, quæ sit strata cum folijs chalef, & extremis uitis, & myrtho humida, & sabesefram, idest, basilicone habente folia minuta, & rosis recentibus si inueniuntur, & floribus nenufaris, & curibus aquarum frigidarum quæ per mutantur quotiens calefiunt. Et ponatur super stomachum & uentrem cerotum factum ex oleo rosato, & aqua cucurbitæ, & niue, huiusmodi enim extinguit extinctione ultima. Et iuuantur etiam cum clystere facto ex aqua portulacæ, & aqua foliorum psyllij cum oleo rosato, (vel secundum aliam literam, cum clystere facto ex portulacæ, & aqua psyllij, & oleo rosato,) & aqua cucurbitæ decocta, & aqua cucumeris, & oleum uiolatum. Et similiter aqua uirgæ pastoris, & aqua chalef: huiusmodi enim conferunt iuamento efficaci ad extinguendum inflammationem, & casacan, & syncopim causatam ab ea. Et si accidit in lingua siccitas vehemens & asperitas, tunc oportet ut extrahatur mucillago seminis cytoniorum, & psyllij & seminis althææ, & misceatur cum ea oleum seminis cucurbitæ dulcis, & zucharo: & lambat ex eo infirmus assidue: & fricetur lingua, quando ipsa denigratur & exasperatur, cum istis seminibus prædictis ligatis in petia lini, donec rubeat color eius: (uel secundum aliam literam, & fricetur etiam lingua si fuerit nigra, cum petia lini infusa in istis mucillaginibus, donec rubescat & fiat lenis.) Et accipiat infirmus in ore suo aquam cucumeris assidue, & oleum uiolatum, & aquam granatorum muzorum uehementis saporis, cum oleo seminis cucurbitæ dulcis. Et si accidat infirmo subeth magnum, ita ut non possit aperire oculos suos, neque loqui: tunc non ponas super caput eius oleum, neque emplastrum factum ex farina hordei, sed embroca super ipsum oleum rosatum & acerum: quoniam hoc confortat caput, & remouet subeth. Quod si accidat infirmo inquietudo seu angustia, ita ut ipse permuteetur à dextris & sinistris, & proiciat seipsum huc atque illuc, & inflatur uenter eius, & quum manu percutis super ipsum, sentis uocem sicut tympani: tunc si soluitur uenter eius, seu natura ipsius & non remouetur illa inflatio, scias quod infirmus moritur, præcipue si apparent in eo bothor seu maculæ violacæ: (uel secundum aliam literam, si appareret in eo morbilli uirides, præcipue si sunt amplæ latæ,) & currit ex corpore sudor multus: (uel secundum aliam literam, præcipue si sunt amplæ latæ, existentes in pluribus locis corporis. In huiusmodi ergo dispositione, oportet ut fugias à curatione eius.

Si autem accidit infirmo fluxus sanguinis narium secundum semitam crisis, tunc oportet ut gaudeas & letaris ex hoc, & non abscondas eum. Quod si huiusmodi fluxus fortis fiat adeo ut debilitetur uirtus, tunc oportet ut cures eum curatione descripta in capitulo fluxus sanguinis narium.

De cura febris causata ab almeffere, seu ab erysipelate.

Si causa huius febris est apostema nominatur erysipelas, quæ est almeffere oportet ut curetur primo almeffere cum phlebotomia uenæ: deinde cum medicina solutiuâ facta ex speciebus myrobalanorum, & ex prunis, & tamarindis, & fumo terræ. Et si est nobis necesse, damus etiam aquam solatri, & aquam endiuie, & aquam lubleb cum cassia fistula. Et damus post illud aquam hordei cum aqua granatorum muzorum. Et liniatur apostema cum sandalis rubeis, & faufel & sief memithæ, & bolo armeno cum aqua solatri, & aqua coriandri humidi, & camphora.

De cura febris causata à variolis, (uel secundum aliam literam, De cura febris causata ex planta diei, quæ est uariola.)

Si hæc febris fuerit, propter causam uariolarum, & uirtus & ætas consentit, tunc non aliquid magis iuuatiuum quam phlebotomia uenæ. Et si aliquid prohibet phlebotomiam, tunc oportet ut administrantur uentose. Et custodi oculos ita ut non egrediantur in eis uariolæ, seu ulcera uariolarum, & distila in eis ambobus assidue aqua rosatam, & aquam sumach. Quidam autem exprimunt ex semine & ex pulpa granatorum, & distillant in oculum: (uel secundum aliam literam, Quidam autem liniunt oculos cum eo quod exprimitur ex semine & ex pulpa granatorum.) Quum ergo apparent ulcera in oculis, oportet distillare in eis cohol, seu antimonium dissolutum in aqua coriandri humidi, aut coriandri sicci infusi in aqua pluuiali colata. Et damus in potum hanc medicinam, ut egrediantur uelociter ulcera seu uariolæ absque constrictione peccoris, & absque angustia, & casacan, & absque nausea, & descriptio: medicinæ est hæc. Recip. laccæ mundatæ drach. 5. lentium non excorticatarum neque ablutarum drachm. 7. (uel secundum aliam literam, lentium excorticatarum ablutarum drach. 7.) dragacanti drach. 3. decoquantur ista cum libra una aquæ donec remaneat tertia, & coletur, & exhibeatur. Deinde detur in potum omni die aqua hordei, postquam decoctæ fuerint ex ipsa partes. 2. & pars una lentium: (uel secundum aliam literam, Deinde exhibeatur aqua hor-

hordei omni die, & decoquatur cum duabus partibus hordei pars. i. lentium:) & comedantur mes, & lentes, & atriplices, & olus iamenum cum oleo abluto. Quod si infirmus indiget lenitione nature, tunc oportet ut ipsa leniatur cum decoctione iuiubarum, & prunorum, & tamarindorum, & cassia fistula, & terentiabin, usque ad diē septimum: deinde post septimum oportet ut caueatur a medicinis solutivis, quoniam de consuetudine huius egritudinis est, ut accidat ī fine eius solutio ventris, quia materia quando remā sit intus, & non egressa fuerit ad exteriora, expellitur a natura, & facit accidere diarrhæam aut excoarationem propter acuitatem suam. Et propter hoc oportet ut post septem dies, exhibeantur in cibo lentes iam torrefactæ & decoctæ cum aqua granatorum muzorum: & loco cucurbitæ ponantur cum eis giumar palmæ. Et ex fructibus exhibeantur vua alba, & granata muza, & poma, & pyra, & cytonia. Et si tempus est hyemis, accendantur coram eis ligna tamarisci, & sarmēta vitis. Quum ergo incipiunt ulcera exiccati, liniatur super ea cum penina linimentum factum ex farina rizi perfici, & farina milij cum radicibus cannarum exiccatis, & croco, & amylo permixtis cum aqua rosata. Et quidam alij liniunt corpus infirmi cum sale contrito dissoluto cum oleo sisamino. Quidam alij faciunt sedere infirmum in aqua in qua iam decocta sunt ficus, & sal, & furfur rizi.] Et oportet ut sternatur sub eis stratum impletum milio, & panico aut rizo: quoniam hoc exiccat ulcera uelociter. Et si egreditur in naribus aut in ore aliquid ex ulceribus seu ex uariolis, oportet ut inungatur nares cum oleo niolato permixto cum cera alba dragacantho. Et extenuatur illud quod ex eis accidit in ore, cum mucillagine seminis cytoniorum, aut mucillagine psyllij. Quod si natura fuerit soluta, tunc exhibeatur in potu suffus de seminibus, cum trochiscis de spodio factis cum semine acetosæ, quorum descriptio est hæc. Rec. spodij drac. 4. solarum rubearum drac. 5. seminis acetosæ excorticati drac. 6. gummi parum torrefacti, & balauftiorum, omnium ana drac. 5. boli armeni drac. 3. terræ sigillatæ, berberis, omnium ana drac. 5. granatorum myrthi alborum dra. 4. amyli, & croci, omnium ana drac. 3. castanearū drac. 5. terantur, & cribellentur, & conficiantur cum aqua cytoniorum, & fiant trochisci, & excentur, & dentur ex eis in potu cum aqua pyrorum stypticorum. Et cibetur infirmus cum milio excorticato torrefacto iam decocto cum hordeo torrefacto, aut cibetur cum sauch hordei. Et si indigent clystere, curamus eos cum uno clystere prædictorū in curatione excoarationis. Et nō comedat duragi, neq; pullos, donec exiccent ulcera seu uariolæ, & mudificetur corpus a febre. Quod si patietes febrē sanguinis, post eradica-

tionē feb. indiget eo quod extinguat illud, quod iam remansit in corpore de acuitate seu de impressione febris, damus in potu istos trochiscos. Rec. spodij drach. 3. seminis portulacæ dra. 5. seminis cucumeris excorticati drac. 4. seminis cucurbitæ dulcis drac. 6. gummi dragacanti, amyly, omnium ana drac. 3. succi liquiritiæ drac. 7. terantur, & cribellentur, & misceantur cum mucillagine seminis psyllij, & fiant trochisci, & dentur cum aqua granatorum, aut cum aqua citrulli, aut cum aqua endiuiz, aut cum aqua cuscute.

De febre tertiana, qua causatur ex putredine cholera. Cap. XIII.

SVper hanc febrem tertianam sumuntur quidam significationes ex rebus naturalibus, & ex rebus quæ non sunt naturales, & ex rebus præter naturam. Et cognoscitur ipsa febris tertiana ex causis præter naturalibus, quoniam ipsa incipit cum rigore difficili, si fuerit materia eius putrescens extra uenas & arterias: & si est intra uenas & arterias, tunc est febris tertiana continua, aut febris adustiuæ seu caustionis. Et in nulla istarum duarum febrium est rigor seu tremor, quoniam materia ipsarum est comprehensa in uenis & arterijs. Sed differentia inter febrem tertianam continuam, & inter febrem adustiuam, est &c.

Alia litera habet principium huius capituli usque ad istam particulam, Sed differentia &c. sicut infra.

Scias quod quando febris tertianæ materia est extra uenas & arterias, tunc ipsa incipit cum tremore difficili: & si est intra eas, incipit absque tremore, & accidit febris tertiana assiduæ. Sed differentia inter tertianam assiduam & comburentem seu adustiuam, est quod cholera faciens febrem tertianam continuam, est in omnibus uenis corporis æqualiter: sed in adustiuæ, est inflammatio & ebullitio cholera, seu putrefactio cholerae proprie in uenis quæ sunt in circuitu cordis. Et quandoque est febris adustiuæ ex putrefactione phlegmatis salis, sicut dixit Hippocrates in libro epidimæ. Quod si materia faciens febrē tertianam putrescat extra uenas tunc feb. incipit cum rigore seu tremore, qui est sicut punctura acuum, & sicut horripilatio quæ causatur ex effusione aquæ ebullientis super corpus subito. Et hoc quidem accidit, quoniam cholera citrina habens partes subtiles igneas, mouetur ad superficiem corporis exteriorē, quumque pertransit super membra sensitiua, mordicat ea, & lædit ipsa, unde caliditas naturalis fugiens nocuentū mordicationis, profundatur cum sanguine uersus profundum corporis, quia accidit ex hoc tunc tremor propter frigiditatem membrorum extrinsecorum, & propter mordicationem &

nocumentum accidens in membris sensitiuis. Et quandoque fit tremor etiam propter humorem frigidum effusum super membra sensitiua, sicut tremor qui accidit in febre phlegmatica, & in febre melancholica. Verum ille tremor qui accidit in febre phlegmatica, non fit secundum plurimum in principio febris phlegmaticæ, nisi propter grossitudinem phlegmatis & viscositatem eius: sed in fine quum subtiliatur humor, augeatur tremor paulatim paulatim, ita ut fiat vehemens. In quartana autem seu in febre melancholica, tremor in principio est debilis, quoniam illud quod effunditur super membra ex humore melancholico, est res parua, quia est humor grossus: & in fine fit tremor fortis, quando subtiliatus est humor, & fit currens: & tremor quidem fortis, accidens in fine, est significatio bonæ in hac febre melancholica. Et tremor quidem qui accidit in febre tertiana, ex hoc quod accidit in ea mordicatio sicut punctura acuum, ideo nominatur tremor simplex: (vel secundum aliam litteram, nominatur tremor absolute.) Tremor autem, accidens in febre phlegmatica, est cum frigore sicut nix, & nominatur alcharisie, seu nominatur frigus. Tremor uero qui accidit in febre quartana quia ex eo accidunt dolor membrorum, & grauitas, & dolor in ossibus, nominatur tremor faciens laborare ossa. Et ad febrem quidem tertianam sequuntur uomitus cholera citrina, & solutio uentris cholericæ, & paroxysmi eius longiores sunt circa duodecim horas, quando febris tertiana fuerit pura, & quies seu interpolatio inter paroxysmam & paroxysmum sunt 36. horarum, & periodi eius sunt septem, & terminatur in quatuordecim diebus, sicut dixit Hippocrates. Et in febre quidem tertiana accidunt sitis, & inflammatio, & soda. Et patientes hanc febrem non desiderant ut cum eis aliquis loquatur, aut moueat eos. Et accidunt eis vigilie, & non sentiunt grauitatem in capite. Et quandoque infrigidantur manus & pedes ipsorum, aut propter declinationem caliditatis naturalis & sanguinis ad profundum membri, in quo est putredo: (quando sanguis attrahitur uersus illud membrum, propter caliditatem generatam in eo ex putredine) aut quoniam febris est composita ex febre quotidiana, & ex febre interpolata, cuius materia est extra uenas, & effunditur ad membra sensibilia, sicut dictum est. Et in fine paroxysmorum febris tertianæ sequitur sudor &c. (Alia littera habet, Et foras se infrigidantur manus & pedes, & sequitur ad resolutionem periodorum, seu in fine periodorum, sudor: quoniam humor est subtilis facilliter resolubilis, & expellitur ad superficiem corporis, & liberat infirmum a paroxysmo particulari: & illud non est in febre phlegmatica, propter grossitudinem humoris phlegmatici, & viscositatem eius.)

Et urina est subtilis ignea, propter permixtionem cholera cum aquositate sanguinis & propter multam caliditatem igneam. Et pulsus eorum in principio paroxysmi est paruus, quoniam caliditas non expanditur adhuc in corpore toto: & quum status est propinquus, fit pulsus magnus, uelox, frequens. Fit autem magnus & uelox, propter necessitatem: & fit frequens, propter caliditatem cholera quæ causat necessitatem. Et non est in pulsu diuersitas, nisi diuersitas quæ appropriatur febri: quoniam non est illic materia quæ debilitet uirtutem. Istæ igitur sunt significationes super hanc febrem tertianam, sumptæ ex rebus præter naturam. Significationes autem sumptæ ex rebus naturalibus super hanc febrem, sunt quia ipsa secundum plurimum fit in statu adolescentiæ, & in complexione calida cholericæ, & in tempore æstiuo, & in regionibus calidis siccis: & secundum plurimum accidit corporibus extenuatis, & habentibus corpora macra sicca. Et significatur super hanc febrem cholericam ex rebus non naturalibus, quoniam plurimum accidit eis qui utuntur multitudine ciborum calidorum, & potibus calidis, & exercitijs multis laboriosis, & coitu supra mensuram moderatam. Et iam uidimus multas gentes, in quibus uerificatum est eis accidisse hanc febrem tertianam, ex significationibus sumptis a rebus non naturalibus. Et oportet ut scias, quod hæc febris tertiana est febris acuta, uerum ipsa est salubris, & eius acuitas est propter subtilitatem humoris facientis ipsam: quoniam huiusmodi humor digeritur & resoluitur cum facilitate. Salubritas autem eius a timore, est propter eius acuitatem, id est, propter breuitatem temporis eius: quoniam ipsa separatur a natura: (vel secundum aliam litteram, quoniam dimittit naturam, & facit eam quiescere, & non debilitat ipsam.) Et si natura laborat in hac febre die uno, quiescit in die secundo qui est post ipsam, propter leuitatem materiam seu cholera: quoniam ipsa non est gravis super naturam, uel quoniam ipsa non grauat naturam. Et est sciendum quod ex cholera citrina quædam est quæ generatur in hepate, & sunt quatuor species eius, scilicet pura citrina, & etiam rubea clara, cuius generatio est in hepate, & est tenuior quam pura citrina: quoniam ipsa est ex permixtione humiditatis aquosæ cum illa cholera rubea. Et est etiam alia species quæ dicitur uittellina, & est similis uittello oui crudo: & hæc species est grossior quam illa prima, & eius generatio fit ex permixtione humiditatis grossæ phlegmaticæ cum cholera rubea clara, quæ quidem cholera rubea similatur sanguini subtili: & spissitudo quidem cholera, aut est ex resolutione aquositate, aut ex permixtione uirulentie sanguineæ. Et ex cholera est quæ generatur in stomacho, & sunt tres species eius, scilicet cholera porrina, quæ similatur porris: & cholera zinaria, quæ similatur uiridi aris: & cholera nil, quæ similatur colori.

colori azurro. Et istę tres species generantur in stomacho: ex cibis calidis acutis, sicut piper, sına pis; & alleum, & cepe, & mel, & quę sunt illis similia. Febris aut tertiana non generatur ex istis tribus speciebus cholera; maxime ex cholera potrina & zinaria, quoniā natura expellit ipsam uelociter per superius & inferius, & non moratur in corpore donec faciat accidere febrem: im motertiana fit ex cholera robea, & cholera citrina; & reliquis speciebus cholera; quę generatur in hepate supradictis. Et oportet etiam ut sciat quod febris tertiana, si nō est tertiana pura, non sunt in ea istę significationes, quas diximus, manifestę; sed sunt diuersę secundum mensuram diuersitatis humorum, (vel secundum aliam literam, secundum mensuram diuersitatis permutationis humorum,) quoniā ipsa febris prolongatur non tantum in quantitate temporis paroxysmorum, quę est circa 12 horas, immo etiam in numero paroxysmorum, quoniā fiunt plures paroxysmi quā septem. Et proprietas huius febris tertianę est, qđ patientes ipsam sentiunt in hepate suo inflammationem & feruorem uehementem. Restat autem inquirere quomodo sit possibile, ut cholera citrina & cholera nigra putrescant, quum ambę duę sint siccę. Pro decisione huius dubij, sciendum quod aliqua sunt sicca in complexione & in substantia sua, sicut lapis, & ferrū, & quę sunt illis similia: aliqua uero sunt sicca in complexione & in uirtute sua, & sunt humida seu fluida in substantia, sicut acetum, mel, uinum uetus, cholera citrina, & cholera nigra, & quę sunt istis similia. Huiusmodi enim sunt sicca in uirtute & in complexione, & in substantia sua sunt humida fluida. Et propter hoc istę duę cholere, scilicet cholera citrina, & cholera nigra, putrescunt & corrumpuntur propter humiditatem seu fluxibilitatem substantię suę, & propter solubilitatē seu fluxibilitatem corporis sui & non propter complexionem & uirtutem ipsarum siccarum: *rebusq; estis dōcē*

De cura febris tertianę.

Quia illud ad quod intenditur in hac febre, est duę res, scilicet mala complexio calida sicca, & materia, ideo oportet contrariare istis duabus rebus simul. Mala enim complexionis calidę siccę contrariandum est cum his quę infrigidant & humectant, & materię contrariandum est cū his quę ipsam euacuant. Et quoniā mala complexio est magis dominās in hac febre quā materia, ideo oportet magis declinare ad humectationem & extinctionem quā ad euacuationē. Quare oportet administrare post lenitionem naturę factam cum aqua prunorum, & tamarindorum, & iunbarum, & tereniabin, aliquid de aqua hordei, quoniā ipsa est ex eis quę infri-

gidant & extinguunt febrem, & humectant & mundificant materiam facientem ipsam, per uirtutem absteriuam quę est in ea, & ipsa cum hoc etiam nutrit & conseruat uirtutem. Et oportet ut detur in potu aqua hordei per tres aut quatuor horas ante paroxysmum, aut post eradicationem febris, ut stomachus in hora paroxysmi sit uacuus. Quod si aliquid prohibet exhibitionem aquę hordei, detur in potu aqua cucurbitę, & aqua granatorum, mizorum, aut secaniabin zucarinum. Et cibetur infirmus cum cibis infrigidantibus humectantibus, sicut lactuca, & attriplex, & olus iamenum, & malua, & cucurbita, & citrulli, & quę sunt his similia. Et quando apparet in urina digestio, tunc oportet ut euacuetur materia ex locis ad quę ipsa declinat. Si enim ipsa plus declinat ad stomachum, seu ad os stomachi, euacuabimus eam per uomitum cū secaniabin & aqua calida. Et si declinauerit plus ad intestina, tunc euacuabitur per clysterem lenitiuum. Et si est decliuis uersus superficiem corporis tunc euacuabitur per sudorem. Et si est decliuis ad uenas & ad hepar, tunc oportet euacuare ipsam cum his quę prouocant urinam, sicut est decoctio apij, myrobalanorum, & absynthij, in tertiana pura post digestionem. Absynthium enim est calidum, quare nō oportet exhibere ipsum ante digestionem, ut non sit causa inflammationis febris: sed ipsum est exhibendum post digestionem, ut si aliquid de materia remaserit, subtiliet & leniat ipsam: quia in absynthio sunt duę uirtutes, scilicet uirtus styptica, & uirtus solutiua. Quotiens ergo exhibetur absynthium ante digestionem humoris, non securatur quin ingrossetur materia, & ipsa retineatur sua stipticitate, quare necessarium est ut accidat angustia. Et cū uirtute solutiua quę est in absynthio, mouetur humor ad euacuationem & cum uirtute styptica ipsius, fit illud quod euacuatur difficilis euacuationis, & propter hoc laborat natura, & læditur a duabus uirtutibus simul. Si uero absynthiū exhibeatur post digestionem, & post quā materia fuerit iam subtiliata, tunc facilis fit euacuatio eius, quia duę uirtutes quę sunt in absynthio adiuant ad illud. Virtus n. solutiua ipsius iuuatur cum uirtute eius styptica, quę aggregat & exprimit ad uirtutem expulsiuam, ita ut expellatur humor, & moueatur etiam ad expulsionem.] Si autem febris tertiana fuerit pura, tunc oportet ut præcipiatur infirmum balneari ante quā appareant signa digestionis, quoniā illud exinguit per naturam propter aquam, & cū hoc humectat & exinguit etiam per accidens, quoniā balneum euacuat materiam facientem febrem. Et administramus quidē ipsum balneū ante digestionem, quoniā qualitas in hac febre ē magis dominās quā materia, & materia ē et est facilis resolutionis, & non timeur qđ ipsa

ns pissetur & non resoluatur, & faciat accidere oppilationem. Et si infirmus magis diligit ut infundatur seu sedeatur in tina, tunc concedatur ei illud, quoniam non est ex eis quæ nocent, immo iuuat, quoniam lenitur & rarificatur corpus cū huiusmodi tina, & per eam fit resolutio superfluitatum, & acquisitio eius quod acquiritur ex uirtute aquæ. Et si infirmus fuerit consuetus balneo, oportet ut infirmus ingrediatur balneum vicibus duabus in die, & fiat balneum primo propter ægritudinem, & secundo propter consuetudinem. Si uero febris tertiana fuerit non pura, aut fuerit febris quotidiana aut quartana, tunc oportet ut infirmus non balneetur ante digestionem, quoniam materia in istis est dominans difficilis resolutionis: & non oportet ut precipiatur eis balneum ante digestionem, ut non effundatur seu non moueatur materia, & non faciat accidere oppilationes & apostema, & non corrumpatur ex permixtione materiæ effusæ, illud quod prius nō erat aptum corrumpi, Quum uero apparuerit digestio, & facta fuerit facilis resolutio, tunc precipiatur patientibus has febres, ut ingrediatur balneum.

De cura tertiana non pura.

In cura tertianæ non puræ sunt duæ res, quarum una contrariatur alteri, scilicet uirtus & multitudo materiæ quoniam multitudo materiæ indiget ieiunio, ut natura euacuet & subtiliet humorem, & facilis sit ei resolutio: uirtus uero indiget cibo, ut non prosternatur & debilitetur. Quare ille qui intendit curationem bonam & perfectam, oportet ut incēdat uia media seu mediocri, & exhibeat cibum die uno, ut conseruetur uirtus: & dimittat cibum die alio propter materiam, ut non multiplicetur materia, & grauetur, & ut non prosternatur uirtus propter ieiunium, quoniam sicut ieiunium cōfert multitudinī materiæ, similiter nocet uirtuti: & sicut cibus intenditur uel exigitur à uirtute, similiter cibus non conuenit multitudinī materiæ. Quare oportet (sicut diximus in his quæ præcesserunt) ut resistatur illi quod ex eis est magis difficile, & magis proficuum seu necessarium. Si uero uirtus fuerit permanens, precipiatur infirmo ieiunium. Quod si uirtus non fuerit stabilis, tunc fiat e contrario. Et sit studium nostrum circa uirtutem proprie, non in hac ægritudine tantum, immo in omnibus ægritudinibus quæ sunt ex repletionē. Et oportet ut infirmus assidue administrationem uomitus, post cibaria subtiliantia quæ abstergūt. Et si natura fuerit sicca, tunc oportet ut administrentur clyster acutus, quoniam humor faciens hanc febrem, est grossus, uiscosus compositus, difficilis euacuationis, propter commixtionem eius cum phlegmate. Quod si prohibeat aliquid à

clystere, & uolumus euacuare ipsum per superius, & uirtus fuerit debilis, & caliditas fuerit uehemens, tunc oportet euacuare eum cum syrupo rosarum, aut cum geleniabin aut teteniabin aspersis cum aquis, aut cum aqua libleb, & cum uiolis siccis. Si uero uirtus fuerit fortis, permansens, & materia fuerit dominans fortis, tunc oportet euacuare infirmum cum pilulis factis ex aloë, & mastice, aut cum pilulis de eupatorio. Illa autem quæ iuuant iuamento magno, sunt pilulæ istius descriptionis. Rec. hieræ pittæ dr. 5. succi absynthij, & succi eupatorii, omnium an. dr. 3. seminis apij, myrobalanorum citrinorum, & myrobalanorum nigrorum, omnium ana drac. 4. salis indi drac. 2. trochiscorum de rosis dr. 5. turbith drac. 7. Summa medicinarum est numero 8. terantur, & cribellentur, & misceantur cum aqua apij, & fiant pilulæ, & exhibeantur ex eis drac. 2. cum aqua tepida in nocte. Quod si natura fuerit lenis, & non indigeat medicina solutiua, tunc damus eis in potu aquam cum syrupo acetoso. Et si indigent aqua hordei, tunc decoquantur radices apij & feniculi cū aqua hordei, quoniam ipsa confert istis febribus per illud, quod est in ea de abstersione & de frigiditate & de humectatione, ita ut expellat febrem. Et hæc quidē aqua contrariatur complexionī phlegmatis, & qualitas frigida aquæ frangitur permiscendo cū ea radices apij, & radices feniculi. Gale. uero permiscebat cum ea piper. Et cibentur febrientes si materia fuerit grossa, cum aqua cicerum. Quod si caliditas fuerit magis dominans, tunc cū sicca, & asparagis: quoniam ista quamuis sint subtilia humida, tamen prouocant urinam. Et post septimū diem exhibeatur decoctio absynthij, sicut dixit Gale. in lib. ad Glauconē, quoniam subtiliat materiam, & confortat stomachum, & post diē 14. &c. (uel secundum aliam litteram, Et post septimum diem exhibeatur decoctio absynthij, sicut dixit Gal. in lib. ad Glauconem, quoniam materia est grossa & caliditas pauca: & propter illud exhibetur absynthium, ut subtiliet materiā, absque quod timeatur quod ipsum moueat materiam sua caliditate, sicut diximus in tertiana pura. Et exhibetur etiam absynthium ut confortet stomachum, qui secundum plurimum debilitatur per hanc febrem, quæ est causa generationis phlegmatis, sicut facit in febre quotidiana. Et post diē quartum decimum) detur in potu aqua feniculi, & aqua apij cum geleniabin & trochiscis de rosis. Quod si prolongatur hæc febris, detur in potu decoctio eupatorii, & cœgatur infirmus cautela uehementi, ut in eo non prolongetur febris, sicut prolūgata est febris quā dixit Gale. in libro ad Glauconem. Incepit enim illa febris in autumno, & non est eradicata usque ad tempus peris, & paroxysmi eius in principio erant 14. horarum, deinde prolongati sunt, ita ut

neperdurarent uiniquatuor horis. Et oportet ut caueatur infirmus à balneatione ante digestionem, quoniam si fiat illud, tunc accidentia nocumenta, quorum unum est quod materia facies hanc febrem, ex hoc quod permixta est cum humore grosso phlegmatico, si fuerit comota seu effusa, & non fuerit resoluta, generatio oppilationem & putredinem. Secundum nocumētum est, quia materia putrescens retenta in membro, quando calefit ex balneo, & effunditur permiscetur cum humiditate quæ est in corpore non putrefacta. Tertium uero nocumētum est, quod quando euacuatur illud quod est subtile de materia, tunc difficilis fit resolutio eius quod remanet de materia propter suam grositiam.

De febre quotidiana, seu de febre phlegmatica.

Cap. XIIII.

Hæc febris fit ex phlegmate quod putrescit à caliditate præternaturali, quoniam hæc caliditas quumegerit in humiditatem aggregatā in corpore, calefacit eā & putrefacit ipsam aut intra uenas & arterias, aut extra ipsas, scilicet in stomacho & locis vacuis qui sunt in nobis extra uenas & arterias. Et illa quidem materia phlegmatica quæ putrescit intra uenas & arterias, non facit frigus in membris, ex hoc quod ipsa non effunditur ad ea. Materia autem phlegmatica putrescens extra uenas, facit febrem cum periodis, in quorum principio causatur & sentitur frigus in membris, propter causam quam infra dicemus. Et oportet ut scias quod hæc febris cognoscitur, seu discernitur à reliquis alijs febribus putridis ex causis præternaturam, & ex causis naturalibus, & ex causis quæ non sunt naturales. Significationes uero super hanc febrem sumptæ ex rebus præternaturalibus, sunt secundum quod dicemus. Nam patientes hanc febrem, sentiunt in principio eius frigus, propter illam partem phlegmatis quæ adhuc non putrescit, & in fine sentiunt horripilationem, propter illud phlegma quod iam putrescit & calefit. Et ascensio quidem caliditatis prolongatur in statu, quoniam phlegma est difficilis digestionis & calefactionis, propter suam frigiditatem & humiditatem, & propter grositiam suam. Et caliditas habentium hanc febrem, est calida humida cum acuitate parua. Humiditas autem eius est propter humiditatem phlegmatis & multitudinem ipsius. Acuitas autem eius est ex putredine, quia eleuantur ex hoc humore putrido summi sicut eleuantur ex lignis uiridibus. Et non serit illa caliditas quoties ponit manus super corpus, nisi postquam morauerit tempore longo super corpus, quoniam caliditas multiplicatur in profundo corporis, propter grositiam humoris phlegmatici & uiscositatem eius. Quumque rarificatum fuerit corpus, & subtiliatum

fuerit materia, tunc eleuatur caliditas & apparet eius essentia. Pulsus autem patientium hanc febrem, est paruior multum quam pulsus habentium febrem quartanam, quoniam humor phlegmaticus non dissoluit uirtutem suam frigiditate tantum, immo cum sua multitudine, quoniam humor phlegmaticus addit supra humorem melancholicum additione multa, seu quoniam humor phlegmaticus est multo plus quam humor melancholicus. Et pulsus etiam istorum est spissior, quia diminutio ipsius pulsus à magnitudine cum inflammatione, seu putrefactione humoris phlegmatici multi, attrahit seu causat spissitudinem in pulsu. Et urina istorum febrientium in principio est subtilis alba, propter cruditatem humoris phlegmatici, in fine uero eius febris, & in hora declinationis, fit rubea grossa, & hoc quando recipit humor digestionem & euacuatur. Et quando prolongata fuerit hæc febris, apparet in facie patientis febris trechel, id est, tumefactio similis cachexie, & magnitudo splenis, & illud propter grositiam materię. Et color corporis fit declinatus ad uiriditatem propter frigiditatem phlegmatis. Et paroxysmi istius febris secundum plurimum fiunt in uespere, quoniam ista hora est hora digestionis. Et egestionem istorum sunt humida ualde, permixte cum phlegmate, si non fuerit complexio infirmi calida. Et tempus paroxysmorum huius febris est decem & octo horarum, & eorum dimissio est .6. horis. Et non eradicantur paroxysmi eradicatione completa propter grositiam materię, quoniam corpus non mundificatur ab his paroxysmis, sicut mundificatur in tertiana, quoniam materia eius est subtilis. In hac autem febre phlegmatica caliditas est conculcata in interiori corporis, & propter grositiam materię corpus non mundificatur ab ea. Et accidit istis febrientibus dolor stomachi, & uomitus multus phlegmatis. Et non est in declinatione febris sudor, immo est eradicatio paroxysmi absque sudore, propter grositiam humoris & uiscositatem eius, & propter hoc non mundificatur ab ea corpus, sicut mundificatur in tertiana & in quartana. Et os ipsorum est humidum plenum salua, & minoratur sitis eorum. Et si sitiunt non sitiunt propter phlegma immo propter caliditatem & putredinem eius, sicut accidit eis qui comedunt pisces recentes, & ficus, & batecam, & quæ sunt illis similia, quoniam sitis accidit istis non propter naturam comestorum, quæ diximus, sed propter caliditatem existentem in stomacho. Similiter etiam accidit sitis in istis febrientibus, non propter naturam phlegmatis, sed propter caliditatem & putredinem quæ est in eis. Ista igitur cum quibus cognoscitur hæc febris sunt ex eis quæ sunt extra naturam. Ex rebus autem naturalibus cognoscitur hæc febris secundum hunc modum, quoniam ipsa secundum plurimum

rimum accidit habetibus complexionem phlegmaticam, in ætate pueritiæ & senectutis. Et non accidit quidem pueris proprie nisi propter gulositatem eorum, in senibus uero propter multitudinem phlegmatis dominantis in eis, & propter paucitatem caliditatis in ipsis. Et post istos accidit etiam eis qui sunt multum gulosissimi regimine suo, & illis qui sunt humide complexionis. Et plurimum accidit in hyeme, & in regionibus & in partibus frigidis humidis. Et hæc quidē febrem cognoscitur etiam ex rebus non naturalibus, quoniam ipsa secundum plurimum accidit eis, qui utuntur malo regimine, & ocio multo, & eis qui non digerunt cibum suum frequenter, & eis qui multiplicat balneum proprie post cibum. Et proprietas huius febris est dolor stomachi & ventris, & tumefactio cachectica manum & pedum & quandoque faciei etiam, & color habentium hanc febrem est declinans ad albedinem. Et oportet ut scias quod hæc febris prolongatur, & non securatur patiens eam à perditione. Prolongatio autem eius est quoniam phlegma quod est causa ipsius, est grossum, frigidum, viscosum, tardæ digestionis, difficilis resolutionis. Et in ea est magnus timor, quoniam natura laborat omni die, & non permittit eam quiescere die uno integro, & quoniam os stomachi secundum plurimum est læsum, ita ut ex læsione ipsius accidat syncope, & prohibitio à cibo, & malitia digestionis. Causa autem propter quam huiusmodi febris non facilius eradicatur, immo prolongatur tempore, est multitudo phlegmatis, & grossities, & viscositas, & frigiditas eius.

De cura febris phlegmaticæ.

Curatio quidem huius febris, uniuersaliter in principio suo, post tres aut quatuor dies, est cum rebus que subulant & incidunt, sicut scabiant & que prouocant urinam. Et oportet ut exhibeantur in hac febre ea que leniunt uentrem, & sit studium ad os stomachi. Iam enim diximus quod proprietas huius febris est, ut sit eundem dolore stomachi, nam plurimum quod in eo aggregatur est iste humor phlegmaticus. Quare oportet ut sit studium in reo, proprie in hora difficili febris, (uel secundum aliam literam, proprie in hora status,) quoniam in hac hora quando materia est digesta necessaria est euacuatio eius cum uomitu & solutione ventris, & cum emplastris confortantibus. Et hæc omnia quando non administrantur secundum quod oportet, tunc emplastra & alia, lædunt & contrariantur stomacho. Curatio autem bona ad hanc febrem, à principio usque ad diem septimum, est cum geleniabin cum aqua calida solum. Sed post hunc diem, scilicet in octauo, oportet ut misceatur cum geleniabin aliqua ex medicinis, que confortat sto-

machum & uentrem, & prouocant urinam, prouocatione forti, sicut mastix & anisum. Aut exhibeantur istæ medicinæ singulariter, aut decoquantur ipse, & exhibeatur decoctio ipsa cum geleniabin. Et oportet ut sit quantitas geleniabin & medicinarum secundum ætatem & complexionem. Et est necesse ut ipsi prohibeantur à potu aquæ frigide, quoniam ipsa ingrossat materiam & auget quantitatem eius, & propter hoc prolongat hanc febrem. Immo loco eius administrata aqua calida, proprie in principio paroxysmi, quoniam sedat frigus accidens in hac hora, & subtiliat materiam, & sedat sitim si accidit, quoniam quando resoluitur materia, & deponitur ex stomacho, sedatur sitis si accidit eis, prout si accidit sitis ex phlegmate salso. Et si patientes hanc febrem indigent lenitione naturæ, exhibeantur eis geleniabin & terebinthin cum aqua calida, aut cum aqua luleb non bullita cum penidijs, (uel secundum aliam literam, aut cum aqua luleb non calefacta cum penidijs.) Et ex hominibus sunt, qui uolunt ut ponatur cum aqua luleb medulla carthami, quoniam medulla carthami euacuat humorem phlegmaticum. Et ex hominibus sunt, qui exhibent uioles siccas & zucharum. Et melius istis est clyster lenitiuus in principio, & post illud clyster acutus. Et si indigent aqua hordei, tunc decoquatur in ea de corticibus radicum apij, & radicum feniculi, pondus vnc. i. & exhibeatur cum tantundem secaniabin factum cum melle bono. Quod si aqua hordei accessit in stomacho eorum, tunc oportet ut loco eius exhibeatur aqua mellis decocta, que nominatur Melicratum. Et si accidat patienti hanc febrem uomitus, non oportet ut abscindatur proprie in principio paroxysmi, quoniam alleviat materiam, (uel secundum aliam literam, quoniam resoluit hanc febrem, & eradicat eam.) Quod si multiplicatur uomitus ita ut resoluatur uirtutem seu debilitet uirtutem, oportet ut abscindatur dādo in potu minā cytoniorū & syrupū granatorū factū cum menta. Et ex eis que conferunt iunā mēto maximo est iste syrupus, cuius descriptio est hæc. Rec. granorum granatorum acetosorum paucæ acetositatis drac. i. o. thuris albi, & masticeis, mentijana dra. 7. decoquantur cum duabus libris aquæ donec remaneat medietas, & coleetur, & detur ex eo in potu parum per parumper in hora post horam. Aqua autem prunorū, & rā marindorū, & rob agrestis, & que sunt his similia, non oportet ut exhibeantur, propter suam frigiditatem in hac febre. Quod si non accidat uomitus ab expulsionē naturæ, tunc oportet ut prouocetur cum arte, cibando infirmum cum raphano infuso in syrupo acetoso, & post dādo ei in potu aquam calidam, in qua decoctum sit anethum, & calamentum, & aliquid de sale permixtum cum syrupo acetoso, in quo iam fuit infusus rapha-

nus. Quumq; uomuerint, tunc mastificent aliquid de mastice, & aniso, aut menta, ut confortetur stomachus eorum. Quod si acciderit eis post uomitum soda, tunc oportet ut detur eis in potu post uomitum, calametum, ut resoluatur materia, (vel secundum aliam literam, tunc oportet ut fomententur seu embrocetur cum uapore aquæ, in qua decocta sit camomilla, ut resoluatur materia, deinde ponantur manus & pedes ipsorum in illa aqua calida.) Et si oportet, stringantur crura cum strictione uehementi, ut attrahatur materia ad inferiora. Et non oportet ut administrentur oleum nisi cum hac materia permixta fuerit cholera. Nam si non fuerit illud, uel si non fuerit ita, & administretur oleum & res humectantes, tunc prolongatur febris, & augetur soda, & ingrossatur materia, & prohibetur eius resolutio. Et post hoc oportet considerare qualitatem ægritudinis, & quantitatem uirtutis. Si enim uirtus fuerit fortis, subtiliabitur cibum eorum, proprie si iam appropinquat hora status. Quod si uirtus fuerit debilis, & non expectat statum ægritudinis, tunc oportet ut isti cibentur post diem septimum, & ingrossetur regimen, & quum appropinquat hora status tunc ponatur regimen eorum subtile, ut non occupetur natura in digestione cibi, & ut ipsa non impediatur a pugna ægritudinis, seu a pugna contra ægritudinem. Quod si uirtus fuerit debilis, & status ægritudinis fuerit longinquus, tunc oportet ut administretur cibum medioeris inter subtilem & grossum, & administramus ex eo in principio plus parumper, & in statu aliquid modicum, nisi sit uirtus debilis, & status propinquus, tunc enim oportet ut resistatur ei ad quod magis exigit necessitas, uel ut resistatur ei quod est fortius & difficilius duarum rerum. Et sit studium in conservando uirtutem. Si enim uirtus est debilis, & status ægritudinis est longinquus, tunc oportet ut incedatur uia media, ut non prosternatur uirtus, & non ingrossetur materia ex multo cibo. Post statum uero oportet ut augeatur cibum, secundum quod ex eo est facta minoratio ante statum, & ut fiat permutatio ex pauco cibo ad multum parumper parumper, (uel secundum aliam literam. Post statum uero oportet ut augeatur cibum, secundum quod ex eo facta est minoratio ante statum sicut, n. a principio ægritudinis cibum paulatine paulatine minoratur, procedendo ex multo cibo ad modicum cibum, uersus statum, similiter post statum oportet ut augeatur cibum, paulatim paulatim procedendo ex pauco cibo ad multum cibum. Et oportet quidem ut sit hora cibi ante eradicationem febris, aut ante paroxysmum per tres aut quatuor horas, ita ut quando superuenit febris occurrat stomacho mundo, (vel secundum aliam literam, ita ut quando superuenit febris, inueniat stomachum vacuum,) quoniam febris quando super-

uenit, & in stomacho fuerit cibus, tunc ipsa fortificatur & augetur ualde. Virtus enim debilitatur a mala complexionem febrili, & non alteratur cibum, & quum non alteratur seu non digeritur cibum, tunc ipse efficitur materia febris. Cibus autem patientium hanc febrem sit aqua ciceris, & sicla, & asparagi elixati cum oleo abluto, aut muri. Potus autem eorum, si materia non fuerit multa grossa, sit secaniabin. Quod si materia fuerit congelata grossa, tunc secaniabin est nocuum malum, quare oportet ut potus sit aqua mellis, & aqua zucchini. Et si ægritudo prolongata fuerit, & pertransierit dies 14, tunc detur in potu aqua endiuie, & aqua feniculi, & aqua apij cum geleniabin, & trochisci de rosas cum aqua endiuie, & cum melle colato. Et conferunt eis semper pilule de aloe, & mastice, & pilule de eupatorio, & pilule alefagineæ, aut pilule huius descriptionis, quæ conferunt febribus phlegmaticis, & mudificant caput & stomachum. Rec. hieræ picæ dra. 7. turbit albi mundi drac. 10. myrobalanorum nigrorum dra. 5. trochiscorum de rosas dra. 4. salis indi drac. 3. sucaba, bedauard, omnium ana drac. 4. anisi drac. 3. herbe eupatorii drach. 4. Summa medicinarum est numero 9. terantur, & cribellentur, & misceantur cum aqua apij bullita, colata, & fiant pilule, & dentur uni cuique homini secundum quantitatem uirtutis. Quod si eradicatur febris cum hoc, exhibeatur hæc decoctio. Rec. radices apij, radices feniculi, radices, liquiritiæ rasæ, omnium ana drach. 10. radices squinanti drach. 7. anisi drac. 3. mastice, rosarum herbe eupatorii, absinthij, omnium ana drach. 7. bedauard drach. 5. sucaba drach. 4. passularum enucleatarum drach. 20. myrobalanorum citrinorum mundatorum a suis ossibus drach. 10. corticum myrobalanorum mundatorum nigrorum dra. 7. decoquantur cum lib. 4. aquæ donec remaneat lib. 1. coletur, & detur ex ea in potu tertia pars libræ cum vnc. 1. geleniabin aut secaniabin. Decoctio alia ad febrem antiquam. Rec. eupatorii drac. 20. sucaba, & bedauard, absinthij, & granorum seu minimum capparum, coriandrorum siccorum, omnium ana drach. 7. corticum myrobalanorum citrinorum, sumiterræ, omnium ana drach. 10. decoquantur cum lib. 3. aquæ donec remaneat libra, & coletur, & detur in potu tribus diebus. Quod si frigus fuerit uehemens, exhibeatur hæc decoctio, cuius descriptio est. Rec. herbe eupatorii drac. 5. ameos dra. 2. seminis feniculi, apij omnium ana drach. 4. corticum radicum tribulorum, radicum squillæ, omnium ana drach. 7. cherchean drac. 6. rosarum rubearum drac. 5. origani drach. 3. decoquantur cum lib. 4. aquæ donec remaneat libra, coletur, & detur in potu ex ea tertia pars libræ in ieiunio dum est tepida. Decoctio ad febrem longam cum qua est frigus

gus uehemens. Rec. origani, & ameos, rosarum, omnium ana drach. 3. coriandri sicci drach. 4. calamamenti fluuiialis drach. 5. passularum enucleatarum drac. 7. zinziberis drach. 3. decoquantur cū lib. 3. aquæ donec remaneat libra, & coletur, & detur ex ea in potu tertia pars libræ dum est calida. Et ex eis quæ sedant frigus uehemens in hac febre, est ut ponatur sub ipsis febrientibus aqua bulliens, in qua decocta sint chamemilla, & melilotum, & maiorana, & quæ sunt his similia. Et quando inungitur corpus etiam cum oleo de sccha, [] & alchaisun, aut oleo de costo & sedatur frigus. Et non oportet ut febrientes cibentur cum pullis, neq; cum franculinis, donec declinet febris, & minoretur, nisi prosteratur & debilitetur uirtus. Quod si accidat in facie & in pedibus tumefactio cachectica, tunc oportet ut dentur in potu ex istis trochiscis. Trochisci qui conferunt tumefactioni cachectica, accidenti in facie, ex febre phlegmatica cum frigore. Rec. anisi drac. 5. amygdalarum excorticatarum drac. 4. florū squinati drac. 3. lacte ablute drac. 5. reubarbari dra. 6. croci drac. 3. hierę picrę drac. 7. succi eupatorii drac. 3. se. feminis apij, & feniculi, omnium ana drac. 3. mentę siccę dra. 4. spicę, rosarum ana. drac. 6. Summa medicinarum est numero. 13. terantur, & cribellentur, & misceantur cum aqua solatri, & fiant trochisci, & dentur in potu cum aqua calida, aut cum decoctione radicum. Et si exigit necessitas, dentur in potu confectioes quæ sunt sicut diacurcuma, & omorusia, & diacostū. Et ex eis quæ conferunt iuuamētum magnum, sunt trochisci quos scripsit Gal. in libro decem tractatum, seu in libro māmīr. Descriptio trochiscorū ex decem medicis, qui cōferunt febris phlegmaticę antiquę, & frigori accidenti, & tumefactioni cachectica accidenti in facie & manibus & pedibus. Rec. anisi drac. 4. succi eupatorii, folij indi, assari, spicę, absynthij, amygdalarum excorticatarum, masticeis, omnium ana drach. 3. feminis apij drac. 1. aloes drac. 4. terantur & cribellentur, & misceantur cū aqua apij, & fiant trochisci, & dentur in potu cum aqua tepida, aut cum aqua foeniculi, aut cum syrūpo acetoso. Et oportet ut scias, qd si hac febris fuerit non febris phlegmaticę putrida, & fuerit ei permixta putredo cholere citring, tunc oportet ut capeas ab omni quod est uehementis caliditatis, seu ab omnibus ualde calefactientibus. Et in summa dico, qd oportet ut intendatur curatio uersus humorem qui dominatur. Si enim fuerit permixta cholera nigra cū phlegmate, & ingrossauerit ipsum, tunc oportet ut curetur cum his quæ calefaciunt calefactione sufficienti sicut cū trochiscis de absynthio, cum aqua radicum, aut confectioe de caulibus, (vel secundum aliam literam, aut confectioe cū sulfure, aut confectioe diapi pereon, aut theriaca,

aut diacymino, & quæ sunt illis similia.

De febre quartana. Cap. XV.

SVper hanc quidem febrem sumitur etiam significatio ex rebus præternaturalibus, nam ad ipsam præcedit aduentum aliarum febrium putridarum secundum plurimum, erraticarum seu permixtarū. Humor enim faciens accidere hanc febrem quartanam, non fit secundum plurimum, nisi ex adustione aliorum humorum, scilicet ex adustione sanguinis, aut cholere aut phlegmatis, aut melancholie naturalis. Vnusquisque istorum humorum dum putrescit in febre putrida, aduritur, & incineratur à calore febrili, unde ex putredine febrili maxime chronica, alicuius istorum humorum paulatim generatur & congeritur humor melancholicus, non naturalis, adustus, qui post aliquam istarum febrium multiplicationem mouetur ad putredinem, & causat febrem quartanam. Et si dubitatur, qualiter humor adustus, incineratus, à calore febrili putrido, possit post aliquam febrium prædictarū de nouo putrescere, & causare aliam febrem quartanam putridam, quum sit humor siccus, adustus, & incineratus, aptus resistere putredini? Dicendum qd in capitulo de tertiana, declaratum est, qd licet humor cholericus, & humor melancholicus, sint sicci in complexionem & in uirtute sua, tamen in substantia sunt corpora fluida apta putrescere. Similiter dicatur qd licet humor faciens febrem quartanam, secundum plurimum, sit humor, non naturalis, adustus, & incineratus à calore putrido febrili, & habeat complexionem & uirtutem siccam, tamen quia substantia huiusmodi humoris incinerati est corpus studium aptum putrescere, sicut humor cholericus, & humor melancholicus, naturalis, ut dictum est, ideo uerificatur qd febris quartana succedit secundum plurimum post febrem putridam, sanguineam, aut phlegmaticam, aut melancholicam naturalem, aut post febrem cholericam. Ex rebus igitur præternaturalibus sumitur significatio super febrem quartanam interpolatam aut continuam, quia huiusmodi febris secundum plurimum fit post alias febres putridas, erraticas seu permixtas, maxime post febres cholericas, & minus fit post febrem putridam melancholie naturalis. Raro autem accidit quartana non post febres putridas alias, sed incipiendo ex putredine humoris melancholici multiplicati, aut ex egritudine & latione splenis, qui non mundificat humorem melancholicum à sanguine, aut ex multiplicatione comestorum & potuum generantium humorem melancholicum, unde iste humor multiplicatur in uenis supra illud, qd est possibile spleni mundificare. Et in principio quidem periodi quartanę, accidit tremor fatigans corpus, & lædens ipsam

sum. Et tempus durationis paroxismi quartanę si est pura, est. 24. horarum. Et sicum ea est per mixta cholera citrina, minoratur tempus periodi eius. Et si phlegma fuerit permixtum, augetur tempus periodi & prolongatur. Et oportet ut scias q̄ longitudo periodi non est nisi propter grossitiem materię, & multitudinem eius. quoniam ipsius resolutio est difficilis, aut quoniam uirtus est debilis, & non potest eam expellere, aut propter spissitudinem corporis, ita ut ab eo difficiliter resoluitur materia. Et quandoq; prolongantur paroxismi [etiam propter tempus, si cut contingit in febre quę fit in hyeme. Et quandoq; abbreviantur paroxismi propter causas q̄ sunt istis contrarię. Et dimissio huius febris est. 48. horis. Et est corpus mundum, quia materia est sicut cinis. Et est urina in inceptione sua subtilis, alba, cruda. Alba quidem propter humorę melancholicum qui non est digestus, subtilis vero propter siccitatem humoris melācholici qui non est digestus. In fine uero, & in hora declinationis, urina patientium quartanam, est urina nigra, quoniam ille humor melancholicus iam est digestus, & euacuatur per urinam. Et in summa dico q̄ vrina istorum alteratur in hac febre ad spēs, diuersas secundū diuersitatē humorū generantium febrem, ita ut urina in eo in quo generata est febris quartana ex adustione cholę citrinę, diuersa est ab urina eius in quo generata est febris quartana ex adustione phlegmatis, & sic de alijs. Nam secundum diuersitatem speciei humoris melancholici, & secundum diuersitatem generationis eius ex alijs humoribus, fit diuersitas urine in patiētibz ipsam quartanā. Pulsus autem eorum in principio paroxismi, est paruus, tardus, intersectus seu diuersus, & causa in hoc est frigiditas materię, & grossities eius, & hebetudo ipsius. In statu uero pulsus est magnus, frequens, & causa in hoc est uehementia uirtutis motus eius in illa hora. Et non inuenitur in hac febre æqualitas pulsus, nisi quando inuenitur aliqua quies. Diuersitas autem pulsus reperitur illic propter priuationem æqualitatis. Quando autem pulsus est uelox frequens, sicut fit in febre tertiana, tunc difficile est comprehendere modicum æqualitatis. Et in patientibus quidem hanc febrem, magnificatur splen eorū propter multitudinem humoris melancholici, quoniam splen est minera eius. Et color eorū declinat ad uiriditatem. Et cutis eorū est nigra, secca, arida, propter siccitatem humoris melancholici. Et sudor in eis etiā minoratur. Hęc igitur sunt signa febris quartanę sumpta à rebus præternaturalibus. Signa uero sumpta ex rebus naturalibus sunt ista quę dicemus, quoniā hęc febris quartana secundum plurimum accidit habentibus naturam melancholicam, & i etate consistentiā, & in habentibus complexionem

frigidam & siccam, & etiam in habentibus complexionem calidam siccam, quando in eis adiunguntur humores. Arebus autem non naturalibus sumitur significatio super hanc febrem quoniam ipsa secundum plurimum accidit in tempore autumnii, & in regionibus & partibus frigidis siccis & in eis qui utuntur regimine sicco, & in eis qui assiduunt cibaria generantia humorę melancholicum, sicut caro bouina, & pisces saliti, & caules, & lētes, & caseus antiquus, & quę sunt illis similia.

De cura quartanę.

CVra quidē febris quartanę in principio suo si sanguis fuerit dominās, fit cum phlebotomia basilicę manus sinistrę, aut uenę nigrę. Et si sanguis fuerit niger, oportet ut euacuetur sufficiens euacuatione. Si uero fuerit sanguis rubeus, clarus oportet ut abscindatur & nō moueatur, quoniam non securatur ab euacuatione huiusmodi sanguinis a casu uirtutis. Quod si sanguis non fuerit dominans, non oportet in principio euacuare humorem malum, indigestum, & inobedientem ad exitū & ad euacuationem, propter sui grossitiem. Si enim fiat illud cum medicina solutiua uiolentando humorem prædictum ad exitum, tunc mouebitur humor ille, & agitabitur, & non erit securitas etiam, quin medicina solutiua bibita deficiat ab euacuatione humoris melancholici peccantis, & extrahat illud q̄ non oportet euacuare, unde lædatur corpus duobus modis, quorum unus est q̄ euacuat illud q̄ erat conueniens corpori, secundus modus est quia approximat ei aliquid quod ipsi nocet. Post apparitionem autem signorū digestionis, oportet tunc exhibere istis febrientibus medicinas euacuantes humorem melancholicum sicut epithimum, & elleborus niger, & polypodium, & mirobalani nigri, & stœchas, & agaricus, & lapidis armenus, & sene, & quę sunt his similia. Et cibentur isti cum cibis laudabilis humoris, ut ab eis uincatur ille humor malus. Et quoniam humor melācholicus est frigidus siccus, oportet ut cibentur cum cibis calidis humidis, ut subtilient sua caliditate, & faciliter faciant currere materias sua humiditate. Et cum hoc etiam oportet ut sint subtiliatiui, resolutiui inflationum, lenientes naturam. Subtiliatiui quidem, ut subtilient grossitiem humoris melancholici, resolutiui uero, inflationum ut resoluāt inflationes & uentositates generatas ab humore melācholico in stomacho & splene. Sint autem lenientes naturam, ut prohibeatur aggregatio superfluitatū in corpore. Si enim nō lenit natura cū cibis sicut oportet, administrabimus clysteres lenes in principio, ad leniendum siccitatem humoris, & humectandum, & ad præparandum ipsum ad euacuationem,

tionem, deinde post illud administrentur eliores fortes, quoniam ad grossitiem illius humoris non sufficit operatio levis seu pauca. Et sit studium in eo quod facit humorem obedientem ad euacuationem, & administretur comestio altharich, & sinapis aliquibus diebus, non secundum viam cibi, sed secundum viam medicinę subtiliatis sua qualitate grossitiem istius humoris melancholici. In substantia autem huiusmodi comestorum non est iuamentum de quo sit curandum, quoniam humor qui generatur ex pisce salito, qui nominatur altharich, est melancholicus, quoniam piscis predictus ex natura piscis est frigidus & grossus, & ex natura salis est ficeus. Et secundum hanc semitam administratur quandoque, sed raro, confectiones calidae, sicut cyminum, & diapipecon, ut sua caliditate subtiliet humorem melancholicum. Et fiat illud non contigue, sed diebus intermediantibus ut non resoluetur subtile & remaneat grossum, & etiam ut resoluetur residuum humoris melancholici, ita ut fiat fluidum & aptum effundi & euacuari eius lenitate seu facilitate. Et oportet ut istis administretur exercitium deambulationis & frictionis temperatum, cum huiusmodi enim regimine est possibile ut rarificetur cutis, & subtilietur materia, & resoluetur pars eius. Balneum autem oportet ut caueatur omnino, aut minoretur ingressio in ipsum, quoniam accidit in balneo ut effundatur materia ad membrum aliquod, & accidet illi grossities & corrumpetur, & etiam illud quod de ea est subtile, resoluetur in balneo, & quod est grossum lapidificabitur, sicut diximus. Et ille humor grossus perueniens ad porositates latas seu rarificatas ex balneo, oppilabit eas. Quando vero appropinquat status oportet ut administretur regimen subtile, & paucitas motus, ut non abscindatur seu impediatur pugna naturę. Et assidue ut administratio medicinarum quę euacuant humorem melancholicum, quoniam ipse iam est digestus, & subtiliatus, & preparatus ad euacuationem. Et oportet etiam ut tunc exhibeatur theriaca, quoniam ipsa subtiliat, & si fuerint aliquę reliquę humoris, resoluit & euacuat eas. Et exhibeantur medicinę similes istis, sicut medicamen de assa fetida. Verum oportet ut scias, quod si erimus ausi exhibere has medicinas antequam appareant signa digestionis, & antequam adueniat status ægritudinis, tunc deficiet ab euacuatione humoris, & agitata materia solum, & effundetur & curret. Quod si effundetur, permiscebitur cum humoribus bonis, & alterabit eos, & conuertet ipsos ad sui naturam. Et si fiet hoc in membro vno solum, tunc accidet magnum nocumentum, & fiet febris magna, difficilis, mala species. Et si materia ista melancholica putrescit in duobus membris, tunc ex ea fiet inflammatio duarum

quartanarum. Et si putrescet in tribus membris tunc fiat tres febres quartanę. Et oportet ut in principio & in fine huius febris, sit sollicitudo proprie cum his quę conueniunt hepati & spleni. Hepati quidem, quoniam ipsum est causa inflammationis & adustionis sanguinis, spleni vero, quoniam ipse recipit fecem illius quod inflammatur & aduritur. Et oportet ut exhibeatur in principio continue secaniabin, quoniam ipse confert istis duobus membris, scilicet hepati & spleni. Post hoc autem, scilicet in finem quum digesta fuerit materia, exhibeatur isti trochisci, qui conferunt hepati & spleni, in febre quartana facta ex adustione cholere citrinę & sanguinis, [Rec. succi eupatorii drach. 3. scolopendrię drach. 5. ravedsceni, & laccę, omnium ana drach. 4. spodij drach. 5. seminis citrulli, seminis portulacę, omnium ana drach. 4. rosarum, berberis, omnium ana drach. 7. spicę drach. 4. seminis cuscute drach. 6. anisi, & seminis apij, & seminis feniculi, omnium ana drach. 3. radicis capparum drach. 4. croci drach. 2. granorum alben drach. 4. seminis endiuie, seminis cucumeris, omnium ana drach. 2. terantur & cribellentur, & comisceantur cum aqua apij, & fiant trochisci, qui exhibeantur cum secaniabin, aut cum aqua feniculi & endiuie & cuscute. Et quandoque iuuantur isti etiam cum trochiscis absynthij, & cum administratione vomitus. Et precipue infirmo ut utatur ieiunio in die paroxysmi, & proprie ei cuius febris est ex adustione phlegmatis, & ei etiā cuius febris est ex adustione sanguinis. Quandoque confert ieiunium quoniam sanguis propter suam humiditatem indiget ut subtilietur cum ieiunio, & cum his quę sunt illis similia. In eo autem cuius quartana est ex adustione cholere citrinę, non oportet ut administretur ieiunium nisi prolongetur valde. Si enim prolongatur & apparuerint signa humoris frigidi grossi, oportet exhibere in potum istam decoctionem, quę confert febre quartanę factę ex adustione phlegmatis, & datur in potu post digestionem. Rec. seminis apij, anisi, corderij, omnium ana drach. 5. ameos drach. 4. origani sylvestris drag. 7. radicis chercherheam drach. 3. passularum enucleatarum drach. 20. eupatorii drach. 10. calamenti montani drach. 10. (vel scđm aliam literam drach. 5. decoquantur cum 3. libris aque donec remaneat libra, & detur in potu ex ea tertia pars librarum dum est tepida, non in die paroxysmi, immo administrentur in die paroxysmi vomitus, & ieiunium post ipsum. Et quandoque iuuantur etiam iuamentum magno in hac febre quando prolongatur, cum hoc medicamine, cuius descriptio est. Rec. ameos drach. 10. carui drach. 7. piperis drach. 3. assę fetidę drach. 5. zinziberis drach. 4. calamenti montani drach. 10. cassie lignę drach. 5. spicę drach. 10. terantur

terantur, & cribellentur, & commisceantur cum melle, & exhibeatur ex eo pondus drach. 1. cum aqua apij & sceniculi. Et post hoc etiam exhibeantur ista pilula in qualibet hebdomada quarum assumptio valde confert quartana, quando exhibentur post digestionem, quarum descriptio est. Recip. epithymi drach. 10. ameos drach. 8. anisi, seminis apij, seminis sceniculi, omnium ana drach. 3. turbith drach. 10. salis indra. 5. polypodij dra. 7. hiera picra dra. 10. agarici dra. 8. terantur medicinae, & misceantur cum hiera picra, & conficiantur cum aqua mentae, & fiant pilulae, & detur in potu ex eis. drach. 1. sem. cum aqua calida, in principio noctis. Et quidam sunt qui administrant piper nigrum solum & quandoque administratur hoc in hora declinationis. In principio autem aegritudinis, oportet cauere ab administratione medicinarum calidarum, ut non duplicetur febris, sicut diximus ante.

De febre hemitritaea. Cap. XVI.

HAec quidem febris non nominatur hemitritaea, nisi quoniam eius medietas est febris tertiana, & altera medietas est febris phlegmatica, quare efficitur haec febris composita ex istis duabus febribus. uerum una ipsarum est exterius, scilicet tertiana, & altera interius, scilicet phlegmatica. Et haec hemitritaea est vera, pura. Et non nominatur hemitritaea pura, nisi quando una istarum duarum febrium est interius, & altera exterius, quaecunque ambarum fuerit, tertiana aut phlegmatica. Quoniam si omnes simul fuerint exterius aut interius, tunc ista febris quando componitur secundum hunc modum, non nominatur hemitritaea, sicut dixit Hippocrates in primo libro epidimiae, quod haec febris non tolerat periodos seu dimissionem febris, in quantum ipsa est continua, secundum uero modum alium ipsa tolerat periodicationem seu dimissionem febris: (vel secundum aliam literam, sicut dixit Hippocrates in primo libro epidimiae, quod hemitritaea febris non separatur penitus, id est, quod ipsa in quibusdam dispositionibus est continua, & in quibusdam alijs dimittit, & non est continua.) Huius autem febris, scilicet hemitritae, tres sunt species. Aut enim in ea dominatur cholera citrina: & apparent in ea istae significationes cholerae, scilicet tremor accidens habenti eam subito, & vomitus cholerae citrinae, & urina cholerica, & amaritudo uehemens, (vel secundum aliam literam, & caliditas uehemens.) Aut phlegma dominatur in ea, & apparent signa phlegmatis ita ut manus & pedes infrigidentur, & pulsus est tardus diuersus. Aut duo humores in ea sunt aequales, & apparent signa, quae ad se inuicem non superantur in significando magis unum duorum humorum

quam alterum. Et haec est hemitritaea pura. Duae autem aliae species, scilicet illa species in qua dominatur cholera citrina, & species altera in qua dominatur phlegma, non sunt ambae hemitritae purae. Et haec quidem febris die uno est difficilis uehemens, & die altera est quiesca. Et causa in hoc est quia in die primo sunt duae febres, scilicet febris quae est ex cholera, & febris quae est ex phlegmate. In die uero secunda est febris una tantum, scilicet phlegmatica, & ex causa huiusmodi febris, phlegmatica est leuior illa quae fuit in die primo, in quo erant duae febres. Et si quaeratur, quare haec febris nominatur media tertiana, & non nominatur media phlegmatica. Dicendum quod nomen quando est compositum ex duobus nominibus, scilicet ex eo quod est notum, & ex eo quod non est notum, tunc denominatur ex illo quod est occultum, sicut dicitur de composito ex morbo accidentali & homine, quod ipsum est aegrum secundum medietatem, & denominatur a nomine morbi occulti, non a nomine hominis noto. Similiter etiam haec febris non denominatur media phlegmatica, quoniam febris phlegmatica continua est manifeste nota, tertiana uero quia est cum paroxysmis, non est ita manifesta. Et propter hanc causam haec febris nominatur media tertiana, ab illo quod est occultum, non ab illo quod est manifestum.

De cura febris hemitritae.

Oportet ut curetur haec febris hemitritaea secundum humorem dominantem in ea. Si enim ista febris fuerit pura, in qua non dominatur humor cholericus, neque humor phlegmaticus, tunc curabimus eam cum rebus permixtis. Quod si in ea cholera citrina fuerit dominans, & infirmus indigeat lenitione naturae, tunc oportet lenire naturam cum aqua prunorum tamarindorum, & tereniabin, & castia fistula, & dare in potu post lenitionem naturae, aquam hordei, & syrupum acetosum zucarinum. Et cibentur patientes cum melle, & cum attriplicibus, & spinachijs. Quod si phlegma fuerit dominans in ea, & necessaria fuerit lenitio naturae, oportet ut dentur eis in potu aqua luleb cum geneliabin, & post illud exhibeatur geneliabin cum aqua mastice, & trochisci de rosis etiam cum aqua sceniculi & apij. Quod si duo humores fuerint aequales, tunc oportet ut sit curatio cum curatione media, ut non accidat inflammatio ex rebus calidis, & non fiat ingrossatio cum rebus frigidis. Quod si dominatur unus duorum humorum, tunc oportet ut curentur cum his quae conueniunt illi humori.

De febribus quae nominantur empiale & liparia.

Cap. XVII.

Phlegma quidem uitreum, quod est frigidus

de speciebus phlegmatis, quandoque dominatur in toto corpore, aut in aliquo membro. Et quod ex eo dominatur in toto corpore, aut totum putrefit, aut non putrefit aliquid ex eo, aut putrefit quædam pars eius, & quædam pars eius non putrefit. Quod si totum non est putrefactum, generat in corpore frigus uehemens & patiens ipsum non calefit absque febre. Quod si totum iam est putrefactum, aut est putrefactum extra uenas & arterias, & tunc facit febrem phlegmaticam periodicam: aut putrefit intra uenas & arterias, & tunc facit accidere febrem phlegmaticam continuam. Quod si pars eius putrefit & pars eius non putrefit, tunc facit accidere febrem quæ nominatur empialos, & patiens hanc febrem sentit in interiori corporis sui frigus, & extra corpus sentit calorem. Et causa in hoc est, quoniam calor qui iam putrefit, facit accidere caliditatem & inflammationem, & pars phlegmatis quæ non putrefit, facit accidere frigus. Urina autem habentium hanc febrem, est minoris caliditatis quam urina habentium febrem quotidianam phlegmaticam, & est urina grossior quam illa: quoniam materia faciens hanc febrem, est grossior quam materia faciens febrem quotidianam. Et pulsus ipsorum est tardus, diuersus plus quam sit illa febre. Et quandoque paroxysmat omni die, & quandoque omni tertia die, & quandoque omni quarto die. Et non significatur super has febres, nisi ex significationibus earum, & non ex paroxysmis ipsarum. Et similiter etiam dicendum de reliquis febribus, ignorantes enim significant super febres ex paroxysmis earum. Et quandoque est paroxysmus huius febris scilicet empiales quatuor horis, & quandoque septem horis, & quandoque 24. horis, & quandoque pertransit hunc terminum secundum grossitiam materię & multitudinem eius, & spissitudinem corporis illius infirmi, & raritatem eius, & debilitatem uirtutis, & fortitudinem eius, & secundum tempus anni est longitudo & breuitas paroxysmi. Et hæc quidem febris scilicet liparia, non prolongatur tempore, quoniam natura secundum plurimum uincit eam, & destruit ipsam. Et quandoque moratur 20. diebus, aut minus aut plus. Febris autem quæ fit in omnibus quinque diebus, aut in omnibus septem diebus, aut in omnibus decem diebus, fit ex phlegmate grosso, aut ex cholera nigra, & periodi eius præcedunt aut postponuntur secundum grossitiam materię facientis ipsam febrem, & urina & pulsus sunt secundum materiam ex qua accidit hæc febris. Feb. aut quæ dicitur liparia, sicut dicitur à Gal. est febris in qua infrigidantur extremitates membrorum, & quod apparet de corpore, & profundum corporis & uiscera aduruntur cum siti uehementi, & asperitate linguæ. Et pulsus istorum est paruus, debilis, secundum caliditatem quæ iam est in profundo corporis. Liparia quidem est contraria empialos, quia in empialos frigus est interius, & caliditas exterius, & in liparia est contrarium illius, & aduentus quidem lipariæ quandoque est ex cholera citrina, grossa, non pura.

De cura empiale & lipariæ.

Oportet ut in hac febre solliciti simus de stomacho cum vomitu, deinde cum potionibus quæ infrigidant & mundificant stomachum, & prouocant urinam: sicut aqua feniculi & apij cum geneliabin & secaniabin. Et detur in potu infusio aloes, & hiera picra, & pilulæ de eupatorio, & pilulæ de aloë cum mastice. Et administretur clyster in quo sit quædam acuitas, ut abstergat humorem grossum, sicut clyster factus ex camomilla, & mellilotto, & medulla carthami, & centaurea minore, & fursure, & anetho, & cymino, & almuri, & melle. Et bibentur cum aqua eicoris, & almuri, & cymino, & oleo amigdarum dulcium, & sicla, & asparago. Et confert in principio lipariæ geneliabin cum secaniabin, & in fine exhibeatur infusio aloes, & hiera picra, & aqua feniculi endiuiz & apij, & etiam trochisci de rosis & mastice. Et uniuersaliter oportet ut illud quod administratur in hac febre scilicet liparia, sit minoris caliditatis quam illud quod administratur in febre empiale.

De febre quæ fit cum communitate membri dolentis.

Cap. XVIII.

SI accidunt febres ex dolore alicuius membri, sicut hepatis, & splenis, & lateris, & renum, aut cum læsione cerebri, oportet ut conuertatur studium totum ad membrum infirmum, ita ut mundificetur. Quum enim abscinditur causa faciens ægritudinem, abscinditur etiam effectus. Si enim non abscindimus superfinitates seu putredinem earum, non destruitur febris, quoniam causa faciens eam est fixa permanens. Et in summa dico quod oportet ut sit resistentiæ & intentio nostra, ad causam facientem febrem plusquam ad ipsam febrem.

De syncope. Cap. XIX.

Syncope est res una, & est resolutio spirituum vitalium subito. Cause autem eius sunt multe, & unicuique earum est cura proportionata conueniens, quare nunc intendendum est in hoc secundum quod potest homo, ut quando accidit hæc syncope subito, sit possibile nobis resistere ei, uel succurrere ei. In illis igitur in quibus accidit syncope propter cholericam passionem, aut solutionem uentris, aut propter aliquam euacuationem superfluum, seu egredientem terminum

minimæ qualitatæ, oportet rosare seu aspergere super faciem eorum aquam frigidam, & constringere nasum eorum, & fricare os stomachi ipsorum, & mouere eos ad uomitum cum intromissione digitorum aut penne, & stringere manus & pedes eorum strictura forti. Quod si fuerit euacuatio per inferius, stringantur manus: si uero fuerit euacuatio per superius, stringantur duo crura. Et quandoque iuuantur isti quibus accidit huiusmodi syncope, cum potu uini permixti cum aqua frigida. Balneum autem est conueniens eis quibus accidit syncope ex diarrhœa. Illis uero quibus accidit syncope causa eruptionis sanguinis, aut causa sudoris supra mensuram, balneum est contrarium ualde, quoniam ipsi magis indigent in frigidatione, & stypticatione magis quam calefactione & mollificatione. Et uinum quidem permixtum conferre eis ualde, præcipue quando fuerit permixtum cum aqua frigida. Et isti quidem non indigent ligatura seu strictura membrorum suorum, neque vomitu neque aliqua specie motus, sed oportet ut quiescant omnino. Et administrantur res quæ infrigidant & stypticant, & sedent uel iaceant in domo in qua fiat uentus frigidus. Et alteratur aer domus ad qualitatem frigidam stypticam, sternendo in ea myrthum humidam, & rosas, & extremitates vitis. Illorum uero quibus accidit syncope propter repletionem, oportet fricare manus & pedes fricatione uehementi, & calefacere eos, & stringere ipsos, & prohibere ipsos a cibo & uino & a balneo, & sint isti contenti aqua mellis, in qua iam decocta sint calamintum montanum aut campestre, aut hyssopus, aut hæscæ. Et detur eis in potu etiam syncopus acetosus. Et similiter etiam curentur mulieres quibus accidit syncope propter matricem, uerum non exhibeatur eis syrupus acetosus, immo stringantur pedes earum & fricentur, & applicentur ventosæ super duo crura. Illis uero mulieribus quibus accidit syncope ex euacuatione multa sanguinis à matrice, ponantur uentosæ sub mamillis. Illis uero quibus accidit declinatio matricis ad superius, aut ad unum duorum laterum, applicentur ventosæ super inguinæ, & super coxas, & fac eas odorare odores fœtidos, & fac suppositoria odorifera, ut perueniat ad matricem illud, quod cum odore bono est calefactiuum resolutiuum. Quod si accidat syncope ex debilitate stomachi, oportet ut emplastrum membrum cum emplastro confortante ipsum, sicut emplastrum factum ex alcas, id est, daçtilis nõ complete maturis, & uino, & sauch hordei, & croco, & aloë, & mastice, & inungantur cum oleo absinthij & mastice, & cytonijs, & oleo nardino, permixtis cum cera & uino. Quod si acciderit in stomacho caliditas & inflammatio, tunc permisce cum istis quædam res quæ in-

frigidant, sicut rasura cucurbitæ, aut succus lactuæ, aut solatri, aut agrestis. Et quandoque confert eis iuuamento magno fricatio manuum & pedum, quoniam quando curantur hac curatione, bonæ fiunt dispositiones eorum ualde. Quod si accidat eis ex his rebus inflammatio, oportet ut abluantur cum aqua dulci tepida statim. Illis autem qui sentiunt frigus, oportet ut exhibeatur medicamen factum ex tribus piperibus, & piper de per se, & syrupus de absinthio. Illi uero quibus accidit syncope propter humores malos mordicantes, cogantur uomere cum aqua calida sola, aut cum quibusdam oleis. Quod si uomitus est eis difficilis, tunc calefiant primas partes stomachi & manus & pedes. Quod si uomitus non est eis facilis cum hoc, tunc moueatur uomitus cum intromissione digitorum aut penne. Quod si non potest etiam cum hoc uomere, tunc datur eis in potu oleum calefactum multis vicibus, quoniam hoc quotiens datur in potu, mouet uomitum & lenit naturam, & lenitio naturæ confert istis ualde. Quod si non lenitur natura, oportet ingeniari ad leniendum eam cum suppositorijs impositis inferius, & quum feceris hoc & iuantur cum eo, tunc detur in potu aliquid de floribus absinthij decoctis cum aqua mellis, & ingenietur ad confortandum stomachum cum omni re ad hoc præparata, administrando eam interius & exterius. Et non oportet ut administrantur res styptice in principio, sed post euacuationem malorum humorum. Quod si causa syncopes fuerit phlegma multum frigidum, aggregatum in stomacho, tunc eius cura est cum embrocatione olei de absinthio, deinde post illud exhibeatur aqua mellis, in qua decocta sint hyssopus, & quæ sunt his similia, & detur eis in potu secaniabin & piper. Et oportet ut omnes species curationis sint calefacientes, subtiliantes, & incidentes. Quod si accidat syncope quibusdam hominibus ex frigore uehementi, oportet ut curetur cum omni specie eorum quæ calefaciunt, & detur eis in potu uinum permixtum cum aqua calida, & bibentur cum cibis calefacientibus, & fricentur seu inungantur prope ignem, & curentur cum contrario eius quo curatur syncope accidens à calore uehementi. Et illi quidem cui accidit syncope uehemens ex aere calido, & angustia, propter longam moram in balneo, oportet ut succurratur dando in potu aquam frigidam, & cum aspiratione aeris frigidi, & cum extinctione, & ut iaceant in locis in quibus fiat uentus frigidus, & fricentur stomachi ipsorum, uel ungantur stomachi ipsorum, deinde post illud exhibeatur cibus & potus. Et si causa syncopes est magnitudo apostematis calidi, aut malitia, seu malignitas febris, & accidentia mala in principio periodi febris, oportet quædo manus & pedes infrigidantur ut calefiant,

& fricentur fricatione uehementi, & prohibeamus eos à somno & à cibo & potu. In eo autem in quo timetur syncope ex siccitate complexionis suæ, tunc præcedat cibatio ante paroxysmum, cum pane infuso in uino, & sit illud modicum, quia si exhibeatur ex eo multum, aut comedatur aliquid difficilis digestionis, tunc syncope augmentatur & fit fortior. Quod si cā syncope fuerit uehementia læsionis in aliquo membro principali, tunc detur in potu secaniabin, aut aqua mellis decocta cum calamento montano, & cibatio eorum sit cum cibis incisi uis, & fricentur etiam manus istorum & pedes eorum & stringantur, & administrentur etiam ea quæ prouocant urinationem, & quando curantur cum hac cura & iuuantur, tunc detur eis in potu uinum album antiquum stypticum in parua quantitate. Quod si accidat syncope quia causa temporis euacuationis subita, tunc confortetur infirmus cum odoriferis bonis, & cibetur cum sorbitionibus facili digestionis. Et si accidat syncope ex uehementia tristitiæ & timoris aut ex delectatione & gaudio, & similibus animæ passionibus subito aduenientibus,

tunc confortetur infirmus cum odoriferis, & cum retentione anhelitus, & cogeeos uomere. In illis uero in quibus accidit syncope ex dolore colico forti & difficili, & ex punctione nertritis, aut ex dolore membri alterius, tunc syncope sedatur cum emplastrationibus & fomentationibus, & cum fricationibus suauibus.

De illis quorum uirtus debilitatur cum sudore.
Cap. XX.

Oportet ut prohibeatur sudor illorum, quorum uirtus resoluitur ex multo sudore, cum rebus quæ exiccant & stypticant, sicut lutum samus, & merdasengi, & gallæ, & amyllum, (uel secundum aliam literam, & gallæ & alumen,) & folia myrthi, quando teruntur & puluerizantur super corpus. Aut inunge corpus eorum cum oleo florum uitis, aut oleo rosato, aut oleo de cytonijs, aut oleo arboris mastice. Et iuantur etiam cum minuto thuris, quando teritur & puluerizatur super corpus.

H A L Y A B A T I S

D E F E B R I B V S

L I B E R I



De medela febris qua fit ex calore solis.

Cap. I.



MEDIA quæ oportuit ostendimus & explanauimus de simplicium uirtute medicaminum ac utilitate singulorum in una quamque infirmitate quidque in corporibus operentur atque hæc recta qua

itur semita à medicaminibus ad ea quæ conferunt in morbis iam nunc hoc in sermone incipimus uiam qua ad curandos accedimus morbos & passionem eaque quæ profunt illis medicaminum regimina & ciborum. Disputauimus autem de his secundum dispositionem & ordinem qua eorum signa sensui sunt manifesta & causas retulimus, principio. namque de signis morborum communium, quæ & in manifesto erant corporis & intimo febrium, scilicet & apostematum disputauimus incipientesque à febribus, de febre proposuimus diei, deinceps alias quæ sequuntur febres. Dicimus ergo quoniam diuersitatem febrium diei communis medela fit rebus causis aduersantibus à quibus factæ sunt. Quod cum ita sit diei febris quæ fit ex calore solis & uenenis medela est in frigidis sessione locis quæ cōbussent aquilo ad odoratum; sandali aqua rosæ caphore, nenufaris, rosarum. Et quoniam maior quæ hæc patiente urget febrile læsio in capite est aqua roseæ per caput eius fundendum est oleum roseæ acetum quoque cum niue refrigeratum sit quæ acetum, aqua roseæ quartata pars.

ta. pars: oleum autem tanquam eius medietas, hæc funde super patientis caput pedetentim pluribus & non semel vicibus sitque dum hæc facias manus tua à capite illius sublata: de hinc autem in hac proijcies aqua ro. acetumq; & oleum sandalum al. infundesque panniculum lineum quem & super caput ipsius extends frigidum. infundes autem panniculum hunc sæpius & appones nec cessabis donec ab eo febris cessauerit aut inclinetur. Cum autem inclinata fuerit medio illum inducas balnei aquamque super eius caput & omnia membra funde suauiter & temperata infusione interpolata quò corpus eorum humectetur & dissoluatur: at uero si decoxe ris in ipsa aqua uiol. siccas ninifar & camomillâ perfectius erit & utilius corporis humectationi cum ex solis calore ac venenis siccitatem sit lustratum corpus. ideoque ergo oportet superfundi capiti parum olei viol. aut ninifar. sed & seminis cucurbitarum oleum post balneum quo humectatione corpus humectetur: egressus uero balneo quiescat hora accipiatque refrigeratiua, aquam cum zaccara si quidem habuerit si mundum infusumque refrigerata cum niue aqua: panem tritici dabis illi siue infusum lotum aqua calida refrigeratumque niue cum zaccara mundissimâ, aut acetum cum medulla conditum cucumeris & arfenegi: aut portulaca aut cucurbitarum meaurum & massi sine omnibus condimentis calidis. Si autem perfecte alicui se fructuum crediderit dabis. ante prandium elelegi granata pruna, frigoris niue affecta. Somnum inducas post prandium quietemq; abibit enim omnino hoc febris regimine.

De medela febris diurnæ que fit ex densatione & frigore. Cap. II.

AT vero quando diurna est ex frigore & niue & densatione feb. patientem in loco oportet esse secreto & parum humenti lenibusque operiri vestibus & amictu fricetur eius corpus fricatione tenui donec inclinetur febris, qua inclinata introduc in balneo moramque in eo faciat, corpus eius temperatius fricetur quo dilatentur pori dissoluaturque qui attritus est in eius corpore, calor à frigore utatur post sudorem cum fricatione cheiri oleo modico aut arietis aut susani aut acuiani. Egressus operiatur calefactorijs optimis per horam reficianturque iam tunc subtilibus ut pullis tranquillinis similibusque cum espidabago conditis aut zirabago: uel etiam coctis aut potellatis odoret marcemusum & nemanium sium, porrigatur illi ribani parum uini, si quidem parua est densatio ut aperiantur eius calore pori dissoluaturque inclusa. Si autem magna est nullo

modo uinum apponendum est, uinum enim ad aperiendum poros fortius densatos non sufficit. liquefacit autem humores & dissolutos ad poros mittit nec potest emittere sitque opilatio. Si ergo patientem hoc regimine reueris eruntque aliqua febris reliquæ appones solutionem in alias in secundo inducere balneo mane, disponasque omni ordine disposito regimine. At uero si quando fuerit pororum densatio de aluminosis uel alijs arctantibus aquis, hoc eodem regendæ regimine nisi quòd fricatione ampliori oportet uti cum oleo plurimo uiolato aut ninifar oleoque seminum cucurbitæ & cacrelege in balneo plurimaque aquarum suauium ac superfusione tepidarum. Si autem hæc differatur febris tempore, sitque principium eius tanquam continuæ febris, timeturque ne in putridam conuertatur febrem, huius oportet accelerare medelam ut ait Gal. ostendit enim huius sæpius in continuam fieri mutationem. accelerandum ergo phlebotomum si uirtus ætas, præsensque non prohibuerit tempus, auferatur sanguinis quantum opus est quantitas, & si quidem fortis erit uirtus eo usque educes donec defectus eius appareat, huius namque dominus febris magis eget phlebotomia quam ceterarum febrium eo quòd conclusæ superfluitates dissolui prohibeantur. hæc uero cum feceris patientem cum aqua reficies hordei in qua feniculi semen, corticesque eius radices decoctæ sint, tribus autem de hinc aut. 4. horis squingibin porriges aut absinthij sirop. & limie quæcunque hoc præsens tempore sint. hæc etenim ad aperiendam oppilationem incidendosque humores uiscosos utile est regimen qui in corporis inclusi sunt interioribus eosque purgandos. Non oportet autem patienti oppilationem aperiencia aut euacuantia dari, non enim securus fieri potes dum pori aperiuntur educunturque meatibus humores educantur quòd quidam humorum qui sunt in uenis insiganturque meatibus & inhereant aut sua copia aut grossitie aut uiscositate maximeque si per arctos sit transitus meatus: sitque fortior oppilatio ac difficilior, proculque dubio putredinum patiuntur febris. Agnosces autem oppilationis quantitatem ex febris uirtute & quantitate. Cum ergo patientem ut imperatum est euacuaueris phlebotomo: & quæ dicta sunt porrexeris die primo: secundaque squingibin propina aut limue, uel absinthij sirop. cibabis illum post hæc duabus aut tribus horis hordei aqua cum ipsius farina aut reficias illum cum mezaïro cum feniculo parato siue aqua hordei. delectabitur autem sorbicuncula de maraigne in alias murazæ parata. Facto autem tertio die cum intellexeris febrem manifestissime minui nec potest tendere

aliqua putredinum signa pulsus: sed nec vrina opilationis geret significationem: priuationisq; maturationis tunc oportet patienti ingressum imperes balnei: fricetque corpus his. quæ elimât purgant & aperiunt vt hordei farina; & fabarum assuamem spahanicæ & neiranicæ. Si autem perpenderis, feb. aliqua augmētari hora uti balneis ante illum impera minusque quod in tere-rit. 4. sint horæ. Egređienti squingibin propina à balneo aut limue vel absinthij sit. cibabisque his quæ hesternâ refecerat die nec aliquid concesseris vini: confortat enim febris. vt dies fiet; quarta certumque erit expulsa & vrina quod aliqua super sint caloris signa his eisdem regas regiminibus. febris enim omnino cadet & deficiet. die vero quinto squingibin porrige & iuleb. pul- lisque reficias & tranquillinis similibusque in consueta reducens illum cibaria pedetentim.

De diurna feb medela qua fit ex cibis potibus vel acutis medicaminibus. Cap. III.

Sequitur de diuersitatibus diuturnæ febris me- dela quæ fit ex calore corpori ab interioribus su- peruenientibus. Diximus autem in octauo pri- mæ partis sermone libri huius nostri cum de cau- sis febrium signisque disputarem ac ostendi- mus, quoniam quæ ex huius fuerit febris: aut ex qualitate eorum habent fieri quemadmodum quæ ex ciborum fit & potuum acumine febris; quædam autem ex quantitate sicut quæ ex copia fit prandij quæ scilicet est febris ex ciborum etiâ stomacho putredine & diarria. Et febris quidē quæ fit ex ciborum porrectione acutorum me- dela est patientis accubatione in locis frigidis. Si quidem tempus hæc æstas est quibusque sit aquilonis uetus. fiatque cum flabello ventus la- halum seminis psilij dabis illi & succum quoque seminis portulacæ cum contritum diligenterq; in aqua fricatum fuerit ac colatum cum iuleb & aqua granatorum ac aqua cum niue refrigerata propina quoque aquam hordei cum zaccara & amigdalidis oleo dulcium. cibus sit mezarium. cū cucurbitis paratum & spinachia triplicibusq; cum oleo amigdalidis dulcium & oleo sisami recē- ti & si uolueris hordei aut tritici suicū infusum aqua fri. & zaccara & dimissis nocte in lalabo seminis psilij & granorum granatorum citonio- rum & zaccara alba aut iuleb & oleum cucurbi- tæ seminis aut amigdalidarum dulcium. Si autē sit hyems lactucas in aliis bulbulegeras come- dant conditas cum intiba ac hasbera sitque eius cubatio in temperati aeris loco. At vero si æstas portulacas dabis cucumeris citruli medul- las: granata sugat arsunega pruna comedat per- fica matura & lenia epithimet stomachum & hepar cum sandalo & aqua ro. & ceroto refrige-

ratiū quod aqua ro. & aqua coriandi. fit ac la- ctucarum & semperuiuæ & aqua portulacæ & uiol. & ros. & alba cera si iuxta quod opus est hu- ius dominus febris non uinum tangat, balneum quæ non intret. Quando autem hæc febris ex vi- ni potu fortis facta est patienti granatorum a- quam propina musorum aut heferem sit aquam quæ niuis: extrema ipsius fricentur, quiescat & dormiat. Cum autem inclinata fuerit. f. balneū visitet: super caput eius aqua roretur multa tem- porē. odoretque & trahat naribus uiol. oleum egressusque balneo temporis quiescat hora. Iam tunc frigidis reficiatur & meauris, pullis quo- que cum heferem aqua & granatorum plurimū quæ dormiat. Cessabit enim. f. ab eo uelocius. Eius autem quæ fit febris ex ciborum in stoma- cho putrefactione medelam iam diximus: quo- niam quædam est cum emollitione naturæ aut cum eius incarceratione: quæ & difficilior est & fortior. Et medella quidem eius. si cum emolli- tione est naturæ talis est. Speculare si quod egie- ditur est id quod est corruptum est in stomacho opus est cum quieuerit febris balneo patien- tem introducere, post quod reficiatur paneo pane infuso granatorum aqua: aut heferem aut iure pullorum cū his eisdem preparato po- ma suggat & pruna ante prædium aut hordeum dabis siue cum biscoto aqua infuso granatorum aut pomorum muzorum. quādo autem solutio superabundat in tantum ut accidat defectus, hūc defectum curatione medicari oportet qui fit ex euacuatiōe roborisq; refrigeratam rosarū aquā super eius faciem, corpus fricabis aliaq; non præ- termites quæ in subsequētib; dicemus in de- fectus cura. quod si & singulat refice illū his quæ dicemus, non tamen balneum introduces. Si aut adhuc persistat solutio dabis illi puluere granorū granatorum, stomachūq; illius intinge oleo po- morum aut zurigendorum, bulliasq; oleum ro. cum citoniorum, aqua pōticorum aut aquā mu- zorum pomorū donec deficientibus aquis super sit oleum. emplastrices etiam stomachum emplas- tris quæ de sandalo & rosa & aqua quia ac se- ceo aut raraeto in alias dragmecho. succoque le- letelteis, & aqua mirri & foliorum. vitis aqua, ac aqua uirgæ pastoris & similibus. ut autem defe- cerit solutio stomachum linies absinthij, oleo, & si quidem acciderit stomachum infirmitas aut de- bilitas stomachum cataplasma mantilibus calefa- ctis siccis aut oleo, zezembabaci calefacto hu- mentibus, uel oleo cherelesi in alias helesi aut susani, aut mustefarase alijsque amenis oleis ca- lefactisque. Sedata infirmitate amputata solu- tione, oportet patientem reficere pullis starnis assatis & frixis cum aqua heferem & granato- rum aqua, sed & piscibus lapidosis assatis aut frixis. Si autem defecerit appetitus diacitonitum dabis pomorum electū & muscū cōditū electu- rium.

riumque nucum iuxta qđ opus est, facto mane balneo induces oleisque linies amenis, nec vero sit illi in balneo mora. hoc ergo modo huius-febris dominus regēdus ē si quidē emollita fuerit natura. Conspicata uero natura oportet ea quæ sub hypochondris sunt tractari, intuerique utrum a stomacho nec ne cibus descenderit ad intestina subtilia, & ad intestinum quod colon appellatum est interrogaq; patientem in quo gravitate aut morfuram sentiat loco ventris, quē etiā eructet saporem, hæc cū feceris & intellexeris qđ cibus corruptus in superioribus est intestinorū oportet patiēti mērescēdū des marchemus in quo est buraci duplum qđ in libro scriptum est, rotāq; super corpus eius aquam ca. interpollate. Si autem corruptus iam descendit ad inferiora intestina, cibus aquā rotari oportet ca. super ventris inferiora. Cum autē movebitur ad inferiora manifestissime cibus subimitti oportet alia sum clisterizariq; cum clisteri mollienti. & si quidē morfuram sentit infirmus oportet clistere fieri de iunibis & sebesten hordeo tōso & uiol. ac oleo niolarum & anatis adipe & anseris ac gallinæ. Quod si inflationem senserit ac uētositatem, clisterizari expedit illum clisteri quod fit ex eis quæ uētositatem extirpant, ut est semē apij aut feniculis similibusq;. Euacuato cum clistere patienti, mezauro pascas illū ex blita facto cum espidabago, aut spinachijs siquidem morfuram inuenit. Si autem uētositatem ciceris aqua pascatur cum oleo uiol. aut oliuarum, aut cinamo. sequenti introduce infirmum balneo, sedeatque in aquæ concham. Si autem gravitatem in intestinis patiens sentiat rotulam da casie fīf. & calungebinum fricatum cum aqua calida emollita eius natura iure refice illum pullorum & zirebagico, somnum inducas. ut autem dormierit diutius febrisque & infirmitas sedata fuerit in cibum conuerteres pedetentim consuetum.

De medela febris dici que fit ex labore.

Cap. IIII.

Qui autem febrem ex labore patitur molestam quiete utatur oportet in loco quem temporis dat qualitas aut somno plurimo, donec a defatigatione redierit, ceperitque febris inclinari. hoc ubi fiet balneum ingrediatur in media domo suavi siter infundatur aqua tepida, & siquidē cōchadeerit cōtinua supfundatur aqua quo humectetur ab ea quæ acciderat ex labore siccitate illius corpus egressusque inungatur corpus oleo uiol. & ninfare cum plurima fricatione, sed temperata, maximeque concatenationum loca plurimum superfundantur oleo, ut emollescant membra, & cedat siccitas quæ acciderat extensio neque ex labore. Quod si manibus corpus frica-

ueris sepius utilius erit tunc iterum in concham redeat, superfundatur illi aqua tepida, & si quidē labor fuerit plurimus & fortis bis hoc faciat aut ter aut certe quater. Si uero parvus semel sufficiet aut bis, de hinc egressus balneo per horam quiescat plenam carnibusque cibetur pullorum hædorum ue extremis. Sitq; eorum paratio laudabilis lactucas comedat & intiba, & portul. ferula sæpius multiplicet uinum uero bibat quod conuenientes & concurrentes dabunt causæ quæ sunt. sc. corporis complexio, ætas, instātia tēporis regio & cōsuetudo. Si ergo erit eius complexio frigida & plura aliorum ac patientes plurimi cōsuetudo uini oportet utatur uino temperata qualitate, sed quantitas quidem maior sit quā temperata. Si autē hic calida fuerit aut plurima aliorum, nec multum ei in consuetudinem est uinū, aut equidem paucum sit eius potus paucus & uinum album subtile multum temperatum, plurimum dormiat. plurimum quiescat, febris enim facile cessabit. Si autem supersint post hæc aliquæ eius reliquæ, apponatur hoc idem quod dictum est regimen balnei & sessionis in aquæ concha & unctione oleorum, aliorumque.

De medela febris que fit ex ira. Cap. V.

Cui accidit hæc febris quæ ab ira est, mansuere oportet & sedare ipsumque quiescere ac seipsum iocundare & mitem facere. Cunque febris declinare ceperit ingrediatur aquæ plenam suavis ac tepidæ, concham, in qua etiam perfecterit temperata mora egrediatur quæ & si quidē ætatis est tempus fundatur super corpus eius aqua fri. māsuecatque seipsum & quiescat, proxima sint illi sandalum aqua ros. camphora. rige turque corpus eius, bibat de iuleb modicum & aquam granatorum mazorum cum niue. Cibetur frigidis escis & humidis ut acetum oleum oliuæ frigidis que paratis cum aqua heserem & granatorum & piscibus lapidosi parum cum sale cōditis. Non autem accipiat uinum, auget enim iracundiā. Iam tunc plurimum utatur somno & requie, hoc etenim hæc omnino anullat febrem & extirpat.

De medela febris que fit ex tristitia. Cap. VI.

Cui uero hæc ex tristitia contingit & cura tristitiæ eius mitigationem molliori expediet, eiusque exhilarationem, latificantemque audiat cātilenarum diuersitates ut cytharæ & lyar, sed & tonos dulces & imittigantes, corpusque eius tenuiter frica. Ingrediatur balneum, sit in domo, prima inmergatur conchæ aquæ temperati caloris ut eo educatur calor corporis ad exteriora modo competenti cibus reficiatur tēperatis uti carni

carnibus hedorum agnorum ac gallinarum, pul-
b irumque piscibus quoque lapidosi & cucur-
lotis ac citrolis omnibus his ut humectetur cor-
pus. Nec uero semel multam ciborum accipiat
copiam, uinum propinetur ei temperatum cum
aqua fri. secundum consuetudinem & etatem,
tempus istas anni & si quid tempus anni ætas
est in frigidis sit locis. Si uero hyems locis. secre-
tis temperatisque, nec plurimum faciat somnū,
hec diebus continuatis usque dum calor omnis
deficiat corporis.

De medela febris que fit ex uigiliis. Cap. VII.

CVI autem hæc fit febris uigiliarum causa
patientium soporatione mollienda est. concipiant
ergo anhelitu narium oleū uiol. aut oleū
cucurbitæ seminis conditum cum uiol. cataplas-
mentur eorum. capita aqua decoctio nis uiol. &
ninifar, papaueris corticisque eius tritarum hor-
dei quoque tritū donec plurimum consumpse-
rit somnum cerebraque eorū humectentur. Cū
ergo ab eis cessauerit febris mediam introduca-
tur balnei domum. super eorum capita funda-
tur aqua tepida suauisq; , & omne corpus cum
oleo fricetur diligenter, ingrediatur concham
aquæ tepidæ & dulcis fundaturque super eorū
corpora interpollate, induatur uestibus & quie-
scant hora cibo reficiantur laudabili & subtili
ut sunt pulli turdi nec plurimum accipiant. Et
si quid est qui consueuerit potum uini, propi-
nes illi parū plurimū mixtū ut acceleret eorū
ciborum digestio, cum sit uigiliarum extenuare
digestionem ut eorum humectentur corpora,
uinū & enim plurimum mixtum humectat cor-
pora. sic ergo expedit humectationem molliori
corporum. Illis quibus hæc febris ex accidenti-
bus animæ contingit prohibeantur a coitu, defic-
cat enim corpora.

De medela febris que fit ex apostemate. Cap. VIII.

CVI hæc autē febris diurna acciderit ex apo-
stemate glandoso alijue apostematibus calidis
oportet sanguine minuatur uenas membro cō-
petenti in quo est apostema & cataplasmetur epi-
thimate opportuno, ut epithimata simplicia &
stringentia sint ac extinguentia quæ & probi-
beant & repellant materiarum fluxum bibat ex-
tinguentia & refrigerantia, ut prisanam grana-
torum aquam, iuleb pilij semen & portulacæ,
mezauris cibe ex cucurbita masso, spinachijs at
triplicibusq; facis cū aqua granatorū & helerē
similibusque. Quiete in locis utatur frigidis, do-
nec omnino sedatur dissoluaturque & mature-
tur euacueturque quod in eo est. Caveatur au-
tem balnei introitus uini potus donec consu-
metur morbus. hæc ergo sunt quæ oportuit de

diuersitatum dici febrium medela commemora-
re. Iam nunc autem de medela febrium ex pu-
tredine incipiemus præponemusque eam quæ
communis est omnibus putredinibus.

De cōmuni medela febrium & putredine. Cap. IX.

Dicimus oportere in medela febrium ex pu-
tredine minime communium tribus uti, primū
febris caloris extinctio ac aduersari ei. Secun-
dum autem euacuare humorem putridum. Ter-
tium uero regimen ciborum ac potus electio.
Et extinctio quidem caloris febris facienda est
cum refrigerantibus & humectantibus cibis. &
& medicaminibus. Et quoniā morborum mede-
la communium fit febris ipsi aduersantibus fe-
brisque est complexio calida & sic medela eius
& cura in rebus est refrigerantibus & humectan-
tibus, nisi quod minime utendum est his quæ refri-
gerant & humectant simpliciter, sed secundum
quod morbi expetit cōplexiōis quātitas, & secu-
dum complexionem corporis naturalem patiē-
tisque etatem ac anni præsens tempus, sed secu-
dum complexionem regionis, & secundum quā-
titatem morbi complexionis, quoniam cum erit
fe. calore fortis & acumine, oportet nos multa
facere ea quæ refrigerant & extinguant, utari-
que refrigerantibus secundum egressionem cor-
poris a temperantia in calore. hoc autem cō-
mune quidem est quod oportet æquilibrari in
omni morbo ueniēti ex mala complexionē.
Nec te tamen lateat medici notitia uicissim tra-
ctari non posse subito intuitu, sed artificio ex ar-
te. Si & enim posset medicus morbi qualitatem
quantitatem diligenter percipere, medicaretur
aliquibus quæ sufficerēt repugnationi eius fieret
que sanitas. Sed cognoscimus ex subitione quia
approximando usus longitudinem exercitij in
morborum medelis. Oportet quoq; ipsam se-
cundum complexionem corporis naturalem ef-
se medelam. ut si quidem complexio corporis
naturalis frigida, egerimus in febribus rebus quæ
fortiter refrigerant eo quod corpus hoc frigi-
dum a complexione naturali plurimum elon-
gatum est. quod si corporis est ea complexio, ac-
cesse est huiusmodi medicaminibus uti refri-
gerantibus minus, non enim corpus a naturali
plurimum elongatum est complexionē. Sic er-
go scire habet in omni morborū medela quæ ex
diuersitatibus fuerit malæ complexionis, mede-
la namque infirmitatum communis est corpō-
ris egrotantis in naturalem reductio complexio-
nem. Vtinur & refrigerantibus secundum in-
firmitatē anni temporis præsentis regionemq;
quam inhabitat, quoniam si hæc omnia ca. aut
plura, necessum est maiorem esse refrigeratio-
nem caloris febris extinctionem. Si uero frigida
sunt omnia commodum est minus extinguenti-
bus

bus uti & refrigerantibus. Ad hunc modū oportet diuersitatem omnium ex maiora complexione morborum esse medelam. i. f. & humidorum ac siccorum atque hanc quam proposuimus regulam ministra.

De euacuatione humoris putridi. Cap. X.

Humoris euacuatio putridi his moliēda est medicaminibus quorum sit. illum euacuare humorem qui febrem parit, ut si quidem febris fuerit tertiana fiat euacuatio medicaminibus quorum est cholericum exinanire humorem. Si uero quartana his quę humorē attenuat nigrū. Qd si quotidiana phlegma euacuantibus. Si uero sanguinea febris ē phlebotomo. At uero si composita est febris. utendum est certe medicaminibus laxatiuis quę dominantem in compositione humorem euacuent quemadmodum explanabimus. Oportet autem de omnibus dari medicaminibus tantum quod quantitatem ex corpore morbum generantem euacuent. Dictum est autem hoc quidem esse quod medici non possint notitia certissima teneri. Cognoscet hæc autem quantum consideratio monstrat & artificium quantum proprius accipere poterit, hic autem cognoscet qui plurimum in arte exercitatus est medicinæ & expulsionē morborum frequentationeque infirmitatum longo tempore. Nec uero laxatiuum in morbis oportet dari principio cum humor maturus nō est nisi sit humor quidem excitatus. Si enim medicamine utaris laxatiuo & humor crudus est euacuabis quod in eo subtile est & tenue supereritque grossum eritque simpliciter nihil habens secum quod illum subtiliet ac maturet, unde & difficilior sit eius maturatio & labor ad excoquendum illum natura, sitque morbus prolixior. Cū autem uideris infirmitatem tumultuantem & de loco ad locū trāseuntē, leditque infirmū & concutit, tunc iam in principio euacuandum tibi humor nec sustinendū donec maturetur ut quiescat egrotans. Et sciendum quoniam non oportet quantitatem eorum intueri quę euacuantur sed maxime necesse est qualitatem speculari & si quidem euacuatur humor morbum generans oportet eius tantam exinanire quantitatem quanta opus est si quidem patientis perferat uirtus, quod si id quod euacuatur humori morbum generanti contrarium est amputetur solutio, prohibeaturque euacuari, nisi sic fiat morbus augmentatur, nec ægroti perferret uirtus. Quod enim educetur humor est quo maxime corpus eget, ergo intuearis in eorum quę euacuanda sunt exinanitione quin & infirmi uirtutem ac ætatem anni tempus quam inhabitet regionem & consuetudinem euacuationis & inclinationē humoris, & uirtus equidem ægroti consideran-

da est, quoniam si fortis fuerit & sufficiens euacuandum est iuxta quod exigit necessitas semel. At uero si debilis minime euacuatur, sed utēdum est refrigeratiuis & restringentibus donec uirtus redeat & tunc adhibenda est euacuatio eorum quę oportet. Qd si uirtus debilis ē medicina nō forti sed paulatim quę oportet euacuabimus pluribusque uicibus ne forte immutata uirtus deficiat. Intuēda quoque infirmitas tēpus p̄sens ac regio in euacuatione. quoniā, si ætas iuuenis est & tēpus anni uer, aut autumnus & ær tēperatus & regio similiter, semel euacuari purganda oportet. Si autem ætas sit pueritia uel senectus & tēpus quidem est aut ætas aut hyems torpor, ær calidus graui calore aut frigidus regioque frigida ut septentrionis, aut calida ut est australis nō euacuatur infirmus, q̄ si urget necessitas exinaniatur parum pluribus uicibus, hæc quoque in loco oportet intueri tēpus quo euacuare necesse est. Et si quidem ætas est superius uomitu ægrotum euacuet. Si autem hyems laxatiuo medicamine sicque cū propinas medicamē in æstate dū ær est frigidus tēpore quo naturalis calor per omne dispersus est corpus. Quantitas quoque euacuationis intuenda est ex consuetudine patientis, quoniam si infirmus est qui laxatiuo consueuerit egetque euacuatione euacuatur quantum opus est omni postposito timore. at uero si non consueuerit cum timore euacuatur, q̄ si uomitum prouocanti consuetus ē purgari medicamine & nō laxatiuo aut laxatiuo & non uomitu, eo quo consueuit euacuari oportet modo. Conferentius enim est & illi utilius. Si quoque in euacuatione quę phlebotomo sit intelligendum est, hæc est sit phlebotomo purgari consueuit, est quoque qui eget sanguinē minui, sanguinē iuxta quod opus est subtrahas. Si uero minime consueuerit pedetētim educas minusque quā est opus. Intuenda est quoque materię inclinatio in euacuatione celebranda, quoniam quidem si materia longa & in parte hepatis est inclinata & est in gibboso latere euacuabimus medicaminibus urinam prouocantibus. Si inclinatur in profundo latus materia; exanimus medicaminibus laxatiuis. Quod in stomachi partes atque ad superiora eius uomitu euacuatur, si uero ad inferiora laxatiuo. At uero si ad intestina clisteri purgandus est humor. His collationibus euacuatione libranda est in omnibus morbis & passionibus cum euacuandum quid erit.

De regimine se. per uictum. Capi. XI.

Per uictum regimen oportet secundum morbi esse naturam ac tempora eius, sed & secundū infirmi uirtutem & ac consuetudinē, sed & secundum corporis figuram appetitusque inclina-

tionem, sed & secundū q̄ accēditur, ac iuxta q̄ ac-
cidunt ægroto signa accidentia a porrectiōe pro-
hibentia ciborū. Et natura quidē morbi, quoniā
cum febrium ceterorūq; morborum, quādam
quidē sint acutæ, quēdam autem diuturniores
& longæ. Oportet infirmi regimē secundū mor-
bi disponi in cibus acūmē ac eius dilatationem.
Et quoniam acutorum morborum diuersitates
multæ sunt & quādam quę peracutæ sunt in ul-
timo acuminis atq; hæc quę 1. aut. 3. aut. 4. aut
5. finiuntur die, quādam non simpliciter acutæ.
quæ ad. 7. 9. 11. extenduntur diem. quēdam quo-
que ad quartūdecimū. sed & quādam acutæ
sunt, sed est in eis mōra, atque hæc sunt quæ 14.
transgredientes ad 20. pertingunt, quādam au-
tem his tardiores quorum omnium ordinem
exponemus loco quo de morborum tractabi-
mus naturis & temporibus eorū. Si quidē in ul-
timo fuerit morbus acuminis & diētā quoq; ī
ultimo subtilitatis esse expedit ut aqua pura cū
iuleb mixta, aut uiolato syru. aut aqua mellis, aut
squinibin. Si autem morbus est qui ad. 7. perue-
niat, huic aqua hordei conuenit cum zaccara &
iuleb. aut uiolarum syru. Quod si ad nonum per-
ueniat & quartūdecimū aquam dabis hor-
dei cum sua farina, aut aquam eius colatā bis in
die, aut aquam quidē hordei in diei p̄cipio,
eius autem transcurrentem medio mezaurum cum
cucurbita & spinachijs alijsq; similibus quę p̄æ-
sentia tenueris, sic se res habet in morborum re-
giminē qui minus acuti sunt his scilicet, quę
grossiora sunt. quantūcūque autem morbus
acutior est cibus subtiliorem esse cōuenit, quā
to autem minus acutus & cibus grossiorem ef-
se decet. Dabis etiā quibusdam in morbis aquā
hordei subtilem in longioribus aquam eius cū
purgamento suo. Porro in morbis prolixitatem
habentibus ut tertiana nō pura quotidiana, quar-
tana similesque his morbi prolixi grossiorem
desiderant diētā & nō subtiliari, augeaturq;
eius quantitas donec ad statum morbus perue-
niat. Si etenim in huiusmodi morbis subtiliane-
ris diētā, fortassis esse securus nō poteris quin
cadat uirtus in statu morbi, nec erit fortasse in-
firmitati uirtus qua resistat passioni cū sit mor-
bus circa statum fortior quā fuerit. ideo ergo
expedit diētę subtiliationem & diminutionem
in prolixioribus morbis circa statum fieri, quo
uirtus occupetur tunc temporis in aduersando
ægritudinē quatenus superatam effuget. Com-
parauerunt autem antiqui medicorum infirmi
uirtutem expensis, morbum peregrinationi me-
dicū peregrinanti. peregrinans nāq; expen-
sas extimat itineris secundum uirtutem & lon-
gitudinem. Sic & medicus uirtutem morbo resi-
stentem compensat secundum ipsius breuitatē
& longitudinem, & si quidem uiderit morbum
breuis esse spatij statusque propinqui, cibum sub-

tiliat & imminuit. Sicut peregrinans cuius est
peregrinatio proxima, unde & expensis eger bre-
uioribus. At uero si morbum prolixum aduer-
tit uirtutem a principijs conseruat ægritudinis,
ne forte uirtus deficiat ueniēte ergo statustem-
pore uirtus fortis est sic & peregrinans si longū
est iter longiores apparat expēsas, ne forte eius
deficiant expensæ antequam ad locum attingat
propositum debiliteturque ac deficiat uirtus. At
uero diētę regimen secundum morbi tempora
sic oportet esse. Commodum est in morbi prin-
cipijs cibum ad grossitiem inclinari, ne forte in-
firmi fiat transitus de grossa ad subtilem semel
diētā, noceatque ipsi amplius dissoluaturque
eius uirtus & debilitetur. Dehinc autem eius im-
minuatū grossities paulatim, & per dies donec
morbus ad statum perueniat quo quidē opor-
tet diētā tempore in ultimo esse subtiliatis, ut
est p̄andij dimissio ac inniti iuleb. aqua mellis
uiol. syrop. ne uirtus in ciborum occupetur dige-
stione, conuertatque omnem sui curam ac mor-
bo resistendū expellendūq;. Vt uero ceperit
morbus declinare, cibus quoq; grossari incipiat
regendūque resurgentium ab infirmitate re-
gimine egrotus. Diētę porro regimen secundū
infirmi uirtutem contemplari oportet & si qui-
dem patientis fortis est uirtus. peracutus mor-
bus siquidem ad statum peruenerit reges hūc
subtili plurimum ciborum dimissione & iuleb
ac uiol. sirop. cum aqua temperata. q̄ si debilis
est uirtus nec morbus acutus, status quoque re-
motus. infirmum hūc diēta reficiēs ad grossum
inclinanti sæpius & paulatim. quo uirtus conser-
uetur ad statum usque morbi tempora. At uero
& si uirtus fortis & status longius positus hūc
cibo reficimus infirmum temperato semel tan-
tū. At si uirtus fortis & status morbi proximus
subtilem dabimus cibum, atque hoc est ut om-
nino uictu amputato sola utatur mellis aqua ac
iuleb. q̄ si temperatā sentimus uirtutē statūq; re-
motum tēperato reficiatur infirmus cibo semel
tātū. At si uirtute tēperata status istat proximus
cibus erit infirmo subtilis & sæpius. Augmen-
tū etenim & grossities cibi uirtutē quidē auget
pariterque morbū cōtraq; subtiliatio cibi & im-
minutio uirtutē imminuit, ipsum quoq; exte-
nuat morbum. At uero cibus in substantia tempe-
ratus sua & quantitate uirtutem suo tuetur lo-
co. sic quoque oportet si ex repletionē morbus
fuerit ac uirtus fortis subtiliari cibū eiusq; im-
minui quātitatē. Cū uero ex euacuatione sit mor-
bus est uirtus, est debilis cibū utile est esse gros-
sū, sed eius imminuēda est quantitas, hisque in-
die sæpius apponendum & non semel. Cū au-
tē est fragilis uirtus ex repletionē morbi, aut
cum uirtus quidē fortis & ualens, & morbus
exinanitione cibū esse in substantia ac quantita-
te conuenit tēperatū. Obseruandū est etiam
regimen /

regimen secundum anni tempora ciborum. Si etenim æstas fuerit antequam meridies trāseat prandēdum ea hora. s. qua naturalis ualidus est calor, sint quæ omnia quibus infirmus reficitur frigida actu, ut anima uoluntarie illa suscipiant & in quibus quiescat. Quod si tēpus hyems est, circa meridiem cibi sit hora cum naturalis calor fortis est & in omnes diffusus corporis partes. sitque quod ciborū sumit uel medicaminis actu calidum atque hoc modo in omnibus faciendū est morbis. Aestimatio autem ciborum secundū consuetudinem talis est. Intuēdum si fuerit infirmo in sanitate. sua consuetudo ciborum copia, hunc non oportet prohiberi à cibus tam & si morbi nō expectet natura. Si enim prohibueris illi cibos uirtus dissoluitur ac deperit, q̄ si ciborum illi consueta est paucitas, hunc omnimodis arcēdum subtilibus refice. Si enim grōsiora appones uirtus nō sustinebit, & grauata debilitatur & debilitata perit cum qua & infirmus ēt si morbus minime sit acutus. At uero ciborū pōderatio secundū corporis figurā, siquidē corpus rarum fuerit plurimum hunc à cibo arcendū minime iudicamus pascendūq; secundum q̄ morbi expetit natura. At si spissum ægrotantis corpus aspexeris cibis huic imminuendus ac subtiliandus est, quin etiam prohibendus siquidem indicaueris. Sequitur ciborum iudicium secundum accessionum tempora. Considerandum. n. si febris fuerit immobilis & minime variabilis nec mixta prohibendus erit patiens accessiui tempore & ante sex horas donec induratur calor & actio deficiat. Attamen si nō patitur infirmus donec febris omnino deficiat non oportet illum refici dū calor in superioribus uel interioribus est corporis aut in omnia diffusus mēbra, sed cum à pectore ardor cessauerit & à uentre & in his leniatus locis ad extrema contendet. In continuis autem febribus patiens cibo arcēdus est dum difficultas urget feb. hæc enim cōferentius & utilius magnis digestionibus eorū quæ sumūtur descēsum accelerās ciborum propter caliditatis lenitatem. Si est actionis & difficultatis fe. tēpore patiens, reficiatur, occupatur à resistendo febris natura à ciborum digestionē, sed & stomachus cum non naturali fuerit calefactus calore cibos non digerit & alterantur in febris materiam, qua augmentata morbi tempus producit & opilatio uenis superuenit. Quando autem febris est accessus uariis & incertis & minime ordinatis, tūc cū necesse fuerit infirmum refici disponendum est regimen ciborum secundum appetitum infirmi, eiusque ad aliquam inclinationem. Considerandum nanque est si infirmo multi sunt utiles & conferentes cibi nisi q̄ quidam minoris sunt utilitatis si infirmam animam ad minus inclinatur utile appetitus ægroti sequendus est, dabisque quem desiderat

cibum. Conferentior enim est illi & utilior & corpori eius melior eo q̄ libentius suscipit, sic etiam in omnibus alijs faciendū ratio approbat quibus curandus est morbus aliquis. In mēsurādo autem cibum secundum accidentia quæ infirmum à cibo prohibent intuēdum in stomacho superfluitas est ciborum aut in uisceribus & intestinis crapulę omnimodo reficiendus non est nisi stomachus purgetur & intestina crapula uacuentur. Sic si quando euacuandi fuerit necessitas iſirmo aut laxatio aut clysteri aut à flapho aut deniq; phlebotomō alijsq; cibum non oportebit dari nisi post euacuationem corporis ac purgationem. Potus autem regimē in tria diuiditur aquam medicinalem potum & uinum aque quidem est refrigerare & humectare, & si quidem febris est de continuis & urentibus ut causon maturitatisque signa iam manifesta sūt & uirtus ualida & infirmi consuetudo aquam potare frigidam, nec principalium aliquod mēbrorū debile, nec apostema huiusmodi ab aque potu frigidissime minime arcendum. At si maturitatis minime signa apparent uirtus est debilis excellentium aliquod mēbrorum apostematicum, nec infirmo aquam bibendi frigidam consuetus hunc omnino frigidioris aque porrectionem prohibeas. Sed & si tempus est æstas & febris in acuminis ultimo & maxime stomacho & hæpate debilibus arceatur quinimmo aquam temperati frigoris propina. febre autem constantiani tenente periodicam aquam oportet patiēti propinari frigidam accessionis eius medio tempore. At uero in principio nullo penitus modo aqua frigida est permittenda. Si sit autem febris minime acuta, sed humor crudus prohibenda aqua frigida potio. Si enim plurimū sumatur multas fouet, ut ē apud Hipp. ægri tudines in libro acutorū morborum. Immoratur eius per membra infusio, ac descensus difficilis fit, maturatio differtur & prolongatur eius mora in stomacho, facitq; in pluribus infirmitatibus uentri uentositatē. & siquidem contingerit stomacho dominantē esse choleram corrumpitur aqua & in choleram conuertitur. Cumq; post tēporis longitudinem ad intestinum descenderit ieiunum non facile ab illo separatur & mittitur ad hæpar & renes, pectus & pulmonem. Quæ cum ita sint nec urinā prouocat nec sitim extinguit in hac habitudine. Nō enim facile à stomacho mittitur nec ad profunda mergitur corporis. ideo ergo cū quibusdam dāda est syropis aut iuleb aut squingibin. Medicinales autem potus quidam quidem squingibin & est potus febricitantibus opportunus, aut simplex & est conferens causon patiētibz & cholicis febres, refrigerat enim & extinguit & incidit humoris uiscositatē, subtiliat immittitque ad uenas, oppilationem aperit,

rit, humorem educit putridum nisi q̄ tusi mini me conuenit, sed nec intestinis ad quā humor defluit acutus excorians ea & educens. qui autem ex seminibus factus est phlegmaticis proudest febribus. Amplius enim diffunditur & subtiliat urinamq; prouocat. At uero iuleb refrigerat & extinguit sitim mitigat, est & quidem mel lis aqua subtilias incidēsq; phlegma sine forti refrigeratione, est & sirop. viol. emolliens naturam asperitatem liniens canalium pulmonis, & pectoris acumēq; sedat. Vinum autem calefacit subtiliat, corpus confortat, digestionē procurat nisi q̄ febricitantibus ex cholera minime conuenit, sed nec acutas longasq; patientibus febres ut tertianā non purā, quartanā & quotidiana. in quibus cū maturitatis uestigia apparebūt, uinum subtile dādū est qđ inter nouū uetūsq; mediū sit parum tēperatū, adiuuabit & .n. naturā ad maturandā materiā & subtiliandam cum harum sit febrīū excitatio de grossis humoribus. At uero si sit in capite grauitas minime dandum est cum sit eius uentriculos replere cerebri superfluitatibus. Caloris etenim sui causa eius eleuatio ad caput acceleratur, eleuatque qui in corpore sunt secum humores utile ante est debilibus patientibus febrem, si uirtus debilis sit maturitatisq; signa manifesta, si detur aquosū & subtile. Ad hūc itaque modū oportet esse regimen cibi ac potus in omnibus passionibus & morbis, faciasq; hāc tibi regulā qua egrotanti cibum porrigas & potū. hęc ergo sunt quæ nos oportuit ponere de communi regimine in febribus quæ ex putredine fiunt humorum, medela aut. singulis propria simplex iam deinceps incipienda est. Tertianæ puræ regimen primum incipiendum est.

De tertiana pura febris medela. Cap. XII.

ET quoniam ex his quæ dicta sūt dicimus medelam putridarum febrium esse per extinctionē caloris, & putridi euacuationē hūoris, & tertiana febris utroq; eget, nisi q̄ calor in tertiana si sit pura fortior & amplior ac maior est materia cum huius febris sit aduētus de cholera .ru. quæ ceteris est cōplexionis calidioris hūoribus subtiliorisq; materiei, magisq; necesse habemus calorem extinguere quā materiā euacuare. Omning .n. & per omnia cum inceperit febris hęc naturam emolliiri expedit, sed his quæ refrigerant cum mollificatione. ut est duorum aqua granatorum cum suis adipibus & zaccara, succo etiam prunorum & aqua tamarindi. cass. f. aut cum aqua lebelabi, in qua defricata sint zurizidacum in al. casia, f. aut zaccara. aut sirop. r. repetitus cum squingibin aut aqua .r. de unoquoq; iuxta q̄ opus est. Si uero cum febre sit cephalæa & turbatio clysteri uti oportet molli in

quo ē hordeū iuiubæ sebestē, ninifari, cathemia, furfur, uiolarū oleū, zaccara rubea, & muri qui ad inferiora trahatur materia. Sit autem patientis locus frigidus quē excusserit aquilonis uentus, si quidem tempus fuerit æstas, q̄ si hyemis est tempus in temperatis locis aeris. Cum autē euacuaueris egrotum mane intuearis, & si quidem dies est accessionis aquā granatorum dabis ei muzorū & iuleb. cū pauco portulacē, scē diligēter trito, aut aquā tamarindorum diligenter fricatorum colatā cū aqua melonis indi. aut aqua citroli cum portulacē semine aut spodio. propinabis autē ab accessionis hora post terminationē rigoris aquā plurimam frigidā si quidem stomacho & hepati nō est debilitas, maxime autē si humor maturus sit. Pulchrā .n. habet actionē in calorem refrigerādo. Caueas aut aquā dare f. hora accessionis si quidem fuerit tertiana febris nō pura, aut alię febres quę acceduntur, nisi ematuratio manifesta sit, hęc .n. humorem crudificat augetq;. Die aut qua cessauerit accessio dabis illi ascelēbe. a. 40. drac. vsq; .l. cum .i. 10. dr. zaccarē aut sirop. vio. ut autē portexeris feselem be succum post. 4. horas squingibin puri .i. 10. dra. vsq; .20. cum aqua .ro. granatūq; sugat muzum. Non enim oportet dari squingibin statim post hordei aquam, sed nec cum ea miscere ne forte antequā digeratur illam à stomacho emitat nec pascatur laudabiliter corpus. Amplius hordei aqua refrigerat & humectat quandiu in stomacho est antequam digeratur & ad hæpar mittatur ac fiat sanguis. Sed nec incongruum erit squingibin patienti dari ante hordei aquā hora, hęc enim plurimum consonat nature; prece dedit enim & elimat quæ in stomacho sunt & in testinis ac uenis, emittitque quæ in eis sunt uia parans hordei aquæ quo citius cum digesta fuerit diffundatur. De hinc autē quatuor post hordei aquam horis squingibin rursus dabis quō hordei aqua à stomacho & intestinis subtilibus ad hæpar facilius transeat. Post horam uero plenam, meaurum dabis de attriplicibus factum cum cucurbitis, spinachijs, bleta, cabezi, lactucarum radicibus. Quodcūque presens fuerit cum granatorum aqua ac portulacarum aqua & hēserem cum amigdalorum oleo, a cerō aut medulla citrolorum & cucumerum lactucas portulacam refrigeratam cum aqua hēserē & granatorum muzorum aut prunorum recentium aut aqua zezeri i al. gerseti & similia de cibis frigidis utilia, nanq; sunt hęc hanc febrem patientibus, ut ait Hyppocras in aphorismorum libro humectantes cibi conueniunt febricitantibus omnibus magis ante pueris & mulieribus, & quorum sunt humidiores complexionēs, quoniam medela ē infirmi ad proprium reductio statum & naturam, febrium autem est corpora calefacere & desiccare, egentq; ut reducantur ad hābitudinem

itudinem naturalem his quæ refrigerant & humectant, pueri autem humidioris iuuenibus sunt complexionis mulieresque humidiores viris, quare in febribus humidioribus egent ut ad naturalem redeant statum. Oportet autem cum his quoque si tempus estas fuerit cibos eorum cum nunc refrigerari. hoc autem cauendum in his quorum stomachus & hepatis debiles sunt. Facta non accipiat aliquid, siropi heferem aut aquam granatorum & spodiõ, portulacæ semine lehabu seminis psilij, de vnoquoque iuxta quod opus est cum aqua frigida. Accessionis vero die febris, aquam hordei minime dabis, differes prædium donec omnino finiatur accessio, aut in tempore alleviationis eius. Si ultimo erit diei tempus in alia typus eius non incongruum erit tunc diei principio aquam propinare hordei ad subtilitatem inclinantem, nec cessabis infirmum regere rebus refrigerantibus & extinguentibus donec signa maturitatis afferat urina. hæc enim febris si pura fuerit septem tantum in pluribus circulis absconditur. Ut autem signa uideris maturitatis apparentia patientem temperati caloris, inducas balneo, quem sedere in media facies domo balnei. Rorabisque super eum dulcem ac temperati caloris aquam, ut & dissolutione eius materia & compleatur eius maturatio. Sed nec quidem peccaueris si huius febris puræ dominum post. 7. induxeris balneum diem etiam si non maturitatis signa appareant cum sit hac in febre materia subtilis & pauca, id eoque facilis est dissolutionis, magis autem si consuetum ægrotanti est intrare aut omni die aut secundo uel tertio balneum. Quod si appetitus inclinatur eius ad balneum iam conferentius erit. Sit autem qua ingreditur die typus febris uacuus & stomachus eius cibis omnibus. Ut autem induxeris plurimum patientem fricare noli ne forte fiat illi fatigatio. Sed sit omnis tua intentio ut intrauerit aquam temperati caloris super effusionem facere ut materia soluantur reliquæ, humecteturque siccitas corporis, supereffundes autem aqua calidam paulatim. Sitque primo aqua tepida, dehinc ad calorem paululum inclinans. Dehinc uero aqua temperati sit caloris cum sit contrarium ad contrarium transitus semel malus in omnibus. Egrediam autem balneo componas assignato regimine, & si quidem animus ipsius inclinatur ad quosuis lapidosos pisces aut pullos paruos non incommodum erit illis cibari, humectant enim corpus. Oportuni autem sunt illi pisces cum se quebago & pulli cum heferem, aut aqua granatorum hisque similia. Quod si patienti accidat subuersio sentiatque in ore cholas non inutile erit uti uomitu cum squingibin & aqua calida ac stomachum mundare, cui post uomitum dabis sirop. gra. aut heferem sirop. cum aqua

fri. Caueas autem illum ab omnibus cibis quibus inest acumen ac punctio, medicaminibusque utatur quiete & uacuitate. nec ad iram adducatur & tristitiam. Confortant & enim hæc cholera ru. Si ergo dominus febris tertianæ, si puræ hoc utatur regimine, septimum uero transgredietur febris eius diem. terminabitur autem quarto aut quinto sextone circulo.

De tertiana non pura febris medela. Cap. XIII.

Tertiana porro non uera febris est longioris temporis, accessionesque eius horis. 1. 2. longiores, nec est cum calore eius acumen aut morsura, sicut in loco in quo signa descripsimus dictum est. Hæc etenim febris maxime ex phlegmaticis est & cholerae ruberæ admixtionem, maiorque est calidæ materie, quare plurima adhibenda humori euacuationis cura. Omnino autem & in omnibus urina consideranda est, palpandeque & consulendæ arteriæ, & si quidem urinam uideris tinctam, & in arterijs celeritatem oportet patienti dare primo quidam hordei aquam tribus deinceps horis aut. 4. squingibin, & aquam frigidam & pillul. reficies aut zirebazi iure, aut cum aqua heferem, aut granatis hoc autem die quo febris non accenditur. Cum & enim habet hæc longitudinem febris non accenditur. Cum & enim habet hæc longitudinem febris oportet custodiæ uirtutis adhibere diligentiam usque infirmitatis statum. Accessionis uero die mezuaro, refice, aut cucumeris, aut zirei in alia citruli medela. Refrigerat. n. hæc & humectant urinamque, prouocant. Sit autem hæc accessio finita. Intuearis quoque naturam oportet quæ si dura & sicca fuerit mollienda est cal. fr. rotula & tergebino aut tamarindis quietate qua temperat natura. Non enim euenit comodum est huius in fe. magnam principijs facere, donec materia maturetur, dehiç dabis hordei aquam postquam squingibin hæc qui de die quo typus fe. cessat. Accessionis uero die squingibin, ppina solū quem oportet mazauris plus accessionis finem refici. Veniente uero infirmi septimo die, si aliqua uideris maturitatis signa apparere iam tunc euare incipies aut laxatiuo aut uomitu aut urinae prouocatione. Et laxatiuum quod erit absinthij decoctio, quoniam absinthij hac in febre utilitas manifesta est modis quibus pluribus, uno quidem quoniam in eo est potestas ideoque; si non confortat cum hac in fe. stous debilitetur phlegmatis incommoditate quoniam confortatio illi opus est ut cibus perfectius digeretur phlegma non generet. Plurima namque; phlegmatis generatio ex debilitate prouenit stoui cum non ad bonam ualet ciborum digestionem. Secundo uero quoniam urinam prouocat uel excitat absinthij sua phlegmatici humoris subtiliatione & apriendo meatus Tertio quoque; quoniam in eo uirtus est attrahens cholera ru. quæ est chimorum est radix hæc generantium febre. Non oportet uti absinthio, nisi post ma-

terię ematurationem. si etenim ante uteris lēſio fiet manifesta. Absinthio nāq; due sūt virtutes cōtrarię, altera stringēs, altera vero soluēs, q̄ si vtaris añ maturitatē arctatiōe sua cruditatē auget materię & duritię, difficilisq; fit eius dissolutio. At vero laxatiua vult humorē laxare virtus nec pualet eius repulsa cruditate qua ex re natura fit lēſio laxatiuo & attractiuo ī alia labor & alteratio debilitaturq; virtus eius. At vero cum post maturatiōē quis utitur absinthio, pōtica quidē q̄ in eo virtus cōstringēs mēbra cōfortat ac solidat quibus ēt est auxiliū ad expellendas educendasq; materias q̄ sua subtilitate obediētes cito exeūt, et sine lēſiōe aut naturę molestia. Oportet multis etiā t̄pibus lebelabo vti cū turbit modico & besaigo in alia befargo cū zaccara aut cal. si. rotula iuxta q̄ imperabit necessitas trochiscis etiā vtē benefegi quorū hęc est āsīgnatio. Sumūtur violarū recētū. dr. 2. turbit albi. dr. 1. scam. oboli. 5. succi liqui. dra. 5. terātur oīa diligenter & subtilissimē cribentur pāno. su manturq; cū his zaccarā ru. dr. 5. bibāturq; cum aqua ca. est. n. optimū medicamē huic febrī, est. n. huius trochisci cholera ru. laxare & phleg. Nec vero vtēdū vt sēpē iā dictū est laxatiuo nī si prius hūor maturus fuerit eiusq; videbuntur signa, nisi qdē tumultuosa sit passio, de loco trāsitura ad locū. tunc et. n. euacuatiōe vtendū nec expectādū amplius. cū vero nō tumultuat hūor nec signa apparēt maturitatis nullo mō laxatiuo vtaris. Si. n. feceris qd̄ subtile ē in hūore euacuat grossūq; remanet solū, cuius & difficultat maturatio, humor nāq; subtilis si cum grosso ē illum maturat & subtiliat, vñ & eius facilis fit maturatio & post maturitatē exitus. Oportet ēt si materiā ad hēpatis latus videris p̄fundum in clinari & ad venas & intestina clisteri vti, & si humor fuerit phlegmaticus clystere fac calidū q̄ intestina lauat ā phlegmate. Qd̄ si humor dominās fuerit cholericus clisteri vtaris inter lēne tēperato & acutū. q̄ si inclināt ad superiora hūmoratq; in partes oris stomachi, inuenitq; in ore amaritudinē & morsurā ac subuersionē infirmus, euacuatio per uomitum celebranda est post prādium, faciliior est nēpe eius exitus cum plurimorum sit expulsio leuior ea quę paucorum est. Sed & qm̄ humor immiscētur cibo ac facilius cū eō agredit̄. Porro si hac in febrē dominās humor est phlegmaticus admisceri cibis subtiliātia oportet & incidētia vt fauētēgum saturegiā fugiles. Qd̄ si dominās ē cholera q̄scū infirmo da hordei, pisces recētes acētum in alia acutū stiba & similia. vt āt euacuaueris illū vomitū oportet mūdare stōm cū vomitu dato s̄ngi bin & aqua calida nec p̄mixtas in stomacho qd̄ ciborum vel aliud. Quē vt purgatum intelliges oportet s̄ro. aliquem des pomorū simpliciū. Si vero humor ad gibbosum latus hēpatis incli

nari videris illūq; inuenis hypochondrijs dextra grauitatē facientem medicaminibus urinā puocantibus utere similiterq; cibis eadē facientibus. Si āt quo uteris urinā puocans medicamē nō fortiter calidū, ut apij decoctio & feniculi. Mellulla granorū melonis feniculi semē acpasta cę siluestris hęc æqualibus p̄tibis sumpta tere & bibe de eis. drac. 2. cum iuleb aut s̄quingibin somni t̄pe cum aqua frig. Quod si videris febrē prolōgari specularē, & si quod videris sanguinis dōinationis signa manifesta ut corporis ruborē pulsus magnitudinē aliaq; q̄ diximus signa in alio loco, uenā minue aq̄helā & educas sanguinis q̄ritatē secundū q̄ est uirtus reliqua oīa q̄bus euacuatio p̄ phlebotomiā necessaria si gnificat. Vtaris āt restaurantibus & ciba pullis aut frāquillinis & trochiscos spodij da emolliētes omni die exagiū. 1. cum. 5. dr. s̄quingibin cū aqua fri. Si uero minime dñationis sanguinis si gna appuerit oportet utaris medicaminibus q̄ phlegma euacuent tū laxatiuis tū vomitu sicut iā dictum est. Si āt temporis inter euacuatiōē, & euacuatiōem tāta q̄ritas qua possit cōfortari corpus & humorem maturare nec cōtinuetur euacuatio debilitaret et. n. uirtus. In hac oportet fe. cum euacuaueris si amplius p̄telabit rosārum uti trochiscis cum spodio factis exagium. 1. sumens cum s̄ngibin. vn. & 5. mixta aqua hordei. Qd̄ si cū phala erit tinctura & in pulsu velocitas utaris aqua hordei in qua decoctum sit semē feniculi cū spodij trochiscis & intibę aqua, cibaq; auium carnibus subtiliū, ut pullis & frāquillinis cōditis cū zirabago aut espidabago aut frixis utat̄ cibo post dimissionē accessiōis. Die āt quo accendit cibos deferat quos & subtiliet post tipi terminatiōem ut die qdē quo nō acceditur uirtus seruetur. Die āt accessiōis uirtus oīno aduersāti morbo occupet & cōsumatur materia. Quod si infirmi nō patitur uirtus cibi dimissionem accessiōis die, nec est ei cōsuetudo prādū dimitte accessiōis pascat die sorbicū cula quę cum fursure sit & zaccara & amigdal. oleo & quēsto hordei cū zaccara aut tritici sine cū aqua fri. iuxta q̄ egrotantis inclinabitur aīa sitque hęc post accessiōis finem declinatiōēq; caloris ad inferiora ā pectore & vētre. Cauenda sūt oīa quę tardē sūt digōnis. hęc. n. fatigāt uirtutē & debilitāt ī alteratiōe cibi in sāguine siq; phlegma, augētq; morbi mā. Vino āt oportet vt cū manifesta fuerint maturitatis signa in vrina p̄pinetq; post horā vnā cibi. sitq; album subtile nō vetus aut nouū aqua mixtum frigida. p̄derit nāq; manifeste, diffundit. n. cū cibo ad mēbra quę cōfortans urinā puocabit & sudorē, tēpabit cōplexiōē, digōnē, pcurabit. Si uero utat quis ante maturatiōē vino calor augētur & cōfortat ipsius calore eiusq; augmētatiōē cholera augēt cōfortatur liquefit hūor ī oē corpore diffunditur

diffundit, opilationē facit, misceturq; illi hūores
 qñi ac corrūpūt. quare nō oportet vti hac ī fe-
 bre vino nec in alijs nisi post quā maturitatis si-
 gna manifestabunt. Oportet at hac in passione
 stūm emplastrare calefacienti illū emplastro &
 cōfortari ac maturari q̄ ī eo ē hūoris phlegma-
 tici eiusq; phibeat gnationē, & hęc eius descri-
 ptio. Sumatur laudani. dr. 2. & liquefiat cū oleo
 sisami & oleo ro. addasq; illis hęc medicamina
 rosę rubę purgatę. dr. 5. seci ramaci vniuscū-
 iusq; .dr. 1. teratur diligēter cū laudano miscēa-
 tur liqfacto cū oleis & emplastra stōm cibo va-
 cuum ytaturq; balneo aque. ca. ī qua decocta sit
 camomilla, aqua lilelmelec, marcemuscū maxi-
 meq; qñ humorē animaduuerteris ad cutē incli-
 nari exteriorē cū morsura .s. prurigne pustulif-
 que manifestis. Roraq; super stōm vt calefiat
 aqua. Nō at oportet vti balneo proprie ī hac &
 phlegmaticis febribus ac quartana nisi post ma-
 turitatē. si. n. vtaris ante ī his febribus ī qbus mā-
 teria qualitatē earum supat & materia eorum
 grossa nec subtiliatur, trēs fiant lēSIONES. Prima
 est qñ humor cum liqfiet nec dissoluetur, decur-
 rit & opilationem exaggerat, ideoq; et putredo
 eius augetur. Scđ a qm humor putridus cum li-
 qfactus fuerit balnei calore diffunditur p cor-
 pus bonisq; miscetur humoribus quos & putre-
 scere vt ipse est facit. At vero tertia qm materię
 subtilitatem balneum soluit remanetque eius
 grossities, quare eius difficilior fit maturatio &
 dissolutio. oportet aut huius fe. incommodum
 ferentem quiete uti q̄ sit humor suo quietus in
 loco donec maturetur. Caveat ergo & motum
 & laborem, hac enim si quā faciunt humores, &
 diffundunt dissoluunturque optimi humores
 quos & corrumpit & in putredinem transmittit,
 qua ex 1e feb. augetur materia & mora eius
 prolongatur. G. refert hāc iuueni cōtigisse viro
 febrem ac sex ī eo pdurasse mensibus. vidi quo-
 que ego cui hac accidit estatis ultimo. febris du-
 ravitque vsque in ueris principio tempore, &
 tamen eius erat probatum & optimum regimē
 quare hac expedit in febre his que dicta sunt vti
 cauere autem contraria.

De quartana feb. medela. Cap. XXIII.

Quartana feb. fit ex humore cholere ni. gros-
 so & sicco & maturari tardanti ideoque &
 longa est perseverantiā & temporis diuturnio
 ris nisi forte æstate eam fieri cōtingat, secundū
 maiorem etenim partem si hoc anni contingat
 tempore finitur uelociter nec eius prolōgatur
 tempus. Quando ergo hanc in estatem uideris
 febrem tempore ultimorum eius breuē nō om-
 nino cui inest aliquibus cōmoueas medicami-
 bus, sed cibum subtilia dabisq; ius pullorum tā-
 gorum paratorum cum espidabago aut ciraba-
 go aut patellatum prohibeasq; grossis cibis le-

guminibus piscibus lacte, quoque & fructibus
 omnibus & quæ uentositatem generant. Satis
 ergo tibi sit dare illi gelengebin vno quoq; die.
 drach. 7. deinceps squingibin & fructus quales
 vuz passę corrosanice granis mundatę cum xi-
 gillafis in alias floxigilafis amigdalidis dulcibus
 & pistachijs, hac etenim febris si hoc in patien-
 te utaris regimine citius tollitur. Quando au-
 tem estatis ultimo hac febris cōtingit aut autū-
 no aut hyeme longioris est spatij. Principio er-
 go cum contingerit intueri oportet si quidem
 uideris in pulsu magnitudinē & in eo celeritas
 non multa, vrina ru. & grossa ætas plena & iu-
 uenilis, oportet accelerare sanguinis minutio-
 nem de basilica aut aqua hala vena de sinistra
 manu, & cōsidera sanguinis colorem quem si vi-
 deris nigrū & turbatū aufer de sanguine quatū
 opus est si quidem uirtus adiuerit. Quod si ru-
 beus est claudi venā oportet nec aliquid omni-
 no educas, qui. n. sanguis est talis bonus est quē
 si euacuaueris uirtus debilitatur munda, & pu-
 ra, nec deinceps habet resistere morbo, amplius
 si euacuas sanguinem mundum & purum in cor-
 pore solus remanet humor malus pessimus, au-
 geturque uirtus turbati sanguinis nec superest
 corpori quod ei resistat. quod si recte facta est
 aliquo nō phlebotomia patiētē chimorū refi-
 celandabiliū cibus vt pullis, frāquillinis, gallis,
 castratis pīguibus, ouis forbilibus, hædorum &
 agnorum carnibus. laudabiliter præparati cum
 zirabago, tharaago tab hago, hespidabago patel-
 latis in quibus ē anisū in alia clarufani. i. ciminū
 carui, anetū, prohibeas illum a cibus grosso ge-
 nerantibus chimos aut melacholicos vt sunt cā-
 nes equorū. carnes zarcarum maiorum cōple-
 æ lēticulę oīaq; legumina mala & similia. Cum
 uero sanguinis dominationis signa nō iueneris
 nō oportet minui, sed nec euacuare patientē me-
 dicamē aliquo laxatio ī morbi principio quā
 diu crudus est humor. Si. n. hoc tpe vtaris laxa-
 tiuo humorem ni non poterit euacuare pp eius
 grossitiem difficultatēq; decursus eius, sed euacuat
 bonus humor & uile remaneatq; malus ī
 corpore solum, vñ & hęc cōfortat fe. difficilior
 que fit eius expulsio. his itaq; de causis nō oportet
 ī pīcipijs uti medicamine q̄ nigrā euacuat
 cholerā. Sed oportet naturā esse temperatā icli-
 nantēq; ad mollitiem emollientium uentrē usu
 ut olerum cōditorum cum muri & aceto & oli-
 ua, oleo sicut etiam blito corrosanica spinachijs
 femina cogalorum iuribus & carniū cum ze-
 bibo corrosanico, fallagisq; in alia ficibus prū-
 nis dulcibus siccis cum medulla cartami. Si au-
 tem suspensa est natura laxa eā prunorum aqua
 dulciū & uis paslis sene, cal. si. terēgebino aut
 cal. aqua cū zuccaro et similibus, et si nō emolli-
 his natura, clisteri utere emolliēti cū aqua blitis
 & sisami & oleo & muri. Et oportet hac ī feb. ci-

bū tēperate nō vtaris gressio digestionis iobediē
ti, augeatq; feb. materia sed nec subtili peccetq;
in seruanda virtute, debiliteturq; hęc. n. feb. de
longioribus est morbis remotiq; status. Si ergo
subtiliaueris cibū. imbecillis sit virtus in infir
mitatis tēpore status. Cū status cāteris sit for
tior morbi tēporibus, ideo egro oportet man
tenere quo cōseruet ad status morbi tēpus infir
mitas, imminuasq; cibi pederetū grossitiē. Cū
ergo ad statū puenierit febris, iā tūc subtiles ci
bū expedit, quo oīo cōseruata occupet ad resi
stēdū morbo uirtus, sic & i oībus facies morbis
sicut aliquo iā dictū ē loco, dabisq; singulis cha
lēgebin diebus, & squingibi diebus cōtinuis, p
hibeasq; cibo actiōis feb. die vt natura in resistē
do morbo potius occupet, nec uero omnino ut
oportet hoc in feb. balneo nisi cū status eius ad
uenerit declinatio que ceperit. Est. n. balnei hu
mores euacuare subtiles, porro huius materia
febris grossa est. Si ergo euacuaueris qd̄ subtile
est in ea augeat remanētis grossities & vigor, &
difficilior sit maturatio. Quibus at utēdū ē deā
bulatio ē tenuis fricatio leuis moderata quatita
te ut poris fiat dilatacio tēneturq; materia, ne
cessaueris hoc vti regimine, donec maturitas si
gna appareant. Quæ ubi emergent laxatiuo ute
re choleram purgate ni. vt ē hęc decoctio cuius
hec ē assignatio. Sumat lebelachi feselechi in alia
mirabolani chebuli & idi. vniuscuiusq; dr. 10.
bellirici. eblici. cuiusq; dr. 5. vuz passæ corrola
nice granis purgate. dr. 20. sene. dr. 10. absinthij
gręci. dra. 4. linguæ bouis foliorū badernebine.
besfaigi tonfi vniuscuiusq; dra. 4. susani radicū
dr. 5. estacobi. dra. 3. coquas omnia medicami
na in. 4. lib. aquæ donec ad vnā redeat. superad
des epithimi. proijcies inus. dr. 1. cretici i alia
cartami & purgati & ab igne sublatū ita dimit
tas, dehinc fricabis cū poteris epithimū diligen
ter colabis fumesq; de hac. vnc. 10. proijcias de
su p agarici exagium dr. 1. aloes hæpat. dra. 5. sa
lis nastē. 5. dra. ellebori nigri subtilissime tri
bol. 2. bibesq; & sit tepidum. Vtaris at hoc me
dicamine die ab accessione scđo, hic cum vsus
fuerit oportet patiēti dare post accessione tro
chiscorum gaseri exagium vñ cum duabus vn
cijs squingibin zaccare duabus mixtis aq. parti
bus. Die at accessiōis utat squingibin in quo
infusæ sint radices cū aqua decoctionis aneti, &
puocet uomitus, hūor etenim accessiōis die ru
multuosus ē. calorq; illū liquefacit feb. vñ & fa
cile euacuat. hęc at tollerati fe. oportet post ma
turationē vnaquaq; septimana hoc vti medica
mine cuius hęc ē descriptio. Sumat mirabolani
indi, & chebuli. vniuscuiusq; dr. 5. i. al. 7. besfa
gi epithimi cuiusq; dr. 3. terant oīa diligēter cū
tantundem zaccare selimanicæ bibaturq; post
hoc aqua calida sitq; hoc materiæ accessiōis
die. Cum at differtur huius feb. tēpus eiusq; spa

tiū puenierit in hyemis incōmoda, apparet
que maturitatis signa & vestigia, oportebit ali
quibus vti. electuarijs calidis, vt ē electuarium
heltici aut eius pillule. omni die. 3. exagium su
mes dimidium usq; dr. aut aliquid electuarij pi
perei cuius hęc ē descriptio. Sumatur pipenis al
bi ni. & lō. cuiusq; dr. 20. rilob. dr. 10. zinz. apij
seminis felichiz. adari. rasseni. vniuscuiusq; dr.
1. scbeli. emane. vniuscuiusq; dr. 4. terant oīa
diligentissime distēperentur cū melle dispuma
to. Dabis quoq; singulis hebdomadibus de ele
ctuario metrocidi vel metridati & tynaca de
vnoquoq; iuxta qd̄ opus esse videris & quātum
natura ferre poterit morbi vt humor subtiliet
& hęc ē descriptio electuarij uel metridati qd̄
post maturationē quartanę vtile est. Sumatur
pipis n. 3. cuiusq; dr. 3. helthitē dr. 3. quache
felichecz. dr. 8. pic. dra. 10. fautenegi. mōrāgi
fi. dr. 5. teratur oīa diligentissime & subtilissi
me cribentur pāno, distēpenturq; cum apūm
dispumato melle, vini medicaminū partitres
adens mellis. eius potus. dr. sit. 12. cum feniculi
aqua & apij, hoc utetur post humoris maturita
tē. Oportet. n. diligētissime hęc euacere electua
ria sumptūq; formidare eorum ante maturita
tem, afferent. n. non paucas lēSIONES, quia eu
acuare nō poterunt humorem ppter eius crudi
tatem & grossitiem turbabuntq; cum fortiter
& fluere cogent, vñ & bonis mixtus humoribus
alterabit eos i suā naturā, adeoq; & cōfortaban
tur & maior fiet febris. Sepe quoq; hęc materia
in duo defluit corporis loca, suntq; gemine fe
q; si in tria fluxerit tres sunt quartanę. Oportet
quoq; vt caueat ea calide vir cōplexiōis & in
uenis, sed & tpe estiuo. qd̄ si necessitas ad lumen
da coegerit modicum, & cum diligētia accipiat
sitq; illi satis hoc incōmodo & qualitate, trochi
scos scđm minorem accipere partem gaseri cū
squiringibin & calengebin. Et uomitu accessi
ōis die vti oportet porrectiōe cum aqua i qua
decoctum sit fautenegū fluuiale & epibimum.
Quando uero est hyemis tempus patientisq; que
aras senectus cōplexiōq; eius frigida & humi
da, cū hūor quoq; maturari ceperit nō incōmo
dū erit hęc dari electuaria calida. Arceasq; pa
tientem ab omnibus frigidis medicaminibus &
sic. generantibusq; cholera. ru. grosseq; substan
tię. Oportet at huius dominis. sc. vinum propi
nari post humoris maturationem sitq; vinum
nō uetus, sed nec nouum parum mixtum. Cum
at febris ad statum puenierit. patientem ar
cta, subtili regimine ut pullis. franquillinis rau
gis. meaurijsque statu tempore, auimque al
lis ac collis similibusque quo ad resistendum
morbo omnino natura occupetur & materiam
eius possit expellere, utaturq; quiete parū mo
uatur ut i morbū uires cōuertat natura, nec ali
quo impediatur motu a resistendo. Oportet
autem

autem hac in febre hepatis & etiā splenis curā geras, hæpar nāq; humorū est generator., quare oportet curā exhibeas ne forte humorē generet melancholicū. Splē autē huius humoris est locus, curetur ergo ne forte debilitetur accidatq; illis opilatio & grosities, dando patiēti berberis trochiscos, aut geferi cū squingibin in hora morbi & sine eius post maturationem, ante autem in principio morbi usus squingibin ex utilioribus est.

De quotidiana febris me. Cap. XV.

Quotidiana febris quoque difficilis est & longā, maxime si autumnio causa moueri cōtingit, nemēq; cū sit eius ex phlegmate putrido generatio. Cura autem eius sicut & omniū febrū extinctio est caloris & humoris euacuatio, & quoniam hac in febre minor est calor quā materia, oportet euacuationē phlegmatici amplius curari humoris quā super extinctionem caloris. principium igitur hanc patientis febris regiminis .i. quotidianam, cum primum mouetur squingibin. vnc. 2. parum mixtum claræ zaccarē drac. 7. dabisq; tribus transactis horis. tribus autem abeuntibus diebus calēgebin cum squingibin. vnc. 2. parum mixtis. Si uero fortis in eo sit calor & punctura ac morsus, urinaq; tincta simulq; est cum his siticulosus egrorū. Oportet te dare summo diluculo calengebi. drach. 5. ne aut ortus est sol. drac. aquæ hordei da. 40. in qua decoctū fuerit feniculi semē aut eius radicū cortices .4. de hinc horis squingibin. vnc. 2. dabis cum aqua frit. & obseruandum ut hordei des aquam ante accessionem horis. 6. non patioribus autem. 4. ut cū accessionis nenerit hora descēderit stomachusq; uacuus sit hæc facies usque quo omnino calor deficiet. Si autem nō sit illacumen & ardor non utaris hordei aqua nec calengebin. ut diximus donec maturitatis incipiant apparere signa. sitq; prandium cum mezauro condito cum blito & spinachijs aceto. & mari. & carui. ac cinamomo, & si quidē æstas est dabis acetum & caren lēgum oleum cum zuccara paratum menta & silimbrio; & carui. Et si uirtus debilis est franquillinis pascē & tan gis patellatis uel affatis, sitq; condimenta eius piper ciminum darasinum. Ut autem maturitatis uideris signa oportebit euacuare infirmum aliquo phlegmatis medicamine laxatiuo ut turbit, agarico, cartami, medulla, & hæc assignatio medicaminis phlegma laxatiui. Sumatur turbit. dra. 1. agarici. obolos. 4. salis in di. obol. 2. terantur omnia diligenter & cribrata distemperentur, & distemperata pillulentur & in umbra siccent utarisq; summo diluculo cum aqua tepida. Laxatiuum aliud, sumat turbit albi, cartami, medullæ cuiusq; dra. 1. agarici. obol. 4. sa

lis paste. obolis. 2. seminis apij anisi; cuiusque obolis. 1. & 5. terantur omnia diligenter & cribrata distemperentur ac pillulata siccentur in umbra bibantur diluculo & sorbeatur post aqua calida, prodest enim utaris autem hoc medicamine unaquaque hebdomada semel eiusq; in medio uomitum adhibe cum squingibin. cui infuse sunt fugiles & comestis radicibus squingibin bibat, postea cum aqua ca. pauco sale heri fo. hoc .n. phlegma incidit & subtiliat & fluxum faciens exitum faciliat, & si hæc fecerit accessione hora utilissimum erit. Quod si uomitus uacuo nō cōfert stomacho reficiat piscibus salis & fugilibus & utat uomitum cum fugulum & sermaci semine distemperato cū squingibin mel leo & oleo & aqua i qua coctum sit anetū cū sale hēsiro. oportet et aliquādo hæc in febre urinā prouocantibus uti ut apio. feniculo recenti hoc medicaminibus misceat radicūq; accipiat ferula cum calengebin, diutiusq; in eo calēgebin ducatur & coletur hoc scilicet modo. Sume radicū feniculi cortices & radicū apij cortices seminaq; eorum anisum hēsa, de uinoquoq; quātum opus eē extimaueris, decoques in aqua diligenter & cola fricabisq; in ea calēgebin sumaturq; tepidum. Et alterius ferculi hæc est assignatio. quod sumit cum calengebin. Sumantur feniculi radices apij & radices iusani. cuiusque dra. 7. sechabe danredli. cuiusq; dra. 4. seliche. masti. spic. nardi. vniū cuiusq; dra. 1. & 5. miscebulorum. citrinorum & indorum vniū cuiusque dra. 5. uia passæ corosanicæ optime purgare dra. 20. coquant i. 4. li. aque donec ad unā redeant & coletur & sumatur de eo uinoquoq; die vnc. 4. cum. 7. calengebin. zaccarē. dra. Si uero differtur hæc febris extendunturq; eius dies curam adhibeas opus est stomachi ori confortesque illud emplastris in quibus est laudan. ros. ramecum seccum, emplastrizando stomachi et tenim os in hac febre debilitatur & conuiscatur phlegma, porro si stomachus fiat debilis amplior sit phlegmatis generatio. quare oportet etiam ori stomachi medela exercere. utarisque calefacientibus illud ad hæc confortantibus medicaminibus. Et hæc emplastri assignatio illi utilis est. Sumatur secci optimi. dra. 3. laudeni. dra. 2. ro. 1. clerice. cuiusque dra. 10. in alia. 5. zafrañi. dra. 1. terantur omnia diligenter & subtilissimo cribrentur panno & distemperentur cum samuco & nulsene & aqua matcemusi & nemani, & his similibus. Idem quoque ea quæ os stomachi confortant phlegma subtiliant ut hij trochisci. nardi. drach. 1. masti. obolis. secundo xilaloēs obol. 2. terantur omnia diligenter & distemperentur cum eis calēgebin diligenter quo eius acceleretur digestio meliorq; actio fiat desq; trochiscos gase. cū squingibin uilimū nāq; ē. At si phlegma ē multū sit

laq; alba fit quod dabis squingibin melleu. Cū aut ne fiat stomacho opilatio extimesces refrigetur eius complexio trochiscos helbe in alia ab finthij aut lacce cum squingibin propinabis prohibeasq; potus ab aqua, copia maxime uero que cum niue refrigerata est, hec etenim stomachū refrigerat & hēpar augetq; quod huius est febris materia flegmatis. i. gnationē. At si plurimū proteletur febris tempus & cūm urina alba tempus hyemis aut. f. etas senectus infirmi complexio frigida & humida aut horum plura sic oportebit patienti magnam te dare tyriacam diebus interpolatis, dabisq; de ea obol. 2. usq; drac. 5. cum aqua decoctionis cimini & hesse cū asaro, q; si de electuarijs deberis illi calidis ut pipereos & matrocidi quantum est auellana utilimum erit. At uero qñ tps etas & infirmi ca. cōplexio eiusq; etas inuētus nullo modo de tyriaca des, sed nec electuaria horum quidem calidorum. Sufficiantq; tibi quos diximus trochiscos cū squingibin zaccareo aut melleo aut calengebin iuxta q; morbi uideris virtutem & debilitatē omniaq; reliqua quibus oportuna sunt minuatur. Expedi aut omnino hāc patientē febrē omnibus abstinere fructibus humidis omnibusq; quorum est flegmatis generatio laete piscibus alijsq; similibus desq; illi uas passas albas in quibus est modica ponticitas zaccara & mel cum medulla cartami & pistachijs ac medulla helbe uiridis aut aliquādo etiam zaccare in heseremin, prodest. n. illi prohibe quoq; balneo donec maturitatis signa apparent nec febris declinatio incipit, malum etenim est ut posterius dicemus. ut autem apparuerint illi balneum permittit. Roraq; super illum aquam in qua decoctum sit camomilla aqua lilimelch. marcemusum nemanum herēgstum siue in alia similiū & similia his calefaciētia & subuliaria.

De continuariū se me. Cap. X V. L. 101

Continue febris ab humorum putredine qui sunt intra uasa & uenas sunt ut in prima huius nostri libri parte ostendimus. & quoniam quia amplius est humorum in uenas sanguis est, fit ut quæ continua est febris amplius, sanguinea sit quæ dicitur sinochus, quæ etiam acutus est morbus. quod ergo i huius febris principio maxime necessarium est causæ cura. hoc est primo secundo & tertio quo mouetur die ut omnino utatur sanguinis minutione aque hale & basilicē uenarū si uirtus & etas & tēpus adiuerit p̄sens, educa s que de sanguine plurimā quātitatē ut ēt defectus fiat. Si enim hoc feceris aut omnino extirpabis aut proculdubio febrem leuiabis eiusq; breuiabitur tēpus nec deinceps patientis pauebis mortem. Si quando autem nec uirtus nec etas nec patientis complexio, sed nec tēp-

pus suppeditat plurimi. educationem sanguinis semel, educa tamen statim paulatim aut pedetentim iuxta quod hæc subministrant, febris etenim hoc modo fiet leuior. Post sanguinis uero minutionem necesse est utaris granatorum dulcium & acerborum aqua cum squingibin puro aut tamarindorum aqua cum iuleb aut robo heserem aut robo prunorū muzorum aut robo hemmacea cetegi in alia hemmacean regi similibusque cum aqua frigida & niue. & si quidem etatis fuerit tempus cibabis eum die minutionis sanguinis si quidem uirtus est ualida mezauro facto zetetari spinachijs aut laticucarum radicibus aut portulacæ uirgulis aut lilingis in alia cucumeris & citruli medulla cū aqua heseren aut granatorum aqua aut aqua acerborum citoniorum aut berberis succo, & masso. Cum autem debilis erit uirtus patientis die phlebotomiæ pullorum oportebit apponere iusculum aut tangorum aut franquillo rum & horum similia. Mane facto post sanguinis minutionem intueri si morbus hic deperacutis est aut de acutis continuis quibus mora est immixta. Et si quidem de morbis est in ultimo positus acuminis quæ minime diem transgrediatnr quartum ualidatque uirtus abstinere patientis cum solo iuleb aut benefegisiro po & granatorum aqua muzorum aut robo heseren. Quod si debilis fluctuat uirtus aquam propinā hordei cum muzorum aqua granatorum aut si de morbis est acutis qui diem non transeunt septimum & uirtus ualida sufficiat patienti diei principio muzorum aqua granatorum cum zaccara aut iuleb aut aqua emenze citrini cum zaccara & robo heseren in quo nihil sit ponticitatis. dehinc autem duabus horis aque hordei dra. 40. dabis cū zaccare albē & optime dra. 10. Iam aut ad hoc horis transcurrentibus 4. squingibin dra. 15. dabis zaccare simplicis cum aqua fri. Sufficiatq; ei la habum seminis psilij & citoniorum seminis cū iuleb aut aqua granatorum. Si autem hunc dederis illis siropum manifestissime proderit. A signatio eius. Sume pruna dulcia magna trigiōta tamarindorū. l. 5. decoque utrunq; in 3. li. aque donec ad librā redeat. Colabis & mites desuper granatorum aquam muzorū & aquam acerbam citoniorū cuiusq; mediā lib. & temperato decoques igne donec ad dimidiū redeat tunc superaddes zaccare mundissimæ libram & quæ drantem. In aqua rosa optime bullies spumantes separabis ut frigescat ab igne dimittas. Dabis autem ex eo vna quaque nocte dragmas 15. & ab eis usq; 20. cum portulacæ semine diligenter trito. Quod si & calor fortis est & sitis grauis, oportet tunc addere seminis psilij dra. 5. & spodium. Quod si infirmus debilis est aut dum sanus est copie comestitionis affectus,

fectus; & bis in die comedere oportebit te bis ei hebehelein alia hordeia quam in die bis dare. Quod si hec illi non uidebis sufficere comodum erit in fine diei biscorum diligenter tritum cum zaccara dare & aqua ro. vel tritici succum & papaueris aqua lotum ea. deinceps refrigeratum cum zaccara alba. Quod si & hec non placent aut defunt dabis acetum & oleum cum citroli medulla & cucumeris ac amigd. oleo zaccara optima & alba desuper comminuta cum niue & similia. Si quando autem est morbus cuius sit ad 14. uel 7. usque 10. attingere oportebit patienti ut dictum est ante solis ortum melonis aquam dare & granatorum: aut de siropo quem assignauimus cum citrolo & indico melone. & post solis ortum hordei aquam cum zaccara. 4. aut hora potum dabis squingibin simplex cum frigida & cibo reficies pauco cum mezauris ex his quae diximus factis oleribus scilicet cum heserem aqua aut alijs. Si quidem uirtus debilis est & egroto bina in die comestio sit. Quae uero in longius quam dictum est extenduntur infirmitates ampliori hoc reficiantur & grossiori cibo quemadmodum iam alias assignauimus morborum regimina. Scruteris autem cum his pariter naturam & si siccam uideris emolles cum cass. f. rotula & teregebinis ac tamarindis iuxta quod necesse uideris dabisque infusa uiolarum siropo pruna haec si non patitur praeparata ei assaafum de cathemia & buraco. & zaccara factum cum. Sumatque aliquid rechabini quod est machalum corrosanum & faciatque ex eo assaafum & subimmittat sibi & si non obedit horum cuiquam natura clysteriteri molli de zaccara & oleo sisami ac muri factis; aut & de hordeo tunso & uiol. blitorum folijs sebestem uiolarum oleo zaccara cum aut blitorum aqua expressa zaccara sisami oleo muri & similibus. Et si quidem carcerata est natura patienti hordei aquam dare caueas. nec reficias nisi postquam quae emolliunt adhibueris naturam. Sic quoque quando eger phlebotoomia infirmus aquam non expedit dare hordei si non adhibueris sanguinis minutionem. Sic quoque si infirmus in quouis membro dolorem inuenit interiori non oportebit aut aquam hordei aut cibum nisi cum sedatus dolor fuerit dare. Et si lingua asperatur aut nigrescit panno lineo in lababo pilij seminis infuso extergatur & oleo amigdal. dulcium ac zaccara munda. Quod si grauis est sitis lababum seminis pilij dabis & iuleb & amigdal. dulcium propinabisque cucurbitae esse aquam cum granatorum aqua & melonis indi.

Quando autem continua est febris ex cholerae putredine & est acuminis fortis calor; ingrauescit tertianus ut est febris quae cauponatur & incendium, tunc multiplicare necessesse est quae refrigerant & extinguunt quantum po-

teris, hoc nam regimen utilius omnibus quae in hac facere poterit feb. & si quidem immoratur maior ritas & crisis non inest ei lesio. Si quoniam uero breuissimum sit sub in alie sine hoc regimine fallax est patienti. Ideoque oportebit diei principio cucurbitae aquam assata dare quantum 30. sunt drach. cum drach. 10. iuleb. & drach. 5. tabefari. quod si & sitis comitatur morbum & turbatio grauis oportebit cum cucurbitae aqua camphorae trochiscos dare & post pusillum aqua hordei cum granatis porrigenda erunt eunti dormitum aquam citruli & peponis propina cum iuleb & cum papaueris sirop. quem antea diximus cum spodio, drach. 5. & portul. seminis. drach. medullae citruli. drach. & seminis cucurbitae. drach. 5. hoc totum sit si quidem tempus est aestas aut uer; & refrigeratum cum niue refrigerabit et hepatis & stomachum cum panis lineo condito in ceroto & refrigerato de intiba & coriandro & portul. facto & aqua ro. percussa cum cera alba liquefacta cum ol. ro. & ol. uio. ac modico aceto uini refrigerato cum niue si quidem est aestatis tempus. Si uero hyemis est tempus sit cerotum tepidum & oportebit si tempus est estiuum odorare ninfar & uiol. recentem & sand. aquam ro. & camphoram & sit locus eius frigidus aut quem perurat aquilo, aut infusus aquis & aquiloni patens, sternaturque calefactis & ros. pomorum floribus citoniorum sintque eius in circuitu uasa fistilia aqua frig. & niue plena proicianturque in ea lapilli ut condelectetur eis & resurgeat infirmus. Oportet autem locum quo iacet frigidum esse ex pannis frigidis permittasque illi aerem trahere frigidum quo calor extranaturalis extinguatur & calor confortetur qui in pectore est naturalis & corde prohibeaturque operimenta intra corpus calorem arctare quin dissoluatur, nec decet infirmum uerborum producere copiam clamoribus in domo & secretis. Nec desistas hoc illi disponere regimen donec ad statum morbus surrexerit & presenscreticus sit dies, tunc enim cibum subtiliare ultima subtilitate saturque sit iuleb & granatorum aqua & pomorum minorum & siropus uiol. donec compleatur crisis & declinet morbus tunc intuendum est si crisis sudore sit nec in nulla est dubietas educas frigidum patientem loco ad minus frigidum quod si aliam uideris crisis speciem eodem permittas loco completa crisi declinanteque morbo infirmum regimine a morbo surgentium rege ut alias dictum est. Si quando autem morbi aliquae supersunt reliquiae in corpore quae non dissoluantur & in uenis humorum restant reliquiae quae subtiliatione egeant & emissionem aqua intibe aegroti danda est aut aequiflusi succus decoctus & dispumatus de uia quaque dra. 20. cum uio. 5. squingibin semine tribus aut quinque diebus, hoc enim grossas subtiliat reliquias & emittit & meatibus hepatis congruum est, vi-

nam prouocat suntque in eo contra febrium reliquias utilitates plurimæ, quod si natura in hac est sicca habitudine ante persicorum danda est infusio, purgat enim ventrem & educit humorum reliquias calidorum facile & sine molestia, & hæc est assignatio infusionis. Sume prunas. 20. & totidem iuiubas. 30. sebesten poma, yuae passæ cor rosanicæ & purgare à granis. drach. 20. tamarin dorum. dra. 20. ros. r. dra. 7. viol. optimarum. dra. 4. senemeoti in alia senemecie. drac. 7. sumiterræ. drac. 7. seminis intibæ aquessuti cuiusq; dra. 4. fœniculi seminis ani. drac. 2. miro. citri. dra. 15. mitte hæc omnia in 7. vel aq; dulcis. & bullias lento igne & mitte in phiala die ad solem cuius os latum sit. nocte autem in domo non humida fumaturque de eo post. 4. dies, vno quoque die. vnc. 4. cum. vnc. squingibin. & vnc. sirop. viol. Oportet ergo huius dominum feb. hæc arcere regimine: caueasque infirmo peccare. minima namque transgressio in morbum patientium acutum magnum facit nocumentum siue in cibo sit siue in potu; aut si non suo vitæ tempore. in morbis autem prolixioribus patuum non apparer peccatum nisi aut multiplicetur aut frequentetur.

De medicamine febris composita. Cap. XVII.

Compositarum vero febrium medelam compositam esse oportet ex simplicium medelis febrium. Necessè est enim hanc intueri febrem & habitudinem eius utique diligentiã discreptionis & perceptionis ac regularum artis & inde poteris utrum febris ex duobus composita sit humoribus cognoscere vel tribus aut pluribus, & si ex duobus utrum cõtemperatis & eomixtis simul aut quisque horum separatim in corpore sit parte. Hoc quoque cum ita sit utrum due febres compositæ æquales virtute sint aut altera fortior altera & magis fallax. Si quando etenim æquales sunt oportet in earum cura regimen cõtemperare per medicamina & cibos cuique conuenientia alterum cum altero æquali tẽperacione. Quod si altera fortior est altera erit regimen huius cõueniens ut sit causa febris fortioris maior fortior & amplior, debilioris autẽ minor debiliorque. Si quando autem duæ sunt febres & altera fallacior oportet adhibere causam & regimen, febris quæ magis fallax est & periculiosior quo securior fiat infirmus. Sic quoque necesse est facere in omnibus compositis febribus. Compositæ namque febres plures sunt numero & specie compositione diuersæ secundum augmentum & diminutionem nec possibile est earum unicuique compositæ & puræ tractatum ponere segregatum. hoc enim librorum longitudo & explanationis faceret, sed oportet harum dispositorem febrium exerceri plurimum

in febrium simplicium medelis & agnoscere cuiusque separatim formam & causam. Si enim perfectius hoc nouerit possibile erit ei mederi omnibus quæ ex his componuntur collationis uelocitate & bonitate. Exempli causa. Febris quæ dicitur hemitriteus composita est ex quotidiana continua & tertiana fixa: & est difficilis febris fallaxque plurimum. patientis etenim hanc corpus non dimittitur feb. propter continuitatem quotidianæ tertianæque repetitionis sue accessionis temporibus. hoc ergo die difficilis est & generatur in ea casus confortatur calor vitæ natingitur, corpus turbatur & fatigatur fortiter propter duarum coadunationem febrium in corpore. Sæpe autem fit hanc in hecicam transire febrem nimia corporis debilitatione & humiditatis cõsumptione. Huic ergo in principio oportet patienti aquam hordei cum zaccara dare, dehinc tribus completis horis squingibin & iuleb. cibabis illum accessionis die mezauro facto de cucurbitis massa attriplicibus spinachijs, aliquando zirabago aliquando cum aqua granatorum. die autem quo fit accessio pullis & tangis cum espidabago aut zirabago. reficies autem affatis cum aqua romaniarum & heferẽ dabis autem accessionis die succum porulis seminis triti optime fricati cum iuleb. & aqua frigida ac medullâ seminis citroli. & si quidem uideris hac in febre patientis corpus bene se habere nec accidere illi maciem & siccitatem. uile erit emolliri naturam quibusdam temporibus cum modico casie fistu. & tamarindorum adiaciaturque parum turbit quandoque autem clysteri emollienti, sitque regimen tuum in hac febre secundum virtutem alterius passionis feb. & si quidem tertiana fuerit. fortior feb. & grauior & magis lædens sit. tuum ad extinguendum calorem propositum & euacuationẽ cholæræ tu maius. Si vero sit quotidiana fortior & perustior sit tibi maius accuratiusque subfiliare humorem euacuareque phlegma propositum. Quod si uirtute æquales sint, sit tibi propositum medelam aptare & cõtemperare ex duobus quod si prolongatur fe. trochiscos dabis spodij molles cum squingibin diebus continuis. & si quidem uideris calorem fortem urinam ru. & impulsu tenuitatem & duritiem ac celeritatem corpusque consumi & desiccari oportet camphorẽ trochiscos dare. post quos hordei aquam regesque illum quibus hectica gubernatur, molliarisque & refrigerationem corporis & humectationem quantum poteris quemadmodum in febre hectica causa dicturi sumus.

De medela febris qua dicitur epileos & lipareos. Cap. XVIII.

Medela autem epimalos atque ipsa est febris qua

qua sentit simul febricitans frigoris. & caloris accessum, & sit ex phlegmate grosso & virteo hæc autem cum accideret febris, vtendum est regimine phlegmaticæ fe. statim ab eius medela calengebin usu vnoquoque die. drach. 8. accipiens & diligenter masticans post quod aquam bibat tepidam, duabus abhinc horis squingibin zaccare. 2. dabis. vnc. cum seminibus. quod si frigus est graue & vrina cruda sit: & calengebin & squingibin sumantur cū melle, sitque cibus eius pullus paratus cū espidabago aut cirabago, aut patellatus cū cinnamo. & carui hisq; similibus. Transactis. 7. diebus. hoc illi medicamen dabis cuius hæc est confectio. Sume herregi in zalia heyregi. drach. 1. agarici. drach. 2. orientes aloes hepatic. drac. 5. tere & criba subtilissimo panno. distemperatumque cum squingibin. poriges diluculo: sorbebitque post illud aquam cal. hoc cum laxauerit illum dabis mane trochiscos. 10. cum calengebin, & si quidem stomachus eius debilis est xilo aleos & mastic. modicæ addice. Sin autē, sed est in eo ardor trochiscos cū squingibin dabis. Introducas autem illum omni die balneo nec tamē sit in eo diutius ne forte lique fiat humoris subtilitas, remaneatque eius grossities. Vtatur autem simul subtile & temperata fricatione pectorum corpus dehinc reges illum omni quo phlegmatica, feb. regitur regimine. Hoc quoque modo reges lipareon patientem & febrem quoque æstuantem. hæc etenim ex crasso phlegmate fiunt & viscoso febres, vnde etenim phlegmaticæ feb. curandæ sunt regimine ac secundū qd maturitas humoris & cruditas indicabit. Si ergo humor est crudus subtiliantibus reges illum ut talengebine, & masticæ, cum aqua decoctionis seminis feniculi & apij acanisi, dabisq; squingibin melleum, & squingibin hausa licum aqua hesse, aut fautenegi montani aqua absinthij cum trochiscis zurizeddam aliquādo cum squingibin. dabis quoque electuarius helthithi. quandoque non videtur esse necessarium electuarius etiam pipereon, sit hoc post maturationem & euacuationem per medicamen laxarium compositum de turbit. agarico, antali adipe, hyera, granis lini, alijsq; quorū est phlegma laxare. Quod si non patitur tempus nec complexio nec ætas decoctione illum enacues quæ sit ex mirobo cheb. & indis, inductoque balneo super rorabis corpus eius aquam decoctionis babunegi aquam lilecmelec hesse, fautenegi, fricabisque corpus eius oleo in quo decocta sint. camomilla. sibum, quæsumum febeni aut costi oleo.

tur die, quoniam semper fiant ex humoribus cholera. n. nimium grossis in earum necesse est medela regimine uti quo quartanis medemur subtiliatione scilicet humoris euacuatione eius per medicamina cholera ni. laxantia & subtiliatione ciborum commestionis dimissione, vsu quoq; gastrici trochiscorum cum squingibin aut calengebin. Aliquando cum ieiunus est in alia dum remittit est accessions die uomitu cum squingibin quo infusa sint fugiles incisa & aneum & sal indicum ac mel; omnibusq; his similibus quibus in medela vtimur quartanariorum si tempus eorum proreletur.

De accidentium medelis quæ febres sequuntur.

Cap. XX.

Febres multa & diuersa sequuntur accidentia quorum quædam similia sunt febrī complexionique eius consonant; horumque medela eadem quæ & febris; quemadmodum accidit cephalea in feb. vaporum causa calidorum qui in capite ascendunt, eritque medela feb. & cephalea eadem species regiminis. Quædam autem ex habitudinibus sunt morbo dissimilibus quorum etiam medela dissimilis est. & si quidē proposuerimus alterius causam magis alterum augmentatur. Quare oportet quod natura eorum fortius sit & dominantius intrueri infirmo. & ad id nostrū conuertimus propositum, eritq; nostra maior cura in morbi medela consumanda, & si quidem morbus erit fortior & maioris periculi erit nostrum maxime propositum ad morbi medelam; nec tamen omnino prætermisso accidenti. Quod si accidens fortius & ab eo maior urget timor eminentior tua sit in mendo accidenti causa non tamen neglecta causa morbi. verbi gratia. In quouis hominum febris est sanguinea eiusque medela vt nouimus sanguinis est minutio nisi quod stomachus eius debilis est fastidiositatis quæ accidit. causa aut ciborum in stomacho eorum corruptorum. vnde & morsura ac defectus illi accidit & animæ conturbationes ideoque virtus eius debilis facta est, in hoc ergo phlebotomiam non oportet antepone. Si enim huius passionis uir phlebotometur eius virtutis augetur dedilitas. dissoluiturque minutionis causa caloris naturalis quæ sit sanguinis educatione, præponenda ergo stomachi medela & confortatio eius vt quæ sunt illius rectificentur, dehinc patientem sanguinē minue. aliud exemplum. patitur quis acutam febrem; sed & defectum urget. nos necessitas huic patienti dare vinum ut nutriat illum uti quæ calefacientibus eo quod defectus timeatur virtutis talis; tam & si vinum febrem augeat defectus nanque maioris est periculi. hac ergo operatione curare feb. & accidentia illa sequentia oportet

De medelis feb. quæ aut. 5. aut. 6. accenditur die.

Cap. XXI.

Cacterum feb. quæ aut. 5. aut. 6. accendun-

oportet omnesque cum quibus sunt accidentia morbos, quemadmodum in colicæ sit dolore si plurimum fuerit grauis necessaria sunt quæ dolorem mitigant & tranquillat quauis morbi augeant materiam. Accidentia autem quæ febres sequuntur multa sunt & varia. est enim rigor & horror & cepheala vigilæ, tussis, appetitus ciborum corruptio, nimia naturæ mollietates, & siccitas vomitus defectus sudor nimius. Et rigoris quidem ac horroris medela est vt des illis aqua mca. sorbendam stringatque lacertos crurium latis pannulis, fricabisque plantas pedum & quiescat ponatque sæpius manus & pedes in aqua cali. plurimisque operietur. Quod si hæc accidunt sæpius & plurima, oportebit corpus manibus plurimum fricare; temperateque ut cõmunis fiat omnibus membris corporis ipsa fricatio tempore quò non insunt accidentia, & inungatur oleo in quo decocta sit hessa camomilla, fautenegum montranum costum & similia. Et si quidem feb. phlegmatica fuerit frigusque multum & forte, oportet hæc olèra misceri cum modico pipere & gendebedaston, & agarico si enim bibatur de eo. drach. i. vsque exagium prodest rigori qui ex humoribus sit phlegmaticis, & grossis viscosisque, sic quoque fautenegum fluuiale si cum aqua mellis bibatur idem facit. Cephealæ quæ sit cum febre medela est vt super caput fundatur aqua ro. acetum vini & oleum racheloi in alia ro. sitque acetum pars una, olei duæ. aqua. ro. 3. Quod si aliquid addideris portulacæ & aqua citroli semper inuicem aqua aut aqua rufuræ cucurbitæ manifestissima utilitas sequetur. Si autem cum his aliquid sandali miscueris ro. vio. ninifar, vilius erit. & si quidem his sedatur cepheala sine. Sin. sume de opio obolum idest, farinæ hordei & cathemie cuiusque. drac. i. alia sum memite corticum papaueris cuiusque. dra. 2. teras omnia diligenter & cum lactucarum distemperabis aqua & portul. & modico vini acetum emplastrizabisque his caput. Naribus quoque oleum trahat ninifar factum cum cucurbitæ semine, odoret ninifar & viol. recentes eiusque extrema ligentur fasciculis friceturque; diligentius dabisque patienti cum aqua hordei aquam granatorum mazorum. Quod si aliquid intellexeris cholerarum esse in stomacho cuius vapor ascendat caput squingibin & aqua ca. vtere inducatque vomitum patienti & stomachus purgetur sequetur quæ syrop. heserem, & syro. tamarindorum granatorum quoque aqua & his similibus.

De appetitus defectu ciborum cum febre.

Cap. XXI.

Appetitus aut ciborum casus in febribus curandus est cum iocundorum odoratu ciborum ut pulvis assatis in camino qui circumducti pasta

fuerit, eorumque scissione in facie & ore infirmi odoratu quoque suico decocti & calidi panis optime compositi. odoratu quoque vini rihani ac fructuum ponticorum & redolentium ac eos suggendo materia proiecta, corpus fricetur ac oleo liniatur iocundo emplastrizetur os stomachi cum rameco & sandalo. pomorum aqua & citoniorum ac aqua talcha in alia talba, & oleo calefi. Oportet autem ordinari patienti cibum ac dari ab eo quem diligit & quem veretur cuiusque suscipit orationem, nec negligatur huiusmodi accedens cura & diligentia. Relinquere enim cibum debilitat virtutem & dissoluit. Si autem acciderit appetitus ciborum defectus, his quos dimisit febris, scilicet a morbo surgentibus corpora eorum aliquo euacua medica mine laxatiuorum & emollientium quantitate qua eorum patitur virtus, aut quantum euacuari & purgari desiderant ut facilius sit illi utari. quæ in eorum cura regimine quod diximus exercitio pauco ut deambulatione, lectione & similibus & exercitijs. vtatur fricatione, ante cibum sit. absint hijs modicum summant quasi sorbeant parum acetum hancali. prodest namque plurimum prius autem apponantur iocundi odoris cibi ut calidis panis & affata calida ut pullos perdices. cibi quoque muzi, sed & hijs quos desiderat cibos in sua sanitate quos & commemoret, hoc enim appetitum confortat ipsorum adiuuatque ad appetendum cibum.

De tussis & stitis & sternutationis medelis quas se. sunt. Cap. XXII.

AT vero si febrem. tussis comitatur in hordei aqua iuinbas mitte & sebestem & gilabi radicem rasam & tunfam. decoquatur hæc cum hordei aqua cum aquam patienti propinaturus es viol. conditas in ea diligenter confricat. aut dea super viol. syro. frigi. dabisque ei citoniorum seminis lababum & seminis pilij cum zaccara albâ munda. & amigdalarum oleo dulcium. sorbitionem quoque quæ ex aqua fit furfuris dabis aut quæ ex fabis siccis tritis cum zaccara amigdalarum oleo. heiregorumque reficies. Etiam cum spinachiorum mezauro & sarmaci & cabegi cum masso ex coriato & coriandro recenti, & sicco, cum amigdalarum oleo dulcium dabisque illis de hoc puluere. Confectio eius sume cucurbitæ seminis medullâ cucumeris & citroli. vniufcuiusque. drach. 4. spodij gumme arabicæ amilli, quathire cuiusque. drach. vnam & 5. medullæ citoniorum seminis. drach. 2. teras omnia diligenter & subtilissimo cribra panno. & propina de eo. drach. 2. cum iuleb. aut dabis cum eo tantundem zaccara mundissimæ. Porro sternutatio quæ in febre accidit si exuberet caput replet uirtutem debilitat corpus concutit, & aliquando etiam

etiam sanguis excitatur. Oportet igitur hanc prohibere oculos & nasum & frontem & collum fricando, eructuationem vero multiplica spiritusque suppressionem extrema fricet corpusque totum, maxime autem collum oleis humidis ut viol. aliquidque de eo infunde tepidum auribus & cataplasma cervicem de super cum panno calefacto aut lana. & caueant huiusmodi fumum & puluerem. Si quando autem moratur sternutatio, eaque desideras prouoca cum lignorum immisione in naso & ex cartis extensioneque colli & oppositione narium radio sol. aut concluso odoratu, statim etenim fiet sternutatio.

De me. vigiliarum & obstupescationis in feb.
Cap. XXIII.

SI quando autem uigilię febres comitantur patienti papauer recens dare expedit cum zaccara & propina illi viol. oleum & cucurbitę seminis oleum conditum cum recentibus viol. caput cum recentibus emplastriza viol. cataplasma illud aqua decoctionis hordei excorticati & tunsi ac papaueris propinaque illi sir. papaueris & in aqua hordei mitte. papauer cum corticibus suis & viol. recentem ac ros. camomillam cucurbitę rasurę eiusque semen tunsum & similia, & oportet te hoc facere siquidem non erunt uigilię ex crisis signis. Si quando autem sunt crisis causa patientem nullo modo mouere nec eius aliquo faciliare naturam oportet modo nec omnino infirmi caput lacti approximes, affert enim lesionem magnam: timeretur enim ne turbet cerebrum, est enim in lacte dissolutio fortis, eūque inuenerit materiam dissoluit & dispargit. Quod si stupor patienti acciderit medeberis his que in causa obstupescationis dicemus.

De medela mollitie natura siccitatis uomitus, sudoris multi & ariditati que sunt cum febre.
Cap. XXII.

QUANDO autem incarcerationa est natura patienti dabis cassię sis. & terengebin tamarindorum prunorum, zebibi. viol. siccarum, rosarum, vniufcuiusque suscipiētem decoctionem iuxta quod opus fuerit, dabisque ei lababum prunorum & cassi. si. aut ante prandium pruna appones dulcia sine corijs infusa iuleb. aut viol. sir. & lebelabi cum zaccara rubea, & aquam duorum granatorum cum adipibus suis. Si non placent hæc & lædunt patientem medicaminum porrectiones transijteque inclusio naturę. iam quatuor dies clysteri vt ere emollienti, ut est clystere quod fit ex blutis aqua expressa & zaccara ru. & sisami oleo. & muri, aut clystere in quo cadunt hæc, hordei tunsi excorticati. drach. 20. fume. in. 3. aque si bris fac bulire donec ad libram redeat, tunc cō

fricabis in ea cassi. sis. rotularum drac. 20. & colabis ac proijcies in illam olei viol. drach. 10. in alia. 20. & totidem muri. Aut etiam utaris aliafo. cathemie & buraci & zaccare. r. aut aliafo. narengebin quod est massallum & cibes illum mezauro labelabi cum oleo amigd. espidabago. factum cum oleo oliuę & muri. Cum autem in febre nimia erit nec mollities aquam suic ei cum gummā ara. & terra ciprina, dabis uno quoque die. drach. 1. sitque in ea decoctus fructus mirti aut citoniorum frusta. Dabis etiam seferengeli in alia. fergedi sirop. & ribesi, dabisque puluerē factum de psilij semine, & semine safatemi in alia sciferemi frizo suauiter cum modico cimini arabico & terra ciprinea semen quoque meum & spodij parrem. Cibabis autem illum mezauro & zirabago cum uvis passis & granis granatorum, ac vngul. portul. aut pauco acerborum condito cum sumac aut heserem aut zerasquia aut biscoto cum aqua citoniorum aut aqua pomorum uel etiam pirorum. Si autem non conuenit aqua suic hordei propinari, propina saltem spodij trochiscos stringentes cum citoniorum syrupo. Quod si est mollities naturę cum sanguine dabis illi in potu puluerem tami aut puluerem carabe cum sumac aut portul. aqua similibus quemadmodum hac in infirmitate separatim dicturi sumus. Si autem cum morbo etiam vomitus contingit granatorum, dabis siro. factum cum menta & ribesi robo aut citoniorum aut robo heserem propinabis quoque succum pomorum & aquam eorum quę muza sunt cum corticibus pitatorum exterioribus emplastrizabisque stomachum cum sandalo. aqua ro. aqua pomorum aqua mirti. aqua quoque ro. & aqua calefi. cum modico laudano & rameco. Simul autem intue dum si huius uentris effusio causa crisis facta est minime amputandam, sed permittendam iudicamus quandiu patiatu uirtus nisi modum transgrediatur & ultra uires fiat. & quod si fiet utaris his quę naturam constipant ut dictum est.

De sudore. Sudor autem si exuberet nimiusque sit timereturque uirtuti ne eo subruatur corpus patientis oleo inungi oportet helalech dato uel halembacho & aqua mirti & tutia trita cum aqua ro. ungaturque corpus oleo calefi. aut pulueriza super illum rosam siccam contritam & intuere si locus patientis calidus est amone illum in frigidum quem aquilo combusserit ut confortetur corpus eius & sudor retineatur.

De m. defectus cum febre. *Cap. XXV.*

CUM autem febrium patienti molestiam subuersio acciderit oportet quare contingerit speculari, & si quid est causa cholera ru. ad os stomachi defluens aqua rorabis frigida super patientis faciem os stomachi frica & uentrem, ligatura eius

ga eius manus & pedes cum fasciulis fortiter ut ad inferiora trahatur materia, apprehende os & nares ut calor ad interiora redeat naturalis, propina illi uinum tenue & aquosum aqua mixturum, sed & sir. squingibin cum aqua ca. ultimus est in his ut choleram ab ore cogant descendere stomachi, aut cum uomitu educatur. quod si effusionis uentris causa defectus hic acciderit omnibus quae dicta sunt curabis excepto squingibin cum aqua ca. odoret aquam ro. sandalum camphoram. fiat illi uentus cum aliquo irrorabisq; aqua ro. plurimum refrigerata uultum eius. dabisque ei panem uino infusum propinabisque pomorum siropum & siropum hespanicorum & citoniorum liniesq; stomachum succis stringentibus ut aqua citoniorum & mirti aqua quoque uitis ligaminibus. Quod si acciderit nequitia febris humorum malorum defectu. oportet hora qua febris ascendit ligari crurum lacertos, uerberaque manus & pedes. & talos quo educatur ab interioribus corporis ad exteriora materia & ab eminentibus atque a dignioribus ad minus digna membra, prohibebisque illum somno. Somnus enim materiam ad interiora deducit corporis, immergitque calorem naturalem. Prohibe etiam cibo ne forte occupetur in ciborum celebranda digestionem calor & non in maturatione materiae, sed ne & repletioni addatur extinguaturq; naturalis calor. Si quando etiam siccitatis causa in principio accessionis defectus acciderit oportebit ante accessionis horam cibum apponere, sed cum iudicio. ut siquidem qui acciderit defectus difficilis pannum infusum in uino ueteri dabis tam etsi enim uinum febrem augeat, sed tamen uirtutem adiuuat uitalem, ac corpus pascit, dabis quoque sir. pomorum & eorum aqua ac citoniorum & eorum aqua, pedesque illius & manus liga & frica utrumque, trahitur enim materia ad extrema & declinatur frictione ad exteriora. At uero si defectus minime fortis est cibabis patientem ante accessionem pomis, piris, granatis, quo his stomachus confortetur & uirtus seruetur uitalis. Quando autem iam incepta febre defectus acciderit oportebit patientem pane cibare uino infuso calefacto quo eius ad membra acceleretur missio & humectet ea prohibeatque desiccari. Hoc ergo regimine oportet eum regi ac curari cui in febribus defectus accidit. Omnes autem defectus species commemorabimus inferius & medelas earum cum de passionibus cordi dicemus accidentibus, quoniam defectus ex morbis fit qui cordi contingunt.

De hectica febris medela. Cap. XXV 1.

Febbris hectica si fiat in aliquo usque ad marcoris & consumptionis terminos, apparentque

omnia signa quae supra diximus, extenuatio & siccitas cutisque oslibus inherentia, desiccatio humiditatis complexionis ventristenuitas & consumptio decoris faciei & frontis. Aliaque quae diximus cum de hectica febris signis loqueremur, non oportet eius sanationem sperare. In morbi autem principio dum adhuc uirtus ualida est membra quoque carnosa, corpus optimu febrisque mollis, pulsus non tenuis durus, & omnia adhuc signa dubitabilia non manifesta adhuc sanari potest & expelli si regimine quo oportet regatur. Primum ergo quod in hac facie dum est ut sit eorum in aestiuo tempore in locis frigidis habitatio in quibus septentrionales perflent uenti aquaeque percutient. Sint in circuitu posita uasa fictilia in quibus aqua sit frigida & suavis, odoresque frigidi, ut rosa, ninfarum, pomorum flores & citoniorum pirorumque, folia quoque calesi extra nitium & mirti recentis sandali, aqua ro. & camph. Iaceat in loco stratisque lenibus similibusq;. Si uero sit hyems sit in locis aeris temperati in quibus non horrescat, prohibeasque illum a labore motu, uigilijs, famae siti, coitu, nec sedet irae & tristitiae. Dabisq; illi hordei aquam in omni die cum zaccara mundissima iuxta quod opus esse intelliges. postquam autem hordei aqua acceperit dabis ei iuleb aut papaueris syro. aut iuiubarum. unc. circiter duas cum aqua fri. Introducas illum etiam in aqua tepida concham,eductumque refice: pullis humidis edisque conditis cum espidabago cum cucurbitis & lactucarum radicibus spinachijs atriplicibus. Quandoque autem fac illi sorbitionem de heueri farina & cum zaccara & amigdalorum oleo dulcium & atria. Nonnunquam uero cibabis piscibus recentibus optime conditis cum espidabago aut frixis cum oleo amigdal. aut assatis desuper proiecta aqua & sale. Quandoq; etiam refice lacte a quo butyrum eductum est caprarum recentium aetate corporibus sanarum. At si non adhuc sit manifesta febris, sed est mollis lacteilum dulci refice maximeque asine lacte & ouis sorbilibus. est enim illi utile. medulla quoque cucumeris & citroli lactucarum radicibus & intibae medulla condita ac similibus sitq; eius cibus in diebus paulatim iuxta quod digerit stomachus eius uelociter & membra suscipient. De fructibus autem illi dabis granata optima persica nabatica bene matura poma quoque similiter iuiubas recentes, non tamen multifacere oportet has, ficus quoque & unae laudabiles sunt si porrigatur earum quae oportet quantitas maturarum & musa de dulcibus & zaccara quoque cum humidis amigdal. & medulla seminis citroli & his similia. Non arceas illum aqua ayeze rei in alia aqua frigida. reprimas autem illum ab omnibus calidis & siccis & proijce super peritus & hepar eius infusum aqua r. & sandalo parum

min: aut cerotum cum aqua ros. factum & aqua portulacę, & quęssare humidę super niue cum oleo ros. & uiolato, oleo. ut autem incaluerit pannus frigidus immutat: odoret autem oleum uiolatum & conditum cum cucurbitę semine, oleum quoque ninifar: sitque eius uestimentum uestes lineę molles & suauēs: & si fieri potest q; cum sandalo & aqua ros. eius tingantur uestes: animę eius uirtus augetur & membrorum. Hoc ergo regimine hecticam patientes febrem regendi sunt in quibus signa non apparent consumptionis. hæc enim habitum eorū confortant & ad sanitatem reducunt. In quibus autem consumptionis iam incipiunt, apparere signa & febris manifesta est os cauere frigidum oportet aerem ne forte catharri accendant denturque illis quotidie ante solis ortum camphorę trochisci cum aqua granatorum & aqua melonis indi & cucurbitę aut citroli, ut autem sol ortus fuerit hordei aquā dabis in qua decoctę fuerint iuiubę, & papauer & proijce desuper parum amygd. olei dulcium: aut seminis cucurbitę olei quantum est exagium. Tribus autem deinceps horis parum dabis syrūp. papaueris aut iuiubarum, aut iuleb introducasque eos in concham aquę suauis: in qua decoctum fuerit ninifar, uiola cucurbitę cortices sitque in mediā balnei domo, & in loco qui temperati sit caloris & aeris. Nec omnino calidam ingrediantur balnei domum nec locis in quo anxientur sudentque: parum sint in concha & temperatę, egredi sique corpus eorum inungatur oleo uiol. aut seminis cucurb. & odorē trahant expectent paululum & reficiantur carnibus zunedarum conditis cum espidabago cum amygd. omnino: sed & atria in qua sint cucurbitarum frustra aut lactucarum medulla & reliqua quę diximus. Vespere autem introducantur in aqua tepida concham quemadmodum in principio diei factum est & eodē reficiantur cibo: nec uero multum sumant: denturque eis dormituri iuleb, aut iuiubarum syr. cum seminis psilij lahabo aut seminis citoniorum aut succo portul. seminis triti & fricati cū aqua dulci, cum drach. i. dulcium amygd. utarisque in illo regimine refrigeranti ut diximus & humectantibus, & ceroto refrigeratiuo. Et hæc est assignatio trochiscorum camphorę. Summe medullam seminis cucurbitę & melonis in al. floxi galferi & medullam cucumeris, & citroli sefergeli, cuiusq; drach. 5. ros. r. purgat. drach. 3. guin. ara. sandali albi, amili quę thire. cuiusq; drach. 2. liquiricię succi, spodij, cuiusque drac. 4. feniculi seminis. drac. 1. camphorę. drach. 5. usque exagium dimidium. terantur omnia diligenter & distemperentur cum lahabo seminis psilij. Si sit autem cum hac febre naturę mollicies hos dabis trochiscos patienti quorum hæc

est confectio. Summe papaueris albi medullę colozacrę in al. semin. cucurbitę medullę seminis cucumeris & seminis citoniorū frixi uniuscuiusque. drach. 7. guin. ara. spodij, seminis hermazę terrę cipricę. cuiusq; drach. 3. amili. drac. 2. ros. r. mundatę. drach. 5. camphorę. drach. 1. tere omnia diligenter & cum lahabo seminis psilij. distempera & trochisca sic. ut quisque trochiscus exagij sit vnus: propinabisque cum pomorum aqua ac cum citoniorum summo diluculo. Post solis ortum suicum hordei dabis cū aqua in qua decocta sint grana mirti aut citoniorum frustra, & proijces desuper gumma arab. & terram cipricam iuxta quod opus fuerit. Confectio utilium hecticę febris si sit cum ea uentris solutio trochiscorum. Summe cucumeris seminis medullę citoniorum cucurbitę. frixorum cuiusque. drach. 5. terrę armenicę castanearum, cuiusque. drac. 4. rosa. foliorum r. granorum mirti, seminis emaze. carabe. cuiusque drac. 3. spodij. gummi arab. cuiusque. drac. 2. tere omnia diligenter & cum citoniorum distempera aqua: & trochisca quemque trochiscum exagij unius & bibatur cum robo mirti & aqua frig. summo mane. Sitque cibus patientis massum excoriatum & frixum decoctum aut milium tunsū decoctum cum espidabago. In quo autem consumptionis apparent manifestę iam signa non tamen eo usque res deducta est ut sanari non possit: hunc quoque hoc eodem regimine condecet regere quo diximus: utanturque camphorę trochiscis summo mane cum lacte asinæ uel mulieris in quo aliquid bō bacis proiectum sit: quo eius spuma & pinguedo sit abstracta. hoc quidem si non fuerit febris ualida illis & acuta: dehinc autem concha tepidę aquę introducatur in loco largo & in mediā balnei domo & prope ianuam: sitq; ibi temperatę & egrediatur & immergatur aqua frigida dulci siquidem tempus estas fuerit. Si autem sit hyems aqua sit tepida. deinde autem ungatur corpus eius oleo uiol. puro: & si fuerit factum cum cucurbitarum semine. utilius erit. Propinetur hordei aqua cum papaueris syr. tribus deinceps horis apponat aquę tepidę conchę introitum in qua decocta sint uiol. ninifar. cortic. cucurbitę & papaueris, & hordeum tunsū & excoriatum mesani flores & semen cathemię & cabezi & folia eius & folia lactucarum semperuiuę & similia: sit in ea temperatę: egrediaturque & immergatur aqua frig. dulci. sed non multū: ut non percutiatur corpus eius ea & hispidum fiat. Qua egressus ungatur oleo uiol. & ninifar. uestes induat: reficiatur pullis & tangis piscibus quoque lapidosi aliisque cibis digestionis facilibus: nec impleatur cibo: sitque escarum quantitas quę cito digeratur. Facto autem uespere cum stomachus purgatus

est & cibo uacuum: tunc uti forbitione oportebit quæ hac utilis est in infirmitate. A signatio. Sume arugenz in al. lenticulæ excoctæ. drac. 20. fabarum albarum tunfarum. drac. 10. malsi sine corticibus: papaueris albi cuiusque. drac. 7. amygdalarum dulcium sine corticibus. drac. 5. coque omnia in tribus libris aquæ donec perfectæ cocta sint & cola ac projice desuper aquam cucurbitæ muze, & amygdalarum dulcium, oleum & fricabis desuper medulam panis simile quantum opus fuerit de qua sorbeas. 4. unc. usque. l. 5. & in ea expectet aliquantulum & ingressus balneum conchæ faciat quæ admodum in diei principio: ut autem egressus fuerit stomachusque eius uacuum est & omnia quæ fuerant porrecta diligenter digesta sunt & a stomacho descenderint. dentur eis quæ diximus lahaba & iuleb: aut granatorum aqua aut papaueris syru p. Cum autem febris non fuerit non incommodum erit lac suggere mulieris à mammis, aut lac asinæ accipiat cum mulgatur. Si sit autem calor & febris patiens omnino lacti non approximet: & dabisque lac uaccæ à quo butyrum eductum est, sicut alio loco dictum est emplastrizeturque: pectus eius cum ceroto refrigerato. Si autem constipata fuerit natura quouis tempore detur ei cas. si. & manna aut lahabum prunorum: sed & pruna nabatica infusa syrup. uiol. & similibus & caue naturam emollire: illaudabile nanq; est in hoc morbo. Si autem mollita quandoque fuerit puluerem tam dabis cum myrti syrup. & succo hordei cum gumma arab. & terra ciprina. aut dabis trochiscos spodij stringentes: sed imminues eorum zafranum cum myrti syrup. dabis etiâ hos trochiscos. utiles enim sunt ad huiusmodi. A signatio eorum. Sume medularum seminis carelegi. cucumeris citruli. frizarum cuiusque. drac. 3. gummi ara. amyli, spodij. cuiusque. dra. 2. & s. seminis portul. & seminis emaze frizorum. drac. 4. sandal. al. drac. i. castanearum. dra. 2. camphoræ. drac. 5. terere omnia diligenter & cum seminis psilij lahabo distempera & trochiscos unius fac exagij usque. drac. b. bibaturque cum myrti robo: & pascatur lacte à quo butyrum eductum est in quo proiectum sit biscoctum aut mezauro facto cum masso excoctato aut lacte eiusmodi in quo decocta sint cytonio

rum frustra & pulverizes desuper parum pulueris glandium & misceatur cum castaneis & gaira & zafrano & benaco sicco. Si autem peruenit huiusmodi patiens ad consumptionem & marcorem: & certa est corporis siccitas & extenuatio consumptaque ex humiditas & cessit ab eo uenustas & decor nulla est curæ spes: aut ad eius sanitatem uia nisi ut custodiatur uirtus: ut supersit aliquo tempore. Oportet ergo ad hoc illi lac mulieris dari, quod etiam de mammis eius sugat stilleturque super illius corpus lac dulce quod statim eductum est & si fieri potest in concha, quæ lacte hoc plena sit, sedeat egressusque corporis eius irroretur aqua suavis in qua feceris bullire uiol. & ninifar. dehinc corpus eius oleo inungatur benefegi puri & ci betur pullorum carnibus ac franquilinis & fasianis tritis in qua proiecta sint cytoniorum frustra & pomorum sirorum. parumque uini & loco cinnami frustum xyloaloes crudæ. sorbeatque iusculum: fiat quoque illi aqua carniū eduli subtilis: aut aqua pullorum cum aqua pomorum & citoniorum, & projiciatur desuper aliquid biscocti, hæc enim quædam cōseruant uirtutem custodia. sit autem aqua carniū hoc modo. Sume carnem & minuatim incide: & in uas lapidum uel lebeten projice ac sub eo ignem succende leuem: & cum coeperit aqua glutinosæ esse coletur in uase & iterum igni apponatur. & quodcumque glutinari incipit coletur & sic utatur cum opus fuerit eas quis. Ne uerò prohibeas illum ab his quæ appetit & proponas iocundos odores ut sandali aquam irremazarataram. in al. mezatam, camphoram, uaporetur cum sandali frustis & xyloaloes crudi, & camphora eius camisia tingatur cum sandalo & aqua rosa. & camphora. & sternatur locus quo iacer odoribus & safereno ninifar & uiol. & ros. & fructuum floribus. & calefo. & siquidem est æstas in circuitu eius uasa cum aqua frigida ponantur & lethaletum iocundum. sitque conuersatio loco quo est uenti transitus frig. quandoque etiam irroretur eius facies aqua ros. refrigerata. Viaris ergo in huiusmodi uiro hoc regimine & simili. Si enim feceris uitæ eius prolongabitur spatium aliquandiu nec accelerabit mors.

F I N I S.

A C T V A R I I

FILII ZACHARIAE

DE FEBRIBVS

L I B E R.



De agnitione februm.

Cap. I.



V M nihil aliud sit febris, nisi ob antecedentes causas, externi caloris incrementum, multa variaque particularium febrium genera oboriuntur. alia. n. diaria, Græcis *ἐφ' ἡμέραι πυρετοί*, alia: continuæ & continentes, illas *συνεχ.*, has *συνέχουσ* Cræci nominant: nonnulla intermittentes, & aliqua: q̃ in habitum iam transferunt, *ἐκ τινος* appellantur. Et diaria: quidē ex solo spiritu plus satis excalfactio: continuæ verò ex putribus quibusdam humoribus, vt hecica, q̃ in habitum cordis febrium vitium abiit, committuntur. Harum omnium maximè moderatæ sunt quæ diaria: nominantur, quippe quæ mediocri quadam occasione enascuntur. quædam enim ex ambientis frigore aut calore: alia: rursus ex ira, aut dolore, aut cura, quemadmodum nonnullæ ex cruditate, vel lassitudine, vel alio quopiam eiusmodi gignuntur. Vocantur autem diaria:, & vno fere die desinant. sunt tamen ipsarum quædam, quæ in quartum vsque extenduntur. Atq; hæc oriuntur, cum corpus nō est impurum. Quod si cacochymia quæpiam, aut alia incendio apta materia latuerit, ea. ceu originem, diaria: calorem naçta, affectum in febrem quæ ex putredine conflatur, commutabit, nec amplius iam ut diaria, sed vt febris ex putredine finiatur. Neque id mirandum est, quando etiam diaria: nonnullæ in hecicas, velut postea pluribus docebimus, delabuntur. Ac diarias febres facillimeq; curabis: verum quas putredo genuit, non ita promptè, eas tamen procedente oratione dignoscere etiam discēs. Proinde diaria: complures causas habent euidentes, frigore nimirum, vel calore, aut dolore, iræ, aut lassitudine, atque id genus reliquis antecedentibus. Vrina: in his ut plurimum non carent coctionis indiciis. Pulsus celeriter dilatantur, nec præpropere intro mouentur: differunt tamen

inter se, pro antecedentium causarum discrimine, quarum principia si non ignoraueris, modos quoque quibus alterari consueuerunt iniecta manu diiudicare commodè poteris. adhæc egri in tolerando lenitas, solutionis in diariis celeritatem tibi ob oculos proponet. Cæterum febres quæ ex putredine fiunt, alia: continuæ & continentes, reliquæ intermittentes vocantur, atque illarum quædam eundem seruant tenorem, vigoremque, *ἰσότητος καὶ ἀμείνων πυρετοῦ* Græci nuncupant, quod una eademque sit febris vis: alia: *ἀραιμενῶς* dicuntur, utpote quæ unâ cum febris robore vsque ad solutionem progrediantur: nonnullæ *παρρημενῶς* nominantur, quarum vsque dum desinunt vigor paulatim serenit. Porro continentes (Græci, vt dixi *συνέχουσ*) peculiari nomine appellamus, quæ ex sanguinis nimio: fervore accenduntur. Continuas verò, Græcis *συνεχ.* nominatas, eas potius dicimus quas humorum variorum putredo committit. Ex intermittentibus autem alia: quotidie, quædam tertio, aliæ quarto quoque die reuertuntur: vt & nonnullæ tardius quinto aut septimo redire feruntur. sunt quoque quæ inordinatis accessionibus repetant, quas illi *πληνται*, nos uagas atque erraticas nominare solemus. Quæ singulis diebus accedunt, quotidianæ appellantur, atque ex pituita quæ extra venas putruit, conflantur. In ijs. vrina circa initia cruda est, subcandida, aut perturbata: pulsusque contractionis velocitate, materiam quæ succenditur indicat. Horror ergo eas primùmprehendit, pulsusque inæqualitas ac tenuitas: deinde succenditur febris, & decem & octo horis, aut paulo plus minusve per accessionem occupat, nec vllò plerumque cum iudicio sensibili desistit. Quarum autem accessio tertio quoque die accedit, eæ ex flaua bile, quæ & ipsa extra venas vagatur, consistunt. Hæc cum rigore vt plurimum inuadunt, dehinc febris vsque ad horas. ferè duodecim extenditur, licet nonnunquam plus minusve perduret, pro humoris uidelicet cras-

sitie ac copia, & virium ægri robore, cutisque perspirari facili. Nullæ hic in vrinis coctiones sub initia apparent, & colore flauæ rufæ visuntur, suntque illæ calidiore, quæ liberaliori tinctura inficiuntur. Quædam earum sudore desistunt, aliæ bilis flauæ vomitu, ac cius per aluum egestione, & sanguine è nare erumpente desinunt. Pulsus in harum inuasionibus non sentiuntur, vt in quotidianis, parui ac inæquales. Atqui quæ post quartum exacerbantur, & quartanæ nuncupantur, ex succo melancholico constituuntur. In his extrema primum refrigerantur: deinde ita febris viginti horas perdurat. Vrinæ tenues sunt & albæ, quæ postea perturbentur, & pulsus, qualis in diarris. Cæterum febris vnaqueque, ex anni tempore, loco: adhuc temperamento, viuendi ratione, ætate, atque illis quæ singulos humores augere solent, discernitur. nam si quis ex his comitantibusque symptomatis eas rite coniicit, exiguum, ni fallor, aut nihil, quod ad exquisitam dignotionem pertinet, eum latebit. Atque hæc sunt simplicium intermittentium febrium notæ. Verum ignorare non licet, nonnullas ipsarum aut sibiipsis, aut alijs permixtas, multa intermittentium febrium discrimina gignere. nam quæ tertio quoque die accedunt, duplicatæ, falsam quandam quotidianæ imaginem præbent, quod iam singulis diebus repetant. sed ab ijs qui rectè iudicare nouerunt, ex accessionum specie, & comitantibus symptomatis arguuntur. nam qui rectum potest de simplici tertiana iudicium ferre, is facile duplicem quoque discernet. Quæ post quartum reuertuntur, si duplicantur, duobus continetibus diebus redeunt, vnoque intermittunt. quæ admodum rursus, si forte fortuna quartana increuerit, triplexque è simplici euaserit, quotidianarum more singulis diebus accessiones infert. Verum harum singulæ, eum qui accurate simplicem diiudicare nouit, siue duplices, siue triplices fiant, latere non poterunt. Quod si interdum quintanas, & sextanas, & septimanas, aliasque eiusmodi, & præterea uagas nominari audieris, ne has quidem, seu fieri nequeant, nullas esse arbitrare. nam cum quatuor in nobis humores reperiantur, ipsorum quisque ubi immutatus est, multas uariasque succorum corruptorum species generat. quare pro corrupti quoque humoris quouis dominio, etiam accessiones repetunt. Porro vagæ & errantes, è turgenti quidem materia nascuntur, sed quæ inordinato atque alij nondum confecto alio accumulato cibo compescuntur simul & increfcunt. Cæterum quemadmodum duplicatæ secum febrium differentias constituunt: ita & cum inter se permiscuntur, alia febrium genera oriuntur. nam quotidiana modo cum tertiana, mo-

do cum quartana miscetur, adeo ut tres fiant inter se consistentes coniugationes, & vnaqueque pro humoris in corpore redundantis natura, sibi peculiarem parit accessionem. Atque hæc ad febres interpollantes spectant: sed alia præterea est conuinuarum & interpollantium complicatio. nam nonnullæ ex ijs quæ continuæ accessionibus vrgent, aut quotidie, quando videlicet pituita in venis corrupta computruit, aut post tertium, cum venæ biliolo humore abundant, aut quarto quoque die, cum atrabilis humor in venis infestat, cum prædictis intermittentibus complicatæ, alias febrium differentias constituunt. nam modo quæ quotidiana accessione continua est, cum quotidiana intermittente, aliàs cum ea quæ post tertium interpellat, quam etiam semitertiam, Græci *ἡμιτερτία* priuatim appellant: & demum cum ea quæ quarto die intermitte, implicatur. Sic & cum ea quæ post tertium exacerbatur continua, interdum quotidiana, aliquando tertiana, nonnunquam quartana, & intermittentes commiscuntur. eodem modo & continua, quæ quarto quoque die accessiones obtrinent, cum tribus his intermittentibus permiscetur. quarum si singulares simplicesque agnoueris, in complicatis quoque discernendis haudquaquam aberrabis. Sed quia interdum καὶ οὗτος & ἡ πάλη, ac λυπηρία audire contingeret, harum etiam causas & discrimina cognoscito καὶ οὗτος, quam nostri ardentem uocant, è bile nimis effervescente, est, quando & è sanguine feruido originem trahit, ac vehemensissimo calore urget, & omnium facillime ad id quod res uulerit propendet, quod tantum ardorem natura non ferat. nam aut iudiciis causas molestias abigit, aut in tanto alieni caloris impetu natura defatiscit. ἡ ψίχην verò sunt dicte, quod ὑπὸς ἀλαίχουσι, hoc est blandè miteque refoeciunt. non enim febrem uehementem accendunt. habent quidem horrorem euidentem, sed febris succedens horrore proportionè haudquaquam respondet. interdum uterque simul, & calor & horror persentitur. frigidi & lenti succi modicè putres, hunc morbum faciunt. Denique λυπηρία, satis magno horrore inuadit, verum euidentis calor ei non succedit, velut ex ipso quoque nomine patere potest. ἡ λήπτια πυρὸς, hoc est igne, quod est calore deficit. nam oppidò quàm frigidus succus summa cute innatans, in accessionum significationibus ab excretice facultate propellitur. quare horror comitatur, verum calor nullus accedit, quod ne putredo quidem ei succo, qui satis ægrè corrumpi sua natura potest, aduenerit. Atque hæc sunt febrium quæ intermittunt, & quæ secus, generantur. Superest etiamnum aliud febris genus, quod ἐκ τῆς πάλης nominant, omnium deterrimū, quodque prope-

propemodum curationem respuit. Vocant autem *temperamentum*, quod ex in habitum cordis recipiuntur, nam cum affectio (ita nunc *diabeta* interpretor) quædam afficientis cum affecto sit familiaritas ac consuetudo, quæ haud difficulter commutari potest: & habitus, quod est *temperamentum*, sit cõstas & quæ ægrè elui potest affectio. non injuria febres, quæ cor afficiunt, eius calorem per affectionem immutasse dicuntur: quæ verò effectuerunt, ut calorem in habitum admitteret, & *temperamentum* peritioribus appellabuntur. Gignuntur hæc aliquando quod diariis succedant, ubi nimirum vehementiori ira exarsimus, vel mœrore curaque iugi in tabescimus. eas si quis principiis obstat, curare facillimum est. Verùm quæ ob partium præcipuarum inflammationes, & scirrhus, & tabem, ac reliqua magni momenti vitia committuntur, omnium sunt longè pessimæ, quod natura duobus gravissimis malis relictari, propulsareque nequeat. Nascuntur quoque haud segnius ex inueteratis malignisq; febribus, cum cor iam ob præcuntem facultatis exolutionem vitium excipit. Inter has deterioris sunt notæ, quas *typhus* & *paratyphus* nominant Græci, in quibus vitalis vis emarcuit contrahiturque, à quibus ægri ut euadant fieri non posse putatur. Itaque in omnibus hæc febribus calor in toto corpore succensus est, nerum etsi nunquam intermittat, eum tamen ferè æger minimè sentit. At verò ubi cibum assumpsit, aut excitatus alicui studio obnixus incumbit, se calidiorem fieri animaduertit. quod cum nonnihil difficilius sustinuerit, denudò in pristinum statum redit. Pulsus iis parui semper sunt & densi, atque ut plurimum duri. Urinæ reddunt quales in hæc febribus enumerauimus, proportionem generi morbi excessuique respondentem. Quod si malum progreditur, oculi cauantur, collabuntur tempora, frons mirum in modum aret, palpebræ tardè attolluntur, oculi fordibus opplentur, & tabe destitutionibusque tentantur: & tandem in ipso hominum cœtu, aut alijs quibusdam vitæ munijs, non secus quàm qui animo linguunt, emoriuntur. Porro illud quoque omnium postremum ignorari haud decet, quod ijs qui hæc febribus corripiuntur, variè interdum ex quas putredo facit, implicantur.

De ratione victus febrientium. Cap. 11.

QUoniam febrium alie sunt, ut diximus, diariæ, quæ ex mœrore, aut iracundia, vel cruditate, lassitudineve, aut vigilia, uel alicuius partis inflammatione gignuntur: quædam verò in plures dies porriguntur, atque earum nonnullæ sunt continuæ, & aliquæ intermittentes, & continuarum hæc ex sanguinis feruore co-

piæque, quemadmodum continentes, quas *typhus* vocant, conflantur: alie ex eius reliquorumque humorum putredine creantur, ut nonnullæ sunt quarum calor in habitum abiit: diariæ sanè quæ ut longissimæ interdum quartum diem attingunt, ac magna ex parte eodem soluantur, ubi primo atque altero die jam declinare ceperunt, haudquaquam amplius suspectas habemus, sed hominem boni succi nec admodum crasso cibo nutritum ablegamus, ac causa inspecta, ei aliquid quoque medelæ adapramus, quod cum victu permiscemus. nam si ex refrigeratione, diaria originem sumpsit, ægrum, ut par est, calidis fouemus: sint solis ardor eam genuit, refrigeramus. quod si cruditas peperit, cibo modico, eoque stomacho aptiori ac concoctu faciliori utimur. noxam item ex lassitudine contractam, quiete, ac moderatis quibusdam fomentis auerruncamus: eam uerò quam vigilia creauit, somno sedamus, at quam mœror excitauit, solando comescimus. sic diariis quas inguinum tumores, *Boysia* dicunt Græci, aut vulnere ictusve commiserunt iis quæ inflammationes leniunt, & medicamentis mitigandi vitæ præditis, ac dolorem sedantibus est opitulandum. Verùm ne ignorata ciborum facultate, ijs tempestiuè, & ut decet, uti non possis, nunc paucis, prout maximè dabitur, eos potissimum qui febricitantibus & à febribus iam liberatis conueniunt, proponam. Ac singillatim quenque quo facultatem eius perspectam habere possis, explicabo. Atqui in quâ acutissimis ægritudinibus & præcipiis vniuersi morbi, ægrum citra cibum potumque prorsus continere studemus: illic, ne naturam utpote à maximis affectibus oppugnatam, duobus uacuare permittamus, & hic, quia ab antea ingesto vniuerso cibo etiamnum repletum ægrum denudò alio onerare, inutile iudicamus: quod non genus cibi, sed priuatio potius iure vocari possit. Prima porro cibi oblatio dicitur, si quis modicum aquæ, cui saccharis quippiam admixtum fuerit, propinabit. eo nanque loco antiquorum mullæ, ut nosti vitimur, quod non ita, ut hæc, conspicuo calefaciat. Post id tenuis cibus nuncupabitur, amygdalarum expressarum succus, & ptisanæ cremor, & si quis malo punico, aut cotoneo, vel appio commanducato, succum tantum deglutierit. Inde sequuntur integri fructus æstiu denotati, & hordeum decorticatum atque accuratè excoctum, & ex oleribus portulaca & atriplex, & si quod euidenter non excalfacit, ac ciceris cocti cremor. His verò plenior cibus est, panis purus, & pisces saxatiles, atque ex iis magis qui duriori sunt carne. Post hos collocant pulli gallinacei & agni extre-

ma. Cateri cibi validi iam sunt, atque exquisitè sanis præcipuè accommodati. Porro ex prædictis cibis vinum maximè calfacit, eoquè impensius, quo fuerit coloratius. nā quæ aquosa sunt, & parum dilui sustinent, (*οὐκ ἀπορροα* nominant Græci,) sunt ignava: quæ sanè cum eo quem postremo loco recensuimus, cibo æquiparari possint. Verùm quia ex numeratis cibis, alii ad succi bonitatem magis; alii minus declinare videntur: morbi corporaq; erunt spectanda. nam si copiosiore adesse cacochymiam significabunt, probioris succi alimentis erunt reficienda: sin morbus qualitate calidus magis erit, reliqui cibi sunt præponendi. Sed enim quoniam explicatæ sunt alimentorum facultates, quod qualesque ægris satis esse censentur: ea etiamnum, quæ quibus morbis magis congruere putantur, sunt subdiuidenda. Quare ubi quæ morbis supersunt, vires exposuerimus, de accommodato eorum singulis cibo loquemur: ut in vnoquoq; ea quæ debent exequi, valeas.

De victu febrium continuarum. Cap. III.

ITaque ij qui febre continua corripuntur, alii morbis qui acutissimè mouentur, conflantur, alij iis qui tardiori moru cidentur, ac in plures dies protenduntur. Qui acuti admodum sunt, ad quartum vsque pertingunt, qualis est angina, & pulmonis inflammatio, quam *πνευμονία* appellant; ac febres vehementes, quos in inedia potius tenere oportet, aut modicum tantum aquæ concedere. Qui minus sunt acuti, vsque ad septimum perueniunt, cuiusmodi sunt febres ardentes, & pleuritis acutior. in quibus hordei decorticati coctique & amygdalarum cremorem ægròs assumere permittere licet. Simpliciter acuti dicuntur, qui decimum quartum diem attingunt, quos iisdem etiam nutrire oportet. & si ultra progrediuntur, poterit aliquid ex iis qui ordine succedunt exhiberi. Attamen qui ad vigesimum aut vigesimum septimum accedunt, ita minimè cibabimus, sed cibos post illos facultate valentiores, præbebitur. In omnibus enim virium modus, & novissimi humoris copia inspicienda primùm est, & coctionis signa, ac morbi acumen, ut addentibus vel dementibus nobis victus illis proportionè respondeat. nam si acute mouetur morbus, coctioque apparet, & vires sic satis validæ, ut spes sit illico solutum iri, æger pleniori cibo non est onerandus, verùm modicè ac proportionè roboris morbi nutrientem, futurum iudicium operiri oportet, quod ubi aduenit, ac fidè, & ut decet, iudicauit, iam vires sunt reficiendæ, ad validiores cibos paulatim transeuntibus, non autem euestigio, ne iis ægrum aggrauans alterius morbi auctor euadas. Sin autem ægritudo

tardè mouetur, necdum coctionis indicia existunt, neque magnopere cum tenui victu vsq; ad perfectum iudicium sufficere posse constas, paulo valentiori cibo viribus est succurrendum siquidè in morbis omnibus in quibus vires dominantur, quæ praua maligna quæ sunt euincere haud solent. Porro iam dudum didicisti, quomodo virium mensura exploratur, & humorum coctiones cognoscuntur, & morbi motiones discernuntur: quare tibi ceu hæc omnia edocto, seduloque præmeditanti, pro portione ciborum familiarium genera illis respondentiæ erunt præscribenda. Atque hac ratione victus est imperandus, nisi recens aliquod infestans symptoma obstiterit. nam si quoddam repentinum alui profluvium, aut sanguinis fluxus, vel perpetuus sudor vires defatigauerit, ut periculum sit ne iam æger in syncopen habeatur, cum pro symptomatis portione reficere oportet. & si pulsus fuerit exiguis aut ablatus, aut æger etiam refrigerit, vinum ac reliqua calida sunt exhibenda: quippe hæc symptomata, totum victus modum ad se trahunt. Porro accessionum significationes si apparuerint, hic non secus quàm in intermitten- tibus, obseruare decet: adhuc iudicia, si quæ fore suspicamur, animaduertenda sunt, nec quicquam dandum: sed vires, decedentes iam, ac ceu excitatas opem aliquam ægro ferrentes, ab omni externo pondere liberas, finire oportet. ubi iam eius tempus conspicuo præterit, eas defessas recreare conuenit, ita tamen ut neque alimentorum vim, nec quantitatem ante perfectum iudicium augeamus, quod ubi adest manifestum, increpidè iam nutrire possumus. Verùm ubi morbus citra rationem leuatur, neque inconsideratè alere, nec ita ut antea tenuiter victum instituire: sed nonnihil cibi quantitati adicere, ac vires reuocantem reficientemque, morbi recidiuam expectare decet: utique si antea neque uacuatione fueris opitulatus, nec ualidum satis victum præberis, nam si prius liberalius nutruisti, ac si opus fuit, purgasti: fortassis ab altera morbi inuasionè liberaueris. Nam quemadmodum ex ingenti succenso igne, ubi flamma emarcuit, ac contabuit, quædam in cinere scintillæ relinquuntur, quæ si denudò nutrimentum naturæ fuerint, magnum rursus excitant incendium: uerùm si quis eas arte exemerit, is quo minus secundò accendatur, impedit: ita sanè iis quoque qui non ex ratione iudicantur vsu uenit. Nec ignorari oportet, quando, & quibus cibis sit utendum, quoniam etiam dies quibus morbus exacerbatur, hic cauere oportet, ne aduentante significationum tempore, cibis aliquis in uentriculo reperiatur. ita nanque morbus uiget magis, ac malignior euadit. Adhuc uena tundenda est, sanguisque quando, & quantum, & unde oportet, ceu

ecce iam antea docuimus, pro plenitudinis portione, ac febris modo, est extrahendus. Præterea alius antea enematis iniectis abluenda est. expedit enim in omnibus febribus ut alius sedeat maxime, nisi æger puris aliquid eduxerit, neque in pleuritide ac peripneumonia & tabe contingit. tunc etenim non est laudabile, ut plustulū egerat. nam eo deterius isthac censetur, quo plus excreuerit, ueluti priuatim capite de lateris inflammatione dicemus. Insuper refrigerantibus potionibus ætus magnitudo minuenda est, cuiusmodi sunt, quæ ex uolis, ex floribus nymphææ parantur, præcipue si calor caput obsidet ægerque in somnis degat. sic si in ore ventriculi, aut uisceribus cæteris, mordacior quispian humor obfirmatus hæret, quæ ex aceto & saccharo, quæ item ex acidorum maiorum puniceorum succo potio conficitur, est accommodata. Atque alia aliis magis conueniunt, quemadmodum de iis sigillatim postea agemus. Cæterum ei qui ciborum facultates nouit, & morborum discrimina dignoscit, esse obscurum nequit, qui quibus congruant. Oportet tamen febrientibus semper exhibere, quæ refrigerando pro portione respondent, neque minus, inutile est enim; neque plus, quam par est refrigerare, nocet etenim: sed in animo habere, num os ventriculi promptè à frigidis, neruive, aut alia quæpiam pars lædatur. inquietiâ, num thorax aduentitij cuiuspiam humoris pondere oneretur, & an pus sanguinem uel æger reiciat. tunc enim frigida sunt fugienda, & maxime, quæ tactu talia persentiuntur. Nam uerisimile est, quoddam quod potentia sit frigidum, etiam febris magnitudini posse auxiliari, præcipue nisi manifesta quæpiam offendens qualitas fuerit coniuncta. Quod tactu egelidum sentitur, ijs paribus quæ frigidis non indigent, quodammodo innoxium, nec molestiam inferre uideri possit. Cæterum, quia solo decocti hordei cremore par est ægros minime acquiescere, sed nimio febris incendio ardentem, aliis quoque refrigerantibus quibusdam indigere: danda est, nisi aliqua, ut dictum fuit, causa præpedierit, etsi anni tempus largietur, lactuca, & potissimum si squalidi uigilesque fuerint: præterea crudicucumeres sunt concedendi, atque ex iis magis qui teneri sunt & copioso semine abundant. nam exterior pars quæ asperiuscula est, crudum succum gignit: inquietiam punica dulcia acidis admista, nisi aliud obstiterit, ac mala dulcia & vias exhibebimus, quæ uinosæ non sunt. his enim utimur, cum temporis spatium multam suam humiditatem exuerint, ac calor earum nimius in habitum abierit. Intubum quoque domesticum, (quod *σπυ* Græcis dicitur,) si quod aliud, atque in calidioribus iocinoris affectibus idoneum est: cum alioqui id uolus sit stomacho gra-

tum. nonnulli uel solius succi eius usu plus profuerunt: quod refrigerando ac meatus infarctum liberando satis sit. Verum enim uero non omnia omnibus sunt exhibenda, sed qui alui profluuium tentantur, & os uentriculi imbecillum est assidueque uomunt, danda quæ nonnihil astringunt. At ea quibus alius est astricta, & aliquid, quodcunque tandem illud sit, è thorace educunt, uitanda sunt: & ijs dulciuscula potius conueniunt, quod lentorem quandam obtineant. Acida uero quibus impacti sunt humores, cum incidendi uim habentia, sunt præbenda: ut & iis quibus alius supprimitur, modò natura sunt biliosi. nam in ijs qui non sunt eiusmodi, ea supprimendi uim habere uidentur. Atque hac ratione qui continuè febris conflantur, sunt nutriendi: secus uero quibus febris intermittit. quoniâ neque eodem modo incendit, neque intermittens sibi mutuo sunt similes.

De visu febrium intermittentium, & primum de tertiana. Cap. II.

Tertianæ itaque, siue simplex, siue duplex fuerit, cum uehementer mouetur, ægrique uires robustæ sunt, pristinæ cremor prouictu conuenit: potissimum si copiosæ in accessionibus euacuationes uires non exoluerint, ut idcirco cibo opus sit ualentiori. Verum si mediocri motu cietur, atque ad decimum quartum duratura putatur, oleribus & saxatilibus piscibus est utendum: iis præcipuè diebus, quibus febris intermitteat. Alius quoque si sua sponte non sedeat, clysmatis est excitanda, & nisi quid impedierit, sanguis est detrahendus. etenim in omnibus propemodum febribus sanguinem mittere, nisi adsit quod interpellat, præstat. nam cum is post spiritum primum feruorem excipiat, & totum corpus afficiat, si eius quippiam effluerit, multum caloris una detrahatur. Et quanquam à flaua nonnunquam bile febris per totum corpus diducitur: atamen hic, quippe qui promptè succenditur, ei materiam subministrat: ac cum uniuersum permeet corpus, uniuersum quoque calfacit. quare si quid eius euacuatur, multa quoque febris portio una diffilatur. nam si ex latentibus & materiæ expertibus perspirationibus febrientes opem sentire est persuasum, febremque astricta ac densata cute uehementius accendi constat: an non, quæso, multo melius ægri degent, si humoris qui eam in uniuersum corpus distribuit, sensibilis fiet euacuatio? Quare cum neque ætas, nec anni tempus, neque alia quæpiam obstat vacuatio, nec mulier utrum gestat, in omnibus febribus cum uires patiuntur, ad uenæ sectionem est profugiendum: ac bis terve pro febris magnitudine sanguis detrahendus, atque interdum, cum multus

multus ardēnsque sanguis ægrum aggrauat, ad animi vsque deliquium vacuandus: adeo febricitantibus utilis est sanguinis missio. Cæterum nec alius quidem est negligenda, sed glandibus clysteribusque est irritanda, atque eius cura habenda ne supprimatur. febre iam leuiori facta, modicè quoque purgantibus refrigerantia ac humectantia medicamenta permiscendam, quo purgantia quæ magna ex parte calida sunt, & turbandi uim obtinent, minus offendant, vacuare oportet. Ea tamen in morborum incrementis fugienda sunt, & maximè si matertia sursum vergit, & cruditas adesse uidetur. Quod si materia turgēt, ea, habita prius ægri virium ratione, est uacuanda. Porro altera post eam quæ de purgantibus pertractat, methodus est, diætæ, quæ medicamentis contemperantibus utitur. nam in quibus ob aliquem interturbantem scopum confertas uacuationes moliri formidamus, iis temperantia medicamenta sufficimus, partim coquentes, partim refrigerantes, aut detergentes, uel exobstruentes, uel omnia simul iuxta humores ægrum lædentes, ceu priuatim post explicabitur molientes. Itaque tertiana simplex & duplex, eo quo dictum fuit modo, est curanda. Si uerò non secundum rationem soluitur, aut decimum quartum diem transeat, atque ita in eam abeat, quæ spuria nuncupatur, hæc quoque purgantibus est, tenuatis prius humoribus, & meatibus obstructione uindicatis, confodienda ac perimenda. Victusque eò spectet, ut sit boni succi, & subfrigidus. nam quæ impensè frigida sunt, materiam cogere, ac meatus ferè obstruere solent: & calida, eum qui antea delitescēbat, calorem excitant ac euocāt. Atque hoc propè pacto, uictus ratio & curatio in tertiana exquisita & spuria se habet.

De cura quotidiana & quartana. Cap. V.

Quotidianam, quæ à pituita ortum duxit, neque uenæ sectione, nisi aliud urget, nec refrigerantibus medicamentis compescere oportet: sed aluum astrictam glandibus & clysmatis inanire præstat. Victum boni succi nec crassum egerumat. Permiscenda autem cibo sunt, quæ incidere, tenuare, & meatus obstructionibus asserere, possunt, non tamen admodum calida esse creduntur. Vino potandus est tenuior, & paucifero, in morbi quidem principio: at ubi iam tenuior humor dissipatus est, etiā rufiore ac, si licet, tota uictus ratio in calidiore migret. Tunc pastilli quoque, qui amarus nuncupatur, usus probatur, & si quid aliud hic opem ferre censetur, sed de ijs priuatim suo loco dicetur. si quidem medicamenta methodis admiscere, nec ea ceu exempli loco inferere, eorum est qui nullum in tractando ordinem obseruāt

Porro eodem uictu quartana laborantes sunt continendi, nisi quod humor qui hic infestatur, crassior sit ac terrestrior, atque hic idcirco calidioribus quodammodo ac incidentibus magis opus habeat: cuiusmodi sunt, quæ ex reliquis acerbis conficiuntur. Cæterum in omnibus accessionum significationibus ne aliquis in uentriculo sit cibus, qui mali pondus ingerat, studendum est. nam cum natura, tempore accessionis, ad propellendum ea quæ affligunt exurgat, si quis intempestiuè nutriendus illi obstitit, dubio procul quominus ualidè notios humores adoriatur, præpedit. Verum quia humorum species quæ uariarum accessionum sunt causa, ac ciborum medicamentorumque, & reliquorum quæ ad diætam pertinent, discrimina, prout alia antè explicata fuerunt, & alia postea docebuntur, non ignoras: iam ægri vires, & anni temporis dominium, adhuc locum, ætatem, & consuetudinem inspicere: atque ita ex omnibus commodatam atque in eadem ægritudinis serie collocatam cibi quantitatem qualitatemque colligere & coniecturare oportet. Nanque ipsam perquam exquisitam diætamque rationem, in corporibus quæ ita temerè mouentur, aut quisquam vnquā, (quod sensum nostrum, atremque ea lateat,) assequatur. Atqui ad id quod fieri debet quàm proximè accedere, eorum est, qui omnia accuratè ac diligenter expendant. Porro ex iam dictis, in complicatis quoque intermittētibz febribz medicamenta, cibum, & reliquam uniuersam diætā coniectura consequi, eaque pro portione inter se commiscere licet. nam qui literarum syllabas propè colligere didicit, is & uersus totos, & integras paginas perlegere ualet. Quare in simplicioribus & facilibus exerceri primum oportet, deinde ad complicata properare.

De febre hectica. Cap. VI.

IAM ordine ex febrium species succedunt, quæ hectica sunt, quas, quod solidas partes attingunt, omnemque uitalem humorem exportarunt, ac in marcorem coniecerunt, haud facile est curare. attamen præuenientē antequam solida occupent, subuenire conandum est. Itaque eiusmodi ægri perquam tenui uictus ratione, quomodo eos qui continua febre conficiantur, habebamus, non sunt curandi, quoniam nullum hic iudicium expectatur, neque purgum humorum materia subest, sed nec pleno quidem uictu opus est, quod is concoqui nequit, atque insuper febris inde crescat. Quare mediū, ceu optimus est præferendus, qui modicè refrigeret, cibusque boni succi ac concoctus facilis dandus, cuiusmodi sunt pisces qui in saxis stabulantur, para galei, & gobij, & id genus alij,


alij, quique ex minoribus duriori sunt carne, quales sunt scorpij, philomele; aut friabili, quali nullus constare videtur. Ex carnibus verò domesticarum gallinarum pulli, & quadrupedum pedunculi. Quòd si vires conuelluntur, nimium quoque tenue, album, & quod parum dilui postulat, est exhibendum. Cæterum familiaris ac accommodata iis potio fuerit, quæ ex fructibus æstiuus, & floribus refrigerantibus cum saccharo paratur, quemadmodum libro de medicamentorum compositione docebimus. Balnea porro iis sunt idonea, quæ corporis squalorem humectent: uerum tepida esse decet, nec ullam resipere qualitatē. Nec tempus in ijs trahere cōuenit, sed ubi modicè fuerint immorati egredi, ne quod ex nativo humore superest euanescat & exhalet: egresso forbitio quæpiam refrigerans dabitur. Non est vestium copia excalfaciendus æger, ne copiosius diffusetur. Posthæc cōuenienti cibo reficiendus. Quòd si solum exeuntem, melino, aut rosaceo, aut omphacino saltem oleo inunxeris,

& meatus præcludes, & ne maior fiat diffusio prohibebis, ac antea ex irrigatione inductam humiditatem, intrò compelles, atq; hoc quoq; pacto opem homini tulisse videberis. Somnus cōciliandus est à cibo, ac querenda animi oblectamenta & relaxationes, ac quodcunque tandem cum refrigeratione humectare putatur. Denique heclicas refrigerationes, quæ & ipsæ plerumq; non carent siccitate, & veluti ex morbo senium esse uidentur, cōtrariis curare oportet, calfacientia & humectantia dantes, idque boni succi & cocti facilibus cibis, exercitationibus mediocribus & uinis odoratis, ac subfuluis, atque in summa omnibus calfacientibus, sed non exiccantibus procurantes. Atque ut vno verbo complectar, in omni habitu affectioneque morbosa, contrariis est pugnandum: hoc interim examinantibus, quæ proportionem ac interuallo, corpora quæ nutriuntur, quæque offeruntur medicamenta, à commoderata temperie abscedunt. Habes & quæ victus norma feblicitantes corriguntur.

AVRELII CORNELII CELSI

DE FEBRIBVS

LIBER.



De febrium generibus.

Cap. I.



ENVS febrium & in toto corpore, & vulgare maxime morbi genus est. Ex his una quotidiana, altera tertiana, altera quartana est. Interdum etiam longiore circuitu quædam redeunt, sed id raro euenit. In

prioribus & morbi sunt, & medicinæ. At quartanæ quidem simpliciores sunt, incipiunt ferè ab horrore, deinde calor erumpit, finitaque febre biduum integrum est. ita quarto die reuertitur. Tertianarum uero duo genera sunt, alterum eodẽ modo, quo quartana, & incipiens, & desinens, illo tantum interposito discrimine, quod vnum diem præstat integrum, tertio redit. Alterum longe perniciosius, quod tertio quidem die reuertitur, ex octo autè, & quadraginta horis ferè sex, & triginta per accessiōem occupat, interdum etiam, uel minus, uel plus, neque ex toto in remissione desistit,

sed tantum leuius est. id genus pleriq; medici *intermittentes* appellat. quotidianæ uero uariæ sunt, & multiplices. Aliæ enim protinus à calore incipiunt, aliæ à frigore, aliæ ab horrore. Frigus uoco ubi extremæ partes membrorum inalgescunt, horrorem ubi totum corpus intremitt. Rursus aliæ sic desinunt, ut ex toto sequatur integritas. aliæ sic, ut aliquantum quidem minuatur ex febre, nihilominus tamen quædam reliquæ remaneant, donec altera accessio accedat, ac sæpe aliæ vix quidquam, aut nihil remittant, sed ita ut continuent. Deinde aliæ feruorem ingentem habent, aliæ tolerabilem, aliæ quotidie pares sunt, aliæ impares. atque inuicem altero die leniores, altero vehementiores, aliæ tempore eodem postridie reuertuntur, aliæ vel serius, uel celerius, aliæ diem, noctemque accessiōem, & decessiōem implent, aliæ minus, aliæ plus, aliæ cum decedunt sudorem mouent, aliæ non mouent. atque aliàs per sudorem ad integritatem uenitur, alias corpus tantum imbecillius redditur. Accessiones etiam modo singulæ, singulis diebus fiunt, modo bi-

nz, pluresve cōcurrunt. ex quo sepe euenit ut quotidie plures accessiones, remissionesq; sint, sic tamen ut una quæque alicui priori respondeat. Interdum uero accessiones quoque confunduntur sic, ut neque notari tempora earum, neque spatia possint. Neque uerum est, quod dicitur à quibusdam, nullam febrem inordinatam esse, nisi aut ex vomica, aut ex inflammatione, aut ex ulcere. facilius enim semper curatio foret, si hoc uerum esset. Sed quod euidentres causæ faciunt, facere etiam abditæ possunt. neque de re, sed de uerbo controuersiam mouent. qui cum aliter, aliterque in eodem morbo febres accedant, non eandem inordinate reddere, sed alias, aliasque subinde oriri dicunt. quod tamen ad curandi rationem nihil pertineret, etiam si uere diceretur. Tempora quoque remissionum modo liberalia, modo uix ulla sunt.

De curationum diuersis generibus. Cap. II.

ET febrium quidem ratio maxime talis est. Curationum uero diuersa genera sunt, prout auctores aliqui habent. Asclepiades officium esse medici dicit, ut tuto, ut celeriter, ut iocunde curet. id notum est. sed ferè periculosa esse nimium, & festinatio, & uoluptas solet. quæ uero moderatione utendum sit, ut quantum fieri potest, omnia ista contingant, prima semper habita salute in ipsis partibus curationum considerandum erit. & ante omnia queritur, primis diebus æger qua ratione continendus sit. Antiqui medicamentis quibusdam datis concoctionem moliebantur, eo quod cruditatem maxime horrebant, deinde eam materiam, quæ lædere uidebatur, ducendo sæpius aluum subtrahebant. Asclepiades medicamenta sustulit, aluum non torques, sed ferè tamen in omni morbo subduxit. febre uero ipsa præcipue se ad eius remedium uti professus est. Conuellentias enim vires ægri putauit, luce, uigilia, siti ingenti, sic, ut ne os quidem primis diebus elui timeret. Quo magis falluntur, qui per omnia iocundam eius disciplinam esse contendunt, & is enim uterioribus quidem diebus cubantis etiam luxuriæ subscripsit, primis uero tormentis uicem exhibuit. Ego autem medicamentorum dari portiones, & aluum duci non nisi raro debere concedo, & id non ideo tamen agendum, ut ægri vires conuellantur existimo, quoniam ex imbecillitate summum periculum est. minui ergo tantum materiam superantem oportet, quæ naturaliter digeritur, ubi nihil noui accedit. Itaque abstinendus à cibo primis diebus est, in luce habendus æger, nisi infirmus interdum est. quoniam corpus ista quoque digerit, isque cubare quam maximo conclauis debet.

Quod ad sitim uero somnumque pertinet, moderandum est, ut interdum vigilet, noctu, si potest, conquiescat. ac neque potest, neque nimium siti crucietur. Os etiam eius elui potest, ubi & siccum est, & ipsi scætet. quomodo id tempus aptum potioni non est. Commodèq; Erasistratus dixit sæpe inferiore parte humorem non requirente os, & fauces requirere, neque ad rem male haberi ægrum pertinere. Ac primo quidem sic tenendus est. Optimum uero medicamentum est, oportune cibus datus, qui quando primum dari debeat, queritur. Plerique ex antiquis tarde dabant, sæpe quinto die, sæpe sexto. & id fortasse, uel in Asia, uel in Aegypto cæli ratio patitur. Asclepiades ubi ægrum triduo per omnia fatigarat, quarto die cibo destitabat. At Themison nuper non quando coepisset febris, sed quando desisset, aut certe leuata esset, considerabat, & ab illo tempore expectato die tertio, si non accesserat febris statim, si accesserat, ubi ea, uel desierat, uel si aliquid inhaerebat, si certe se inclinauerat, cibum dabat. Nihil autem horum uirique perpetuum est. Nam potest primo die primus cibus dandus esse, potest secundo, potest tertio, potest non nisi quarto, aut quinto: potest post unam accessionem, potest post duas, potest post plures. Refert enim qualis morbus sit, quale corpus, quale cælum, quæ ætas, quod tempus anni. minimeque in rebus multum inter se differentibus quod intermittendum non est. perpetuum esse præceptum temporis potest. In morbo, qui plus uirium aufert, celerius cibus dandus est, itemque eo cælo, quo magis digerit. Ob quam causam in Africa nullo die æger abstinere recte uidetur. Maturius etiam puero, quam iuueni, ætate, quam hyeme dari debet. Vnum illud est, quod semper ubique seruandum est, ut ægri vires subinde assidens medicus inspiciat, & quandiu supererunt, abstinentia pugnet, si imbecillitatem uereri coeperit, cibo subueniat. Id enim eius officium est, ut ægrum neque superuacua materia oneret, neque imbecillitatem fami prodar. Idque apud Erasistratum quoque inuenio, qui quamuis parum docuit quando uenter, quando corpus ipsum exinaniretur, dicendo tamen hæc esse uisenda, & tum cibum dandum, cum corpori deberetur, satis ostendit dum vires superessent, dari non oportere, ne deficerent, consulendum esse. Ex his autem intelligi potest ab uno medico multos non posse curari, eumque, si artifex est, idoneum esse, qui non multum ab ægro recedit, sed qui quæstui seruiunt, quoniam is maior ex populo est, libenter amplectuntur ea præcepta, quæ sedulitatem non exigunt, ut in hac ipsa re. Facile est enim dies uel accessiones numerare his quoque, qui ægrum raro uidentur ille.

ille assideat necesse est, qui, quod solum opus est, uisurus est, quando nimis imbecillus futurus sit, nisi cibum acceperit. In pluribus tamen ad initium cibi dies quartus aptissimus esse cōsuevit. Est autem alia etiam de diebus ipsis dubitatio, quoniam antiqui potissimum impares sequebantur, eosque, tanquam tunc de aegris indicaretur, *propius* nominabant. Hi erant dies tertius, quintus, septimus, quartusdecimus, uigesimus, primus, ita ut summa potentia septimo, deinde quartodecimo, deinde uni & uigesimo daretur. Igitur sic ægros nutriebat, ut diem imparium accessiones expectarent. deinde postea cibum quasi leuioribus accessibus instantibus darent, adeo ut Hippocrates si alio die febris desisset, recidiuam timere sit solitus. Id Asclepiades iure ut uanum repudiavit: neque in ullo die quia par, imparue esset, his uel maius, uel minus periculum esse dixit. Interdum enim peiores dies pares sunt, & opportunius post eorum accessiones cibis datur. Nonnunquam etiam in ipso morbo dierum ratio mutatur, sitque grauior, qui remissior esse consueuerat, atque ipse quartusdecimus par est, in quo esse magnam vim antiqui fatebantur. Qui cum octauum primi naturam habere contenderent, ut ab eo secundus septenarius numerus inciperet, ipsi sibi repugnabant non octauum, neque decimum, neque duodecimum diem sumendum, quasi potētiorem. Plus enim tribuebant nono, & undecimo. Quod cum fecissent sine ulla probabili ratione, ab undecimo non ad tertiumdecimum, sed ad quartumdecimum transibant. Est etiam apud Hippocratem ei, quem septimus dies liberaturus sit, quartum esse grauissimum. Ita illo quoque auctore in die pari, & grauior febris esse potest, & certa futuri nota. Atque idem alio loco quartum quemque diem, ut in utrumque efficacissimum apprehendit, id est quartum, septimum, undecimum, quartumdecimum, decimumseptimum, in quo & ab impari ad paris rationem transit. & ne hoc quidem propositum conseruauit, cum à septimo die undecimus non quartus, sed quintus sit. adeo apparet quacunque ratione ad numerum respeximus, nihil rationis sub illò quidem auctore reperiri. Verum in his quidem antiquos tunc celebres admodum Pythagorici numeri fecellerunt, cum hic quoque medicus non numerare dies debeat, sed ipsas accessiones intueri, & ex his coniectare quando dandus cibis sit. Illud autem magis ad rem pertinet scire, num oporteat dari cum iam bene uenæ conquieuerunt, aut etiam num manentibus reliquiis febris. Antiqui enim quam integerrimis corporibus alimentum offerebāt. Asclepiades inclinata quidem febre, sed adhuc tamen inhaerente in quo unā ratione secu-

tus est, non quo nō sit interdum maturius cibus dandus, si mature timetur altera accessio, sed quo scilicet quam sanissimo dari debeat. Minus enim corrumpitur quod integro corpori infertur. Neque tamen uanum est quod Themisoni videbatur, si duabus horis integer futurus esset æger, satius esse tunc dare, ut ab integro corpore potissimum diduceretur. Nam si diduci tam celeriter posset, id esset optimum. Sed cum hoc breue tempus non præstet, satius esse principia cibi à decedente febre, quam reliquas ab incipiente excipi. ita si longius tempus secundum est, quam integerrimo dandus est, si breue, etiam antequam ex toto integer fiat. Quo loco uero integritas est, eodem est remissio, si qua maxime in febre continua potest esse. Atque hic quoque queritur utrum tot horarum expectanda sint, quot febrem habuerunt, an satis sit primam partem earum præteriri, ut ægris iocundius infidat, quibus interdum non vacat. Tutissimum est autem antè totius accessions tempus præterire. quamuis ubi longa febris fuit, potest indulgeri ægro maturius, dum tamen ante minime pars dimidia prætereatur. Idque non in ea solà febre, de qua proxime dictum est, sed in omnibus ita seruandum est.

De febrium speciebus, & singularum, curationibus, & primo quando cibus febricitantibus dandus sit. Cap. III.

HAEC magis per omnia genera febrium perpetua sunt: nunc ad singulas earum species descendam. Igitur si semel tantum accessit, deinde desijt: eaque uel ex inguine, uel ex lassitudine, uel ex æstu, aliave simili re fuit sic, ut interior nulla causa metum fecerit: postero die cum tempus accessions ita transijt, ut nihil mouerit: cibus dari potest. At si ex alto calor uenit: & grauitas uel capitis, uel præcordiorum secuta est: neque apparet quid corpus confuderit, quamuis unam accessionem secuta integritas est: tamen quia tertiana timeri potest, expectandus est dies tertius: & ubi accessions tempus præterijt, cibus dādus est, sed exiguus, quia quartana, quoque timeri potest. Et die quarto demum: si corpus integrum est: eo cum fiducia utendum. Si uero postero, tertio uel, aut quarto die secuta febris est: scire licet morbum esse. Sed tertianarum, quartanarumque, quarum & certus circuitus est: & finis integer: & quia liberaliter quicta tempora sunt expeditior ratio est. De quibus suo loco dicam. Nunc uero eas explicabo, quæ quotidie urgent. Igitur tertio quoque die cibus ægro commodissime datur: ut alter febrē minuat: alter uiribus subueniat. Sed his dari debet si quotidiana febris est, quæ ex toto desinat: simul atque corpus integrum

tegrum factum est: si, quâvis non accessiones, febres tamen iunguntur: & quotidie quidem increscunt: sed sine integritate tamen remittunt: cum corpus ita se habet, ut maior remissio non expectetur. Si altero die grauior: altero leuior accessio est post grauiorem. ferè uero grauiorem accessionem leuior nox sequitur. quo fit ut grauiorem accessione nox quoque tristior antecedit. At si continuatur febris: neque leuior unquam fit: & dari cibum necesse est: quando dari debeatur, magna quidem difficultas est. Quidam, quia ferè remissius matutinum tempus agris est: tunc putant dandum. quod si responderit, non quia mane est: sed quia remissior est æger: & dari debet. Si uero ne tunc quidem ulla requies agris est: hoc ipso peius id tempus est: quod cum sua natura melius esse debeat: morbi uitio non est: simulque insequitur tempus meridianum: à quo cum omnis æger ferè peior fiat: timeri potest ne ille magis etiam quàm ex consuetudine vrgeatur. Igitur alij uespere tali agro cibum dant. Sed cum eo tempore ferè pessimi sint, qui ægrotant: verendum est: ne si quid tunc mouerimus: fiat aliquid asperius. Ob hæc ad mediam noctem decurro: id est finito iam grauissimo tempore, eodemque longissime distante: securis uero ante lucanis horis, quibus omnes ferè maxime dormiunt: deinde matutino tempore, quod natura sua leuissimum est. Si uero febres uagæ sunt: quia verendum est, ne cibum statim subsequantur: quodcumque quis ex accessione leuatus est: hunc debet assumere. At si plures accessiones eodem die ueniunt: considerare oportet, pares ne per omnia sint: quod uix fieri potest: an impares. Si per omnia pares sunt: post eam potius accessionem cibus dari debet: quæ non inter meridiem, & uesperum definit. Si impares sunt: considerandum est quo distet. Nam si altera grauior, altera leuior est: post grauiorem dari debet. si altera longior, altera breuior: post longiorem: si altera grauior, altera longior est: considerandum est. utra magis affligat: illa uero, an hæc tempore: & post eam dandus est. Sed planè plurimum interest: quantæ, qualesque inter eas remissiones sint. Nam si post alteram febrem motio manet: post alteram integrum corpus est: integro corpore cibo tempus aptius est. Si semper febricula manet: sed alterum tamen longius tempus remissionis est: id potius eligendum est: adeo ut ubi accessiones continuatur, protinus inclinata priore dandus cibus sit. Et enim perpetuum est, ad quod omne consilium dirigi potest: cibum quàm maxime semper ab accessione futura reducere: & hoc saluo dare quàm integerri- mo corpori, quod non inter duas tantum, sed etiam inter plures accessiones seruabitur. Sed

cum sit aptissimum tertio quoque die cibum dare: tamen si corpus infirmum est, quotidie dandus est: multoque magis si continentes febres sine remissione sunt: quanto magis corpus affligunt, aut si duæ, pluresve accessiones eodem die ueniunt. Quæ res efficit, ut & à primo die protinus cibus dari quotidie debeat. Si protinus uenæ conciderunt: & sæpius eodem die, si inter plures accessiones subinde uis corpori deest. Illud tamen in his seruandum est: ut post eas febres minus cibi detur, post quas si per corpus liceret, omnino non daretur. Cum uero febris instet, incipiat, augeatur, consistat: decedat, deinde in decessione consistat, aut finiat: scire licet optimum cibo tempus esse breve finita. deinde cum decessio eius consistit: tertium si necesse est, quodcumque decedit: cetera omnia periculosa esse. Si tamen propter infirmitatem necessitas urget, satius esse, consistente iam incremento febris, aliquid offerre: quàm increscente. Satius esse instanti, quàm incipiente: cum eo tamen ut nullo tempore is qui deficit, non sit sustinendus. Neque hercule satis est ipsas tantum febres medicum intueri: sed etiam totius corporis habitum: & ad eum dirigere curationem, seu supersunt uires, seu desunt: seu quidam mali affectus intrerueniunt. Cum uero semper agros securos agere conueniat, ut corpore tantum, non etiam animo laborent: tum præcipue ubi cibum sumpserunt. Itaque si quæ sunt quæ exasperata eorum animos sunt: optimum est eadem agrotantium notitiæ subtrahere. si id fieri non potest: sustinere tamen post cibum usque somni tempus, & cum expperecti sunt, tunc exponere.

Quando. potiones febricitantibus dari expedit. Cap. IIII.

SED de cibo facilior quidem cum agris ratio est: quorum sæpe stomachus hunc respuit etiam si mens concupiscit. De portione uero ingens pugna est: eoque magis, quo maior febris est. Hæc enim sitim accendit, & tum maxime aquam exigit, cum illa periculosissima est. Sed docendus æger est ubi febris conquieuerit, protinus sitim quoque quieturam, longiorémque, accessionem fore, si quod ei datum fuerit alimentum. ita celerius eum desinere sitire qui non bibit. Necesse est tamen quanto facilius etiam sani famem, quàm sitim sustinent, tanto magis agris in portione, quàm in cibo indulgere. Sed primo quidem die nullus humor dari debet, nisi subito sic uenæ conciderunt, ut cibus quoque dari debeat. Secundo uero, cæterisque etiam, quibus cibus non dabitur, tamen si magna sitis urgebit, potio dari potest. Ac ne illud quidem ab Heraclide Tarentino dictum

dictum ratione caret, ubi aut bilis ægrum, aut cruditas male habet, expedire quoque per modicas portiones misceri nouam materiam corruptæ. Illud uidendum est, ut qualia temporaria cibo leguntur, talia potioni quoque; ubi sine illo datur, deligantur, aut cum ægrum dormire cupiemus, quod fere sitis prohibet. Satis autem conuenit, cum omnibus febricitantibus nimius humor alienus sit, tum præcipue esse feminis, quæ ex partu in febres inciderunt. Sed cum tempora cibo, potionique, febris & remissionis ratio det, non est expeditissimum scire, quando æger febricitet, quando melior sit, quando deficiat, sine quibus dispensari illa non possunt. Venis enim maxime credimus fallacissimæ rei, quia sæpe istæ leniores, celerioresve sunt, & ætate, & sexu, & corporum natura. Et plerumque satis sano corpore si stomachus infirmus est, nonnunquam etiâ incipiente febre subeunt, & quiescunt, ut imbecillus is uideri possit, cui facile laturo grauis instat accessio. Contra sæpe eas concitat, & resoluit sol, balneum, & exercitatio, & metus, & ira, & quilibet alius animi effectus, adeo ut cum primum medicus uenit, sollicitudo ægri dubitatis quomodo ille se habere uideatur, eas moueat. ob quam causam periti medici est, non protinus ut uenit apprehendere manu brachium. sed primum residere hilari uultu, percontarique; quemadmodum se habeat, & si quis eius metus est, eum probabili sermone lenire. tum deinde eius corpori manum admouere. quas uenas autem conspectus medici mouet, quam facile mille res turbant. Altera res est, cui credimus, calor æque fallax. nam hic quoque excitatur æstu, labore, somno, metu, sollicitudine. Igitur intueri quidem omnia etiam ista oportet, sed his non omnia credere, ac protinus quidem scire non febricitare eum, cuius uenæ naturaliter ordinatæ sunt, teporque; talis est æqualis esse sanis solet. Non protinus autem sub calore, motuque; febrem sese concipere. sed ita si summa quoque; arida inæqualiter cutis est, si calor, & in fronte est, & ex imis præcordijs oritur. si spiritus ex naribus cum feruore prorumpit, si color, aut rubore, aut pallore nouo mutatus est, si oculi graues, & aut persicci, aut subhumidi sunt, si sudor cum sit, inæqualis est, si uenæ non æquis interuallis moventur. Ob quam causam medicus, neque in tenebris, neque à capite ægri debet residere, sed illi stri loco aduersum eum, ut omnes notas ex uultu quoque; cubantis perspiciat. Vbi uero febris fuit atque; decreuit, expectari oportet num tempora, partesue corporis alię paulum madescant, quę sudorem uenturum esse testentur. ac si qua nota est, tunc demum dare potui calidam aquam, cuius salubris effectus est, si sudore per omnia membra diffun-

dit. Huius autem rei causa continere æger sub ueste fatis multa manus debet, eademque; crura, pedesque; cõtēgere, qua male plerique; egros in ipso impetu febris, pessimeque; ubi ardens ea est, male habet. Si sudare corpus cœpit, lintum tepe facere oportet, paulatimque; singula membra detergere. At ubi sudor omnis finitus est, aut si is non uenit, ubi quam maxime potuit, idoneus esse cibo æger uidetur, sub ueste leniter uingendus est, tum detergendus, deinde ei cibus dandus. Cibus autem febricitantibus humidus est aptissimus, aut humori certe quam proximus, utique; ex materia, quam leuissima, maximeque; sorbitio. eaque; si magnæ febres fuerunt, quam tenuissima esse debet. Mel quoque; despumatum huic recte adijciunt, quo corpus magis nutriatur, sed id, si stomachum offendit, superuacuum est, sicut ipsa quoque; sorbitio. Dari uero in uicem eius potest, uel in trita ex aqua calida, uel alica elota. Si firmus est stomachus, & cōpressa aluus, ex aqua mulsæ. si uel ille languet, uel hæc profluit, ex posca. Et primo quidem cibo id satis est. secundo uero aliquid adijci potest, ex eodem tamen genere materie, uel olus, uel conchiliū, uel pomum. Et dum febres quidem increscunt, hic solus idoneus cibus est. Vbi uero aut desinunt, aut leuantur, semper quidem incipiendum est ab aliquo ex materia leuissima, adijciendum uero aliquid ex media, ratione habita subinde, & uirum hominis, & morbi. Ponendi uero ægro uarij cibi sicut Asclepiades præcepit, tum demum sunt, ubi fastidio uertitur, neque; satis uires sufficiunt, ut paulum ex singulis degustando famem nitet. At si neque; uis, neque; cupiditas deest, nulla uarietate sollicitandus eger ne plus assumat, quam cōcoquat. Neque; uerum est, quod ab eo dicitur, facilius cōcoque; cibos uarios: eduntur. n. facilius, ad cōcoctionem autem materie genus, & modus pertinent. Neque; inter magnos dolores, ut neque; incresciente morbo tutum est, ægrum cibo impleri, sed ubi inclinata iam in melius ualitudo est. Sunt alia quoque; obseruationes in febribus necessariæ, atque; id quoque; uidendum est, quod quidam solum præcipiunt, an astrictum corpus sit, an profluat, quorum alterum strangulat quod continet, alterum digerit. nam si astrictum est, ducenda aluus est, mouenda urina, eliciendus omni modo sudor. In hoc genere morborum sanguinem etiam misisse, cōcusuisse uehementibus gestationibus, corpus in lumine habuisse, imperasse famem, sitim, uigiliam prodest. Utile est etiam ducere in balneum, prius demittere in solium, tum ungere, iterum ad solium redire, multaque; aqua fouere inguinæ, interdum etiam oleum in solio cum aqua calida miscere, uti cibo rarius & serius tenui, simplici, molli, calido, exiguo, maximeque; oleribus, qualia sunt, lapatium, urtica, malua, uel iure etiam cōcharum, musculorumue, aut locustarum, neque;

danda caro nisi elixa est. At potio esse debet magis liberalis, & ante cibum, & post hunc, & cum hoc ultra quàm sitis coget. Poteritque a balneo etiam pinguius, aut dulcius dari uinum. poterit semel, aut bis inter poni grâcū falsum. Contra uero si corpus profluit, sudor coercendus, quies adhibenda erit tenebris, somnoque, quandoque uolet, utendū, nō nisi leuigestatione corpus agitandū, & pro genere mali subueniendum. Nam si uenter fluit, aut si stomachus non cōtinet, ubi febris decreuit, liberaliter oportet aquam tepidā potui dare, & uomere cogere, nisi aut fauces, aut præcordia, aut latus dolet, aut uetus morbus est. Si uero sudor exercet, duranda cutis est, uel nitro, uel sale, quæ cū oleo miscentur. At si leuius id uitium est, oleo corpus ungendum est. si uehementius, rosa, uel melino, uel myrteo, cui uinum austerū sit adiectum. Quisquis autem fluore æger est, cū uenit in balneum, prius ungendus, deinde in soliu demittendus est. Si in cute uitium est, frigida quoque, quā calida aqua melius utetur. Vbi ad cibum uentum est, dari debet is ualens, frigidus, siccus simplex, qui quā minime corrumpi possit, panis tostus, caro assa, uinum asperū, uel certe subausterum, si uenter profluit, calidum, si sudores nocent, uomitusque sunt, frigidum.

Quomodo pestilentes febres curari debeant. Cap. V.

Desiderat etiam propriā animaduersionem in febribus pestilentia casus. In hac minime utile est, aut fame, aut medicamentis uti, aut ducere aluum. Si uires sinunt, sanguinem mittere optimum est, præcipueque si cum dolore febris est. Si id parum tutum est, ubi febris, aut tenuata est, aut leuata est, uomitu peccus purgare. Sed in hoc maturius, quàm in alijs morbis ducere in balneum opus est, uinū calidū, & meratius dare, & omnia glutinosa. inter quæ quoque carneum generis eiusdem. Nam quo celerius eiusmodi tempestates corripunt, eo maturius auxilia, etiam cum quadā temeritate rapienda sunt. Quod si puer est, qui laborat, neque tantum robur eius est, ut sanguis mitti possit, siti ei utendū est, ducenda aluus, uel aqua, uel prisanæ cremore, tū de mum is leuibus cibus nutriendus. Et ex toto nō sic pueri ut uiri curari debent. Ergo, ut in alio quoque genere morborum parcius in his agendū est. Non facile sanguinem mittere, nō facile ducere aluum, non cruciari uigilia, fameue, aut nimia siti, conuenit. Vomitus post febrē eliciendus est. deinde dandus cibus ex leuissimis, tū is dormiat, postero quoque die, si febris manet, abstineatur. Tertio ad similem cibū redeat. Dandaque opera est quātum

ferri potest, ut inter opportunam abstinentiam cibosque opportunos, omisis cæteris, nutriatur. Si uero ardens febris extorret, nulla medicamentis danda potio est, sed in ipsis accessione oleo, & aqua refrigerandus est, quæ miscenda manu sunt, donec albescant, & conclauī tenendus, quo multū, & purū aerem trahere possit, neque multis uestimentis strangulandus, sed admodum leuibus tantū uelandus est. Possunt etiam super stomachū imponi folia uitis in aqua frigida tincta. Ac ne siti quidē nimia uexandus est. alendus maturius est, id est a die tertio, & ante cibū, isdē perungendus. Si pituita in stomacho coijt, inclinara accessione uomere cogendus est, & tunc dandū frigidum olus, aut potū ex his, quæ stomacho conueniunt. Si siccus manet stomachus, protinus, uel prisanæ, uel alicæ, uel orizæ cremor dandus est, cum quo recens adeps cocta sit. Cū uero in summo incremento morbus est, utriusque non ante diem quartū magnā siti antecedente, frigida aqua copiose præstanda est, ut bibat etiā ultra satietatem, & cū iam uenter, & præcordia ultra modū repleta, satiusque refrigerata sunt, uomere debet. Quidā ne uomitū quidem exigunt, sed ipsa aqua frigida, tantū ad satietatem dara, pro medicamento utuntur. Vbi utrum liber factum est, multa ueste operiendus est, & collocandus ut dormiat. Fereque post longā sitim, & uigiliam, post multā satietatem, post infractum calorem, plenus somnus uenit, per quē ingens sudor effunditur, idque præsentissimū auxilium est. Sed in his tamē, in quibus præter ardorē nulli dolores, nullus præcordiorum tumor, nihil prohibens, uel in thorace, uel in pulmone, uel in faucibus, nō ulcus, non deiectio, non profluiuū alui fuit. Siquis autē in eiusmodi febre leuiter tulsit, is neque uehementi siti cōsistatur, neque bibere aquā frigidā debet, sed eo modo curandus est quo in cæteris febribus præcipitur.

Curatio semitertiana febris, quæ hemitritica dicitur. Cap. VI.

At ubi id genus tertianæ est, quod medici appellant, magna cura opus est, ne id fallat. Habet enim plerunq; frequentiores accessiones, decessionesq; , ut aliud morbi genus uideri possit, porrigitq; febris inter horas 24. & 36. ut quod idē est, nō idē esse uideatur. Et magnopere necessariū est, neque dari cibū, nisi in ea remissione, quæ uera est, & ubi ea uenit, protinus dari, plurimiq; sub alterutro curatis errore subito moriuntur. ac nisi magnopere aliqua res prohibet, inter initia sanguis mitti debet, tū dari cibus, qui neque incitet febrē, & tamen longū eius spatium sustineat.

Curatio lentarum febrium. Cap. VII.

Nonnunquam etiam lentæ febres sine ulla remissione corpus tenent, ac neque cibo, neque remedio locus est. In hoc casu medici cura esse debet, ut morbum mutet. Fortasse enim curationi opportunior fiet. Sæpe igitur ex aqua frigida, cui oleum sit adiectum, corpus eius pertractandum est. quoniam interdum sic evenit, ut horror oriatur, & fiat initium quoddam novi motus, ex quo eo cum magis corpus incaluit, sequatur etiam remissio. In his frictio quoque ex oleo, & sale salubris videtur. at si diu frigus est, & torpor, & inactio corporis, non alienum est in ipsa febre dare multum tres, aut quatuor cyathos, vel cum cibo vinum bene dilutum. Intenditur enim sæpe ex eo febris, & maior ortus calor, simul & priora mala tollit, & spem remissionis in ea curatione ostendit. Neque hercule ista curatio nova est, qua nunc quidam traditos sibi egros, qui sub cautioribus medicis trahebantur, interdum contrariis remedijs sanant. si quidem apud antiquos quoque ante Erophilum, & Erasistratum, maximeque post Hippocratem, fuit Petro quidam, qui febricitantem hominem ubi acceperat, multis vestimentis operiebat, ut simul calorem ingentem, sitimque excitaret. Deinde ubi paulum remitti ceperat febris, aquam frigidam potui dabat, ac si mouerat sudorem, explicuisse se ægrum indicabat. si non mouerat, plus etiam aquæ frigidae ingerebat, & tum vomere cogebat. Si alterutro modo febre liberauerat, protinus suillam assam, & vinum homini dabat. Si non liberauerat, decoquebat aquam sale adiecto, eamque bibere cogebat, ut mouendo ventrem purgaret. & intra hæc omnis eius medicina erat. eaque non minus grata fuit his, quos Hippocratis successores non refecerant, quam nunc est his, quos Erophili, vel Erasistrati æmuli diu tractos non expedierunt. Neque ideo tamen non est temeraria ista medicina, quia plures, si protinus à principijs exceperit, interemir. Sed cum eadem omnibus conuenire non possint, ferè quos ratio non restituit, temeritas adiuuat. Ideoque eiusmodi medici melius alienos ægros, quam suos nutriunt. Sed est circumspecti quoque hominis, & nouare interdum, & augere morbum, & febres accendere, quia curationem, ubi id quod est, non recipit, potest recipere id, quod futurum est.

Remedia in febribus ad capitis dolorem, & præcordiorum inflammationem, & ariditatem, & scabritiem lingue. Cap. VIII.

Considerandum etiam est febres ne solæ sint, an alia his quoque mala accedant. id est nunc

caput doleat, nunc lingua aspera, nunc præcordia intenta sint. Si capitis dolores sunt, rosam cum aceto, miscere oportet, & in id ingerere, deinde habere duo pittacia, quæ latitudinē frontis, longitudinemque æquent. Ex his inuicem alterum in aceto, & rosa habere, alterum in frõte, aut intinctam ipsam lanam succidam imponere. Si acetum offendit, pura rosa utendum est. Si rosa ipsa lædit, oleum acerbo. si ista parum iuuant, teri potest, vel iris arida, vel nuces amaræ, vel qualibet herba ex refrigerantibus. Quorum quilibet ex aceto impositum dolorem minuit, sed magis aliud in alio. Iuuat etiam panis cum papauere iniectus, vel cum rosa, cerussa, spumave argenti. Olfacere quoque, vel serpillum, vel anethum non alienum est. At si in præcordiis inflammatio, & dolor est, primo super imponenda sunt cataplasmata reprimentia, ne si calidiora fuerint, plus eo materiam concurret. Deinde ubi prima inflammatio se remisit, tunc demum ad calida, & humida veniendum est, ut ea quæ remanserint, discutiant. Notæ uero inflammationis sunt quatuor, rubor, & tumor cum calore, & dolore. Quo magis exaruit Erasistratus, qui febrē nullā sine hac esse dixit. Ergo si sine inflammatione dolor est, nihil imponendum est. Hunc. n. statim ipsa febris soluit. At si neque inflammatio, neque febris, sed tantum præcordiorum dolor est, protinus calidis, & siccis fomentis uti licet. Si uero lingua sicca est, & scabra, detergenda primum penicillo est ex aqua calida. deinde ungenda mixtis inter se rosa, & melle. Mel purgat, rosa reprimat, simulque siccescere non sinat. At si scabra non est, sed arida, ubi penicillo deterisa est, ungi rosa debet, cui ceræ sit paulum adiectum.

Remedia contra frigus, quod febrē præcedit. Cap. IX.

Solet etiam ante febres esse frigus, idque uel molestissimum morbigenus est. Vbi id expectatur, omni potione prohibendus æger est. hæc. n. paulo ante data multum mali adiicit. Item maturius ueste multa tegendus est. admonenda partibus his, pro quibus metumimus, sicca & calida fomenta, sic, ne statim uehemētissimi calores incipiant, sed paulatim accrescant. Perfricandæ quoque eę partes manibus unctis ex uetere oleo sunt, eisque adiciendum aliquid ex calefacientibus. Cõtenti quoque medici quidam una frictione etiam ex quolibet oleo sunt. In harum febrium remissionibus nonnulli tres, aut quatuor sortitionis cyathos etiam nunc ultra manente febre dant. deinde ea bene finita reficiunt stomachum cibo frigido, & leni. Ego tum hoc puto tentandum, cum parum eibus semel, & post febrē datus prodest, sed curiose perspicendum est, ne tempus remissionis decipiat. Sæpe enim in hoc quoque genere ualitudinis iam minui fe-

bris uidetur, & rursus intenditur. itaque ei remissioni credendum est, quæ etiam immoratur, & iactationem, fœtoremque quendam oris, quem ^{græci} uocant, minuit. Illud satis cõuenit, si quotidie pares accessiones sunt, quotidie paruum cibũ dandũ. si impares, post grauiore cibum, post leuiorem, aqua mulsam.

Curatio horroris in febribus. Cap. X.

HORROR autẽ eas ferẽ febrẽs antecedit, quæ certum habent circuitum, & ex toto remittuntur. Ideoque tutissimæ sunt, maximeque curationes admittunt. Nam ubi incerta tempora sunt, neque alui ductio, neque balneum, neque uinum, neque medicamentum aliud recte datũ. incertũ est enim quando febris uentura sit, ita fieri potest, ut si subito uenerit, summa in eo perniciēs sit, quod auxiliij causa sit inuentũ. Nihilque aliud fieri potest, quam uti primis diebus bene abstineatur æger. deinde sub decessu febris eius, quæ grauissima est, cibumumat. at ubi certus circuitus est, facilius omnia illa tentantur, quia facilius proponere nobis, & accessionum, & decisionũ nicēs possumus. In his autem cum veterauerunt, utilis famis non est. Primis tantummodo diebus ea pugnandum est, deinde diuidenda curatio est, & ante horror, tum febris discutienda. Igitur cum primum aliquis inhorruit, & ex horrore incaluit, dare ei oportet potui tepidam aquam subfalsam, & uomere eum cogere. nam ferẽ talis horror ab his oritur, quæ biliosa in stomacho resederunt. idem faciendum est, si proximo quoque circuitu eque celsit, sæpe enim sic discuitur. iamque quod genus febris sit, scire licet. itaque sub expectatione proximæ accessionis, quæ instare tertia potest, deducendus in balneum est, dandaque opera est, ut per tempus horroris in solio sit. si ibi quoque senserit, nihilominus idem sub expectatione accessionis quartæ faciat. si quidem eo quoque modo sæpe id discuitur. si nec balneum quidem profuit, ante accessionem alium edat, aut bibat calidam aquam cum pipere, si quidem ea quoque assumpta calorem mouent, qui horrorem non admittit. Deinde eo modo quo in frigore præceptum est, antequam inhorrescere possit, operiatur. Fomentisque protinus ualidioribus totum corpus circundare conuenit, maximæque inuolutis extinctis testis, & titionibus. Si nihilominus horror perruperit, multo oleo calefacto inter ipsa vestimenta, perfundatur, cui æque ex calefacientibus aliquid sit adiectum. adhibeaturque frictio quantum is sustinere poterit, maximeque in manibus, & pedibus, & spiritum ipse contineat. neque desistendũ est etiam si horror est. Sæpe enim per-

tinaciã iuuantis malũ corporis uincit. Si quid euomir, danda aqua tepida, iterumque uomere cogendus est, utrendumque eisdẽ est, donec horror finiat. Sed præter hæc, ducenda alius est, si tardius horror quiescit, si quidem id quoque exonerato corpori prodest. Vltima quoque post hæc auxilia sunt gestatio, & frictio. Cibus autem in eiusmodi morbis maxime dandus est, qui mollem aluum præstet. Caro glutinosa, uinum cum dabitur, aulterum.

Curatio quotidiana febris. Cap. XI.

HAEC ad omnes circuitus febrium pertinent. discernendæ tamen singulæ sunt, sicut rationem habent dissimilem. si quotidiana est, triduo primo magnopere abstinere oportet, tũ cibis altero quoque die uti. Si res inueterauerit, post febrem experiri balneum, & uinũ, magisque si horrore sublato hæc superest.

Curatio tertianæ febris. Cap. XII.

SI tertiana uero, quæ ex toto intermittit, aut quartana est, medijs diebus, & ambulationibus uti oportet, alijsque exercitationibus, & vnctionibus. quidã ex antiquioribus medicis Cleophrantus in hoc genere morborum multo ante accessionem caput egri multa calida aqua perfrindebatur, deinde uinũ dabatur. quod quauis plerique eius uiri præcepta secutus est. Aesclepiades, recte tamen præterit. Est. nanceps ipse, si tertiana febris est, tertio die post accessionem dicit aluum duci oportere. quinto post horrorem vomitum elicere. deinde post febrem, sicut illi mos erat, adhuc calidis dare cibũ, & uinũ. sexto die in lectulo detineri. sic enim fore se se primo die febris accedat. Id sæpe fieri posse uerisimile est. Tutius tamen est, ut hoc ipso ordine utamur tria remedia, uomitus, alui ductio, uini potus per triduum, id est die tertio, & quinto, & septimo tentare. nec uinum nisi post accessionem die septimo bibat. Si uero primis diebus discussus morbus non est, inciduntque in uetustate, quo die febris expectabitur, in lectulo se contineat, post febrem perfricetur, tum cibo assumpto bibat aquam. postero die, quo cibo uacat, & ab exercitatione, vnctionesque aqua tantũ cõtetur cõquiescat. Et id quidẽ optimũ est. Si uero imbecillitas urgebit & post febrem uinum, & medio die paulũ cibi debet assumere.

Curatio quartanæ febris. Cap. XIII.

EAdem in quartana faciendæ sunt. Sed cum hæc tarde admodum finiat, nisi primis diebus discussa est, diligentius ab initio præcipiendum est, quid in ea debeat fieri. Igitur si quicquid horrore

horrore febris accessit, eaq; desijt, eodem die, & postero, tertioq; continere se debet, & aqua tantummodo calidam primo die post febrem sumere, biduo proximo quantum fieri potest ne hanc quidem. si quarto die cum horrore febris reuertitur, nonne sicut ante præceptum est, deinde post febrem modicum cibum sumere, vini quadrantem. Postero, tertioque die abstinere, aqua tantummodo calida, si sitiet, assumpta, septimo die balneo frigus præuenire abstinere, continere se debet, & aqua tantummodo calida, si sitiet, ac tunc ita nono die balneo frigus præuenire, si febris redierit, ducere alium. ubi ex eo corpus conquieuerit, inunctione uehementer perfricari, eodem modo sumere cibum, & uinum, biduo proximo se abstinere frictione seruata. decimo die rursus balneum experiri, & si postea febris accessit, æque perfricari. uinum copiosius bibere. ac si proximum est quies tot dierum, ut abstinentia cum cæteris quæ præcipiuntur, febrem tollant. Si uero nihilominus remanet, aliud ex toto sequendum est. curationis genus, idque agendum, ut quod diu sustinendum est, corpus facile sustineat. Quominus etiam curatio probari Heraclidis Tarentini debet, qui primis diebus educendam alium, deinde abstinendum usque in septimum diem dixit. Quod uel sustinere aliquis possit, etiam febre liberatus, nix refectio ualebit. adeo si febris sæpius accesserit, conueniet. Igitur si tertio decimo die morbus remanet, balneum neq; ante febrem, neq; post eam tentandum erit, nisi interdum iam horrore discusso. Horror ipse per eadem, quæ supra præscripta sunt, expugnandus. Deinde post febrem oportebit ungi, & uehementer perfricari, cibum, & ualidum, & fortiter assumere. uino uero quantum libebit. postero die cum satis quieuerit, ambulare, exerceri, ungi, perfricari fortiter, cibum accipere sine uino, tertio die abstinere. quo die uero febrem expectabit, ante surgere, & exerceri, darique operam non oportet, ut in ipsam exercitationem tempus febris incurrat. sic enim sæpe illa discutitur. At si in opere occupauit, tum demum se recipere. In eiusmodi ualitudine medicamenta sunt, oleum, frictio, exercitatio, cibus, uinum. Si uenter astrictus est, soluendus est. Sed hæc facile ualidiores faciunt. si imbecillitas occupauit, pro exercitatione gestatio est. Si ne hanc quidem sustinet, adhibenda tamē frictio

est. si hæc quoq; uehemens onerat, intra quietem, & inunctionem, & cibum sistendum est, dandaque opera est, ne qua cruditas in quotidianam id malum uertat. Nam quartana neminem iugulat. sed si ex ea facta quotidiana est, in malis æger est. Quod tamen nisi culpa, uel ægri, uel curantis nunquam fit.

Curatio duarum quartanarum. Cap. XIIII.

AT si duæ quartanæ sunt, neque hæ, quas Apoposui, exercitationes adhiberi possunt, aut ex toto quiescere opus est, aut si id difficile est, leuiter ambulare, considerare diligenter inuolutis pedibus, & capite. Quoties febris accessit, & desijt, cibum modicum sumere, & uinum. reliquo tempore nisi imbecillitas urget, abstinere. Aut si duæ febres penè iunguntur, post utranque cibum sumere. deinde uacuo tempore, & moueri aliquid, & post inunctionem cibo uti. Cum uero uetus quartana raro, nisi uere soluitur, utique eo tempore attendendum est ne quid fiat, quod ualitudinem impediat. Prodestque in uetere quartana mutare subinde uictus genus, à uino ad aquam, ab aqua ad uinum, à lenibus cibis ad acres, ab acerbis ad lenes transire, esse radicem, deinde uomere, iure uel pulli gallinacei uentrem resoluerè, oleum ad frictiones adijcere, calefacientia ante accessione forbere, uel aceti cyathos duos, uel unum sinapis cum tribus græci uini salsi, uel mixta paribus proportionibus, & in aqua diluta, piper, castoreum, laser, myrram. per, hæc enim similiaque corpus agitandum est ut moueatur ex eo statu quo detinetur. Si febris quieuit, diu meminisse eius dici conuenit, eoque uitare frigus, calorem, cruditatem, lassitudinem. Facile enim reuertitur, nisi à sano quoque aliquandiu timetur.

Curatio quotidiana febris, quæ ex quartana facta sit. Cap. XV.

AT si ex quartana quotidiana facta est, cum Aid uisio inciderit, per biduum abstinere oportet frictione uti, aquam tantummodo uesperis potui dare. tertio die sæpe fit ne febris accedat. sed siue fuit, siue non fuit, cibus post accessione tempus est dandus: at si manet, per biduum abstinentia, quanta maxime imperari corpori potest, frictione quotidie utendum est.

F I N I S.

M E D I C O R V M

V E T V S T O R V M L A T I N O R V M

D E F E B R I B V S

Tomus tertius.



Q. S E R E N I

D E F E B R I B V S

C A R M I N A.

Subitaneo dolori, febrî, atque ostocopo.



Nonnunquam existit subiti no-
ua causa doloris :

Cuius origo latet, ueris repri-
menda medellis.

Nanq; chelidonia mixto sale
nectere prodest.

Velleraque infuso recalentia sulphure sanant
Ostocopon lento conduxit melle perungi.
Sin autem calidæ depascent corpora febres,
Tunc apij succus leni sociatur oliuo :

Membra lines; fotuq; ferus mulcebitur ignis.

Nec spnēdus adeps, dederit quē bestia Melus.

Seminēcis cerui lacrymam miscere liquori

Conuenit : atque artus illinc mulcere calētes :

Febribus at longis galli des iura uerusti.

Ad typum quartanæ.

Nec tu crede leuēni dilato tempore febrem :

Quæ spatiū sibi dat magis, ut cessādo caleſcat.

Leniato quæ crassatur quartanā calore :

Ni medicas adhibere man⁹ discamūs & herbas,

Allia non pudeat terno cum cimice trita,

Et diluta mero medijs haurire diebus :

Aut facilem iecoris murini ducere fibram.

Quatuor & duri iungantur scrupula bacchi.

Mira est absinthij cum simplice potio lympha.

Sume tribus digitis apprehēsum semen anethi,

Tantundem marathri, mullum nec desit aceto,

In cuius cyatho prædicta salubriter hauris,

Ilia quinetiam spartum suppone tumentia :

Aut leporis trepidi diluta coagula trade.

Prodest & potus sed mullus doridis humor.

Quidam etiam mirāda ferunt veniente calore

Iurantes ludum veneris, munusque petendum.

Sed prius est oleo partus feruescere ranæ

In triuijs, illoque artus perducere succo :

Ad typum tertianæ.

Est etiam alternis febris rediuiua diebus :

Tempora discernens quasi iustę pondera libræ :

Vt possis igitur talem prohibere furorē,

Tu volues, cera sine caudis grana cumini,

Puniceæque indes pelli, colloque ligabis :

Pulei ramus lanæ velatus amictu

Tempore suspecto medicos præbebit odores,

Præterea cimex potatur trius in ouo,

Horridus attractu, sed gustu commodus apte.

Ad typum quotidianæ.

At qui continuis non cessat adire diebus,

Sed tantum certas morbus discriminat horas,

Triticum metuit granū (si credere dignū est)

Quod latitās fracto fuerit sub pane reperit,

Nec non ossa iuuant septis inuenta domorum.

Conuenit hæc tereti, pendentia subdere collo,

Multaque præterea verborum monstra silebo,

Nam febrem vario depelli carmine posse

Vana superstitione credit, tremulæq; parentes :

Hemitritæo depellendo.

Mortiferū magis est, quod græcis hemitritæū

Vulgarur verbis, hoc nostra dicere lingua

Non potuere vlli : puto nec voluere parentes.

Inſcribis chartæ quod dicitur, abraça capra

Sæpius, & subter reperis, sed detrahe sumam :

Et magis atque magis desint elementa figuris :

Singula quæ semper, rapies, & cætera figes.

Donec in angustum redigatur littera conum.

His lino nexis collum redimire memento

Nonnulli memorant adipem prodesse leonis :

Corallum vero, si collo nectere velles.

Nē dubites illo veros miscere smaragdos.

Talia languentis conducent vincula collo :

Letalesq; abiget miranda potentia morbos.

F I N I S.

C. PLINII

C. PLINII SECVNDI

DE FEBRIBVS

LIBER.

*Ad febres calidas intercidendas.**Cap. I.*

MEDVLLA ceruina, adipe anseris, adipe porcino recenti, & exiguo ceræ perunges sero, ac statim de succo lini seminis. Idemq; asinæ lac tepidum facit. Cotonia item matura, &

rosam siccam, & papaueris capita sicca in olla rudi cum aqua decoques, & ex hoc dabis bibere. Item portiagla & apium tusum cum axungia colata, & oleo rosato, & lactucæ folijs, & rasura cucurbitarum, & ouis crudis permixtū, & in modum ceroti pectori impositum, ardores ac subitos dolores hemitritæ, & febres emendat. Ad ardorem stomachi febrientis. Rosaceum in aquam calidam mittes, & agitabis in carbonibus, quo platulam lineam infundes & stomacho superpones. Mellis libram unā, adipis porcini recentis colati vnam, olei rosati vnam, ceræ unam, argenti spumæ uncias duas, teres autem spumam & simul decoques, deinde croci triti mittes uncias duas & teres in linteolo, inductum super stomachum impones. Ad hæc ambrosia. Recipe olei rosati libram unam & semis, ceræ vnam & semis, croci vnc. duas, succi rasuræ cucurbitæ quantum sufficit, medullæ ceruinæ uncias quatuor, seruefacies autem ceram & medullam cum oleo tepesfacto cerotario, addes succum per partes & teres diligenter, postea addes crocum & diutissime teres, permiscebis & facies pastillos, seruabisq; & cum opus fuerit teres cum ouorum vitello. Cumque vnum corpus fuerit, linteum illitum impones super stomachum. Ad ardorem stomachi in febribus quæ non declinant ex lini seminis farina cum albo oui facies cataplasma, & frigida super stomachum pones. Lactucas autem in calida coques, & teres cum albo oui, & stomacho superpones. Itemq; rasura cucurbitæ & vuz acerbæ cum albo oui imponuntur. Rasura iridem cucurbitæ & crocum æquale cum albo oui imponitur. Confectio ambrosiæ. Ceræ lib. unam, olei rosati vnc. sex, olei camomillæ sex, axungia recētis lib. vnam, croci vnc.

unam, lithargyrii unam, meliloti unam & semis. Iniectio ad febres calida. Succus lini seminis cum oleo rosato seu camomillæ bene faciet. Si uero nimium febris æstuauerit. Plantaginis folia viridis & caules simul tundes, succoque eorum corpus perunges. Ad ardentissimam febrem, herbam quæ dicitur Iouis barba, conteres, ac succum eius exprimes, & miscebis cum cinere aquaticæ lanæ, & addito oleo rosato perunges, tunc ægrum cooperies, inde somnus irruet, & ardor compescetur. Item ad febres. Axungiam leoninam manu subiges, & totum corpus perunges. Ruta item cum oleo subacta totum corpus perunges. Lilij radices tres aut quinque, croci den. v. macerabis in aquæ quartario uno, & ouorum tribus, vitellos teres bene, & adicies olei rosati quantum sufficiat, & inde totum corpus perunges, præter manus & pedes. Vt febrem tollas. Nucleos tritos ex aqua calida dabis bibere. Itemque ut febres foras eijcias. Siliginem in aqua recentem macerabis, & teres in mortario cum tribus ouis duris, & panno inducto ad stomachum ligabis. Si quis uero febres patitur & fatigatur aut angustias patitur, dactylos quàm plurimos & adipem aut recentem aut vetustum in receti aqua macerabis, donec exallescatur, deinde in mortario teres ut vnum corpus fiat, & panno induces quasi cataplasma, & stomacho impones nocte, sed prius dactylos tritos in careno aut sapa macerabis. Vt febrem tollas, & ut ex infirmitate pallidum ad bonum colorem perducas, ciuaria & lupinos dulces ieiuno in cibum dabis. Succum item calamenti & pleum rosatum æquis ponderibus comiscebis, & sic perunges. Itemq; herbam quæ vocatur canis lingua, mense Iunio tundes & vnam exprimes, succoq; eius ægrum perfundes.

Hemitritæo depellendo. Cap. II.

RANULAS paruas uirides capies, & aperto ventre uiuarum harundine intestina auferes, ac proijcies, illas uero mittes in stagnatum nouum & frigis: quibus sublatis, mittes in oleum ceram & facies cerotum molle, & ab auribus vsque

vsq; ad pedis ungulas triduo perunges, & non lauet, sanus erit: quia vulnera exeunt per corpus à quibus cito liberabitur. Potio ad hemitritum, siue ad leuiscos. Croci denarios duos, nardi duos, absinthij pontici duos, enulae tres: quae omnia cribrabis, & cum opus fuerit dabis cochlear dimidium in aqua calida. Potio. Recipe costi denarium dimidium, folij, denarium vñ & semis, spicanardi duos, croci tres, semperuiæ cauliculum vñ, aut certe prout videris magnitudinem cauliculi dabis cum aqua calida. Herbam camomillam cum rosa sicca coques, & ipsam aquam cum colaueris mitres camomillinum oleum, & farinam lini seminis coques & vteris tepido, sed alij tantum de farina hordei & lini seminis & oleo camomillino faciunt, alij dactilo, camomillam & melilotum aqua infundunt & coquunt, in quam mittes farinam lini seminis & hordei, coquesque, & ita cataplasmas, sed eum qui magnis laborat febribus. Trochiscus ad hæc & ad febricitantes, ut non sentiant: ad ardorem stomachi, ad febres, & ad solis ardorem nimium. Recipe succi glycyrrhizæ drach. sex, seminis cucumeris hortensis quatuor, draganti duas, quæ teres singillatim & permiscebis cum albo ouorum, & facies cataporia.

Febribus periodicis medendis. Cap. III.

IEcur delphini ante accessiorem gustandum datur. In aselli piscis capite lapilli qui plena luna inuenti sunt, alligantur in linteolo. Vtile est inungi oleo & sale. Cancris fluuiatilibus tritis in oleo & aqua, ante accessiorem perungi oportet. Oculus item lupi dexter salsus alligatur, ante meridiem quoque dantur heminae tres porri, in quibus additæ sunt guttæ tres sanguinis ex vena asini quam in auricula habet. Recidivas autem febres prohibet lacerata viridis uina alligata in uascello quod eam capiat. Lyxoperita ambrosia ualde optima. Recipe lithargyrii lib. i. rodini. i. mellis. i. sed prius facies cerotum, postea mitthes lithargyriū, & feruescias ut supra fortius, leuabisq; de foco & cum spatha agitabis donec refrigeret.

Quotidianæ curandæ. Cap. II.

Dabis bibere mentam tritam ex aqua cyathis duobus, statimq; sanguis e naribus exit. Costum tritum & admixtum pleo ante accessiorem perunctos à febribus liberat. Beta agrestis cum oleo rosato totum corpus perunges. Itemque rutæ succum cum uino bibat qui potest, quia uehementissimus est. Ad horrores. Bethonica denarios sex, aqua calida cyathos duos ex uino austero sub accessione

dabis bibere, & sudabit.

Tertiana curanda. Cap. V.

SV B. accessione, pauca grana apij seminis cum aqua calida bibat. Itemque succum trifolij hora prima dabis bibendum ei qui patitur. Folia item de persico & modicum lasarteres, & dabis potionem. Rursumque ante accessiorem tria grana coriandri deuoret. Melliscratum item frigidum bibat. Ante solis ortum spongiæ aphricanæ cinis ex oleo nelato fronti illinitur. Cancris fluuiatilis oculi erit alligantur, & ipse cancer in aqua remittitur. Pulegij similiter ramus in lana inuolutus ante accessiorem olfaciendus datur, aut stratis subditur. Vrticæ autumnalis radix alligatur. Is uero qui eam effodiet, debet nominare eum cui medetur, & quibus parentibus natus sit. Herba quæ in fluminibus aut riuis nascitur alligata in lauo brachio, quid sit nescienti, tertianas discutit. Legi autem debet ante solis ortum, sicut eum qui colligit nemo uideat. Aranei tres cuilibet emplastro infricantur, idemq; emplastrum ut libet in aluta tanquam anacolima imponitur. Ante accessiorem quoque aqua frigida decem vñc. bibuntur.

Quartana curanda. Cap. VI.

Vini optimi Spateni uel pecinini, uel putto Hadriani Aphrivi, seu burdi gallici pond. nouem pensabis, hinc quotidie in maiori calice potionem dabis uini calefacti ieiunando nec totum bibat, & sanus erit. Parum croci quatum tribus digitis leuatur teres, & ex aqua calida dabis sub hora accessiõis iam suspecta. Communiter autem ad omnes typhos facies pannum talem. Recipe axungie lib. vñ, picis vñ, absinthij tenelli unam, primumq; teres absinthium & dehinc picem. postea simul omnia in pila tundes in modum cerotum & panno illita per totum pectus & stomachum ac ventrem pones, habendum iugiter quinque diebus ac noctibus. Cataplasma ad quartanas. Recipe farinæ baccarum lauri sextarium unum, fenugraeci unum, farinæ lupi unum, sapæ heminam unam, carycas numero triginta, oleum daurinum ad unguendum stomachum habebis, prius uero sacello de fursure per quadriduum fouebis, & sic cataplasmas. Apocusthermanticus ad quartanas. Recipe cerebinthinæ drach. sex, ceræ similiter, medullæ ceruinæ similiter, guttæ ammoniaci similiter, galbani similiter, aphronitri similiter, hyssopi vñciam unam, piperis vñ, myrrhæ vñ, vini cyathos duos, mellis attici duos, olei veteris drach. septuaginta, irini sextarium vñ, soluta

soluta uero resolues in olla, & sic mittes sicca, trita & cribrata, & sic omnibus permixtis uteris. Ad quartanas expectum. Recipe castorij sex, panacis regij sex, opij sex, iusquiami duas, mellis quantum sufficit, dabis ante horam dimidiam accessione ad magnitudinem fabæ Aegyptiacæ cum uino mixtum. Caput clauis quo aliquis in crucem fixus est alligatur panno. Fimi bubuli cinis spargitur. Vrina pueri illiniantur primi digiti in manibus & pedibus. Leporis cor alligatur, coagulum quoque eius bibitur ante accessione. Leonis quoque in cibo datur. Vipera etiam caput abscisum in linteolo alligatur. Muri uiuo rostellum primū & auriculæ summæ præciduntur, & in roseo panno alligantur, & ipse mus uiuus dimittitur.

Rana in triuio decoquantur cum oleo carnisque earum proiectis & oleo utuntur ad vñctionem. Allij elixi caput vnum cum lasare tritum obulo in uino austero bibitur. Hirundinis item fimi drachma vna trita ex lactis caprini aut ouilli aut pasci cyathis tribus ante accessione propinatur. Rubetæ ranæ cor uel iecur alligatur in panno leucopæo. Semen anethi tribus digitis comprehensum & sceniculi tantundem, & aceti mulsi cyathus vnus potui datur. Panem & salem in linteolo de lyco liget, & circa arborē licio alliget, & iuret per ter panem & salem: Crastino mihi hospites uenturi sunt, suscipite illos. hoc ter dicat.

F I N I S.

G A R I O P O N T I

D E F E B R I B V S

L I B E R.

De febris definitione & generibus eius.

Cap. I.



FEBRIS est calor in naturalis præter naturam cordis & artiarum principaliter lædens operationem uirtutis. Tria autem sunt genera febriu, unum in spiritibus, alterum in humoribus, tertium in solidis. In spiritibus uero ephemeræ dicuntur. Ex humoribus uero, ex phlegmate quidem intra uasa putrefacto, à calore præter naturam à corde procedente, amphemerina sinocha fit. Si uero extra uasa phlegma putrefiat, amphemerina intermittens. Ex rubea uero cholera putrefacta in uasis, fit tertiana indeficiens, quæ & caupon & sinocha dicitur. Si uero extra uasa eadem cholera putrefiat, fit tertiana intermittens. Si uero melancholicus humor in uasis putrefiat, fit quartana sinocha. Si uero extra, fit quartana intermittens. Sanguis si putrefiat intra uasa, sinocham facit, quæ caret intermissione, eo quod humor maxime amicus naturæ periclitatur. Proportionaliter enim est in aliis tribus humoribus. Phlegma enim quod post sanguinem magis est amicus naturæ, si putrefiat amphemerina fit, quæ duodecim occupat

horas, duodecim tantum intermittens. Quæ uero ex cholera rubea fit, quoniam humor iste minus est amicus naturæ, duabus prædictis, is putrefacto, tardius in tertia die fit passio. Nā quæ ex quarto humore, id est, melancholico fit, quoniam humor, iste est naturæ minus conueniens, putredine facta fit tardius, id est, quarta die passio accidit. Ephemeris uero quæ ex spiritibus præter naturam calefactis, id est, ex animali qui est in cerebro uitali, qui in corde est physico, qui in hepate, fit ex ira, aut ex timore, aut ex cupiditate aut aliquo huiusmodi. Et quia subtilis est materia quæ patitur, facilius ex solo lauacro soluitur. Tertiana uero, uel quartana, uel quotidiana, si putrefacta intra uasa, fit sinocha & caupon continua, ut supradicitur. Quoniam et si ad tempus cessare uidetur, eo quod aliquantulum minus laborant patientes, tamen tunc patuntur, etsi non adeo Frigus autem & rigor in febribus uidetur fieri humoris superfluitate, calorem naturalem superante & quasi extinguente. Qui dum paulatim conualescit, ipsam superfluitatē succedit, & per singulas accessiones periodis eam ex parte consumit. Dum uero per interualla febris uidetur cessare, natura uires resumit ad inimicam superfluitatem rursus accendendam & siccandam, quod tandiu fit, donec eucrasia, id est,

id est, bona temperantia restitatur. Sciendum uero quoniam sicut sol exortus primo mane facilius aerē calefacit propter substantiæ eius subtilitatem, quam aquam, aquam uero quā terram, ita calor prorumpens ex corde facilius calefacit spiritus, quam humores, humores quam solida. Febris uero quæ ex solidis fit præter naturam calefactis, hæctica, id est, consuetudinaria appellatur. Solida uero dicuntur carnes, pinguedo, venæ, arteriæ, nerui.

De diuersitatibus febrium. Cap. II.

QUæ uero, uel quantæ sunt febrium diuersitates, maxime dieticos medicos conuenit nosse, ne per ignorantiam non intelligendo contraria adhibeant, & periculum faciant mortis uicturo, aut macronoriam, id est, longam, & grauem ægritudinem de modica & leui faciāt. Debet etiam scire medicus quatuor esse tempora omnium causarum, maxime febrium, initium, augmentum, statum, & declinationem, quod nisi optime intellexerit, grauiter lædit, nesciēdo quid in his temporibus debeat ægroto adhibere, uel auferre, in quo tempore curet, in quo potum uel escam det. In quo ab his abstineat febrientem, aut quando æger dormire debeat, uel in quo uigilare, & in quo cubiculo iacere debeat. Nam lucidus nimis, & calidus locus relaxat corpus, frigidus & obscurus constringit. Mediocriter ex his temperatus paragonizat, id est, mulcet, & oblectat, & temperat. Intelligere ergo manifestissime clinicus debet pulsus uenarum, & indicia urinae prænosceret: quam maxime enim in his duobus intelligitur genus febris, & origo eausque, & temporum ratio, uitæ mortisque professio. Pulsus etiam ostendit qua hora declinatio, & qualis sit. Hæc utique maxime duo signa considerando poteris manifestissime intelligere quæ sit febrium species, an ephemerina sit, id est, febris simplex, & non molesta, an sinochus, id est, spissa, uel acuta, & iugis, id est, sine inducijs, uel intermissione, uel sine requie ulla, an ampherinus, an triteus, an hemitriteus, an quis hemitriteus sit, an tetrarteus, an pentheus uel hexeus, uel hebdomæas, & harum quæ sunt generales, & quæ sunt speciales, & quæ græcè genicæ, uel hydicæ, & quæ alithæ, & nothæ, id est, ueræ & non ueræ dicuntur. Quæ omnes febres quas supra memorauimus, aliquoties inuicem sibi, uel alijs febribus geminantur, & duplices fiunt, & tunc maxime periculosæ sunt. Vnde duo ampherini, id est, duæ quotidianæ, aut duo tritei, id est, duæ tertianæ, aut duo tetrartei, id est, duæ quartanæ, aut cum ampherino tetrarteus accidit, id est, cum quotidianæ quartana adiungitur, aut cum hemitriteo mi-

nori, uel medio maior adiungitur hemitriteus, ex quo difficile quis poterit euadere, aut cum motus amphemerinus, id est, non uera quotidiana mouetur, aut cum nothus triteus, uel tetrarteus, id est, cum non uera tertiana inueniatur, aut non uera quartana, sed sordida quæ & difficilis ad curandum.

De periodicis febribus. Cap. III.

PERIODICÆ sunt febres quotidianæ, diurnæ, nocturnæ, tertianæ, vel quartanæ. Diurna est quotidiana, quæ diem tenet totam, & noctem habet liberam. Nocturna est quæ noctem tenet totam, & diem habet liberam. Tertiana est quæ diem & noctem habet liberam, & die & nocte tenetur. Si quis duodecim horis febricit grauius, & alijs horis 12. lytopericæ, id est, minutæ, febres cum retinent, & alijs 24. horis apyretos, id est, sine febre habetur. Quartana est quæ post duos dies, diem noctemque tenet, & ita declinat. Nam quotidianæ, tertianæ, & quartanæ possunt esse singulæ, & binæ, & ternæ, & quaternæ. Sed omnes in die & nocte, si duplex est, bis tangit. Si triplex est, ter, si quadruplex, quater. Quia omnes typici etiam quadruplicem unum morbum habere possunt. Sunt horum nothæ, id est, non ueræ, periodicæ febres. Periodicæ enim dicuntur quæ eo quod certo quodam statuatur tempore, in circulo mouentur, uel tumescunt habentes certas commotiones in certis diebus, atque declinationes.

De acutis febribus. Cap. IIII.

ACUTÆ uero sunt febres sinochus, & sinochæ, & caufon, & tripartitus, hemitriteus. Sinochus uero est continua febris sine intermissione, aliquoties & cum augmento. Sinochæ uero & caufon semper modicam habent, & maruinam, non quidem plene mundam remissionem atque quietem. Quo quidem tempore debent refici qui patiuntur: hemitriteus uero est, mediam partem habens declinationis tritæ, unde si minor est hemitriteus mouetur horis 18. & quiescit horis sex. Si uero medius est hemitriteus mouetur horis 36. & quiescit horis 12. Maior uero hemitriteus mouetur 66. & quiescit horis 6. Nec tamen omnes cum quiescunt sine febre sunt. Nam maxime maior hemitriteus proprie sinochæ similis est. Nā sunt hemitritei tres, medius, maior, minor, medius est, qui tertianæ coniungitur. Maior uero quartanæ, & minor quotidianæ. Vnde & acutæ febres dicuntur, eo quod magis ad mortem quam ad uitam properant. Vnde ualde opus est artificii has omnes diligenter curare. Nam maxime hemitritei diuina manu quam humanā curari

rari possunt quamuis & ipsis cura competens deesse non debet. Quibus hoc antidotum con-
ficiendum est; quod aptum scimus hemitri-
teis uniuersis, & à Basilio medico probatum
est ueraciter: Recip. costi, carpobalsami, cel-
ticæ, gariopholi. ana scrupul. 1. croci scrup.
2. nardostachij, melliloti. ana. unc. 2. cas-
siaz folij, semperuiuæ foliorum ana. drach. 3.
mellis lib. 1. aquæ lib. 1. & s. aut 2. his infusis
dabis bibere ex quo sunt duæ commotiones,
aut mox ab initio permittis utrisque.

De febrium diuersitatibus. Cap. V.

Multa sunt genera febrium quæ nascuntur
in homine, id est, ex mutatione temporis
& ætatis, ex labore, & ex ebrietate, & amari-
tudine, & ex alijs multis causis. Quarum no-
mina sunt quotidiana, tertiana, quartana, si-
nocha, causton. Hæ duæ ex abundantia sangui-
nis sunt, & cholerum. Sunt & aliæ febres mi-
nutæ, quæ uocantur ephemeræ, quas dicit Hip-
pocrates simplices febres, eo quod non mul-
to tempore nutriuntur: sed subito contingen-
tes ex nimia uigilia, ex cogitatione, ex tristi-
tia, ex ieiunio, ex mala uoluntate, ex timore,
ex parabola, ex ebrietate, ex labore, ab æstu, à
frigore, ab amaritudine, quam maxime in au-
tumno tempore, non sunt longiores, in tertia
uero die, aut in quarta dimittunt; si negligen-
tia non fuerit. Febris quotidiana est quæ quo-
tidie accidit. Fit autè ex phlegmate congrega-
to in stomacho, ideoque quia phlegma frigi-
dum est, & ipsa febris frigida succurrere ei de-
bes calidis argumentis. Febris tertiana est,
quæ à tertia in tertiam diem accidit. Nascitur
uero ex cholera rubea. Quæ quia ipsa febris ca-
lida est & sicca, succurrere ei debes, frigidis &
humidis argumētis. Febris quartana est, quæ
a quarta in quartam diem accidit nascitur ue-
ro ex cholera nigra, ex sanguine uiscido, & ca-
lido, unde fit grauior ad curandum, quia ex fri-
gido humore melancholicæ & calido humore
sanguinis creatur. Ideoque nimium calida, &
& nimium frigida.

De curatione singularium febrium. Cap. VI.

Dicamus ergo medicinas earum generali-
ter, id est, tales medicinas quæ per singu-
las febres proficiant, & homines ad sanitatem
perducant, sed quia contraria contrarijs curā-
tur, id est, frigida calidis, & calida frigidis: ta-
men interim dum febris non apparet qualis
debeat esse, impendimus ipsas curationes fe-
bricitantibus, ut elementa eorum in melius
temperemus. Hoc est si nimius calor fuerit,
ad frigiditatem reuocemus; si nimium frigus,

ad calorem retrahamus, hoc est, in primis die-
bus uel in prima hebdomada ponamus super
stomachum eius cataplasma, habens lini se-
men, & hordeum, & fœnugræcum, absinthii
anethum, apium, petroselinum, leuisticum,
& lupinum. Hæc erunt in cataplasmate, fœni-
culi semen cum aqua bulliat, quam bibat. Su-
pradiçtis autem seminibus farina facta, mit-
tis desuper oleum uel axungiam ueterem, &
facto cataplasmate induc in lintecolo, & cali-
dum super stomachum impone, per dies pluri-
mos, mutando omnibus diebus, & calefacien-
do, postea facies ei unguentum quod dicitur
marciaton, aut pentamiron, deinde dabis eis
antidotum istud: quod Recip. piperis unc. 2.
cymini unc. 5. mellis quod sufficit, fac electua-
rium, & dabis sero coclear. 1. aut mane ieiuno.
Si hæc diligenter feceris, auxiliante domi-
no, subuenies contra omnes febres.

De natura febrium. Cap. VII.

Febricula à feruore ueluti feruicula nuncu-
patur. Febricitantem uero apprehendi-
mus tum tactui nostro occurrere, ueluti ex al-
to ascendentem feruorem plurimum, atque
acriorem naturali senserimus, qui lippotho-
miam, id est, defectum per totum corpus exha-
lantem irrigat. Mutatio enim pulsus, febricu-
læ signum confert. Sed secundum ueteres nō:
Hippocrates enim & Eugenius, & Phistoni-
cus solum feruorem naturalem moderationē
excedentem, signum febrium posuerunt. Sed
& ceteri successores eorum de pulsus mutatio-
ne dispares in sententijs sunt. Alij enim con-
tra naturam effectas mutationes sine exteræ
causæ aduentu, signum febrium uocauerunt:
ut Acrisius. Alij crebritatem pulsus ultra na-
turam, ut Eleotates, Erißippus, & Sostratus.
Alij uehementiam & duritiam pulsus, ut qui-
dam nonnulli inuentores: ex quibus aliqui so-
lius pulsus mutationes, & aliqui etiam non
naturaliter calorem superuenientem, signa fe-
briculæ posuerunt. Nos autem quoniam in
infirmis mutatur pulsus, aut causarum irruen-
tium euentu, aut suæ proprietate facilitatis,
suas mutationes etiam propterea febrium
passioni tribuimus. Nam naturalis feruoris su-
perantia non solum ex febre, sed etiam sola ua-
poratione exercitationis, uel motu, uel acris ci-
bi usu (alias esu) efficitur, ut per totum cor-
pus ex alto atque acrior naturali, & plurimū
exhalans feruor, sentiat, quod Græci apy-
retos uacant. Fiunt multæ febres ex cholerū
humore, quarum species sunt quatuor: Sino-
chus, amphemerina, triteus, & tetrarteus. Si-
nochus est continuus. Nascitur à plurima cho-
lera, & acerrima, & dimissionem habet in exi-
guo

quo tempore. Corpus enim non refrigerat ullo tempore, sed inflamatur acerrime à multo calore cholericum. Amphemerina, id est, quotidiana, & ipsa à cholera nascitur, & transit celerius quam illa longissima sinocha, quoniam ex parua efficitur cholera, & habet requiem corpus. In sinocha autem febricitans non habet requiem ullo tempore. Tritea autem, hoc est, tertiana longissima ab amphemerina, ex cholera rubea & parua nascitur, & propterea multo tempore non retinet tritea. Tetrarteia autem, id est, quartana secundum istam rationem tardior est, à tritea, quia quantum habet cholericum, tantum à cæteris febribus distat, & propterea acredinem multam habet, quia uetusta est ex cholera nigra abundantia, propterea difficile curat à supradictis omnibus. Quomodo apprehendimus quatuor tempora febriculæ, id est, initium, augmentum, statum, & declinationem. Initium apprehendimus ex primo paruo motu feruoris in acriorem qualitatem transeuntis. Augmentum uero excremento qualitatis & quantitatis supradictæ significationis. Statum uero ex quantitate. Declinationem ex diminutione, id est, nascitur, crescit, stat, & minuitur, i. senescit, quomodo & crescit, & scire nos conuenit species febrium, non amplius esse quam tres. Tipicam quam quidem periodicam Græci uocant, hemitriteam, & sinocham. Tipica est biformis, si bene tamen hoc nomen translatus est, quæ quotidie laxamentum, uel quotidianis, uel ternis diebus, uel quartanis facit, quas uulgo quotidianas, uel tertianas, uel quartanas uocat. Hemitritea est quæ duplum habet tertianæ. Sunt autem hemitritearum genera tria. Minimæ, mediæ, & maximæ. Minimæ est, qui post diem & noctem hypodexim, id est, relaxationem habet. Relaxatio est dum declinat febris, & laxamentum, aut puræ intermissionis, aut sordidæ facit, & rursus fit. Mediæ est, qui una tertia quaque die laxamentum quod supradiximus tribuit & adiunctionem facit. Maximæ quamuis declinationem facit, ut cum febris triduo iuncto, & quarta die quasi quasdam inducias tribuat, tamen mox etiam acris incalescit. Hoc genus morbi quoniam accidentia habet, graue & periculosum est. periculosior tamen omnibus sinocha febris est. quæ laxamenti nihil dat, aut ita dat ut modicum fiat, & uix possit intelligi. Semper enim assiduus est febrium color. Continuo ut incipit hæc febris, fit tremor corporum, & ualidum frigus ut in typicis febribus. Solet autem in tritaicis apparere circulus ante oculos, inhorrescunt membra corporis, nondum plene oppressa frigore, ita tamen calefcere incipiunt, quia in alto sunt posita, & per totum

corpus uapor iugis fit. Post hoc cum coeperit declinare estus, tunc intepescit calor, & naturalis paulatim temperatur, & corporis tactus blandior redditur. Item febris accidentia sunt, quæ Græci synthomata uocant, id est, aut capitis dolor, aut uentris, aut stomachi, aut uomitus, aut uentris nimia solutio, aut strictura nimia, aut uigilia iugis, aut somnurbationes, & his similia. Ex quibus quanta sit uis febris contemplari potest. Sed iam de ipsarum febrium specie aliquanta dicta sunt, quo facilius cognoscas eas, quarum quasi contemplaria aliquanta ante oculos tuos sunt posita, & quæ reliqua sunt promemus. Quomodo apprehendimus febrium dimissiones; Limpidam ex tranquillitate, sordidam ex mitigatione. Quæ sunt febrium differentia? Sunt febres strictæ, solutæ, complexæ, celeres. Sunt & tardæ, id est, temporum differentias habentes, secundum solam solutionem febricula esse potest, cui nihil stricturæ admisceatur. Aliqui hanc fieri negant. Stricturam enim effectam febriculam dicunt. Nos autem manifeste hanc fieri probamus, cum plerisque cardiacos nihil stricturæ patientes febre ostendimus, atque hos solis constrictorij releuamus. Quomodo complexam intelligis? Ex accessionibus & dimissionibus eiusdem febriculæ. Si enim sese cum cæteris in stricturam extulerit, aut tranquillauerit, eidem adscribenda erit passio, uel eius contrariæ, atque communis utriusque. Quomodo apprehendimus febricitantem in sudorem criticum aduenisse? Ex pulsu magno, celeri, totiusque corporis superficie uaporatione, cum pruritu cutis, & quodâ tactu in similitudine rigoris per totum corpus. De hinc ab ipsis poris ueluti humectatione, & laxatione tanquam mox ex lauacro uenientium. Aut sicut in continuationibus febrium frigus membra pertractans irruerit.

De typicis febribus. Cap. VIII.

O mnes typicæ febres siue strictæ sint, siue solutæ, siue permixtæ, quandiu sunt in frigore in principio non possunt dignosci ex uenarum pulsu, & ex compressione manus. Sed ex linteis calidis patientes cooperiantur donec rigores leniantur, at ubi coeperint increscere, paulatim amouenda sunt. Operimentum, donec sudoris tempus adueniat. Sed tamē de typicis minus laborandum est, quarum etiam natura adiutorium nobis com facit. In hemitritæis causa grauis est. In quibus & subtilitas ciborum & tempora cauenda sunt. In sinochis autem quoniam iugitas febrium est, minime latet quanta sit perturbatio, placet nobis ita ab eis uexatos primo mane curari, & cibari

cibari & semper calidam potare. Neutrum tamen ante declinationem. Nam quicquid ante hoc tempus fuerit appositum, perturbatis corporibus in stomacho accescit, ac propter hoc infirmitatis fit non corporis cibus. Quibus stalticum, ut est frigida unctio olei rosei atque calasticum ut est olei uiridis, aut dulcis recentis, pro ut necessitas communis iusserit, admoendum est.

De cognoscendis febrium causis, Cap. IX.

Sollicite considerandum nunc, & etiam illud sciendum est, quod saepius diximus, mox a principio causas cognoscendas, & origines, & species, & genera ut sciamus quae sunt generales, quae speciales, & quae uerae, quae non uerae, & quae typicae, & quae non typicae, & quae acutae, & quae prolixae, & quae simplices, & quae duplices, sibi an alijs geminatae, & harum quaeque quomodo accedant, aut quomodo recedant, qualiter moveantur, aut qualiter declinent, etiam quibus horis diei, uel noctis, & quod horas paroxysmus, id est, commotio teneat, quod ue anesis id est, declinatio, quid ue significet, aut quo aegrum ducat. Quamuis ex his multa dicta sunt, considerandum est illud, uirtus aegrotantis, impetus aegritudinis, qualitas & quantitas, ex hoc enim uitae mortisque iudicia cognosces. Maxime ex pulsu & consideratione urinae genus febris considerare poteris, si fueris lectionis usu perdoctus assidue. Nec non & ex alijs signis quae noster Hippocrates in prognosticis probat, & futura antepraedicat. Indicant enim tibi, & quasi tacita loquuntur. Hoc est aegrotantis color, oculi uultus, uox rauca, taciturnitas, habitudo corporis, quae omnia diligenter considerata sunt in aegrotato, ut sciamus manifeste quid teneamus, uel quid fugere debeamus, ne forte haec ignorantes aut aegrotos laedamus, aut nosmetipsos deludamus. Nec non illud moneo, ut consideres in omnibus aegritudinibus regionum qualitatem, locorum quae positionem, aut aerum temperantiam, temporum rationem, aetatem & consuetudinem aegrotantis, naturam corporis, uirtutesque, uigorém animi, causas & origines. Item animi aut corporis uitio nata sit aegritudo an extrinsecus uenit ex cibo uel potu, an ex corrupto aere erit. Cum haec considerata ratione & perpensata bene cognoueris, optime scies quid facere ad haec conuenit. Nam si causam ignoras, quomodo curas? Si enim nescies an periculosa an sine periculo sit causa, quid nisi temere facis? Quicquid feceris nescis si sanas: an potius occidas. Vnde fit, ut si quis curatus a te euaserit aeger, non tui muneris, sed fortunae sit. Proinde doctorum est nosse, providere, & intelligere causas & quid ex his futurum est praedicere,

& anticipare quae periculosa sunt congruis beneficijs medicinae, quamuis saepe uincantur beneficia, etiam cum bene offerantur, quia mala fortiora sunt bonis, quia humorum impetus fortior est. Tunc maxime uincuntur beneficia a malo, cum non in tempore suo offerantur, quia mala fortiora sunt bonis aut natura a malo fatigata beneficia non sentit. Aut quantitas boni maliue ignoratur id est, quantum offerendum sit bonum iuxta modum mali. Vnde fit ut non omnibus possit mederi medicina nec semper auxiliari, quia rarorum est intelligere causarum qualitatem, id est quanta est nunc, & qualis & quanta futura sit causa, uel quo tempore factura sit statum, uel qualem habitura erit, id est, digestionem uel iudicium. Nata enim causa mouetur, crescit, uenit ad statum, & stat pugnat physis cum causa, id est, natura resistit aegritudini, & spectatur quod uincat. Succurre medicina laboranti, naturae fer opem uince aegritudinem, libera periclitantem. Vtique fit crisis tempore suo, hoc est necessario: cum sit quo aegrotatur naturae periclitanti obtruleris. Sic ergo subuenis medicina. Si uero auxilium medicinae apte adhibueris naturam iuueris, & ex malo bonum faciens liberabis aegrotum. Aliter uero si feceris, & non in tempore competentem bene medeberis, hostis malus naturae eris & bonum malum feceris, aegritudinem nutris, naturam deijcies, aegrum occides. Si in paroxismo, uel in ipso statu causae ignorando tempore aegrum facias potum, uel escam accipere, aut incongrua curatione & non licito tempore cures, natura duplici in bello erit, & laborans. Nec sufficit hostem pugnando vincere, dum festinatam escam importune sibi ingestam coquendo non ualet digerere. Vnde sunt omnia diligenter perspicienda, & prauius & cognitis causis his, suis curis, suisque temporibus uersa esse curanda scito.

De cognitione ceticorum dierum in febribus, Cap. X.

Si uero ceticum diem futurum senseris, & prauidaris fluxum sanguinis ex naribus, aut certe uomitum, uel urinae, uel uentris copiam aut sudoris manifestum remedium, ne sollicitus aliquam adhibeas cum haec signa futura sunt curationem, quia non symptoma erit hoc, sed utile & salubre signum, & futurae sanitatis indicium. Nam quoties natura corporis ad crisin se praeparat, perturbat insolito more aegrotum & totum grauius fatigat corpus. Et cum ex naribus per fluxum sanguinis, & per uomitum futura est crisis, capitis antecedit dolor. Quae res multas hoc ignorantes perturbat & desperare facit, quia relaxatur & perturbatur corpus appropinquat.

pinquante crisi, & ideo ante omnia diligenter cognoscendum est nobis quæ sit febris, uel cuius generis, cuiusque speciei, uel qualiscunque uirtutis, quotumque diem habet, & an sit calida satis, atque acuta, uel æstuosa, quia hæc talis febris amat. crisin. facere per meatum, id est, aut per fluxum de naribus, aut per uomitam, & uentris, urinæque nimium obsequium & non diu permanere, aut certe persudorem, sicut mollis febris, & sine impetu facere solet. Quæ etiam ægrotantibus diu apostema facit. Attendendum etiam si ipsa febris est sine periculo, & si bona crisis speratur, etiam in ægitudinibus periculosis uidentum est. Considerandum est & tempus totius ægitudinis & aduertendum ualde etiam quale principium sit, qualeque augmentum fecerit, & ex hoc statum & futuram declinationem tunc poteris intelligere, & prædicare salutis periculiue imminencia. Nam in principio, aut in augmento si urinæ multæ fiant, uel uentris obsequia, uel nimius sputus, & uomica, aut fluxus narium, non bona speranda est crisis futura, neque sine periculo, qui ista signa si in tempore suo & in statu fiant, tunc prospera sunt, & utilia crisis indicia. Nam cum futura est crisis, subito ante diem quo fieri debet, uel ante noctem æger incipit se grauius habere, & uehementius angustias patitur, usque ad desperationem, & cum uideris fieri id, inquire quotum diem æger habet ex quo cœpit ægrotare, & inuenies creticum diem, sicut in alio loco tractauimus. Quia si septimus dies erit, nihil est uerendum. Si uero sextus, grauissime fatigat, frequenter etiam nec crisin, uel nō sine periculo facit. Si ergo ex hoc & reliquorum dierum contēplaberis naturam & signa quæ solent suo tempore procedere, & futuram crisin nunciare, quæ si mox in principio ægitudinis fieri uideantur, non signa crisis, sed symptomata ægitudinis sunt, id est, capitis dolor, fluxus narium, uomica impetus, urinæ uentrisque nimietas, sudoris solutio, & alia quæque talia. Et ne terrearis si ante creticum diem æger dicat subito sibi colicū, uel uerticem dolere, & præcordia tensiora, uel calidiora habere, & dispnia ei sit, id est, constrictio, & difficultas anhelitus, quasi constrictum & angustum habet thoracem, & si super his omnibus turbati subito pulsus cadit in paruitatem, nec ualde tamen imbecilles fiunt, crisin sperato ex his omnibus signis iam appropinquare, & magis iam adesse si ipsi pulsus erigantur altius, & uirtutem cito accipiant. Vetricem enim naturam nunciant. Attende mox uultum ægri & si aliquam eius particulam uideris in uultu salientem, uel si pulsauerint uenæ temporum, aut genæ, aut oculi ru-

buerint, magis manifestam futuram crisin scito, & si silent inuiti, aut eis uolentibus fluunt lachrymæ, aut si quasi circulos, uel si quid simile aliud ante oculos uersari sibi uiderint, & si manus ferunt digitosque ad nares frequenter fricantes uel scalpentes quasi pruriant eis, tunc iam non sperabis, sed mox fieri crisin uidebis fluendo de naribus sanguinem, quia solent frequenter hi tales alienari, & non sane loqui, & quasi excutere se & subleuare, ne terrearis, & ne metuas super hoc quia hæc talia signa sunt bilium ex inferioribus locis ad superiora repentium. Hoc quidem ad cognoscendam crisin sufficiat dixisse. Sed considerandum in his, atque animaduertendum, ut ætatem ægrotantis, & naturam corporis eius attendamus, in quo futura crisis speratur, & ipsam ægitudinem temporis aerisque rationem, quia si iuuenis erit qui ægrotat, & calidus natura, & abundans sanguinis, magis in his talibus per fluxum narium futuram crisin speramus. Inquirendum etiam ilico est, ut si sano atque ægro ipsi est consuetudo per nares fluere sanguinem, aut si tempus æstiuum est, uel aer calidus, & id considerandum quod maneat, ex hoc fluxu sanguinis fieri crisin ægitudinis scito, & si ipsa ægritudo pectoris generis sit, & si solitæ purgationes restrictæ cessauerint, omnia (ut diximus) obseruando, & animaduertendo poteris prænoscere, & prædicere, & scire quæ ubi sunt capiendæ, atque curandæ, fugiendæ uel abnegandæ, atque frequenter sunt faciendæ.

De creticis diebus. Cap. XI.

Oportet etiam de creticis diebus non silere, quia hoc maxime memoriæ commendandum est, ut cognitis creticis diebus possis congrua beneficia offerre, quia si non suo tempore adiutoria adhibeantur, lædunt potius quam inueniunt. Vnde necesse est ualde creticorum dierum cognitionem optime nosse medicos, ad cognoscendam febrium rationem, & eius qui ægrotat an ad salutem, an ad periculum, ut possimus ex hoc dicere quod futurum est. Ideoque inquirendus primus dies est manifeste, quo cœpit quis ægrotare ita & si non iacuit in lectulo, sed ex quo sensit sibi ægitudinem fuisse exortam, ut certum numerum sciens medicus, uerum creticum sciat inuenire diem, siue arcium, siue quem diximus perysson. Quia hæc duæ species crisis, arcis, & perysson dicuntur. Nam arcij sunt pares numero dies, ut 2. 4. cæteri similiter pares dies ut sex, perysson uero impares, ut 1. 3. 5. 7. & cæteri impares dies eodem modo. Quia si hoc bene cognoueris, sicut in sequenti etiam manifestabo & ordinabo, & si

& si qualitates creticorum dierum inueneris attendas, & scias qualiter futura sit crisis. Nam melior est ad crislum faciendam perysso numerus dierum, quam arcis. Amat enim sapius arcis, id est, creticus superscriptus pari numero factus dierum recidiuare, atque commouere easdem ægitudines quod perysso facere non potest. Sciendum ergo est ante omnia commotionis infirmi primum manifestum diem ut diximus. Ex hoc enim, ut uetères dixerunt, uisibiles, & cretici diei inueniētes rationes, quæ faciant scire an bona sit futura, an mala crisis, & si in cretico die symptoma, id est, accidens natum fuerit, & ipsum præuidentium diligenter quale est, quia neque maius neque minus ægitudine esse debet, sed congruens ægitudinis generi, & quantitati, & qualitati, & aurti, & in ipso cretico die adueniente symptomate, si sit utiliter, & congrue, soluit ægitudinem. Nam si ante tempus creticum innatum fuerit, id est, sudor, & cætera quæque talia quæ crislum faciunt, iam non crislum, sed in macronoxiam significat pergere ægitudinem. Nam quodquod mediocriter in ipsis creticis diebus uersantur, nullo cretico symptomate præsentente uel innato, hi difficile euadunt: ut Hippocrates dicit: Illi uero qui non, creticis diebus cretica symptomata patiuntur uidentur ad horam esse liberati, sed postmodum recidiunt, & uix euadunt non sine periculo. Sed si in arcis diebus paroxysmos fieri uideas non bonum scito futurum, si in ipsis creticis diebus commoueantur, & multo peius si in his crisis fiat, uel symptomata aliqua importunius accedant. Quia ualde graue erit, ut ea quæ solent prodesse atque inuare, & suo loco uel tempore uenire ad utilitatem ægri, si incongrue contingant, aut non suo tempore. Nam melius est si ante creticum diem nox, aut dies præcedens grauior fiat. Quod quidem ex urinis & pulsu poteris cognoscere, si diligenter attendas, & consideres, & alijs signis ab Hippocrate dictis in prognosticis. Ergo creticorum dierum (quos diximus) exordium facimus ab arcio. Arcij uero dies sunt in quibus periodica febris faciunt crislum in 4. & 6. 10. & 14. & 24. & 40. & 60. & octogesimo, & centesimo. Sed sciendum est ex his diebus qui bonam faciunt crislum aut malam. Vnde quantum diem firmum utilemque ad faciendam crislum & frequenter dicimus. Sextum uero rarum atque infirmum recidiuum, quia nec ualde congruus est ad faciendam crislum, & raro inuenitur in periodica ut uideatur creticus, quia neque ab Hippocrate est confirmatus præter in una tantum, id est, non febriente lyenterico. Similiter decimum diem Hippocrates omnium peritissimus in uno tan-

tum inuenit creticum diem, & ideo etiam ipsum incertum obseruamus. Quartumdecimum diem firmum frequenter accepimus ad faciendam crislum. Vicesimum autem diem iuxta Hippocratem non arcium, sed perysso recepimus. Sexta tetraestis, id est, quarta de sexto. Tertia enim hebdomada in hoc extat & transcendit, & ideo firmum congruumque obseruemus. Similiter etiam uicesimum quartum, & tricesimum quartum, & quadragesimum quartum, & sexagesimum, & octogesium, & centesium, firmos & creticos scito. Sunt etiam cretici dies, quos diximus perysso, id est, septimus, aut nonus, aut undecimus, aut septimusdecimus, aut uicesimusprimus, aut uicesimusseptimus. Sed non tam creticus & firmus, ex his uicesimusprimus, quam cæteri. Amat enim recidiuare in 21. die facta crisis. In alijs firma causa & stabilis est & frequens, in illo tantum rara & instabilis. Typicarum febrium, id est, periodicarum expleuimus creticorum dierum rationem.

De creticis diebus acutarum febrium.

Cap. XII.

Nunc de illis creticis diebus dicamus qui in acutis febribus attenduntur. Vnde oportet ex his creticis diebus, quos diximus arcios & perysso præuidere, atque inuenire acutarum febrium manifestissimos dies creticos, & certos, & firmos, ut Hippocrates dixit ad docuit sic: Acute febres in 14. die faciunt crislum, non sic intelligendum scito, ut quidam putant in 14. die omnino acutas posse solui febres, sed in 14. die, qui usque in quadragesimum protenditur. Est enim uerus creticus dies in acutis febribus 3. & 4. & 7. & 9. & 11. & 14. & 17. & 20. & 24. & 27. & 30. & 34. & 37. & 40. Præter enim hos dies facta crisis in acutis febribus recidiuam pro certo significat ægitudinem, & non sine periculo. Si uero aliquis nos interroget, quomodo arcij & peryssi dies possint esse cretici communiter? respondebimus sic: Arcios & perysso dies communiter creticos esse in periodicis duntaxat febribus iuxta suam rationem ut supradiximus, perysso autem proprie in acutis febribus tantum facit crislum, dicente Hippocrate: Febres acute quæ in arcis diebus faciunt crislum recidiui uexantur febribus. Quæ uero in perysso, manent firmæ ad salutem. Sane ipse uoluit nos obseruare sic: Vicesimum creticum dixit esse diem, quia unus dies medius qui communiter crescit, ad perysso numerum magis pertinet, ut permaneat simul eius dogma. Et ideo relinquens septimum diem ab octauo rursus incipit numerare. Obseruauit autem maxime

Hippocrates ista duo in his symptomata, uicesimo primo die fit firmissime crisis si fiat cum frigore, ut in alijs creticis diebus. Vicefimo autem die sola crisis facta, cum frigore reciduiam manifestissime significat, febrem, & aliam sperandam crism, talemq; finem quale residuæ principium uidimus. Hæc ergo est ratio atq; obseruatio de creticis diebus febrium, siue periodicarum, siue acutarum.

De distantia creticorum. Cap. XIII.

Quanquam multa de creticis dixerimus diebus, tamen placuit exponere quid in utrisque dissimile sit. Nam cretici ueri sunt perysi dies, ubi iam adest, sine dubio febris solutio, cretici ueri non sunt arcii dies, ubi dubium aliquid speratur. Deinde & hoc præmittendum non fuit in notitia humani corporis dicere quemadmodum dies cretici debeant computari, & ideo ordinandum credidi diligenter, ut in hoc numero horarum quidem accedentium, aut minuentium non fallaris incerta ratione, quia dies unus cum nocte sua 24. horas habet. Vnde si unusquisque hora tertia utputa tangatur, uideatur ipsius diei tres horas perdidisse. Sed non peccant, quia cum cœperis computare, largiris eis ex nocte horas tertias quibus per diem minustactus est, ut possis 12. horis completis computare plenissime. Simili modo uersa uice si nocte sit computata, ut si quinta hora noctis tactus est quisquam, quinque etiam diei horas nocti largiaris. Ad hanc rationem omnium ægritudinum noctes & dies, ut non dierum magis numerum, aut noctium quam horarum secundum numerum constitutum computes, ut puta sicut in triduum unumquemque discuti posse monstrabimus, quia unus dies & nox 24. horas habet. Computa ergo ex hora qua cecidit in ægritudinem typum horarum 72. ut tridui compleas numerum pro dimissione horarum. Tunc enim cum bene computaueris, dies & horas discussionis poteris prænunciare. Similiter enim & si amplioris numeri dies cretici sunt, computandi sunt ut superius demonstrauimus. Supputare debemus ueram discussionem aut periculi horam, ut reciduiarum febrium possis rationes inuenire.

De febrium speciebus. Cap. XLIII.

Febrium igitur species discernere nemo potest, & uelut ipsarum præuidere, quæ harum curabiles, & quæ incurabiles sint, uel quæ breui solui possunt, & sine periculo, & unde nascantur, & in quibus ætatibus, & in quo tem-

pore sint, nisi fuerit intentus usu doctissimorum lectionibus. Ephemeræ uero, id est, simplices febres scito nasci, aut ex calore aeris subito & spisso, & nimio, & in consuetudo, aut ex frigore, aut ex mœrore, aut ex gaudio nimio, aut ex sollicitudine, aut ex cogitatione, uel timore, uel amore, aut dolore, aut ex iracundia, aut ex indigestione ciborum, uel ex nimietate uini seu potionis, uel uigilijs multis, ex labore ingenti, & insolito, aut ex nimio dolore cum sine uulnere aliquo sit, aut ex alia huiusmodi occasione sit. Hæc febres in omnibus ætatibus, & in omnibus temporibus fieri solent, quæ tamen ex proprijs signis discerni & cognosci possunt. Harum enim febrium pulsus simplices sunt, & non ualde inæquales, aut sordidi, aut difficiles, aut duri. Urinæ etiam non longe à sanitate distantes, nec calor grauior, aut acer inuenitur, sicut in alijs febribus inuenitur. Post commotionem & impetus paroxysmi primi, id est, primæ commotionis impetus in pulsu uenarum, & ætate non sinceræ. In ephemeris uero febribus, id est, simplicibus nihil tale cessante paroxysmo primo, id est, primæ commotione inuenitur, sed omni impetu, sedato, cuncta proficiunt ad meliora. Plurimis etiam eorum quasi humor corporis calidus cum uapore, aliquibus sudor mox in principio utiliter apparet. Dolor etiam capitis si fuerit in principio mox cessat & omnino recedit ante diatrium primum, quod in alijs febribus non fit, & ipsas quidem qui febricitant, & tolerantia, manifestat genus & indicium febris. In his etiam ualida, in alijs uero mox imbecilla innentur uirtus, & cum balneis lauamus ephemeris, nullus horror, uel frigus corporis in solio, uel in ipso balnei ære sentitur, ut in alijs febribus fieri solet. Sed si animi ægritudo febrem commouerit corporis, id est, tristitia, aut cupiditas, pulsus perlassus, & tenuis inuenitur, mox in principio, ut multis temporibus potes eum ægrotasse ex longinqua ægritudine. Urina sicut in cæteris rubra est, sed in his rufior, & acrior, & modica, & non tam frequens sicut in cæteris, e contrario uero sitim patiuntur, qui ex commotione uel ira animi februnt. Nam his qui ex tristitia ægrotant, uel cupiditate desiderij, exilitas corporis, & oculorum dimensio & pallor in facie euidenter apparet, hæc cogitatio diurna & sollicitudo continua facere solent, etiam uigiliæ cōtinuæ pati ista solent, sed uultus subrimidus in illis non est. Nam graues luminum palpebræ peragitantibus inueniuntur, & quasi humidæ & uix oculos leuare possunt. Nam tristitium & cogitantium sicca & mœsta cernuntur lumina. Concaui uero oculi commune prope omnium indi-

indiciū est, id est, mœrentium, uigilantium, cogitantium, sed non iracundiæ indicium. Nā huic nec pallor accidit, nec concaui efficiuntur. Sed calor ardentior & amplior de profundo pectoris ex ire modis procedere ostenditur, & magnitudo, & immanitas pulsus, non minuitur, atque desijdet, sicut his qui ex tristitijs uel uigilijs uel cogitationibus laborant. Ex hoc ergo indicio iratum uel indignatum ab his discernere poteris, & illos a se inuicem ex suis signis ut diximus. Qui uero ex labore aliquo fracti fessique februnt, cutis corporis eorum magis tenrior & siccior, quam in alijs ephemeris febribus inuenitur. Aliquibus autem persequens siccitas usque ad paragma, id est, usque ad statum iam declinantis temporis. Fitque illis maxime siccitas qui plus quam fert physis laborando deficiunt & infinitum laborem sustinentes perfecerunt. Etenim in his pulsus minor & lassior inuenitur. In his autem qui minori labore lassati februnt uastior & maior est. Ita ergo & hos qui de maiori labore, & minori ægrotant, uisu discernere poteris, utriusque urinae croceæ uel rubeæ sunt, sed magis turbulentiores horum qui maioribus plus laboribus lassati sunt. At uero hi qui constrictione uel densitate & tensione cutis februnt, ita habitudine corporis sui sentiunt, qualiter illi qui aluminosis lauerint se aquis, contracta exiccataque cute stringi omne corpus sentiunt, & quasi contrahi. Hi soli ex omnibus febribus constrictionis causa laborant. Hi stynosis, id est, constrictionem patiuntur, quos quidem & visu & tactu facile cognoscimus, sicuti & illos qui nimio labore siccitati ægrotant. Si in his feruentior motus caloris est, & primo ictu pulsus mitior sentitur, acrior uero procedenti tempore fit, & difficiliora ventris atque urinae obsequia sequuntur. Urinae non penitus rubeæ, nec habitudo corporis minuitur, neque oculi in his concaui ac sicci videntur, sed magis quibusdam horum eminent foris, neque pulsus venarum in his minuitur atque pusillus, sicut in his qui mœroribus, uel curis aut solitudine aliqua, aut uigilijs, aut laboribus, aut exercitatione nimia exagitati ægrotant. Illis uero qui ex causa inguinum laborant ephemeris, id est, simplicibus febribus, pulsus fit magnus & grandis ictu atque uelox & spissus, & calor vehementior & plurimus & post temporis statum mox ex profundo emergit calor uel humor quidam sudoris non multus, & calidus, & delectabilis, & vultus in his rubeus conspicitur, & maiore habitudine, & urina eorum subalbida. Sed magis commune est omnibus ephemeris febribus, id est, simplicibus æquales pulsus habere. In paucis autem harum febrium inueniuntur inæquales sordetes uel asperi, non in uno tactu ictum habentes.

Talis itaque est cognitio in ephemeris febribus, id est, simplicibus & diuersitas generis harum.

Cura.

Cura eorum facilis est ijs qui eas aduertunt & certissime intelligere possunt. Nam qui eas pro certo cognoscere non possunt, difficiliores & periculosæ efficiuntur, si ab ignorantibus curantur quia grauiores omnibus fiunt, & in macronoxiam veniunt. Vnde consideratis & illis duntaxat signis, quæ in cunctis febribus, id est, habitudo corporis, color, oculus, vultus, mens, animus, anhelitus, aspiratio, loquela, lingua, manus, aures, frons, cutis, schema iacentis, motus iactatio uel quies & silentium, patientia languentis, obsequia ventris atque vesicæ facilia, & difficilia, & ipsa vniuscuiusque physis, id est, domina corporis natura, si calida uel frigida, sicca uel humida sit, & in quibus maxime delectabatur rebus in sanitate, sic facilius curabitur, contrariæ contrarijs curantur. Nam si ex calore nimio feruentis aeris (ut diximus) natam febrem intellexeris, frigidis medeberis beneficijs. Si uero ex frigore, calidis, si ex sollicitudine & cogitatione, securitate & consolatione uerborum consolaberis, & amputabis. Si uero ex furore, uel ira, blandis & mollibus affatibus placabis. Si ex amore, aut ex concupiscentia, promissione sedabis. Si ex mœrore, gaudia vincet. Sicut ea mœror exuperat, & famem elca & sitim potus & laborem requies, & indigestionem abstinentia, concupiscentiam uirtus sapientiae sedat. Ergo postquam cognoueris ephemeram febrem non expectabis ut in ceteris febribus diuturnum primum, uel secundum uel triduum ad cognitionem febrium, sed mox securus lauacro balnei & cibo reficis, quia in his febribus ægrotantes si abstineant a lauacro uel cibo, peiorant. Est enim in his tantum febribus usus balneorum utilis, alijs uero contrarius, & inimicus, præter tertianas. Sed quia alijs horum qui ephemeram ægrotant, diutius in aere balnei morari conuenit quam in folio, alijs magis in folio quam in aere, discernenda est inter hos ratio diligenter, ne forte, quia (ut diximus) utiliter omnibus his ad recuperandam sanitatem usus balnei conuenire, non intuendo quibus & qualiter sit adhibendum, hoc ipsum incongrue adhibendo, noceamus. Non enim leuis res est, aut sine periculo febricentem uti balneo, & hoc ad haberi mox in principio, sane cum non manifeste cognoueris genus febrium. Illis itaque qui ex inguinum indignatione februnt sine vulnere, nec non etiam illis qui constrictione & cutis duritia laborare videntur, diutius in aere balnei quam in folio esse conuenit. Cæteros uero omnes memoratos in folio magis quam in aere quam diu uoluerint uel potuerint continere, etiam si natate in ipsa aqua uoluerint, dabis

dabis potestatem, imò ut reficiant hortaberis. Quos omnes ingredientes tepido & plurimo oleo mollibus & planis manibus sufficienter perunges. Plurimum eos qui ex labore aliquo feбриunt, & eos qui ex constrictione, uel duritia cutis, & eos qui ex inguinum indignatione feбриunt debere sæpius eos & diutius lauacro uti, & maxime scito, cibo refici plurimo & frequenti, qui digestioni sufficiat. Eos qui ex labore aliquo feбриunt, etiam uiuo reficies sufficienti. Non tamen illos utile est ita cibari ut istos qui ex constrictione cutis uel inguinum indignatione feбриunt. Sed utriusque his subtilis & pertenuis conuenit, adescatio, & refectio ciborum, abstinendos à uino autem maxime illos scito, qui ex indignatione inguinum feбриunt tandiu quandiu inguinum indignatio sedetur. Attendenda uero in his est ut in cæteris omnibus uirtus animi eius & ætas & habitudo corporis, etiam februm genus & species & physis eius qui ægrotat & consuetudo, & tempus & regio, & situs locorum, & cætera quæque talia. Horum uero qui ex constrictione febricitant, illos quidem qui leuius & minus patiuntur minimeque plethorici sunt, scito non penitus prohibendos esse à uino. Qui autem amplius id patiuntur, & manifeste plethorici sunt, omnino abstinendos esse à uino. Eos uero qui insomnia & uigilia, uel etiam animi causa uel passione feбриunt, cum laueris, humidis & succosis cibis refice non duris & corporatis, uel digestioni contrariis, uisum tenue & album, & maxime illis qui non dormiunt indubitanter dabis, si tamē capitis non patiuntur dolorem, uel temporum pulsus nō erit, quod quidem in alijs omnibus censeo obseruandum. Sed neque eos qui ex ira, uel furore, uel ex solitudine, aut nimia cogitatione feбриunt, à uino abstinendos scito. Sed & illos qui ex furore aliquo ægrotant, tam diu à uino abstinendos esse noueris quàm diu penitus furor sedetur. Si uero ex uulnere aliquo, uel pustula calidus feror inguinum indignatione commouerit, & ex hoc causa fuerit orta, sanato prius uulnera uel pustulā mox etiam febris calorque sedabitur. Sic ergo origines causarum cognitæ amputaueris, nec causam amplius inuenies quæ opprimat hominē, sed maxime ad pristinam redibit sanitatem. Tu ergo si sapientia præuidere, atq; mente cognoscere sategeris, omnia manifesto consilio uindiq; quæ facta sunt, & quæ futura sunt, & quæ sint, id est, præterita, præsentia & futura cognoscas. Hæc cum præuideris, scies quæ fugienda sunt, & quæ amplectenda sunt, nec causam ignorare poteris, nec incongrue curando in peius protrahere ægrotantem ut multi faciunt indocti, causarum originem ignorando.

De acutis febribus, uel sinochis. Cap. xv.

Nunc uero incipiamus dicere de acutis febribus, & periculosis sinochis, id est, quæ non faciunt anesim, id est, declinationem induciant, sed in uno eodemque motu perseverant, aut in peius crescendo non desinunt ante cruentum diem, id est, ante tres, aut 4. aut 5. aut 7. aut 9. aut 11. aut 14. aut satis 17. quia difficile est, ut ad 19. aut ad 20. diem peruenientes isti crismus non faciant, aut uitæ, aut mortis. Aut enim in istis taliter febricitantibus, aut uincit, aut uincitur pugnando physis, & maxime in istis febribus sinochis, id est, tam acutis & asperis artifices medici probantur, peritus autem medicus congruis medicinæ armatus beneficiis succurrat, & auxilietur antequam labatur & vincatur perpetuis febribus repugnando natura. Sinochum ergo sic cognoscas, primum quidem in 24. horis diei & noctis non facit anesim, id est, non declinat, nec desinit, sed in eodem motu permanet, aut magis acrior inuenitur, & si inaequalem, aut turbulentum fecerit augmentum, scito longinquiorē esse futuram febrem, & non sine periculo.

Cura.

Sinochis autem medeberis sic: Est præuidendum augmentum, & status febris ipsius non longe à 7. die, sed circa ipsum nec tardiores futurum. Et si uirtutem egrotantium uideris ualidam atque sufficientem contra vigorem ualitudinis ad statum, nec non etiam ætatem idoneam, quæ possit sufferre impetum huius febris & uehementiam, hos tenui atque exili diætā mox à principio curandos obseruandosque scito. Illos uero quibus longinquior à 7. die status, id est, post febres futurus, & uirtutes minus sufficientes erunt, mox à principio ægritudinis usque quo statum febris incipiat facere, largiori eos & impensiori diætā curandos obseruabis. Prope autem ipsum tempus quo statum futurum febris uideris, abstineto à cibo, & pariori atque tenui diætā hos curabis. Iam itaque in ipso statu positos magis abstinere per parum atque exilem, & permodicam ualde diætā offerendo iunabis. Deinde transactō iam statu, & fracto uigore febris, reficies atque resumes ægrum paulatim addendo impensiores diætā & longiorem. Sed quoniam anesim, id est, requiem hoc genus febris non habet, ideo tempus reficiendi eos optimum eligimus horā prandij, quæ sani soliti sunt capere escam. Quæ uis ante lucanum, id est, ante matutinum aliqui elegerunt tempus. Sanguinis in his detractio fit pro magnitudine febris, & maxime illis conuenit qui rubore sanguineo plus naturali & solito rubent, & quasi suffectum sanguinem, id est, plenum & tensum corpus habere videntur, uel etiam

uenas impletas & tenfas. His profecto talibus auferendus est sanguis, si neque uirtus, neque ætas, neque alia (ut supra diximus) causa prohibeat. Ex quia liquidæ atque fluentes diætæ omnibus acutis febribus cōgruunt, & remedio sunt, recte ab Hippocrate olim dictum scimus, succum pitisanæ bene coctum illis quibus non æcerat in stomacho, aut cholera generat, uel fastidium facit, offerimus & succū alicæ simili modo, & panem optime coctum per tenuem ex aqua calidissima damus, & alia quæque talia quæ sunt facile digerenda, & non contraria laboranti naturæ. Illos uero qui causon, id est, nimio igne laborant, & acerrimo igne iactantur, quibus os siccum, & lingua arida & aspera est, oculi igne pleni, & quasi ardentes sentiuntur, mor ut primū uideris signa digestionis, id est, statum temporis, uel uigoris, frigidam aquam da bibendum securus, & modum bibendi æstima bis, & metieris, considerans tempus, ætatem, naturam, consuetudinem. Talis itaque sit cura sinochorum uel causon, id est, acutissima febriu, eis quæ sine symptomate, id est, sine accidentiis febrium extrinsecus scilicet capitis, uel stomachi dolore, uigiliis, singultatione, & alijs quoque talibus.

De tribus speciebus sinochi. Cap. XVI.

T Res sunt sinochorum species. Homothenus, agmasticus, epagmasticus. Quorum ab homotheno exordium facimus, qui omnium periculosior est & maior. Cui quidem nisi fuerit cito arte succursus, sunt grauiores febres, & sordidi pulsus, & geminata ægritudo, quam sic cognosces. In initio huius febris spissi pulsus, grauiorēs & sordidi inueniuntur, lingua siccior, sitis acerrima, lipothomia non deest, id est, malefactio & animi angustia. Cui quidem declinatio nulla poterit inueniri usque in 5. uel 7. diem quem in uno diatrīto poteris recognoscere. Cumque recognoueris auxilio saluari succurrere, sicut in sequenti diligenter est ordinatum.

De Homotheni cura. Cap. XVII.

Prima die usque in tertiam cum homotheni signa intellexeris, id est, ut nullam habeat declinationem intra 4. diem, id est, in primo, aut 2. aut in 3. phlebotomandus est, si uel eius ætas, uel fortitudo permiserit. Si autem ætate breuior, aut senior sit, aut ex ipsa febre exagitatus defectior inuenitur, phlebotomum non adhibebis. Quorum ætates & causas in phlebotomo nosse conuenit, ut à 18. anno, uel 20. usque 40. si talis ætas fuerit reperia, phlebotomandi sunt. Si uero plenioris fuerit corporis,

uel sanguinis abundantiam dum sanus fuerit habuisse cognoueris, aut genere suo habuit qui sanguine abundauerit etiam à 16. anno usque in 45. annum eos poteris phlebotomare. Cui si phlebotomo adhibito, declinationes fuerint, nihil adhibebis. Si uero declinatio non erit, post triduum explicito phlebotomo 4. die talia adiutoria adhibebis, si tamen fortis fuerit. Nam & ad balneum deducendus est æger, cui solum paranscum abundantissimo oleo, ut embrocas facias, quod solum tepidissimum esse debet. Aer quoque similiter procurandus est, quem cum ibi miseris usque ad guttur descendat, & tandiu manibus totum corpus fouere debes, quam diu ipse poterit ferre. Quem cum eieceris de balneo, diligentius inuoluis, ne frigus sentiat. Quod si fortior non fuerit, ut balneorum usus sustinere possit simili modo sicut in balneo demonstrauimus, in cubiculo calido uirgis adhibitis, uel ex tegmine in lecto laxius restricto uelut balneum facis, & ibi eum ex eadē embroca diuissime fones, quandiu tolerare poterit, & cum foueris diligentius cum sabanis calidis extergis, ut frigus non sentiat, quem cum reficere delectaueris, reficiet ouis forbitibus, & succis pitisanæ, uel lactucis elixis sic solutis, sine aliquo condimento, uel mistura, quæ in uisceribus (alias iuscellis) sunt, qui & si hoc minime sentit, & febris grauior fuerit, uel nulla declinatio & si in sitim exarserit, uel si recentem desiderauerit, primo ei negando cupiditatem bibendi incita, deinde aliquoties promitte, ut spe promissionis exardescat. Quæ tandiu differt, quandiu eum senseris nimia siti perurgeri, uel bibendi habere ardorem. Tunc ei uas magnum & lucidum, in quo aquæ splendor appareat, plenum recenti lymphæ offeres in tanta capacitate, ut qualiscunque fuerit sitis maxima febrientis satiari possit. Sed aqua fontanea eligenda est, & leuior, & in die cretico danda. Hos autem scias ex tantis etiam adiutoriis necessariis ad crīsim esse venturos, id est, discutionem uel salutem percipiendam.

De cognitione agmastici. Cap. XVIII.

Agmasticum, id est, secundum sinochum ita cognoscis. Ab initio grauioribus agitur febribus cui quidem per singulos dies, uel etiam horas augmenta concrescunt, hunc etiam intra diem tertium quam causam habeat cognoscere te conuenit. Si enim ad primum diatrītum uenerit iam eo reperies febres, & signa certissima, quæ quidem signa habent hæc: Cutis eorum aspera est, & asperior inuenitur, & urina rufam habent, quibus etiam uenter per singulos dies constringitur, est illis pulsus ingens & spissus, sine intermissione sordidus. Et quod grauius

gravius est per singulos dies, uel etiam horas augmentantur, quibus nec status, nec declinatio, sed tantummodo augmenta inueniuntur. Sudor nullus, qui nisi 7. die discusserit, aut non euadet aut difficilem uitam percipiet.

Cura.

Hi maxime phlebotomo curandi sunt, quos cum in diatrium recognoueris, adhibebis eis clystere austere, ut squibales relaxare possint, quod conficis sic: Mittis oleum & aquam, in qua elixata est blea, aut aquam de qua coctum est furfur triticeum & siliqua, aut lixiuum, aut aquam simplicem, cui admisceas mellis coclear. 4. & aphronitri coclear. 4. & nitri semiunciam, & salis triti coclear 1. & ex tepido clysterizas. Et postquam fuerint squibales relaxate, tempera aquam cum hydroleon calidissimo quod tolerare possint, & diligentius uapora. Vbi intingens plagellas duas sic humiditas ad stomachum impones, unam leuando, alteram ponendo, & subinde oleum calidum, aut aquam calidam mitte, & diutius uapores, & tandiu uapora, donec ei humidam linguam inueneris, aut frontem humectari. Quibus etiam potiones simplices dabis tales. Seminis apij triti coclear 2. li ga in linteolo mundo, & in aqua coques, & ex ea aqua quando potum desiderauerint dabis. Catharticum etiam molle quod choleram ru beam deponat, dabis: Recip. mastiches unc. 3. cymini asii coclearia 2. piperis grana 20. diagridij in pane cocti, scrup. x. & cum melle ueluti electuarium tempera, exinde temperatum dabis coclear 1. Quibus etiam omnibus noctibus caput fomentandum de aqua papaueris agrestis, uel hortiui uiridis, siue aridi decocti, siue cum semine, uel sine semine eius, cum caput fomentaueris obuoluendum est linteamine calido, ne infrigidet.

De epagmastici cognitione. Cap. XIX.

Epagmasticus agnoscitur sic: Ab initio grauioribus febribus pulsatur, in tantum ut quisquis eum uiderit medicus, uehementer de eius uita desperet. Secunda uero die, uel tertia declinatio inuenitur, cui etiam signa propemodum discussionis futuræ inueniuntur. Aut sudor emititur, aut sanguis de naribus fluit. Nam prima die sitim patiuntur, secunda uel tertia sitis ipsa refrigerabitur, & post minutior inuenitur. Qui si signum discussionis in tertium diem non habuerint, securus esto 5. uel 7. die crism habituros. Quos cum diligenter cognoueris, sine aliquo auxilio medicinæ sanitatem promittas. Istitis enim nihil adhibetur, quoniam adhibita talibus medela ægrotantibus contraria est.

Cura.

Oleum roseum frigidum tantummodo ca-

piti imponatur. Quibus etiam esca uetanda non est. Nam indeclinatione etiam uinum leue & aquatissimum dandum est. Quibus si aliquid adhibueris, adiutorium aut escam negaueris, facis sinochum homothenum.

De distantia inter sinochum & sinochen. Cap. XX.

Vo sunt sinochus, & sinoche. Inter sinochen, & sinochum quanquam sit apertissima similitudo, tamen inter eos ita separatur atque disiungitur intellectus. Nam sinochus non habet anclum, sed magis augmentatur. Sinoche uero dum simili ægritudine retineat caput tantum, tamen horarum, sed non plene mundarum remissionem. Nam sinochus ex sanguine & felle rufo commixtis nascitur. Sinoche uero ex fellis rufi abundantia concreatur.

De cognitione febris qua dicitur caufon. Cap. XXI.

Sinoche uero simili modo ut sinochus, aut caufon curari debent, maxime phlebotomo, si tamen ætas, aut tempus, aut fortitudo permiserit, aut si nihil aliud est contrarium occurrens prohibeat. Et si tempus & ratio in omnibus istis phlebotomiam adhiberi prohibeat, tamen pro causa faciendum, est ei cubitulum temperatum, si ætas, aut fortitudo permittat, ita ut medieras sanguinis deducatur, quam postulat causa, ut causæ sanguinem deducendo subuenias, & temporibus dum non satis deducitur, seruias. Quamquam hæc causa sinochis, neque in senibus, neque in pueris uenire poterit. Memineris aurin ipso impetu febris intra tertium diem, aut quartum phlebotomum adhiberi, quia si ceperit eam causa fatigare, non poterit adhiberi phlebotomus, ne sit contrarium. Sed si phlebotomus pro certa ratione non poterit adhiberi, dimittenda, est physis cum causa pugnare, aut certe sinochorum cura adhiberi debet. Etenim sinochus, aut caufon, & sinoche quamuis habeant dissimilitudinem, tamen simili modo curantur.

De eadem passione. Cap. XXII.

Caufon febris est denuntiata ab Hippocrate, ut in acutis febribus fiat, & in prolixioribus quartanis. Nascitur autem ex cholera nimium sicca circa subtiliores uenas, quæ in hepate sunt.

Cura.

Mederi debet phlebotomo in principio curationis, & frigida potatio & frigida adiutoria in his necessaria sunt adhibenda. Viscera autem oleo & aqua calida & unctionibus quæ humectare & refrigerare possunt, restaura. Frigidæ similiter infusiones capiti sunt applicandæ. Item febris quæ dicitur caufon, his signis cognoscitur.

cognoscitur quando sunt : Sitis est grandis, & insomnietas, & alienatio prosequitur, & surdi sunt, uel muti, tamen hæc alia signa habet, triduo antequam febris fiat, dolor capitis sentitur & in bucino aurium ipse dolor cum fortiori & tremore configitur, deinde prosequitur febris cum supradictis signis. Item cura sit ut euacuetur cholericus humor, & extinguantur, & dissoluatur. Euacuetur autem per sudorem, aut per uomitum, aut per uentris solutionem. Certissime autem extinguitur si bibant aquam multam, & nimis frigidam. Etiam hydroleon bibant, aut layacrum intrent ut sudet sed non descendant, nec diutius morentur. De escis uero nihil aliud nisi psisanam māducem, & abstineant se à uino.

De cardiacis quos diaphoreticos dicunt.

Cap. XXXIII.

Veteres hanc passionem præcipuam dixerunt. Indeque eam cardiacam dixerunt. Nam græci cardiacam dicunt cor. Verum ipsa indicat res nihil aliud esse, quam febrem acutam cum nimio sudoris fluxu per totum corpus manantis, cum paruo pulsu uenarum, quæ signa produnt cardiacos. Hæc passio plerunque ætatis tempore facile lædit. Aduenit autem in calidiora tempora, uel corpora, & iuuenes boni corporis, habitudinis, & ætatis. Præcipue hos lædunt lauacra post cibum, post cœnam uomitus, frequenter corpus in sudorem uertunt cum animi defectione. Ex hac uale tudine fiunt cardiaci 5. uel 7. dies incumbentibus febribus, & urentibus uelut flamma ignis. Ut autem cœperint esse cardiaci, refrigerant eis summitates manuum atque plantarum, plerunque usque ad cubitum, uel genua, siue etiam totum corpus. Venæ pulsus est velox, & ueluti eleuatus, paruus, rarus, inanis. At ubi cœperit crescere passio, vibrans est pulsus, atque rarus cum tremore, & formicatione, incognitus atque se subducens. Sequitur eos defectio animi, & subductio & nunquam dormiunt. Quibusdam eorum sudor nimius, & per totum corpus se diffundit, multum pinguis, & glutinosus, quem græci glytyon dicunt. Atque si eum teneat, vix producit. Post hæc grauitudo corporis, & virium, & sensus, & tremor, & debilitas, facies pallida, concaui oculi eos subsequuntur, suræ illis grauantur, ubi desinit accessio, lingua liuida inuenitur. Si quando per epiplocem laborant, uel eis ipsa passio dominatur, tincta est lingua eis, tunc frigida desiderant. At ubi cœperint passionem urgeri, tunc visus hebetatur, liuescunt eis manuum summitates, plantæq; gibberosæ fiunt, & ungues, & non in uno loco iacent, sed cum palpitatione huc atque illuc. Primum quidem

pulsus est densior, postea uero defectior. Cutis eorum corrugatur plerunq; in modum uuæ passæ. Accidentibus illis ventris solutionibus, malum signum est & aliquando plorant nulla præcedente causa. Ob quam causam oculorum pituitatem gignunt. Apparet in eorum oculis signum, quod onichior appellatur. Item auidæ conantur sæpe cibos sumere, tamen escam deuoratam non digerunt. Subinde cibis delectantur. Hæc autem omnia signa sunt mortuorum. Aliquando fastidium patiuntur. Aliquoties per infaniam, labia & linguam submordent putantes escam morderé, tunc nec potum, nec varios cibos dare debemus. Item malum signum cum post acceptum cibum & uinum, cum molestia, atque febre, & cum lassitudine corpus soluitur. Oculi rubescunt, lingua fit sicca, & aspera, præcordiorum sudor agitur, plerunque autem & sine sudore dissoluuntur. Ut autem ad melius cœperint venire, pulsus venæ apparebit. Aliquando enim auidæ sumunt cibum, & dormiunt, uelut quandam lassitudinem patiuntur. Fuit autem dissentio inter medicos, quæ pars corporis maxime in eis laboraret. Et nobis placet totum corpus in passione expeditius implicatum esse, quam scrupulose querere utrum cor in causa sit, an membranam quod cor tegit, aut stomachus, aut pulmo, uel iecur. Nō enim hæc particulariter passio curatur, sed toti corpori medicatur. Quomodo discernitur sudor ille qui februm solutionem significat, ab eo qui inuadit cardiacos? Istorum sudor satis erit calidus, in cardiacis autem sudor est frigidus, & pro amplitudine eius passionis, & paruitate naturæ paruus pulsus, atque obscurior, & densior est. Thorax eis grauatur, frequenter inspirant, neque est animus. Sunt autem ex his quibus omnia uiscera sudant calidum, pulsusq; æqualis est, atque in summa cute, venæ inspirant, bono animo sunt, atque releuationem corporis sentiunt. Quomodo separamus passionem cardiacorum a passione stomachi? Si stomachus in feruore fuerit, sequitur debilitatio, angustia, compunctio, ac dolor, & quædam duritia in præcordiis inuenitur, uel in dorso, ita ut in pressura sint post cibum. Quod si imbecilitas affiterit stomacho multum expuunt, & os humidum habent stomachi, nauſeam patiuntur, humores reiiciunt, nonnunquam & cibum sumptum, manus infrigidantur uel pedes, & plerunque recalescunt. Cardiaci uero multum sudorem sentient, neque grauantur post cibum, neque reiiciunt, rigorem summitatum manuum atque plantarum æqualem habent, sudorq; eis plerunque crassus adest, mali odoris. Eis autem qui pressura stomachi sudant, tenuis sudor oboritur, semper fit autem subductio animi, uel stomachi cum incipiat accessio fieri.

fieri. Est autem cardiaca passio defluxa, atque acuta, & ualida eo quod strictura quadam his non desit, & extensio præcordiorum & quibus est impetus.

Cura.

Hos autem curare oportet cum magna discretione, tamen genus curæ quod adhibemus sic operemur ut his adiutorijs utamur quæ expediunt. Multi autores dicunt eos incurabiles esse, sed tamen aliquando curantur sic: Iacere debent loco refrigerato, & umbrato non satis lucido ut constringantur. Tunc & flabella apponantur, & aqua subinde aspergatur, & odores boni ad nares adhibeantur, & folia uitæ, mirtæ, quercus, pini, lentisci, maligranati, & rosarum, uel his similia stramententur. Item operiantur lanis quæ non habent floccum calidum solhant corpus. Stratus non strictus, sed latus fiet, ut subinde uoluant, & deinde fricare debemus pedes, ac plantas, quæ frigidæ sunt. Non debent aliquod tædiosum cogitare, in ipso impetu accessionis foueamus ex oleo frigido, & melle, & flabellemus, & spongiam frigidam intinctam expressam ceruicibus applicemus. Post hæc foueamus totum corpus & stomachum spongijs frigida intinctis, aut lacte, aut aceto. Subinde pannos in succis herbarum tinctos, aut amoglossæ, uel polygoniæ, aut portulacæ, uel ayzon, uel myrtæ, uel rubi mollis, uel maligranati, cauliculis decoctione iam infrigidata, apponimus & succum hypoquistidos uel acaciam ex pulsa solutam, uel omphacium, uel etiam in oleo uiridi, aut lentiscino, & uentri, & pectori, & stomacho, & uentris orificio appone similiter. Quod si sudor perseverauerit, simplasma adhibeatur, quod sit ex pulvere gallæ, thuris, myrtæ siccæ foliorum, & aluminis sicci, & omphacij sicci, plumbi usti & loti, gypsi, & cretæ famiæ & malleorum cauliculis, & maligranati, quem in nocte bis uel ter siccum corpori aspergis, & sic fricato corpore, de istis cataplasma, uel omnia adiutoria sicca & frigida adhibebis. Item manna, thuris, cum oui albugine ad mellis spissitudinem mista corpus ungatur, & cataplasmata adhibenda sunt statim. Vbi minuitur cariorum tritam cum oleo uiridi, uel myrtino uel lentiscino, aut rosaceo uel polentam tritam similiter cum pulsa admistam adhibemus. Item mala cytonia cocta cum palmulis, & mista acacia, aut alumine, aut hypoquistidos succo, uel rore syriaco. Item de supra scriptis herbis cum pane sicco cataplasma. Sic cataplasma imponatur, ut spisse subinde renouemus. Item palmulis, & polline seminis lini cataplasmentur. Ponamus etiam odorem naribus, panis assati fumum, mala cytonia, myrtam, & his similia. Recentem uero damus non satis frigi-

dam, mellis partem unam, aquæ partes 2. ad mellis spissitudinem redactas, damus per tri-duum coclear. singula. Ut autem ad declinationem uenerit passio, mulsam damus coctam in modico uino, pultes, oua sorbilia. De pomis uero pyra, aut cytonia. De auibus, pullos columbinos, palumbos, perdices, anseres, hæc saginata omnia stomacho indigestibilia sunt, de quadrupedibus, rostrum porcellinum, aut cerebella, aut hædina caro uel caprina. De mari uero, locustas, mugiles, purpuras, lupos. De oleribus uero, intybam, plantagines, sparagos. In declinatione autem damus uinum album, leue, de uase in uas transfusum. Bonum signum est quando pulsus uenæ surgit, sudor minuitur, frigus auertitur, sompus sequitur. Quando ista omnia sunt, uinum accipiant, & post epithematibus confortentur constrictis, & cucurbitis in ore impositis uentris. Quod si aliquid remotum fuerit, clysteria iniiciantur, maxime si perniciosus est fluxus uentris. Id si fuerit, succus lenticulæ per clysterem iniiciatur. Utantur post tertium diem lauacro.

De eisdem cardiacis.

Cap. XXIIII.

Cardiacos etiam heleni diaphoreticos appellant, licet quam plurimorum sententia ita diffinierunt: Sicut in hac eiusdem professione nominis attestatur, cordis uitio hanc ægritudinem fieri, quibus in hoc non dabo assensum. Nunquam enim claruit manifestum quod indicium tentari in aliquo natura cordis intelligatur. Est autem totius corporis & uirium plena resolutio, quam cardiacam diaphoresin appellamus, quæ cum sudoribus uiscosis, & frigidis perseverare interemptis uiribus manifestatur præcedentibus acutis febribus, & flammæ interiorum ardoribus quos aliqui causam appellauerunt. Hæc igitur passio frequentius in iuuenibus, quam in cæteris ætatibus euenire consuevit in augmento ægritudinis, id est, circa diem septimum, & hoc quam maxime tempore quo ætas, uel æstus calidior incanduit.

Cura.

Licet in omnibus passionibus generaliter præmoneatur ad maiorem ægritudinem necessitates gubernandas temporibus seruire debere attamen magna ni, & periculo interposito, dum sudoris illius emerferit iniquitas, cum uirium defectu, & ex eo præsens est uitæ periculum, tunc confusis prætermisissisque temporibus rationabilibus adiutoriis circumvallantibus imminuamus. In cubiculum frigidum, nunc lectum straminibus ueteribus lineis disponamus, nunc flabella, nunc pannos cum nardo & uino infusos præcordiis ordinate præponamus. Cataplasmata uero frigida & stiptica imponenda sunt

da sunt eorum præcordijs, ex strigno, & coniza, uel rubo, aut marrulio, & dactylis, & caducis mali granati, uel inantis. Certissimum enim est singularum specierum quæquam medicum merita cognoscentem, etiam temperic, aut commestionem adiutorij posse disponere. Faciem ergo illorum ex pusca frigida, uel uulno stiptico fomentabis, & puluere aspergis membra sudantia myrtæ, uel rosæ folijs succis tufis & cribratis, & manna thuris, galla, omnibus tufis singulariter, & commistis cum uino stiptico, & eius fecibus simul mistis. Omnibus vero odoribus bonis, uel thymiamatibus vires labentes, & membra deficientia reparabis. Articulos quoque eorum oleo cucumerario, uel nimis vetusto, misto puluere nitri, uel piperis, pyrethri, adarcis, aut urticæ seminis defricabis, infundens calore ignito, morientem calorem reparare quatenus valeamus, nutriemus succis modicis, & frequentibus, frigidis tamē, quibus sudoris facilis nimietate vires emorientes exuscitentur. Nutriendi sunt cibus præ omnibus ratione ministratis, & nutriendi sunt similiter ex alicæ, uel prisanæ succis, in quibus ungulas porcorum in plenam usque eorum coctionem coqui suadeo, aquam frigidam subinde per intervalla subministrabis. Et si ætatis adhuc uapor calidior coegerit, etiam niuatas non aspernabo.

De typicis febribus, id est quotidianis. Cap. XXV.

Nunc dicamus de typicis febribus, quæ cum frigore atque tremore, & rigore accidunt, & cum calore recedunt. Quotidiana uero febris, siue per diem, siue per noctem fiat, hæc indicia habet. Nunquam cum tam acri uel ingenti rigore incipit, ut tertiana, & calor subhumidus inuenitur in quotidiana febre, & quasi cum uapore aliquo, & continuo, & diu manente, tactu manus, pulsus prænoscutur ictus, quia pulsus venarum minor inuenitur in quotidianis febribus, quam in tertianis, in tantum quantum quartanæ minores pulsus patiuntur à tertianis. Et quantum quotidianæ febres minorem sitim habent à quartanis, tantum quartanæ à tertianis. Alio indicio quotidiana differt à tertiana, quia in tertianis os, lingua, & omne corpus siccum est. In quotidianis habetur humidum corpus, & quotidiani uomunt phlegma, & itaque per uentrem egerunt frigidiora, & indigestibilia, & aquatiora, & sunt phlegmate plena. Quia corpora eorum qui quotidianam patiuntur febrem, phlegmate & indigestis humoribus plena videntur. Nam in ætatibus, & natura frigidis, & temporibus, & locis humidis ac frigidis quotidianas febres maxime nasci videmus. Iuuenem calidum & siccum cor-

pore à quotidiana febre nunquam uidi corruptum. Quia aut pueros paruos ætate, aut senes pigros, ociosos, & inexercitados, à quotidianis videmus proprie corripui. Vnde nec sudore iuuantur, nec cum declinantur omnino sine febre sunt. Vrina namque eorum qui quotidianis febribus laborant, aut candida & tenuis videtur, aut spissa, aut turbulenta. In tertianis uero crocea satis, aut rubea, & quasi sanguinea. In quartanis diuerso colore, maxime pallida, uel fusca, aut indigesta apparet.

Cura.

Curabis ergo quotidianam sic: Oxymel dabis post primam diem, id est, cum medium causæ tempus uideris, & dabis & diuretica quæ urinam prouocent, etiam escas, & cibos calidæ virtutis, & qui phlegma incidunt, & deponant, & temperent ventrem frequentiori obsequio. Maxime dabis quæ os ventris purgent, deinde facis de radicibus vomitum, quæ dantur cum oxymelle, & alia quæque talia simili ratione facies, & media ipsius viscera embrocabis & cataplasmas, medicina calidæ virtutis: quod Rec. croci, meliloti, floris camomillæ, seminis lini, ana drac. 1. pollinis hordei ꝑnc. 2. Itē adipis recētis porcini drac. 3. vitelli ouorū 5. cerę lib. i.

Item de cognitione ipsius. Cap. XXVI.

Item ad quotidianam febrem: si negligentia medici non fuerit, hac ratione curabis: Quotidiana febris (ut diximus) ex phlegmate fit, quia nimis est frigida. Ergo indoctus medicus dum putat omnes humores esse calidos, dabit eis frigidus cibos dicens: Extinguere uolo febrem. Quam quidem non extinguunt, sed spiraculum uitæ dat, mittēs calidam super calidam, & frigidam super frigidam. Ergo doctus medicus ista non facit. Sed cum febris quotidiana fuerit, dabit ei cibos calidos, sicut est piper, ruta, cuminum. Dabit in potu ante accessionem vinum subtile, albi coloris, & modicum temperatum, & calidum, generaliter autem in accessione nihil ei dabit, sed ante accessionem, & post accessionem. Et cum manducare uoluerit, dabis ei pullum habentem piper, & cuminum. Dabis & pedes lactentis aceto coctos, & pulegio. De pecudibus dabis lac bibendum bene coctum, & siliginis buccellas, habentes oleum modicum. Quod si sitierit, facis aquam coctam cum radice feniculi, & apij seminis, & anethi, petroselinis, & anisi. Si taliter omnia feceris, in paucis diebus liberabis ægrotum, quia (ut diximus) calida dantur in quotidianis.

De tertianæ ueræ cognitione. Cap. XXVII.

Tertiana aliquando est uera, aliquando non uera

uerā febris. Verā enim si est, mox ē principio cum ingenti horrore nascitur, & frigore, & tremore, sed non tandiu tenet rigor quam calor. Nam citō frigus uertitur in calorem, & tenet calor diutissime. Pulsus erit ingens, uehemens, citatus, & creber, ætas hominis iuuenis, & fellis, id est, nisi fellis abundantis, tēpus calidum & siccum, & locus talis & aer, si uis uehemēs, uomica fellis & crocea, & sudor, & mortis iterum talis ut prius erit, & post triduum congruentibus horis, ex his omnibus tertianā poteris cognoscere uerā.

Cura.

Curabis uero lauacro frequenti, & tēperato, cum olei abundantia, & aquis dulcibus non salis, & ideo nec nitro, nec sapone cum lauantur, talia enim desiccant, sed dabis ea quę humectant & infrigidant diutius, & frequentius, quia contraria contrarijs curantur. Rursum enim fel calidum est & siccum, frigidis, & humidis delectatur rebus. Ergo & obsequio uentris, & urinę purgandus est hic humortalis. Quod quidem a se frequenter facit, quia commouet uentrem & urinam, si uera est tertiana. Ergo molli clystere curabimus uentrem: urinam uero dato apij decoctione, aut anethi, prouocabimus. Et cum uideris signa digestionis post tertiam commotionem, etiam absinthij potici decoctionem addito melle modico dabis bibere. Nam maxime stomacho hoc etiam utile est, & si naturaliter satis balneo delectantur, his etiam lauent in die. Et ut nātent fidelectentur, hortare. A uino autem omnino abstinere, quandiu uideris digestionem fieri causę, tunc dabis uinum album tenue, aquatum. Cibos uero dabis quibus possit humidari, & refrigerari corpus eorum qui in tertiana laborāt febre, id est, ex oleribus, bletas, atriplices, & succum maxime pisanę & alite forbitiones. Pisces etiam aspratiles, & non assios, neque frixos. De uolatibus dabis ea maxime quę facile digeruntur, molli & tenui carne, gallinaceorum etiam ascellas, & cerebella, & testiculos, & ungulas porcellinas dabis & ouapala, & horum similia quę facile digeruntur. Dabis etiam poma quę non digestionem difficilia sunt, a melle omnino abstinere & dulcibus, & sinapi salsamentis, & ab acrimonijs omnibus, a leguminibus, & a uino ualde ueteri, & calidiori natura.

De non uera tertiana cognitione.

Cap. XXVII.

NOthos triteus, id est, non uera tertiana in hoc discernitur ab illa quę uera est. Nam uera tertiana ut multum, in septem periodis, id est, septem uocibus motionis suę digeritur,

sed periculo est. Hęc autē non solum cito non digeritur, sed etiam si non diligentissime mox à principio cognita curationibus congruis obseruetur euidentis periculum est, nec facile quibilibet remedijs postea artifex continebit eam, si eam diligenter non prauiderit. Vnde ualde attendendum est, ut ex proprijs signis eam uerā & non uerā tertianā cognoscere possimus, quantum intra se signis discrepant, tū in cura distant. Hęc autem non uera, neque impetu, neque calore uerę tertianę similis est, nec pulsu, uel sudore, nec facit uomere cholera sicut illa quę uera est, sed sudor paruus inuenitur in hac, & quędam humectatio & cum uapore raro, & lente exhalante, & diutētenente, & cum iam uidetur declinasse, non tantum purus, aut sanus imminetur pulsus, sed fordens & adhuc aliquid in se retinens febrium quę paulatim addendo, in peius crescendo, in tantum durescit, ut intra septem dies putetur esse si ipsi febrienti tantummodo credamus multorum mensium causa. His itaque & talibus signis uerā & non uerā tertianā discernendo proprijs curis diligens, & doctus medicus curabit sine periculo. Nam maxime obseruabis, ne incongrue æger tractus in peius & in longinquum, & non sine periculo protrahatur. Nam quantum causa creuerit, in tantum uires eius qui patitur minuentur. Amissa enim uirtus ualente causa nō sufficit uiuere æger. Ideoque conuenit ut respicias semper ad agritudinem, & impetum causę, & ad quantitatem uirium eius qui ægrotat, & ad qualitatem morbi, ne lapsus non reficiendo ciborum refectione, sed forte nimis in initio abstinendo ad periculum ducas. Sed ita fac, ut congruā collatione beneficiorum medicinę assistere ægro gaudente natura fruatur. Hunc non solum in hac causa modum considerando tradimus, sed in alijs semper omnibus causis. Scio enim quendam incipientē autumno à notho triteo correptū, usque ad primum ueris tēpus non posse curari, & in tantum extenuatum, ut dubitarem de eo, quia & ipse non consentiens præceptis medicinę, aliter quam conueniebat, se habebat, & tēpus hyemis causę contrarium, agritudinem in peius protrahebat. Nam & splen ipsius in magnitudinem excreuerat, uisceręque protensa stomachi indignatione, & grauiorẽ ægro causas minabantur. Nam uultus pallidus, tumore muratus, uirides oculi, crurum tumor, pigrum hydropem ostendebant. Caterum corpus exilitate & ex longinqua agritudine confectum macies lassauerat. Cuius exemplum, deo proposuimus ut sciamus cuius periculi sit non uera tertiana, si à principio cognita, & congruē curata non fuerit.

De duobus tertianis. Cap. XXIX.

ERgo nothum triteum, id est, non ueram tertianam qui patitur, mox à principio abstinendus à lauacro est. Et tam diu abstine, quam diu signa digestionis causæ uideantur. Neque quotidie cibetur, sed alterno die sufficit ut reficiatur succis optimis, & sorbilibus benefactis, & digestorijs. Quiescat silentio, & molli lectulo iaceat. Media eius uiscera fricentur, id est, stomachus, & præcordia cataplasmentur, & embrocentur. Clystere utantur non satis molli, & si sanguinis detractionem uideris necessariam, considerabis mox à principio indubitanter unde putaueris utile esse auferes quantum conuenit. Omnis ratio dietæ ipsius non sit perfrigida, & humida sicut supra diximus in ueris tertianis. Sed hic quidem habeant calidum aliquid, & quod incidere possit originem causæ, id est, succum ptisanæ piperatum. Sed etiam interiectis diebus hyssopum, origanum, uel etiam spicam nardi infusam in mellicrato decoques, mellicratum sic confice, mellem partem unam, & duas uini coque ad spissitudinem, & adiecto pipere dabis bibere, & alia quæ urinam possunt mediocriter mouere. Præter illa quæ uehementissime, & nimium sicce uirtutis sunt, & nimij caloris, id est, quæ nimium calefaciunt, & siccant, sed quæ mediæ uirtutis sunt dabis. Vnde maxime absinthium ponticum transacto iam septimo die, ex aqua calida dari conuenit. Multis etiam oxymel datum profuit. Nec non etiam utendum est illis medicaminibus hypelatis, id est, solutiuis, quibus non frequenter uti sumus. Vtilissimum his probauimus, ut uomant post cibum. Quo facto multos mox scimus sanatos.

De quartana uera. Cap. XXX.

Quartanam uero febrem non tam difficili ratione cognoscimus, quia euident est. Nam duos integros dies pueros & quietos habet. Quarto die semper mouetur, & pulsus eius rarior, & segnior, habens inæqualitatem. Calor non longe minor est à supradictis febribus, quia melancholici quartanarij fiunt, & tempore autumnali, & aere mutato & inæquali, id est, non salubri naturali ratione, & ex quo hic humor in corporibus mouetur, & splen maior & crassior fit & extra naturæ modum. Fit quartana frequenter ex febribus non bonis, & indigestis, & male curatis. Nam istis febribus sicut in tertianis uomitus fellis rursi non inuenitur. Id enim proprium est tertianis, & cum declinauerit, adhuc pulsus inuenitur fordens, lassus, segnis, & rarus, & rardus etiam ad opera faciendum.

Cura.

Curabis ergo quartanam sic: Mox à principio diligenter præuideas, ut mediocriter & quiete ac patienter agas, neque medicamen aliquod temere des, neque purgationem uentris, uel detractionem sanguinis facias, nisi forte uiderit nimiam sanguinis esse abundantiam & cum ferieris uenam, statim respice intente fluentem sanguinem. Qui si erit niger & spissus securus auferes quantum causæ putaueris conuenire, uel ætati, aut uirtuti eius qui patitur. Rufus uero & tenuis, id est, liquidus si fuerit, mox retine, & stringe uenam: non enim conuenit in huiusmodi auferre. Tangenda uero est in hac causa uena in brachio sinistro, quæ est mediana, cum opus fuerit, & diætæ adhibenda est utilis, & digestoria, quæ non inflat, uel tendat stomachum, sed quæ temperet uentrem, & prouocet. Nec non etiam interdum clystere in initio utendum est molli, postea acriori, ad depouendum humorem. Abstinendos eos scito à porcina, & caprina, & carnibus his similibus quæ grauant digestionem, & ab omnibus frigidis quæ grauant stomachum. Pro qua re nolo ut existimes hanc superduam esse dietam, quam nos regulam uiuendi dicimus. Diætæ enim medicina est, & pars medicinæ. Nam cum dicimus digestibiles cibos dandos, & non incongruos, nec non etiam dum offerimus cibos frigidos, aut calidos, humidos, aut siccos, necesse est ut sint congrui ut contrariis contrarijs dum medentur medicinæ præbeant auxilium, quoniam contraria contrarijs curantur. Et sic quia hæc causa frigida, & sicca est, calidis & humidis delectatur rebus, & quia ad dietam nobis redeundum est, ideo obseruare debebis sic, ut ab omni iracundia, uel alia qualibet animi commotione, sic & ab omnibus cibis qui melancholiam nutrire uidentur abstineas. Nephās enim est augere malum. Nam cum difficilior certis & probatissimis medicaminibus adhibitis hæc causa curari possit quanto magis non curatur, si quartanarijs ea quæ melancholiam nutriunt adhibeantur. Vnde ipsa causa nascitur si requirant, ex melancholia diximus illa esse. Et diligenter illud caue ne patiens frigus sentiat, & ideo obseruare debes à constrictorijs cibis, quia anathymyalin faciendo ex constrictione, in peius existentem causam faciunt. Obseruabis etiam ab omnibus frigidis & humidis cibis. Vino autem utendum est tenui, albo, & mediocriter naturali uigore calido. De uolatilibus uero uel auiibus dabis, sed quæ tenniore & sicciorē habent carnē. Utendum illis maxime quæ non aquosis uel palustribus gaudēt locis, & piscibus qui facile digerantur & nihil fluidum habent, sed siccioribus carne. Salsamentis quoque, & sinapi, & alijs calidis digestorijs rebus. Dandum etiā

G A R I O P O N T I
MEDICI VETVSTISSIMI

De typicis febribus

L I B E R.

P R O L O G V S.



Vanquam typicarum febrium signa, curationesq; rationabiliter quidem, & non confusæ omnia dicta sunt, melius est tamen diuisiones & coniunctiones diligenter ostendere, quare omnium causarum supra scriptarum febrium, quæ ueræ, & non ueræ, uel quomodo sibi iungantur breuiter pandam.

Qui, & in quò tempore fiant. Cap. I.

Q uotidianarum causa uerarum hyeme tenet, & in principio ij cum febre cœperint, & cutis eorum sudorem emittit, & sic ut sudor uideatur, non tamen amplius effluat. Nam secunda die typum patiuntur, post uero typus recedet, & accedunt leues horrores. Sunt alij qui nec frigus, sed nec horrores habent. Aliquibus etiam nec secunda die frigus accidit, sed leuem sentiunt typum, quibus horis uariando in ascensum pergunt. Vtputa non in uera quotidiana, sed in prima hora tenuerit aliquem. Secunda uero die hora 2. tangitur. Similiter 3. uel 4. die, uel cæteris incrementis dierum, horæ ascendendo uariantur. Siquidem & alio indicio, uel signis possunt agnosci. Quia in quotidianariis (sicut supra dixi) agnoscuntur, ut horis suis nascantur, scilicet non immutatis. Quia quidem post frigus typicum calore purgentur acriori, & post febres sudorem in capite, & in pectore habent. Aliquoties & per totum corpus sudant, sicut tertianarij pati solent, aliquibus etiam stris accidit: urinam uero albam habent, stercorea uero phlegmate mixta egerunt, quæ subalida aliquoties, & pinguis inueniuntur. Nam hæc causa nascitur ex phlegmate, his etiam facies subhumidiores sunt, & ambarum partium laterum inflatio sequitur. Pedes etiam tumidiores sunt, sed non omnibus intumescunt. Hi uero qui hoc morbo laborant, frigidioris & humidioris naturæ sunt, maxime si tempus humidum, aut frigidum occurrerit. Nam & in uero tempore quamuis calidum & humidum sit, tamen possunt homines hac causa teneri, propterea quod habet humiditatis partem. Sed quia maxime hæc causa confurgit hyemis tempore, quod ea frigida & humida sit. His ergo cōcurrētib; cum tempus, & aer, & humores corporis uirtus

malum

his interiectis diebus antidotū diatripton pipe-
reon, & diaspoliten, aut certe piper tritū ex cali-
da aqua. Hoc etiā si quotidie detur, ut bibant,
recte datur: deambulatio & perfricatio blan-
dæ manus fiat, & si aliud aliquid est consuetu-
dinis, non penitus prohibendus est, & subinde
utendum. A lauacro autem si non omnino po-
tuerint abstinere sine tædio sui, sola perfrica-
tione aut deambulatione utentes, non medio-
criter iuuabuntur. Et si non ualde uehemens ip-
sa quartana est, etiam si exercitatione consue-
tudinis urantur utiliter faciunt. Hæc talia uti-
que fieri conueniunt in principio causæ eius, uel
que dum ueniat ad statum causa. Cum uero
status erit, tunc abstinere ab omnibus his, & diæta
utere quam subtili, & pertenui, & quietem adhi-
be, & ociositatem prolixiorē, & medias tunc
corporis partes cura cataplasmate, & embro-
cis calasticis. Deinde utere diureticis, & cum
manifeste uideris fieri signa digestionis causæ,
tunc etiam dabis purgatorium quod melan-
cholicum purget humorem nō semel, sed quo-
ties putaueris conuenire. Vetandus est ab esca
uel à cibo contrariio: uomitus uero sæpius adhi-
bitus, si nihil sit quod e contrario prohibeat, el-
leborum album utiliter dabis. primum radice si-
zum & abstractum. Deinde si sic datum nihil
profuerit, etiam ipsum elleborum (ut ipse no-
st) dabis. Qui uero uomere non libenter ha-
bent aut non possunt, hos fortiori purgatione
purgamus, & reiectis interiectis diebus paucis,
theriacam diacidnes accipere suademus, & alia
quæque talia, quorum ad has febres laudantur
beneficia, ex quibus omnibus probatissimum
est nobis hoc antid. quod opium quirinatum
recipit. Qui uero mox, in principio aliquid tale
dederit, nō proderit, sed maxime oberit. Nam
ex una quartana duas facit, & ex duabus tres,
aut ex leui fortiores, & ita in summum pericu-
lum hominem deducit, & facit ut non possit
uita esse copiosa. Id etiam in alijs typicis fe-
bribus obseruabis, ne quid tale mox in princi-
pio des antequam uideas person fieri causæ, id
est, digestionem, antequam in statu ueniat cau-
sa, tunc enim proderit datum, ante uero obe-
rit. Nam scio ego quendam medicum hoc
ignorantem, dedisse homini tres quartanas ha-
benti, antequam statum faceret causa, uel signa
digestionis ostenderet, medicamentum quod
dicitur diacidnes, & ab ea hora in peius tractus
est, in tantum ut mutaretur in sinochym, nec
ei postea potuit succurrere, sed ita occidit.

malum miscent, quotidianarios faciunt, quibus nisi medicinae arte succurreris, tunc quotidiana ipsa in macronoxiam uertetur. Quod cum contingit, necessario quartanarios facit. Ergo ante succurrendum est, ne ad tantum malum quartanae ueniant causae.

Cura.

Quotidianarius uero in initio causae oxymellis simplicis dabis ex melle & aceto per triduum bibere, per singulos dies coclear. 4. quibus utiliter & radículas oxymelle infusas pridie ieiunis edendas dabis, ita ut eis continuo uomitus prouocetur. Quod si minime profuerit, oxymelli addis piperis grana 20. & sic per singulos dies utantur. Quibus per singulos dies potionibus acceptis simplicibus, urinam prouocabis sic: Mitte in calidam radices sparagi, aut ipsos ramusculos, similiter apij, & anethi, aut si omnia non fuerint, uel unam mittes, & tandiu coquatur donec color aquae prasinus fiat, & quoties bibere uoluerint, utantur. His etiam uenter deponendus ex cathartico phlegmatico, quae si minus ualuerint, philonium, aut adrianum in modum fabae, si uires permiserint, cum mulla dabis. Si autem ex ipsa causa lasior fuerit, uel aetate senior, aut puerulus, ut uirtutes adriani, atque philonij sustinere non possit, pro modo uirium antidota sunt deducenda, & in breui tempore curabis. Quorum stomachus curandus est fomentis calidis, id est, ex oleo calido, cui admiscendum est dum coquitur absinthium ponticum, & anethum. Hi salsum, & erucam comedant, aut raphanos, aut radices. Quibus conditum utiliter datur, ita ut in calida superscripta conditum misceas. Melius si condito addas spicam nardi, piper, & semen apij, & sic bibant, qui quidem a lauacro abstinendi sunt, sed in hac causa plus cathartica adhibita assidue profunt, uehementius, & si semel in hebdomada, aut duabus uicibus, si uires, permiserint, sumantur.

De quotidiana non uera. Cap. II.

Quotidianarius non uerus sic intelligitur, quia cum horis per singulos dies uarijs descendat, & ascendat, ut puta si 5. hora aliquem tenuerint, alia die 4. hora teneat, tertia die in 3. hora. Et subinde per singulos dies alijs horis ascendat. Nothi enim quotidianarij in 24. horis diei, noctisque, uix hora una, aut duabus, aut multum tribus requiem patiuntur, quia quotidianarij nothi non ex phlegmate dulci hoc morbo tenentur, sed eorum phlegma acris inuenitur, ideoque & frigus non patiuntur, quod ueri quotidianarij habent, sed habent leues horrores. Caetera signa praeter horarum ascensum, aut descensum, omnia communia habent. Sed hi maxime in autumno, aut circa autumnum

tenentur, quamuis quolibet tempore hoc morbo teneri possint.

Cura.

Quos fomentis curabis, sicut supradictum est, & cataplasmate, quod fit ex polline seminis lini, & hordei, scenogræci, & melle, & aqua, & inde stomachum calidissime per triduum uaporabis. Quibus cathartica adhibenda sunt, quae phlegma deponant, & choleram rufam. Et his oxymel necessario detur, cui admiscendum est piper, pulegium, & hyssopum, origanum, & thymus, & ex inde coclear. 3. ieiunis per singulos dies dabis. Radices etiam danda sunt, sicut supra monstrauimus, & uomica prouocabis. Urina quibus ut supra mouenda est. Sed hi conditum non accipiant.

De cognitione duarum quotidianarum. Cap. III.

Quotidianas duas cognosces, quod bis in die tangant, sed utrum uerae sint ambae, an non uerae, vel si una uera, & altera non uera, ita intelligi potest. Si ambae uerae sunt, horis suis non mutatis typo ipso, uel febre patientes tenentur. Quod si ambae uerae non fuerint horis ipsis typicis uariatis tanguntur, & non illis horis quibus solent. Quod si una uera, & non uera mixtae fiunt, quae est uera hora sua cognoscitur. Non uerae autem accessionebus horarum uariantur, ut si quando tenuerit hora tertia, alia die, aut secunda, aut quarta tenent eum.

Cura.

Quotidianarum diuersarum curationes superius ostendi, id est, uerae & non uerae. Ergo si ambae uerae sunt, earum adiutoria adhibebis. Si autem ambae uerae non sunt, similiter earum impende medicinae auxilium. Si uero una uera, & alia non uera fuerint, singulis sub hora ipsarum accessionum sua offeres adiutoria, & etiam succum hunc, quamuis omnibus quotidianarijs necessario detur, uidelicet ex succo pisanæ calicem implebis unum, cui admiscebis piperis grana 50. & seminis apij drach. 2. & salistriti cyathum 1. Hoc accipiat quousque causa accedat in melius. Post uero ex omnibus speciebus istis quae succum accipiunt: mediam tamen superscriptorum partem mittis, & quomodo causa requirit, subinde paulatim deducis ex omnibus superscriptis, & sic usque ad perfectionem sanitatis detur.

De tertiana simplici, & non simplici. Cap. IIII.

Tertiana aliquando simplex, aliquando non simplex, aliquando uera, aliquando notha. Tertianam uero quae uera tertiana est, sic intelligitur: Ab initio frigore nimio exagitantur febrientes, ut

is horis quibus aguntur de frigore complicentur & tenentur frigore & febre horis 12. Quibus recedentibus, sudor consequitur, & litopercia alijs 12. siccis nimia non deest, lingua siccior, ut loqui pene non possint. Urina rufacosequitur, uen trem facilem habent, & in somnietatem patiuntur, & tantam æstuationem, ut nudare se uelint, & in recentem submittere se desiderant, & hoc maxime est intuendum, ut tempus & corpus intendas. Nam æstatis tempore hæc causa confurgit, & maxime iuniores, & callidiores, & corpore sicciores tenent. Nam hi cum sani essent, peracriores fuerunt in quolibet exercitio, & calidiores animo (alias omnino) solliciti, cogitantes assidue, choleram rufam nutriunt, unde hæc causa nascitur. In die inter diem tanguntur non immutatis horis.

Cura.

In primo, uel secundo, si fortes fuerint phlebotomandi sunt in uena brachij dextri, quæ est iofana, quæ ad hepar pertinet. Dabis ptisanæ succi lib. cui admiscenda sunt hyssopus, origanum, piper, mel, & aceti parum. Et hæc catapotia dabis post 7. dies: quæ Recip. aloes, scamoneæ, colocynthidæ, succi absinthij æqualia pondera, confice cum succo caulis ad modum ciceris, & dabis secundum uirtutem, prima uice 7. secunda 13. tertia 21. Quod si neglexeris, mutantur in quartanarium, Quibus quotiescunque bibere uoluerint, dabis mulsam, in qua decoxeris spicam indicam, & piper. Item potandum semen apij & anethi decoctum in mulla dabis. Item post 7. dies absinthium ponticum in calida coctum utiliter dabis bibendum. Ozymel etiam ieiunis cum calida, & pipere datum, mirificè prodest. Catharticum etiam lene adhibendum, quod choleram rufam deponat. Vomitus etiam post escam pronocandus est, unde maxime multos curatos constat. Nascitur hæc causa ex putridis cholericibus rufis.

De signis tertiana non uera. Cap. V.

Tertianæ nothæ signa hæc sunt: Autumni tempore hæc causa tangit ambarum partium hypochondria, id est, iecinora inflata sunt cum dolore. Quibus cum in accessione dierum creuerit, uultu sub tumidiori efficiuntur, nulla accidente siti. Urinam habent subalbidam, uen trem sine solutionis obsequio, uomunt etiam assidue phlegma choleribus mistum. Quorum signa præcipue intuenda sunt. Qui cum die inter diem febrem patiuntur, tamen non horis suis quotidie commouentur, sed uariando aut horis descendit, aut ascendit. Hi sicut ueri tertianarij non sudant: ueri enim tertianarij sudore agitur. Nascitur quam plurimum hæc can-

sa in infantibus, & declinantibus ætate. Hæc enim causa si autumnii tempore quenuquam tuerit, & non ei medicinæ auxilium succurrerit, in macronoxiâ uertitur, ut omni hyemistempore ex hac ægritudine carere non possit, exinde in accidente moritur tempore.

Cura.

Tertianarij nothi in initio, uel usque ad declinationem à lauacro sunt abstinendi, quibus etiam si signa bona futuræ digestionis cognoueris, lauacrum tamen raro offeres. Hi etiam dum in causa sunt non quotidie reficiendi sunt, sed reficiantur anethica die escis calidis, & pepsitis, id est, digestilibus. Vtere succo ptisanæ cum pipere, & melle cum aceto paruo. Quorum uiscera calefacienda sunt ex oleo, in quo anethum & absinthium decoctum est. Quibus clysmata nimis fortiora adhibenda sunt, sicut frequenter scripta sunt. Qui si iuuenes fuerint, aut sanguine abudauerint phlebotomandi sunt, ita ut magis uena eorum euenter, quam plurimum sanguinem educat. Quibus si phlebotomus minime profuerit, clysmata eis adhibebis tale: hydroleon, & mellis modicum, & aphronitri, scrup. 5. Urinam eis conuenit prouocare, ex petroselinis, & feniculi semine, & anethi semine elixis, quorum aquam bibendam dabis. His etiam cathartica danda sunt, quæ choleram rufam & phlegma deponant, & uomitus pronocandus est sic: Olei partem unam, aquæ tepidæ partes duas, salis coclear 1. in simul misce, & dabis ad bibendum quantum satietatis fuerit, & mittis pennam in ore, ut reicere possint. Quod si hoc adiutorium uomitus non prouocauerit, dabis calcucecaumeni unc. 2. tritas cum lacte caprino calefacto, calicem 1. ut post deambulationem ex se reiciant. Præterea cum febre cœperint, & sitierint, dabis eis frigidam bibere. Qui quotidie recedentibus febribus habent utantur dulcis aquæ, sed maxime in solio plus fricentur quam in aere. Utantur etiam ptisana, & cum causa ex parte refrigerauerit, ut non tam grauiter ex eadem causa grauentur, aquam calidam in qua absinthium decoctum est ieiuni bibant, quibus dare debes catones, id est, atriplices bletas, aut maluas, uel lactucas, aut cucurbitas, oua apala frigida, & poma diuersa, celsa, & cætera his similia. Vinum album, & leue, nec mireris quod typum diximus frigidis esse curandum. Celerato enim malo accenso, frigore, perungentur. Hi enim ex colericibus multis hanc causam patiuntur.

De signis tertiana uera, & nothæ. Cap. VI.

Tertianariæ duæ, uera scilicet, & nothæ, si sese cōiunxerint, his signis cognoscuntur. Quia uera diebus suis tangit non immutatis horis:

ris; notha uero suis uariatis: Verbi gratia, si una dietanguntur hora nona, & altera die hora 6. tertia die sicut prima die taguntur hora 9. Quarta iterum die quinta, aut hora 7. tanguntur. Sic ergo fit ut intermissa die, nona iterum tangantur hora, sicut tertianarij ueri, & si 5. die hora 6. non tacti fuerint, intelligis hæc signa non ad ueram tertianam pertinere. Unde intelligere conuenit ex uarietate signorum feb. duas tertianas esse coniunctas. Si uero quotidiana tertiana se coniunxerit, sic intelligitur, ut tangantur sicut quotidianarij, ut diem intermissum non habeant.

Cura.

Cum duæ tertianæ commistæ fuerint, ita curandæ sunt, ut in diebus suis secundum disciplinam feb. unicuique sua adhibeas adiutoria, ut die tertianarij ueri suū adiutorium adhibeas, & die tertianarij nothi, suas offeras curationes, quia quæadmodum per singulos dies diuersarū signa uariando monstrantur, ita etiam & curatio non una adhibenda, sed utrarumque causarum diebus suis conueniunt adiutoria.

De signis uera quartana. Cap. VII.

Tetrartei nigris coloribus abundant, unde hæc causa contingit, maxime eos tenet qui mediam habuerint ætatem. Nam senes & pueros si tenuerit, non diutius laborant. Quæ si uera & integra quartana sit, his signis cognoscitur. Primo de quo tentantur, nimium tremorem, & febres aciores patiuntur. Sitis nulla, pulsus ingēs, fortis, spissus, qui cum decem periodos expleuerint, declinationem eiusdem frigoris patiuntur, & febres augmentantur. Ventrem constrictum habent. Quorum urinam suscipere conuenit, & cum resederit, inspicienda est, cuius colorem subnigrum inuenies. Tumidum etiam splenem habent, uultum & oculos subtumidiores, hi etiam recedentibus febribus sudant.

Cura.

Sive in initio, sive in quolibet tēpore, si nulla grauantur lassitudine, phlebotomandi sunt, quorum sanguis tandiu currat, donec niger color in rubeum conuertatur. Quibus post tertium diem clysteriū austere adhibere per triduum debetis, & escæ calidæ, & calidam uirtutem habentes, uel quæ uentrem deducant, offerenda sunt, ut est sapathium decoctū in patina, siue malua, uel bleta, quibus ut uirtutē calidā facias, piper adhibebis, conditum etiam piperatum offeres, à porcina, & bubulina abstineant, uino albo & leui utantur. Pisces aspratiles, & salsamenta comedant, & sinapi, & cætera talia. Quibus ieiunis piper cum calida dabis, abstinendi sunt à balneis. Quibus manus defricari debent manibus puris, quorum splen oleo calido primū fomentandus est, in quo decoctæ sint cappariss

radices, & absinthium, & anethum, cataplasma etiam splenitale facis, quod Recip. aristologiæ rotundæ & corium radices hederæ, sinapis ana unc. i. caricas, 20. conficitur sic: Caricæ die & nocte in oxymelle infundantur, & sic extra terantur, & cum puluere admisceantur, dehinc in eodem oxymelle omnia mittantur, & usque ad sufficientiam decoquantur, & ita cataplasma impones, ut duritia splenis soluatur. Quod si minimè profuerit cathartica adhibenda sunt, quæ nigram choleram deponant. Hoc frequentius facias, & post cathartica diatricon pipercon, & philonium uel adrianum, frequenter ieiunis dare debebis. Qui etiam calidam aquam si in usu habet, bibere si uoluerint, bibant. Epithimum, & cyminum, & hyssopum creticum in coctura addes calidæ, & sic bibant, & post escas uomicam prouocabis, & radices in oxymelle infusas per triduum ad satietatem comedant. Et post comestionem, oxymel ipsum cum aqua calida bibant, ita ut potu satientur, & sic uomicam prouocabis, quibus helleborum album sic dabis: Tolle raphanum, & perunges ex helleboro, ita ut helleborum intra radices coniunctū una die maneat & eo sublato ad satietatem dabis radices, ut manducent, & uomitum prouocabis, quibus etiam oxyporium adhibebis, & maxime calida frequenter danda sunt.

De quartana non uera. Cap. VIII.

Quartana notha maxime pueros & senes retinet. Nam yrinam habent albam, & post febribus & frigore perurguntur quarum horarum ordinem non seruant, & per singula lustra horas deducunt & adducunt. Sitis eos tenet. Hæc causa nascitur ex phlegmate, & cholericis nigri.

Cura.

Si fortes fuerint, in manu sinistra de uena splenis phlebotomandi sunt, quibus etiam apophlegmatismata adhibenda sunt sic: Mitte staphilagiam tusam in dulcoribus calicibus duobus, & aceti uno, ubi fundis etiam hyssopum, & thymum, per triduum coquens, & dabis ut gargarizent in sole, aut in balneo, ad heminæ dimidium modum, quia satis iuuantur. Catharticum etiam dabis, quod phlegma deponat. Reci. pulegij, piperis, drach. 4. cymini drach. 3. cocognidij, lacteridos, ana. drach. binas euphorbij drach. 1. mulsam quod sufficit, & cætera quæ phlegma deponant. Vomica etiam ieiunis, & post cibum est prouocanda. Ieiunis etiam semen apij, & piper cum calida aqua bibere dabis. Quorum splen si in tumore fuerit, curabitur sicut supradiximus. Quibus etiam antid. dipolisten dabis. Si uero hæc adiutoria

minus profuerint, theriacam eis dabis in ipso impetu. Philonium similiter dabis & adrianū, ut supra. Quibus succum prisanæ quotidie dabis, & piper admixtum. Ventrem etiam per singulos dies per clysterem deduces. Et si hæc omnia minus ualuerint, helleborum album per triduum in aqua infundes, & eum eadem aqua philonij, drach. 2. dabis.

De quartana duplici. Cap. IX.

Quartanarij duplices cum in quartana simpliciter sanos duos medios habent dies: primo etiam & nouissimo febriunt in duplici quartana biduo ab initio febriunt, in medio habent unum diem sanum, & biduo iterum febriunt. Sic duæ quartanæ coniunctæ veræ, per typos ipsos & horas suas agnoscis. Si veræ non sunt, in horarum accessione variantur. Quod si una cardinalis non veræ misceatur, una die & una hora non agnoscitur, sed in alia varia commotione, hæc duarum quartanarum sunt diuersa indicia. Si quartanæ veræ nothæ se coniunxerint, aspicias secundum disciplinam superscriptam, ut scias quæ dies sit quartanæ veræ, & nō veræ, ut horis accessionum suarum, uel dierū, sua adiutoria adhibeas, ut si in die horas suas seruauerint, catharticum des, uel adiutoria veræ quartanæ. Si non seruauerint ordinem adiutoria quartanæ nothæ adhibebis, ut eodem die talem des medicinam, prout est causa, aliud in crastinum, quia quæadmodū quartanæ subiunguntur. Ita etiam adhibenda est duplex curatio, ut in die uniuscuiusq; febris ei adiutoria offeras.

De planetis. Cap. X.

Planetarum febres quotidiano typo similes sunt. Nam frequenter medici in his falluntur. Quanquam signa planetarum interdum diligenter ostenderim, tamen rem nimium necessariam credidi adijciendam. Scire te conuenit planetas esse febres, quæ nullius febris, uel typi habuerint indicia. Vnde si super signis, nullam periodicam febrem comprehenderis esse, recognoueris esse planetas. Nam quæcunque febres variando se, suum genus aut speciem non ostendunt, profecto febres erraticas, quas græci planetas appellant, se esse demonstrant, & qui pro certo eas intelligere non possunt, existimant amphemerinas esse, id est, quotidianas. Nam planetæ febres quotidie bis tangunt, ut putentur duæ quotidianæ esse coniunctæ. Sed inter quotidianas coniunctas & planetas, hæc habetur distantia, quia quotidianarij necessario typum patiuntur, planetæ sine typo sunt. Sed maxime hæc signa habent, quæ aliquos bis, & ter, & quater, in die tangunt, &

non diu ipsæ febres retinent ægotantem, ne possint habere inter se intervallum sanitatis, aliquoties habent & diem anethicum, id est, sanum. Dum enim tangunt & bis, & ter, & subito semel in die tangunt, & in tempore redeunt, ut bis, & tertangant. Sunt etiam quibus typus levis accidit, sed non semper, nec omnibus accessionibus, sed ne typo ipso accedente medicus fallatur. Ex tanta uarietate accessionum intelligis planetas esse febres, quas latine erraticas diximus. Quæ febres diuersis humoribus infestantur, quia quemadmodum ista febris uaria & instabilis est, ita etiam corpus eius de omnibus uarijs humoribus infestatur. Vnde necesse est ex ægritudine hac ut quartanarius efficiatur, nisi ei auxilio medicinæ fuerit succursus. Dum enim cholera nigra & rufa, & phlegma inter se contendunt, & exuberant, tunc planetæ febres nascuntur. Sed dum humores hominum in corpore exuberant, qui uicerit, obtinet causam. Sed quia paulo cholera nigra obtusior & fortior est cæteris humoribus, quoniam eandem choleram cæteros humores obtinere necesse est, quartanarium cum uicerit facit. Ergo ne ad huiusmodi tam sæuæ quartanæ ueniant causam, auxilio medicinæ congrue succurre.

Cura.

Præcipuum & magnum auxilium est catharticum dare, diuersam choleram & phlegma deponeas, quod etiam tu medice qui naturam pigmentorum nosti, colligere poteris, ut intelligas quæ pigmenta phlegmaticos, & quæ diuersos cholicos soluant, ut ex diuersis pigmentis unum catharticum facias, ita ut temperatum sit. Quamuis cathartica tamen stomachica danda sunt. Quibus utiliter detur succus prisanæ, cui admiscebis diagridium modicum & piperis grana 20. & epithemi, quod sufficit. Quod si epithemum non fuerit agaricum mittes, melius si addas semen balsami, sed ex omnibus modice mittis, ne aut plus faciens homines turbes. Quibus dabis piperis grana 20. uel si ætas minor fuerit, paulominus ipsum catharticum, pro ut uires ætatis prospexeris, dabis. Omnia enim medici est præuidere & réperare utiliter conuenit, etiam epithemata adhibeantur stomacho ante horam accessionis, quæ calido uigore utantur. Sed in omnibus nihil præponendum est cathartico, quod humores qui febres nutriunt deponat, & cum detracti fuerint, necesse est ut etiam febres ampuentur. Isti mane comedant, & ab omnibus quæ melancholicum nutriunt humorem, cibis abstineant.

G A R I O P O N T I

MEDICI VETVSTISSIMI

Desymptomatibus febrium,

LIBER.

PROLOGVS.



Nunc diligentius, & valde consideremus, quantum possumus perpersemus, quale, & quantum ipsa febris iuxta suam speciem, uel quale iuxta suum genus symptoma afferat agrotati periculum. Nō enim mediocriter laborat, neque periclitatur, qui ex febribus & symptomate, id est, dolore aliquo, & vigilijs consumitur, cum una res ex his per se tantum si sit assidua, sufficiat extinguere hominem. Vnde prænisa & intellecta utriusque virtute, hoc est, quales sint febres, & qualia symptomata earum, & si qua vehementiora, & peiora sunt, ad ea magis attendas, ut cum omni diligentia cures, sicut doctus artifex, ne sis omnino piger, aut negligens, atque non curans. Vt puta si sit febriens quidam pectoricus, quod est abundans corpus malorum humorum crassitudine, & ex eorum indigestione compungatur, vel commordeatur, & ipsum os ventris quod dicitur stomachus, ex congestione indigestorum, uel pinguium humorum comprimatur, & suffocetur, uel concludatur, ita ut nullam habeat exhalationem: Et si etiam pectoricus aliquos corruptos vomat humores, aut per humoris abundantiam laborans natura clausis horum meatibus non inuenit iter, apertum, & liberum egestionis, & periclitetur angustiis, quid in hoc facere conueniat nos videamus, vtrum ad causam & ad impetum febris attendamus, aut tantum purgabimus nimietatē, vt diximus pectoris. Quod si fecerimus, non sine grandi malo faciemus, aut ante magis os ventris plenum, & laborans humoribus purgabimus, etiam cum id factum bene prius uiderimus, tunc melius totius corporis purgationē faciemus. Mihi uero sic fieri utile esse uidetur, ut antid. id quod grauius est de pluribus obtineamus, & sic postea id, quod lenius est, facilius curabimus. Nam scimus multos medicorum ignaros, non ad hoc respicientes, & incongrua facientes, plurimos hominū extinxisse, multosq; grauissimo periculo subiecisse, aut certe in macronoxiam misisse. Quia antequam laborantem, & plenum stomachum corruptis humoribus, & crassis purgarent, & corroborarent, ausi sunt, contra rationem totius corporis facere purgationem. Sed si cum fluxu ventris febrat, qui pectoricus est, non

est alia aliqua adhibenda purgatio extrinsecus, etiam si non illa purgatio tanta sit, quā sit sponte per fluxum ventris, quantum causa postulat, tamen sufficiat, quia fluxus naturalis est, frequenter enim ipsa sibi physis medetur, quā est domina corporis. Nam sæpe multi non intelligendo existimant debere eos qui talia patiuntur, pluribus & maioribus purgationibus indigere, & ausi sunt, hi aut sanguinem detrahere, aut ventrem sponte fluentem, dato medicamine amplius prouocare, grauissimisque eos periculis magis lædendo affecerunt. Sed si quis etiam pectoricus corruptis humoribus contorqueatur, & hunc purgari medicinali ratione necesse sit, nec tunc tantum demere ventris semel, aut sanguinis conuenit, quantum ipsa causa, uel plenitudo pectoris postulat, sed sint aliquid ex symptomate relinquentes, sudorem frequenter irreprehensibilem commouente, aut uigiliās inferente, & uirutem agrotantis commouente. Ita ergo considerandum, & maxime cauendum est, si uigilijs continuis, uel etiam aliquibus laboribus æger afficiatur, alio quolibet symptomate non uehementer, & multa purgatione, uel sanguinis detractiones facere conuenit, non enim ad hoc sufficit æger. Arbitrandum etiam hic & quasi symptoma aliquod accipiendum ad curationem ægritudinis, si sit aer uehemens, siccus & calidus, sicut præsentī anno factum uidimus, incipiente ortu canis, uel æturi, atque syrii stellæ, quod tempus incipit à 15. calend. Augusti, & extenditur usque in nonas Septembris, & usque est numerus dierum 50. Vnde qui hoc tempore sanguinem detraxerint, finem uitæ fecerint, eo quod medici ipsorum causas tantum attendentes, temporis rationem ignorantes, symptoma causarum non viderant. Ita ergo symptoma sit ægritudinis, sicut frigidum satis tempus sit & humidum. Ergo simili ratione nec tunc utile est detractionē sanguinis fieri, nec ventris quia non minima fient ex hoc pericula. Perierunt nanque illi in sicco, & uehementer ignito, ut diximus temporis aere, ablato irrationabiliter corporis quo sustinebantur humore, siccati nimium & arefacti subitis angustiis animam exhalauerunt. Similiter & illi qui nimis frigidus aere temporis, amiserunt per aliquā purgationem, uel detractionem sanguinis naturalem corporis calorem, subito ex nimio frigore constricti mortui sunt. Quia pari ratione nimium frigus, ut nimius calor occidit. Ita siccitas multa, & multus humor necat. Quippe si in frigore nimio auferas sanguinem, aut in tempore calido exices satis, nonne contraria, & in considerata ratione occides? Ita ergo & locorum positio, & regionum situs, & aer considerandus est à nobis, quia neque in nimium calidis, aut nimium frigidis locis,

locis uel regionibus, auferendus est sanguis, aut ueter purgandus, sed temperandus ex hac ratione, ad utilitatem curationis ægroti. Nam si sit calidus locus, calidaque regio, calidum tempus, abstinemus à retrahendis humoribus, id est, per uenas, & per uentrem. Similiter & in frigido loco, & regione frigida, tempore frigido, quod minime facies. Consideranda ergo est & physis, id est, natura ægrotantis. Nam multi neque nimiam sufferunt exhaustionem, neque ieiunium ferunt, id est, nec abstinere possunt à cibo longum, quia sunt aliqui, qui mox amittunt uirtutem corporis exhausti per uenâ, id est, per uentrem, & aliqui ex ieiunio stomachum in uitium inittunt, & fastidium incipiunt pati ciborum, & si quid coacti & compulsi acciperint, digerere non possunt, sed aut mox uomunt id ipsum, aut non digerendo grauantur in peius, hoc incipit esse iam symptoma. Ergo in hac parte cognitionis physis ipsa, id est, natura corporis eius qui ægrotat, ponenda (ut dixi) & consideranda est. Quotquot enim calidi & sicci natura corporis sunt, hi omnes si uehementer, & nimium purgentur, facile & non mediocriter læduntur. Quia & consuetudo non parua res est, decet ut consideretur, & in hoc, id est, in exhauriendo, & in alijs omnibus, & in cæteris rebus. Secunda enim natura est consuetudo. Nam illi qui plurimo utuntur cibo, & purgari soliti sunt, illos ne metuas, etiam uehementi purgatione uentris, & detractione sanguinis exhaurire, maxime si alia testentur, his purgationem fieri manifeste debere. Istos uero mediocriter exhaurias, qui antea leuius purgati sunt, nec dum uehementer pertulerunt purgationem uentris, uel detractionem sanguinis. Alios uero horum aut facile exhauriendos censeo, nisi prius diligenter omnia perpexeris & id fieri exposcere causam, atque postulare cognoueris. Ad hoc ergo ualitudinem corporis, uel qualitatem considerabis quia alij spisso, & constricto sunt corpore, ac ualido, & non facile sentiunt molestiam. Unde hos tales corpore non uerearis semel, & uehementer purgare, si erit necessitas, aut detrahere sanguinem, quantum causa postulauerit, & si nihil aliud de diuerso sit, ut solet, quod prohibeat. Illos uero qui fluido & molli corpore sunt, & imbecilli quidem, & facile uincuntur ab omni re, nec ferunt molestias, hos minime exhauriendos censeo, etiam si id fieri manifesta causa postulauerit, non solum detractionem sanguinis, sed & alijs etiam quibuscunque purgatorijs, uel medicaminibus mediocriter, & non semel, ut diximus, & uehementer in his utendum censeo, quia mox uicti malefiunt, atque deficiunt. Unde partim paulatim melius utimur, & sine metu atque periculo. Simul considerandum eadem

ratione, & in iis est, qui aut nimia mole corporis grossi, uel pingues sunt, aut nimia exilitate pertenuēs, & macilenti satis sunt. Quia in his detraçtio sanguinis de uena nimia, & purgatio uentris uehementis, nec facilis est, nec sine periculo fit. Est enim in his quasi symptoma, prohibet id fieri habitudo corporis, & ætas ipsa. Nec enim pueri, nec senes postulat hoc sibi fieri, nec gaudent, si facta fuerit, sed tristēs & periclitantes erunt. Sed ut diximus uniuersos iuxta rationem causarum considerantes, diligenter exhauriemus, non semel, nec uehementer, sed partim & molliter abstinendo à cibo, mediocriter ieiunis utimur, in tempore suo cibum dantes, & potum. Curandus est stomachus cum fricationibus rationabilibus, & clystere non uehementi & molli, & congruo, atque temperato. Omnibus medicinaliter utimur embrocis, & fomentationibus, & lixoperitis, & ce rotis, & cataplasmate salubri, calidis fomentis, etiam cucurbitis, lenibus, uel cum foco, uel scalpello, ut ratio causæ postulauerit, nec non & lauacro utimur tempore competenti, nihil omnino incongrue facientes, ne lædamus potius, quam iuueamus. Phlebotomo uero utimur, si grandis & matura fuerit causa ex uitio sanguinis, & ætas, & tempus permiserint, & uirtus ægrotantis. Clystere uero utimur si uenter non obsequitur, & decocta febribus uentris egestio, in his squibala cōstricta augmentant aggritudinem. Fomentationibus & embrocis ea loca curabimus, quæ patiuntur, aut gargarismate simplici, uel electuarijs tunc utimur, cum tussis, aut singultatio ægrotantes infestauerit, & si phlegma collectum in stomacho senserimus, succum prisanæ addito oxymelle dabimus, aut apium bene coctum, si urina difficilis erit, cataplasmis utimur, ad incidendas febres, id est, lini semine, ex aqua in oleo rosæo tantum decocto, aut si senserimus medias partes stomachi indignatas, & in feruore positas, addimus fœnugræci pollines, & hordei, & tritici, & oleum dulcel, his addimus etiam & mellis quod sufficit, & sic utimur etiam cucurbitis sordidis, & paragoricis. Horum omnia tempora abseruanda sunt, ut quando declinent, & quando comoneantur causæ, sciri possint, quia talia horum in declinatione fieri cōueniunt. Cibus maxime leuibus, id est, succis prisanæ utimur, cum febris accenditur. Deposita enim & transacta febre, paulatim addimus cibos bonos, & digestorios ad recuperandam sensum uirtutē ægroti, & ad confirmandam sanitatem.

De dolore capitis. Cap. I.

SI quis doleat capite sicut solet, & sit abstinens à cibis, & cordis pulsus patitur, impera
ut no-

ut uomat. Qui uomet choleram, aut phlegma, aut utrumque nullo autem evidente signo, circa ventrem causæ alicuius existente, unde possit per anathymasin dolor capitis commoueri, præscire tunc demum, & considerare diligenter debemus, ne forte nimietas exuberationis alicuius humoris, enfracin meatus alicuius, aut feruorem fecerit locorum eorum qui sunt in capite. Id autem sic poteris cognoscere, si interrogas, an totum caput doleat, atque tendatur dolore, an nimia aliqua capitis parte uehementis infederit dolor. Deinde interrogabis, utrum ipse dolor cum gravitate sit, id est, quasi pondus aliquod grauet caput, aut tendat, aut confingat, aut pulset. Nam si cum pondere capitis dolor erit, significat abundantiam humorum. Si uero cum confectione, uel compunctione humorum feruentium, significat acerrimam exhalationem, uel uaporationem. Si autem cum pulsu, & quasi cum percussione, calorem & feruorem significat. Si cum tensione, id est, quasi tendatur doloribus caput sine pondere, & pulsu, indigestiue uentositatis copiositatem significat, & tumentis spiritus abundantiam. Si uero tensio ipsa capitis cum pulsu erit, feruorem atque indignationem significat, & membranarum quibus cerebra inuoluuntur. Si autem cum pondere tensio erit capitis, abundantiam significat humorum infra ipsos sinus membrorum congestam, atque constrictam. Cum ergo omnia ista definita ratione manifeste cognoueris, inquire, & considera rursus causam, id est, originem quæ id facit. Ipsa enim causa uniuscuiusque passionis, curationem sui ostendit, id est, si abundantia & nimietas exhalationis, uel uaporationis feruentium humorum erit, præuide & cognosce, ne per nimietatem febrium ebullierint humores, uel biles, qui à stomacho effusi, uelocius caput cerebrumque petierint, aut propter infirmitatem partis capitis, aut propter nimietatem & abundantiam humorum in toto corpore, qui totum corpus pondere suo grauant, & hanc quidem non difficile curabis purgatorio, & euacuatione totius corporis. Illam uero causam quæ per imbecillitatem in parte capitis sit, curabis non tantum in ea parte, sed etiam per antipasin congrue facies, si acriter utaris clystere, & ligaturis constringas pedes, & blandis confricabis manibus, & necesse erit aliquid detrahas sanguinis ex alia contraria parte. Ipsam uero partem sic curabis: In eodem tempore quo antipasis sit, embroca capitis utaris, quæ possit abigere & repellere causam à parte capitis, deinde alijs adiutorijs, quæ possint purgare & euacuare, sic etiam postremo quæ possint confirmare & corroborare. Repellit & abigit oleum uiride recens, & nouum, nec non & oleum roseum idem facit, & per se ipsum, & cum

aceto mistum, & quæcunque sunt sibi uirtute similia, id est, oleum in quo papauer fuit infusum, & frondes, uel summitates oliuæ reperimæ & per quam molles, & hederæ grana, mentha, & sisimbrium tenerum & uiride. Vtredum est uero histepesactis, fraquosus, uel frigidus humor in capite abundans sentitur. Si uero calidus & cholericus, frigidis embrocabimus caput. Euacuat uero & purgat atque detrahit humores, calens oleum, ipsum per se tantum, id est, purum & magis id facit si sit uetus, aut si anethum in eodem oleo bulliat, aut radices cum cumeris agrestis. Nam isto tali oleo fomentando curabis mediocriter, & non ualde spissos & acres humores. Cum ergo crassiores & satis spissos humores uolueris purgare, des quoque infusum serpillum, desuper oleum vel pulegiū, aut neptam, uel mentham, aut sisimbrium, quia hæc talia & uehementer purgant, & uirtutem tribuunt, & laxata reficiunt membra. Vnde oportet uti his continuatim usque ad sanitatem completam, & si necesse erit caput purgari, per palatum & nares id faciemus, & sternutationem prouocabimus, & in balneis aere siccis caput sabanis diutissime perfricabimus non utentes oleo, nisi sale, & nitro, & sinapi. Hæc ergo cura dicta est capitis ægrotantis. Nam quia ex nimia febre dolor capitis fieri solet, frigidis effectum, atque uirtute embrocabimus, id est, hydroleon, uel oxyrhodino, hoc est aceto & oleo roseo, uel ex papauere confecto oleo.

De signis doloris capitis. Cap. II.

Per quantitatem febrium capitis dolores esse diximus, maxime in qua parte incubuerit febris. Venas ergo eius in quo ascensio eius febris est, extendit cum dolore capitis, unde Græci symptoma dicunt. Quoniam & augmente febre, augetur dolor capitis, & laxante, laxatur. Quanquam eam passionem ab ipsis audiamus, qui eam patiuntur, tamen manifesta hæc eius passionis sunt signa quod in initio eius sæpe grandis grauedo est. Et cum passio grauis esse cœperit, manifestum est tunc magis caput commoueri à febre, & dolorem reddere. At ubi augmentum eius uires acceperit sit manifestus dolor, atque grandis maxime temporū. Deinde totius capitis sequitur dolor, tamen ostenditur quædam agnitio in facie, quam Græci pyrosin prosopum nominant, quia nonnunquam oculi eorum rubescunt, & genæ. Palpebræ uero tardius mouentur. Tacent plerumque & tumescunt uenæ, piget eos loqui. Oculi quoque eorum non clare cernunt, uix audiunt, nati seant, albumen quoque oculorum foris persum ostendunt, uel intumescunt ubi dolor cœperit minui. Nonnunquam subito & sine ratione, definit

definit dolor capitis, ex quare suspensio esse debet, ne fiant illa quæ Græci paracopen dicunt, aut obliuio mentis, id est, lethargia, uel cataphora, quæ alienationis signa sunt mentis, id est, phrenesis.

Cura.

Oportet his hæc adiutoria adhiberi, id est, mollibus manibus, atque calidis caput continere, atque frontem, nec sint valde constrictæ manus, ut eadem res hanc passionem possit augere, vetandusque erit valde aer luminosus. Locus enim lucidus si erit oculorum acies percutiens irritat dolorem capitis, cui cum in statu erit, oleum calidum adhiberi iubemus, nec satis calidum, nec satis frigidum, quia intemperantia lædit. Quod si se addiderit dolor, oleo camomillino caput perungatur, aut mulsam gargarizent. Quod si perdurauerit dolor, foueatur caput ex elixatura seminis lini, aut maluarum. Si uero increuerit dolor maximus, acacia, aut creta ex aceto, aut cum aqua trita, frontem, & tempora perunges, aut apponito uermes terrenos cum pipere. Quod si febres interiores erunt, & magnus intreuerit dolor, sanguinem de uena emittere debes, aut cataplasma, aut accipiant elixaturam anethi, aut absinthii pontici. Quod si adhuc perdurauerit dolor, pressus erit caput tondendum, & cataplasma adhibendum capiti, ex lini semine, & hordei polline, & fœnugræco. Si uero omnia contempserit, cucurbita erit adhibenda, cum hypolaupadio, non satis ignita in medio capite, scarificatione moderata adhibita, id est, ut non minus aut amplius incidatur. Post hæc cerotario uti debent. Quod si hæc omnia obseruaueris, ad plenissimam eum sanitatem perduces. Sane si febres non sunt, chirurgia est adhibenda. Quod si inter est nausea, oxymel accipiant, & uentrem prouocent.

De parotidis in febribus. Cap. III.

IN febribus parotidæ nascuntur, propter earum magnitudinem febrium, vel quia in ipso impetu frigidam aquam vel bibant uinum plurimum, aut ex perfricatione, vel si immoderate se abluant, uel si plurimum loquantur, uel si dura assidue manducant, aut frangant, aut multum disputent, ex his enim omnibus causis phlegmon fit. In febre plurimæ gignuntur parotidæ circa auriculas, unde & parotidæ sunt dictæ.

Cura.

Plures uero harum modos diuersos dicunt, & uarias adhibent curas. Nos autem communes quoque impetus communi curatione curabimus. Nam quamdiu in impetu est causa, tegimus lana munda & molli. De hinc cum coeperit impetus febrium dimipui, fouemus oleo

dulci & calido aures, & ex eo oleo ibi aliquid infundimus, nec fasciamus lana foramina aurium. Extendit enim dolores aurium constipatio, & tandiu fouemus oleo ipso, donec mitigentur. Quod si non mitigaueris, cataplasma adhibendum erit, id est, mulla, vel hydroleon, siue decoctio fœnugræci, uel lini seminis, aut maluarum comistione. Mittimus & oleum calidum, & pollines hordei, & ex eo cataplasma, ita tamen ut oleum & mel misceas. Tunc si diutius dolor permanebit, opponamus ei pannos lineos tinctos in calida & oleo. Quod si impetus & dolor permanebit, pirasis erit illis adhibenda, id est, sponsia in aqua calida, intincta, & expressa. Deinde cucurbitas adhibemus, ut non satis constringant. Vbi non declinauerit duritia, cataplasma bis ex farina hordei & mulla. Vbi autem minuitur duritia, creta argentea, aut succo de immaturis prunellis, id est, acacia ex aceto conspersa de penna linimus. Vbi duritiam inuenimus, cerorum est adhibendum ex oleo dulci limpidum cum achanti radice, vel adipe porcino recente. Post hæc apponendum erit malagma diaquilon, uel diasulfur. Quod si duritia permanerit, dissoluere debemus tumorem ut remollescat, & corrumpatur, apponentes triduo nasturtij semen trium & hordei in mulla coctum, quousque duritia illa ut superius diximus, ad maturitatem humoris ueniat. Et tunc chirurgia erit adhibenda, in rotando, & locum incisum curamus sicut in omnibus uulneribus exigit. In omnibus autem temporibus curare debemus, ut cibos omnes molles, & forbiles accipiant, & alicam ex mulla gargarizent.

De lingua asperitate. Cap. IIIT.

PROPOSITUM est dicere de sicca, & aspera lingua & usta in febribus. Differuat equidem febres à se, quia alia magna est, & alia leuis. Nam quando leuis est siccat, & lingua, sed quando augetur, asperatur. Quando coeperit in statum crescere, inflammatur, atque uirur lingua, quam causam Græci dicunt.

Cura.

Ergo hæc prima causa collutione oris intempore adhibita, soluitur, & si siccitas, aut asperitas permanet, signum est hoc quod ex intimo lingue incendium seu siccitas, uel asperitas uenit, id est, ex interioribus membris quæ lingue sunt connexa unde impetus nascitur, & cum ipsa sunt in impetu, necesse est quoque quod uerum est signa impetus gerere, ex hac enim causa quam uidemus, illam quam non uidemus ratione perspicimus.

Cura.

Lingue autem asperitatem ita humentari oportet:

oportet : Dabis aquam continere in ore, uel lini semen, aut psilium in linteolo ligatum decoquitur, & cum eodem linteolo ut est ligatum linguam fricabis, & sic semper infundes aquam mundam, & lauas, spongiaque detergis, seu ex oleo roseo cum melle misto infundis, uel portulacæ succum dabis in ore tenendum, & libanoidos in mulla decoctum, necnon & damascena, maximeque ossa eorum, cum lactuca uel caulis succo.

De periculis. Cap. V.

Perielcosin passionem latine possumus dicere nimiam sitim, cum ardore febris. In initio hanc passionem his signis comprehendimus: Primum quod phlegma pectoris eorum uritur, talique anhelitu redundat, hi quoque uehementer sitiunt. Accidit hæc passio strictis febribus, uel illis qui epiploce laborant, quibus maxime respicere debemus, si cum strictura coeperit augmentum habere, tunc debemus in oleo calido, uel decoctione fœnugræci, non tamen spissa, uel multum aquata, uel decoctione maluæ intingere pannos laneos molles, uel lineos, aut spongas molles, & eas opponere præcordiis & thoraci, & si possibile erit etiam per dorsum eas immutare assidue & dare operam oportet ne frigescant.

Cura.

Tunc conspicis quod contrarium habet corpus, deinde adhibebis hæc laxamenta superficiæ corporis, id est, plagellas in calida, & oleo intinctas, in qua calida immittis rosam siccam, aut lini semen. Et iterum post hæc aqua calida labia, uel os, & linguam ægri lauato, adhibebis cucurbitas uacuas, & loco iaceat æger lucido, & pensili lectulo. Cataplasma erit adhibendum: quod Reci. palmulas pingues, & oleum, & aliquid mellis, atque aquæ, & pollines hordei, lini seminis, fœnugræci, altheæ radices, aut folia, & conficitur sic. Palmulæ bene trita, oleo, melle & aqua ferueant, & sic althea optime trita, & pollines omnes commisceantur, & ita calida per triduum stomacho imponatur. Post hoc cucurbitæ tractus adhibeatur, nausea prouocetur, & uenter subducatur. Vbi laxatio fuerit ardoris, obseruari debet à stipticis uel frigidis, quod si impetus maior fuerit ardoris, frigidam accipiant, & sic bibant pro siti, accipiant rhodomel, aut omphacomel, aut elixaturam apij uiridis, aut rosæ siccæ, cibum accipiant tenerum, & paruum.

De fastidio cibi & potus. Cap. VI.

Fastidium est cibi ac potus recusatio, aliquando uehementius in toto recusant, aliquan-

do non ex toto accipere summopere recusant ægri, aliquoties molestant, & contrariam sentent desiderare causam. Quando hæc patiuntur, stomachi est præcipue nitium. Aliquando cum fluxu, aliquando cum strictura, & non tamen in febribus, sed sine febribus hæc accidit passio. Ergo si constrictura laborant, stomachus laxari debet, si per fluxum constringi, & dari quod demonstramus, atque monemus his quædam odoramenta quæ odorem ferant, & si passio permittat, id est, si faciat declinationem, gestare debemus illos cum equis, & plaustris, & uarios cibos & separatos in declinatione dare, & leue quod dabimus uarium sit. Inuitant enim uarietates animum infirmi, & repente quædam oblata excitant, & in extremo odoratos damus cibos, ut gustent de plurimis paululum. Tunc enim si hæc fecerimus, lætabitur infirmus. Deinde introducatur sermo qui irriter ad cibum inducendum. Quod si non acceperint cibum, clyster iniiciatur, & cataplasmate uti debent de pane sicco, & palmulis, & malis cytoniis. Quod si omnem cibum auerrat æger, & contrariis sibi delectetur, sermone atque ratione utendum erit, sed primo quæ sunt recta contra uoluntatem ei debemus. Quod si omnia contempserint, & contraria uoluerint, accipiant. Si uult constrictoria, ut fluxa utenda sunt, tamen qualia accipere ualet, eoque modo deficientem sustinebimus, usque in declinationem quasi propter remissionem.

De singultu. Cap. VII.

DE ualido singultu sermo est: accidit aliquando febricantibus, nonnunquam & sanis plerumque euenit, & acute febricantibus. Huius rei signum est stomachi consensus, seu uibratio cum quodam sonitu proprio atque huius rei solitario, & ueluti asperitate quadam resonante, & in tantum ut singultus cogat plerosque uocare quæ accipiunt, nec simpliciter uocare, sed cum quadam præfocatione: aliquando validior est. Nam tunc & uniuersa quæ accepta sunt reijcere cogit.

Cura.

Adiutoria diuersa ad hanc ualitudinem adhibemus quæ superius in stomachi impetu diximus. Quod si frigus est in stomacho calefactoriam curam adhibemus, dicente etiam Hippocrate: Singultus aliquoties fit aut ex repletione, aut ex inanitione. Inanitione repletionem, & iterum repletio inanitionem soluit. Si per longum tempus fuerit, uomitum prouocamus ex raphano, & potum damus acetum squilliticum, aut castoreum ex mulla, aut calidam, ubi coxeris cyminum, aut oxymel cum calida. Iuuat eos cursus & uexatio, & stomachus curetur, uel oxyporia

oxyporia accipiant plus thermantica, uel epithema. Cibos utiles & leues ex calida aqua accipiant, intervallo facto non plus, sed parum, & catamodicum glutiant, ne singultu prouocent.

De sicca & aspera lingua. Cap. VIII.

DE sicca & aspera lingua sermo est, quam uisu comprehendimus & tactu. Videmus autē illam siccam quam tangentes sentimus asperā esse, & quasi papulas quasdam in ea cernimus: atque sentimus. At si encausim passa sit, est ruborata, uel subcinericij coloris, siue liuidi, aut nigri, uel rhadagias habere cernitur, sicca autem quasi pelliculæ pergamenorum similis. In se habet uniuscula, nunc ampliora, nunc minora. Vnde & uocem æger tardam uel obscuram reddit, quia os siccum, atque linguam ostēdit. Oportet autem eos collatione oris uti, aut apponentes in mento, aut ante mentum, quod græce antereon uocatur, lanas molles intinctas in oleo calido dulci. Linguam uero fricamus cum spongia molli, & munda, & aqua calida intincta. Post hæc colluendum est os ex aqua calida, aut ipsum antereon, diamoron medicamento tangito, aut ex rosa sicca cum croco ex æquo trita, & cum melle mista de penna linito. Cataplasma ex pane & aqua calida, & polline scœnugræci, aquatam aut mulsam dari conuenit, & aliquando melle cum penniculo fricabis, & lini semine integro in linteolo ligato, & in calida tincto, aut foliis mentæ uiridis linguam fricabis & os. Quod si asperitas magna fuerit, & os & palatum uista fuerint, gargarizent elixatuturam rosæ siccæ, ad tertiam decoctæ in aqua.

De diaphoretica. Cap. IX.

Diaphoreticos multi cardiacos appellant, quos ita cognosces. Vt cœperint nimis & acerrimis exagitari febribus, sudorem patiuntur incongruum, & non creticum, ex quo uehementi periculo urgentur, qui sudor tanquam symptoma appellatur. Nascitur hæc causa ex sincho, aut ex causon, aut ex sinoche.

Cura.

Cuius signa certissima cum uideris, & nimium sudantem, & sine intermissione repereris, hunc curare debebis sic: Phlebotomabis eum mense Martio maxime, & facies tenere myrtos sub asellis, ne forte cum phlebotomas sudor incurrat. Si uero neglexeris, apoplexia, paralysis, epilepsis, synanche, eueniunt. Constitues eos in pauimento, aut in tascello, aut in tegestri, quos aqua frigida roras, & ponis pueros & puellas, ut cum muscarijs stabellent, melius si ex canina uiridi sint, quæ assidue in recente intincta

præstare possint corpori æstuantī uentum frigidum & ex guttis humidum rorem. Hæc sine intermissione fieri iube. Quibus etiam dandum est diacodion mane coclear i. sero i. His etiam similiter utile est rhodomel adhiberi, quamuis hæc duo adiutoria nō solum diaphoretico profunt, verum etiam causis unde diaphoresis descendit, id est, sincho, & causon, & sinoche. Adhuc etiam myrthus super patientem debet spargi, & cataplasmata lixoperiton adhibenda sunt, maxime quæ sunt ex portulaca trita, & acinis acidis. Quod si acini iam maturi sunt, aut nondum nati, etiam ex portulaca sola cataplasma fieri potest. Quod quidem siue habeas acinos, siue non, trita portulacæ, & induta in plagella sic frigida imponenda sunt, ut sudor ille noxius reprimi possit, quamuis hoc cataplasma etiam omnibus causis istis faciat, id est, sincho, sinochæ, & causon. Item ut supra cataplasma lixoperitum, quod facis sic mittis semen lini in recentem, & cum mollierit teris, & adde rasuram cucurbitæ uiridis, & sic frigido stomacho imponis. Omnia enim lixoperita in stomacho ponenda sunt, sed hoc lixoperitum facit & ad causon, & sinochen, & diaphoresin. Sed in hac causa quam maxime obseruandum est, ut & locus, & flamina stiptica procurentur, id est, ut recens sparsa non desit, & frondibus hederæ, myrtæ, & granatæ, uel pampini, ac buxi cubiculum ornetur. Medicamen ad cardiacos: Foliorum hederæ terraneæ cum ramulis suis, quantum duobus digitis cingi potest teratur, & in uinū albi phiala, id est, ita ut sub diuo moretur nocte una, infundatur & sero, in primo mane exprimis, & sic bibatur. Item ipsum uas foris sit tota nocte. Hoc fac diebus nouem, & sanabis hominem, & abstineat se æger ne cor comedat undecunque aut carnem quæ cum corde cocta est. Item cōtra sudorem remedium optimum. Si ante solis ortum herbam quam appellant semperuinam legas, & ante solem teras, atque eum qui patitur ex eodem succo perungas, utiliter prodesse dicitur. Etiam remedium est si in collo eius qui patitur uiridem uuam, & album corallum, ita ut tota nocte in recente maneat ante solis ortum suspendas lino, scilicet inserta, sed melius est celari. Et uita, ne hoc remedium facere die solis incipias. Cui etiam pulvis recipiens umbilici maris, corallij, anacardi, cymini, piperis longi, oßis eboris, spinæ histricis, panis fermentati, gladioli, oßis de corde cerui, opij nuconis. ana r. cū calida aqua dandus, tamen spina, ossa, & panis combusti sunt, & iaceant in silentio & secreto.

De sudoris distantia. Cap. X.

Quomodo discernis cretice sudantem ab æqui

quā diaphoresi soluitur, & creticus sudor est: Hic pari numero factus & calidus. Diaphoreticus uero est in pari numero & frigidus, & tennax. Non faciliem, sed satis necessariā quæstionem proponis. Nam plurimi medici ignari, salutarī sudori imminenti, ægrotantibus resistere, & alii diaphoreticos conlaxantes causa mortis extiterunt. Vnde eorum differentias necessitatio suggeris ordinandas, quæ uaria ratione colliguntur. Primo ex præteritis diebus, dehinc ex generibus passionum, & magnitudine temporum, & sudoris ipsius ordine, qualitate, & quantitate. Significatio firmatur ex præteritis diebus, in qua consideramus, utrum signa sudoris diaphoretici, aut salutaris præcesserunt.

De iudicio eiusdem. Cap. XI.

EX genere passionum qualitates significationum attendimus. Si enim solutio inest, sudor etiam utilis diaphoreticus esse monstratur. Si uero strictura inest, attendenda est infirmitatis magnitudo. Parua enim passio diaphoresin facere non potest. Si enim magna fuerit, attendendum est tempus sudoris. In statu autem totius passionis, atque temporali accessione, limpidam amissionem creticus maior sudor ostendit. In initio autem, uel augmento perniciosus, æqualis bonus, inæqualis autem malus sudor iudicatur. Ex quantitate signa accipimus moderationem considerantes. Modicus autem sudor bonus, immodicus malus accipitur. Denique non recte sudantes & sine moderatione, diaphoresin incurrunt. Ex qualitate significationem accipimus, cum tactu iudicium adhibemus. Salutaris autem sudor calidus & tenuis, & non male olens probatur. Perniciosus autem frigidus atque acidus, a quatis tamibus similis inuenitur. Deinceps ex præteritis atque concurrentibus signis affirmanda significatio est. Non recte sudantibus magis paruus atque creber, imbecillis & inanis pulsus inuenitur. Thorax etiam grauatur cum respiratione frequenti, ac iactantia animi uocis tenuitate arrectante pallore. Recte autem sudantibus pulsus rectus, respiratio facilis, atque leuior efficitur. In somno enim prona defectio, & omnium aduersariorum diminutio, cum animi atque corporis relaxatione, & recto & salutari ordine. Quomodo discernis à cardiaco eum qui ex stomachi passione sudauerit? Ex stomachi passione sudans cum dolore quadam parte corporis nexari uidetur, hoc est, sub pectore, aut inter spatulas, atque arrectante aliquando singultu. Aliquando post acceptum cibum tenax corporis cum saliuarum fluore, & nausea, & uomitu.

De sudoris præcognitione. Cap. XII.

Sudoris præcognitio apud scientes non est in negligentia. Nam & salutaris sudor est, & mortiferus. Salutaris est creticus, cui credo nomen ex iudicio impositum, eo quod quasi iudicet hominem ex sententia sua, aut puniat, aut liberet. Hic calidus est, cui color rubens est, & cursus est fortis, & ingēs pulsus uenarum, & quanto plus his sudoris affluerit, tanto æger fortior fit. Aliter quippe exterminat, & subito fit frigus cum pallore ægri, aut defectione uenarum, aut penitus absque sensu, aut tremore potius quā solutione febris. Sed creticum facile est calefactionibus prouocare, cardiaco obistere arduum est. Tamen huic frigidis rebus obistere placet ut nondum iaceat æger. Si ita surget, aduentetur hinc atque inde labanis, atque flabellis uentrum inferentibus. Interdum ex spongijs in aqua frigidissima tinctis & expressis corpus eius refrigerandum est, & si nix affuerit, hac utendum est magis quā frigida humiditate. Cuius manus stringendæ sunt fasciis lineis, in eo loco ubi uenarum pulsus tentare consueuimus, & si adsit fluxus, frigida danda, & non nimia nec cum impetu hanc accipiat. Hæc res accidit plerumque illis qui cum strictura febricitant, scilicet ut habeant sicca stercora per nimiam febris ardorem.

Cura.

Hos oportet per clysterem foras deducere, sicut in secundo Metamaticō ostendimus. Subiecta erit rubrica de ijs qui in acutis febribus in impetu habent dolorem in præcordijs, in splene, & iccore. Singula hæc medicamina sine omnia in passionibus suis demonstrata sunt, quemadmodum & quibus signis comprehendatur quæ nos omnes scimus. In ueterantibus passionibus ea debemus adhibere quæ sunt dicta, & quæ ad curam eorum pertinent, omnia sunt adiuncta, quāquā & ij cōmuniter ut cetera curantur. Propter quod in quibusdā febribus debemus, & si non grandis causa sit, lanis mollibus ac mūdīs fomētare oleo calido ac dulci. Si amplius fortis sit causa, caraplasmatibus, & cucurbitis, & pyriasis, i. spongia debet intingi in liquore ita sæpe dicto. Postea ce rotario erit utendum, scilicet ubi declinare coepit passio. In impetu autem clysterizabis in myrta, & in cantabris, & blerae radicis decoctione mel, & sal, oleo mixtum, uel nitrum, aut affronitrum, ex mulla & oleo, aut cateno, salem & oleum ut sepuerit, & oua dura mixta iniice.

De impetu uesicae. Cap. XIII.

Solet uesica in acutis febribus in impetum ac dolores uenire. Sed quando assidue meianr, & paulatim intumescit membrum hoc facie dolore, & parere illa quæ comphebeon Græci dicunt

Gariopont.

dicunt facit, quæ omnia soluentur, ubi accessio minuerit. Dehinc plurimum meiant. Quod si molestius ea passio accubuerit quo usq; febris laxationem dimissionesque perficiat permanere solent ea signa.

Cura.

Ad curam eius rei qualia nota sunt adhibere debes fouereque ex oleo dulci cum calida mixto. Omnia illa quæ supra & sub umbilico sunt loca, & cataplasmata, & cucurbitas adhibere debes, leues & encathismata calida, & hydroleon, nec non fœnugræci decoctionem, vel maluz, & per clysterem iniicere debes, laxatis enim his partibus resumitur uesica. Quod si aliquis morbus erit in veretro, pirioticum clystere, id est, oleum calidum erit iniicendum. Lenit enim atque moderatur passionem hanc, & augere debes omnia quæ huic passioni sunt utilia, etiam apozimas accipiant, & causas necessarias: quia omne quod bibitur in uesicam confluit, & grauatur id membrum. Vesica quoque fatigat egrum multum mingendo non minus uentris solutio. Vnde adhibemus stiprica sub umbilico atque esebcon, & clunibus, ut sunt. Spongiæ ex aqua frigida, uel pusca, atque epithema frigida, & cucurbita italica.

De uigilijs. Cap. XIII.

Vigilia aliquando propter aliquam causam fiunt, uel propter quasdam animi cogitationes, uel propter alicuius loci dolorem, raro quidem propter fluxum uentris & propter stricturam. Eadem dignoscimus si ex strictura sit aut ex fluxu, nostra interrogatione, quo sæpe interueniente nunquam egrum dormire uideamus. Præcedit autem hebetatio mentis atque appressio quam græci paracopen dicunt: hanc uigiliam affert assiduitas animi, quam græci cataforam dicunt. Nam debilitationem uirium & corporis angustiam patiuntur. Hippocras quoque ait oculos & nares eorum in acutum procedere. Cui summas nares frigidæ tangimus & cutem, & summas manus & plantas & oculos quoque tenfos habent, sed sic intente & non palpebrantes quod græci quoque anthoman appellant. Dolent quoque eidem oculi atque non habiliter mouentur. Nonnunquam etiam in uenulis eorundem oculorum rubor apparet. Pulsus quoque infirmus est eis, mox laxior fit, aut si intereest aliquis dolor, exinde uigiliae fiunt. Debemus ubi sunt stricturæ mollires, & ubi sunt laxationes constringere, sicut in capitis dolore monstrauimus & oleo dulci, aut anethino caput foueatur & cataplasmetur, & pone cucurbitam vacuum in loco qui ilion dicitur & lecto pensili gestetur, & spongiam cum aqua calida intincta expressam oculis sa-

pone & odorem pigmentorum naribus ut est myrrha & opium storace ex æquo in unum trita cum careno modico aut melle & punctione præstentur humidia, ut caput sensum recipiat, & somnus sequi possit.

De tremore in acutis febribus. Cap. XV.

Fit tremor in acutis febribus tam grauis ut plerunque mentes hebetentur. Est autem passio neruorum quam simforaneuron græci dicunt. Deprehenditur ea passio in strictura uel in fluxu hæmorrhoidæ uel sanguinis uomitu. Quando hoc fit oportet nos mitigare fluxum constringentibus adiutorijs, secundum quod sæpe demonstrauimus. Sed cum in omnibus talibus remissio secuta fuerit, utile est egrum in oleo dimittere, aut stomachum curare & acopo uti diasansuco aut diaquilon, in oleo soluto totum corpus perungere, & bibant elixaturam absynthij pontici.

De malfactionibus. Cap. XVI.

Nunc conuenit dicere super his qui in agnitionibus & per symptomata aliquod frequentibus angustijs, id est, assiduâ malfactione laborant atque periclitantur: harum enim malfactionum diuersa origo est, quia nec una causa est unde nascuntur. Diligentius ergo singulorum inueniamus originem, uel causam unde fiunt & tunc demum indubitanter, harum unius cuiusque præuidebimus curam. Alij namque angustiantur, uel malfiunt per abundantiam cholerae. Alij per diarriam, id est, fluxum nimium. Alij per dysenteriam, uel lenteriam. Alij per nimium sanguinis fluxum, siue per nares, siue per uulnera aliqua, siue per fellâ, ut ille qui hæmorrhoidas patitur, & mulieres per nimiam mēstruam, aut per abortum, aut per dolorem matricis intolerabilem malfiunt frequenter & deficiunt, cum aut contorquentur, aut de locis suis excutuntur, facit frequenter & indigestio ciborum nimia, & non mediocris malfactione. Maxime cum per hanc corruptis humoribus fluxus uentris fit, & bulismus, quid aliud nisi malfactio est? Præuenit enim frequenter malfactio futuram apoplexiam ex sanguinis ictu, & malâ epilepsiam fit etiam in commotionibus febrium cum summa corporis frigescent, id est, manus & pedes, & cum ex causa iccoris in fetore positi uel stomachi feбриunt quidē, & in his causis angustia fiunt, & cum crudi & intemperati humores in aliqua insolita sibi uiscerum parte infederint, uel meatus naturales concluserint malfactiones non sine periculo ægrotantis faciunt. Frequenter & multi æstuant animo, siue gadio, siue morore, siue nimia cogitatione lassati angustiantur, & deficiunt.

& deficiunt ita ut humor quidam sudoris in his non solum in uultu, sed etiam in omni corpore videatur. Malsiunt etiam illi quibus inualida, & debili uirtute apostemate rupto siue à se siue ab artifice extrinsecus sanies purulenta decurrit, & aut in thorace, aut in stomacho, aut in uentre coagulatur. Necessesse est ut illi malsiant, quoniam nos ipsi secando apostema aperimus, & totum semel quod intus est euacuamus cum partim id euacuari melius sit. Eadem ratione & illi malsiunt, quos uehementi data purgatione, uel clystere adhibito, & ualide semel euacuauimus, cum nec hydropici ipsi qui quamuis superfluo humore abundent ubertim, ex toto tamen si subito semel purgentur, non sine periculo malsiant. Quid uero de illis dicemus, qui dolore nimio tacti malsiunt? aut compunctionibus quibusdam aut stropho, aut ileon, aut qui coli subito & graui dolore conficiuntur? Nec minus illi qui confixi uel uulnerati in neruo aut in capite musculi malsiunt. Et in articulis graui uulnera, id est, chironia uel cancrenæ, uel etiam carcinomata, faciunt frequenter malfactiones. Sicut nimia frigora faciunt, & intolerabiles æstus uel calores, & uitalis uirtutis dissolutio, uel lassitudo, ex defectione & angustia malfactiones faciunt. Ergo sunt propriae curæ malfactionum causæ uniuscuiusque earum.

De eadem cura. Cap. XVII.

Per singulas causas ut dicatur curatio nunc in hoc libro satis est longum, quanquam breuissime tibi (ut ipse petisti) disposuerimus dicere, sitamen breuitas ipsa efficiat, atque præstabit tibi, ut scias ex paucis, quæ diximus, plura mederi. Nam siue ex cholericis nimijs, siue ex diarrhæa, siue ex hemorrhodia, siue ex alijs ut diximus causis deficit, atque malsit aliquis, conuenit mox ut aqua frigida in facie roretur, manus & nares constringe, os etiam dentesque, aperiri, ut tussiant, & impera ut exercent, auræ trahere, aut capillos, & iuxta pectus stomachumque fricari manu, uomitumque prouocari digito in ore misso, uel in tædis pennæ in hydroleon, & articulos uinciri, id est, summitates manuum uel pedum colligari. Oportet autem ligaturas in extremis manibus & pedibus esse, sed plures quidem uehementiores in manibus tunc cum fluxus sanguinis uel uentris ex inferioribus partibus, & angustias nimie manando perfecerit. In pedibus uero tunc, cum ex superioribus partibus fluxus uexauerit, usque ad angustias & nec ut solet narium sanguinis incessabilis fluxus molestare, aut stomachi relaxatio uomitum facere nimietatem. Ergo siue ægro, siue sano aliquid tale contigerit, & angustiarum uel malfactionum molestias fecerit, considerandum erit

ut per antiparistasin restringamus sanguinem qui manat, id est, contrario medicamine, ut inferiora colligando, uel constringendo superiora leuentur. Sic etiam menstrua foeminarum sedemus, ita ut superiora constringendo, uel colligando leuentur, inferiora cessare faciamus. in tuendum est etiam in his talibus & dicendum causis, qualiter debeat, uel quo schemate iacere qui patitur, ut si de inferioribus laborauerit fluendo partibus, pronus & decliuus capite iaceat, nec tamen nimie, sed temperate. Item de superioribus si fluxus fuerit erectior à capite letulus eleuetur. Sic etiam mulieribus ex nimio sanguinis fluxu medeberis, ut abstineas riuiolos matricis insolito more fluentes, si iuxta mammæ earum calidas figas cucurbitas, ita ut & iecori atque spleni infigas & superponis cucurbitas. Cum ex utraque nare nimius & inabstinens manauerit sanguis, aut si de una fertur nare considerabis. Si de dextra erit, iecori superponis, si de sinistra, spleni. Necnon etiam medicamentibus quæ sunt ad fluxum sanguinis restringendum, & ad menstrua uteris, uel in naribus, uel in potione adhibendis, necnon & ad uomitum, & ad choleram sedandam, & ad fluxum uentris, & ad menstrua multa quæ in pharmaceuticis scripta sunt, & per ora danda utilia intrinsecus, & extrinsecus diuerso modo adhibenda, scilicet uentri, matri, stomacho, thoraci, capiti ac fronti. Balneo non utendum est illis qui fluxu sanguinis laborant, atque deficiunt, alijs uero non incongruum est, præter illos qui nimio laborantes malsiunt, atque eclipsantur. Nocet enim & ipsis usus balnei. Oportet enim hos non calidis relaxare, sed frigidis constringi uel escis uel potionibus, uel unguentis stipiticis, & frigidis, quia his calida contraria sunt, nec ligandos his, uel constringendos scito pedes, nec uomitum prouocandam omnino, nec aliter commouendos. Vinum etiam frigidum pane infuso dandum est, & flatu frigidi uentorum sunt adhibendi, & aer & cubiculum stipiticum ubi iaceant ex artis scientia faciendum, id est, frondibus teneris pauimentum sternamus, uidelicet myrtæ, salicis, & pampini, & malignati, atque rosæ, & alijs huiusmodi uirtutis stipiticæ. Sed illis ista incongrua sunt, qui humoribus ore uentris repleto, sudore uel ægritudine laborant. Quibus balnei usus utilis est, & uentris purgatio, & uini usus. Vinum sit tenue, calidum, & natura calidum ut est siculum. Tale enim dare conuenit, sicut illis qui sanguinis fluxu, atque euacuatione laborant, quod non sit spissum nigrum, uel ruboratum, atque austerrum. Sic itaque hoc modo curabimus istos, qui per nimium fluxum atque euacuationem laborando malsiunt, uel angustias laxantur frequentibus. At uero illos quibus ex aliquo

nimio humore concreta abundantia, quasi effra-
 xim, id est, obiecta numeratis mole occlusio-
 nem meatibus facit, ita ut vitalis spiritus solitis
 naturalibus impediatur cursibus, & ob id mal-
 factiones atque angustias patiantur, & non si-
 militer, sed longe aliter curabimus. Nam his
 extremas manuum pedumque partes diuissimè
 manibus perfricabimus blandis & constringi-
 mus, atque colligamus, atque calefaciamus: &
 si febris erit, abstinemus à cibo, & uino, & bal-
 neo. Sufficiat nanque his mellicratum tantum
 decocto thymo, uel origano, uel hyssopo. Vti-
 le est etiam oxymel his dari cum pulegio, & iri-
 llyrica factum. Similiter medicaminibus his
 & illas scito curandas, quæ & matrice laboran-
 tes malsunt, præter oxymel, & non magis in
 his manus quam crura cōstringenda sunt, sicut
 illis qui profluxu matricis nimio uexantur, &
 istis similiter cucurbitas circa mamillas poni-
 mus. Ita etiam his quibus matrix excussa à na-
 turali loco & conuersa, & resupinata sursum vel
 transuersa deorsum renibus, aut lateribus, aut
 inguinibus incumbens iacet, cucurbitas ex di-
 uerso apponimus, id est, ut per antipasin in suo
 matricem eandem deducamus loco. Nec non
 naribus odores fœtidos apponimus, matrici ue-
 ro suffumigationes delectabiles, & perpulchre
 olentes offerimus, atque suffumigamus, necnō
 etiam medicamina, uel pessos calidæ uirtutis,
 quibus relaxari atque placari possint adhibe-
 mus. Si uero infirmis aut nō bene sanis stoma-
 chi uitio lassitudo frequens fecerint malfactio-
 nes atque angustias, utamur epithemate quo
 possit confirmari, & corroborari stomachus, id
 est, dominus corporis, quale est quod recip. cro-
 cum, aloen, mastichen, atque his similia. Et em-
 brocabitur oleo nardino infuso modico uino
 decoctionis absinthij pontici, uel oleo masti-
 chino, aut melino, id est, de malis cytonijs. Et
 si calorem sentiunt quasi ardentis stomachi, mi-
 scemus ijs aliqua frigida uirtutis de succis cu-
 curbitæ, vel lactucæ, uel portulacæ, atque strin-
 gni, necnon uiz uiridis, uel immaturæ succum,
 qui nō solum hic frigidus est succus, sed etiam
 stripticus. Aqua etiam frigida ijs qui stomachi
 nimio ardore & ariditate fatigantur, uel defi-
 ciunt malsientes, opportune uel in tēpore suo
 data ualde prodest. Aliter uero data ægrotis,
 maxime & grauiter nocet. Et oportet magis
 ægro stomacho uinum & calidam aquam dari,
 si ni hil aliud prohibeat quod sit contrariū. Pro-
 dest maxime ijs talibus stomachi vexationibus,
 etiam perfricatio manuum & pedum. Et cum
 ex his iuuamentis ad melius profecerint, & sen-
 serint beneficium, illos ilico qui calore stoma-
 chi, & ariditate uexantur, utiliter ducis ad bal-
 neum & laues. Et illos qui ex frigore nimio &
 rigore stomachi laborant, potionibus eos cura-

bis, id est, antidoto quod dicitur diatriton pipe-
 reon, & ipso etiam solo pipere, & absinthio
 ponticū in aqua coctum dabis. Illis uero qui cō-
 gestione malorū humorum os uentris repletū
 habent, & ob id laborantes malsunt, & quasi
 submordentur, dabis aquam calidam multum
 bibere, & hydroleon calens copiosum, & facies
 eos uomere digitis uel pennis ori gutturiq; inie-
 cis. Si uero nō potest uomere ut solet uomere,
 oleum optimum dulce calidū dabis bibere,
 quia nō solum facit uomicam, sed etiam uen-
 trem soluit, & prouocat, aut certe si id nō ene-
 nerit, clystere super his uteris, & ita siue postuo-
 mitum, siue post uentris depositionem absin-
 thium ponticū in mulla decoctum dabis. De-
 inde etiam pinum ex aqua calida, & epithema
 aforis adhibe, quod confortare & corroborare
 solet laxatos, & nō in principio est hoc uten-
 dum, sed postquam os uentris uideris ab humo-
 ribus quibus uexabatur, purgatum. Non enim
 expedit medicaminibus constringi, cum adhuc
 humores intrinsecus, & nondum de ore uentris
 educti atque purgati, sed sufficit confricari tan-
 tum, & relaxari, ut supradictum est. Si uero in
 ipso uentre cōgestum phlegma mole abundan-
 tiæ suæ fatigationes & malfactiones fecerit, ut
 ris fomentationem olei multi coctio cum eodē
 absinthio. Deinde dabis mullam decoctionis,
 uel hyssopi, uel iris, & oxymel piperatum, nec-
 non & antidotū diatriton pipereon. Aliaqueq;
 talia dabis quæ possunt phlegma incidere & de-
 ponere. Diætæ eorum sit calida & sicca. Si uero
 ex nimio frigore malfactiones, uel angustia
 sunt similiter, ut bûlismos curabis, omnino ca-
 lefaciens eos intrinsecus & extrinsecus escis ca-
 lidis piperatis, & potionibus uini conditi, quos
 cum aqua calidissima perfricabis toto corpore
 contra focum, maxime manus eorum & pedes.
 Si autē nimio æstu, uel calore fatigati malsint,
 frigidis eos rebus refrigerabis, & corroborabis.
 Euenit maxime illis qui in aere angusto & of-
 focato, uel in balneo diu, & plusquam oportet
 morantur. Reficies ergo eos resumens mox in
 præsentia aquam frigidam in faciem rorando, &
 flabello uentrum facias frigidum, & abiges cir-
 cumstantes, ut liberi aeris foueantur aspectu.
 Manu etiam palpando pectus stomachumque
 perfricabis, & exclamabis interdum auribus, &
 cum redierint ad se, micam panis ex uino dabis
 frigido & congruis eos fescito escis. Illos uero
 qui seruire alicuius humoris uel dolore, uel ca-
 lore nimio febris malsunt, & angustiantur, qui-
 bus manus summæ pedesque frigesunt ut gla-
 cies, oportet fricari manibus calidis, & colligan-
 do manus, & crura, facias uigilare, & ab omni ci-
 bo & potu abstinere, & quæcūque his faciendū pu-
 taueris, festina ut ante paroxysmos, i. e. comotio-
 nes febris omnia facias. Illos etiā qui ex nimia
 siccitate

ficcitare uel ariditate deficiunt, mox in principio paroxysmi prouidendum, & maxime cognoscendum est, ut ante duas horas, uel tres quam incipiat paroxysmus, cibo refici, uel potu, & stringi uel teneri pedes eorum & manus iubeas. Quod cum factum fuerit non deficiunt, aut perirent. Oportet ergo escam etiam quam suscipiunt, facilem, leuem & digestoriam esse, ne granato stomacho grauius uexentur. Si uero ex malfactione febrienti periculum senseris futurum, scilicet prouidendum ad mortem magis quam ad uitam, tunc & uinum dabis, & maxime admixtam uino alicam coctam, uel granatam offeres. Item proderit etiam panis cum uino datus, ubi periculum graue non est, non oportet aegro uinum dari, sed sufficit malisgranatis, uel piris, uel malis refici, & confirmari eos uel aliquibus pomis stipticis cum alio cibo admixtis offerre sibi uirtute, & his adhibitis & sumptis fortiter tulerit impetum paroxysmi, & non fuerit ualde fatigatus, sufficiet eos tantummodo cibo refici, non utendo pomis. Hoc ergo age utiliter, cum cognoueris antea quæ futura sunt, ut modeste cures. Illis uero qui subito in hoc inciderint periculum, uinum dari, & panem calidum, & granata pariter utile est: sed per parum modicumque dandum. Nam si plus dederis quam possint, eis non mediocriter officit. Qui uero enfraxin patiuntur, id est, conclusionem pori alicuius uel membri necessarij ac uitalis & ob id malfiunt, atque angustiantes deficiunt, oxymel his dandum & scito, & positiones tales, hyssopum, origanum, & pulegium in mulla coctum, & cibos qui possint incidere & relaxare humores, & purgare atque aperire occultos & uiales meatus. Prodest his frictio atque colligatio summitatum manum. Utile est etiam his uti diureticis potionibus, hoc est, urinam prouocantibus, id est, anetho, feniculo, apio, petroselino, dauco, ameos, spicardi, & reliquis similibus. Ex quibus si uiderimus euidenter inuatos, & melioratos, uino postea reficiemus albo tenui perdigesto & ue-

teri. Quos quidem ex pulsū poteris manifeste cognoscere quia inæqualis & inordinatus maxime inuenitur in istis pulsus sicut in pectoricis in ante lassatis diximus, nisi quod in istis frequenter etiam dialipon inuenitur pulsus qui mortem significat, quod quidem in ratione pulsuum amplius diximus, pulsus discernere possumus.

Item de malfactionibus.

Nunc uero transimus dicere & de alijs malfactionibus quæ eueniunt, aut de euacuatione subita apostematis, id est, si quando se ruperit apostema, aut secantibus nobis euenit, uelut paracentesyn hydropicis, uel si de cathartico totum semel euacuatum fuerit subito malfiunt & deficiunt quasi morientes, & ideo non debemus in his talibus uehementer facere euacuationem sed de semel euacuare, sed partim & temperate. Proinde cum id congerit ilico odoribus bonis & delectabilibus releuabimus. Nec post multum de hinc temporis succis bonis, & escis reficiemus. Si uero ex inuicore nimio, aut gaudio, aut metu, aut iracundia, aut ex aliqua his simili ratione malfiunt odoribus primo adhibitis: De hinc narium occlusionem reconfirmabimus, mox etiam ut uomant imperabimus. Similiter etiam illis naribus ad præsens dumtaxat apponimus odores qui uulneri aliquo, aut dolore fatigati nimio subito malfiunt, uel nervorum, uel musculorum compunctione. Nam nervus si incidatur totus non dolet si pungitur grauissimos dolores facit. Postea eos congrua curatione, & diligenti curabimus, non aqua sed oleo fomentantes, nam mox putriet nervus si aqua tangatur. Coli autem & ilij, uel huiusmodi causæ ob grauissimum dolorem frequenter malfactiones atque angustia contingunt molestissimæ. Quas sedabimus fricando continuo loca quæ dolent, & pedum manuumque summitates blando more diutissime perfricantes.

F. I. N. I. S.

CONSTANTINI APHRICANI DE FEBRIBVS

L. I. B. E. R.

De ephemeris febribus.

Cap. I.



PHEMERA febris ex calore nascitur simplici, & spiritus sine materia, vel putredine calefit. Vnde fit, ut nō durer nisi die vna. Spiritus hi sunt: Vitalis spiritus, qui fundamētum est vitæ, & materia calor-
ris naturalis: Animalis, qui fundamentum est sensus & voluntarij motus: Naturalis item spiritus, qui fundamētū est quatuor naturalū virtutū, quæ sunt appetitiua, cōtentiua, digestiua, & expulsiua. Hæc febris duobus diuiditur modis. Vel enim ipsa est morbus, vel accidens morbi tale quale ex alio morbo consequetur. Si ipsa est morbus, fit ex causis tribus: Vna est qua corpus patitur extrinsecus, sicut calor est æstiu solis, & nenenum, & frigus nimium, & balnea aquarum, exteriora corpora suis miribus desiccantium, & oppilantium, sicut vitrea aqua, vel aluminosa, vel sulphurea. Secunda est motus corporis, sicut & labor & exercitia, ambulario nimia, & similia. Vel motus animæ sicut ira, cogitationes, tristitia, angustia, & similia. Tertia est consuetudo ciborum & potuum calidorum sanguinem calefacientium. Ephemera febris quæ accidens est interioris morbi, est febris apostema sequens inguinis & ascellarum & colli, & similia. Sanguis enim collectus in apostemate nisi cito dissoluatur, necesse est, calefiat, & putrescat, & vitalem spiritum calefaciat. Deinde cor calefcit propter coniunctionem arteriarum, & cordis, unde generatur ephemera febris. Hæ sunt causæ ephemeræ febris. Oportet vniuscuiusque causam dicamus, & significationes, & planissimas curationes. Intelligitur ergo febris ephemera, quæ est ex calore solis, quia capita corporibus sunt calidiora, & nimium dolentia, & facies est rubicundissima. Aliquando patiuntur calidum rheuma, & incendunt nares. Febris propter venenum, corpora magis quàm capita calefacit,

exteriora desiccant, & incendit, quia calor veneni desiccant humiditatem corporis. Febris ex nimia frigiditate mutat colorem, & aufert pulchritudinem. Mutatur enim in liuiditatem & obscuritatem, & sic extrinsecus corpus refrigerat, & desiccatur: Et in capite cum frigiditate grauitas sentitur. Febris ex stiptica & desiccantia aquarum balneis, cutem duriorē, & sicciorē reddit, quæ quæ ex frigiditate fuerit. Quæ cutis si manibus tangatur, apparet quasi infusa aliquandiu in gallia, & maligranati corticibus. Cum autem manus in corporis locis immoretur, aliquibus, expositione calefit sentiturque fumus à corpore exiens acutus. Febris ex cibis & potibus calidis, incendit sanguinem calore sui, & spiritum naturalem, qui par inhabitat, & ita calor cordis impeditur, & à corde per totum reliquum corpus diuiditur. Vnde urina & sanguis rubicundior est quàm in alijs ephemeris, quia urina & sanguis colamentum sunt cæterorum humorum, & quia calor est in sanguine, in statu sentiunt calorem in hepate. Febris ex labore corporis, corpus fatigatum, debile, & siccum facit, in articulis nimiam debilitat, & continuum dolorem. Sudor in statu minor est quàm in cæteris ephemeris febribus. Hæc enim febris cum declinauerit, dissoluit humiditatem de superficie corporis, sicut in exuritibus à balneis. Alij sudant sudore laudabili, & si non sudauerint, fumus de interiori corpore ascendit. Febris ex ira, intelligitur ex facie rubicunda, & egressione oculorum, & velocitate motus eorum, ac desiccatione palpebrarum, & fortitudine, & magnitudine pulsuum. Aliquando color citrinatur, & tremorem patiuntur. Quod fit, cum ira tremori permixta sit. Febris ex tristitia & angustia, oculos concauat, & inquietat, colorem aufert, corpus debilitat, pulsus subtiliat, urina fit acuta. Hæ significationes angustiosæ & tristes sunt, in omnibus angustijs qualescunque sint. Cum ergo medicus intellexerit, unde ephemera sit febris, ad curandum erit facilis. Et si ex calore sit solis, vel ex uenenis, bainendus erit in declinatione febris,

febris, neque tamen balneo debet immorari. Aqua tepida, & dulcis sit. Postquam balneum exierit, lecto flores frigidi, sunt apponendi, sicut niola, rosa, salices, psyllium, myrtus, & similia. Humectandæ sæpe sunt nares eorum cum oleo uiolato, tempora ungenda oleo rosato, & aceto. Fumiganda capita post febris declinationem cum tepida aqua, ubi niola & chamomilla sint coctæ. Si inquam rheuma non habeat, neque caput doleat. Si humores sint in capite, nimium caueantur hæc, & tantum nares fumo huiusmodi apponantur. Demus succum malignanati, cum saccharo, & sirupum album, rosaceum, & niolaceum. Nutriamus cum mica panis lota cum saccharo, & cucurbita, portulaca, cucumere lactucis, malis granatis. Post ablationem febris, perdicibus, starnis, pullis, & similibus. Si ex frigidityte nimia sit, apponatur post declinationem febris aqua ubi cocta sint chamomila, samfucus, anethum, basilicum, capite inclinato super horum fumum. Post balneum in aqua tepida, & dulci. Moretur plus in aere balnei quam in solio, quia calor huius aeris sudare facit, humectationem dissoluit, poros aperit. Si catarrhum habuerit, caueat fortiter balneari, nisi postquam catarrhum ad dissolutionem maturauerit. Odores odorifera, samfucus, sambucum, & similia. Calidis operiatur uestimentis. In usu habeat carbonum focum sine fumo, ut prohibeant frigiditatem aeris. Vngamus corpus cum temperatis unguentis, sicut chamomeleo, anethileo, iroleo, & similibus. Si febris ex stipticis sit aquis, & desiccatis corporis, oportet balneum prohiberi, nisi post declinationem febris. Cruraponamus in aqua ubi cocta sint chamomila, anethum, samfucus, & similia: fumum horum odoret. Post balneum faciamus, ubi eum suauiter fricemus; & cum aqua dulci & tepida fumigemus. Hoc enim cutem emollit, & poros aperit. Caueant unguenta in balneis, quia poros claudunt corporis, & fumum includunt in interiora, temperata hanc adiuuant exercitia, corpus dissoluentia, & poros aperientia. Viten tur cutem refrigerantia. Nutriamus cum diæta facile digestiua. Si hæc ex calidis sit cibariis & potibus, oxyfaccharum demus cum succo malignanati, sirupum album, & rosaceum doneamus. Post declinationem febris, demus trochiscos de spodio, uel de camphora cum sirupo rosaceo, uel niolaceo. Cataplasma superponamus epati, de portulaca, lentigine, atque psyllio, corticibus cucurbitæ, farina hordei, oleo rosaceo, camphora, & similibus. Nutriamus portulaca, endiuiâ, crysolocanna, cucurbita. Misceat aqua si fuerit cum sirupo de psyllio, uel malogranato. Si de labore sit corporis, oportet studeam eius quieti, & suauitati. Fricemus

eum suauiter cum oleo uiolaceo, siue rosaceo. Balneetur in temperato balneo, & cum exierit ungamus cum oleo rosaceo, & niolaceo. Nutriamus cum humidis cibariis, sicut pullis, edulis, & similibus. Si febris ex animato sit motu, contrariis ei repugnetur, ut anima mitigetur, & delectetur sermonibus, & actionibus, & diuersis musicorum generibus, & uidendis rebus diuersis & odoriferis, & pulchris formis, uel formosis puellis. Studeamus in humectatione corporis cum temperatis balneis. Vngamus postquam balneum exierit cum oleo rosato, & uiolato, neque moretur in balneo, neque appropinquet coitui. Nutriamus cum priuana, chrysolocanna, cucurbita, portulaca, bliatis. Febri discedente, demus pullos, perdices, starnos, phasianos, vinum temperatum. Odores sandalos, camphoram, rosam niolam. Vniuersaliter caueat desiccatiua. Vtatur humectatiuis, secundum ætatem, & consuetudinem sui, & tempora anni, & regionem, & similia. Si febris ista sit ex apostemate inguinis, uel cuiuslibet alterius loci, studeamus in medicandis apostematibus, quæ causa febrium esse videntur.

De causone. Cap. II.

CAUSON est febris, cuius signa sunt hæc, sitis nimia, & continua, calor incensius, & molestissimus, naturæ repugnatus, & ab initio corruptius, propter acumen materiæ unde generatur. Materia enim eius acuta est, ignea & cholericæ, in concauitate uenarum quæ cordi vicinæ sunt, adunata maxime in uenis oris stomachi, & concauitatis epatis, & pulmonis. Accidentia hanc febrem comitantia sunt hæc, calor nimius, sitis continua. Causa fortitudinis caloris in hac febre est cholera rubea intra uenas. Duricies & cōtinuitas ex plurima sunt cholera, in uenis cordi uicinis collecta. Quæ huius febris generatiua cum sit uenarum oris stomachi, & concauitatis hepatis propria, necesse est ut si ris confortetur & continueatur. Hæc febris duobus diuiditur modis: Vnus est purus & molestissimus, alius non purus, & minus molestus. Purus & molestissimus, de cholera rubea incensius, pura & acuta nascitur, & plurimum in iuuenibus, quorum complexio naturaliter calida & sicca est, & maxime in æstiuo tempore. Aestiuum enim tempus hanc confortat naturaliter, & augmentat. Alter modus non purus, neque adeo molestus, est ex cholera rubea citrina, cum humiditate mixta, & fumo nascitur. Quæ moderata sunt utraque. Cum hanc febrem molestissimam timor comitetur, oportet ab initio non negligatur. Sed studeat medicus ut quatuor eius tempora perfecte intelligat, & primo quoque operetur, secundum quod oporteat.

Si uiderit

Si uiderit in initio morbi, quia natura indiget ut purgetur & remoueat materia morbi, purget morbum & remoueat cum oxyfencicia, prunis, iuiubis, cassia fistula, manna, uiola, & similibus. Et si quid habeat contrarij, sicut defectio nem uirtutis & cruditatem, uel uiscositatem materiae, caueat quanto plus ualeat, ne in augmento morbi faciat, quia natura distrahitur & impeditur a regimento morbi. Sed oportet & notitiam, motus initium, eum non effugere, ut adiuuet naturam in regimento suae uirtutis, cum diæta ad digerendum facili, & in substantia laudabili, sicut ptisana perfecta, panis mica cum aqua frigida bis uel ter lota. Galenus ite in libro criseos innuit quomodo in acuta ægitudine infirmus debeat nutrir: In nutriendo, inquit, infirmo, intentio nostra triplex est in acuta ægitudine. Vel enim considerata est quantitas uirtutis infirmi, uel tempus infirmitatis, uel qualitas morbi. Quantitas uirtutis necessaria est, si bene custodiat: Virtus enim repugnatiua est morbi. Vnde aliquando plurimus datur cibus, cum defectio uirtutis ambigitur, neque tempus morbi consideratur. Quantitas temporis sciatur, & ut secundum uiciniam status cibum ordinemus. Verbi gratia: Si sit uicinisissimus, diæta subtilissima, & aliquando nulla dabitur: si remotus fuerit crassior, & paulatim secundum ordinem usque in statum subtiliabitur. Qualitas morbi est scienda, quia omnis febricitans liquida indiget diæta. Qui febrē habet corporis consumptiuam, querit habere quantitatem ciborum plurimam, & aliquando in tempore accessione. Quod si febris nullam quietem habebit, & infirmum nutrire necesse sit, eligenda est hora in qua sanus comedere solebat, & cōueniens diei tempus frigidum, ut potest aurora in qua natura est exercitata, aer subtilis, & clarus, & febris mitigata, quia frigida aurora calori febris repugnat. Hi sunt sermones Galeni in ordinanda diæta infirmi cum acuta ægitudine ad sit. (ij) apponuntur causa eius auro-ræ, quia autem causas ab initio usque ad finem est periculosa & molesta, oportet adueneri huic diætae subtili, ptisanæ, micæ panis aqua lotæ ter uel quater cum saccharo. Si febricitans sit, aqua detur de saccharo, mulla, suggat malagranata, uas hyemales, molliciem cucumeris, uel citruli, sirupum uiolatum, uel rosatum, & similia. In uespere demus, drach. 2. psyllii in aqua frigida loti, & drach. 1. feminis portulacæ. Si autem cibum oportet dari, mica panis lota danda erit in uespere cum malagranatis, & hoc sit cum mitigatur febris. Custodiatur autem quanto plus poterimus, ne detur cibus cum febris augmentetur, nisi necessitate maxima cogamur. Si digestionem sint stipticæ, molliantur cum succo cucurbitæ, manna, uiola,

cassia fistula, sirupo uiolaceo, & similibus. Quod si non ualeat, subpositura fiat de uiola, astro, scammosio, licio, & similibus. Et si hoc non ualeat, clystere faciamus de succo bliti, surfure, herba circondantem arborem, sicut hedera, uiola, malua, & similibus. Et in augmento febris studeamus, inanitione stomachi quantum poterimus, nisi aliquid impediat, sicut suspicio defectionis uirtutis in repugnatione morbi. Tunc enim aliquantulum recreandi erunt, cum diæta subtili, sicut ptisana, & mica panis lota, & demus parum quantum sufficiat uirtuti sustentandæ, & non plus. Si dolor capitis superueniat, oleum rosatum cum aceto dandum, & succus portulacæ. Vngatur his frons & tempora. Sternutationes faciamus cum oleo uiolaceo. Calcaneus & crura infundantur aqua tepida, & dulci. Post vngantur plantæ pedum cum oleo uiolaceo. Ligentur crura mollioribus panis. Cataplasmetur frons, & tempera de fandalis, & rosa, hordei farina, cum aqua rosata, temperata, uel succo cucurbitæ, uel portulacæ. Vigilijs infirmo ingruentibus, iungendum est huic cataplasmati feminis lactucæ, & papaueris, quam temperanda sunt cum succo lactucæ. Si siccitas sit in ore, & asperitas in lingua, lauentur utraque cum psyllio, & semine citonij, & oleo uiolato. Si autem cor tremat, psyllium demus cum succo cucumeris, & sirupo de iuiubis, uel sirupo de uis agrestibus, uel acetoso de pomis citrinis. Cataplasmetur de sandalis, farina hordei, & succo cucurbitæ, uel aqua rosata, temperatis. Quod superponendum est stomacho exinanito. Nutriendus est cucurbita, portulaca, lentibus mundatis. Hæc omnia coquantur cum aceto uasarum agrestium, & amygdaleo, & similibus. Apponantur ei frondes myrti, salicum, & similia. Hanc febrem patientes, plurimum incidunt in phrenesim: Quibus medicandum sicut in prima particula diximus. Similiter tussim siccam, patiuntur ictericiam. Quæ sunt medicanda sicut diximus per singula sua loca.

De tertiana febre. Cap. III.

Tertiana febris quam *apax* dicunt Græci nascitur ex chymis cholericis immutatis & putrefactis. Sed tamen si putredo sit extra uenas uel arterias, generatur tertiana interpolata cum rigore & tremore. Quod si putredo intra uenas sit uel arterias, concreatur uel tertiana continua, uel causos. Reprehendimus tamen a quibusdam nobis obiectantibus. Vnde, inquit, tertiana uel causos conueniunt, uel dissoluantur. Quibus respondebitur. Conueniunt, quia materia una, id est, cholerici humores sunt, & intra uenas ac arterias concreunt & continuant.

sunt. Differunt secundum locum, ubi humores non conueniunt. Incessioniones enim caulis in uenis cordi sunt vicini, maxime uenis oris stomachi, & hepatis, & pulmonis, specia- lius quam in aliis locis corporis. Incessioniones tertianæ continuæ in omnibus uenis totius cor- poris æquales sunt. Intelliguntur autem ter- tianæ continuæ tribus modis uel de re naturali, uel de re non naturali, uel de re cōtra naturam. Verbi gratia, quia plurimum in æstate nascun- tur, maxime si aer sit calidior, & siccior, & com- plexiones regionis similes sint, & exercitia in- firmorum dum sani fuerint, in nimio labore, siue fatigatione. Vel de re naturali, quæ plurimū in- nascuntur quibus cōplexiones calidissimæ, & siccissimæ dominantur, maxime si corpore sint macilentiores, pori rari, ætatē annorum 22. us- que ad 36. Vel de re extra naturam, id est, de- cidentibus infirmo, & significationibus medi- co. Quia autem hæc febris de humoribus na- scitur cholericis acutis, necesse est semper se- quatur rigor nimius quasi punctura spinæ uel acus. Acuta enim illa materia sensibilibus mē- bris est uicina. Quæ cum estuat & membra pun- gat sensibilia, acumine sua puncturam, & tre- morem generat, cum nō in usu habeatur, quod sit, cum hæc materia extra pulsum & arterias sit. Proprium autem huic febrī cholericus uo- mitus, digestio tincta, maxime in tertia perio- de, uel in quarta. Urina eorum rufa, uel ignea, subtilis. Sæpe quoque febrem acutam habent, & in hepate puncturam, propter cholæræ & san- guinis mixturam. Quod si sit uera, duodecim tenet horis, & dimittit horas 36. & in periodo finitur 7. id est, diebus 14. quod si 12. excesse- rit horas, neque diē finitur 14. intelligitur non esse uera. Hæc ergo cum non sit uera, & cum alia sit mixta, transit prædictum terminum, & diutius durat. Aliquando in autumno incipiens, & in uere finiens. Quia in febribus molestius est genus putredinis. Vnde oportet cauere ne res dentur calidæ, ne forte cholera rubea cum acumine suo cerebrum ascendat, & apostema faciat, & inde infirmus phrenesin incurrat. Quæ febris timidior est & molestior, quia cholera ru- bea ex mobilitate sua, & uelocitate cum suo acu- mine non patitur peccare infirmum, nec errare medicum. Vnde oportet medicum morbi præ- uidere initium, ut si uirtus infirmi sit idonea, hu- mores furiosi, & mobiles, pharmacia detur de prunis, oxytencicia, uiola, myrobalanis citri- nis, calsiastistula, manna & similibus. Demus hæc secundum uirtutem & ætatē. Detur & succus malignanati, & quædam cathartica in li- bro nostro iam præscripta, quæ cholæræ rubeæ sunt purgatiua. Cauendum tamen ne in diē ac- cessionis dentur, ne forte natura impediatur, in morbi repugnationibus. Detur ergo in diē ac-

cessionis succus malignanati cum sirupo uiola- to, & psyllium cum sirupo rosaceo. Vitetur er- go cibus in accessionis temporibus, nec etiam detur aliquid tribus horis præcedentibus, sed sustentetur cum sirupo rosato, uel uiolato, usq; post abscessionem febris. Deinde detur in ue- spere prisana, & panis cum saccharo lotus. Si sint stiptica, neque cathartica ab initio eis, sicut diximus, possint dari. Cum quædam nos impe- dient, utpote corruptio aeris, uel defectio uir- tutis, demus in diebus dimissionis oxytencici, mannâ, calsiastistulam, sirupum uiolatum. Si autem digestio non humectetur, subpositura conficiatur, cum uiola, scammonio, nitro, li- cio. Similiter & clystere faciamus de prunis, iuiubis, uiolis, surfure, hordeo mundato. Cu- stodiamus diē 7. quasi diē accessionis, ut in- ueniat diē 7. eorum corpora mundificata, & præparata ad obediendum naturæ, in morbi re- pugnatione, neque impediatur cibo, uel me- dicamine aliquo. Si autem infirmus in augmen- tatione febris murmuret de siti, & siccationibus laborum, uel palati, demus psyllium in aqua cucumeris, cum oleo uiolaceo. Similiter suc- cum malignanati. Misceatur aqua bibenda cum sirupo uiolato, rosato, iuleb, & similibus. Ces- sante autem incensione, & febris mitigato acumi- ne, si murmuret de punctura stomachi, danda est mica panis, bis, ter lota cum saccharo. Nutrien- dus est autem chrysolocanna, portulaca, mal- ua, cucurbita, & similibus. Quæ omnia coquan- tur cum amygdaleo. Ista tamen facienda, cum febris cessare incipiat. Si caput doleat, super frontem & tempora ponamus oleum rosatum cum aceto. Nares humectandæ cum oleo uiolato. Si uero capite desiccato phrenesin inci- derit, sternutatio fiat cum oleo uiolato uel ro- sato, & lacte mulieris puellam nutientis. Ca- piti raso infundamus lac, & aquam tepidam, uel papauer, & lactuca sint cocta, uiola, & si- milia. Pedes & crura ponamus in aqua tepida dulci. Deinde cum oleo uiolato calcaneus, & plantæ pedum ungantur. Si uero septimo di- uomitus, uel digestio supernenerit, sponte ex- actione naturæ, non erunt stringenda, sed di- mittenda quandiu uirtus id pati ualeat. Danda calorem stomachi mitigantia, & sitim extin- guentia, sicut sirupus malignanati, uel rosatus, uel oxyssaccharum. Ponendum in aqua biben- da spodium, sandali, semen portulacæ, & si- milia. Si enim egestio augmentetur, & de defe- ctione uirtutis dubitemus, ad extinguendam fe- stinemus cum sapa myrtina, uel citonia, tro- chiscis de spodio, & sicut diximus in diarrhæa, uel dysenteria. Similiter si ictericiam incide- rit, medicabimur sicut in suo capitulo diximus. Iungat autem siue muniat medicus, secundum quod ex necessitate eogetur.

De synochis. Cap. III.

Quia sanguis omnibus naturaliter temperatior est elementis, & saporosior, atque uicini-
 or humanæ complexionis, inde & naturæ fa-
 miliarior existit, quem fecit materiam nutri-
 menti totius corporis. Sed tamen si quantita-
 tiue augmentetur, & qualitate mutetur, di-
 mittitur à natura, neque regitur, negans ad se
 attinere eum, sicut pater inobedientem sibi fi-
 lium. Remanet ergo crudus, & indigestus,
 exiensque temperamentum, necesse esse putre-
 fiat, generatur febris quæ synochus uocatur, &
 est continua, quia sanguis naturaliter intra ue-
 nas est & arterias, quæ semper sunt uix ad om-
 nia membra corporis. Galenus in libro de fe-
 bribus, diuidit febrem putredinem dupliciter.
 Altera enim est cum putredo intra uenas est, &
 arterias: altera uero cum extra. Dixit ergo de
 priore, quia continua sit ex necessitate. Quæ ue-
 ro extra arterias & uenas erit, interpolata. Na-
 scitur item de puro sanguine febris acuta, cum
 intra uasa non tamen putrefactus calefiat. Hinc
 febris est proprium inflari, quia sicut diximus
 de puro sanguine nascitur, cuius in corde & pul-
 mone, plurima est uirtus. Vnde calor inflatiuus
 ab antiquis ista febris uocatur, quia causa eius
 inflationis, calor est pectoris, siue pulmonis.
 Differunt autem nascens de sanguinis putredine,
 & quæ nascitur de eiusdem ebullitione, quia
 prioris fecet urina, pulsus est diuersus, quia
 constringi se uult magis, & sæpius quàm dila-
 tari, propter festinantiam naturæ in expellenda
 fumosa putredine. Alia huiusmodi nulla habet
 accidentia. Quam signa præueniunt, eam fu-
 tura prænuntiantia, antequam appareat, fati-
 gatio, grauitas membrorum, plenitudo eorū,
 rubor coloris, calor superficiiei corporis. Hæc
 autem signa sequuntur eam, dolor capitis, in-
 censio sui, & grauitas, tumor temporum, egres-
 sio oculorum, paruitas sitis, stupor assiduus,
 imaginatio rufa ante oculos, pulsus fortis, &
 uelox, urina rubicunda sicut uermiliosa. Plu-
 rimū hanc sequuntur uariolæ. Quod cum sit
 ante statum morbi oportet de uirtute infirmi
 perquiri, & ætate atque complexionem, tempore
 & aere, & consuetudine. Quæ si conueniant, &
 uirtus maxima plebotomandus est infirmus, &
 de sanguine quantum sufficiat auferatur. Si au-
 tem morbi initium propter nimium sit cibum
 quem comederit infirmus, & adhuc in uentre
 sit coadunatus, oportet ut in secunda die, uel
 in altera suspendatur phlebotomia, quatenus
 in digerendo cibo confortetur natura, & à uen-
 tre excludat. Quod si non fiat naturaliter, fa-
 ciāmus nos artificialiter. Si autem nulla horum
 conueniant signa, nisi uirtus sola, scarificemus,
 & non phlebotomemus. Omnibus uero alijs

congruentibus, sola tamen uirtute dissonante,
 neque phlebotomari, neque scarificari, est ne-
 cesse, quia uirtus sola semper morbo repugnat.
 Vnde semper est inuestiganda, & obseruanda,
 & confortanda quoque, & pro posse nostro
 adiuuanda. Si autem obuietur phlebotomia
 quibusdam ex causis, quas debemus dicere, ca-
 ueatur maxime in statu, uel augmentatione, &
 si uirtus uideatur cōgruere. In his enim duobus
 temporibus uirtuti non cōfidimus, adeo laborat
 in morbi repugnationibus. Oportet ergo ex-
 tingui calorem, & acumen sanguinis, cum psy-
 llo, succo maligranati, sirupo, uiolis, sirupo de
 prūnis. Quod si digestio obuiat, erit humectan-
 da cum oxyfenicia, cassia fistula, manna, uiola,
 & similibus. Si habent in pectore antiquam
 tussim, uel febris superueniente palsionem no-
 uellam, demus iuiubas, uiolas, semen portu-
 lacæ, & similia. Nutriatur cibis lenibus diges-
 tione in substantia laudabili, sicut psisana, huius
 panis mica. Si autem sanguis non sit choleri-
 cus, uel nimis acutus, uenter ab initio hume-
 ctetur, sicut antea iam diximus. Si hoc non
 proficit, subpositura fiat, & clysterizemus. Ca-
 piti dolore superueniente, oleum apponatur ro-
 satum cum aceto. Nares humectentur cum
 oleo uiolato, pedes & crura aqua imponantur
 tepida, ubi chamomilla, uiola, & similia sine
 cocta, ligentur etiam crura mollibus pannis.
 Dolore non cessante, & catharro, uel tussi ca-
 rente pectore, lac mulieris, uel a sinipum, capiti
 infundamus. Laueturque cum aqua, ubi hor-
 deum, uiolæ, & chamomilla sint cocta. Strenu-
 tatio fiat cum oleo uiolato. Angustia uero uel
 incensione superuenientibus, psyllium demus,
 & succum maligranati, & sirupum rosatum, &
 similia. Si mente stupeat, & oculos aperire
 non ualeat, cessandum est à supradicta capitis
 medicina, & pedes prædictæ aquæ infundi suf-
 ficiat. Nutriendus est maligranatis, & pane
 lecto. Si autem cardiacam palsionem incident,
 cataplasma stomacho debet superponi, de san-
 dalis, farina hordei, rosa, camphora, & aqua
 rosata. Sanguine de naribus effluente, super-
 ponantur temporibus, & fronti cataplasmata
 in cardiacam dicta. Si autem necesse sit in fine huius
 febris, extinguere quod remaneat incensio-
 nis, demus hoc electuarium quod probauimus.
 Recipe spodij, sandali citrini, seminis portula-
 cæ, succi liquiritiæ, ana drach. 3. seminis melo-
 nis, cucumeris, cucurbitæ, mundati, ana drach.
 2. dragaganti, gummi arabici, amyli, ana drac.
 1. camphoræ, cubebæ, ana scrup. 1. conditi
 drach. 6. fac pulnerem, & tempera cum oleo ro-
 sato, dans drach. 3. multum enim ualet.

De febre quartana. Cap. V.

Febri quartana de putrida nascitur cholera nigra, quæ si sit intra uasa, generatur cum rigore quartana, quæ uocatur continua. Si extra uasa, generatur interpollata. Vera tamen quartana uiginti quatuor tenet horis, intermittens quadraginta octo. Quæ signis tribus, sicut & tertiana intelligitur, id est, renaturali, & non naturali, atque extra naturam. De re naturali, quia plurimum patiuntur hanc qui complexionem habent frigidam, & siccam, ætate senes, maxime frigidi & macri, & sicci, subiles uenas habentes, & cauas. De re non naturali, sicut temporibus anni, si sit autumnus, & aer frigidus, & siccus tunc fuerit, & regiones similiter. De re extra naturam, ut in initio accessions cum materia incipiat putrefieri, nimius erit rigor, laboriosus corpori, frangitius ossuum. Cholera enim nigra quæ huius febris est materia, propter suam frigiditatem & crassitudinem per sensibilia membra effluens, grauatur, fatigatur ea, & frangitur. Color febrientis liuidus est, cutis sicca, huic febrili durities & dolor splenis propria sunt. Urina in prima febre alba & aquosa, in declinatione & cessatione, materię digestio nescit nigra. Quæ de pura nascitur cholera nigra frigida est, & sicca. Et item cholera nigra quæ de incensionibus est aliorum humorum, sicut sanguinis, cholera rubea & phlegmatis. Oportet suis proprietatibus unamquamque discerni, ut medicamina sua ordinentur singulis. Dico ergo. Si significationes dictæ de pura cholera nigra dantur intelligere, regatur infirmus cum cibis digestilibus, & diureticis, sicut succo scariolæ, marathri, api. Quæ omnia coquantur & colentur, cum oxymelle aromatico, & melle rosato. Apozema detur de radicibus, cum sirupo, de absinthio. Purgetur quæ materia cum uomitu paulatim. Incitetur sudor cum chamomeleo, anethileo, calamenthaleo. Non purgetur corpus in principio febris cum uirtutis in declinatione febris, & apparentibus signis coctionis, cholera nigram oportet purgari cum pharmacia, & clysteri huic humori proprijs. Deinde demus trochiscos de eupatorio, de rhenbarbaro, uel de aniso, sicut in quinta diximus particula cum sirupo de squinato, uel de calamentho, uel cum apozemate de radicibus. Aliquando autem in fine febris huius demus theriacam maiorem, & diacyminum. Caueamus tamen medicinam hanc in ætate, calida regione, & in iuuenili ætate. In hyeme ergo danda, & regione frigida, ætate uetula, atque complexionem frigida. Vitanda sunt & refrigeratina, quia crudificatur materia, & prohibetur digerenda, unde diuturni morbi fit causa. Quæ quartanam si tertiana antecedit, & infirmus in

uenis existat, macer, & cholericæ complexionis, cui urina rufa sit, uel ignea, sitis nimia, & uigilia, tempore anni ætate, natura aeris calida, & sicca, intelligitur hæc febris esse de incensione cholera rubea. Unde in primis medicabitur cum refrigerantibus, sicut succo maligni, & oxysaccharo. Si sit stipticus, cum prunis, manna, uiolis, humectetur, & similibus. Quæ si non sufficiant, clystere est faciendum. Si autem materia digeri incipiat, demus catharticum cholera rubeæ incensæ purgatiuum sine labore, sicut pruna, oxysencia, manna, & similia. Demus malagranata, uuas, portulacam, blitum, chrysolocannam. Balneetur aqua tepida febre cessante, & aqua ubi cocta sint chamomila, & melilota, uiola, & similia. Toti corpori post balneum epithima faciamus, cum uino uiolæ, & oleo. Si hanc febrem morbus sanguinolentus præcesserit, & complexio infirmi similis sit, uenæ quoque plenæ sint, urina rufa, crassa, sapor more dulcis, somnus multus, tempus uernale, intelligendum est febrem de incensione sanguinis esse. Danda ergo digestibilia, & materię suæ calefactione excoquentia, sicut oxysaccharum, prisana de hordeo cum saccharo, mel uiolatum, succus scariolæ. Infirmi pedes & crura, ponantur in aqua calida, ubi chamomila, uiola, sint cocta. Si moueatur uomitus in principio accessions, cum rigor inceperit, demus malagranata. Misceatur aqua bibenda cum oxysaccharo. Materia digesta & excocta, phlebotomemus de basilica, uel de media, ut sanguis crassus & incensus exeat. Similiter & pharmacia est danda, sanguinis subtiliata, & suæ incensionis extinctua. Si autem hæc febris 20. dies transierit, abstinendum est infirmo de cibis omni die accessions, in alio uero die parum comedat. Si hanc febrem morbi phlegmatici præcesserunt, & infirmus senior fuerit, cum complexio frigida, & humida sit, tempus hyemis, pulsus tardus, urina cruda, crassa, uel alba, sitis parua, intelligitur esse febris de incensione phlegmatis. Dandus est in initio succus scariolæ, marathri, api, quæ omnia coquantur, & colentur. Detur autem lib. s. cū 20. drac. mellis rosati uel uiolati. Si autem sint stiptici, moueantur cum pharmacia, siue clysteribus phlegmatis dissolutiuis. Incitetur sudor cum calido epithimate & diuretico. Abstineant a cibis in die accessions, nisi cum uirtus defecerit, neque pati possit. Deinde parum comedant, uinum bibant subtile, & clarum, & in calore temperatum. De uolatilibus comedat, quæ carnes habeant teneras, & ad digerendum facillimas. Manducent lotum cieer cum blito. Caueant omnia refrigeratina. Post cibum accipiant diacyminum, diatriopipereon, dianisum. Vtilis autem uomitus cum radicibus, & frondi-

frondibus; & anetho atque oxymelle, & aqua calida. Sæpe accipiant theriacam magnam, & diacostum, diarhenubarum, diasulphur, & similia. Febri cessante iam per tres hebdomadas, nutrantur cum pullis phasianis, & perdicibus. Post dies autem quadraginta annualem comedant agnum. Sumantque medicinam semper diureticam & principalium membrorum confortatiuam.

De quotidiana febre. Cap. VI.

Febri uero quæ quotidiana uocatur, de putredine humorum phlegmaticorum nascitur. Antiqui uero concordant omnem materiam phlegmaticam, cholicam, siue melancholicam, putrescentem ebullire, & inde calorem & febrem contereare. Idem facit & phlegma. Si enim putrescat, & sit intra uasa amphemerina continuam generat, sine rigore. Si sit extra uasa, sit amphemerina interpolata, 24. tenens horas, & 6. dimittens. Quæ tribus ex signis intelligitur, sicut & cætera, id est, re naturali & non naturali, & de re quæ est extra naturam. Re naturali, quia plurimum nascitur complexionem frigidam & humidam habentibus, & ætate senioribus, uel pueris ex copia phlegmatis. Senioribus naturaliter; pueris uero, accidentaliter: De re non naturali, quia plurimum in hyeme fit, & in uere, & in regione naturaliter frigidis & humidis, maxime si in sua sanitate quiescerint, uel suauiter uixerint. De re extra naturam, quia hanc febrem semper rigor nimius sequetur, ut totum corpus congeletur, maxime extremitates. Putrescente aut phlegmate, calor paulatim sentitur ascendere, & febrem lentam facere, sed tamen diuturnam. Hæc febris semper famulatur dolori stomachi, quia phlegma plurimum in stomacho regnat, maxime in ore eius. Vnde & phlegmatici humores euomuntur, & infirmus subtiliatur, facies tumet, color plumbinus, uel liuidus est, os humidum habet, non sitit. Vnde oportet medicum inuestigare naturam phlegmatis, unde sit ista febris. Quoddam enim phlegma ueraciter frigidum, & humidum est, quæ species naturalis est, nascens de colamentho sanguinis. Quoddam frigidum & grossum est, sed humidum minus, sicut acerosum phlegma nascens ex magnitudine frigoris, in colamentho sanguinis. Vnde si quis uideat ægotantem, sitim patientem, & siccum os habentem, de falso phlegmate intelligitur esse. Danda ergo sunt oxysaccharum cum aqua calida. In hora accessions perdes & cura eorum ponamus in aqua calida, ubi chamomilla, anethum, uiola sint cocta, frigemus pedum plantas cum sale, & oleo uiolæ. Si uomitus ueniat spontaneus, in initio

morb, leuitatem & subtilitatem materiz portendit. Quod si non ueniat, non artificialiter fiat, quia morari uomitum in principio morbi, crassitiem materiz, & coagulationem denunciat, & ad digerendum tarditatem. Danda oxysaccharum cum aqua calida, quia multum ualeat in febris ista, quia dissoluit materiam, & subtilizat. Post danda ptisana cum oxysaccharo, ut digestibilis uenter fiat: uel artificialiter cum pharmaciaz, uel clysteri. Si de inflatione, & gurgulatione intestinorum murmuret infirmus, & de stomachi abominationibus, materiam dissolutam, & subtilitatem ad exeundum intelligamus. Vnde natura cum leui cathartico siue pilulis est adiuvanda, in expellenda illa materia. In stomachi abominationibus uomitus cum leuibis est incitandus. Si autem in uirtute deficiat infirmus, ut catharticum non possit suscipere, laborandum est leuiter in subtilianda materia. Et ista faciendæ sunt secundum materiz naturam, & membri, ubi illa regnat materia. Vt si sit materia phlegmatica falsa, & circa hepatis, tunc detur medicina mundificatiua, repati propria, quæ cum urina superfluitatem eius expellat: sicut trochisci de spodio, de camphora, de sandalis, cum oxysaccharo. Si phlegma sit acetosum, dentur trochisci de rosa, de berberi, de aniso, cum scariolæ, marathri, & apij succo, & cum oxymelle. Sic medicandus est, per unam septimanam. Si autem febris diuturnior fiat, dandum est apozema de radicibus, & sirupus de squinanto, sirupus de absinthio. Si materia sit in stomacho de phlegmate acetoso, detur in morbi initio mellicratum aromaticum, uel oxymel cum aqua calida. Nutriatur cum ptisana, cum corticibus marathri, & apij cocta & cum oxymelle. In hora accessions cum iam rigere inceperit, incitetur uomitus, cum oxymelle & aqua calida, ubi anethum, & radices sint coctæ. Perdes imponendi sunt aquæ calidæ, ubi cocti sint chamomilla, anethum, melilotus, samfucus, abrotanum, & similia. Demus mel rosatum cum aqua calida, & materia iam digestionem immutata, demus apozema de aloem, uel de hierapicra, uel de absinthio, siue de pilulis aureis. Quæ si uirtus infirmi pati nequeat, dentur trochisci de eupatorio, de absinthio, de rheubarbo, cum apozemate de radicibus, & oxymelle. Incitetur uomitus in initio accessions, neque comedat, nisi febris molestatio quiescat, ne subtilibus distretur, ne uirtus infirmi deficiendo molesteretur. Apparente autem signo decoctionis in urina, calefaciamus, & fumigemus stomachum cum rebus calidis sicut nardileo, masticheleo, anethileo, absinthileo, & similibus. Fumigemus cum aqua calida, ubi coctæ sint chamomilla, spica, mastiche, absinthium, & similia. Cataplasmata ponenda sunt super stomachum

chum calida moderate, & odorifera. Aquā bibendam miscemus odorifero uino, & mellis crato aromatico. Demus stomachum confortatio sine cibum seu potiunculam. Hæc enim febris propria est oris stomachi.

De synocha febris. Cap. VII.

Synocha febris ex multitudine sanguinis oritur, cum sanguis quantitatem, & qualitatē suā naturæ supergrediens, ab ea quasi derelictus, putrescit, ex cuius putredine febris synocha nascitur, i. continua. Hoc autē duobus modis est, alia ex putredine sanguinis nascitur, alia uero de nō putrefacto sanguine oritur. Quādo ex nō putrefacto sanguine, hæc signa habet, urina rubra est & nō putrida, nullā habens hypostasim, nec foetorem, clara. Vultus ægri inflatus, uenæ plenæ, oculi quasi sanguinei, pulsus plenus, sapor oris dulcis, homo pilosus, crassus, niger, rubens tempore ueris, diæta calida, & humida. Si uero de putredine fiat, urina eius turbida, spumosa, rubicundissima, pulsus plenus, sapor oris dulcis, pulsus maior in constrictione, quā in dilatatione, & oculi tumidi, nullam habent requiem, angustia, sitis non magna cutis quasi humida, grauitas totius corporis. Hoc & omni die melioratur, aliquando autem peioratur quotidie, aliquando eodē morbo usq; in finē manet. In primis sanguis detrahatur de uena mediana, aut hepatica, dextri brachii, secundū uirtutem, si tēpus, & ætas, & uirtus permiserint. Deinde super latus dextrū impone epithima, de succo solatri, farina hordei prius assati, & puluere rosæ, aut sandali rub. & albi, cāphoræ, & aqua rosata. Mane & sero fomentabis pedes & crura in aqua calida, in qua cocta sunt uiolæ, rosæ, lactucæ, maluz, papauer, & hordeū, post fomentum, ungantur plantæ, pedum, ex oleo rosaceo. Si nō dormiunt, pannus infundatur in oleo rosaceo, & aceto, & capiti, & tēporibus imponatur. Vel hoc: Rec. psyllij. unc. 2. spij, drach. 2. rrito opio, adhipe psyllium, & moueatur cum pistillo, deinde mitte tantundē aceti, quod tribus digitis superemineat, & moue donec coaguletur. Iterū secundo moueatur cū aceto ut coaguletur, adiuncto pauco oleo rosato, uel uiolato, cū pāno aqua infuso, & cataplasmate ei induscto, fronti imponatur. Hoc sæpius fac. Si sitis aderit, detur aqua cucurbitæ, cum psyllio, uel mane accipiat de elacterio prunorum, cum syrupo acetoso, & aqua frigida, aut ex oxyœnitijs, aut succo solatri, aut ptisana. Cibus eorum sit mica panis lota, in aqua frigida, ter uel quater de cōdita cū saccharo pruna, mala siriaca, uæ mediz maturæ, malagranata, pisces aspratiles in aceto cocti. Hoc tantum in aurora & extremitate diei

comedatur. Si uenter est constrictus, soluat, cum electuario, & scammonia.

De synochis. Cap. VIII.

Synochi ex sanguine, & cholera nascuntur, ergo phlebotomari debet, prima uel secunda die aut multū in tertia. Si masculus, de dextro brachio: Si fœmina, de sinistra, & si uenter est constrictus, clysterizabis ita: Catabræ, & maluz cū oleo, & aqua coquant, & colatis per linteū utantur. Si desiderauerint balneare, pmittantur & utantur fomento superiori. Cibentur succo pri sanæ, & molli faræ, malis matianis, uel siriacis, & pane in aqua. Potione rosatā quā in tertiana scribemus, sub lingua teneatur, & succū eius liquefactū trāsglōtiatur. Vngamus frontē oleo rosato, epithima p̄cordiis imponamus: Rec. oli bāni, mastichis, ana. unc. r. croci hortulani, unc. s. uitellæ ouorum assatorum, prout uideatur. cum oleo rosaceo, & modico aceto, confice & utere. Item oleum rosatum cum succo portulacæ, aut cucurbitæ, aut berberis, p̄cordiis inungimus. Detur succus oryzzæ, uel alicæ. A uino omnino abstineant, mulla tamen mellis attici detur.

De causone. Cap. IX.

Causon est acutissima febris ex cholera rubra, quæ non differt à tertiana acuta, quæ intra uasa est, nisi quia acutior est, & breuior. Sitis continua, lingua sicca, in quibusdam nigra, urinæ ignea, pulsus uelocissimus, uigiliæ, & synopsis. Purgentur cum cathartico, & nō cum phlegmatico, cum tamarindis, prunis, & cassia fistula. Sed quia calor in causone acutior est, eo quod fit in synocha, laudo hoc dari debere: Recip. tamarindi, unc. drach. mittantur in aqua melonis palestini die ac nocte, deinde manibus fricati colentur, & bibantur. Si deest aqua illa, mittatur, in aqua prunorum rubeorum nigrorum, uel in aqua solatri. Si sitim habuerint, bibant psyllium, ter lotum in aqua, utantur succo malignanati, & cucumero palestino. Si patientur ardorem & cardiacam, da cum supradictis succis, uel aqua, trochiscum de camphora, uel de sandalis. Apponantur in stomacho cataplasmata de sandalis rubeis, rosas, farina hordei, & aqua rosata, uel succus semperuiuz, & portulacæ, olei rosacei, solatri, ana. unc. r. aceti, unc. s. farinæ hordei, unc. 2. rosæ, unc. s. sandali, drach. 3. Aliud: Cum aqua rosata detur psyllium, si sitim habent maximam, & intolerabilem, detur aqua cucurbitæ cum succo psyllij, uel cum syrupo uiolato, uel rosaceo, uel cum psyllio, uel sine eo. Si habent tremorem in corde,

accipiant aquā tamarindi, cum psyllio cocto cum saccharo. Si tussim non habent, uel solutionem, da eis quod utilius est. Recip. pruna sicca, mittantur die ac nocte, in aquā calida, & fricentur manibus. Si uenter sit solutus naturaliter, uel artificialiter, & febris non minuat, mortaliter est.

De tertiana febre. Cap. X.

Tertiana feb. alia contigua, alia nō cōtinua. Continua in hoc differt à causone, quia calor eius unoquoq; die tertio, in eadē hora qua incepit, accepit, & in 12. finitur, & calor eius quāuis uideatur descēdisse, tñ manet, licet non fortis existēs, usq; in diē tertium. In tertio uero die ad eandē horā incipit ascēdere, & manet in feruore usq; ad 12. horā. Hæc curatur sicut causon. Si uero nō sit cōtinua, cum uomitu curatur facili: Rec. seminis atriplicis, unc. 1. & s. Tritum in raro panno missum, & in aqua calida mollicatur, fricetur in eipho. Lac uero quod egredit, sumatur cū syrupo acetoso, uel semē infundatur in aqua, in qua coctę sint radices cucumeris agrestis, uel cū oxymelle, uel si tēpus est cōtrariū, purgetur cū aqua in qua nocte & die posite sunt unc. 2. mirobalani citrini, & unc. 2. tamarindi, si difficilis sit, unc. 1. & s. uel secūdū quod uides. Si autē febris permaneat, da rubeam. Si priores purgationes secūdū uomitū facere nō potueris, purgatur cū laxatiuo prunorū cum scāmōnio aut mirobalani citrini succo, & tamarindi. Cibetur quotidie pane, & aqua, aut mica panis lota in aqua & saccharo. Accipiant fructus quos diximus in synocha, & diatā supra. Etā scariolā cū aceto. Cibus autē det tribus aut quatuor horis, ante accessiōē. Omni die ante aurorā, dabis elect. de prunis, cū syrupo acetoso, aut cū succo solatri. Rubrica tertianæ probata: Rec. opij, unc. 4. croci, anisi, cardamomi, storacis, hyoscyami, baccarum lauri, añ. unc. 1. Cōfice aut cū melle, da 2. uel 3. horis, ante accessiōē, in modū fabæ cum farina, q. acceptū in intima, mox febrientē liberat. Si autem propter hoc nō liberat, & tertiana notha fuerit, & uomitu eguerit, misce mel, & acetū, quibus admisceatur semē atriplicis, drach. 3. potuique dentur. Si constructi fuerint, puluerem uiolæ, drach. 4. bibār, interpolata die, cū frigida aqua, & utatur hoc epithimate: Rec. farinæ hordei, drach. 2. & sicca rosæ, unc. 1. sandali al. unc. 5. spodij, drach. 2. cāphoræ, scrup. 1. tēperetur cū succo solatri, & quasi unguento utatur & desuper cum pāno ponatur. Bibant autē quotidie suc cum malignanati, & mane, & post 7. dies, si urina fuerit ruffa, & turbida, & nihil superiora profuerint, balneo utetur, & fometetur ex aqua &

oleo & post fomentū phlebotometur media uena dextri brachij. Tertiana si duplex fuerit, utatur hydrocypion cum balsamo & rubea & mufa, ut portione una. Diata utantur ut supra. Prodest & tertianæ triasandali, & rosata simplex, quæ recipit rosæ, unc. 4. seminis melonis, liquiritiæ, dragagari, succi liquiritiæ, añ. unc. 2. seminis citroli, unc. 1. croci, unc. 5. mel. ros. & aquā rosatā. Cibus dabis succum oryza, aut alicæ, ius gallæ, pisces saxatiles, poma frigida. De oleribus, lactucas cum aceto, portulacæ, solatrum. Omnes cibus frigidos, parum salitos dabis, post aquam frigidā & mullam de rhodomelle, & si solutus fuerit, citonium mel cōfectum ita: Rec. succi mali citonii, partem 1. melius, partes 2. coque lento igne ad spissitudinē mellis, & exinde mullam dabis. Epithima ad idem: Rec. mastichis, scenugræcum, thus, linisemen, farinā hordei, croci æquali pōdere, trita, ita distemperentur, cū uittello onorum, & oleo rosato, qđ hoc modo cōficitur: Oleum & rosas cum humore suo, in uas uitreū simul mitte, & in puteum, aut in aquā uinā pone per dies 20. postea sustollens inde, pone ad solē, diebus 9. & sic in umbra reponē, hoc oleum frigidissimum est. Si ignea febrē hoc oleo unxeris amputare solet. Si autē tertiana in autumnno uenerit, purgabitur cum diateffaron, distēperato cum uino calido & cū rubea atq; mufa. Cibi dandi sunt temperati, ut far & similia, & granum bonum bene coctum, atriplices, spinachia, pisces squamosi.

De quotidiana febre. Cap. XI.

Quotidiana ex phlegmate nascitur, & hæc intra uasa, & extra uasa. Quādo est intra uasa facit calorem cōtinuum, sine frigore. Quæ autem extra, calorem facit cū frigore. Quādo uero ostenditur ex phlegmate falso, calor ex eo erit maior, frigus paruus, sitis magna, & cito curatur. Quādo autem sit ex acetoso, e contra contingit. Quādo autem ex dulci phlegmate somnus ex ea erit longus, stupor, sitis parua, urina grossa, media inter citrinum & rubicundum colorem, uultus humidus, uenæ grossæ, pigritia, sapor dulcis, & fastidium. Si igitur curanda, detur aliquid maxime pro materię ratione. Si acetosa contingat materia, diacostum, uel diatricon pipereon, cum syrupo acetoso, cum aqua diurerica factō, & cum eadem bibito, & hoc 4. uel 5. diebus. Deinde dabis uomitū, si facilis sit ad mouēdū, & tempus, & uirtus cōueniat, q. his moueatur: Rec. thapsiæ, partē 1. croci, partē 5. cinnamomi, unc. 3. da cum oxymelle, scrup. 2. Si deest thapsia, da electuāriū cū oxymelle, pōdus, scrup. 2. uel secūdū uirtutē, uel da picrā cū scāmōnio. Si nec hic definit

definit febris, da ei mulfam. Si uero fuerit ex phlegmate falfo, da eis picrā mixtā cū triphera, uel cū diadamaſceno, & ſcāmōnio, aut cū picra & ſcāmōnio, & ſero caprino. In ſui tollēda da ei mulfam, mel roſatū, aut ſirupū cū calida. Quotidie mane ſumant ſirupū acetosū, aut oxy mel cū ſucco ſcariolæ aut ſolatri, aut cū ſucco ſcniculi, coctis, & deſpumatis ante tres horas acceſſiōis, uel ſumat de rubea in modū fabæ, cū frigida. Dieta ſint piſces ſaratileſ, marini, rubella, & ſquamoli cocti cū aceto, cymino, cinnamomo, & pauco adipe: poma, pruna nigra & rubea, granata, pira, poma matura, uua duraciæ, cucurbita cocta cū cymino, & ſpica. Nō comēdāt niſi 6. horas ante acceſſionē. Si aut de phlegmate acetoso, uel ſanguineo quotidiana fuerit, magnū habebit frigus æger, cū pauca febre, dolorē in ſtomacho & uomitū. Hanc itaq; curabis ita: Purgetur cū picra, uel theodoriton. Sumant quotidie mane aut diacalamēthū, aut theriacā magnā, aut noſtrā, aut mithridatum, aut rubeā, aut adrianū cū oxymelle ſcillitico, cū ſucco ſcniculi, & apij, coctis, & deſpumatis, & colatis, aut oxymelle ſcillitico cū aqua in qua cocta ſūt radices ſcniculi, apij, petroſelini, ſcariolæ, & ſemina eorū. Cibi eorū ſint ſcariolæ, borrago, ſcniculū, lactuca, cū eruca, paſtinaca, porri cocti, ius ciceris, uinū rubeū, aut citrinū, aut aureum, hordeum, far, piſces marini, petroſi, rubellæ, & ſquamoli, cocti cū uino, & aqua, anetho, apio, cymino. In tēpore acceſſionis pedes mittantur in aqua calida, in qua cocta ſunt pulegium laurus, & nepita, plantę pedū fricentur cū oleo, & ſale, & aqua calida. In balneo ſumāt rubricā cū oxymelle ſcillitico, & ſuccis pſcripiſis, aut aqua prædicta, aut theriacā in modū auellana. Si magnū ſit frigus, ungātur renes eorū iuxta ignē cū oleo in quo coquatur ſemen ſinapis, piper, ruta, & radix cucumeris agreſtis, hoc fiat aliquantū ante tēpus rigoris. Vel aliud, pyrethrū tritū cū fortifſimo uino, coque ad tertiā partē, & poſt rātū de olei adde. Si ſine frigore ſit, detur picra ſarpius. Si cū typo fuerit quotidiana, deſ potio rubea mixta cū hydrotopion ante 1. horā uel 2. acceſſionis, poſtea bibāt aquā frigidā. Si uero frigus magnū fuerit, uinum uel aquā dā calidā. Si hæc nō pſunt, accipiant mulfam. Si ſtomachus plenus humoribus fuerit, ut uomant, detur oxymel, quod ita ſit: Rec. acetū phialas 2. mellis unā, ſeminis radices, ſaſani triti, ſeminis atriplicis, ana unc. s. coquātur ad mediū & bibant ante acceſſionē, & ieiunēt hora una poſtea. Si uero ſic nō uomuerint, accipiat aquā calidā. Cibus detur ius gallinæ aut far cū oleo: hæduli dētur, phiaſiani, turdi, perdices, fiſcedulæ, aſpratiles piſces aſſi, aut elixi, mala citonia, uua, mala granata, uinū leue & albū. Si in æſtate acuta fuerit quotidiana, & habuerint urīnā turbidā ex ſanguine p-

cedentē, primo nel tertio die, uel uſq; ad 7. mane phlebotoment. Cibus datur priſana ſuccus, q̄ cōficitur ſic ex hordeo purgato: Hordeū purgātū miſſum in aqua nocte una tundatur, & ad menſurā unius phialæ, mittat in aquæ phialas 16. & coquant cū lento igne ad tertiā partē, & p liſteū colentur. Vtantur molli farre, malis ſyriacis, aut dulcibus amygdalis, & pane in aqua. Si quotidiana admiſceat tertianæ, detur rubea & hydrotopion in potione unā, & utātur. Si nō pſuerit, theriaca magna detur. Si quotidiana in tēpore ueris fuerit, curabitur potione rubeæ. In cibo accipiat gallinas, & omnia uolatilia, uinū albū, & leue, far, cicer, betas, ſcniculū coctū, piſces aſpratiles. In æſtate eadē in oībus, obſeruet curatio. In autumno ſi ſine typo fuerit, ſimiliter curabitur. Si aut cū typo, uomitus puocetur ut ſupradictū eſt, aut cū aqua calida & oleo, aut cū oxymelle ſimplici, ut mel, & acetū. Et ſi fuerit cōſtrictus, oxymel catharticū dabis, quod ſit ita: Mel & acetū, & elactery, unc. i. hoc deſ ſecundū uires ægri. Cibus ut ſuprà utantur. Si aut ſolutus fuerit, damus cibos ſtipticos, & potū ſimiliter, ut uinū græcū coctū. Si uero ſuo tēpore uenerit, aut cū typo, aut ſine typo, primo catharticū dabis, ppter phlegma deponendū, & oēs potiones calidas, ſ. diacalamēthū, picrā, adrianū, mulfam, athanaſiā, hydrotopion, & calida. Cibus autē ſupradictos pānos uero impone extra, oxyra croceū mixtū cū ceronio: Cataplaſma uero quod recipit hæc: Micas panis, fel terræ, æquali pōdere, cōſice cū onno molli cocto aſſo, & oleo cypriano aut laurino, & pāno inductum ſuper uiſcera impone, pbatum eſt. Experimentum ad quorū dianas: Recipe zingiberis, unc. 2. cinnamomi, unc. 1. laureolæ, unc. 3. mellis quancū ſatis eſt.

De quartana & cura eius. Cap. XII.

Quartana ſit ex melancholia, aut cū frigore, aut ſine frigore. Hanc calidus & acutus pcedit morbus, atq; cholericus, ut cauſon, uel tertiana. Aut ſanguineus, ut ſynocha: aut phlegmaticus, ut quotidiana. Similiter & poteſt cōtingere in quotidiana, & tertiana: Vnde ſi hæc febrē cholericus morbus pceſſerit, dietā & frigidā curā dabis, cū aquā calidā mixtā. Si aut ſanguinolētus, curet cum eis q̄ conueniunt ſynocha, mixtis cū eis medicinis quæ conueniunt quartanæ. Cauſa uero quā tertiana uel cauſon præceſſerit, ita curabis, purgentur cum picrā, aut cū mirobalanis citrinis, uel ſero, cum mirobalanis, & ſumulo: Vtantur ſirupo acetoso cum mirobalanis, uel cū ſucco apij, & ſcniculi, aut cum aqua quam ſcripſimus in quotidiana. Si aut quartanā nulus morbus præceſſerit, in principio tribus diebus iunctis dabis theriacā magna in modū auellana cū oxymelle ſcillitico, & aqua quā ſcripſi-

mus in quotidiana: Aut cū succo sceniculi, & apij, coctis & colatis, postea dabis lazatiuū pī-
cram, aut theodoron, aut hieralogodion, aut
drach. 3. epithymicū sero & scāmonio, drach.
s. aut uomitū superius scriptū, aut uinū in quo
prius infusum est elleborū albū, drach. i. & s.
Purgato corpore, fac tinā aqua plenā, in qua
sunt cocta anethū, nepita, pulegiū, laurus, &
abſinthiū. Intretur in ea sequenti die quarta-
nē, & intus bibant theriacam magnā cū oxy-
melle scillitico, & succis supra scriptis, aut
aqua prafata. Si non habes theriacā magnam,
da nostrā, aut diateſſaron, aut adrianū, aut ele-
ctuariū diatrion pipereon, aut diapyretubrū. In
die accessionsis nil manducet, sed duabus horis
ante tempus accessionsis intrēt balneū, & in eo
accipiant theriacam magnā ut dixi, aut rubeam
cū uino odorifero. Exiens autē ungat. renes cū
oleo in quotidiana. scripto. Si uult manduca-
re in nocte, uel tranſactis 6. horis, post acces-
ſionē manducet. Si cū typo fuerit quartana, &
in æſtate, ante accessionem, dabis potionē mu-
ſam. Si fuerit in hyeme, utantur emplastro pau-
lino, & portione diaſyluiō, & unguento dial-
thea. De cibis utantur rapis coctis, porris, tar-
re, cicere, carne porcina, agnina, gallina, & pe-
dibus porcinis, malis citonijs, & uino medio-
cri. In duplici quartana, da adrianū tempera-
tū cū balsamo, dicta uero ut supra. Si quarta-
na uenerit in tempore ueris, curabitur cū po-
tione ſancti Pauli portione, & cū muſa ænea.
Ungatur dorsum ex ſinapi ante accessionē. Ci-
bos damus duos & ſtipticos, aut ut lepores,
phaſianos, perdices, anates, anſeres, cicet be-
ne coctū, granū, fabas bene fractas, ſceniculū,
capita raparū, intras agreſtes coctas, potrū, vi-
num rubeū, & forte nimis. In æſtate uero cura-
bitur cū portione rubea mixta cū theriaca mun-
diſſima, & cū uino bene temperato. Fumigiū
faciamus ex ſpolijs ſerpētis, & pelle uiuuli ma-
rini. Ungamus autē totum corpus de unguen-
to marciaton viridi ante horam accessionsis ad
ignem donec fudet, & præterita hora accessio-
nis, cibos damus ut supra. In autumno cura-
bitur cum portione muſæ mixta cum hydroto-
pion, cū uino forti tepido, & ante horam acces-
ſionsis dabis aquam calidā cōdicam cū pipere,
cymino, ruta, & uino forti, & melle. In hyeme
curabitur cū portione muſarū, adriano, diacala-
metho, & trochiscis, q. ad quartanariū dicuntur
eſſe probati, quos in fine huius libri ponemus:
petroleū etiā bibere dabis, & ungāmus dorsū,
& ſtomachū eorū, cū unguento dialthea. Quo-
tidie calidā bibere dabis, & cibos prædictos.

De hæmitritæis febribus. Cap. XIII.

Hæmitritæus fit ex mediā tertiana, & media

ephemerina, & ideo grande frigus. Acredinē
enim cholera retinet phlegma. Pigrizia autē
phlegmaris retinet & excitat cholera, & ideo ſi
cōmiſceantur multas accessiones faciunt, &
dicta fractus hæmitritæus. Nam ſi eſſet in-
ger hæmitritæus, tunc cholera & phlegma ſunt
æqualia. Vno die fit una accessio, alia altero.
Hi hiera purgentur. Quod ſi negligatur, hy-
dropici ſiunt. At ſi cholera incenditur in ſyno-
cham conuertetur, uel lethargiam. Amplius.
Hæmitritæus fit ſecundū quosdam ex materia
cholericā extra uafa, & phlegmate intra uafa,
utriſq; uinis quantitatis exiſtentibus, ideoque
hæc febris curari debet cū medicinis inter cali-
da & frigida exiſtentibus. Vnde ſi materiæ eo-
rū ſunt eiſdē quantitatis cōretur cū rebus at-
tenuantibus & diſſoluentibus, nec frigorem nec
calorem facientibus, ſicut cum lupulo, ſucco
marathrij, apij, māna, uiolis, ſaccharo, piſana,
oxymello. Quod ſi cholera ſit maior, fit febris
faciliōris & leuiōris curationis, & cū mundi-
cantijs cōretur, & modice refrigerantijs, ſicut
candinia, & rodofaccharo, uiola, ſaccharo, mā-
na, prunis, piſana, & cū oxyſaccharo. Si autem
phlegma domineſcit, hæmitritæus erit moleſtiōr,
curatur cū medicinis diſſoluentibus, & aliquate-
ntia calefactiuis, ſicut melicrato cū calida, ſiru-
po abſinthij, piſana, in qua cocta ſit radix apij,
marathrij, anethi, calamēthij. Oxy-mel quoq; pro-
deſt, & trochiſci de roſis, uel de berberis cū ſuc-
co marathrij & oxymelle. Mel roſatū cū maſti-
che, aniſo, marathro, & aqua calida. Cūq; ma-
ria cōpetit adtenuari, & moueri, & ſignū deco-
ctionis in urina apparuit, da ſuanē pharmaciā.
Vomitū prouocabis poſt cibū, dabisq; diureti-
cā, ſicut trochiſcos de abſinthio, uel de lacte cū
ſucco marathrij, endiuiz, & apij, ana drac. cum
tepidā. Pilulæ ad hoc ualentēs: Rec. hierapicræ,
calamēthij, ana drac. 5. aniſi, marathrij, apij, ana
drac. 3. tēpera cū ſucco apij, cū tepidā da. Aliud:
Rec. hierapicræ, calamēthij, ana drach. 5. aniſi,
marathrij, apij, ana drach. 3. ſucci eupatorii, ana
drach. 4. fac trochiſcos cum ſucco ſumuli, da
drach. 3. cum calida.

De hæſtica febre. Cap. XIII.

Hæſtica ſi ſit ſimplex, & corpus eſt humidū,
immundū humoribus, maxime putredini præ-
paratis bene curatur ſi cauſa p cōtrariū expellat,
ſicut triſtitia cū læticia, ira cū paciētia. Similiter
& ea eſt in corporibus mūdis, cū cōtrarijs cure-
tur. Sed in priori poſteaquam cauſa ſit expulſa,
per cōtrariū pellatur materia putredini præ-
parata, cū medicinalibus herbis & mundificanti-
bus, abſq; calore, & ſiccitate ſicut cū ſucco lu-
puli, & rhodofaccharo, uel uiolaſacchara, mi-
ropalano, māna, caſia ſiſtula, uiolis & ſimilibus
mixtis.

mixtis: Purgata materia ordinetur aer, locus, indumentis, cibus, & potus, odor & cataplasmata. Aer frigidus constituendus est. Locus septentrionalis. Indumenta frigida, sicut lana uetusta infusa rosis, sandalis, & aqua rosata. Cibi frigidi calorem extraneum extinguentes, & confortantes naturales, sicut prisanā, panis ter lotus in aqua frigida, uel infusus in uino albisimo, & bene comestito. Lactuca cum oleribus dentur, portulaca, cucurbita, betę, & triplices cōditę cum amygdaleo. De fructibus ista, utraq; malagranata, melones palestini, cucumeres, mala maciana, mala citonia, pira, uę passę, hyemales, & similia. Sirupus granatorum uel albus. In aqua cocta, quā bibiturum fuit, mittant, spodiū, & bolus, uel semen portulacę. In pauimento sternalent frondes, & flores frigidi, ut salices, myrtus, uiolę, & rosę. Dabis trochiscos de spodio, & bolo cum prædictis sirupis, & aliquando psylliū. Si egestio humida sit, dabis quę caueant solutionē. Si hyems fuerit nō morietur, nisi forte nimis sit frigida: Pannis igitur operiant. Si uero sit æstas, in frigidetur aer & humectetur. Domus sit spatiosa, & septentrionalis portę, in pauimento sternalent frondes & flores salicū semperuiua, rhanus, iuncus, rami uitii, & similia, & aqua paulatim super ea fundatur. Non autem habentibus humores putredini præparatos, ungatur cutis cum succo lactucę, portulacę, succo uinę acerbę, uel solatri, cum oleo rosato nō tamē super pectus ponantur. Quod si mixta sit cum putrida, aut cum morbo in nobili membro existēte, ut in diaphragmate, & pulmone, cum diurna tussis, sit, hepatisq; dolore & similibus, malū signum. Caveas aquā frigidā & unctiones, nisi apostema habeat, propter quod est febris calidissima. Si apostema uero nō sit calidissimū, caveas aquā frigidā, quę omni hæctica nocet. Virtus reparetur cum cibus & potibus, facile digestilibus, & uelociter nutrientibus, & multum. Vnde Hippoc. Facilius est repleti potu quā cibo. Nō tamen purum accipiat neq; tenue uinū, neq; sumatur multum, & subito, ne cito exeat, neq; nimis sit grossum. Cibus sit mediocris, facileq; nutritas, aliquantulę grossitici participas, ut permanens in membris nutriat, & confortet, ut uinū aliquantulū grossum, lac, prisanā, & similia. Cumq; hæctica febris & cessauit, & nō indigent alio, nisi ut corpus augmentetur, sumatur mane lac caprinum, ita: Lac statim emulsum cum tantundē aquę calidę mixtū ad suauē ignē coquatur, quousq; tota aqua consumatur. Deinde potui detur calidū, adeo ut ab uberibus multum fuerit. Quo bibito, expectent quousq; digeratur; deinde sumāt, starnos, perdices, pullos gallinaceos, & similia, cum uinū coquantur. Vinum album & ponticum mediocriter mixtum dabis. Quod si nō potuerint solum lac bibere, misceatur cum hordeo similia triticea, & similibus, secundum quod uides

inde digestiua esse robusta. Hi uero quibus humores fuerint immundi, ab his se abstineant, & sumant solum prisanā, panē lotum, maxime si egestio eorum sit cholericā. Nā febre permanente, nō cōcedatur perdices, starni, lac, & uinū poticum. Cum autē febris discesserit, lauentur in balneo tepidę aquę temperatum aerē habente, & calor aquę sit quasi calor lactis cum ab uberibus egreditur. Balneum uero mansioni eius sit uicinum, in lectumq; ducantur ne deficiant. In fonte diu moraturi sint, eo quod aqua fontis humectat eos, & uirtutē confortat. Fons autē sit speciosus, & uicinus ostio balnei, ut nō laborent ad eū cundo, ne parua eorū humiditas desiccetur. Aqua temperate sit calida, quia si calidior sit quod oportet, coadunatur cutē & eā indurat. Si frigidior sit quod oportet, debili tribuet frigiditatem, & calorem naturalem extinguet, & cutem oppilat, cum & in his pori aperiri, & cutis debeat mollicari. Ar nō magis aperit poros, quā aqua temperate calida. Nā membra delectationē hnt in ea, natura excitatur, seu per omnia membra diffundēs, eo quod cōgaudet consimili, i. calori aquę. Eo uerso agitur in contrariis, quia cum odio habeat nociua, fugit ad interiora corporis. Vnde cutis sanguinem & naturalem calorem amittens, patitur in cute rigorem, & oppilationem, & duritiam. Præterea in balneo morietur, donec cutis rubea, & aliquantulum tumida cœperit fieri. Tunc extrahatur a balneo, postquā tumor discedat, ne ultra manentes desiccantur. Ut igitur caro augatur, maneat in balneo donec cutis & tumescere & rubicunda cœperit fieri. Si autē aliquis uult attenuari, post prædictum tumorem, adeo morietur in balneo donec tumor prædictus prorsus discedat, quia tempus istud est strictum, caue ne modus prætermittatur, maxime si caro fiat augenda. Verus igitur terminus erit tumor. Si aliquis magis morabitur, ad deterius ibit. Exeuntes balneū, ungantur cum frigidis unguentis, uel oleis frigidis & humidis. Balneent igitur mane prius, quā accipiant escas, uel lac, uel prisanā. Secundo die uespere, postquā hæc sunt digesta. Lac uero priusquā in fontē ingrediatur, super egrum emulgeatur. In aqua fontis mittantur lactuca, uiolę, & similia. Post balneū, sumant lac asinum, calidum ut emulsum fuerit. Cumq; lac fuerit digestum, iterum balneum ingrediantur. Tertio etiam si usus eo fuerit, ingrediatur balneum. Caveatur tamen hoc si febris adsit. Mora tamē unius balnei ab alio, sit quinque horis. Postea cœnetur perdices, pullos gallinaceos, & alias gallinas. Caveant tamen hæc si febrem habeant. Caue quoq; ne eos grauet cibus. At quia lac solutionem facit, calidus lapis bis uel ter extinguatur in eo, & ita detur. Confortata autē uirtute, da cancos cum similia uel hordeo coctos.

BERGORDONI

DE FEBRIBVS

LIBER



Quid sit febris.

Cap. I.



FEBRIS est calor innaturalis mutatus in igneum. Calor est ibi loco generis, quia omnes febres conueniunt in calore: Innaturalis dicitur ad differentiam naturalis, qui est cōseruatiuus: Febrilis autē est cor-

ruptiuus mutatus in igneum. Istud est loco alterius differentia constitutiuā: quoniam quolibet mutatio cum intensiōe caloris, non facit feb. sicut patet in calore generato propter irā, aut exercitium. Sed quando mutatio est magna, tunc laeduntur operationes sensibiliter, & pro tanto dicebatur mutatus in igneum. Bene igitur dicebat Gal. febris est calor innaturalis mutatus in igneum. Nunc autem cum feb. sit propria passio cordis, corde superaccenso & inflammato, spiritus, qui à corde procedunt unā cum sanguine, transeunt ad totum corpus, & calefaciunt ipsum vniuersaliter superius & inferius, exterius & interius, nisi accidentaliter impediuntur, ut in lipparia, & similibus: Et quia feb. omnibus morbis molestior est, sicut scribitur à Gal. suo 8. de ingenio sani. ideo à febre dignum duximus inchoare. Nunc autem triplex est feb. in genere: Ephimera, cuius subiectum sunt spiritus: & putrida, cuius subiectum sunt humores: & Hectica, cuius subiectum sunt membra solida. Februm autem sicut aliorum morborum 4. sunt tempora, scilicet principiu, augmentum, status, & declinatio. Qui autem differentias constitutionis generum, & specierum feb. scire uoluerit, & cognitionem temporum morborum, prout distinguuntur ex parte digestionis & parozysmorum, uadat ad librum nostrum de prognosticis. Ibi enim cum auxilio diuino fideliter aggregauimus dicta Hippocratis, & Galeni, & Auicē, & aliorum. Nunc autem intentio nostra est à febre ephimera inchoare.

De febre ephimera.

Cap. II.

Ephimera est feb. ex distemperantia spirituum

procedens, ultra diem tertiam secundum suam naturam non se extendens. Circa istam materiam quinque sunt intelligenda. Primum erit de causis ephimeræ: Secundum de signis: Tertium de prognosticis: Quartum de curatione: Quintum de dictorum clarificatione.

Licet enim secundum Auicē, causæ ephimeræ sint multæ, sicut est fluxus superfluis, coitus, ira, crapula, fames, uigilia, syncope, & multa alia consimilia, omnes tamen ad quatuor causas reduci possunt. Prima igitur causa ephimeræ sumitur à causis extrinsecis actus, uel potentia, calefacientibus, uel poros claudentibus, sicut est caliditas solis, aut ignis, aut balneum, aut stapha cum rebus calidis, aut balneum sulphureum, aut aqua frigida. & breuiter omne illud quod claudit poros & retinet uapores. Nunc autem intelligendum est, quod secundum diuersitatem uaporum & corporum, diuersæ febres generantur: quoniam si corpus est plethoricum, calidum & siccum, & uapores calidi & sic retinentur propter pororum clausuram, & similia, tunc de facili ephimera generatur. Si autem corpus sit cal. & humi. & uapores calidi & humi. retinentur, tunc de facili febris putrida generatur. Secunda causa ephimeræ sunt cibi, potus & medicina calidi, sicut est uinum purum, forte, antiquum, gallia, capra, pipere, euphorbium & similia, potissimè in non consuetis. Tertia causa est motus animalis & corporalis, sicut est exercitium & similia. Quarta causa est apostema in inguinum, axillarum & similia, & si sint aliæ causæ, ad istas possunt reduci.

Signorum ephimeræ quædam sunt generalia, quædam specialia. Generalia sunt ista: ephimera enim non uenit à causis antecedentibus, sed à primitiuis, & ut plurimum non uenit cum rigore: pulsus & urina modicum distant à naturali: calor in tactu non est pungitiuus, nec mordicatiuus, nec multum lædens tactum, sed est sicut calor naturalis, uel irati, aut illius, qui multum laborauit, & ut plurimum terminatur cum sudore humoroso naturali. Et dicit Aui. quod si ponatur in balneo, & non eueniat aliqua horripilatio, tunc est signum ephimeræ. Signa autem specialia sunt ista. Si autem ueniat propter

per solem & similia, tunc est caput calidum, oculi calidi tanguntur, facie & cutis, pulsus accedit ad uelocitatem. Si autem proueniat propter frigiditatem, mutatur pulchritudo coloris faciei, & transit in luorem. Si autem ex stypticis & oppilantibus prouenerit, cutis sicca inuenitur, calor occultus, & si diu teneatur, sentitur calor acutus. Si autem uenerit ex cibis & potibus calidis, sentitur caliditas in regione hepatis, & urina est tincta. Si autem uenerit ex labore, fatigatione, debilitas est in toto corpore & dolor in iuncturis. Si ex ira, oculi sunt eminentes & facies rubicunda. Si ex tristitia, oculi sunt concaui. Si ex uenenis, interiora inueniuntur calida, intensa & desiccata. Si ista signa specialia non sufficiant, recurramus ad indicia patientis. De causis primitiuis non est multum curandum, quoniam ingenia curandi morbos non habentur ex causis primitiuis, sed ex morbi essentia, membri natura & similibus, sicut testatur princeps medicorum Gal. 3. de ingenio cap. 3. licet aliqui magnam credant philosophiam inuenisse, si per signa corporis possunt in causas primitiuas deuenire: tamen ad curationem non faciunt, bene faciunt ad notitiam. Ut uerbi gratia, ponamus nos, quod cutis patientis ephimeram, est dura & aspera, frigida & oppilata: morbo igitur cognito oportet me calefacere, subtiliare, ex quacunque causa fuerit, siue propter sumach, aut gallas, aut alumen, aut balneum aquæ frigidae, aut nivem & similia. Postquam igitur morbum cognosco, curare possum quæcunque fuerit causa primitiua. Non igitur ualent ad curandum, licet ualeant ad cognoscendum: quoniam postquam scio, quod aliquis balneatus est in aquis stypticis, tunc scio quod pori sunt iam condensati &c.

Febris autem ephimera, secundum Auic. est facilis curationis & difficilis cognitionis. cognoscens igitur poterit prædicere, hæc febris erit bonæ terminationis & uelocis: quoniam ephimera de natura sua non durat, nisi per unam diem naturalem, & pro tanto denominatur ab ephimero Græcè quod est piscis Latine: ille enim piscis illa eadem die, qua oritur, eadem moritur. Ita est de ista febre. de natura enim sui non durat, nisi per 24. horas, tunc terminatur cum sudore naporoso non plurimo. Sed propter malitiam regiminis & naturam corporis, aliquando extendit se usque ad quatuor dies inclusive, ultra autem non est ephimera. ideo si post statum non quieuerit, pul. sit diuersus & urina indigesta, signum est transitus in putridam: potissimum cum fetore eorum quæ egrediuntur à corpore. Si autem corpus est siccum & aridum in tactu, timendum est de hectica. Non autem febris ephimera negligatur, quia propagines malas gignit.

Patientes ephimeram quoad curationem, in multis conueniunt. In primis quod detur cibus facilis digestionis, sicut est hordeatū, pul. li parui, uinum album, cum multa aqua, & quod non uratur aliquo cibo donec in declinatione feb. Attamen aduertendum est secundum Gal. 8. de inge. quod in extenuatis, aliter est operandum. Si enim inueniatur cholericus extenuatus, qui laborauit, & fuit in sole calido, & similibus, & incurrat se. nullo modo est triduanum ieiunium imponendum, sed statim cibus est exhibendus, aliter caderet in hecticam aut in mortem. Virtute igitur constante, non cibetur nisi in declinatione. Conueniunt balnea, quoniam in declinatione feb. possunt omnes balnari, nisi quod cauendi sunt qui ad feb. putridas sunt parati, sicut oppilati, repleti, crapulati & patientes catarrhū, nisi esset catarrhus adustius, sicut dicit Auic. quia in tali catarrho posset fieri balneum in declinatione. Cura tamen specialis potest esse, quia aliter in calidis, aliter in frigidis, aliter in oppilatis, aliter in non crapulatis, & ita de alijs. Si igitur aliquis incurrat ephimeram propter causas calidas, uratur frigidis potissimum in capite, si uenerit propter solem, iram & similia. Si fuerit catarrhus, Recip. rosarum ru. electarum lib. s. zomnium sand. ana unc. s. chamomillæ. un. et aquæ fontis lib. s. aquæ ros. nnc. 3. aceti unc. s. bulliant leui inundatione, & recipiat fumum. Si autem fuerit dolor capitis, calor & instantia uigiliarum, tunc Recip. se. papaueris al. drach. 3. olei ros. unc. 2. aceti, aquæ ros. ana unc. 1. succi lactucæ, portul. ana unc. s. misceantur lento igni sicut decet, & panni intincti fronti & temporibus applicentur. aer domus infrigidetur cum multa aqua, salicibus, aceto, nenuphare & similibus. locus autem sit subterraneus, non rheumaticus, & portæ sint ex parte septentrionis. In declinatione autem feb. balneetur in aqua dul. ubi sint rosæ, chamomilla, nenuphar & melilotum, deinde cibetur cum hordeato, aut auenato, aut amydo, aut paruo pullo & similibus: utatur uino debilissimo cum multa aqua: & totum infrigidatum in medio profundi putei aquæ hauribilis, deinde dormiat & quiescat. Si autem fuerit propter frigiditatem & pororum clausuram, ponatur in domo temperatè calida, temperatè modo cooperiatur, suauiter fricetur & in declinatione. Si est cum oppilatione, fricetur & sudet in aerè calido, postea ponatur in aqua ubi sit chamomilla, melilotum: deinde cibetur ex auiculis minutis, aut pullis, & uino, nisi esset timendum de forti oppilatione cum plenitudine corporis. Et intelligendam est, quoniam ubi est fortis oppilatio & plenitudo, & timemus de feb. putrida, tunc est facienda phlebotomia. Regulariter autem in aliqua ephimera non competit

petit euacuatio, nisi in crapula, aut fortiter op-
pilato, aut repleto. Si fuerit ephimera propter
cibos cal. ponantur frigida supra regionem he-
patis, si cum rheumate, suffumigetur caput cu
thure in plus, & rosas in minus. Si ex ira, iniun-
gatur mansuetudo. Si ex tristitia, lætitia & simi-
lia indicantur. Si ex fame, detur cibus tempe-
ratus, sicut oportet. Si ex syncope, conforten-
tur membra principalia, & infra de aliis per co-
ntarium reducantur. Sed quia ephimera cum
oppilatione frequenter ducit ad putridam, ideo
phlebotomentur, deinde fricetur, postea stu-
pherur & fricetur cum farina hordei, cicerum,
fabarum & nitri. Et si accideret quod patere-
tur aliquam horripilationem in balnea, non
stet ibi ictu oculi, sicut dicit Auicenna. Si autem
aliquis fuerit crapulatus, & postea exercitet se
fortiter, aut stet in sole calido, si uenz sint stri-
ctæ & eructatio fumosa, timendum est de fe-
bre putrida, sed raro accidit in eructatione
acerola: tamen si cibus est in stomacho, fiat uo-
mitus: postea si uenter non est laxus, fiant sup-
positoria aut clysteria: deinde in declinatione
balneetur, postea cibus detur: quoniam in ephi-
mera, longa abstinentia competit ei ex crapula
nauseatiua. Materia digesta, potest fieri phle-
botomia: febre autem absente, confortetur di-
gestio stomachi, cum diatrion pipereon: den-
tur sibi pulli & pisces petrosi. crapulato autem
& nauseato, melior est medicina, si superue-
niat fluxus uentris spontaneus. Si autem fuerit
propter apostema emunctoriorum membro-
rum principalium, aut furunculos, aut scabiem
& similia, præcipiatur abstinentia, phleboto-
mia, pharmacia, & curentur illa, sicut debent
curari. Curatio autem ponetur in suis locis.
Et quia rarissime uocatur medicus propter
ephimeram, ideo de curatione eius amplius
non curo.

Ad clarificationem eorum quæ dicta sunt &
dicenda sunt, oportet multa breuiter intelli-
ge, ideo intelligendum secundum intentionem
Gale, lib. de differentiis feb. In corpore enim
humano non sunt, nisi tria membra, scilicet so-
lida, humores, & spiritus, & secundum hoc suf-
ficientia feb. sumitur. Quoniam si membra so-
lida supercalefiant primo & subiectiue, sic est
hectica, & assimilatur calori patiens in balneo
secundum Auicenna. Si autem humores primo
& subiectiue supercalefiant, sic erit putrida: &
assimilatur aquæ balnei. Si autem spiritus princi-
paliter & subiectiue supercalefiant, sic erit ephi-
mera, & quia non sunt nisi tria, ideo non sunt
nisi tres feb. Ad hoc sequitur quod nulla fe-
bre post se dimittere ephimeram, licet fiat eco-
uerso, pro tanto, cum in qualibet quodlibet
calefiat, tamen non subiectiue, ideo una non
est alia. Si igitur cesset quod est in solidiori,

cessabit quod est in subtiliori. Si cesset super
calefactio membrorum & humorum, cito cessa-
bit & spirituum: ideo nulla febr. dimittit post
se ephimeram. e contrario autem bene potest
fieri: licet enim cesset calefactio spiritus subie-
ctiue, non tamen propter hoc aliorum. Relin-
quitur igitur, quod omnes feb. possunt sequi
ephimeram, ephimera autem nullam. Secun-
do intelligendum, quod licet febr. dicatur et
lori innaturalis, non propter hoc erit causa &
effectus, cum causetur ab innaturali: quoniam
calor qui est in minera, est causa, & calor qui
est in actu inflammatus in corde, est effectus,
& per illum diffinitur. Tercio notandum, quod
calor naturalis & innaturalis in feb. possunt
idem, sustentibus hanc uiam per hunc mo-
dum: quoniam sunt idem in specie: utrobique
enim est calor, & idem numero, quia in eo-
dem subiecto, sicut in calore fluente, quia a cor-
de procedit superaccenso: quoniam nihil aliud
est feb. quam calor innaturalis: mutatus in
igneum. Erunt igitur idem in numero, quia in
eodem subiecto: nec sunt contraria in eodem,
quia contraria sunt uel quasi, & ibi bene pos-
sunt esse, sicut sunt in quolibet misto, & pro-
tanto talia contraria contraria simul existen-
tia generant nouam speciem, sicut est febris.
Alia autem dicunt, quod differunt in se, & in radice
quia unus uiuificat & alter mortificat, & ita pos-
sunt stare: quia in quantum trahit ad dispositio-
nem naturalem, uiuificat & dirigit materiam
cibi & morbi: in quantum autem attrahit ad di-
spositionem innaturalem, corrumpit & mortifi-
cat. Et est quarto notandum, quoniam suppo-
sito quod calor & spiritus differunt, quoniam
forte non differunt, sed ponamus uerbi gratia,
quod differant, non propter hoc alia feb. erit in
calore naturali, & alia in spiritu, quoniam quo-
modocunque sit, utrunq; tamen est de latuum
uirtutis, & ita non erunt quatuor feb. eum sint
simul, & simul inflamentur, & simul sint dela-
tores. Quarto intelligendum est, quod sequitur
frequenter ephimera apostema inguinis, axil-
larum & similia, quam sequatur alia aposte-
mata magna, pro tanto, quia sunt emunctoria
membri nobilis, ideo de facili inflammatur spi-
ritus, & cum hoc causata est ephimera, quia illa
materia non est sic putrefacta. Alia autem aposte-
mata ut sunt foriculi, scabies, & similia genera-
tur magis de materia corrupta & putrefacta,
potissime quoniam est in interioribus, ideo talia se-
quetur putrida febr. Et pro tanto dicebat Hippo-
crates in bubonibus, omnes feb. malæ præterquam
ephimera, quia materia cum qua est ephimera
videtur magis peccare ratione suæ quantitatis,
quam ratione suæ malæ qualitatis. Quinto
aduertendum, quomodo ad nauseam, tristi-
tiam, somnum, syncopim, & alia multa conti-
nua

milia sequatur feb. cum habeant infrigidare. Dico quod est per accidens: nausea potissime fit in cholerico, ubi sumi cal. & sicci, acuti res solvantur, qui supercalescunt, in alijs autem propter spirituum concultationem, pororum clausuram, & similia. Sexto notandum, quod ut plurimum ephimera non est cum rigore, pro tanto, quia materia non est horribilis, putrida, infecta. Septimo intelligendum est, quod cum dicitur, quod in ephimera ex calore ponantur flores frigidi in lecto. Intelligo quantum est de presenti circa lectum ad alterandum aerem, non quod tangant carnem nudam, quia tunc esset timendum de clausione pororum, & ita de putrida. Octavo notandum, quod in curatione ephimeræ non competit coitus, quia timendum esset de spirituum inflammatione. In ista autem materia nolo aliter ratiocinari, timens prolixitatem.

De causone. Cap. III.

Causon est feb. continua de cholera intra nasa existente in membris nobili, aut loco proximo cordi. Febris causonica causatur, aut de cholera rub. pura, aut de phlegmate falso, ita quod cholera aliquando peccat plus ratione quantitatis, aliquando ratione suæ qualitatis, aliquando ratione utriusque. Inflammiatur igitur fortiter, cum chol. rub. sit inflammabilis: & plus, quia est in stomacho, aut hepate, aut locis proximis cordi: & in hoc differt à tertiana continua, quia tertiana continua est de materia putrefacta in venis remotis à corde, sed causon in proximis. Ideo causon, incendium interpretatur, & ratio venit semibus: si ueniat, est signum perditionis. Iumenibus autem uenit ut plurimum: & si conueniant alia particularia, tanto fortius. Fit etiam de phlegmate falso secundum Auicem. putrefactio, & inflammatio in eisdem locis.

Summum incendium & inflammatio in toto corpore cum inquietudine, malitia tolerandi & multis pernecabilibus accidentibus, sicut est phrenesis, instantia vigiliarum, aliquando somnus profundus, nigredo & ariditas linguæ, syncope, icteritia, tremor, fluxus ventris, & alia quando retentio egestionum, pulsus parvus & uelocissimus, urina rub. & subtilis. Tamen uidetur multipliciter diuersificari: quoniam alia quando est à principio cruda, propter multitudinem oppilationis: aliquando tincta, propter resolutionem cholerae: aliquando liuens & turbata, propter multitudinem putrefactionis. Et si sit causon de chole. citrina, aut phlegmate falso, omnia erunt remissiora: & afflictio, & alia particularia proportionantur phlegmati, & quia

affligit 18. horis, & aliquo modo uidetur interpolare 6. quia tempus est hyemale, & diata sibi conueniens præcessit, & talia consimilia. Hæc enim ægritudo est brevis terminationis ualde, cum terribilibus accidentibus, & si omnia bona signa appareant à principio morbi, liberabitur in die quarta aut infra: si mala, morietur in quarta, aut infra. Aliquando autem extendit se usque ad 7. Ista autem ægritudo non potest prolongari, quia natura secundum Gal. non patitur morbi prolixitatem & molestationem accidentium. Signa autem bona & mala non oportet hic apponere: alibi enim à nobis posita sunt. Hippoc. tamen uoluit prognosticare. Quibuscunque in causone tremores sunt, alienatio soluit.

In curatione autem oportet considerare causam morbi, morbum, tempora morbi, & naturam accidentium. Quia igitur causa huius morbi est putrefactio cum forti oppilatione, in primis remoueatur oppilatio, fricando pectus, uentrem, latera, & partem quæ magis dolet cum aceto albo, oleo de chamomilla, & aqua rosa, & hoc cum suauibus fricationibus & longis. Sed contra morbum, oportet infrigidare, flammam caloris extinguere, & nimiam subtilitatem materię ad quandam mediocritatem reducere: & hoc est contra maleficiatos & fascinatos, qui non opinantur ingrossantia subtilibus competere. Recip. dentiginis, aquæ fontis, portul. ungulæ caballinæ, ana unc. 3. rosarum rubearum electarum, sandali muscatelini, spodij, florum nenuphar ana unc. 1. aquæ ros. lib. 5. aquæ fontis lib. 12. & 3. minimi malorum granatorum unc. 2. panis zncari lib. 1. fiat sympus clarificatus, & condaturo lento igne, sicut decet. Digesta materia, purgetur cum cassia fistula, aut thamasind. aut myrobal. citrini, & similibus. Si esset de phlegmate falso, addatur apium, bruscus, asparagus, & similia: & in laxatione addantur myrobalani chebuli. Ordinetur cura secundum tempora morbi. Si enim ægritudo terminetur in quarta aut infra, nullus cibus penitus detur, fruirtus tolerare queat. Si uero ægritudo terminetur ante quartam, aut ultra, & uirtus non possit tolerare, detur sibi cibus iuxta conuenientiam particularium. Materialia autem sunt ista, succus malorum gran. syrupus iulep, prisana hordei colata, aut non colata, lac amygdal. brodium cicetum, lactuc. portulac. panis lotus in aqua, brodium parue pullæ cum multitudine lactucarum, hordeatum, anenatum, amygdal. Accipere autem hoc uel illud, industriæ medici relinquitur, quoniam aliqui sunt fortes plus uel minus iuxta naturam ætatis, complexionis, temporis, regionis, consuetudinis, & officij quod exercent. Ex his enim & alijs, ingenium dixerandi & regendi eligatur à medico sapienti, & forma

& forma totius regiminis, secundum doctrinam Galen. in regimento supra illam partem Quo sumpto, si dolor loco ingruerit, &c. & non solum cibus ordinatur secundum tempora morbi, sed & medicinæ. Quoniam ista ægritudo est periculosa, & cum terribilibus accidentibus, timemus malitiam symptomatum in statu, ideo bonum est, ut in principio euacuetur. Recip. florum bora. florum uio. ana unc. i. norum 30. fiat decoctio, & in decoctione colatur calida silt. mundi. tamarind. ana unc. j. detur aliquantulum ante auroram. In statu autem & aliquantulum ante statum, nihil ferè fiat, nec cibus, nec potus, nec medicinæ, nec aliquid aliud. In fine autem status, si uideremus quod natura esset sopita in expellendo, bonum esset ipsum excitare, hoc diuersimodè, & secundum quod natura ad diuersa mouetur emunctoria. Si autem moueretur materia ad superiora, tunc excitamus naturam cum setis porcinis infra nares subito intromissis. Si autem ad stomachum, cum uomitu. Si ad intestina, cum supposito-rio uel clysteris. Si ad uias urinales, cum diureticis & fricationibus circa illas partes. Si ad totum corpus, cum temperatè calidis: phlebotomia autem nunquam fiat, & si debeat fieri, hoc est de raro contingentibus ualde, ratione oppilationis aut aliquorum aliorum particularium.

Viso igitur de causa, morbo & temporibus, uideamus de accidentibus: & primo de phrenesi: quoniam phrenesis secundum Galen. est necabilis in omni genere suo. In principio igitur ponantur stupæ canabinæ à maiori commissa capitis usque ad oculos, & aures inunctæ in succo lactucæ, morellæ aqua ros. & aceto, & sint acti tepida, & postquam 14. horæ transuerint, ponatur catulus, fissus, calidus, uiuus per spinam dorsii, aut pulmo arietis: & si non habeatur tanta copia, calefiat in aqua, & extrahatur pulmo subito ab ariete uiuo per dorsum, & capiti applicetur. Si autem febris cessauerit, & alienatio remaserit propter incinerationem materiæ, fomentetur frequenter caput ex alto cum aqua decoctionis chamomillæ, meliori, hordei, uiol. & similia. Et si adhuc stupor propter multitudinem uaporum ascendentium ad caput, fricentur fortiter extrema, & fiant ligaturæ dolorosæ in extremitatibus. Si autem ad sunt uigiliæ, accipiatur farina papaueris albi, & distemperetur cum albumine quorum, & aqua ros. panni intincti temporibus applicentur, aut emplastrentur cum rubea trochiscata circa frontem & tempora. Contra sitim & ariditatem linguæ, fiant sacculi de psyllio aut sem. cytoniorum, ponantur in aqua frigida, & teneantur super linguam, aut folia portulicæ. Infrigidata in aqua, aut frustum latum te-

nue pomi in aqua refrigeratum, & positum super linguam. Frequens ablutio aquæ frigida cum modico aceti ualet. Confert etiam mundare linguam, & os cum cannula aut manutergiis, & abluatur cum multa aqua, paucis aceti & melle. Confert etiam multum & siti & febri aerem frigidum attrahere. Infrigidetur igitur & humectetur cum multa aqua & aceto aspersis, & foliis uitæ albæ, canarum, salicis, nenupharis, & similia. Et ordinetur amphora cadens ex alto, quæ continuè aquam per se haurit, sicut scitis, cum calamo sic formato, pars autem longior ponatur in aqua, & per aliam fiat foris tractus, post non cessabit, & casus aquæ super peluum reddat patienti decoratissimam melodiam. Si autem istericia uenerit antequam commendetis ipsum Christo: & si post, curetur sicut inferius dicitur, & abluatur facies cum aceto albo tepido, & uinum malorum granatorum tepidum oculis instilletur. Si autem uenerit synopsis, irroretur cum aqua ros. odoret camphoram, san. & aquam ros. & ista etiam ponantur supra pectus, detur sibi panis intinctus in uino cum aqua ros. multa, aut succo cytoniorum, aut acetositate citri, aut lardetur & asseretur gallina, & aspergatur aqua ros. ubi fuerint ambra & gariofil. odoret eam modicum post modicum, solum transeundo, cauendo ne ex his supercalefieri possit. Odoret & sandalum, secelinos, & fricentur extrema, & multa consilia fiant. Si autem uenter nimis fuerit laxus, detur syrupus myrtinus, aut syrupus de cytonijs. Si constipatus, fiat clystere aut suppositorium, aut detur sibi syrupus uiolæ & similia. Mirabile uidetur, quomodo in causone ubi est ultimata inflammatio, potest esse materia cruda. Dico quod potest esse aliquo istorum modorum, aut quia chol. est citrina, aut phlegma falsum, aut quia ratione crapulæ nouellæ, potest esse materia cruda circa primas uenas, ita quod ista materia non est subiectum feb. sed chol. ru. pura est putrefacta in locis proximis cordi, & cruditata est circa hepar de phlegmate falso, & chol. citrina. Dico quod potest esse magna putrefactio, & ita fortis calor, aut quia oppilatio magna, aut quia in uenis pulmonis, stomachi, hepatis, aut in locis uicinis cordi, & ita inflammatio magna, cruditata autem est ex parte materiæ. Secundo posset aliquis dubitare de uis hyemalibus, quomodo possunt competere, cum sit ibi dulcedo, & sint duræ digestionis. Dico quod possunt competere, aut ratione sitis cum pertineant frigiditati, aut ratione fortis appetitus, iuxta illud, Parum deterior cibus, &c. Tercio posset fieri dubitatio, si cholera posset inflammari ad feb. sine putredine, sicut san. in synoc. Dico quod opiniones sunt, melior tamen sententia uidetur quod non, quoniam multum distat cholera

cholera à temperamento. Quarto intelligendum, quòd causon est ægritudo magna & periculosa in senibus, quia fortis est ignis, qui in aqua non extinguitur, secundo in iuuenibus minus quàm in senibus, & plus quàm in pueris, secundum Auic. quoniam licet sit in iuuenibus cum conuenientia particularium, & inquantum est ex conuenientia causæ, & particularium antecedentium, tamen quantum est de particularibus subsequenibus & communicantibus, dissoluitur corpus, uirtus, & ibi ægritudo multum periculosa. In pueris autem est humiditas multa, quæ resistit calori uehementer dissoluenti, quod quidem non est in iuuenibus. Quinto notandum est, quòd holismus potest esse in causone, quantum est ex stomachi debilitate, & corporis dissolutione. Sexto aduertendum, quòd aqua frigida mirabilissimè potest competere in causone, cum istis particularibus, quòd uirtus sit fortis, & materia digesta, & morbus sit in declinatione, & quòd non sit oppilatus, nec sit cruditas materiæ, nec sit apostematus & quòd uehementissimè litiat, & quòd aqua frigida sit dulcis, & consueuerit, & quòd in una uice potest tantum, quantum poterit attrahere una uice sine attractione anhelitus. Et hæc sunt quæ leguntur à Gale. in regimento supra illam partem. His autem qui pleuretici sunt, &c. Septimo intelligendum, quòd phlebotomia cori filio meo non debet fieri, ut uidetur: quoniam frangum auferretur chole. & igniretur, materia inflammaretur, & redderetur magis cursibilis, nisi forte corpus esset plethoricum, oppilatio fortis, & similia. Etiam retineamus consilium Auicem. qui dicit capitulo de phlebotomia, quòd tardetur quantum est possibile.

De tertiana. Cap. IIII.

Tertiana est febris putrida de incensione chol. generata. Intelligendum est, quòd duplex est cholera: quædam est chol. rub. pura: quædam non pura propter phlegmatis admixtionem, & appellatur chol. notha. Primo chol. aut putrescit intra uenas & arterias, & generat continuam: aut extra, & generat interpolatam. Tertiana igitur continua generatur de chol. putrefacta in uenis & arteriis totius corporis: & in hoc differt à causone: quoniam causon, ut dictum est, causatur ex chole. putrefacta in uenis pulmonis, aut stomachi, aut hepatis, aut in locis proximis cordi: & omnia sunt intensiora in causone, quàm in tertiana continua: & ideo curatio feb. eadem utrobique. Tertiana autem interpolata causatur de chole. putrefacta extra: & ideo habet periodos, & interpolationes. Putrescit autem materia quando conculcatur, & caret euentatione, & destituitur, & su-

percalefit cor: aut quia fumus putridus perit cor, aut quia calefacit pars partem, donec neniatur à minima usque ad cor, aut utroque modo. Calefacto autem corde, sic unà cum toto corpore generatur febris tertiana, igitur continua sub causone reponatur: quoniam hic magis intendimus agere de interpolata.

Signa tertianæ sumuntur ex naturalibus: ut quia iuuenis, cholericus: & ita de aliis. & sumuntur à non naturalibus: ut quia æstas, & currens, & comedit cal. & ita de aliis. & sumuntur à rebus præter naturam: ut quia incipit cum rigore, sicut cum acubus pungeretur: & est differentia constitutiuæ: & à principio rigoris pulsus est occultus, & postea uelox, & semper equalis: & urina citrina & tenuis: & terminatur cum sudore plurimo. Signa autem tertianæ nothæ sunt alia & alia, iuxta phlegmatis admixtionem & conuenientiam particularium.

Tertiana uera terminatur in 7. periodis, aut infra: & ita terminatur in 14. die, aut infra: & affligit 12. horis, aut infra: & interpolata 36. Prima autem periodus est debilis: & secunda fortior: tertia fortissima: & quarta est in ultimo: ibi enim est status, & nequissima accidentia. quinta autem incipit debilitari: sexta autem plus: septima autem modica, aut nulla. In princip. paroxysmi uenit uomitus, & in fine sudor. Et quia ista ægritudo uenit cum terribilibus accidentibus, & non patitur ignorantiam, nec stultitiam infirmi, ideo ut melius futuris periculis obuietur, & honestas medici conseruetur, bonum est semper futura pericula prædicere. Ponamus igitur quòd post tertium paroxysmum sit uocatus, & uidetur sibi quòd phlebotomia debeat fieri, & syrupus administrari, & fiat totum quod debeat fieri secundum uiam rationis: sed tamen nihil prognosticauit: tunc ueniet quartus paroxysmus fortissimus. uerè tunc assistentes dicent quòd phlebotomia interficit, aut postquam sumpsit syrupum semper deterioratus est, & ita factus erit ignominiosus. Sed si pericula in quolibet morbo prædixerit, semper medicus commendabitur, & mihi sibi imputabitur. Sit ergo regula generalis, quod nunquam operetur in aliquo morbo, nisi prius prognosticauerit: non est igitur prognosticatio negligenda.

In curatione igitur oportet considerare morbum & causam morbi, & naturam medicaminum, & naturam ciborum. Intentio igitur non est una, sed multiplex: quoniam in curando oportet considerare causam, & materiam morbi & dyscrasiam. Non est igitur intentio simplex, sed composita: ratione igitur putrefactionis oportet subtiliare & aperire: ratione autem materiæ competunt mediocriter ingrossantia: ratione autem dyscrasie frigida & humida. Sed quia

quia accidētia sunt multiplicia, sicut est inquitudo & uigiliæ, & malitia tolerandi ægritudinem, ideo talibus competunt quodammodo stupefacientia: ideo uno solo ista compleri nō possunt: igitur in syrupo oportet multa apponere propter multitudinem eorum quæ dicta sunt. Et in tertiana, Recip. endi. scariol. lactucarum nouel. & summitatum papaueris. añ. unc. ij. quatuor seminum frigidorum maiorū, & minorum mundatorum, & non mundatorum. ana. unc. x. rosarum rū. florum nenufaris, florum uiol. ana. unc. i. & s. omnium sandalorum. ana. drac. 2. aceti al. unc. 3. panis zuccari lib. i. fiant syrapi clarificati quartariæ 5. Digesta materia purgetur sic. Recip. florum borag. florum vio. ana. unc. i. prunorum 20. fiat decoctio, & in decoctione resoluitur calsiasist. mundæ, thamarind. ana. unc. i. & detur in aurora. Ratione autem accidentium, quantum est de uigiis, incipiamus à leuioribus, Recip. olei rosa. olei nenufa. aquæ rosa. aceti al. albuminis ouorū. ana. unc. i. lactis mulieris quātū omnia, & panni madefacti fronti, & temporibus applicentur. Si autem ista non ualeant, paulatim ascendendum est ad fortiora: quare possumus addere papauer. cum sua enim narcoticitate domesticus est, ut dicit Auic. Deinde ascendamus ad succum lactucæ, solatri, mandragoræ, iusquiami, & similia: & similiter addamus opim cum croco, & requiem, & rubeam trochiscatam. Requies est species confectionis. Et si fuerint uigiliæ cum capitis grauitate, oportet odorare camphoram, acetum, aquam rosa. sanda. chamomillam, melilotum, & similia materiam humidam desiccantia. Si autem fuerit ibi stupor, fiant fricationes extremitatum dolorosæ. Et si fuerit uomitus, inquietudo & clamor, & reuolutio, & malitia tolerandi, suffumigetur cum narcoticis. Sed gratia putrefactionis, & oppilationis fricetur ueter cum uino al. & oleo de chamomilla & aqua ros. De reliquis autem accidentibus fiat sicut dictum est in causone. Electuaria autem possunt esse suc. ros. uiol. dia dragantum frigidum, tria sandal. diapapauer, & similia. Si autem fuerit tertiana non uera, addatur prædictis apium, bruscus, asparagus & similia, iuxta conuenientiam particularium. Et si esset mulier, aut phlegmaticus, aut tempus hyemale, aut oppilatio multa, quod addatur radix scenic. petro. lactuc. spica nar. scolopendria, lupulus, & similia. Et in euacuatione possumus addere myrobal. rhabarb. diagrid. & similia iuxta conuenientiam particulariū, quæ non curo pertractare gratia breuitatis. Si autem loquamur de curatione gratia temporum morbi, tunc intelligendū est, quantū est de natura medicaminū, q̃ a principio dentur aliqua leuia laxatiua, sicut est calsiasist. & thamarindi, cū de-

coctione prunorū, & uiol. & post tertiā accessiōnem potest fieri phlebotomia, si aliqua particularia cōueniunt, ut fortitudo uirtutis, & plenitudo corporis. In statu autē nihil fiat, nec cibale, nec medicinale, nisi aliqd aliud obuiaret, ut fortitudo symptomatis, & multitudo resolutionis, & similia. De cibis autem demus plus uel minus, sed per cōparationē ad paroxysmos ante accessiōnē per trēs horas nullus detur cibus, nec in accessiōne, donec uenerit ad manifestam declinationē, nisi corporis liquefactio impediret. Et prohibeatur somnus in principio accessiōnis & potus, nisi molestatio accidentium impediret. Cibus autem qui eis cōpetit est, ut dictum est in causone, s. hordeatum, auenatum, amygd. spinachia, mica panis ter lota, lactuca, portul. melones, cucumeres, cucurbita, pruna, mora, pyra cocta, poma cocta, brodium cicerū, brodium pulli, lac amygd. pulli parui, pisces petrosi, & similia. Intelligendū tamē, q̃ cum olera & fructus habeant humiditates aquosas putrefactibiles, utile esset abstinere: sed quia ratio inuenitur aliquis ita obediens, ideo oportet multa concedere, & cum diuersis operari secundum diuersitatem particularium. Accedamus igitur ad ea quæ artis sunt, quantum erit nobis possibile: quia formæ regiminis ex concursu particularium consurgunt.

Si dubitaret aliquis in qua febrium putrefactio esset maior. Dico q̃ si nos loquamur de maiori putrefactionis, quod ad intentionem & acumen, & furiam accidentiū, tunc dico q̃ maior est in cholerica. Sed si loquamur de maiori putrefactione quod ad continuationem, & nullam interpolationem, sic maior est in feb. sanguinea. Sed si nos loquamur de maiori putrefactione quod ad continuationem, & difficilem eradicationem, sic maior est in phlegmatica & melancholica.

Secundo posset aliquis dubitare si competat uomitus in tertiana. Dico, q̃ in tertiana & in omni febre interpolata in principio paroxysmi competit uomitus: quoniam sensibiliter alleuiatur totus paroxysmus, & potissimè si fuerit spontaneus, uel ex modo facili procuratus, & aliquid purgatur de materia antecedente, & natura postea melius potest supra cōiunctam. Et ista uidetur intentio Auic. cap. de quartana. Et hoc uidetur sapere Hipp. ubi quotidie rigores sunt, quotidie febres soluantur: quia ad rigorem cōsueuit sequi sudor, uomitus, egestio, & similia, & ita mundificatur corpus, & ita febris cessat. Et uidemus sensibiliter, q̃ cum aliquis patitur interpolatam, & in paroxysmo nulla est euacuatio, tunc in tēpore interpolationis est totus grauis & ponderosus, & cum modica alleuiatione. Si autem in paroxysmo fuerit mundificatus, in die interpolationis uidetur sibi q̃ sit curatus omnino. Vtile est ergo in principio rigoris mo-

ris moderatè modicum vomitum prouocare, sicut est multum utile in fine paroxyfmi tolerare sudorem.

Tertio posset dubitari si oxyfaccara, & syrupus aceto: competant in tertiana, postquam ita subtiliant, & materia est subtili. Intelligendum, quòd ista materia fuit declarata à nobis per intentionem supra illum aphorif. Quibuscunque in causone &c. Breuiter tamen dico rationes prætermittendo, quòd in materia subtili non competunt subtiliantia: quòd ad sui digestionem, secundum quòd determinat Auicē. cap. de curatione februm putridarum in generali: imò competunt ingrossantia. Et dicit Auicē. quòd ille qui dicit contrarium, non est audiendus. Hoc idem dicit Gal. 1.2. de ingenio. In tertiana igitur, quātum est de reductione materiæ & dyscrasie, non cōpetūt frigida & sicca, sed magis frigida & humida. Sed ratione oppilationis, & putrefactionis possunt competere oxyfaccara, & syrupus acetosus: & quia etiam cum istis ponuntur rosæ & spodium, & multa consimilia, sicut dictum est cap. de causone; & ideo consuetudo mea est q̄ in talibus ego addam syrupum uiol. Gratia igitur ætatis & sexus, aut temporis, aut complexionis, aut ducitiei uiscerum & oppilationum, & similia, autores concedunt oxyfaccaram, & syrupum acetosum. Sed quantum ex parte materiæ, & dyscrasie simpliciter non uidetur competere: opiniones tamen sunt de ista materia, & ideo conscientie operantis relinquo.

Quarto posset aliquis dubitare de chylo, si putrefiat ad feb. cum autores non faciant mentionem de febr. putridis, nisi humoralibus. Dico quantum est de præfenti, quòd chylus & humiditates tertie possunt putrefieri, cum putrefactio fit in humidis & liquidis, cum dissolutione caruerunt, & transcunt in naturam alicuius humoris inanimalis per uiam cuiusdam ebullitionis, & supercalesfactionis & adustionis, & ita febres putridæ semper sunt humores.

Quinto posset fieri dubitatio, si uno humore corrupto alij corrumpantur, propterea q̄ sunt simul & simul generantur, quare simul corrumpuntur. Dico quòd non est necessarium: quoniam humi. sunt distincti per proprias formas, & per proprios situs, & per proprios motus, & ita quilibet habet suum regimen, & proprietatem, & proprium temperamentum: & ita potest amitti temperamentum unius, & non propter hoc amittetur alterius: quare non est necessarium, quòd uno corrupto alij corrumpantur.

Sexto intelligendum, q̄ si iuxta prædicta aliquis dubitaret, q̄ melancholia corrupta, & om-

nes alij corrumpantur, cum resistat utraq; qualitate: & ita cum sit fortis uictoria ex parte melancholiz, & tamen corrumpitur, igitur & omnes. Dico q̄ solutum est, quoniam uictio hoc temperamento, licet fortissimè repugnet, non tamen propter hoc temperamenta alia: quoniam particularia quæ concurrunt cum isto, non est necessarium quòd concurrant cum alijs: quare &c.

Septimo possumus notare, q̄ humor cū corrumpitur, & putrefit in carne, & in stomacho, & in hepate, & pulmone, & breuiter in quacunq; concauitate fuerit præternaturam, si ibidem crearet euentatione, & destituatur à regimine, ibi dē corrūpitur, & ibi erit minera. Et iuxta hoc intelligendū q̄ chol. præsina, & eruginosa sunt tantæ perneccabilitatis, q̄ putrefieri nō possunt. Ante enim ueniret mors. Et iuxta hoc intelligendū, q̄ tertiana uera de chol. rub. naturali generata, magis in regionibus frigidis generatur. Sed tertiana notha de chol. nō naturali causata, magis in regionibus cal. generatur, quia ab agēte præternaturam causata est. Et iuxta hoc intelligendum, q̄ in tertiana phlebotomia bene potest cōpetere post tertium uel quartum paroxysmum, aliter nunquam, quia sic redderetur transcurfibilis, & fieret de simplici duplex, & de duplici continua, sicut uidemus frequenter. Et licet non euacuet materiam continuam, antecedentem tamen euacuat.

De febre sanguinea. Cap. V.

SYNŌCHUS est feb. continua de sanguine putrefacto, intra uasa. Synocha est feb. continua, quæ ephimeræ proportionatur, de sanguine peccante ratione suæ quantitatis.

Intelligendum quòd cum aliquis confectus est exercitari, & subito dimittit exercitium, et utitur multis cibis, et potissimè sanguinem generantibus, aut sanguinem aquosum, sicut est sanguis generatus ex fructibus: & tunc ex his & alijs sibi conformibus, multiplicatur sanguis: & si peccet ratione suæ quantitatis, generat febrem continuam ephimeræ proportionatam ex sanguine non putrefacto: in qua si fiet phlebotomia, non cadet in putridam, sicut scribit Galen. 9. de ingenio. Si autem abundet sang. & peccet ratione suæ quantitatis, & esset malæ qualitatis, generat continuam de sanguine putrefacto, qui synochus appellatur. Et habet tres species, augmasticam, quæ semper procedit ascendendo & augmentando, quia maior est dissolutio quàm resolutio, & est deterior inter omnes. Secunda species est epigmastica, quæ semper procedit diminuendo, & est alijs salubrior, quia maior est resolutio

& consumptio quàm dissolutio. Tertia autem species uocatur homotonon, ubi omnia sunt equalia: semper enim est in statu: & qualis enim est dissolutio resolutioni. Et istæ tres species sunt in qualibet feb. sicut declarauimus supra librum Gal. de differentiis fe. Sanguinem autem opifiatus est Gale. 1. 1. de crisi, quod non potest facere fe. solam simplicem singularem: semper enim est composita: quoniam quando putrescit, & altera eius pars conuertitur in chol. & altera in melancholiam, ideo feb. solas simplices singulares non ponit nisi tres feb. quæ proportionatur chol. & feb. quæ proportionatur phlegmati, & fe. quæ proportionatur melancholiz.

Signorum quædã sunt antecedentia, & quædam subsequencia, & quædam concomitantia. Signa autem antecedentia sunt grauitas capitis, inflatio spatularum, repletio uenarum, rubedo faciei, flagellatio totius corporis, & similia. Concomitantia sunt dolor frontis, apparitio lampadum ardentium, paraphrenesis, turbatio mentis, tenebrositas oculorum, plénitudo pulsus & undositas, & diuersitas, dulcedo oris, urinæ rub. & spissa & foetida, & liuens. Subsequencia sunt tumor faciei, mollities totius corporis, & aliquando superueniunt morbilli & uariolæ, & carbunculi: & sunt mala signa, ualde quæ conueniunt in temporibus pestilentialibus euenire. Ista autem declarant sanguinem putrefactum. Ista autem omnia remissa sunt in sanguine non putrefacto, quoniam ephemera proportionatur.

Si autem appareant pustulæ liuidæ nigræ, mortem significant: similiter si in uentre audiatur sonus, sicut tonitruum, sicut dicit Anic. Lachrymæ si appareant propter malitiam morbi, difficultas anhelitus, & præfocatio, & apostemata in uis anhelitus, & si post somnum sentiat se grauatam, ista omnia sunt mortem significantia. Apparitio autem uelox uel tardæ digestionis uel indigestionis significat crislum breuem uel longam, salutem uel mortem relata ad uirtutem: quia in omni morbo sunt diligentissimè consideranda, quia secundum eas facies ea prognosticare & dictare.

Tota fere curatio istius morbi consistit in phlebotomia. Intentio igitur fuit Gal. 9. de ingenio, quod fiat phlebotomia usque ad syncopin: & redarguit homines qui forte dolosi sunt in hoc: & uidetur mihi, quod tutius est facere phlebotomiam multis uicibus, donec deficiat materia, non patiens. Magis enim diligo quod ægritudo aliquantulum prolongetur, quàm si mors mihi imputetur: quia signa fortitudinis uirtutis, aliquando fallunt. Virtute igitur fortis cum conuenientia aliorum particularium, fiat phlebotomia mane, & sero, & multis uicibus; imò si fuerit neglecta, non solum in 7. die uel

in quacunque hora uenerit, secundum Gale. 9. de ingenio. Si particularia non conueniant, fiant uentosa inter spatulas. Si autem crapula, fiant fricationes uersus extrema, & fortis abstinencia, & fiant suppositoria & clysteria: quia talia multum competunt in hoc casu: & cum crapula erit digesta, fiat phlebotomia. Viatur ergo isto syrupo. Reci. endi. scariol. cichorez. ana. unc. 2. quatuor seminum frigidorum. ana. unc. 1. florum nenuf. florum uiol. ana. unc. 2. uini malorum granat. unc. 3. panis zucca. libr. 1. fiat syrupus. Et si patitur insomnietatem, ponatur in syrupo se. pauperis al. & si rufissim. tollatur uinum malorum granatorum, & addatur uua passæ munda ab arill. iniubz, sebesten. Et si pateretur cardiacam passionem, addantur rosæ, sandali, spodium, coriandrum. Et si constipationem, addantur pruna cum cassia fist. & ita multa & diuersa debent apponi secundum diuersitatem compositionis accidentium. In uigiliis igitur fiat sicut superius, & in stupore sicut dictum est. Et in siti nimia fiant sacculi parui de psyllio, uel pilulæ tales. Recip. succi uua acer. bz, succi acetosæ, lactuc. uini malorum gra. acet. albi. ana. 1. & condiantur lento igni cum pane de zucc. & fiant pilulæ, & teneantur sub lingua & supra linguam. Laxetur uenter cum cassia fistu. mæra, thamarind. prunis, uel cum oxy. laxatio, diaprunis, trisera saracénica. Pareiur aer, locus & domus, sicut dictum est superius. Cibus autem multus uel paruus, secundum longitudinem uel breuitatem morbi: sit igitur hoc deatum, mica panis ter lota, lac amygd. cū mæra, panis, mala granata. Et potest administrari oxyfaccara, syrupus acetosus, iulep, syrupus uiol. syrupus nenufar, & hydromel, sicut aliqui uoluerunt: & si sic, sit hydromel aquaticus. Sed in his temporibus inueniuntur uiri & mulieres ira delicati, quod nihil horum sumerent: & tunc sicut in naufragio oportet te cōcedere pulli parui brodiū coctū in multa aqua. cū fasciculis lactucæ aut seminibus frigidis. Et si eadē ratione cōcedatur uinū, accipiantur duæ amphoræ paræ, repleatur una uino, & alia aqua, & coniungantur in suis orificijs, & aqua tingatur: & cum erit aliquantulum tincta, detur patienti, & appellabitur uinū succaratum: uel frangatur cū multa aqua bullientis: uel detur talis potus. Reci. aquæ fontis lib. 5. aceti albi lib. 5. panis zuccari puluerizati unc. 3. misceantur fortiter, & videbitur uinum albu gallicum. f. & quasi uiride: attamen quantitas aceti, & etiā totius mixtionis, quod non sit multum acetosum, nec parum, experimento probetur. Si aliquis dubitaret, quod ingenium curadi sit fortius, uel sumptum a morbo, uel sumptum a uirtute. Dico, quod ingenium a morbo aliquando est fortius, & aliquando a uirtute, secundum diuersas intentiones. Vnde intelligendum, quoniam ingenia

ingenia curadi sunt multa: quædam enim sunt ad digerendum, & quædam ad conseruandum, quædam ad euacuandum, & quædam ad dandum similia, & quædam contraria: tunc ponamus quod graua ætatis & uirtutis & consuetudinis similia debeant dari in feb. sed sola feb. præcipit dari contraria. Dico quod in hoc casu ingenium sumptum ex morbo est fortius: quoniam non obstantibus omnibus alijs particularibus contraria debentur. Et propter hoc dicebat Gal. octauo de ingenio, quod consideratio sumpta ex morbo omnes alias conditiones destruit & annullat. Si autem nos loquamur de ingenio sumpto ex parte euacuationis, ita quod morbus præcipiat euacuationem, & uirtus præcipiat contrarium, in hoc casu magis est credendum uirtuti quam morbo. Et secundum hoc dicebat Gale. in regimine, quod sublimior omnium considerationum sumpta est a uirtute. verbi gratia, febris enim sanguinea semper est cum sanguinis multitudine, & ideo quantum de natura morbi, competit phlebotomia: sed si uirtus est debilis, & non possit sustinere: in hoc casu magis est credendum uirtuti quam morbo. tabulam enim ingeniorum ordinauimus, quam oportet cum studio pertransire. Secundo posset aliquis dubitare si sanguis putrescat, & si solus. Dico quod putrescit, cum habeat duas causas, scilicet humiditatem, quæ est mater putrefactionis, & caliditatem, quæ est causa. Ad secundum dico, quod solus sang. putrescit in sui principio & fine: sed postea ratione sui temperamenti additur compositio propter alteram partem conuersam in choleram. alias fecimus longissimos sermones de hoc. quare & cætera. Tercio posset aliquis dubitare, si febris interpolata possit ex sanguine causari. Dico, quod opiniones sunt de hoc, inuenio tamen Gale. ponentem 9. de ingenio, febrem interpolatam de sanguine, & Viaticus ponit hoc idem, & satis est rationabile: quia possibile est quod sanguis putrescat in tanta distantia à corde, quod calefactio non potuit continue uenire ad cor: & ita non erit continua, & non erit etiam ita in remota parte, quin possit aliquando uenire, & ita erit interpolata. Quarto posset aliquis dubitare uel dicere, quomodo distinguuntur tempora morbi propter diuersitatem specierum? Dico quod licet non distinguantur quo ad accidentia, distinguuntur tamen quo ad digestionem uel indigestionem. Quinto notandum, quod si phlebotomia fuerit neglecta in principio, fiat post uirtute stante, non obstante opinione Serapio. quia Gal. uult hoc.

De quartana. Cap. VI.

Quartana est febris putrida de materia me-

lancholica generata.

Causa quartanæ est illud quod multiplicat materiam melancholicam, & putrefacit illam, sicut dicit Auicenna. Intelligendum quod quædam est quartana continua, quædam interpolata, & quædam est uera, & quædam non. Vera autem quartana generatur de melancholia naturali cum conuenientia aliorum particularium, quod sit melancholicus, & tempus autumnale; & quod comederit cibaria multiplicantia melancholiam, & similia. Notha autem est de melancholia causata per uiam adustionis, & ita potest aduri melancholia naturalis & phlegma & chol. & san. propter nimios labores & comestionem ciborum nimis calidorum, & propter ægritudines intensiuas, & similia.

Incipit enim cum frigiditate congelante & horripilatione, ossium confractione, & est pulsus occultus & paruus, & postea efficitur uelox, & terminatur cum sudore plurimo: quia materia est sicca, & ita nec fumosum nec semiadustum remanet post paroxysmum, sed completè eradicatur secundum Gal. in de differentiis feb. Urina est remissa & tenuis in principio, sed postea post paroxysmum multum coloratur: & faciunt ad hoc, quia uenæ sunt strictæ, & habitudo extenuata, & tempus autumnale, & alia similia quæ præcesserunt: & durat accessio 24. horis, & interpolat. 68. Signa autem nothæ remissa sunt, & uariantur secundum uarietatem humorum: quoniam si quartana sit de sanguine adusto, uergit pulsus ad plenitudinem & nodositatem, & tempus est uernale, & præcesserunt ægritudines sanguineæ, & similia. Similiter in cholericis sunt signa quæ pertinent cholerae: quoniam præcessit ægritudo cholericæ, & pulsus est uelox, & urina colorata & tenuis, & est tempus æstiuum, & comedit res calidas, & laborauit in sole, & similia. Quartana autem de phlegmate habet urinam remissam, & spissam, & mollitiem in pulsu, & longitudinem paroxysmi, & paruitatem sudoris: & secundum diuersitatem cholerae, & phlegmatis diuersificantur signa: & ita de melancholica. Considerentur igitur signa iuxta diuersitatem humorum & specierum.

Quartana de sanguine est salubrior & breuior aliarum, deinde ex chol. deinde ex phlegmate, deinde ex melancholia. Quartana autem durat regulariter per unum annum: quoniam sicut acutæ sequuntur motum lunæ, ita chronicae motum solis. Aliquando autem durat per 12. annos sicut dicit Auicenna. Omnes autem quartanæ ut plurimum sunt salubres. Ex quartanarius habet multas dignitates, quia raro incurrit maniam, melancholiam, lepram, & spasmodum de repletionem: quia purgatur & mundificatur tota materia in quolibet paroxysmo.

Nn 2 Quar-

Quartana autem de materia melâcholica cum duritie splenis aut hepatis à proprietate membrorum est pessima, & ducit ad hydropisum. Erit igitur ægrotudo longa, dato quòd bono regimine utatur: & si malo utatur regimine, erit longissima aut mortalis.

In curatione huius morbi oportet multa considerare. Primò, quòd non dentur nimis calida, quoniam adurunt sanguinem: & ita errant qui dant prassium & piper, nisi essent aliter repressa. Secundò, quòd non dentur nimis frigida, quia materiam congelant, & ita errant qui dant succum lactucæ, & narcotica. Tertio, quòd non dentur nimis sicca, quia materia est nimis sicca de se, & ita magis induratur, & ita errant qui dant assa & frixa & acetosa & styptica, & omnia ista intelliguntur, nisi cum aliis fuerint bene proportionata. Quarto, quòd à principio non nimis euacuetur: nam materia non potest esse digesta, quia in digestionem quartanæ frequenter sumus decepti: quia homines qui utuntur modico cibo & potu, & bene dormiunt, habent in principio quartanæ urinam satis bene coloratam, & hypostasim: & uidentur quòd sit ex materia morbi, & non est, sed cibi. Cognoscimus igitur digestionem materię morbi ex mitigatione paroxysmorum, & alleviatione eorundem. Quinto oportet considerare, quòd cibus non detur nimis subtilis, nec nimis in magna quantitate: quoniam status multum remotus est à principio: & ideo uidentur errare, qui auferunt omnes carnes & unum usque ad 20. vel quadraginta dies: quoniam uirtus nimis debilitatur, & non potest resistere morbo. Sexto oportet aduertere, quòd nullum incrudans uel ingrossans materiam debet exhiberi, sicut sunt olera cruda, & fructus & carnes grossæ, & ea quæ sunt duræ digestionis, aut nimia quantitate assumpta, & similia. Septimo diligenter aduertendum, quòd in die accessionis cibetur, & parum ante paroxysmum per tres horas ad minus vel quinque, & postea cibetur in fine paroxysmi cum eradicatus fuerit. In toto autem paroxysmo nihil cibale detur. Octauo demus considerare, quòd ante paroxysmum, & in principio paroxysmi prouocetur uomitus facilis, & in fine sudor. Nono intelligendum, quòd fortia digestiua nec fortia euacuatina non debent à principio administrari: sed gradatim à debilibus ad fortiora ascendere. In primis digeratur materia cum oxymelle simplici, & postea purgetur cum euacuatione sibi proportionabili: & postea digeratur cum oxymelle diuretico, & postea euacuetur cum fortiori: deinde digeratur cum oxymelle squil. & euacuationes fiant cum fortissimo. In præmissis euacuetur cum diasene, diaboragi, & postea

addatur cum his aliqua portio hieræ Ruffini, & postea cum hiera Ruffini tantum. Decimo attendendum, quòd non dentur opiata nisi corpore mundificato, & in declinatione. Undecimo aduertendum, quòd diuritics & opilationes, & apostema splenis & hepatis cum diligentia transeamus: quia magna pars curationis existit. Visis igitur de uniuersalibus, & ad unguem obseruatis, ad particularia ueniamus. Feb. igitur quartana una sola simplex singularis cum conuenientia suorum particularium per hunc modum pertractetur. Digeratur igitur materia sic. Recip. radicem corn. petrosæ, brusci, asparagi, graminis, apiij, mediani corticis ebuli & sambuci, fraxini, genestæ. ana unc. i. conterantur fortiter, & temperentur per diem & noctem in aceto fortissimo: tunc Recip. germandee, utriusque stœchados, utriusq; calamenthi, eupatorij. ana drach. 10; foliorum absinthij drach. 3. endiuiz, schario. cichoreæ, scolopen. ana unc. 2. quatuor seminum frigidorum, lactucæ capparis, spicæ nar. spicæ celticæ. ana unc. i. mell. ros. lib. i. & s. zucca. lib. s. fiant syrup. lib. 2. largæ. fumantur igitur cum decoctione horum, & fumus terræ manè & serò tria parua cochlearia, & nouem de decoctione. Iste autem syrupus summè remouet oppilationes splenis & hepatis, & ideo ualet in multis. Euacuatur igitur materia per hunc modum. Recip. florum boragi, niol. foliorum senæ, epithymi, liquiritiæ munda, uuarum passerum mundatarum ab arill. ana unc. i. fiat decoctio cum serò caprino, et in decoctione temperentur cortices myrobalindorum, bellicorum, et emblicorum, ana unc. s. fricentur lento igne, et colentur, et dentur in aurora ante accessionem per unam diem uel quasi. Et cum multis uicibus, et paulatinè, et in parua quantitate digestiuum erit exhibitum, possumus cum fortioribus euacuare. Recip. igitur diasenæ, diaborag. hieræ Ruffini. ana drach. 3. lapidis armenici nouies abluti drac. i. misceantur et fiat pilulæ, et exhibeantur eunti dormitum stomacho natio in secunda uice post accessionem. Postquam autem uidemus ægrotudinem declinare, stuphetur, et in stupha ponamus ea quæ ponuntur in syrupo cum multa aqua præter zucca. et mel, sed in maiori quantitate, et exeunti qualibet uice offeramus aureæ alexandrinæ, theriacæ. ana drach. i. misceantur. Sed quia multum conqueritur de frigore et horripilatione, ideo in principio ponamus pedes et manus in aqua calida, uel applicentur lateres calidi, uel fiant fortes fricationes, calefiant extrema cum pannis calidis: uel ponantur ista ut in collo pedum et manuum. Reci. fuliginis, salis communis, urticarum, et terantur fortiter, et distemperentur cum aceto:

aceto: & quando corpus incipit calefieri, quod istud remouetur, uel quod ponatur in balneo aquæ calidæ, ita quod non sit nimis calida, nec stet ibi tantum quod sudet: uel inungatur spina dorsæ, & extrema cum aragon & marcia: ton. Vel quod accipiat myrrham puluerizatam cum uino cal. uel theriacam cum succo mēthæ. Succus calamēti sumptus ante accessiorem curat quartanā. Quies igitur & omnia humectantia competunt in omni quartana, sed calfacientia & infrigidantia diuersificantur secundū diuersitatem specierū. Ad quartanam igitur sanguineam accedamus. In quartana de sanguine fiat phlebotomia de basilica, & digeratur materia cū syrupo de borag. & de fumo terræ, & mādicetur cum decoctione borag. & polypodij, & anī. & calsiæ. & thamarin: hæc enim species facillimæ curationis est. Quartana de cholera, curatur sic. Rec. oxyf. syrapi uiol. syrup. de fumo terræ, ana lib. i. misceantur, & purgetur sic. Rec. florum borag. florum uiol. liquir. munda; epi thymi, ana unc. i. fiat decoctio cum sero capri no; & in decoctione temperentur cortices myrob. citri. indorū bene gummosorum, ana unc. i. fricentur lento igne, & coletur & detur in auro. Si autē fuerit de phlegmate, digeratur sic. Rec. oxyf. cōpositæ, oxymel. diure. de fumo terræ ana lib. i. misceantur. purgetur sic. Rec. florum borag. florum uiol. polypodij, turbit, anisi, liquir. munda; uuarum passerum munda; ram ab aril. absinthij, agarici. laccæ, eupatorij, ana unc. s. fiat decoctio in sero caprino, & in decoctione temperentur cortices myroba. chebus indorū, ana unc. i. fricentur lento igni, & coletur, & detur in auro. Pilulæ quæ ualent in omni quartana. Rec. corticum omnium myroba. bene gummosorum, agarici turbit, hieræ. Ruffini. ana unc. i. succi menthæ, succi eupatorij, succi absinthij, ana unc. s. laccæ, amyli, spicæ nard. marathri. ana drac. cōficiantur cum oxymel. squil. & fiant pilulæ, & possunt exhiberi drac. 3. & plus & minus secundum convenientiam particularium. Utatur pullis paruis, & auius campetribus, & piscibus squamosis, & ouis fortilibus, & extremitatibus porcorum, & arietum, & hœdolorum, & utatur hordeato & auenato, & breuiter omnibus illis quæ sunt facilis digestionis, & quæ non crudificant materiam, nec ingrossant nec constipant, sed magis subtiliāt, & laxant, & aperiunt. Diuersificantur ista secundum tempora morbi in quantitate & qualitate & ordine. Competunt igitur boragines, feniculus, petrosel. brodium cicerum, pruna mātara, spinachia, betz, crocus, & similia. Et Auicē. mirabiliter commendat uomitum & ante cibum & post.

Intelligendum quod fortis & grindini fortis competit medicina: & secundum hoc in quar-

tana medicamina fortia uidentur competere: & ideo intelligendum quod quoddam est medicamen forte ratione suæ quantitatæ, sed non ratione suæ qualitatis, sicut oxymel squil. & hiera Ruffini. Vnde in quartana nō competit in principio medicamen forte ratione quantitatæ & qualitatis, quia resolueretur quod est subtile, & remaneret quod est grossum. Sed bene potest ex altera parte tantum, ut si est debilis qualitatis, quod detur in bona quantitate: & si est fortis qualitatis, quod detur in parua quantitate, & hoc in principio, & in fine utroque modo. Secundo posset aliquis dubitare, si melancholia possit putrefieri, cum repugnet putrefactioni utraque sui qualitate. Dico, quod licet melancholia sit frigida, & sicca in uirtute, actualiter tamen est liquida & fluida: & cum hoc cum coarctatur supercalefit, & humectatur propter vapores retentos: & ita quando putrefit multum moratur, & ideo fluxerit 48. horæ antequam due qualitates sint iunctæ, cum materia est extra uasa. Tertio possumus dubitare, si phlegma aduritur, cum repugnet adustioni utraque sui qualitate. Dico, quod aduritur: quoniam frigiditas & humiditas non est absoluta, & ideo potest calefieri & aduri: uel aduritur propter admisionem partium calidarum adustarum, sicut est cholera, &c. Quarto posset aliquis dubitare de afflictione & interpolatione breuiori seu longiori istarum feb. Dico breuiter, quod afflictio est longior uel breuior secundum quod materia est aptior resolutioni uel non resolutioni, & interpolatio est longior uel breuior, secundum quod materia resistit putrefactioni parum uel multum. Melancholia igitur longo tempore affligit, quia materia est grossa, & non est apta resolutioni, & multum interpolat: quia utraque qualitate resistit putrefactioni. Phlegma autem multum affligit: quia materia est viscosa, & non de facili resoluitur, & parum interpolat, quia humor est paratus ualde putrefactioni ratione humiditatis: & ideo aut non interpolat, aut est in falsa quiete. Cholera autem parum affligit, quia ciuissimè resoluitur, & interpolatio sua est inter quartanam & quotidianam; cum tardè putrefiat ratione siccitatis. Quinto intelligendum, quod balnea competunt in quartana in fine, quantum est in ratione morbi, sed in principio gratia accidentium.

De febre phlegmatica. Cap. VII.

Quotidiana est febris de phlegmate putrefactio. Si autem putrefiat materia intra uasa, generat continuam: sed extra, interpolatam. Et si fuerit ex phlegmatibus frigidis, incipit cum frigiditate cogelante, potissimè si est phlegma uitreum. Et si ex calore, tunc est magna sitis,

& tunc est ex phlegmate salso. In phlegmate autem naturali est modicum frigus, & modica sitis. Causa huius feb. est otium & repletio nauseativa, & ideo libenter uenit in hyeme, & in senne, & in puero, & humidis, & phlegmaticis, & piscatoribus, & mulieribus, & habentibus eruptiones acerosas, & habentibus catarrhum descendente ad stomachum, & breuiter omnia illa quæ generant chimum phlegmaticum: & sicut aliæ febres generantur generaliter ex multitudine suarum specierum, ita & hæc.

Incipit enim quotidiana uera, cum modica frigidityte extremitatum, & cum pulsu paruo & occulto: & cum uenit ad statum, calor non est intensus, sed lentus & occultus, & pulsus est semper diuersus: & terminatur cum modico sudore, & urina in principio est remissa.

Febris enim phlegmatica de difficili eradicatur propter multitudinem materię, grossitiem & viscositatem, & sicut cholericæ raro inuenitur continua, ita phlegmatica interpolata. Clausio pororum est fortis, & humiditas multa, quare putrefactio ut plurimum continua. Si autem in principio paroxysmi uideamus uomitum spontaneum, & in fine sudorem plurimum, bonum signum est: quia ægritudinem breuem & salubrem significant: quoniam ex hoc significatur, quod materia non est multum grossa, nec viscosa, & porum non sunt nimis densi: ista enim febris libentissime uenit cum oscitationibus multis, & aliquibus alienationibus, & cum quodam stupore, & parua siti, & tumore faciei & liuore, & de facili caderent in subeth, & sunt cum dolore stomachi continuo. Medicus igitur ut de eo fiducia habeatur, dicat aliquando aliquid de prædictis præteritis, aliquando de præsentibus, aliquando de futuris.

Curatio igitur erit secundum diuersitatem specierum: sed cognito simplici, satis de facili cognoscitur compositum: & curatio morbo uero satis de facili curatur morbus nothus: & ideo ad ueram quotidianam principaliter intendamus. In quotidiana igitur de phlegmate uitreo multum ualet pristana cum modico piperis: & quia materia est multum frigida, ideo alia exhibentur iuxta proportionem materię. In quotidiana autem de phlegmate salso mirabiliter ualet aqua dulcis potata quātuncunq; calidior poterit, sicut dicemus capitulo de siti, propter phlegma salsum. nunquam potui inuenire remedium in phlegmate sal. cum diligenter & frequenter laborauerim, nisi in potu aquæ dulcis calidissimæ. Fiant igitur alia secundum qualitatis proportionem, quia non esset decorum omnia particularia ruminare. Si autem quotidiana fuerit de phlegmate naturali, tunc oportet aduertere. In primis igitur hic, & in quolibet morbo intendamus ad causam: quoniam si

causam ignorares, quomodo curares? Secundo ad morbum. propter hoc Gal. 5. de ingenio, Semper ante mentis aciem, ægritudinis cognitionem habeas. Tertio oportet aduertere ad accidentia, propter molestationem quam inducunt. Tollamus igitur in primis causam quotidianæ, & omnium febrium putridarum, cum deoppilantibus, & poros subtiliantibus, & intus & extra. Fiant igitur fricationes circa uentrem, & latera, aliquando suauiter, aliquando fortiter, aliquando cum manibus, aliquando cum panis asperis, secundum diuersitatem particularium. Recip. aquæ dulcis lib. 1. uini albi unc. 3. aceti albi unc. 2. radicum apij unc. 1. olei de chamomilla unc. 1. & s. bulliant simul exin, de uenter fricetur, & latera & dorsum, quonia est mirabile in deoppilando, & fiat frequenter, & multis uicibus, & sit semper calidum. Secundo ueniamus ad morbum: digeratur in primis materia cum hyssopo bullito in syrupo acetoso, & purgetur cum ista decoctione. Recip. florum borag. polypodij, turbit, agarici, anisi, marathri, ameos, yuarum passarum mundatarum ab arill. liquir. munda. ana unc. 5. fiat decoctio, & in decoctione temperentur cortices myrobala chebul. unc. 1. fricentur, & coquantur, & detur in aurora. Secundo digeratur materia cum oxysaccara composita, & cum oxymel. diueset, & purgetur cum hierapi. Tertio digeratur sic. Recip. radicum scen. petrosi, apij, brusci, asparagi, ana unc. 1. hyssopi, unc. 2. capij. uene lib. 5. foliorum mentha, foliorum absinthij, ana unc. 3. endi. scario. cichoreæ, scolopen. lactucarum nouellarum. ana unc. 2. quatuor sem. frigidiorum minorum, se. uiol. se. brusci, se. asparagi, se. endi. se. scari. ana unc. 1. laccæ, spicæ nard. liquir. ana unc. ij. mell. rosæ & panis succ. ana lib. 1. fiat syrupus. Materia digesta purgetur cum istis pilulis: sunt enim tanti caloris, quod nulla febris chronica audeat stare ante conspectum earum. Recip. turbit, unc. 1. agarici, aloes, rhenbarbæ corticum myroba. citri chebulorum bene gummosorum. ana unc. 5. foliorum mentha, foliorum absinthij, & eupatorij, ana drach. 2. zingibe. laccæ, anisi, mastiches, piperis, spicæ nardi yuarum passa. mundatarum ab arillis, liquir. munda, ana drac. 1. conficiantur cum oxymel. squill. & fiant pilulæ. Ex istis autem potest uti à drac. 1. usque ad 2. & possunt acui cum esula, aut diagrid. aut utroque, & dentur post unum mensem sue cōfectionis. Dosis autem sue exhibitionis addatur, aut diminuatur, iuxta conuenientiam particulariū. Purgatione facta in declinatione morbi possunt stuphari, & in stupha ponantur ea quæ in syrupo, sed in maiori quantitate præter saccharum, & mel cum multa aqua, & exeunti detur sibi qualibet uice theriacæ probata drac. 1. & in ultimis potest balneari. Quidam autem

do autem in quotidiana videmus urinam multam coloratam & spissam, si fiat phlebotomia cum uirtute forti, non erit malum.

Viso de causa & morbo, uideamus de accidētibus. In principio igitur paroxysmi ponantur extrema in aqua calida, ubi sint chamomilla, & melilotum, & prouocetur uomitus facilis cum decoctione raphani in aqua, aut hydromell. aut syrupo acetoso, aut oxymell. diure. aut de iur sibi unc. s. succi mediani corticis sambuci. In fine autem paroxysmi prouocetur sudor: ponatur igitur uelica znea, plena aqua calida, iuxta plantas pedum, & aer domus sit temperatus. Si autem uomitus erat nimius, confortetur stomachus cum mētha & similibus. Si autē patiatur stuporem, odoret styracem calamitā, & fiant fortes fricationes in extremitatibus.

Et quia stomachi dolor est continuus, emplastretr cum mentha & absinthio, & pane aslo, & aqua ros. & ros. omnibus simul tritis. Si autem fuerit constipatus, fiat suppositorium aut clystere, & in clysteri prater communia ponatur succus betæ & hierapic. Viso de his, uideamus de dicta: & quia parum interpolata, non possumus bene perfecte cibum ordinare. Nullus igitur detur cibus ante accessione per quatuor horas, & ciberetur in maiori tranquillitate feb. Cibus igitur qui competit, est brodium cicerum, mica panis ter lota, & postea detur cū brodio cicerū, detur hordeatum, auenatum, lac amygdal. pullæ paræ cum lactucis, & petro. coctæ, & similia, & paulatim & gradatim post uniuersalem declinationem ascendant ad fortiora, ita quod paulatinē ueniat ad consuetā, sicut in omni morbo debet fieri.

Intelligendum, quod uomitus facilis in principio quotidianæ potest significare digestionē, & est ad bonum, non in quā digestionē completam, sed occultam, & pro tanto dicitur significare digestionem, quoniam magnam indigestionem non significat. Nam materia non est multum grossa, nec viscosa, nec frigida, nec meatus constricti, sed materia uidetur satis parata digestionī: aliter enim non ueniret in principio paroxysmi cum uomitu facili & spontaneo, & in fine esset sudor &c. Hoc ualde bonū est, quoniam totus paroxysmus alieniatur, cum materia antecedens minoratur. Et potest esse, suo modo loquendi, quædam crisis particularis, & est materia digesta suo modo, intantum quod obediens est uirtuti expulsiuæ: procreetur igitur uomitus cum facilitate in omni feb. interpolata in principio paroxysmi.

Secundo aduertendum, quoniam licet in febre phlegmatica debeat esse sudor multus, postquam materia est humida: nihilominus modicus sudor est in fine paroxysmi, imò est differentia cōstitutina secundum intentionem Gal.

in de differentiis febrium. Et ratio huius est, quoniam phlegma naturale est frigidum, grossum & viscosum, ideo materia non est apta ut conuertatur in sudorem. Si ergo aliquando conuertatur, signum est remissionis eorum que dicta sunt, & ideo bonum. Tertio considerandum, quare urina à principio est tenuis, licet materia sit humida & multa, est pro tanto, quia est materia indigesta, & meatus sunt oppilati, & materia est grossa, & non est habilis ad expulsiōem: sed cum incipit digeri, & natura incipit præualere, inspissatur, & ideo significatur principium digestionis, licet occultum. Quarto intelligendum, quod in quotidiana de phlegmate falso aut dulci, est sitis, in alijs autem non est. Vbi notandum, quantum est de presenti, quod in omni quotidiana cōpetit uinum, cum materia sit grossa & viscosa, quæcunque fuerit, licet secundum plus & minus grossior: tamen oportet quod uinum sit debile, & cum multitudinē aquæ, & quod detur post cibum, siue in mensa loco potus, cum habeat digerere, confortare, subtiliare, & non potest feb. intendere, quia feb. de se non est multum intensa, & cum hoc uinum est debile, & cum multa quantitate aquæ, & licet digerat, non tamen debet ante cibum administrari: quia cum sit penetratiuum, timendum est de læsione neruorum, & mentis. Sexto aduertendum, quod licet materia sit grossa, & ita parata euacuationi inferiorum, tamen quia particula patiens est stomachus, & ut plurimū materia in stomacho continetur, & quod est in stomacho, faciliter per uomitū euacuat: igitur in principio paroxysmi laudabilior est uomitus, quam secessus. Septimo declarandum est, quod balneum aquæ dulcis competit in declinatione uera totius morbi ad mundificandum, in alijs temporibus nō: quoniam nimis humectaret, & materia est humida, & cum hoc est viscosa, & non dissoluetur per balneum. Et iuxta hoc uidendum quoniam aqua bullita in uia potus est melior: quoniam in ebullitione rarificantur partes aquæ, & ita partes terrestres cadunt ad fundum, & postea colatur, & est ita melior in omni feb. quæcunque fuerit aqua. Octauo. declarandum, quod panis fermentatus, & cum moderata quantitate salis, melior est secundum Gale. in de cibis, quia frumentū est multum viscosum. Si igitur talis panis est melior quā quicunque alter panis: & talis panis erit melior, si moliatur in aqua, quæ quidem aqua debet exhiberi ut potus: nec sal retinet naturam salis: ideo enim intrauit compositionem sicut aqua, & iuuabit aquam ad penetrandum, nec habet acumen de quo sit curandum.

Nono intelligendum, quod humores mouentur in diuersis horis, & ratione radice superioris, & inferioris: sanguis enim mouetur de ma-

ne sequens motum solis ratione conformitatis, & ipse est in oriente; ratione autem radicis in inferioris: quoniam natura generauit de nocte ratione somni sanguinem multum: natura igitur sagax mouet eum in ista hora post sui generationem; ut a fumositatibus non immundetur. Cholera autem mouetur in tertiis sequens quadram calidam; & licet ratione conformitatis, & ratione inferiorum sit sanguinem non inficiat. Melancholia mouetur post in nobis sequens quadram frigidam & siccam; & ratione inferiorum, ut sanguis ratione motu sequentur; & purgetur a superfluitatibus melancholiz. Phlegma autem in uesperis, sequens quadram frigidam & humidam; & ratione inferiorum, natura sagax, cuius sagacitati non est finis secundum Gale. in de criticis, ne purgetur superfluitates suae; & sanguis remaneat mucus & purus, & ita de sequentibus intelligendum erit. Decimo intelligendum, quod humores grossi magis mouentur de nocte propter calidorem fortiozem; & quia fortiori motore indigent, ideo tunc mouentur: subtiles autem de die, ratione conformitatis, &c.

De febribus compositis ut de septenarij &c.

Cap. VII. In febribus compositis

Postquam actum est de febribus simplicibus, hic agitur de compositis: & inueniuntur quia quae species febrium compositarum, quantum est de presenti: quarum prima appellatur septena, sexta, & ita de aliis: secunda uocatur Erratica: tertia uocatur epiala: quarta causonides: quinta hemitritus. Breniter & in summa intelligendum est, quod phlegma & melancholia componuntur ad inuicem, & faciunt febri compositam. Hae autem compositio fit aliquando ex phlegmate nitreo, aliquando ex aceto, & ita de aliis. Et secundum diuersitatem compositionum, aliquando interpolat plus, aliquando minus: affligunt igitur aliquando de sexto in sextum, aliquando de septimo in septimum, aliquando de nono in nonum. Aliquando mouetur materia de mense in mensem, aliquando de anno in annum: & quia curantur sicut suae relatiuae, ideo non plus dico. Erratica autem feb. causatur ex multis humoribus in diuersis locis putrefactis & adustis: & quando simul conueniunt, generatur feb. quartana, secundum Hippo. potissime uersus autumnum: in se autem non errant, sed quaelibet sequitur motum suae materiae. Nobis autem uidetur, propter diuersitatem suorum paroxysmorum, ad modum planetarum. Curantur autem compositae secundum naturam suorum simplicium. Febbris autem epiala causatur ex phlegmate nitreo, cuius una pars putrescit intra uasa, & cale-

facit interiora: alia autem pars, quae non est putrefacta, dissoluitur & in frigidat exteriora. Eo uerso est in lipparia, unde uersus;

Semper in epiala calefaciunt interiora;

Exteriora frigent, lipparia uertitur illi.

Aliqui tamen uolunt quod aliquando hae compositio sit ex cholera, curatur autem sicut suae simplices. Causonides autem est febris composita ex sanguine & cholera putrefactis intra uasa: & si mistio sit aequalis, appellatur causon synochus: & si cholera in plus, causon synochides: & si sanguis in plus, synochus causonides: & curatur sicut suae relatiuae.

Hemitritus est feb. composita ex continua, & interpolata: & compositiones possunt esse multae: omnes tamen possunt reduci ad tres species tanquam ad magis notas. Causatur igitur prima species hemitritorum ex quotidiana continua, & tertiana interpolata. Et secunda species ex tertiana continua, & quotidiana interpolata. Tertia autem species causatur ex quartana continua, & tertiana interpolata, unde uersus;

Maiores hemitritus in uenis phlegma recondit;

Exterius coleram medius conuertitur illi;

Pessimus humor inest in uenis, sed coquit extrinsecus;

Et quia omnes istae species raro accidunt, quae accidunt, curantur curatione simplicium, ideo non plus materiam dilatare.

De hectica febre.

Cap. IX.

Hectica febris continua, & uniformis, sine humoris uitio, cuius subiectum est cor, & membra solida. Intelligendum est, quod duplex est hectica: quaedam est cum feb. & quaedam sine feb. & appellatur hectica senectutis, ita quod siccitas est multum iniecta, & caliditas est aequalis, uel quasi aequalis, & frigiditas, ita quod istae duo non multum excedunt. Aliquando autem frigiditas, & siccitas multum excedunt, sicut in senibus, ita etiam quod aliquando accidit talis hectica senectutis in iuuenibus aut pueris. Hectica autem cum feb. habet tres species. Prima est, cum consumitur humiditas cordis, & membrorum toralis, & est similis oleo in lampade. Secunda est, cum consumitur cambium, & est simile de oleo in ellychnio. Tertia species est, cum consumitur glutinum, & est simile de humiditate substantiali ipsi ellychnio.

Causae autem febris hecticae sunt omnia illa quae calefaciunt & desiccant, & inflamment cor, & membra solida: & ideo prouenit aliquando febris hectica ex febribus praecedentibus, sicut ephimera, & causone, & similibus, & potissime quando praecipitur eis abstinencia in non suo loco, & quando aufertur potus aquae frigidae, ubi deberet dari tales enim de facili consumuntur.

tur, potissimè calidi, & sicci, & extenuati, quia pingues & carnosì non de facili. ueniunt ad talem consumptionem. Venit & hectica sine febre. præcedente, sicut ex nimia tristitia, & angustia & ira, & labore, & fatigatione cordis & animæ & ex carcere, & ex omnibus illis breuiter quæ corpus extenuant. Et uenit etiam propter uicia hepatis, & cordis, & pulmonis, & pectoris sicut in phthisi & empyemate.

Signum enim febris hecticæ est quando maior calor est in arteria, quàm locis uicinis: quando igitur febris est æqualis & uniformis, & nulla cadit in eo diuersitas, quatum est de ratione sui, nec in prima die, nec secunda, nec tertia, & cutis uergit ad quadam ariditatem, tunc est signum quod iam est in prima specie. Prima autem species secundum Auic. est difficilis cognitionis, & facilis curationis. Et ratio dictorum est, quoniam prima species est, uel potest esse sine siccitate, sicut declarat Gal. in de differentiis febris. In secunda specie hecticæ apparet siccitas notabilis, & cum hoc quacunque hora cibatur, magis inflammatur, & pulsus uelocitatur, sicut apparet in calce uirgæ cum aspergitur aqua. In tertia autem specie sunt oculi concaui, & cutis tensa, & uenter adhæret dorso, & pulsus est debilis, uacuus, & durus ad modum chordæ tensæ, & urina est sicut oleum, & si cadat super lapidem, rancè sonat. Signum autem hecticæ senectutis, est pulsus paruus & tardus, & urina tenuis & remissa.

Prima enim species de facili curatur: tertia autem nullo modo nisi Deus bene uellet: quoniam sicut in ellychnio est propria, & substantialis humiditas consumpta, quantumcumque olei apponatur, nunquam postea rectificabitur: ita nec in hac tertia specie, quoniam substantiales humiditates corporis & membrorum consumptæ sunt, uel uicinarum consumptis. Media autem medio modo se habet, ita quod si curatur, cum magna difficultate curatur. Quando autem ungues curuantur, tunc est in statu: quando autem capilli cadunt, iam uicinantur morti: & si uenerit fluxus uentris, iam est proximus: hoc enim apertissimè desinit uirtutem eorum: quando autem tibiarum incipiunt inflari, iam ulterius uigere non potest, imò ut plurimum infra tres dies moritur. Et patientes hecticam non bene discernunt de calore, quia mala complexio diuersa facta est æqualis, & non sentitur. Et quando febris hectica componitur cum putrida, est difficilis curationis.

Si hectica uenerit ex calefactione hepatis uel ex apostematibus & similibus, curentur illa prius. In hectica igitur competunt frigida & humida, non solum frigida aut nimis frigida, quia desiccant, sicut dicit Auicenna, nec humida cum calidis, quia nimis calefacerent, & exemplificat Auicenna in uino, frigida & humida simul competunt, sicut est pisanæ saccharata. Et compe-

tit etiam lac unde extractum est butyrum. Lac igitur conuenit phthisicis secundum Gale. 10. de ingenio, dum tamen febris putrida non sit admixta, unde lac quod magis competit, est lac mulieris, postea asinæ, deinde caprarum, postea uaccarum. Lac autem quantum possibile, sumatur ab ubere: & si non est possibile, habeatur uas plenum aqua calida, & aliud uas uacuum ablutum cum aqua calida. desuper apponatur, & ibidem colligatur, & uelociter hauriatur: quia lac citissimè corrumpitur, sicut & semine. Et si timeamus corruptionem lactis in stomacho, bulliat una inundatione, & ponatur in eo modicum aquæ, & modicum salis & mellis, & calculi fluuiiales candentes, aut frustum chalybis. Et ideo propter uelocitatem eius corruptionem cum magna cautela sumatur. Balnea etiam competunt: ponatur igitur in tina bis in die, cibo digesto in stomacho, & aqua non sit multum calida sed parum plusquam tepida: & non sudet ibi, nec diu stet, nec inungatur donec in exitu, & subito aqua frigida uel quasi frigida aspergatur: quoniam balneum aquæ calidæ, nisi sequatur frigida, nihil ualet, secundum Gal. nec aqua frigida competit, nisi calida præcesserit. Et qui ista duo, scilicet lac & balnea, diligenter fecerit, inueniet magnum iuuamentum, et animalia bonis pascuis debent nutriri uergentibus ad siccitatem, sicut diximus capitulo de phthisi. Cancris fluuiiales multum competunt, sed extrema debent abijci, et residuum fortiter lauari cum lixiuio facto de cineribus uitium, donec grauitas odoris recesserit, et postea sumantur. Hordeatum, auenatum et amygdum competunt, si coquantur cum lacte uaccino, butyro remoto. Mica panis tritici abluta in multa aqua frigida, dulci, et postea mista cum lacte, multum ualet. Pisces squamosi de aquis mundis ualent. Et oua forbilia, et brodia carniū competunt, et etiam carnes uolariū omnium usualium, non tamè degentium in aquis, et coquantur in multa aqua cum hordeo et coriandro recenti et lactu, aut cum fructibus frigidis, sicut sunt melones, et consimiles. Vinum clarum subtile cum multa aqua competit eis. Inungatur pectus cum isto unguento. Reci. medullæ cerui, et uituli, et butyri sine sale, axungia gallinacea, axungia porcina recentis, dragaganti, gummi arabici infusorij, olei nenuphar. olei uiol. olei de cucurbitis, olei de salicibus. ana drac. i. ceræ quantum suff. & fiat unguentum. Item utatur isto electuario. Reci. puluerem receptarum istorum electuariorum, scilicet diapapaueris, diadra. frigidi, diapeni. sine cinamomo, electuarij resumptiui. añ. unc. 2. carniū testudinū bene præparatarum lib. s. pulueris receptæ triasand. conferue rosæ et uiol. añ. unc. i. panis zucc. quantum sufficit, fiat electuarium. Item utatur isto syrupo. Recip. 4. se. frig. munda. & non munda. maiorum & minorum,

norum, se. papaueris al. pinearum, pistacearum, amygd. dul. iuinbæ, sebest. caricarum, uuarum pas. munda. ab arill. liquiri. munda succi eius, hordei mundi. ana. unc. i. florum rhenus. florum uiol. ana. lib. s. panis zucca. quantum sufficit, & condiatur cum aqua fontis, & iuxta ignem lentissimum. Et si feb. putrida esset admista, possunt cum istis addendi. scari. lactu. cichoreæ, & similia. Et quod purgaretur parum cum calsiat. & similibus. In hectica autem senectutis competit lac, & mel, & bródium carniū: mel autem in hectica, cū feb. est, multum nocuum. Si autem esset in hectica feb. fluxus uentris, detur lac coctum cum lapidibus fluuiatibus candentibus iniectis, aut milio torrefacto, aut lentes excoctæ & elixatæ, aut se. citoniorum, aut sumach, aut myrtilli. De clarificatione huius materiæ excuso me, quia aliquid diximus in lib. de differentiis feb. Gal. & supra 10. de ingenio.

Defebribus pestilentialibus. Cap. X.

Febres pestilenciales sunt illæ quæ adueniūt in temporibus corruptis & sterilibus: cum corumpuntur segetes, & aer, & aqua.

Intelligendum est, quod quædam ægri-tudines, quæ appellantur uariæ & diuersæ, quæ proueniunt ex inepta administratione sex rerum non naturalium: & istæ sunt communes omnibus, & sunt quædam ægri-tudines regio-nales, sicut phthisis, & empyema in montibus, & fluxus uentris & hydropisis in uallibus. Et in quibusdam regionibus sunt quædam arbores, quarum fructus si comedantur, generant à proprietate bocium gulæ, & in quibusdam à proprietate aquarum generatur oppilatio splenis & hepatis, & ita scodus color. Et sunt quædam ægri-tudines quæ appellantur epidimiales seu pestilenciales: & sunt illæ quæ generantur in temporibus corruptis: & omnes tales ægri-tudines sunt pessimæ, & malæ terminationis, propter læsionem membrorum principalium in ra-dice. Corumpuntur autem ipsæ causatiue siue effectiue a superioribus, aut ab inferioribus: quoniam licet aer & aqua & corpora simplicia non corumpantur in naturis suis in quantum huiusmodi, corumpuntur tamen ratione uaporum corruptorum, admistorum: & istis corruptis, corumpuntur animalia, & segetes, & fructus, & item de aliis: & ita corumpunt corpora humana, quia aer corruptus uadit ad cor, & ambit totum corpus, nutritur ex cibis & potibus corruptis. Resoluuntur igitur uapores ex uirtute stellarum, & portantur à uentis ad magnam distantiam, cum strages magna fuerit in aliqua parte mundi, & secundum diuersitatem corporum, diuersæ febres generantur, in

aliquibus sanguineæ, in aliquibus cholerica, & ita de aliis, secundum diuersitatem dispositio-num: & aliqui etiam non læduntur, & aliqui euadunt, & aliqui moriuntur, cum agat agens secundum dispositionem materiæ.

Signorum quædam sunt communia, quædam febribus propria. Signa autem pestilentiaæ futuræ, cum apparet stella comata, candela rotunda & assumpta: & cum modo est calor, modo frigus, & iterum modo calor, modo frigus, siue in eodem die siue in multis. Et cum aer est caliginosus, spissus, & uidetur quod debeat pluere, & non pluit: & cum æstas est cali. & hum. & cum aues dimittunt nidos & ouas: & cum reptilia multa apparent supra terram: ista quippe sunt signa epidimiae futuræ. Propria autem signa in febribus, scilicet quod feb. sit pestilentialis, est quod calor est lentus extra & intus fortis, cum siti & ariditate linguæ, & cum malitia tolerandi ægri-tudine, & difficilis anhelitus, & dolor præcordiorum, & fœtor omnium eorum quæ egrediunt à corpore, sicut est anhelitus, sudor, egestio & urina.

Omnes sunt malæ terminationis, & cum terribilibus accidentibus, & fraudulentis, ad quas consueuerunt sequi uariolæ & morbilli, & ægri-tudines uenenosæ, & ut plurimum deludunt medicos: quoniam urinæ uidentur laudabiles & hypostaseatæ, & non ex materia morbi, sed citi-bi: quia natura non audet morbum inuadere propter malitiam morbi eius: & cum expectatur crisis ad bonum, tunc uenit mors. Aduertamus igitur, diligenter, quod acutorum morborum non omnino certæ pronuntiationes sunt neque uitæ neque mortis.

Præseruari possumus à pestilentia, si tempus est frigidum, odorando muscum, & lignum aloës, & gariosi. & styracem, calamitam, & ambram, & similia aromatica, seu comedendo, seu odorando. Et si tempus est calidum, quod fiat cum aromaticis frigidis, sicut sandali & rosæ, & camphora, & acetositas citri. Curatio autem potest talis esse in feb. quia rectificatur aer iuxta temporum naturas, in frigidando in æstate cum foliis salicis, & cannarum, & uitis alba, cucurbitatum, & cum multitudine aquæ frigida, & acetis, & aquæ ros. & similibus. Odores igitur camphoram, rosas, sandalos, & nenuphar omnia acetosa competunt, sicut est lac acetosum, & herba acetosa, & mala grana. & saccus uinæ acerbæ, & acetositas citri. & limonium, & citrangu. & acetum. Et uitetur uniuersaliter repletio cibi & potus, & in tempore pestilentiali coitus uniuersaliter debet uitari. Si autem ægri-tudo fuerit sanguinea, fiat phlebotomia cum conuenientia aliorum particularium. Et si cholerica, digeratur materia, & euacuetur sicut decet, et ita de alijs. Potest igitur fieri talis

syru. Recip. succi borag. succi buglossæ, succi scario. ana lib. s. ros. storum nenuph. ana unc. i. sandal. muscatell. drach. 2. campho. drac. 2. aceti al. unc. 4. conficiantur omnia cum aqua ros. optima, panis zucca lib. i. fiant syru. quatuor quinq; & clarificentur. Item utatur isto eleuatio. Recip. zucc. ros. triasand. diadrag. frig. ana unc. 4. pannorum auri puri. 20. margaritarum hyacinthorum, ovis de corde cerui. ana drach. i. misceantur. Si autem infrigidarentur extrema, fiant fricationes: fortes in extremitatibus, incipiendo ab interioribus, & trahendo uersus exteriora: & si esset debilitas appetitus, confortetur cum aromaticis & acerosis. Clarificatio habet locum in primo regiminis acutorum.

De sudore. Cap. XI.

Sudor est uapor humidus ab interioribus corporis, resolutus, & iuxta corporis superficiem condensatus.

Causa sudoris, est omne illud, quod materiam resoluit in uaporem: & pro tanto intelligendum, quod duplex est uapor: quidam scilicet, & iste est materia capillorum, sicut dicitur inferius: & est alter humidus, & est materia sudoris. Et ideo sudor prouenit aliquando ab exterioribus, sicut est calor Solis aut ignis, aut ex uento meridionali, aut labore nimio, siue animalis, siue corporalis, aut propter nimias coopturas, aut propter balnea, aut similia. Aliquando prouenit ab interioribus, ratione caloris dissoluentis. Et ex hoc elicitur, quod quidam est sudor naturalis, & est ille qui fit ex bonitate uirtutis regitiuæ, qui est semper cum alienatione, & bona tolerantia. Et est sudor innaturalis, qui fit à re non naturali cum aggrauatione, & mala tolerantia.

Signorum quædam sumuntur à parte quantitatis, & quædam à parte suæ qualitatis: à parte quantitatis quidam est multus, & quidam parvus: multus sudor fit uel à parte efficientis resoluentis, fortiter: uel quia materia multa, aquosa, subtilis, calida, uaporosa, humida: uel quia pori rari: uel quia contentiua debilis, & expulsiua fortis. Paruus sudor prouenit, aut quia resoluens est debile, aut materia pauca, & pori densi, & contentiua fortis, & expulsiua debilis. Et ita uenimus in naturam sudoris ex parte suæ quantitatis. Et ita uenimus etiam in cognitionem ex parte suæ qualitatis, & hoc multipliciter. A parte coloris, primo, quia si pannus in sudore uergat ad rubedinem, signum sanguinis est: si ad citrinitatem, signum est cholera: si ad albedinem, signum est phlegmatis: si ad nigredinem uel luorem, signum est melancholia. Et sumitur signum ex odore, quia grauis & foetidus significat corruptio-

nem. Et sumitur ex sapore, quia aliquando cadit una gutta mollis, & propterea sentit dulcedinem, & ita supra sanguinem: & aliquando sentit amaritudinem, & ita supra cholera: & aliquando falfedinem, & ita supra phlegma falfum, & ita de aliis.

Omnis sudor qui uenit post signum digestionis in die critica, & fit in toto corpore, & cum alleviatione, bonus: & si quæcunque istarum conditionum deficiat, semper malus, & ideo in principio morbi semper malus, quia materia non est digesta: uenit igitur in symptomaticis, non in natura, iuxta illud, Nulla secundum naturam in principio bona est euacuatio. Debet igitur apparere post signa completæ digestionis, & hoc est in fine status. Et ideo in aliquo tempore morbi non est salubris, nisi in fine status: quia in declinatione uirtutem deiecit: quoniam crisis non fit in declinatione, sed in nequiore horarum, si fuerit crisis uera cum omnibus suis conditionibus, quod fit scilicet certa, salua, completa & indicata. Secunda conditio etiam est necessaria, quod fit in die critica: quoniam in omni bona crisi secundum Gale. concurrat radix superior, & ideo oportet quod fit in die critica, ubi natura expectat ut beneficium orbis, quoniam crisis fit semper in fine quadræ aut semiquadræ: & si ista non sint quo ad lunam, sunt tamen quantum ad signum Zodiaci. Tertia conditio est necessaria, quod fit in toto corpore, quia ex hoc fortitudo uirtutis significatur potens expellere ad omnes diametros: & ideo si in una parte tantum fuerit, debilitas uirtutis significatur, siue fuerit calidus, siue frigidus, siue intercisus, siue continuus. Et ideo sudor calidus in capite tantum in febris. continuus malum, & frigidus mortem significat, si feb. sit acuta: si lenta, prolixitatem aggritudinis significat. Sudor autem confurgit plus ex loco ubi est minera, iuxta illud, Vbi sudor, ibi est aggritudo. sudor qui modo uenit, & modo non, est malus: sudor cum debilitate pulsus, est malus. Quarta etiam conditio est necessaria, scilicet quod fit cum alleviatione: quoniam dato quod omnia particularia conueniant, & patiens non poterit tolerare, sudor esset malus: & ideo sudor uniuersaliter cum debilitate uirtutis est malus. Breuiter igitur de sudore per hunc modum poterimus prognosticare.

Aut enim intendimus sudorem prouocare aut auferre: & si auferre, tunc intelligendum, quod nulla euacuatio naturalis, siue innaturalis debet auferri usque uersus tertiam diem, si uirtus possit tolerare: timendum enim esset, quod iret ad cor & membra nobilia: paulatinè igitur abscindatur: remoueantur igitur panni, & euenietur cum flabellis, & citò desinet: aut aspergatur aqua frigida in facie, aut aceto & aqua ros.

ros. aut inungatur pectus cum oleis frigidis: sicut oleum rosa. & salicis, & nenufaris, & similia: aut emplastretrur cum sandalis & camphora, & similibus. Et uidetur mihi, quod facile sit auferre sudorem solum cum flabellis, nisi forte esset syncopalis, & tunc oportet fugere. Si autem uolumus prouocare, aut est feb. aut non: si non est feb. inungatur cum arogon, marciaton, agrippa, & dialthara, & fiat stupha, & cooperimenta, & ignis, & similia. Si cum feb. accipe chamomillam, & melilotum, & semina frigida, & ponantur in sacculo, deinde in aqua cal. & exprimentur, & lateribus applicentur: aut fiat suffumigatio cum his: aut uesica ænea plena aqua calida, in extremis apponatur, & similia.

Intelligendum est, quod postquam de feb. sub quodam cōpendio terminatum est, & feb. plurimum terminatur per sudorem, ideo ut nos sciremus quis sudor utilis, capitulum de sudore fuit hic appositum. Et ideo intelligendum auctoritate Dioclis, sicut narrat Gal. supra illum aphorism. Ventres hyeme & uere. Quia omnis sudor est præter naturam, aut ex parte efficiētis, aut ex parte materiæ, aut alicuius particularis. Si enim uirtus esset fortis, & materia obediens, & pori, & aer, & alia particularia in debita proportionē, aut euaporaret materiam insensibiliter: quod igitur apparet sudor aliquis, repugnat resolutioni insensibiliter: & ideo omnis sudor aliquo modo præter naturam uidetur: nihilominus enim comparādo ad morbum, quia uirtus præualer, & purgatur materia morbi, & alieniatur passio, ideo dicitur naturalis, & bonus. Alter est innaturalis & symptomaticus, & ideo malus, sicut præcedens bonus. Secundo intelligendum, quod sudor materialiter ex secunda. pronenit digestionē, effectiue autem ex tertia, quoniam uapores contenti in porositatibus membrorum expelluntur, & ita sudor potest esse superfluitas secunda & tertiæ digestionis, iuxta diuersos modos loquendi & intelligendi. Tertio intelligendum, quod si sudor ueniat ex causis intrinsecis, communiter & ut plurimum magis uenit in nocte, & magis in hyeme, & magis dormiendo. Si autem ex causis extrinsecis, magis ueniet in uigilijs, & in æstate, & in die. De pinguibus & macilentis est intelligendum quod pingues magis sudant, nisi humorum grossities, & pororum densitas impediāt, & etiam magis uenit in anteriori parte corporis, quam posteriori, cum pars illa sit calidior & rarior, & magis in motu, quam in quiete. Quarto notandum, quod si medicus uideat uersus finem status naturam negligentem & sopitam, & non potentem expellere per sudorem, quod tunc est sudor prouocandus cum temperamento: excitanda igitur est natura, cum medicus sit minister eius. Quinto notandum, quod

in continuis sudor est maior, quam in interpolatis, considerando unicum sudorem tantum: sed si consideremus sudorem omnium periorum, maior est in interpolatis: quia hic pluries, alibi autem non. Sexto aduertendum, quod si uolumus prouocare sudorem, abstergamus sudorem: & ita præcipiebat Gale. quoniam quando sudor moratur, & non abstergitur, oppilat poros & claudit, & ita temperata abstergi: sudoris sine euentatione prouocat sudorem. Sanies autem semper debet abstergi, quia membra corrumpere.

De uariolis, seu pustulis, quæ dicuntur Græcè exanthemata. *omni Cap. in XII. d. ois*

Variolæ & morbilli sunt quasi quædam apostemata seu pustulæ parue ferè supra totam carnem apparentia, de genere infectionum, & corruptionis sanguinis & humorum: ita quod uariola generatur magis de sanguine, & morbillus magis de cholera.

Ista passio generatur ex sanguine menstruo retento in porositatibus membrorum fortis: & natura fortificata expellit, & mundificat corpus infantia, aut pueritia, aut adolescentia: raro autem in iuuentute, rarissime autem in senectute, & iste modus euacuandi est communis omnibus. Accidentaliter autem uenit ex aliis causis, ut si aliquis esset generatus in tempore menstruum, & iste modus est ualde malus: quia tales sic generati, raro effugiunt lepram aut aliquam terribilem ægritudinem. Generatur etiam ista passio ex malo regimine, & potissime cum utuntur cibis de facili, & cito corruptibilibus, sicut est lac, & pisces in eadem mensa: & potissime cal. & humane negligentibus phlebotomiam. Quarto generatur ista passio in temporibus corruptis, & pestilentialibus. Quinto conuenit sequi malas crises feb. sanguineæ. Quia que igitur possunt esse causæ, & quatuor sunt eius species: quoniam quædam sunt de sanguine, quædam de cholera, & quædam de melanchochia, quædam de phlegmate.

Signorum quædam sunt quæ prædicant uariolas futuras, sicut est pruritus uariarum, apparitio lampadum, timor in somno, rubedo in facie, punctio ueniens in toto corpore: & cum incipiunt apparere, sunt sicut capita æuum, aut sicut granum milij, aut sicut caput formicæ: deinde incipiunt multiplicari & magnificari, deinde faciunt crustam et faniem, deinde desiccantur et cadunt. Et si fuerint ex sanguine, uergent ad rubedinem: & si ex chol. ad citrinitatem: & ex phlegmate, ad albedinem: & si ex melanchochia, ad quandam fuscadinem & terrestrementum.

Si fuerint pauca, & cito apparentes, & quod cito maturarentur, signum est bonæ crisis: quia

quasi per modum crisis eueniunt. Si autem uergant ad colorem uiol. aut liuidum, aut viridē, aut nigrum, omnes pessimæ & mortales. Si autem appareat sanies foetulenta, mortale. Si modo appareant, & modo occultentur, pessimum est. Si autem fuerit difficultas anhelitus, pessimum: si autem fuerit cum debilitate anhelitus, & alleviatione feb. bonum est. Si autem in uariolis febr. fuerit fortis, & angustia magna, & sitis uchemens, & uirtus debilis, & anhelitus confectus, signū est mortis proximæ: ut plurimum enim moriuntur suffocati. Si supervenerit syn-copis, pessimum est. Et si urina fuerit nigra aut nigris, ista sunt pessima & mortalia: fluxus enim uentris in uariolis est malus.

In primis si corpus est plethoricū, aut si sanguis dominatur, aut uirtus est fortis. fiat phlebotomia de mediana, postea de summitate nā. si. Cauendum est in hoc morbo, quod non ponantur percussiva, quia materia repercutere tur ad membra nobilia, nisi in oculis, propter nobilitatem eorum. Secundo uerò aduertendum, quod cum oleis non inungantur. Tertio, quia frigida ab extra non applicentur: nec ac si ita frigidus, quod pori possint claudi: nec de tur aqua frigida: & caueantur ea quæ infrigida ta sunt in niue, aut in puteo. Omnia acetosa uidentur competere secundum Auic. & pro tanto competit succus acetosæ, succus mali grana ti, & succus uuæ acerbæ, & succus citrangulo rum, & succus omnium fructuum acetosorum, & competit coriandrum, & nenufar, & campho ra, & sandali, & similia. Cibus eorum sit hordea tum, auenatum, amydu, uua passa munda, ca rica, iuiubæ, sebesten, lentes coctæ in duabus aquis, & postea coquantur in alia aqua. Si igitur fuerit materia sanguinea, digeratur mate ria cum oxyfaccara in plus, & syrupo uiol. in mi nus, & syrupo de fumo terre. Et si cholerica, cū syrupo uiol. in plus, & oxyfaccara in minus, & syrupo de fumo ter. Et si materia fuerit phlegma tica, cum oxyfaccara composita, & syrupo de fu mo terre. Et si materia fuerit melancholica, cū oxymell. diure. & syrupo de borag. & fumo ter. Et aduertendum in laxariis & mundificatiuis, quod sint multum debilia, si exhibeantur: quia ista ægritudo libenter concordat cum fluxu uē tris, & hoc est quod multum abhorremus: dein de inuolnatur totum corpus in panno rub. De inde fiant ista, ut trahatur materia ad exteriora. Recip. apij, foenic. ana fasciculum 1. deco quantur in aqua cum lenticulis multis: & cum tepidum fuerit, linreamen inungatur in illa aqua, & exprimatur, & patientes inuolnatur. Cum uerò maturantur, perforetur cum acu de auro, deinde totum corpus isto puluere asper gatur. Reci. farinæ fabarum, cicerum, lentium, lupinorum, orobi, lithargyri, cerusæ, aloë, fiat

pul. iste enim puluis desiccat & cicatrizat, & carnē regenerat, & si fieret culcitra ex istis pul ueribus, bonum esset. Ad custodiā oculorum. Recip. coriand. sumach, aquæ rosa. albuminis ouorum, fiat collyrium, & frequenter oculis in stilletur. Ad custodiā narium inungatur cum agresta, & aceto, & aqua rosa. Ad custodiā gut turis, gargarizetur frequenter uinum moro rum cum aqua hordei cal. Ad custodiā pul monis utatur diapapa. Ad custodiā intestino rum, utatur trochiscis factis de sumach, & co rian. & spodio conditis cum succo acetosæ. Ad remouendum mala uestigia, quæ in facie post uariolas remanserunt. Recip. lithargyri, cerusæ lotæ, cathimæ lotæ, pulueris cannarum adusta rū, pulueris cōchularū marinarum, & cū oleo de lilio, & cera quantū sufficit, fiat unguentum.

Si dubitaret aliquis de caricis, quomodo cō petunt, postquā uergunt ad ca. & humi. Dico medicamen bonum cōsuevit fieri de caricis, & de dragagathō infuso, lacca, & sem. sceni. & cro co, & lentibus excoriatis, istis simul coctis & tri tis, & simul pistatis & cōfectis. Istud enim me dicamen ualet in principio, & cōfortat uirtutē & facit ad expulsionem: ibi enim sunt caricæ & dragaganthū propter pectus alleviandū, ad præ cauendum stricturem pectoris, quæ libenter ue nit in ista passione, & ibi ponatur sem. sceni. ad aperiendum & ad subtiliandum, & lacca ad re mouendū oppilationē hepatis, & crocus ad cō fortandum cor. Et propter hoc uetula ex quo dam instinctu naturæ quotidie dant in tali casu aquam, ubi est crocus, & lentes, ad confortan dum intestina. Pater igitur quod talis mistio est utilis. Valēt igitur caricæ propter uias anhe litus conseruandas, & ad multa alia. Secundo posset aliquis dubitare, quare non competit fluxus uentris, postquam per illas partes sit fluxus criticus, & cum hoc illa membra sunt apta ad recipiendum superfluitates. Dico quod fluxus uentris non competit in uariolis, postquam manifeste aparent, & potissimē si fiat a natura: cuius ratio est, quoniam postquam natura inci pit hanc materiam uenenosam expellere ad ex teriora, si postea reuenteretur ad interiora, ti mendum esset quod hoc esset ui symptomaticis, & ita esset timendum, quod tunc hæc materia uenenosa ad aliquod membrum nobile. Præ terea ex alio ista materia est acuta & pungitiua & esset timendum de excoriatione intestino rum: igitur fluxus uentris prohibeatur quantū erit possibile.

Tertio intelligendū, quod uariolæ sunt ma gis cū sang. purus ebullitionē: & si sang. choleri cus ebulliat, uocant magis morbilli, & sunt mi noris quātitatis & minoris acuminis: & si sang. cum phlegmate, erunt uariolæ phlegmaticæ, & ita de melancholia.

Quarto intelligendum, quod ex parte purioris sanguinis nutritur foetus, & quaedam pars impura, & immunda remanet in porositate membrorum, & haec est materia variolae.

Quinto notandum, quod ad hoc, ut variolae generetur, oportet duo concurrere, scilicet ebullitio, & fortitudo caloris impellentis: & propter hoc non generantur in matrice, quia membrum frigidum est nisi esset per accidens, & sequeretur morbos sanguineos, nec in foetu existente in utero, nec statim post uterum, sed post cum calor incipit rigori, & confortari.

Sexto advertendum, quod variola & morbillus possunt generari in membris interioribus, sicut in pulmone, & intestinis, & simili-

bus, sicut dicit Avicenna. & est valde malum, quia debilitas virtutis expulsiua significatur.

Septimo considerandum quod ista passio magis generatur in vere, & quia san. magis abundat, & quia uirtus fortior est. Secundo in autumno ratione corruptionis: in aestate autem minus, quia materia exhalat: & in hyeme longè minus, quia pori sunt clausi.

Octavo intelligendum, quod in variolis postquam manifestè apparent, & expansae sunt pettorum, non competit phlebotomia: quia tunc attraheretur materia ab exterioribus ad interiora. Sed quando materia adhuc est in interioribus, tunc bene competit, & hoc est in principio: & ista uidetur fuisse intentio Avicennae.

PETRI DE ABANO

QUESTIONES

DE FEBRIBUS

Quaestio

I.



QUOD FEBRIS non sit calor ostenditur: quia aut erit corpus, vel accides quod est qualitas, non corpus: quoniam tunc duo corpora essent in eodem ubi: quod negatum est 4. phys. & 2. de anima: ut calor naturalis & extraneus, quia enim ratione unus est corpus, & reliquus: cum sint contrarii. Non essent etiam agentia adinuicem & patientia situ distincta & subiecta. Cuius oppositum primo de gen. & cor. Diffinitum quoque & diffinitionis genus non essent ex eadem praedicamentali coordinatione: ut firmatum 4. topicorū: cum febris sit qualitas: puta dispositio vel habitus: neque qualitas, quia februm substantia est in generatione caloris, qui praeter naturam: primo febrium: & 8. theo. substantia vero qualitas non existit, qualitas enim non procedit vel mouetur, cum nihil moueatur: nisi corpus. 6. phys. In febris autem ratione dicitur quod sit procedens à corde per totum corpus in arterias. Amp. febris est dispositio vel habitus ut dictum, & calor, passio, & passibilis qualitas: sed cum diffinitum & genus diffinitionis debent esse eiusdem praedicamenti: ita & speciei, ut unum quodque per id quod sibi proprius & essentialiter inest notificetur. Rursus libro comment

pulsuum 4. Febris est superabundantia caloris secundum totum animal, & aphorif. prima. Est uersio caloris innati ad ignitum. In secundo autem regiminis acu. Est mutatio uel declinatio caliditatis innatae ad caliditatem igneam. Talia uero genera relationem videntur & actionem uel passionem importare, non autem qualitatem, ut febris. Adhuc prima quarti de febribus sunt quodammodo frigida. Palin. Febris autem est calor naturalis, autem extra naturalem. Non naturalis, plures enim scribunt eam fore calorem innaturalem vel extraneum. Non laederet actiones & passiones neque innaturalis: quia cum calori occurrat naturali duo contraria starent simul, quod non fit: cum unum sit alterum natum interimere. Iacerent etiam actus naturae corrupti omnino quod non fit manente uita. Eui. arguunt: sicut se habet bona complexio ad sanitatem, ita & mala ad aegritudinem, cum sit illi contraria, sed bona complexio non est sanitas, verum ipsius causa: igitur nec mala aegritudo. Itaque febris calor non erit naturalis, ne extraneus, cum huius ratione contineat morbi. Ex quibus concluditur febrile calorem non esse, neque naturalem, neque etiam extraneum. Cuius oppositum dicunt omnes febrem potius canes, ponentes illam fore calorem innaturalem vel extraneum. Adhuc illud quod calefacit, & non pereunt actiones, est calidum & extra naturalem huiusmodi vero est febris sensus certificatur. Amp. quod

quæ agunt & patiuntur inuicem communicare debent in materia, alia vero sunt caliditas naturalis & innaturalis; cum vnum alterum corrumpat; convenient itaque in materia: quæ autem sic communicant; conveniunt saltem in genere, cum genus proportionetur materię differentiæ vero formę; quare febris calor erit extra naturalem.

Propter primũ vero huius sciendũ; qd febris plures habet notificationes; est enim totius corporis excedens caliditas proble. prima. Febrium quoq; primo. Calor est præternaturã a corde in totum trãsiciens corpus. Secundo uero de causa. Est calor quis immoderatus animalis; & erectio caloris in tantam immoderationẽ ut contristet hoĩem, & operationibus noceat. 8. quodque theoricę. Febris est morbus ex mala cõplexiõne calida omni cõmunis corpori. Et ibidẽ. Est calor extra naturalem a corde procedens; & per arterias missus ad omnes corporis partes, eiusq; nocens actionibus. Isaac qdem febrium primo. Est calor præternaturã cor in initio patiens per mediocritatem arteriarum; deinde se subito diuidens cum naturali per totũ corpus, naturali nocet actioni. Ioannitius. Est calor innaturalis cursum supergrediens naturę, procedens a corde in arterias, suoq; lædens effectũ. Quarti quoq; canonis initio. Est calor extraneus accensũs in corde & procedens ab eo mediantibus spiritu & sanguine per arterias & nãs in totum corpus; & inflammatur in eo inflammatione quæ nocet operationibus naturalibus. Colliget autem 3. Est calor compositus ex calore naturali & calore extraneo putredinali misso ad totum corpus; & lædit oēs actiones & passionēs. Et istę qdẽ notificationes febricidẽ dicunt; sunt tñ earum aliis cõpletiores qdam. Causę autem febris sicut & aliorũ quæmor existunt, materialis, formalis, efficiens, & finalis. Materialis vel subiectiua duplex, prima qdẽ ut cor; unde Simplicius. 1. ccc. & min. Cor semp a febre patiens primo. corpori distribuit reliquo. Secunda sunt tria subiecta in qbus fundat febris calor, ut spũs & uapor fumosus in qbus fundat ephimera. Et humor sup talem factus, aut putrefactus, in quo feb. cõsistit humoris ac mēbrum quidem fe. ethicę ac habitudinalis est subiectũ. Forma autẽ ipsius & essentia est calor extraneus seu feruor a quo denotat; ceu pyretos feb. Græce deriuat a pyr quod est ignis. Vnde Gal. ad Glauconem & Aurelius. Febricula a feruore quasi feruicula. Efficiens vero duplex; uniuersalis & particularis. Vniuersalis qdẽ est triplex, primitiua, antecedens, & cõiuncta. Particularis est multiplex, sicut in libris traditur febrium. Finis uero illius naturę actibus nocere, ac perimere. Secundum has quoq; causas diuisionẽ recipit ipsa, qm̃ alia ut apparuit est in spi-

ritu; quædam in humoribus; nonnulla uero in membris. Forma eius ut calor pter naturam diuersificat secundum magis & minus. unde primo febriũ. Differentiæ caloris sunt quæ ad magis & minus. Nam qdã est mordax manu; qdã mitis; alia media; & reliqua primo epidimiarũ; & febrium principio. Sed an magis & minus febris diuersificet spẽm, aut minime; p̃sentis non existit inquisitionis. Adhuc quædã sit ex causis primitiuis, ut ephimera vera, qm̃ ephimera ex oppilatione nõ vera existẽs, accidit a causa antecedenti. 4. prima. & primo febrium. Ethica quoq; pluries sit a causa coniuncta complexiõnis malitiã imprimẽte, prout plurimum sequitur febres putridas. differentia. 93. Interdum tñ euenit a primitiua. Humoralis uero semper a coniuncta, febrium primo. Distinguitur et secundum finem: cum quædam sint salubres ut tertiana, quædam mortifera, ut emitritica, nonnullæ medium obtinẽtes. Realior autẽ ipsius diuisiõ est per formã eius secundum qd ipsa diuersificatur secundum tria nota subiecta. Separant deniq; ephimera, quia quædã sunt vera, ut quarum terminus & finis est in prima die dicta ad similitudinẽ enthomini unius diei uinentis tempore, historiarũ. 5. effimeron nominati. & Isaac febrium. 2. & ipsę sunt multiplices, ut earũ causas. Nam qdam sunt animales; ut timor ira &c. aut corporales motiue, ut labor, euacuatio, & fames cum reliquis, aut de foris occurrẽtes, ceu adustio, frigus, constipatio, cutis & reliquę. Quædã non verę sicut quæ ex oppilatione cõsurgunt ex satietate nauſeatiua & apostematibus, quæ res cõcurrunt non motiuis. Et tales intra primum p̃tenduntur diẽ; ut interdum pertransuendo in quartum & quintum cõdescendant; & ut noluerunt aliqui usq; ad septimũ. 8. de inge. & p̃cipue. 4. prima. Febrium uero humoralium qdam est ex eorum sup inflammatiõne absq; putrefactione; ut synocha dicta inflammatiua existens uere medię inter ephimera & putridã; ceu ephimera ex oppilatione medium obtinet inter diligẽtem ephimera & synocha. Altera ex putrefactione humorũ duplex; simplex uidelicet & cõposita: Simplex q ex uno cõsurgit humore; & ipsa quadruplex sicut & quatuor sunt humores tertiana ex cholera quæ triplex existit; certa tertiana, cõtinua, & causon. Synochus de sanguinis putrefactione; quotidiana de phlegmate, & quartana de melancholia. Vel cõposita; cuius cõpositiõ uel est generũ remotorum; ut ephimera cũ ethica; & putrida cũ illis; aut a p̃pinquũ ut qñ duę aut plures cõiungunt putrescẽtes humores; ut cholera & phlegma; & tunc causatur tertiana nota; seu duę tertianę. Aut emitritica; & hæc sæpius euenit cõpositiõ, aut cholera cũ melancholia, uel phlegma cum illa, uel oēs simul. Febris autẽ sanguinis

cum alijs non ponitur componi saltem manifeste. differentia 90. Alterutra vero harum fit aut intra venas, aut extra venas. Quae autem intra venas continua existit: cum meatus sit apertius quo fuligo putrida in cor demandatur: neque possit ex obstructione ac soliditate uasorum, ut uenarum, & arteriarum proprie transpirare ad quae foras. Et in qua materia fuerit multa; ut in syncho, & synocha non apparet sensibilibus additio neque diminutio: aut si fuerit in locis cordi vicinis & in visceribus, sicut in caustione. Si autem humor putruerit extra vasa: ceu venas. & hoc trinus: quia sanguis extra illa, vel ventriculos cordis: cum torculari seu lacuna sanguinis non reperitur. Febrim causat interpositam, cuius motus & quies existunt secundum euentationem humoris & superioribus corporum & quantitatem ipsius & qualitatem: nam phlegma quotidie mouetur: cholera de tertio in tertium: melancholia vero per quartum. In his quidem cessans paroxysmus reincipit propter reliquias caliditatis derelictas post resolutionem causae coniunctae: quae paroxysmum induxit, & propter causam antecedentem adhuc remanentem quae ponitur sub coniuncta. apho. 2. febrium. 2. & 4. prima. Concitatque ad hoc non parum humoris euentatio praetacta. Modus autem generationis febris & proprie putridae est: quia contingit obstructio ex causa exteriori, seu interiori cutis ad quam sequitur oppilatio: & maxime quando fuerit multitudo viscositatis, & grossities materiae: ad quam quidem succedit prohibita transpiratio: & ad hanc putredinis minera & ad ipsam fuligo putrida corpetens: quae à corde ad singulas partes delata febrim inducit. Erbae autem digestio differentia notabitur. 93. Est & diuisio alia febrium accidentalium quasi & ambigua: quoniam quaedam sunt ægritudines: ut quae ex suis per se contingunt causis: aliae sunt accidentales: ceu ex apostematibus: consurgentibus in generum quocunque febrium: quid autem sit calor. quomodo distinguatur: qualiter etiam se habeat ad spiritum ostensum differentia. 49. Deinceps sciendum quod calor qualitatiuus triplex existit: quidam enim est naturalis omnino ut qui inculpat sanorum: alius praeter naturam omnifariam fere: ceu membrorum corruptorum: quae in via mortis existunt, sicut in herpestiomenosis, & caecrosis: accideribus: quidam vero horum medius uelut declarabitur qui febrientium.

Propter secundum vero sciendum: quod quidam dixerunt febrim materialiter esse calorem ut febris est calor id est, in calore consistit. Et hoc ne cogantur dicere duo corpora esse in eodem loco: calorem scilicet naturalem & extraneum: cum Gal. apho. prima ponat ut asserunt calorem fore corpus: & maxime quia Hipp. uidetur nihil aliud

calorem innatum quod spiritum intelligere qui est corpus. simplicium pharmacorum. 5. Et ne agens etiam & patiens loco remaneant indistincta & subiecto: quod quidem est falsum & contra sententiam ut apparebit Gal. sequitur etiam dicere quod omnis febris est in spiritu, & ita ephimera: si spiritus est idem quod calor: sic & febris est calor. in calore: sed quomodo spiritus sit calor ostensum differentia. 59. ubi dictum quod extraneum & improprium valde est dicere quod calor sit corpus cum puram qualitatem dicat & abstractam: licet forte minus caliditate. Ponentes tamen utrumque: calorem esse corpus, dicunt quod in radice vel subiecto differunt: in processu autem unantur: sicut flammae duarum candelarum: quarum una sit de cera constructa, & altera de seuo: radice differunt & materia unantur tamen demum flammae: ita ut ex duobus corporibus fiat unum neutro manente singulari. Haec tamen non est realis compositio & unificatio cum uno corrupto: ut accidentali, remaneat alter, ceu naturalis: neque etiam sic differunt calor extraneus in radice, & naturalis: durante uita ut cera & seuo, cum calor naturalis mineram etiam caloris efficiat extranei: cum nondum sit hic innaturalis omnino: tunc enim mors adesset. Dicunt etiam quidam in eorum subsidio quod non oportet in omnibus actionibus agens & patiens situ fore & loco distincta, sicut in permixtis, quorum unum agit in qualibet parte alterius & patitur. Cōsimiliter in calore naturali & humido radicali: & in his duobus caloribus corporeis: sed in illis quorum unum agentium extra aliud existit in quod agit. At fortassis illud non ualeat cum sermo Arist. sit uoluerit salis sufficienter pariter scientiae naturalis. unde & uniuersalior esse debet. Item, agit Arist. ibidem de actibus & passibus sibi adinuicem permixtis ut apparet in augmento & missione. Propter quod dicendum quod series Arist. est uniuersalis: licet in quibusdam magis appareat huiusmodi distinctio actuum & passuum, ut actus domificationis ostendit, vel generatus. In quibusdam uero licet id adsit: lateat sicut in principiis generationis cum fuerint permixta. Virtus enim per quam generatio perficitur ut in formatiua uelut agens cum principaliori calido magis possidet illarum mediorum: quae autem circumstantiarum locum obtinent materiae & patiens magis ita & quoniam hi calores confranguntur: naturalis tamen possidet coramplius, & proprie illius digniore parte, ut dextra differentia. 47. Innaturalis autem ab hoc calido repellatur ad extra, ut ad superficiem magis pertendatur corporis. Et ideo alii dixerunt quod febris est calor causaliter: à calore namque causat febris: quod persuadent quia si sanitas est calor naturalis, & ægritudo innaturalis: tunc non uident essentialiter differre: sed accideat solum ut fortes albus & fortes niger: unde sanitas & ægritudo erit idem: Dicendum quod hi sicut praedicti in Gal. ut declarabitur peccant. Adhuc distinctio febris

febris seu etiā notificatio esset imperfecta omnino, cū in ea non poneretur genus: dicendo febris est calor. i. à calore causata siue ē in calore fundata: ut dixerunt priores. Amplius qd erit febris aliud q̄ calor, cū sit mala cōplexio calida p totū animalis corpūs diffusa. Ad quod uero deducunt dicendū: q̄ calor naturalis q̄ stat cū sanitate, & calor extraneus q̄ est febris vnitant in calore seu spēs in genere: vt. n. hō & alius sunt idē in animali, sic & calor naturalis, & extraneus in calore. Contrahunt aut in specie per differentias calori essentiales, & nō accidentiales: sicut hi dicunt ut p naturale & innaturale, seu animal descendit in hominē per rationale, & in brutū per irrationale. Quod & actus indicant essentialiter differentes ut digerere, uiuificare: sensibilibiter lādere ac corrumpere: neque est simile quod inducitur de Sorte albo & nigro: quia Sortes est substantia: album autem & nigrum accidentia: calor autem & naturalis, & extraneus accidens.

Propter tertium uero sciendum primitus q̄ febr. est calor extraneus. 2. qualis. Propter primum huius sciendū, q̄ calor extranaturalis est seu essentialis forma febris. Hic tñ calor duplex est. Vnus quidem est passio & passibilis qualitas, prout talis calor infert passionē in talē sensum, & huiusmodi non est febris: cum ea sit dispositio uel habitus. Est & alius calor qui est impressio in aliquid trium subiectōrū inducta, & hic calor est dispositio uel habitus, ut mala complexio, quæ est febris cum fuerit extraneus procedens &c. quod Ari. indicat locans calorē & frigus in prima specie qualitatis: & sanitatē & aegritudinē. unde febrium primo. Substantia febrium & essentia in genere est caloris qui præter naturam: & primo. reg. acu. Non est natura febris ex substantia aliā nisi ex substantia ignis. pyr enim dicitur ignis: inde pyretos: unde latinis græcis non minus febrem à feruore (ut tactum) qui est ignis: proprietas deriuauit: quare Haly. cum febrem diffiniret ait. Hæc quidem diffinitio ex ipsa febris sumitur substantia scilicet ex calore extranaturali non ex ipsū sequentibus accidentibus: quod ostenditur: quia id est, forma alicuius quod in ipsius ratione ponitur, cū diffinitio detur per essentialia. hic autē calor existit præter naturam uel extraneus. Adhuc cum forma det esse ceteris causis magis: potius per eā habet ratio perfici, quam per alias: cū sicut res habeat esse, ita & cognitionē, perficit autem per calorē extraneū conditionatum ut quod à corde & reliqua. Palin. Actio in cognitionē perducit essentia: uelut signum & effectus in significatum & causam. Actio uero febris est excedēt uel præter naturā calefacere: ita vt & actus omnes lādantur & passionēs: propter quod febris essen-

tialiter erit calor & præter naturā. Propter secundum huiusmodi sciendū, quod huiusmodi calor extraneus qui est febr. est qualitas quæ dā superexcedēs horribilis calori impressa naturali, mutans ipsum à dispositione sua naturali & suauī in oppositā: non autem est corpus: vnde Isaac. Calore extraneo ad cor accedente, naturalis egreditur à temperamento. Cum autem per totius corporis partes diuidatur vt eis vitā tribuat: quia à suo egressus est: temperamēto, necesse fit vt mēbra eum recipiant in ea qua est qualitate quæ re calefacit, & vrit ipsa, & generat fe. toti actioni naturali subito nocētē. In quam utiq; sententiā concidit Auer. ita. Febris est calor naturalis mistus cum aliqua qualitate calores putredinalis: sic itaq; calor extraneus calorem afficit naturalem. Hic autē differentia. 29. Spiritū qualificat, quem si vehementer affecerit & ad cor puenerit, hinc abscedēs febr. generatur ephemera, si autē hæc trisia humorem alterēt & corrumpant, febris inducitur putrida: si uero membrā ethica. quod autem sit calor huiusmodi qualitas ostēdunt feb. notificantes per esse malā complexionem calidam & sic. Nosce quoq; quod huiusmodi calor: licet dicatur esse extraneus seu præter naturā: non tamen omnifariā vt calor qui est in corporibus mortuorū secundum Auer. reperitur, sed magis naturalis, affectus tamē vt dictū qualitate putredinali: vnde cū sit medius inter calorem naturalem & præter naturā: sicut semiputredo est media inter saniem & pus, quæ ad bonū simpliciter est in suo genere, & putredinem ad malū omnino febriū primo. Media namq; cum componantur ex extremis eorum sapiunt naturam: ita vt ad alterum comparata videantur altera. phis. 5. naturā utriusq; obtinent extremorū, ppter quod nō parū nominibus denotatur extremorū. apho. enidēs. 4. Et ideo Auer. mediū hoc referens in alterū extremorū quod minus uersutū fe: dixit calorem naturalem qualificatū putredinali qualitate. Et apho. prima. Febris est versio caloris innati ad ignitū. Alii uero respicientes fe. vt declinat uersas deterius extremorū, dixerūt eam esse calorem extraneum, vel extranaturalem, seu præter naturam. Est igitur febris quidam calor compositus ex calore naturali & extraneo putredinali petens cor & ab eo mediantibus spiritu & humidis per uasa in totius corporis actum lāsiones delatus. Propter quartum uero ad primū dicendū q̄ fe. vt ostensum, nō est calor qui est corpus cū calor sit qualitas: non autē corpus nisi improprie ualde pro corpore sumatur calido. Supposito etiam q̄ sit corpus ostensum q̄o duo corpora erunt in eodem ubi & quō nō. Quō etiā agētia & patiētia sunt distincta loco & subiecto. Calor itaq; erit accidens ut qualitas, & sic diffinitum

& genus eius erunt ex eadem egloga p̄dicamē
tali: q̄ si Gal. cum Haly. dicat febrium substan-
tiam esse in genere caloris qui est p̄ter natu-
ram, accipit substantiam pro essentia, ceu quan-
do dicit. Complexio est substantia, & ægri-
tudo est substantia, differentia. 17. In accidentibus
enim reperitur essentia per additamentum, sal-
tem. 7. metaph. & non substantia. Et deinceps
dicendum quòd licet se. non moueatur, neque
procedat per se: mouetur tamen per accidens
ut mediante spiritu & sanguine: qui sunt cor-
pora sicut in. perfectiore tangitur ratione fe-
bris: quod innuit Halyab. quando dixit. a corde
missus. Et. a. procedens a corde mediantibus
spiritu & sanguine. Ad aliud quid dicendum
apparuit, nam feb. est calor, prout hic est effe-
ctus caloris: qui passio existit, & passibilis qua-
litas. Ad alia dicendum, q̄ illa non sunt pro-
priæ rationes febris, sed notificationes commu-
nes quædam. Aut superabundantia, uersio, mu-
tatio & declinatio ratione caloris earum deter-
minati ad qualitatem reduci possunt. Vel su-
perabundantia licet ratione respectus quem
importat sit ad aliquid, tamen ex parte illius cu-
ius est respectus ut caloris in qualitate locatur,
& sic motio & declinatio possunt, aliquid
qualitatem importare. Ad aliud dicendum, q̄
nullæ febres sunt frigida: per se: prout actu exi-
stunt, sed ratione typorum: non tamen de ra-
tione febrim nunc saltem existentium ob re-
giminis lasciuiam ut apparet de accidenti. 5.
Ratio etiam ipsius perficitur ex refractione ca-
loris à corde in reliquum corpus apho. 7. unde
de febribus. Sunt frigida: habentes rigorem aut
horripilationem vt subiungitur. Aut propter
materiam phlegmaticam sparsam super mem-
bra sensibilia: sicut euenit in empiala in qua ca-
lent extrinseca & frigescent intrinseca, uel con-
tra ut accidit in lippiria & in febribus aposte-
matum perniciosorum intrinsecorū in quibus
propter calidum attrahens ut uentosa quæ in-
tus ardent: & exteriora rigescunt: unde quando
sitim cum hoc habuerit: apho. 4. pronuntiatur
mortale. Contingit etiā interdum propter de-
bilitatem caloris naturæ non potētis se per to-
tum expandere. Ad aliud quid dicendum pro
parte apparuit. Declaratum est enim quomo-
do diuerso respectu feb. potest dici calor na-
turalis, non tamen simpliciter & qualiter inna-
turalis seu extraneus, neque inconueniens hoc
apud aliquos aliquando duo contraria simul
existere imo in quibusdam oportet, ceu sanitas
& ægri-
tudo, cum ipsa absque sanitate. esse non
possit: differentia tactum. 72. qualia uidentur
esse calor naturalis & innaturalis. Aut contra-
riorum licet tandem unum expellat reliquum
& corrumpat, simul tamen permanent durante
inter ipsa pugna, ut & mistio denotat elemen-

torum ut tandem calor naturalis tunc calo-
rem extraneum quando sanitas introducit:
aut contra quando mors occurrit: neque etiam
tantum febrilis calor corruptiuus est, ut sem-
per omnes destruat actus. Ad aliud dicendum
q̄ est quorundam fallimentum quo probare
putant complexionem malam morbum non fo-
re, dicendum, q̄ bona complexio est sanitas nō
quidem simpliciter & omnino, quia illa con-
surgit ex temperata complexione cōsimilium,
& eleganti compositione instrumentalium, &
natura utrorumque simul perfecta communi.
Sed bona complexio bene est sanitas cōsimi-
lium, & compositio iusta officialium: & ita ma-
la complexio uel feb. est morbus & calor extra-
neus. Hæc autem dissolutio fundatur super il-
lud quod ostensum differentia. 65. q̄ sanitas
species existit specialissima: ægri-
tudo uero subalterna.

Questio

II

Q. Uod humores non possint periodice con-
fluere ostenditur: quia aut erit ab aliquo ipso-
rum intrinseco, uel extrinseco: sed neutro po-
test esse: nō quidem primum: cum sanguis prin-
cipalior existens humorum non confluat pe-
riodice: sed moueatur a sidue putrefactus, uel
inflammatus, cum tamen uideatur p̄ alijs cō-
fluere, multiplicior enim ceteris, & profun-
dior: quod ad confluxionem cooperatur. Geo-
far introductorij. 3. Neque secundo. quia aut
sunt elementa a quibus non cum motum ha-
beant rectum: hic autem confluxionis est reflexus:
uel a corporibus super celestibus: sed ne-
que ab his, cum fluxio humorum ipsis non ua-
leat coaptari: quoniam octaua sphaera secundū
Ptolomæum complet cursum suum in 30. an-
nis. Iuppiter in 12. Mars in duobus. Sol Ve-
nus & Mercurius vno: & Luna in 27. diebus &
8. horis fere. Periodus autem humorum ut plu-
rimū est trium dierum. Adhuc aut a natura
superiori, aut inferiori, non quidem hac, quia
natura inferior a superiori gubernatur, omnis
autem illius motus gubernatur inde. unde 2.
creticorum. Omne bonum pulchrum, & omne
quod ordini uni adhæret & uiz, & ostenditur
in co uestigium sapientie nō est nisi desursum.
Neque etiam a superiori: quoniam agentia &
patientia oportet in materia communicare,
primo de generatione. Sed natura inferior nō
coincidit cum superiori in materia: cum celi
etiam secundum Cōmentatorem materialia
sit ab ea quæ istorum materia. Amplius, illud
non confluit periodice, quod est ut materia, &
inesse continetur per formam, cum det esse, &
manere sistat, quæ compositi. huiusmodi uero
sunt humores ad animam corporis informam

tuam omnis. Eti. Si confluerent, cum sit motus quidam, & motus omnis à calido & spiritu, calidumque & uentositas requirantur: operatur enim secundum Albumasar ad confluxum, tunc cholera & melancholia magis fluere phlegmate: cum melacholia sit uentosa. 3^o. probe. & cholera calida, cuius oppositum experimur. Palin. Melancholia non confluit cum sigilletur à terra: quæ immobilis extat de animalium motu, neque cholera, cum sit calida & sicca opposita naturæ aquæ, aqua confluxus seu accessio & recessio inuenitur. Humores igitur non poterunt confluere periodice.

Cuius oppositum experitur sensus. Adhuc illud dicitur confluere periodice, quod certis horis mouetur de circumferentiâ ad centrum, vel contra. Sed huiusmodi sunt hum., cum sint humidi currentes. Impelluntur enim a frigore intrinsecus sequentesq; caloris motum expanduntur extrinsecus illius expansione: quod & modus euentus interpolate denotat: processus nanque sit primum à minera putredinis ad cor, & inde ad reliquas corporis partes. Quare humores valent confluere periodice.

Propter primum quidem sciendum quod quid sit humor & quomodo distinguatur monstratum differentia 29. Confluxus autem est motus, quo natura cum calore & humoribus retrahitur à circumferentijs in centrum, & demum ab hoc in illas expanditur: qui sufficienter assimilatur accessioni & recessioni a luna causatur in aquam. Ipsa nanque expanditur à medio in quæ extra. Et accidit quando luna pergraditur à puncto orientis in cœli medium, & deinde restringitur ad intra: donec ad angulum perueniat occidentis. Et ab hinc redit in expansione ut antea, quousque ad angulum perueniat terræ à quo ut prius in se reducitur, unde in centiloquio. Humiditates corporum accedunt in prima quadra, in secunda recedunt, & in alijs proportionabiliter duabus ut declarabitur differentia. 168. Ad quem quidem accessum & recessum iuxta Geofar introductorij. 3. tria oportet concurrere: aquam. videlicet. & locum profundum: longum & latum: asperum, durum, montibus altis consitum & ventosum. Aquæ quoque cuius quantitas sit multa non fluminibus nouiter effusa: sed longo tempore prolixo aggregata, hæc enim densata ac falsa efficiuntur vel amara uaporesque & uenti nascuntur hinc densi. Cuius uero locus & aqua sunt oppositi, influxum & refluxum suscipiunt minime. Sunt autem & aquarum quædam quæ mouentur à generante. Cum enim fuerint extra proprium locum ipsum earum expetunt gravitate seu quæ fluminum. Et Lunam oportet tertio interuenire, cuius dominium est super humida ut humiditates cerebrum, nucham, pinguedines &

medullas, criticorum & introductorij tertio. Ipsa nanque ascribitur aquæ, seu sol igni: differentia. 16. unde secundum ipsius motus diuersitatem permutationem suscipit huiusmodi aqua maxime. potiores enim aquarum ita mouentur attractæ à luna: sicut plura naturalium se concitant & attrahunt. Magnes enim ferrum euellit ad se. Alnaph uero album bitumen quoddam iudaicum ignem ex distantia quam multauit ut prauis eo sacerdotes decipiant plebem, & lapis quis acerum absque contactu, & alius oliualis oleum ac Karabe palcas. Dictum est autem sufficienter quod termini à quo & ad quem dicuntur hic & in confluxu aquæ differre, nam humores quando incipiunt moueri, magis à circumferentijs tendunt ad centrum, & hinc ad eandem: aqua autem est contra. Est autem periodus in quod incipit circuitus terminatus: cuius hic sunt duæ partes scilicet paroxysmus & declinatio, unde apho. prima paroxysmum oportet intelligere totius periodi particulam detriorem, quæ à prima immisione usque ad statum, sicut reliquam quæ declinationis, meliorem. Et eius quidam est fixus eadem hora incipit & terminatus. alius præaccipiens: & reliquus postponens, qui & proprie fit in febribus in quibus exacerbatio reperitur ac quies manifeste. Improprie uero in his quæ additionem & minorationem suscipiunt paroxysmi. Impropriissime autem in horum oppositis ut in febre sanguinis aut caustionibus certis, nisi quis uelit totam ægitudinem unum appellare periodum, cum à sanitate incipiatur & ad ipsam tandem terminetur. Et ideo febrium quædam ponuntur continuæ, alteræ uero periodicæ. hic autem periodus non fit uel haud percipitur in corporibus sanis.

Propter secundum quidem sciendum quod id quæsitum extat difficile. unde. 3. criticorum, quare in morbis acutis per tertium ueniunt paroxysmi ut ad multum, in prolixis uero aut dierum unoquoque, uel per tertium inuenire non est facile. Insuper nullum repens de hoc quæsitum modernum scriptorem ad antiquiores me conuertens eos inuenio utcumque dissonos, & causam in eo tangentes magis ex materiæ dispositionibus, quam ex forma agente, & à fine, cum omnes recte causam hanc oporteat intrinsecari. Necessitas enim ex alijs causis, & non ex materia alicuius est sumenda, seu. 3. physicorum. & primo de gen. animalium detestatur Empedocles. Quidam nanque causam assignant ex parte substantiæ humorum quantitatis, & qualitatis, alij ex parte loci, non nulli ex calore naturali, alij uero extraneo. unde colliget. 4. Causa propter quam circuitus febres habent est, quia humor qui putrescere debet non putrescit simul & semel: quia in eo putrefactionis præparatio

paratio non est cōpleta: sed paulatine in putrefactione proceditur. Et hæc sequitur modū ordinationis quia hæc: operatio secundū aliquē modum est naturalis: quoniam natura in hoc regimen habet, eo quod est putrefactio cū digestionē. Et ideo uarietas ordinis in circuitibus signum est prauum, & non est hæc operatio attribuenda calori putredinali substantialiter: sed naturali, quia in materia nō naturali operatur sicut in multis vijs naturæ reperitur. Et radices Gale. quibus conatur attribuerē ordinē circuituum substantialiter calori putredinali hīc infringuntur. Et propterea nostra sententia est in hoc penitus, quod natura istos circuitus cum calore operatur intrinseco, quamuis superuenit huic calori aliquid extra naturam in quantitate aut qualitate, eo q̄ est agens in materia non naturali vt in humore ægitudine faciente. Et isti circuituum ordines diuersificātur secundum naturam humoris, & quantitatem. Et hic quidem sermo cum eo quod est communis non causæ periodicæ coaptatus fortassis patitur calumniā in non paucis. Primitus quidē eo quod calor naturalis non est causa periodi, cum sit mouens motum conseruans & non incitans. Adhuc natura non mouetur nisi percepto læsuo, & cum cholera sit magis effrenis & naturæ odiosa. Cholera quæ nigra secundum Alexandrum inimica, hæc deberent amplius phlegmate confluere. Rursus. non semper in putrefactione fit digestio, imo non parum amplior suffocatio uel immensior corruptio. Pailin. Varietas ordinis circuituum approbatur cū eius detestetur oppositum, unde apho. 4. Quibuscunque paroxysmi fiunt quacunque dimiserit febris, in crastinum eadem assumpserit hora descripta, nisi uelit uarietatem ordinis circuituum ex debilitate naturæ: iuxta illud eiusdem quantæ si rigor incidit febre nō deficiente, iam debili existente uirtute, mortale. Sed quanquam id uerum eius hoc non patitur positio. Dictum autem Gal. quod is accipit ex secundo febrium aliis eius bene dictis omisissis, amplius ualeat suo: cum calor putredinalis remanens habitu in minora putredinis ex precedenti paroxismo quietata cibo non certissime occurrente superato cum modica euentatione forinseca: mox quidem quod habitu fit actus: ceu calor sopitus in calce confurgit quādo fuerit aqua conspersus: quod autem de hoc magnorum sermones quamquam in medicina sufficiant non tamen causam simpliciter & diuissim euacuant hæsitatum: & in sequenti manifestabitur propositorum. vnde fit opus alia ipsis coniungere vt causa simplicius & præcisius habeatur.

Propter tertium quidē primitus præmittantur quædam necessaria. Et deinceps quāobrem

se. efficitur qdā continua & alia interpolata cū diuersitate tēporis exacerbationis & quietis. Et tertio præcisius ut possibile ostendatur cur hic humorū continue ille quotidie aut aliter certo tēpore moueatur. Propter huius primū sciendum, q̄ cū omnis effectus causetur ex actione agentis in materiam: confluxus equidē ita sciscitabit in humores: qui enim tangit materiam omisso agente, uel agens illa derelicta, insufficiens exeat, cum materia seipsam nō educat in actum: neq; per se agens in semet agat: cū actio in materia concidat extrinsecam: ceu negotiū de corpore anima neglecta uel contra: ut quosdam mordet. Ari. de anima primo. Materia uero in qua fundat periodicus cōfluxus sunt humores talibus uel alijs proprietatibus insigniti. Agens autē est corpus cœlestē naturā mediantē elementari. vnde de animalium gen. 4. Sicut mare & omnem uidemus humidorum naturā stantem, & permutatam secundum ventorum motum & stationem: etiam aerem secundū spiritus solis & lunæ periodum: ita & quæ ex his constituta consequi necessarium: nam secundū rationem necessarium est cōsequi periodos minus principalium eorum quæ principaliora. Vita nanq; est spiritus quidam, & generatio, & diminutio. Cum igitur humores sint minus principales sole & lunæ eorum periodus & confluxus sequet solis & lunæ & uniuersaliter astrorum periodos: ceu principaliores: uelut mare & omne humidum ac aerem ex his naturā stantem recipit ac permutatam. Hic nanq; motus siue mundus cōtinuus est superioribus latenti: bus ex necessitate ut omnis ipsius uirtus gubernetur inde meteo. primo: inde Masahaleh. simile est opus planetarū in hoc mūdo magneti & ferro: & 9. iudices. omnis humanæ genitorū cōditio ex planetis, eorumq; signis tanquā ferum ex lapide magnetē dependet. Amplius nosce periodos certos interpolatarū hos esse. nā phlegmatica certa. 1. 8. quidem affligit horis: & 6. tēpescit. tertiana quoque 12. & 36. quiescit: quartana uero 24. paroxysmat: & 48. interpolat. Indeficientes uero aliquādo extēsiore prædicto affligunt tēpore, interdumq; minori: quod & quietis consequuntur. Quorum quidē indeterminationis triplex est causa: puta humor qui aliquando est maior aut minor, uisior uel incisior: grossior aut subtilior, calidior aut frigidior. Ac uirtus quæ fortis extat interdum, & aliquādo infirma: tertia uero corporis constructio: nam aliquando rara: porosa: leniter commecabilis: & non rara huic opposita, in quibus quidē repertum est medium contemperatum. Si ergo tria inuicem conueniant prima, initium postponetur periodi, & breuius cum accidentibus molestis minime ipsis quietabitur paroxysmus. In reliquis uero tēpore

opposita

oppositis secus eueniet, uelut mediocriter in mediis. secundo febrium & 8. therapeuticz. Rursus quoque aduertendum quod hu. gubernantur forma propria, ceu anima omnis quando in naturali fuerit corpus dispositione omni. Interdum uero magis ostenditur uirtus superna, ut quando fuerit discrasiatum non gubernatum: nanque tunc perfecte ab anima motu agitur corporum superiorum ac elementorum: quod indicant corpora optima: in quibus nulla uel modica ab huiusmodi causatur impressio. In lapsis autem non omnifariam manifesta: sed in aegrotantibus apparens omnino: ceu in anima secundum Geofar. quædam nihil aut minime confluunt: alia inapparenter: & tertia manifeste usquequaque: nec tamen contrarium idest, repugnans ei quod dictum est humiditates accedere in quadra prima & reliqua: hocnanque euenit secundum quod extat possibile uelut subiectum fuerit coaptatum: tunc nanque agentis in ipsum concidit actus. Propter huiusmodi secundum sciendum, quod humores possunt ad duo comparari. Aut ad eorum intrinseca uel forinseca. Siquidem primo quadrupliciter euenit secundum quatuor in eis ad præsens reperta. ut substantiam: quantitatem: qualitatem & locum. Ex his nanque secundum Haly. 8. theo. & Isaac febrium. 5. consurgunt congregationis humoris ad putredinem uelocitas uel tarditas: facilitas putrefactionis aut difficultas, & ipsius euacuationis acceleratio aut mora. Si enim humor fuerit substantiæ mediocris, multæ quantitatis, calidus & humidus: & intra uasa ut necesse sit locatus, non periodice confluet, sed continue magis, uelut san. omnia enim incident una prima: propter nanque ipsius substantiam fluxibilem, multam calidam & humidam putrefactioni paratam: & maxime propter locum intraneum adeo continue & uniformiter affliget: ut additio non perpendatur in ipso neque minoratio. Quod uniuersaliter omnis agit materia quando in cor disintimis fuerit situata: ceu causon. ostendit phlegmaticus etiam. Fuligo nanque putrida cor directe petit & assidue non ualens propter parietum obstaculum transpirare. Et propterea non ut in periodicis febrium sudor expectatur in talibus: cum id quod inflammatum extat ac putrefactum in una partem antequam resideat: quod continuum similiter afficiat: hæc quidem febres breues existent: & in 7. ut multum diebus terminatz dupliciter: uno quidem modo propter eius materiæ coctionis obedientem de leui: alio uero propter eius subtilitatem & acumen. Causam quoque istius satis insuetam Auer. huic superaddidit: ut quia id quod a membris dissoluitur sensibilibus non sentitur. Quando autem materia fuerit extra uasa, non

continuetur motus: sed anesis per oppositum eius quod dictum est euenit: quo quidem iterum superuenit interruptio. Quando enim caliditas finit materiam ad putredinem motam: cum non sit contenta in uasis, cogens expirare: quod eius subtile, remanet incineratum & terreum, quod uehiculum non extat caliditatis & febris: ceu apparet in stercore quando inceduntur cumulis. Quando autem itidem antecedens causa ex cibo non certissime superato ad mineram concurret putredinis & reliquias caliditatis inuenerit ex putrefactione præeunte, inflammatur uice alia: ceu calx conspersa aqua, quod perdurat quousque causa antecedens ad mineram poterit moueri putredinis in ea caliditatis præcedentis uestigia inueniens sufficientia paroxysmi. Gal. & 4. prima. Quia uero phlegma post sanguinem est adauctum: & quia humidum parumque frigidum secundum A. corporis comparatione uiscosum, & locum obtinens extrinsecum a sanguine putrefactionali: alijs reddetur aptius, propter nanque quantitatem & humiditatem. Est enim secundum Alexandrum quotidiana diues materia grossa & uiscosa, uelocius ad putredinem aggregatur, & putrescit his facilius, propter uero uiscositatem eius manet peramplius putrefactio. Non enim potest ut plures aliorum resolui: sed propter frigiditatem aliqualem & locum forinsecum desistit putrescere, non per multum ita ut tempus putrefactionis eiusdem sit peramplius quietis hora. Melancholia quoque, quia grossa, pauca frig. & sic. cæteris tardius putrefactioni subiicitur. tamen quia est corpus humidum liquidum seu currens: humor enim & quod tale putrefactioni est aptum, & proprie quando calorem suscepit extraneum. Quando autem mota fuerit diutius eius perdurat exacerbatio propter impulsionem in subiecto factam terrestrioris: ceu quæ in lapide ostendit facta ut tempore ampliori interpolet quam paroxysmus extat. Cholera uero subtilis medium inter hos obtinet humores, nec ita ad putrefactionem ut phlegma est apta, neque ut melancholia indisposita, minoris enim quantitatis existens, quam phlegma & amplioris quam melancholia ut ostensum differentia. 32. Et quia calida est & subtilis plus recipit passionem 4. prima & febrium. 2. celerius aggregatur ad putrefactionem quam melancholia. Sed quoniam sicca amara putrefactioni resistit: & quia subtilis celeriter dissoluitur ut eius paroxysmus non permaneat diu. Est nanque in subiectum subtile facta impressio, quod cito suscipit citoque susceptum perdit, ut aer denotat autumnalia ut tempore minori affligat quarrana, minori que pauset. Præter autem hæc quæ humoris, oportet attendere robur uirtutis, ac eius oppositum cum habitu corporis

corporis raro uel denso, & dispositionem etiā particulæ mittentis & recipientis febrium apparens. 2. Ex his itaque colligatur diuersitas paroxysmi & quietis interpolatarum ex his quæ intranea sunt humorum ostensa. Sed circa prædicta euenit dubitare; quia cōcessum est multitudinem ad putrefactionē disponere, & quod mouetur amplius putrescere. Quorum contraria quartus continet meteorum; ita multū quidem minus putrescit pauco. Similiter quod mouetur & fluit; minus putrescit quā nō motū. Dicendum quod uera sunt hæc. siquidem multum & motum transpirationem suscipiant; quia in his uirtus conseruatiua existit intensior, nō putrescunt. Si uero euentatione careant secus cōtingit, similiter & uerum sit cum multū & paucū & motum & quietum æqualiter fuerint apta uel indisposita putrescere; ut sang. denotant & melancholia. Si autem humores referantur ad extrinsecā, dupliciter euenit sicut & ea duo existunt. Aut enim se habent per modum agentium principalium. Et ita cœlorum corpora. uel instrumentorum. & tunc elementa quibus dupliciter appropriantur, aut ratione substantiæ, uel accidentis. Et id uel qualitatis uel quantitatis, uel etiam motus. Siquidem ratione qualitatis dicendum quod cum sang. ueri attribuitur, cui caliditas insunt & humiditas; sintque qualitates hæc motus & confluxus causatiuæ maxime expandendo se assidue a centro ad circumferentiā. Calor enim mouet humiditatem, & ipsa tanquam celerius passibile dilatatur secum; & ad exteriora expanditur, ita ut motus hic absque periodo continetur in finem. Et quia frigiditas est in phlegmate humiditati cōiuncta motum eius impedit expansionem præactum, uerum quia non multa & caloris susceptiua accidentis; ut ex oppilatione quam causa; licet motus eius sit ad intra, febrem interpolatam causat. At quia in cholera caliditas cōiuncta siccitati mouere habet ad extra. Siccitas uero contra, motus impeditur calidi, ut interpolatio maior quā in phlegmate interueniat. Sed quia in melancholia frigiditas est siccitati admixta; cum utræque constriquant & reducant ad intrinsecā confluxus tardatur ipsius, ut quies sit maior exacerbatione quæ etiā protenditur amplius quā expetant qualitates propter substantiam terrestrem in qua facta extat impressio: sicut in cholera est minor quā exquirat propter substantiam huic oppositam. Ita namque huiusmodi qualitates uidentur operari in uniuerso. Si autem intendatur in motus elementorum, inueniuntur humores ut cuncti sibi correspondentes: nam ignis secundum eius partem superiorem motu orbis agitur: & non totus ut ostendit cinis permanens sacrificiorum repertus in anno sequenti. 26. proble.

ita & cholera sibi contributa minori tempore mouetur: quiescitque ampliori. Et quia aer in continuo extat motu & turbatione ut denotat athomi in ipso comprehensū: san. ei appropriatus: similiter agitabitur postquam moueri inceperit donec cesserit omni quaque continue. Sed quoniam aqua minus illo mouetur: motū enim habet refluxū accessionis & recessionis in quo quies intercidit physicorum. 8. Phlegma quidem illi ascriptum diutius mouebitur per partem quietatam: at quia melancholia proportionatur terræ: quæ minime mouetur secundū totum: ueram secundum partes magis. unde Comment. physicorum primo: Dubitatur de partibus quæ sunt apud centrum terræ utrum possit moueri, an nō; præ aliis cum difficultate mouebitur diutius quietata, motus tamen eius longæuus perdurat. Ratione quidem attributionis in substantia persuadetur: quia quanto humor fuerit subtilior, tanto erit mobilior: ceu cholera exceptiua impressionis non retentiuæ: & quāto grossior, tanto motui ineptior: ut melancholia designat: sicut in elementis euenit præter ignem: qui eius substantiæ subtilitate non omnifariam motus persequitur orbis. Ex parte quidem quantitatis in humoribus instantiam non recipit. Quanto namque augmentatiore, tanto mobiliore & contra, in elementis uero propter id quod dictum est in igne. Si uero humores reducātur simpliciter in cœlestia uel in lunam cum elementari materia sibi contributa; aut in planetas, ut dicat tunc inest alicui quod melancholia proportionetur. Saturno ratione frigiditatis & siccitatis motusque tardi. Ipse namque ut testantur astrologi, tarde mouetur secundum motum longitudinis qui in oriens connaturalior est sibi. similiter secundum motum retrogradationis qui sibi innaturalior est, uidetur namque diu subire. Sic & melancholia longum habet interuallum, ac etiam paroxysmum. Cholera uero datur Marti calido & siccō minus Saturno tardo in quo etiam motus longitudinis connaturalis illi est longior, retrogradationis autem breuior, quā etiam in melancholia, quietis respectu. Phlegma uero longæ ascribitur mutabiliori frigida & humida, cuius motus est præceps, laboriosus, modice quieti; ut declarabitur coniunctus. Ideoque ipsum diutius mouetur per partem quietatam. Si quis quoque Ioui principaliter ascribitur calido & humido, ac cæteris planetis, cū ipse fons uitæ alimenti, & totius existat naturæ; & quia eius motus est continuus. Sol enim nunquam retrocedit, neque alij una, ideo motus extat ipsius continuus. Propter huiusmodi quoque tertium & partem digestionis alteram præcurrentis immediate sciendum, quod hu. quāquam natura, complezionalis filii pronuntientur ab Hal. lyab. &

Isaac. & Isaac elementorum, eorum enim qualitates his ascribuntur: ut cholera calida, & sicca igni proportionata &c. Substantia tamen ipsorum coaptantur aquae amplius: quod ostendit corporis resolutio. Nam humiditates subtiliantur & fiunt vapores primo theo. vapor autem est humiditas aquea minutatim decisa, simplicium primo. & febrium Isaac quinto humores conuertuntur ad aquam. Cum igitur phlegma sit aqua proprie ac luna ei ascribatur & proportionabiliter ipsum ceu aqua confluum habebit. Et quia in hac conceditur quies, accessus enim & recessus (ut praetactum) motus est reflexus in quo quies interuenit media: sine namque ea duo motus reuerti nequeunt copulari: similiter euenit in phlegmate, quia motus eius est plurimus ceu. 18. horarum: quies autem modica ut. 6. Quod dearticulatur: sicut enim in luna propter paruitatem epicicli, & motus lunae in illo velocitatem: non percipitur statio, directio, neque retrogradatio: sed uelocitas tantum, quando fuerit in parte inferiori epicicli, & tarditas quando in superiori: sic etiam in phlegmate modica sentitur pausa & falsa: unde. 4. prima. Phlegmatica non eradicatur quin ibi sint reliquiae occultae. quare febrium secundo. Non expurgatur finaliter in paroxysmi declinatione. Sunt autem. & 6. huiusmodi quietis horae: quia inundationes aquae & universaliter humidorum, ut ostendetur differentia. 168. tanto completur spatio, in sex enim horarum spatio quartam peragunt caeli unam. Et quia phlegma non poterat motum lunae ac aquae consequi omnino in una lunae caeli gyratione, quae tempore minori perficitur. 24. horarum aequinoctialium deficit ab illius motu in sex horis fere. Celerius enim ipsa sole orbem percurrit proprio motu. Et ideo uelocius ad punctum peruenit praefixum. Et quia melancholia minime comparatur aquae & lunae: ideo motum earum imitatur quam parum. Cum enim sit ad motum & ad impressionem suscipiendam indispota: propter substantiam grossam, & qualitates motui obuias, non solum unam oportet lunae caeli circulationem praecedere ut agitetur: sed & duas, ut tandem dispositione lunae diu affecta in tertia eius moueatur circuituone in qua concitatur omnino propter uirtutem ipsius in subiecto terrestriore impressam. Eius autem Isaac quietem soli ascribit qui in 24. horarum spatio ad eundem reuertitur punctum. Et quia cholera medium inter hos obtinet humores: ipsa mediocriter mouebitur & quietabitur: quoniam post phlegma plus participat aquae substantia & lunae: vigore tamen propinquior est melancholiae quam phlegmati. Non solum sex horis quietatur ut id neque 48. ut melancholia: sed medium geometricum obtinet appropinquando melancholiae motui am-

plius quia 36. Non enim potuit una circulatio moueri ut phlegma: neque duas postulauit ceu melancholia: sed sibi una satis, affuit cum dimidia. Neque tanto mouetur tempore ut phlegma cum minus concitari sit apta tanquam mouentium minus participans proprietate neque ut melancholia: sed medium obtinuit sicut. 12. horas. Ipsa namque subtilis impressionem suscipiua celerius derelinquit. Nosce si quidem neque in talibus terminos expedit omnino praecisos. inuestigare: unde de his febrium secundo. Diligentissima subtilitas uidetur importuna: cum etiam aqua non praecisus omnifariam concitetur a luna. Motus enim & coniunctiones peramplius tempus, effectum inducunt & maxime superiorum orbium & planetarum. Causae namque plurimum non semper tempore coniunguntur effectui. Quaedam namque plurimum distat ab eo ut generans a genito. Alia uero comitatur instantanee. ut illuminatio illuminans: nonnulla quidem medium obtinens ut causa sufficiens calefaciens aliqua. Ad cuius separationem aliquandiu permanet calor: qualis est luna humorum concitatio ac etiam aquae. Quod autem fulcit amplius quod dictum est: quia confluum humorum & pausa credo quod sit lunae periodo: ut aut 18. vel 6. vel 36. aut 12. seu 48. uel 24. semper enim sex horae: quadre mora seruantur illatae. Sic itaque phlegmatis motus cum eius quiete & cholerae quies cum motu proportionem seruant in numeris tripli: in qua diapason locatur conuerso tamen modo: quia in phlegmate triplum est hora motus ad eam quae quietis: in cholera uero contra. Motus uero melancholiae cum eius mora proportionem constituit dupli ex qua symphonia confurgit diapason, differentia 83. Quod autem praedicti motus non concidant ut diffinitum: euenit quia non directe consequuntur motum lunae, neque aquis proportionantur effluxum manifestum habentibus: sed alterius. At quia san. aquae proportionatur fluxui: propterea in motu extat: ut illa continue periodum non recipiens quiete distinctum. Accommodatusque etiam est aeri: qui in grandi extat turbarione. tum propter planetas plurimos ipsum concitantes: tumque substantiam & qualitatem illius passibiles uehementer: cum id ut dictum sit difficile. unde criticorum 3. Non facile sit causam assignare: cur in acutis morbis ut ad multum sit paroxysmus per tertium: in chronicis uero quotidie aut in 4. Sed dubitatio emergit impressa: quia Comen. primo & 2. cor. & mun. dixit Ari. in lib. de animalibus quod natura lunae comunicans est, cum natura terrae propter luminis in se defectum. Cuius seriaz. 3. de ge. Terra uideatur concilians quartae substantiae: sed aquae contributa est luna. Dicendumque utriusque principaliter tamen aquae

aquæ proportionatur fortasse. natura & motu quod eius ostendit actus, terræ non sic ignobilitate & opacitate, sed non tantum actione.

Propter quantum vero ad primum dicendum, quod licet sang. non confluat periodicè, nihilominus alii humores possunt interpolate confluerè. Causa nanque particularis est, qua non sic sanguis potest confluere, licet etiam sang. sit multus, quando tamè peccat natura magis irascitur contra ipsum, cum grauior sit offensa quanto committens proximior extiterit. Neque locus eius est latus quod requiritur confluxui; secundum Albumasar, licet sit profundus & longus. Aut fortassis hunc periodicare quis sentiet, non tamen propter maiorem motum ipsius percipietur, quia motus parui latent secus maiores, de somno & uigilia. & in de sensu & sensato. Motus maior semper minorem depellit. Dicendum etiam quod motus non est hic humoris proportionatus elementis prout habent ipsum à generante, sed ab aliquauirtute superiore eis (ut ostensum) indita. neque confluxus humorum euenit motu orbis aut planetarum totali, sed ut uisum magis particulari ut lunæ per quadras quæ secundum Alchebitium dat dispositionem suâ omnibus aliis planetis idest reddit se dispositam ad omnium planetarum suscipiendam uirtutem. Cui Saturnus in hoc aduersatur, humores etiam ut ostensum moribus & quietibus apparentibus particularibus & naturis simulantur utcumque. Et nosce quod huiusmodi confluxus & motus est naturalis natura uiuersaliori ut lunæ: licet uolentiam quandam importet ratione naturæ particularis ut aquæ uel humorum ut apparuit differentia: 3. Ad aliud dicendum quod sit a natura inferiori tanquam à natura disposita uirtutem superiorum recipere: ab his autem tanquam ab imprimente causa primordiali. Neque est quod superiora non agant: quia non communicent in materia, cum hoc uenificetur in his quæ agunt formaliter: non autem in illis quæ efficiunt. Superiora nanque non sunt ut hæc formaliter talia: sed effectiue. Non enim sunt composita ex elementis: sed est quinta per se altera essentia: primo cœ. & min. Aut una est omnium materia per indifferentiam formarum. Ad aliud dicendum quod quando quis ægrotat sic humores ac eius cōplexio animæ instrumentum sunt distrahta ut agenti non obediunt principali: sed sponte seipsis ab eius recedant principatu: & ideo alteri naturæ subiiciuntur ut superiori. Ad aliud dicendum, quod non solum calidum & uentositas exquiruntur ad motum, uerum etiā plura tam materię attributa, quam agentī, ut ostensum antea. Melancholia etiam uentosa innaturalis est magis de qua sermo Ari. non autem naturalis ita. Ad aliud dicendum, quod ar-

guit difficultatem confluxus, non autem impossibilitatem: licet enim melancholia terræ proportionetur, non tamen est terrea omnino: sed habet humidum tantum ut sub natura collocetur humoris. Et naq. corpus humidum curren. Similiter si non mouetur secundū totum terræ, aut partes propinquas centro: alię tamē distantes successiue motu mouentur octauæ spheræ: ut dictū est differentia. 16. Neq. cholera ratione saltem substantię aquæ, ut declaratum extra opposita.

Questio 111.

Quod sanguis putrescens generet febrem sanguineam, & non cholicam seu aliam ostenditur. Hippo. contra Gal. introducto. 4. primæ. Rursus Ioannitius. Simples quatuor sunt atque singulares putredinis modi: quorum primus ex putredine fit san. comburentis utranq. partem interiorem & exteriorem, ut est synochus secundus &c. Eti. Aurelius. Species febrium ex corrupto humore sunt quatuor: synocha: anisimerina: tritea, & tetratea: humores autem sunt quatuor solum. Idem tertio criticorum. Febris est conclusa quam Græci nominant synochum: & est illa quæ moratur ab initio sui esse usque ad horam crisis secundum similitudinem dispositionis unius, in qua non est apparens additio neque diminutio, uerum in omnibus diebus æqualiter. Sed si san. conuerteretur in cholera, esset additio & diminutio manifesta, quia cholera mouetur per tertium etiam si faciat febrem continuam, præter forte causonem qualis non est febris huiusmodi. Adhuc sang. putrescens febrem generat uel sanguineam & ita quod intentum: aut alia, non quidem phlegmaticam: cum san. non conuertatur in phlegma. Quod enim coctum est, aut assatum, in crudari non potest. theo. primo. & colligit. 3. Neque quartanam, eo quod ipsa incineratione humorum post putredinem relicta causatur, sibi humiditate etiam adueniente extranea. Quæsitum autem actum putredinis importat, similiter neque cholicam ut tertianam: etenim huiusmodi cholera causabitur, aut per superfluam in hepate sang. decoctionem, qua quidem sic febrem non inducit. Aut per putrefactionem generatur ex sang. Sed cum huiusmodi generationem præcedit putredo, & ipsa sit causa febris cōiuncta & immediate, aut erit febris sanguinis antequam sit eius conuersio in cholera, & quàm febris cholica. & ideo. A. Putredo non habet tempus & conuersio sanguinis in cholera non fit nisi in tempore. Palin. cholera cum facilis sit motus & transitus in aliud, sui caliditate transmutationem inducens, & illam siccitate sustentans, uidetur quod eius putredo febrem non generet cholicam,

feriam, sed melancholicam magis. Cum igitur si quod minus uidetur adesse adest, & quod amplius. Sed cholera sic agilis & permutabilis febrem facit tertianam & non melancholicam, & san. continuam putrescens generabit sanguineam & non cholicam. Amplius illa uidetur feb. sanguinis cui cura adhibetur ægritudinis sanguineæ libro Glauconi inscripto; distinguenti quidem synochæ species tres conditionibus existentibus in omnibus ad sanguinis euacuationem, maxime ex uirtute, & ætate sumptis: euacuandam multitudinem fore præcipitur sanguinis grandem: immo 9. therapeutica inducitur duo iuuenes liber, scilicet & senius, quorum unus patiebatur synocham inflammationem sine putredine; alter uero synochum cum putredine, quibus usque ad lippotomiam sanguinem præcipitur euacuari. Cum igitur ipsius educio tanta propria sit ægritudinis sanguineæ non enim in cholerica, aut melancholica, aut phlegmatica: sic expedit san. educio ner dum tanta. Putrescens itaque sang. febrem facit sang. & non aliam. Huiusmodi quoque oppositum crissum & febrem secundis capitulis secundis. Apparet enim superficietens quod sanguis cum putrescit: eius subtile conuertatur in cholera, & ex quo quidem febris generatur cholera & non sanguinea, grossum uero in melancholiam. Cui enim aliquid putrescit, duæ partes in ipso consurgunt grossum uidelicet & subtile: transcedit enim maxime sang. cum putrescit, hic subtile quidem cholera rubra fit, is autem nigra febrium 2. Et confirmatur quia crissum prædicto. Ad discere oportet in febribus qui febriunt quod tria uniuersa sunt genera earum quæ in putrefactis accenduntur febrium. Nam quædam quidem in rubra cholera: & plurimæ sunt hæc quædam uero in nigra: & alia in phlegmate consistunt. Rursus humores sunt filij elementorum. Cum igitur sang. filietur & proportionetur aeri, aut autem inter cætera elementa est altera bilis & permutabilis: differetia 14. & 16. Sanguis quidem præ aliis humoribus permurabilis existens putrescens in suis non permanebit terminis sed in alios potius conuertetur hum. Et confirmatur quoniam sanguis inter humores sicne tradunt solus est dulcis. Quod autem est huiusmodi quando supercalefit & inflammatur: uelociter permutatur in cholera. Et ideo prohibent ne in febribus & maxime cholericis administrantur dulcia. Amp. si sang. putrescens permaneret san. & non conuerteretur ad cholera, iam ægritudo eius curari non posset, cum careamus medicina san. educiua. Refert enim Gal. de uirtute pharmacorum libello se præsidem induxisse oculis ligatis, ne alius panderet illum suspendi, qui medicinam nouerat

sanguinis educiua propter quod sang. putrescens ægritudinem aliam seu febrem generabit & non sanguineam. Propter primum quidem sciendum, quod sit san. cum aliis hu. ostensum est differetia 33. & 30. quid uero putredo & febris differetia 159. & 87. Febris autem sang. siue sit ex inflammatione ut synocha, seu ex putredine ut synochus ipsius 3. sunt modi 9. de inge. febrium 2. & colligit 7. Vnus quidem æqualiter extensus Græce dictus homoteneus, sicut enim incipit: ita usque ad statum permanet: cum æqualiter resoluatur ei quod superebullit & putrescit cæteris maior & periculosior: ad Glauconem primo. Et alius augmentatus siue augmentatus dictus à principio usque ad statum crescens continue. Minus enim euaporat in fumum quam inflammatur & conputreat. Et tertius per augmentum seu de augmentum oppositus in causa medio. Singuli tamen hi synochæ adaptantur de putredine sang. facti: quamuis secundum Gal. synochæ conueniant: consequenter æ. cæteris putridis etiam secundum Ioannitium. Sicque percepit. Propter secundum uero sciendum prius quid dixerunt de hoc moderni, & antiquiores deinceps. Cuius quidem primigratia, nosse quod nonnulli utrinque argentes in quaestio habita uere responsum al signare ob crimen, quod A. imponit Gal. nescientes iiam ueritatis fortassis. Aut non audentes eligere partem circa id quod hætenus difficile reputatum: sed se potius excusantes: non esse litatorum uirorum lites dirimere: sed sopire & cum honore sepelire. Alij uero protulerunt semet non esse indices inter Gale. & Auer. neque partem uelle, sed sufficere quod ad utranque inductum est partem. Propter uero huiusmodi secundum sciendum, quod fere omnium medicorum sapiunt sermones indistincti, quod sang. putrescens febrem generat sanguineam ut Serapio. Ras. Halyabba. Alexander. Isaac & maxime A. quod & Gale. sentit 9. de inge. in quibus quod in iuene sermo patiente nocte synochum de putredine sang. in tertia nocte, neque in alijs fuit factus paroxysmus per tertiam, minor tamen quam prius aliqua facta febre fuit tamen per augmentum siue declinatum. Non igitur sanguis conuersus fuit in cholera, febrem cholicam & non sanguineam causans. A. uero contra Gal. hic grauer protulit, non enim sufficit ei hunc irrationabiliter reprehendere: uerum & sermonem eius mendacium continere ait purum. Et simile in ipsum adducit 9. animalium cum in quibus olfecisse medicatam uniuersumque rei, & sciuisse multum de ramis: sed radices ignorasse scietur. Cuius quidem series 4. prima opinatus

est Gal. non fieri febrem sanguinis ab eius putredine: eo q̄ san. quando putrescit fit cholera & non permanet sang. Fitergo tunc febris cholerica & non sanguinea: fitq; causon & tertiana, & curat ipsam curatione cansonis & tertianæ. Deinde hunc A. sermonem impugnans dicit contrarium fore Hippoc. & ueritati non conuenire. Assumit enim hanc orationem: Sanguis quando putrescit fit cholera. Et dicit q̄ ex ea potest duplex capi intellectus. Quorū unus est, quod post putredinem iam factam san. conuertatur in cholera. Alter uero ut in ipsa fieri putredinis hoc contingat, sicut nomen sapit hic magis alterationis & putredinis huiusmodi, aut duplicem intellectum orationis præfata multipliciter impugnat, primum quidem tripliciter. Quoniam sang. quando putrescit non fit conuersio solum in cholera, uerum eius grossum conuertitur in melancholiā: non igitur fiet febris cholerica tantum, sed etiā melancholica. Adhuc consideratio quam intendimus est in fieri putredinis: non autem in facto esse ipsius: quod fieri putrefactione contingit: putredo enim in fieri est causa febris: non autem in facto esse. Eri. non est necesse q̄ si cholera fiat post putrefactionem sang. q̄ fit putrefacta & febrem faciat, quoniam ex putrido generatur quod non est putridum: ut apparet in generationem uermium ex stercorebus. sic igitur falsus est intellectus denotans sanguinem quando putrescit: id est post fieri putredinem, conueri in cholera. Dico quoque q̄ ipse Gal. hunc non habuit intellectum: cū febris sit ægritudo fiens putrida & non facta. Neque etiam ut dicatur ad primum grossum terreſtre sic est natum gignere febrem melancholicam ut subtile igneum: cholerica: quoniam parum est quid humorum fieri terreſtre. Quod lignorum ostendit incenso, ubi per plurimum enaparat: modicum autem subsidet: febrium 2. Est etiam terreſtre modicum relatione eius quod effumat & in cholera conuertitur: plus nanque ualde distat cholera à melancholia, quā hæc à sanguine. Intellectum uero secundum ut q̄ in ipso fieri putredinis: san. conuertatur in cholera tripliciter similiter deprauat A. Hipp. quidem primo dicentem febrem san. ex eius putredine fieri: & hanc ueritatem sanam existere. Rursus putredo est uia in corruptionem: putredo autem non habet tempus. Et conuersio sang. in cholera fit in tempore. Vult igitur habere q̄ cum putredo præcedat conuersionem sanguinis in cholera, & ipsa fit immediata causa febris & perfecta q̄ ante conuersionem san. in cholera febris erit sanguinea. Adhuc simile est de sang. & alijs hu. sed alij humores quando putrescunt permanent idem, & febres sibi generant proportionales, ut puta phlegma putre-

factum phlegma dicitur & febrem phlegmaticam induci: & sic cholera, & melancholia. Neque conuertuntur ad inuicem nisi post putredinis complementum: propter quod & san. putrefactus & erit sang. & febrem faciet sanguineam. Subtilem quoque Gal. & Auer. hic eius fautoris quis consideras intellectum & magis ueritati attendens, quæ inducta sunt per A. in destructionem intellectus secundi, propositionis præmissæ poterit breuiter remonere. Et primo quia ad auctoritatem Hipp. quid dicendum apparebit consequenter. Ad aliud quod dicit putredinem non habere tempus: conuersionem uero sang. in cholera habere: dicit aduersarius id non continere ueritatem: secundum perspicacem Ari. intellectum: eo q̄ putredo seu putrefactio est alteratio quædam, sicut & nomen indicat actionis. Alteratio enim & actio omnis manente subiecto fit in tempore. physicorū 5. & de gen. primo. Neque etiā conuersionem sang. in cholera dicit antiquista habere tempus: sed in instanti fieri: eo q̄ istud est generari. generatio autem fit in instanti ibidem: cum sit formæ substantialis datio: impartibilis enim substantialis forma: & omne quod mouetur & alteratur fit diuisibile. In hoc nanque differt alteratio à generatione: quoniam alteratio fit in tempore manente subiecto: generatio autem in instanti hoc toto in hoc toto transmutato, de gene. & cor. primo. Hæc quoque quis adinudicator A. prohibere non potest uere nisi dicat A. improprie suscipere alterationem ut paruum tempus eius præcedens generationem nocet non esse, uel habere tempus & etiam improprie generationem non prædatione formæ in momento accipit: uerum generationem appelletur dationem formæ quam alterationem etiam temporalem præcurrentem introductionem formæ in materiam. Adhuc in eo sic exposito itur & fuscito: quoniam si paruum tempus nocet non habere tempus cum eius improprietate: in illo etiam exiguo temporis poterit esse aliquod tempus: in quo & febris erit sanguinea: & postea cum sit citi motus transmutabitur in cholerica. Quod ex ipsius apparet terminatione multotiens in quarta tertio crisium: & 4. prima, ut manifestabitur ex dicendis. Ad tertium præinductum A. dicendum: quod non est simile de san. & alijs hu. Nam sang. cum sit temperatus filius & amicus nature indiuisibiliter magis & minori latitudine terminis angustioribus terminata: alij hu. se habent ad naturam simplicior enim est alijs: febrium secundo. Reliqui nanque hu. distemperati magis & quasi ipsius inimici ampliorem latitudinem habent ad naturam: & eos sub maiori latitudine dimittit peccantes. Sanguinem enim amplius corrigit, ut pater filium. Quod apparet,

parer. proble. 5. Mensurata enim corporum laborant multotiens & permutantur facile: eo quod temperatum propter partium homogeneitatem redactum ad quoddam fere punctale & contrarietatem quam habet cum extremis: plus paratum est & velocius permutari. Testor quoque A. minus sufficienter considerasse ac superficialiter sermonem Gale. & ideo magis gratis ipsum condemnasse. Quod ut appareat: denique sermones adducuntur ipsius ut clarius eius habeatur intellectus intentio. In secundo namque febrium nulla deterior est hac inuestigatio: verum velut in aliis hu. accenduntur ex putrefactione febres: ita & in sanguine putrefacto: quam quidem quaestionem visus est determinare in alteram partem magis: ut quando sang. in aliqua particula contra naturam continetur, & non in venis, & corde, velut in apostemate phlegmatico. Inquit enim quando in aliqua particula animalis coaceruatur sang. amplior super virtutem oppilans propter grossitiam parua vasa vel obstructus propter multitudinem sicut contingit secundum bubones & pustulas & vniuersaliter dicendum secundum omnes phlegmones. In talibus namque dispositionibus duplici de causa corrumpitur sanguis quia non transpiratur: tum etiam quoniam non detinetur a natura: hoc est in eius loco. quia sicut locus est, ita & natura operatur. Quae enim haec duo in se continent: necesse est corrumpi & maxime velut in fructibus & seminibus apparet, & in sanguine extra locum suum situato. vnde apho. 6. Si sanguis in ventrem id est in concavitatem praeter naturam effundatur: necesse est putrescere. Quod quidem hic Gal. determinat in pleuriticis. In his enim sang. transmutatur in choleram: ita quod analogiam per hoc paroxysmorum suscipiunt tertianae. In quibus quantum sang. subtilissimum existit & pingue: in flauam transmutatur cholerae quantum vero grossius in nigram. Secundo vero crissum. Quando sang. qui secundum naturam habet constipatus fuerit ut in rheumatico loco putrescit: phlegmon quidem palsio est simplex, aut ab ipso febris accendetur similis maxime ephemeris: qui in bubonibus finit: nam bubo ex sanguine fit optimo, sed manifestum quod quando inceperit putrescere non ultra is permanet bonus, verum iam cholericus fit. Et constat ex hoc esse tria vniuersa genera simplicium febrium. Quae namque ex sanguine putrescente fit, iam qualitercunque cholerica: & reliqua. Non ergo simpliciter id esse asserit: sed cum modificatione quadam: apparuit quoque ex Gale. differentia 32. quod ipse artius suscepit sanguinem quam A. quare celerius potest in choleram permutari. Auct. quoque sententia huic licet occultius assimilatur

sermoni. In tertio namque colligit: Febres sanguinis generantur proptereius exitum extra naturam in quantitate aut qualitate: sed eius exitus in qualitate debet esse paucus, quoniam quando exit multum, tunc debet agnoscitur attribui nomini illius agnitionis ad quam declinat, & illi cui dominatur manifeste: hoc est: quia quando nimis inflammatur debet attribui cholerae. De hoc quoque quarto eiusdem. Febris sanguinis typum non habet: eo quod sanguis ipsam faciens est in venis. Excepto si fieret propter apostema nominatum phlegmon: quod in membrorum aliquo foret generatum principalium: velut in hepate & diaphragmate. Tunc enim in hac febre paroxysmi erunt tertiani: similes cholerae paroxysmi quia quando sang. supercalefit, ad naturam cholerae declinat, & ideo in tali febre non est differentia inter febrem cholicam: cuius materia est intra uenas: & istam nisi in magis & minus. Dico ergo ipse quod cum magis & minus speciem non variet, quod ista febris sangu. erit tandem specie cum cholera: cum sanguis fuerit conuersus in choleram. Dicit & denuo. Et uerba Gale. varia sunt in febre sangu. quia aliquando dicit quod est cholerica continua, & aliquando quod est aliud a cholerica, & quod non debet attribui cholericae nisi quia non habet putrefactionem perfectam: quoniam natura istius febris est media inter febrem diem & febrem putridam. A. autem ut apparuit solum alterum puta primum accepit extremum. 7. siquidem colligit: duae sunt species febris sanguinis: una dum sanguis nondum est putrefactus, & alia dum sanguis iam putrescere incipit. Signanter enim dicit dum incipit putrescere: quia procedens in putredinem transmutatur in cholerae & eius febre. Sic igitur uult quod sanguis non multum in putredinem mutatus febre causet sanguineam. Quando uero uehementer in choleram conuertitur: febrem inducet tertianam. Propter tertium quidem sciendum quod ex his diligens superueniens intellectus ueritatem poterit animaduertere. Dico ergo ut testantur febrem sanguinis duplicem existere, unam quidem ex ipsius inflammatione con surgentem: quae febris ebullitionis seu synocha appellatur inflammatoria ex peccato eius, con surgens quantitatiuo principali, & qualitatiuo minori sine illius putredine de qua non haesitatur. Est autem & altera febris eueniens ex sanguine peccante in qualitate cum quantitate, donec putredinem adipiscatur: qui quidem aut continetur in locis propriis ut in uenis & arteriis: uel praeter naturam extra locum suum in ventrem effusus. Si quidem prius cum ei non inist

nisi una, quasi causa putredinis: puta prohibita transpiratio. Manet enim in loco suo hic sanguis, cum uero vehementer impingatur ad inflammationem & putredinem, poterit aliquando putrefieri modice & febrem sanguineam generare: absq; eo qd in choleram transducatur, unde secundo febrim. Quæcunque sine periodis nullus in his patiens est locus præcipuus. Sed humores qui sunt secundum arterias & uenas uniuersas & maxime qui secundum maximas & calidissimas sunt, uel propter aliam quandam causam ut in ephemeris; aut propter putredinem ebullientes accendunt febrem unam synocham à principio usque ad finem indefinentem: usq; in ætatum permanentem & comburentem hominem donec generantes eas humores consumantur aut digerantur uel utrumque patiantur. Apparet igitur ex hac serie qd non sensit sanguinem etiam corruptum in choleram permutari sicut in præmissis. Quod ostendit quia in talibus aliquando in prima dierum cognitiones apparuerunt putredinis: interdum in tertia & nonnunquam in quarta. 9. therapeuticæ. Et sic diu remanet sub feb. sang. antequam in cholericam conuertatur: imo per totum si signa non appareant putredinis: usq; ad quartum cum plurimum ut tactu terminetur in quarta. Sic itaq; pono qd in huiusmodi dispositione puta in febre quæ debet terminari in 7. qd pertres dies aut quatuor sanguis ille putrefactus non multum sub forma adhuc latæ san. remanebit & febre inducet sanguineam. In alijs uero diebus supercalefactus amplius & putrescens in choleram paulatim conuertetur & febre generabit cholericam. Quod si fortassis interdum motus non percipiuntur cholere tertiani, hoc euenit: eo qd materia in locis propinquis existit cordi: ut in causone apparet etiam phlegmatico. In quo additio etiam & diminutio esse non ponitur. Aut propter ipsius quantitatem sicut ostendetur in phlegmate: etiam extra uenas existente quod & fere eius continuat afflictionem absq; quiete. differentia priori. Itaq; cum hic plures concurrant causas: ut quantitas: situs intra uenas & prope cor: non est mirum si motus sit continuus. Si autem san. putrescens contineatur extra uenas: tunc cum sibi diu prius occurrant putredinis cause uidelicet prohibita transpiratio, & non à natura retentio, uel non in eius loco: sed in uentrem effusio putrescens: amplius & citius conuertetur in choleram & febrem cholere generabit. Et istum quidem modum situationis sanguinis in præhabitis uisus est Gal. intendisse cum Auer. & maxime febrim secundo, unde 9. de inge. Si putredo quædam uel ab initio cõfestim, uel posterius innata fuerit: secundum uniuersas quidem uenas & maxime secundum magnas putredine existente:

synoche: i. continuæ generantur febres. In quibus equidẽ non apparet additio neq; diminutio exacerbationis quod pprie sanguini inexistit. Phlegma enim omni die mouetur: cholera autẽ de tertio in tertium: melancholia uero de quarto in quartum: sanguis autẽ continue & æquiformiter propter eius continentiam intra uenas & grandem quantitatem quibus cor petit continue. differentia 28. Subdit autẽ denũ. In una uero particula animalis locatus. s. sanguis: eas quæ secundum periodum aliquam puta tertianam exacerbantur uidelicet febres cum sang. propter causas prædictas hic magis & uelocius conuertatur in cholera. In tali nanq; dispositione situatus: in primo die aut minus uel parum plus putrescens conuertetur in choleram: & demum febrem facit tertianam. Et quia Gal. ut præinductum magis in hoc loquebatur intellectu: dixit sanguinem supercalefactum & putrefieri incipientem in flauam choleram transmutari. Non tamen propter hoc negat. quin etiam in tali possit febris sanguinis generari in principio principiante putredinis maxime. Quod autẽ uoluerit febrem sanguineam fieri ex sanguinis putredine; innuit eius fidelissimus interpretu Haly. theo. 8. eo qd ipse cum Ioannitio etiam ait febres putridas fore quatuor ex quatuor humoru putredine factas, scilicet febrem sanguinis continuam synochum appellatam ex putredine san. fieri. Quod ostenditur sicut enim in humiditatum prima locant febrem putridam secundum eius principium & terminum a quo secundum autem ipsius terminum ad quem febrem ethicam; quæ sunt febres genere differentes: multo magis febres genere comunicantes poterunt in eodem humore consistere nisi autem aliter permutato & transducto. Sic igitur considerans subtiliter & Gal. qd feb. utroque modo disposito & situato sanguine non diu stat aut parum ualde quia in choleram permutetur: uel quia simplicissima sanguinea & uerissima febris non permanet penitus: dixit tandem sanguinem putrescentem in choleram conuerti & febrem eius. Sic itaque exposita est recta Gal. intentio quam Auer. imitatus. Et defectus manifestatus est A. qui fortassis eius satyrico intellectu alteram solum respexit partem nolens eisdem leonino lacerare ueridicum Gal. licet in pluribus locorum ipsum se illius fateatur interpretem. consequens quoque committitur. Propter quartum uero sciendum. Ad quantitatem siquidem Hippocratis A. & ceterorum aliorum uolentium sanguinem putrescentem febrem generare sanguineam: dicendum ut expositum id non fore contra Gal. mentem aut amplius, & etiam citius permutari in aliam quam ille, & maxime cum plus loquatur de apostematum febribus sanguineis. Ad aliud dicendum quod

quod sicut caupon diminutionem & augmentum non recipit sensibiliter; eo quod materia fixata est in locis vicinis cordi, ita neque synochus propter eius quantitatem uirtutis aggrauatam, & putredinis fumum plurimum cor continue petentem, in tantum ut diuersitas in ipso manifestetur minime. Ad aliud dicendum, quod sanguis putrescens & febrem generat sanguineam ut apparuit & alias. Nam putrescens potest considerari tripliciter: quia aut erit in principio principiante vel prope principium putredinis & sic febrem generabit sanguineam: aut in medio putrefactionis, & tunc cholerica faciet: secundum tamen prius: ut habitum, & posterius. vel in fine: & ita febrē inducet quartanam. Ad aliud dicendum, quod ipsa cholera licet sit facilius ad motum & maxime localem quam sanguis sui leuitate & calore: non tamen ad motum alterationis puta ad putredinem: differt enim quod sanguis est alterabilior alijs hu. cum putredo calido & humido conficiatur qualis est san. natura. Sanguis etiam cum permuetur in cholera versum, febris accedit ad naturam. Cum uero ea in melancholiam receditur ab eadem. Ad aliud dicendum, quod licet multum veritatis adducat: tamen quid falsitatis includit. Non enim propter sanguinem tantum expetitur phlebotomia: uerum etiam propter alios interdum hu. abundantes cum sanguine: ut 8. apparet de inge. tertioq; prima. Verum tamen non tanta in his queritur euacuatio: quanta cum scelus aut precipue peccet sanguis. Inducta autem Gal. in oppositum iam apparuit quomodo fiat intelligenda. Aliam siquidem rationem subsequenter cum eius confirmatio ne concedo. Conatur enim sanguinem ex eius aptitudine ad putredinem nimia, tamen in cholera posse conuerti: & in febrem tertianam posse transducere. Vel dicendum, quod tria sunt genera febrium sub diuisarum percontinuum & interpolatam. unde crismus. 2. Tria sunt genera febrium simplicium, quarum unaquaque in duas prius inciditur differentias: aut enim continua, uel desinenter erunt. huiusmodi autem subdiuisionem febrium sanguinis cum sit continua omnis non recipit, uenas etiam possidens maiores quare in illis non potest tribus associari generibus. Et ideo in eo non dedit Gal. cognitiones febrium sanguinis. Aut melius intentio ipsius ibidem non erat ut ait multarum immanifestarum febrium intentiones monstrare: uerum paucarum & manifestarum exercitationis gratia. Intentiones uero febrium sanguinis erant difficilis cognitionis valde. unde febrium. 2. In reliquis erat utique nulla deterior hac inuestigatio. Non minus etiam id ad libros febrium interiorum ac typorum pertinet. 2. apparet de crisi. Ad ultimum dicendum

quod quamuis propositum conetur concludere, tamen posset calumniari utcumque: posito etiam quod non sit medicina scita apud quosdam sang. eductina: scitur tamen apud alios aut sciatur differentia. 144. Vel dicendum benignius, quod phlebotomia non solum debetur peccato quantitatis, sed etiam peccato qualitatis, puta malitiae sanguinis uel utrique: licet non ita proprie uelut quantitatis peccato, quarta primi. Quod etiam satis innuitur ingenii. 9. differentia 175.

Quaestio IIII.

Quod febris sanguinis cum alijs componatur febribus uidetur: quia prima quarti non acquiescitur opinioni eorum qui dicunt duas febres continuas non adinuicem componi sicut duae tertianae. Cum igitur febris sanguinis sit febris continua, ipsa poterit alii saltem continuae commisceri. Adhuc componuntur febres quae sunt diuersorum generum, ut ethica & putrida, quae incomponibiles esse videntur. Igitur componuntur per amplius quae sunt unius generis, cum sint propinquiores, ut sanguinis putrida cum alia putrida, quam putrida cum ethica. Amplius simile uidetur de febribus & apostematibus cum fiant ex eisdem causis: sunt. n. formae ipsorum similes. Sed apostema sang. componitur cum alijs: ut cum cholerico & ceteris. 2. crismus. & 14. de inge. Rursus si causat aegritudinem seu febrē: illud de cuius natura minus est hoc facere: puta sanguis qui ponitur a Gale. & Isaac familiaris & filius naturae, multo magis habebit causare illud quod non sic diligitur a natura: humor enim non putrescit nisi a regimine destitutus naturae, febrium primo & secundo. Itaque ipso putrefacto & febrē faciente: alij qui eo regebantur humores putrescent & febrē facient. Eidem cholera minus putrescibilis sanguine, compatitur secū alias fe. ergo sanguis multo magis copatiatur. Itaque feb. sanguinis cum reliqs componit febribus.

Huiusmodi quoque oppositum monstratur: eo quod a nullo fere auctorum innuit febrē sanguinis cum alijs componi febribus. Adhuc talis compositio aut erit secundum compositionem, uel commistionem: quod esse non poterit, cum sang. sicut regit tingit & magnetis super alios humores, ita & putredo eius ad se, quod est putredinis aut extraneitatis aliorum humorum attrahet. Aut secundum uiciniam, cum non ponantur secundo de crisi. & 8. theo. nisi hi duo modi, hic autem etiam fore non potest: quia ibidem & febrium secundo. non dicitur componi nisi quotidiana cum tertiana, aut quartana, uel aliter quocumque modo componi adinuicem. Cum igitur non ponat febrē sanguinis cum alijs componi febribus, & sit ipsum dare sufficientem. febris itaque sanguinis cum alijs non componetur.

Propter primum uero sciendum, q. quid sit febris, quidque febris sanguinis, & quora quæsitum docuit antedictum. Compositio siquidem febrium enodetur realiter primitus, deinde nominaliter. Quartisiquidem prima, & differentia utrunque. 87. Compositio febrium tripliciter existit. una quidem in genere remoto: & alia in propinquo: tertia autem in specie. In genere siquidem remotor: seu ethica componitur cum putrida. In propinquo puta quando febres ex diuersis hu. causatæ inuicem componuntur: ut quotidiana cum tertiana, uel cum quartana. In specie quoque sicut quando una tertiana componitur cum alia, aut quartana cū quartana, uel phlegmatica cum phlegmatica. Et cōpositio quidem huiusmodi duorum cōdorum ultimorum licet maxime hoc sit in secundo, aut erit secundum permissionem, aut secundum uiciniam seu affinitatem: ut statum a Gal. & Halyab. cū Auic. Voco autem compositionem secundū permissionem, quando duæ materiæ differentes, febrem facientes una componuntur, aut multum, ut phlegma cum cholera, & melancholia. Aut minus ut una species cholera cum alia, ut citrina cum vitellina, uel phlegma dulce cum aceroso uel insipido: & huiusmodi. Et talis compositio, aut erit intra uasa, sicut in febribus duabus continuis: aut extra uelut in interpolatis. Cōpositio uero secundum uiciniam est, quando duæ materiæ diuersæ iuxta secundum modum, aut eandem secundum tertium componuntur intra uasa, & extra, differenter febrem causantes: ita quod una faciat febrem continuam, altera uero interpolatam. Adhuc & huiusmodi febrium modus compositionis est triplex. Aut enim febris una est alij communicans, aut subintrans, aut coalternans. Communicans dicitur quando duæ febres, aut plures simul incipiunt. Subintrans uero quando una superuenit ante præcedentis separationem. Coalternans quoque ut alia adueniat post eradicationem præcedentis. 4. prima. Est autem demum secundum Halyabbatem attendere, q. prædictarum compositionum quædam nomina habent. Aliæ uero nominibus careant sicut primæ quæ in genere remoto, uelut compositio est ethica cum putrida, ac etiam in propinquo aliquo, sicut phlegmatica cum quartana: & sic quæ in specie: seu phlegmatica cum phlegmatica, aut cholericæ cum cholericæ. Secundarum uero characterizantur aliqua sicut emitritæa febris appellata. Circa cuius quidem nomen diuersificati sunt scribes. Quidam enim rudiores dixerunt febrē emitritæam, cuius materia est phlegma intra putrefactum & extra. Quod rationi oppugnat nominis omnino cū emitritæus medium nomet tertianam. ab emis quod est me-

dia, & triteus tertianus: quod in prædicta phlegmatica non seruatur. Agatinus autem febri secundo uniuersas quæ extenduntur tertianas uidetur emitritæas nominare: ita ut constetatur eiusdem generis esse cum tertiana emitritæam. Et differentiam solam in magnitudine paroxysmi habere: quia igitur rationem nominis non seruat, sicut priores fecerunt, peccat. Et quoniam huiusmodi quæ sita magis sunt nominum quàm rerum, in eis inquit Gale. dedignior immorari. Sunt & alij dicentes triplicet fore emitritæum, minorem, medium & maiorem: ponentes minorem quando phlegma putrescit interius: cholera uero extra: medium autem contra: minorem autem quando melan cholia putrescit interius, & cholera exterius iuxta illud. Paruus emitritæus in uasis phlegma recondit. Exterius cholera, medius contrarius illi. Pessimus humor inest maiori, sel coquit extra. Alij uero in sermonibus Garim, poti promoti & Aurelij emitritæi tres dicunt modos: medium scilicet, maiorem, & minorem. Medius est qui tertianæ coniungitur: maior uero quartanæ: & minor quotidianæ. Sunt & alij qui se modernos appellant, cum his conuenientes in numero, diuersificantes penitus in componendi modo: ponunt enim minorem emitritæum quando cholera est intra uasa: & phlegma extra: medium uero contra: maiorem quoque quando cholera sit intus & melancholia extra. Qui prædictorum motiua tollere conantes, moliantur suum dictum quibusdam probabilitatibus astruere: sed quia has trahunt ex libris non recte fortassis, ascriptis sapientioribus & Gale. & quoniam tale litigium potius nomen quàm ré importat, impræsentiarum omittatur. Illustiores quoque medicorum, de quibus extrat Gal. Serap. & Halyab. & utrunque Aoum Isaac uidentur tantum duas species emitritæi ponere, purum scilicet seu certum, & non purum. vocant autem purum qui factus est phlegmate intus putrefacto, & cholera extra. Non purus quoque secundum Serap. est contra. Secundum uero quosdam: dum phlegma permanet extra, & cholera intra, aut ambæ extra, uel utraq; intra: quod est falsum: & quod tamē eti est impropriusam quamuis secundus hoc toleret febrium. Emitritæus enim est febris continua & horrida, id est in qua secundū plurimam partem paroxysmi adsunt horrores ex frigore & rigore commisti. primum autem non reperitur quando ambæ materiæ sint extra neque secundum cum sint intra feb. 2. Ista siquidem est compositio secundum uiciniam in qua secundus crismus & febrium quadrupliciter ponitur compositio uidelicet quado cholera & phlegma ambæ sunt intus, aut extra, seu quando cholera intus, & phlegma extra uel cōtra

tra. Quod & tripliciter potest in his duobus ultimis euenire modis: quia aut cholera & phlegma sunt æquales & ita certus emitritus, uel cholera superat phlegma: & sic incertus. Componitur etiam cholera cum melancholia his quatuor modis compositionis cholerae ac phlegmatis: quorum duo naturam habebunt emitritæ triplicis etiam præter alios febrium. Potest & melancholia præactis quatuor modis phlegmati copulari: nullus tamen horum emitritum constituet cum tertianam, saltem importet mediam confurgentem à cholera. Et propter hoc tacenti ibidem. Sunt & alij omnem febrem compositam emitritum appellantes, improprie tamen & communius. Propriam autem & uerius, tenendum est quod dixerunt isti postremo. Et quia talis perscrutatio magis est nominis quam rei ait A. cum Gal. hoc non est de illis in quibus sit uehemens occupatio habenda.

Propter secundum uero sciendum quod quidam superficiales dixerunt febrem sanguinis ex putrefactione indifferenter componi cum alijs febribus inter uasa, seu extra. Et mouebantur: quia videbantur illis quod alij humores haberent habilitatem cum sanguine, sicut & alij qui putrescunt in adinuicem: & potissime quia san. est maxime paratus putrefactioni. Adhuc simile putant contingere in febribus, ut & in apostematibus contingit: sed apostemata componuntur ut sanguineum cum alijs. Quæ quidem posio satis erronea esset inarticulata: neque eorum ualent (ut apparebit consequenter) motiua. Fuerunt & alij similiter dicentes: addentes tamen febrem aliorum humorum à febre sanguinea occultari. Quod conatur ex Isaac in fine febrium confirmare. Sic etiam dicentes cadunt ut & primi & peius, forte sapientes: quia in dogma sempiternæ passionis incidunt. Adhuc non est morbus aut febris qui sensibilibiter non lædat operationes: cum hoc sit de ratione morbi & febris. unde Ioānitius. Suoq; lædit effectum. Et A. impedit operationem ita ut retineatur, sicut enim pauca aqua mista multo uino: non debet dici aqua, neque mistum ex ambobus, sed uinum: & dicitur purum etiā eo quod modicam habeat missionem, prognosticorum. 2. similiter & febres alie non erunt permanentes ut dicunt cum sanguinea febre: Sunt & alij modernorum scriptores: exprimentes febrem sanguinis componi cum febre cholerae tantum. Et cum alijs non ita uidentur adaptare. Et ponuntur triplicem modum compositionis: & trium nomen: iuxta illud quod dicitur. 14. de inge. In apostematibus mistis ex cholera & sanguine: putant enim ut alij & hi simile fore in febribus & apostematibus. Illorum quidem exprimentes ulli hanc composi-

tionem extra uasa contingere: & dicentes quod quando cholera æqualiter miscetur cum sanguine, dicitur caufon synochus: & synochus caufon. Quando uero cholera superat sanguinem caufonem synochidem: quando uero sit contra synochum appellat caufonidem. Quas etiam nituntur compositiones per signa discernere. Horum autem sermo: quia non exponitur duplicem potest habere intellectum: aut quod ista compositio febris sanguinis cum febre cholerae fiat ex cholera præexistenti cum sanguine: quod put. eos intelligere: uel ex cholera ex sanguine generata per eius putrefactionem: cum dictum sit prius quod sanguis conuertitur quando putrescit in cholera. Primus uero stare non potest: sicut tertio ostendetur dicendorum. Adhuc aut putredo cholerae præcedet: & ita ea maioratur super putrefactionem sang. & cum sanguine putrefactus de se conuertatur in cholera: tunc maxime propter cholera fieri etiam conuersio in cholera: sicque febris cholerae & non sanguinis: uel sanguis præcedet & maioratur putredo super cholera putredinem: & tunc sanguinis putredo totum ad se contrahere quod est cholera putrefactum, & proprie cum sit cholera de facili motiua. Neque etiam æqualis potest stare sanguinis & cholerae compositio: cum sanguis maxime superet cholera. Sunt etiam humores citissime permurabiles.

Propter tertium quidem sciendum, primo quod nullus fere Græcorum neque Arabum expressit febrem sanguinis cum alijs copulari: sicut etiam apparuit per eorum sermones de compositione febrium inductos: quod innuitur febrium secundo ita. febris quæ in sanguine consistit simplicior est his quæ in alijs sunt hum. Subdit etiam demum quod non sit possibile fieri putrefactionem sanguinis secundum quandam unam partem: & quandoque secundum aliam: præterquam si phlegmon colligens detineat incipientem putrescere humorem A. tamen 4. prima de hoc quaesito sub fuga quadam talem protulit sermonem. Videtur Gal. quod febris sanguinis non componatur cum reliquis febribus: quoniam quando putredo est in sanguine est communis omnium humorum: & in hoc est contradictio: quibusdam intentionibus suis: in quo non est necesse nos prolongare sermonem: quoniam non iupatur cum eo medicus: cum ipse obseruet quæ sunt sensus: hic autem alias febris non percipit febribus sanguinis permisceri: & si intellectus id fortasse percipit. Contradictio uero ea Gal. est forte quæ secundo febrium ita scriatur. Si nirtus fuerit imbecillis facta, causa erit ut non superfluitates solum: sed & sanguis ipse corrumptur, putrescat: & febrem accendat: & tunc aliud quoddam principium efficiunt periodorum paroxysmorum: & si prædi-

Eius seruetur calor, duplex erit species februm adinuicem complicatarum. Et ista quidem cōtradictio apparebit in sequenti propositorum ex intentione Gal. Isaac vero in fine februm. Quatuor febres impossibile est vt coniungantur, nisi quando duæ fuerint vnius materiei, & duæ nō, verbi gratia, sicut si fuerint duæ febres de cholera, & duæ de phlegmate, aut duæ de phlegmate, tertia de cholera, & quarta de melancholia. Sanguinis autem signa impossibile est ut cum aliarum signis appareat. Is enim in amplius ac abundantius in tanto corpore: quā omnes humores alij. Qui si putrescit & febrem generat omnes febres operit quæ cum ea sunt commistæ: propter multitudinem suæ quantitatis, & obscurat earum significationes. Fortes enim res debilem denigrant, & multum paucum: ut apparet in sole obtenebrante ignis splendorem, unde apho. secunda. Duorum doctorum simul factorum maior minorem denigrat. Manifestum itaque quod sanguis ceteros humores si cum eo fuerint misti, obscurat. Sic igitur voluit quod febris sanguinis non componatur cū aliis febribus ut sit febris apud medicum dicenda cum non appareant earum significationes neque lationes manifestæ quas habet inducere. Ex his denique deinceps ostenditur quod febris per se sanguinis ex putrefactione non potest perdurans cum aliis febribus componi: febris autem accidens potest. Dico autem febrem per se sine apostemate: per accidens vero quæ causa confurgit apostematis. Inquo etiam ex putredine: quoniam febris ex sanguinis inflammatione non potest cum alijs febribus ea permanente componi. vnde Isaac. Neque sanguis est causa alterius febris: licet calefiat: neque ipse calefacit alios humores. Eius enim complexio tēperamento est vicina. Proinde si calefit & putrescit non multum a tēperamento egreditur. Quod autem febris putrida sanguinis per se aliis non componatur febribus ostenditur ratione: quoniam aut componetur febris sanguinis cum febre cholericā, aut melancholicā, aut phlegmaticā, cum non sit dare plures febres humorum. Et hæc autem intra uenas, aut extra. Non intra, quoniam sanguis prædominans caliditatem & aptitudinem ad putredinem humorū omnium aliorum ad se contrahet. Quod firmatur. Quoniam maior motus depellit minorem & occultat. de sensu & sensato. de somno & uigilia 3. & 5. de animalium generatione. Motus autem sanguinis & quantitas est maior immo maximus. Adhuc de causa longitudinis & breuitatis uitæ. Minor flamma comburitur à multa per accidens sibi subito furripiens pabulum seu alimentum. Similiter ignis minor corrumpitur à maiori. 3. cce. & mun. & proble. prima. Multum ignis ad

se modicum trahit. Cum igitur febris sanguinis sit ut maior flama respectu aliarum, & ignis magnus multus, ipsa omnes alias comburet & ad se trahet. Febris enim sanguinis sic alias hebetat & obtundit secundum Isaac, ut dolor maior minorem, non secundum eandem partem factus, cum uirtus sensibilis tota ad uehementiorem decurrat dolorem, ita ut uirtus hic putrefactiua. Neque potest componi cum febribus interpolatis, nō quidem cum phlegmate & melancholia. Tum quia huius materiarum non sunt paratæ ad putrefactionem quando sanguis putrescit. Tum etiam quia calidum & humidum putrefactiuū materierum ipsarum omnium ad id quod est in sanguine putredinis contrahitur & concurrit. Quod autem materia melancholicæ sit indisposita ostenditur, quia in diuisionibus. O quā parum quidem quartana accidit incipiendo. unde 4. prima. Quartana plurimum euenit in successione ægritudinum putridarum, & hæc est illa quam intendimus. Et alia esse non potest cum sequatur illa aliorum humorum putrefactionem. Si igitur raro per se euenit in corpore quantuncunque melancholico, nunquam tunc eueniet in sanguine in quo nara est fieri sanguinis putredo. unde 9. de inge. Natura februm sanguinis neutra in macro scilicet, quantum ad melancholicum, & frigidum quantum ad phlegmaticum amat consistere, quam plurimum autem in multum sanguinem habentibus, & multas carnes est ipsarum generatio. Simili quidem modo monstratur, quod neque phlegmatica materia sit cum sanguine putrefieri apta, cum non multiplicetur phlegma in corporibus in quibus hoc euenit. Adhuc neque ex parte causæ putrefacientis tam talis causa tollatur propter causam sanguinis putrefactiuam, ad quam contrahitur causa aliarum materierum putrefactiua: imo humiditas ad putrefactionem & causa tollitur putredinis à phlegmate, per sanguinem calefacientem & exiccantem materiam phlegmaticam frigidam & humidam & inopilaram reddentem, quæ erant putredinis causæ. Similiter id contingit in materia quartanæ maxime secundum alteram eius qualitatem, puta frigiditatem. Subtiliatur etiam eius grossities caliditate affecta, quare febris sanguinis putrida cum febre phlegmatis, & melancholicæ nō coniungetur quocunque modo, & minus cum febre cholericæ. Ipsa enim sui caliditate, subtilitate & motus agilitate citissime in causas putrefacientes sanguine deducitur. Cum enim ea de se sit mobilis conuertibilis, puta quia in melancholiam transducitur. Multo itaque maius cum habebit aliquid ebulliens attractiuum, ut putrescentis sanguinis feruorem. Si autem febris fuerit per accidens, ut quæ apostematis,

non poterit febris sanguinis cum aliis, & maxime cum cholericis complicari. Et id fortassis est in quo dicit. A. Gal. sibi in quibusdam aliis intentionibus contradicere: quod dupliciter evenire potest. Aut manifestius ceu quando duo fuerint apostemata, unum ex cholera in stomacho aut diaphragmate: aliud ex sanguine in hepate, vel pulmone. Quando igitur harum duarum putrescent materiarum, duo consurgunt vapores putridi simul cor petentes, hoc enim contingere optime potest cum fornax & origo vniuscuiusque permaneat ab alia separata: licet in processu fiat coniunctio aliqua. Aut immanifestius ceu quando aliquod apostematum ex cholera componitur & sanguine aequaliter maxime. Sicut enim materiarum sunt compositae, ita & summi putridi erunt compositi. veruntamen non erit ita discretio ut in praedicta. Et ideo forsitan quis non immerito febrem unam ponet compositam & non duas. Et quae ita sunt febres ex apostematibus compositae, & praecipue manifestae permanent satis diu. Id autem non parum ostenditur ex crisi secundum ita. Quandoque accidit apostema in duobus membris diversis sicut splene & hepate. & facit unumquodque accidere febrem: quae est alia a febre quam aliud evenire facit. Et quandoque accidit in membro uno apostema compositum ut ex sanguine: cuius apostema dicitur phlegmon: & ex cholera quod dicitur erysipela. Et subdit post pauca. Febris quae accidit ex apostemate sanguinis, quod est in aliquo membrorum, quod tuncque sit membrum, est praeter febrem quae accidit ex apostemate existente in eo ex cholera. unde secundo febrium (ceu tactum) non est possibile fieri putrefactionem secundum quandam unam partem: quandoque vero secundum aliam praeter quam si phlegmonem colligens detineat incipientem putrefieri humorem: si autem est putrefactio secundum unam partem & alteram, sicut diversa erit & loco & materia: ita & febris. Propter quod poterit febris sanguinis cum alia febri esse ita permanens compositio. Propter quantum quidem. ad primum dicendum, quod licet inveniuntur duae simul componi continuae, non tamen propter hoc concluditur quod altera illarum sit febris sanguinea, ostensum sit ipsam non posse suo modo febribus alijs componi. quod innuit A. quando posuit duas continuas copulari inquit. Deinde currunt indicia vehementiae & interpolationis. Id autem non evenit in febre per se sanguinea cum ea sit vere continua. Ad aliud dicendum, quod licet componantur febres diversorum generum: non tamen propter hoc quaedam propinquorum: eo quod febres remotorum generum sunt in diversis valde substantiis non ita se impediunt: sicut febres quae sunt in substantiis pro-

pinquis, velut ignes propinqui magis se impediunt & corrumpunt, & maxime cum sint disperses in quantitate, quam distantes. Febris autem sanguinis impedit febres alias: ut declaratum est omnes. Ad aliud dicendum: quod non est simile omnino de febribus & apostematibus, quia in apostematibus minere putredinis sunt magis permanentes distinctae: quam in febribus. Concessum est etiam quod febris apostematibus sanguinei potest cum alijs componi. Ad aliud dicendum: quod licet sanguis sit minus putrescibilis ratione filiationis & dilectionis naturae: tamen ratione suae complexionis calidae & humidae paratus est putrescere magis. Cuius quidem putrefactio non ostensum ad se putredinis aptitudinem omnium aliorum humorum convertit: & actu etiam effectivum. Ad aliud dicendum, quod licet cholera ratione qualitatis non sit adeo putrescibilis ut sanguis, ratione tamen odii quod ad ipsam habet, natura putrescibilis est magis: sanguis enim per oppositum dilectus est & amicus. Adhuc cholera non est tantae quantitatis quod ipsa ad se omnes contrahat humores & occultet velut sanguis.

Questio prima.

Quod ex cholera praesina & æruginosa febris causentur videntur per Auenzoar & Auer. 3. 4. & 7. colligere. Adhuc aphor. 5. primo comment. 10. & 12. de inge. Quidam iuuenis euomit humorem æruginosum innatum ut melius foret ipsum dicere certissimam æruginem quam æruginosum: omnia fariam enim vere assimilabatur ærugini eris: unde spasmus secutus est: sed æruginem purgata cessavit. febris & a spasmo statim evasit. Ex æruginosa siquidem deteriore cholera accidit febris. Rursus melancholia innaturalis facta ex adustione melancholiae subtilis quae ebullit & fermentat terram ut aceti inducit ægitudines: puta cancerum: herpetem, & tales 14. therapeuticae. Igitur huiusmodi cholera cum non videantur sic seorsum ut terram videlicet fermentantes febrem inducent: & praecipue quia febris est ægitudine hominibus appropriata & historiarum. Palin. Humor non putrescit: primo, & secundo febrium, nisi a regimine derelinquatur natura: hi vero duo videntur omnino ab ipsa derelicti, cum sint intantum depravati, & naturae reddantur velut uterinum oppositum humanae. Et. Humor generati in uenis sumus potest cor petere & febrem inducere. Sed cholera praesina, prognosticorum secundo generatur in uenis, & ostensum posse putrescere: poterit igitur sui putrefactione ad ipsum tendere. Amplius haec cum sint calidae & siccae, proportionem habent cum febre. Sed eorum quae habent proportionem & symbo-

& symbolum, facilius est transitus. 2. generationis & corrup. & primi secunda. In genere proportionabili facilius est transmutatio. Et fulcitur: quia corpus humanum calefit causa cholericis hu. prasinis, primo prima, quod maxime eveniet quando putrescet. Rursus. Quia à tota specie naturæ contrariantur humana, ut scorpionis, & talium virus perperissimi, febres inducunt. Non igitur propter istarum cholera- rum malitiam: cum non sit tanta ut huiusmodi uenenorum cessabunt à febris inductione. Itidem primo prognosticorum. Si fuerit in corpore ægro, antix, uel carbunculus, & exiccatus colorem protulerit viridem: citrinum: uel liuidum &c. Color autem viridis & liuidus his attestantur cholera. Ex quibus concluditur ex huiusmodi cholera morbum seu feccasari. Huius quoque oppositum expressius sensit Isaac febrium. 5. Adhuc nullum inuenio præter duos antedictos: qui nedum febres immo ægrotudines exprimunt minime ex huiusmodi sic prauis hu. causari. Amplius. Quod maxime in festum naturæ continue educitur: & immanens febrem non generat, quia ipsius est in tempore generatio. huiusmodi uero cholera sunt hæc. unde & uidemus paroxysmaliter uomitu expelli. Propter quod cholera prasina & æruginosa non inducent febrem. *boV*
Propter primum quidem distinguendum in cholera primis, & deinceps locus generationis uideatur & situs. Propter huius primum sciendum, quod cholera tribus inuenio suscipi modis. Aliquando namq; communiter pro omni humore: iuxta illud 7. aphor. Si febrem non à cholera habeat &c. quoniam hæc febris non est humoralis: sed ephemera in spiritibus fundata. unde 2. re. acu. hu. crudi de genere cholera trahuntur. Accipitur & proprie pro cholera dicta ruffa, & melancholia. quare primo prima. Dux cholera phlegmati &c. Suscipitur & magis stricte pro humore amaro. unde 4. re. acu. Cum dicat quis simpliciter cholera: manifestum quoniam amara. Et tertio alimentorum. Consuetudo est medicorum cholera simpliciter nominare: sine ea quæ secundum colorem appositione. Est autem hæc cholera humor calidus & siccus. Cuius species ab omnibus prioribus sunt posite 5. solū. Est namque una naturalis: quæ est spuma sanguinis: cuius color est ru. clarus, levis, acuta. Quæ & rubea dicitur clara & ruffa, & flaua, & interdum citrina. Est & alia innaturalis quadruplex ens: una ipsius dicitur cholera citrina siue crocea. Et pallida: quæ ex commistione confurgit cholera naturalis rubeæ claræ, & phlegmatis aquosi. Et reliqua vitellina dicta quia vitellis quorum simulatur noniter natum: confurgens ex commistione cholera na-

turalis prædictæ & phlegmate coagulato uel grosso. Gal. de cholera nigra. Quæ in uasis uel hepate etiam simpliciter apud hunc & Halyabbatem generatur: secundum uero A. cum adiectione magis: inuenitur tamen secundo naturalium: cholera adusta vitellina nominari. Et ex naturali & huiusmodi commistione alias uniuersas fieri. In quo Gal. præfertur aliis colligit tertio dicentibus cholera vitellinam minus calidam naturali. Sed inde cholera nigra uel dictum & id tangetur cum reliquis siue ecotra concidit Gale. unde prognosticorum. 3. Flauam quippe interdum uidere grossam & diligenter flauam euomitam & deorsum procedentem: quam siquidem vitellinam appellant aliqui: multotiens autem humidior minusq; flauam: quæ proprius citrina nominatur per totum suum mistum habens phlegmaticum humorem subtilem aut aquosum quod superfluum. Alimentorum autem primo. Cholera hæc quidem tanta, hæc autem ocra, id est vitellina. Et secundum magis & minus utraq; multipliciter obinent: ut alias cholera prætermittam quæ apparent in corporibus infirmis. Interiorum uero quinto. Vocat cholera puram q. vitellum oui. postea uero quandoque viridis ostenditur. Sic igitur alia uidetur ab adusta: Potest tamen ad Auer. responderi, quod cholera vitellina licet dicatur adusta à Gale. non tamen adustione tanta secundum quam hu. incinerantur nigrefacti, sed talis est potius dicenda superassatio quædam conterminatio, licet enim calor fortis adustionem induceret: materia tamen resistit frigidity phlegmatica iuxta illud prognosticorum secundi. Continentis sputum album viscosum rotundum à phlegmate accidere adusto. Et ideo remanet humida viscosa: adustione etiā in ea cōcessa propter hoc nō habet de hoc Auer. alios mordere. Neq; similiter quia intensior est in colore citrina. igitur est calidior ea. Dicendum etiā non valere: quia color non datur solū qualitati sed ad hoc etiā operatur substantia rara uel densa. Nā substantia subtilis minus colorem intendit: grossior aut magis ut cholera flaua ostendit sanguinis citrina & vitellina. Inuenitur & alia species cholera dicta prasina, i. porralis: colorem namq; foliorum refert porri & ex ipso et generatur. Est & alia propter similitudinem quā hēt ad colorem eruginis eris: æruginosa dicta seu zinaria: & quia et similem ut acuta & corrosiuam habet qualitatem. Ut enim in modum ueneni cum ex nimia nascentur adustione. Et corrumpunt hæc dux formā specificā caloris naturalis: sicut & uenenū. Sunt namq; de genere uenenorum. colligit. 3. cum aliis cæteris, quarū origo magis existit à stomacho. Haly. uero addit unum innaturalem modum habentem scilicet colorem indici: quæ siquidem est

dem est expositio eius quod dixerat prasinā. Vel fortassis confurgit per modum adustionis sanguinis ut apparebit per hoc consequenter. Ipse namque tanquam medicinarum insufficientior compilator, septem ponit cholerae innaturalis species. Non enim expressit famosas solum, uerum & infamosas. Cholera namque innaturalis efficitur, aut quia sibi commiscetur res extranea, uel quia in seipsa causam acquirat innaturalitatis. Et prima quidem duplex existit. Nam alia est nota famosa, quod dupliciter etiam aduenit: quia quod ei adiungitur, uel est phlegma tenue, & sic est citrina: aut grossum, & ita nitellina ut dictum à Gal. extat antea. Quaedam uero minus cognita & famosa est cholera: quae dicitur adusta, quae etiam dupliciter confurgit. Aut enim cholera rubra in seipsa comburitur: ita quod subtile & cineritium remaneat simul iuncta, uel ut cholera nigra ab extrinseco cholerae occurrat naturali & sibi admiscetur, quae minus est mala praedicta quam interdum euacuari contingit. Quae uero ex se corrumpitur: ipsa etiam duplex inuenitur: nam una huiusmodi magis generatur ab hepate: quae est subtile ex adustione sanguinis generatum, cuius grossum cholera extat nigra. Altera uero generatione plus accipit à stomacho. Quae iterum in prasinam separatur, & uiridem, ut aeris ærugo, ut ostensum antea. Haec quidem & si odiosae sunt omnes naturae, ita quod etiam naturalis, propter hoc fuit secundum Isaac in libro uniuersalium dixerat in Kisti à natura locata, extent quae calida & sicca: secundum tamen magis & minus. Nam deterior & calidior cæteris est æruginosa: deinde prasinā: demumque ex adustione superius facta: postea facta ex subtilis adustione quod erat in sanguine, deinde calidior licet non deterior naturalis rubra, clara, postea deterior & calidior ex commistione facta melancholiz, demum citrina, ultimo quoque nitellina minus calida cæteris, licet in malitia sit ut excedens & excessum se habens ad citrinā ratione extensionis & intensiōis diuersificata. Propter secundum huius sciendum, quod locus & modus generationis prasinæ & æruginosae multiplex inuenitur assignatus. Gal. enim secundo prognosticorum. ponit prasinam generari in stomacho & fortasse in uenis. Plurimi uero dicunt quasi illi consentientes prasinam & æruginosam magis à stomacho. Cuius quidem series graeca. Quemadmodum fit in corpore secundum naturam se habentē cholera flaua: ita & poralis altera contra naturam. Et uidetur ipsa multotiens in uentre generata aliquorum indigestione ciborum ut olerum quales sunt fici, cepae, ac caules. Apparet autem aliquando sine hoc tale quid generari morbi ratione in uenis & reumatizare, uel in superiorem us-

atremant inferiorem caliditatis in corpore contra naturam ostensua. Et adhuc ibidem in antea. Flauus siquidem humor resoluta ipsius aserosa humiditate & finita uiridis apparet, uirus uero cholera uidelicet æruginosa provenit &c. In secundo uero complexionum ponit cholera: prasinam simpliciter in uentre generari inquiens, quod quibus in uentre calidior extat complexio, cholera generatur superfluitas; similis prasinā nisa. Rubra uero, aut pallida est omnino in quibus ex hepate existit & citissime digredientibus. Quibus autem haec similis prasinā generatur hos oportet comedisse, non panem aut carnem porcinam, aut quid his simile, sed calidius aliquod horum; & solum in male digestibus generatur in uentre. Inde nigra uero cholera, aut tactum aliquo modo, sicut mista subtilis humiditatis flaua: cholera secundum colorem quidem pallidior sit & consistentia humidior, ita quando haec per amplius euaporauerit, crudorum odorum propinquitate similitur; & propter hoc nitellina. Ipsa quippe cholera, siue pallida, siue flaua, siue nitellina nideatur, in uasis generationem habet. Secundum uero uentrem prasinā quaedam generatur cholera, hanc autem taliter appellant à calore prasinam cognominantes; seu & uirulentam a uiru scilicet æruginosam. Isaac quoque quinto febrium, & in dictis uniuersalibus uult omnes praeter naturalem & clarā rubream in stomacho generari inquiens. Naturalis ruffa habitat in felle: & uiruseius in hepate, non naturalis est in stomacho; est tamen diuersa nitellina, crocea, prasinā & æruginosa. Quarum causa, quia naturalis cholera ad stomachum ueniens miscetur cum hu. in stomacho existentibus. Quod si fuerint laudabiles & temperati ex cibo generati contemperato, cholera ruffa in cholera mutatur croceam naturali uicinantem. Quod si humores quibus cholera permiscetur frigiditati attineant & humiditati; cholera in nitellinam conuertitur. Si autem humores inuenierit in stomacho calidos & acutos, ut ex pipere, synapi, portis, alliis & similibus generatos, calor augmentatur cholerae & prasinæ redditur coloris. Quod si ista cholera in suo permanferit acumine & calefecerit ea calor extraneus, sicut calor temporis aut aliarum rerum, intenditur, fitque æruginosa. Quod autem nitellina & citrina: ut asserit contra alios in hepate ponentes, in stomacho generari, ueritatem non uidetur habere: quoniam non post modicum subdit. Si materia febris fuerit nera cholera id est, ruffa, generatur caufon: si crocea sit tertiana, si uero nitellina nascitur emittitæus. Cum igitur materia existens in uenis febrem inducat in continuam, & non quae extra: tunc nullam contineret esse febrem ex cholera continuam: praeter fortassis

fortassis causonē. Dico autem fortassis: quia etiam cholera ruffam videtur solum in chisti locare. Neque emirritus foret nunquam non certus: seu non verus apud ipsum confluens ex putrefactione cholera intra. uenas & phlegmatis extra. Neque cholera has intelligendū generari in stomacho, id est in eius uenis: uerū in ipsius spatiositate. Et ideo forsā dicit croceant interdum in hepate generari, cum sanguis sit humidior quam decet. Auer. autem concedit cum ipso quantum ad generationem prassinae & ruginosae quoquo modo. Inquit enim universaliter quod causa generationis illarum est, quando cholera egreditur a sua natura in caliditate & siccitate, propter spationem illius ad stomachum: & miscetur tunc cum alijs humoribus & proprie cum melancholia: & ibi recipit aliquam speciem putrefactionis: & peruenit ad talem complexionem: & in hoc diuersificatur & ceteris. Ponit enim forte has per modum putrefactionis & non adustionis, ut ceteri causari. Neque etiam si sentiunt cholera in stomacho melancholiae permisceri: sed phlegmati tantum, & cum magis ipsum non sic autem inhiberet melancholia. A. uero cum eo quod ipsas ponat magis a stomacho generari, modum dedit quomodo generentur in ipso dicens: ubi uidetur prassina ex vitellina generari quando aduritur. Ex hepate namque vitellina, quae etiam secundum eum ab illo dicta magis generari in stomachum conuenit. Prassina namque quando adurit non, eam introducit nigredo: quae cum citrinitate iuncta, viriditatem causat ad nigredinem attingentem; calor enim in humidum agens nigredinem inducit, ut apparet in lignis: & ideo adusta omnia sunt nigra, uel ligna, carbone, & exinde ignis. Ari. de coloribus dicit datum sibi uideri zinzariam seu atrugindam ex prassina generari, quando adurit in tantum, ut eius exiret humiditas, ut & sic siccitate ad albedinem redire incipiat. Calor enim agens in sicco dealbat ut in carbone ostenditur. Verum circa praedicta multipliciter contingit dubitare. primo quia cholera quacunque non uidetur ex hepate ad stomachum occurrere, cum paucis porus felleus ad stomachum extendatur, diuisus, sed continuus magis perat intestinum duodenum complexionū. re. acc. secund. & tertio. 15. Sic igitur tales cholerae non poterunt nisi rarius generari. Dicendum duplitem: primo quidem, quia sicut rarius porus ad stomachum mittitur felleus, ita & haec cholerae prassinae & ruginosae in paucioribus adhuc generantur magis, uel licet non sit porus ad stomachum: est tamen porus semper ad duodenum continuatus parum sub pylorū uentris situatus, ita quod cholera perueniens illuc rapitur sursum ad stomachum si fuerit de-

bilis superfluitatibus receptiuis aut indigentia tempore attractionis uirtute. Amplius dubitatum: quoniam concessum est cholera quacunque uentrem intrare uidetur etiam uelle Rasis in diuisionibus dicens, quod felleus habet tria officia, orificium scilicet adhaerens hepatis & orificium adhaerens intestinis, & orificium stomachi. Intelligendum quidem quod non sunt tria incipientia chisti, sed duo tantum, sed ut talia sunt tria quoad extrema in quae terminantur. Nam alterum puta descendens diuiditur in duas partes, quarum maior continuatur intestinis ad quae cholera transmittitur: altera ut minor coniungitur stomacho, & per eam in pituita contrahit cholerae mandat. 3. theo. In primo uero eiusdem partem cholera mittit ad stomachum, quod per illam fit ciborum digestio. Alia uero etiam & Auer. dicunt cholera in stomachi fundum transmitti. unde tertio. 15. Et habet orificium & meatum ad partes stomachi. Concurrit igitur in ipsum. In oppositum & enim de iuuuentis membrorum. Non fuit tunc cholerae in stomachum ad purgandum illud quod in eo generatur ex phlegmate, propter illud quod timebatur de noeuimento quod accidit stomacho ex tali cholera, felleus naretur enim exitus cibi a stomacho, & ita quod digeretur, cum indigeat permanentia in stomacho longa: donec paulatim digeratur, unde quatuor primi. Stomachus non habet quod ipsum mundet sicut intestina cholerae mubeam. Dicendum aliquos uoluisse cholerae non ire ad stomachum, quia non uadit ad fundum eius. Quod tamen est contra praedictorum aliorum: sed uadit inquit ad os stomachi deorsum, ut conforter expulsam: non enim intrat substantiam stomachi, nisi plus mandetur. Aut inquit quod haec in grossa obundatur humida, & stomachi phlegmatica, calorque ipsius inde accipitur. Aut dicendum sicut etiam prius, quod in pluribus hominum & maxime naturaliter se habentium, cholera non transducitur per porum felleum in uentrem, sed in intestina, solum ad quos hic se transulit Gal. Interdum autem & in his qui minus naturales extant, ut calidiores hepate. Natura potum etiam producit tantam cholerae in uentrem, ut euometur quandoque. Neque hunc amplius laedit, quia uigore multum hi caliditate attractiua hepatis & frigidum ipsum habent ne transiens per intestina excoieret. In plurimis enim unus est tantum a felle porus tendens in intestina. Interdum uero cum hoc in stomachum alter diffunditur. Et ita ut ad iustum est minor reliquo rarissime autem contra, ut in saluo sacerdote apparet complexionum, & re. a. secundis. Vel sicut transulit ex Graeco dicendum quod pars modica cholerae occurrat in uentrem, & non est quod

non transeat omnino in illum. Cuius est series ista. Manifestum quod cholera plurima in ventrem confluente secundum aliquam dispositionem non contingit in ipso manere cibaria. Morso enim ab humorum acredine ueratur, & stimulatur nalde ab eo uelocem contentorum effici excretionem. Si autem in uentris peruenit orificium, ut sensibilissimum existens, dolet ab ipso uehementer morfi, & nauseant, ac euomunt. Rursus horum gratia hæsitatur: quoniam uidetur quod subtilior pars cholera pertranseat cum sanguine, eaque vadit ad chistim, quoniam illa descendit multa: & ad multum in intestina inferius entia, quod autem tale grossius & grauius. Eri. Citrinum cholericum quod ostenditur cholera in spuma & sanguinis phlebothomia est subtilius uisum cholera expressa de chisti. Adhuc cholera vadit cum sanguine propter cum subtiliare facereque tandem penetrare. hæc autem perfectius cholera operabitur subtilis grossiori. Subtilior ergo uadens cum sanguine ea quæ ad chistim transmittitur. In oppositum primo enim theoricæ. Quid in cholera subtilius est acutius & clarus trahit ad se fel. Quod autem minus est acutum & clarum natura cum sanguine ad omnia mittit corporis membra. unde prima primi. Quod autem de ea colatum est ad chistim transmittitur fellis. Id autem subtilius. Palin. secundum Isaac. Ideo natura cholera in carcerauit in chisti ne sui effrenitate partes lederet eis occurrens. Sed hoc proprie inest subtiliori: quia fit amarior cum acuitate quadam & penetrabilitate ac mordacior. Minus autem subtilis in his remissa non, tantum distat a sanguine & partibus. Econtrario autem de humore accidit nigro, quoniam quidem ipsius subtile cum sanguine permeat. Grossius autem esplen se attractione deducit. theoricæ primo cum naturalium 2. Dicendum quod uadens ad chistim est subtilior reliqua cum sanguine cuncti: ut indicatur naturalium secundo ita. Indiget autem sanguis non minime & tanto humore qui nondum ultime factus est ignis. Innuitur igitur duplex cholera ignita: & ita subtilior & minus subtilis qua indiget sanguis. Per oppositum autem melancholia uadens cum sanguine, minus grossa est ea quæ tendit ad splenem. Subtile nanque ad grossum excessum important. Quod autem cum sanguine uadit opus fit temperamento attestari. Ad primum igitur dicendum, quod cholera ad intestina non descendit sponte: uerum magis regitua impellente uirtute, sicut & melancholia sursum. prima primi. Ad aliud dicendum: quod ista non est vera substantia cholera quæ apparet in spuma illa supernatante, sed aliquid generatum ex euaporatione seu potius ex ipsius effumatione: quod ostendit secessus cholera

ex uenis euaporatæ. Ad aliud dicendum, quod sanguis non eget tanta subtilitate: quin cholera minus subtilior hunc valeat attenuare: cum eo quod non nocet ut reliqua membra etiam sunt grossa in quæ ordinantur & meatus sufficientes. Adhuc dubitatur: quoniam non uidetur has choleras posse in stomacho generari: sed in hepate cum sint hu. Nam stomachus ordinatur ad digestionem alimentorum, & conuersionem eorum in chylum. Hepar autem ad conuersionem chili in chimum. unde tertio colligit. Quod generat naturale: generat & non naturale quando corrumpitur eius complexio. Cum igitur stomachus non habeat generare humorem naturalem: neque innaturalem generabit. Rursus. hæc cholera cum sint calidissima, ab agente calidissimo generabuntur. Tale uero non est stomachus: cum sit frigidus & siccus natura: nervosum est enim non parum ipsius esse, & exangue in hepar quoque calidum & sanguineum: & membram quantum habet de sanguine, tantum & caloris obtinet. primo complexionum, & secundo apparens de partibus. In hepate ergo generabuntur, & non in stomacho, quod nullus dixit. Dicendum est ipsas in stomacho, & non in hepate generari: quia sui acuitate & malignitate substantiam tenerimam corrumpent hepatis: quod natura non finit. Adhuc. humiditas eius est multa. Est nanque fons humiditatis secundum Haly. unde prohibet earum generationem cum sint siccissima: & unumquodque in loco eius generatur cognato. Ad primum igitur inductorum dicendum, quod generatio duplex existit: quædam est uera uniuoca: & sic stomachus massam gignit prisanariâ: & hepar humores. Est & altera impropria æquiuoca: & hæc cholera hæc duz possent dici in stomacho generari. Uniuoca quidem dicitur generatio quoniam hoc totum transmutatur in hoc totum. primo de ge. & cor. ita quod non solum sit transmutatio in accidentibus: sed etiam in substantia. Non enim permanens est substantia in essentia & accidentibus solum transmutata. Aequiuoca quidem per oppositum dicitur generatio, puta quod in stomacho huiusmodi generentur cholera, quia uiriditate in ipso acquirunt ex acuminu esu: aut cholera ab hepate ad stomachum ueniens alius forma induitur accidentalibus: ut colore, grossitie, duritie, & hmoi. & sic fortassis intelligunt dicentes eas magis a stomacho generari, quia formata lem in stomacho acquirunt: licet materiam receperint ex hepate permanentem in substantia: sed passionibus transmutatam. Et in hoc cõcidunt modi & loci etiam generationis earum prædicti: & si uideantur forte superficialiter diuersi. Aut dicendum, quod magis sunt a stomacho, & proprie prasinæ plus: quoniam dictum est per

Gal. aliquando ipsam generari in uenis propter aliquam ægritudinem, & effundi demum ad stomachum. Ad secundum dicendum quod caliditas dupliciter est insita: naturaliter: & acquisita, prima quidem calidius est hepar. Et namque natura calidum & humidum. secunda uero stomachus: licet sibi indita frigidus & siccus sit magis. Multa enim concurrunt ad ipsum calefaciendum tertio naturalium, & primo prima. Cor quidem superius mediante diaphragmate ab ipso calefacto adorti per dorsum percurrans posterius & musculi eius. Anteriorius quidem omentum adipinum cum musculis. A dextra uero hepar cum felle. A sinistra quoque splenem propter sanguinem uenalem & arterialem magis in ipso contentum: hæc omnia circa stomachum intensam aduentitiam congregant caliditatem, unde & humores potest generare sic extraneos & adustos. Hepar autem sui caliditate innata & humiditate repugnat generationi huiusmodi humorum: generat tamen eorum materia choleram, putrellinam aut aliam. Idem dubitatur, quoniam cum secundum Gal. dictum sit choleram porralem aliquando generari in uenis: poterit & in hepate similiter generari: quoniam in ipso sunt uenæ in quibus humor capiter & non in substantia ipsius. Sæpe namque Gal. digestionem uenarum uocat eam quæ hepatis, ita quod non deficiet talium cholerarum generatio in ipso ut dicebatur: propter quod id tenellum corruperent sui malicia. Dicendum quod in hepate ut apparet non contingit prædictas choleas generari. In uenis autem potest propter caliditatem ægritudinis quarundam adueritium. Neque est simile de uenis quæ sunt in hepatis corpore, & quæ ab ipso prolongatæ. Nam telæ uenarum existentium in eo sunt tenniores telis aliarum uenarum existentium in toto corpore 3. de iunamento. ut perfectior fiat ab hepate digestio. Nam quanto cibus fuerit propinquior substantiæ hepatis carnosæ, tanto uelocioris reddetur alterationis & melius sanguinis suscipiens speciem. Quando autem prolongatur ab hepate uenarum ruficæ, ingrossantur & fortificantur, unde A. 5. partic. de anima. Non est illicitum uirtutes fortiores & ualidiores fieri extra sua principia: eo quod fortiantur materias per quas fiant huiusmodi: sicut uidentur apparet in neruorum origine & in processu demum fortius.

Propter secundum uero sciendum, quod a nullis inuenio adhuc diligenter inquirens qui ex prædictis duabus choleris ægritudinem ponat cõsurgere: sed aut vomitum expelli aut mortem extemplo adueni: nisi Auerzoi & eius Auer, collega. Inquit enim ille. Febris quæ fit ex transiitione febris ephemere ad febrem cholicam:

si fuerit de genere præsina aut æruginosa habebit accidentia magis fraudulenta, & uix poterit euadere ab ea. Et si euaserit diu permanebit, & subdit ipsius demum signa dicens quod fit eius paroxysmus diuturnus & terminus ægritudinis similiter. Et pauci sunt qui ab hac infirmitate euadant: & si euaserint, erit hoc post multum studium: & ægritudinis prolongationem. Et possibile est ei remanere mala accidentia & fraudulenta tempore quàm longo. Tertio uero colliget. Aegritudines quæ ab istis proueniunt choleris, præsina uidelicet & æruginosa, sunt incurabiles, propterea quod non recipiunt digestionem: nec permittuntur a calore naturali: immo corrumpunt formam specificam ipsius: si cut corrumpit uenenum. Quarto uero illius ponit ex hoc causam fieri inquit. Et peior specierum causam est illa, quæ fit a cholera ziniaria uel præsina. Et illius paroxysmus longus est propter inobedientiam humoris illius ad digestionem recipiendam. In septimo quoque si febris tertiana non fuerit ex cholera pura sed erit ex uitellina: hanc enim uoluit in tertio sentire Gal. fore adustam 2. naturalium. Moxque subdit vel præsina aut æruginosa non euadet: hic aut periculo maximo, & præcipue quando fuerit ex præsina & æruginosa. Et possit mihi uideri aut impossibile quod aliquis æruginosa euadat: dicit etiam causam contra alios: impossibile fore ex cholera naturali. Hi quidem sunt sermones horum uirorum: quos si quis diligentia considerat: non solum ad alios sunt diffusi, verum etiam inter se satis dissentiunt. Nam Zoar ponit esse possibile: cum difficultate tamen quadam grandi a febre prædictarum cholerarum hominem posse euadere. Auerzoi uero isti secundum quid aduersus ait sibi uideri possibile quod quis a febre euadat ex cholera æruginosa. Adhuc si hæc cholera adeo ut ipsi etiam testantur sunt praua quomodo febris earum prolongatur & etiam paroxysmus? Quare etiam secundum Auerzoi causam inducunt: cum sit febris continua sine paroxysmo: & hæc habeant paroxysmum. Aut quomodo generatur causam: si non fit a cholera naturali: & non tamen prout est naturalis. Non enim fiet a citrina, neque a uitellina non adusta: cum hæc sint frigidiore naturalis: neque etiam a uitellina quæ in tertio uocauit adusta: quia in septimo ait. quod uitellina causam: si frigidior existit? Quomodo ergo faciet uitellina causam: si frigidior naturalis? Aut fortassis uitellinam nunc accipit cõter cum aliis non seruans quod præsumpsit affirmare & imponere Gal. 3. uel si uitellina adusta sit alia & præsina & æruginosa: distigue non bis de adeste. Aut quod dicunt quod hi uiri extraneum est & insolitum ualde: unde propter ista & similia Auerzoi maxime sermonem non cõprehendo. Dicendum igitur extra ipsum choleam

leram uisellinam duplicem fore: unam quidem per commissionem prædictam magis eius obinentem naturam: alteram uero per adustionem & ingrossationem substantiæ: qua color intenditur. Gale. igitur quàm breuius naturalium 2. generationem assignans humorum: cum in aliis eam tetigerit opusculis: duas tantum choleras enodauit: naturalem uidelicet & innaturalem: per cholera quidem uisellinam perfectius quàm per aliquam aliarum audiens omnem cholera innaturalem duplici præfacto generatam modo.

Propter tertium uero sciendum cum aliis magis dico quòd ex cholera proprie æruginosa febris: neque aliqua ægritudinum potest causari: sed potius uomitu emittitur, aut mortem repentinam inducit. In cholera uero præsina dubitandum est utrumque. Quod autem ex æruginosa non consurgat febris: neque ex præsina præter hoc quòd non inuenio ab aliis ægritudinem ab his choleris positam fieri. Isaac febriam quinto de ipsis talem in communi profert sermonem: præsina impossibile est in hepate generari: neque transit a stomacho: neque generat febrem, quia non tanto tempore in corpore permanet: ut putrescat & febrem generet: nam enim semper se coadiquat, ut eam a corpore expellat propter eius malignitatem. Quod si natura defecerit eam expellere nequens, incendit corpus, & homo moritur. Subditque igitur si talia de præsina accidunt, quanto maiora & certiora de æruginosa eueniunt? Et firmatur quia alimentorum 3. aliæ omnes cholerae uidentur difficulter euacuari & ægotante corpore viridi excepta: unde in dictis uniuersalibus. Aæruginosa peior & corruptibilior est præsina. Quare velociter destruit & mortificat. Quod etiam rationibus confirmatur suppositis quibusdam prius ut quòd natura non mouetur nisi percepto nocumento. Et quia huiusmodi cholerae pessimas habent qualitates acutas mordicatuas: ac quæ sunt in stomacho: proprieque æruginosa. Et quòd stomachus est membrorum sensibilissimum & maxime os ipsius. 4. de accidenti. Ipsi enim sensus inest præter naturalem etiam animalis. Et quod continetur in stomacho facillime educitur: quia propria ipsius euacuatio est per uomitum. Constantinus de stomacho. Via uero quæ educitur brevis & lata. Consurgat igitur nunc sermo talis. Natura non mouetur, nisi percepto nocumento: Sed ex huiusmodi choleris percipit nocumentum: cum sint acutissimæ, & stomachus sensibilissimus. Euomuntur igitur ex stomacho: cum fiant in ipso antequam ægritudinem inferant. Sicut enim natura habens cholera odio: ipsam in chisti incarcerationi: ita & has statim studet expellere quantum potest, ne

ipsam interitiant: & ideo uidemus eas euomi interpolate. Sed contra. non uidetur quod expellatur adeo confestim ex stomacho: ut ægritudinem non generet: quoniam quod generat capillos uirides: cum hoc fiat temporis mora poterit & febrem inde causare. Sed capilli uirides sunt uirides: & proprie in temporibus cuiusdā; hi que ab hac proueniebant cholera cum sibi attestentur: & etiam hebdomada qualibet hanc euomebat periodice. Dicendum dupliciter aut uelut apparebit quòd præsina potest interdum febrem generare, uel quòd capilli licet efficerentur interdum uirides: non tamen putrescebat cholera præsina: ut febrem causare, quoniam expellebatur continue. sicut etiam generabatur non putrescens: per multas tamen ipsius generationis capillos in uiride colorabat, fumos infectos ea superius demandans. Amplius: quæcunque febrem causant humoralem putrescere & cor petere oportet, cum fumus putridus cor petens sit causa febris coniuncta. Sed quæ sunt ignis, & uehementer ignita, non putrescunt, & ideo alia elementorum impurata putrescunt præter ignem. Talis uero est cholera proprie æruginosa: cum ipsa sit calidissima & siccissima. Verum contra hoc uidetur esse: quia prima primi humor dicitur corpus humidum liquidum. Sed huiusmodi cholerae sunt humores, quod autem est humidum & calidum potest putrescere. Ab his enim causatur putredo 4. meteororum. & 11. de inge. Adhuc melancholia res siccior corporis putrescit & febrem generat: & cholera similiter naturalis res corporis calidior de distemperantia inæquali putrescent ergo, & febrem generabunt. Dicendum quod hæ cholerae & proprie æruginosa minime putrescunt: cum sint igneæ sicce ualde. Et quod dicitur primitus humidum & liquidum putrescere, dicendum quòd non omne tale putrescit. Oportet enim quòd in humido putrescibili non adsit calor adustius & condensatiuus: ut hic humidum excludens uehementer & consumens: unde prima primi. ziniaria generatur ex præsina quando tantum aduritur donec eius humores siccatur: remanet tamen utrumque sub humoris natura. Hæ nanque cholerae proprieque ziniariae sunt uelut ulcera corrosiua non putrescere potentia ipsorum caliditate immensa & siccitate, apparet quartæ quartæ. Aut dicendum quod huiusmodi humor non habet tempus sufficiens in quo putrescere possit, ut mox apparebit, neque melancholia siccior est huiusmodi cholera, & maxime postea: quoniam melancholia secundum medicos inest nutrire, propter quod oportet aliquam humiditatem retinere. Verum est tamen quod aliqui propter hoc putauerant melancholia naturalē non posse febrem causare quartanam. 4. prima.

Siccitas enim acquisita in cholera: præcipue in æruginosa, propter id quod cholera existit, & propter caliditatem humidum consumentem intensior redditur siccitate cholerae nigrae naturalis. Rursus. quod facit febrem oportet habere sufficiens tempus in quo ipsa ualeat generari, ut effectus inducatur, cum tria oportet concurrere, agens vigorosum: patiens dispositum, & tempus in quo agens patienti applicetur. differentia 93. & 94. Sed tempus non reperitur sufficiens: in quo æruginosa præcipue possit febris causari, cum ipsa fiat mediante putrefactione: hæc autem indiget tempore: cum sit actio quedam & conuersio humoris: ut febris inducatur sit transmutatio per longa, primitus enim oportet causam præter alias remotiores superesse coniunctam, & fumum putridum ab ea resolutionem petentem, deinde remissio illius fumi à corde in totum corpus. Ab eo namque febris in totum demandatur subiectum. nisi fuerit impeditum. Cholera igitur proprie æruginosa febrem non causabit, neque: uniuersaliter ægritudinem: sed mortem festinam, nisi vomitu expellatur, uel fortè secessu. Cuius quidem uomitum sequuntur quandoque dolores oris stomachi adeo uehementes, ut accendant spasmus, syncopis, desudationes frigida, & paruitas pulsus omnimoda 12. de inge. Sed circa id dubitare contingit, quia dictam putredinem tempus expetere. Cuius contrarium scribitur. 4. prima. Putredo non habet tempus, & conuersio sanguinis in cholera non fit nisi in tempore. Dicendum quod id sufficienter ostensum differentia 89. Non enim intendit dicere A. quod putredo nullo modo habet tempus, cum sit alteratio quedam ad febrem, & omnis alteratio cum sit uere motus fiat in tempore 5. physico- rum. sed uult innotescere quod tempus minus est quo ex sanguine fit putredo: eo quo sanguis in cholera transducitur: cum plures hic requirantur motus & transmutationes. Quod autem huiusmodi cholera præcipue æruginosa (ut dictum) sit adeo uenenosa ostenditur: quoniam uenenum est humiditas subtilis horribilis qualitatis. Halyab. Et qualitas ueneni est diuersa: quia aliquid quod est propinquum humoribus conuenientibus corpori: aliud quod extat longinquum: & aliquid quod habet qualitatem uenenosam prauam. Et idcirco cum hæc cholerae sint tales: non est mirum si natura conatur eas expellere maxime uomitu. Nam eo educuntur multæ species humorum phlegmaticorum, cholerarum, melancholicorum, & species ueneni diuersæ, similiter & sanguis euomitur interdum 5. interiorum. Neque mirandum etiã si huiusmodi uenenum in corporibus generatum: cum sit quantitatis multæ, possit mortem inducere repentinam. 6. interiorum, quia

menstruum retentione corruptum, & maxime sperma in subito à coitu proprie abscessis potest ægritudines perniciosas, & mortem inferre festinam, cum videamus ex paruissimo araneorum ueneno: & præcipue scorpionum symptomata scruilissima, & mortem contingere non parum. Similiter uidemus membrum stupefieri ex tactu medico torpedinis, & à contactu etiã saluæ canis rabidi. Merito igitur menstruum & proprie sperma corruptum, potest in uenenum deduci. unde Haly. Fortasse ex spermate est aliquid simile ueneno. Poterit etiam non minus quis humor paratus in uenenum conuer- ti: quando fuerit violentæ qualitatis & locus aptus in illud. De cholera uero præsina non simpliciter enuntiandum quod febris ea possit gigni: maxime cum non sit condensata ut æruginosa alijs plus possit admisceri humoribus. Generatur etiam non solum in stomacho, uerum ut dictum & in uenis, ut alijs coniuncta humoribus: non sit etiam ut æruginosa naturæ odiosa, ut statim percepto expellat etiam nocumento neque putrefactioni resistens. Quod fortassis uidetur concedere A. quarto prima. inquires ipsam fieri ex chimis subtilibus plurimum, quorum est cholericum uehementis subtilitatis & profundationis malæ substantiæ uenenosæ, cum iam accidit putredo in corporibus calidæ complexionis & sicce ualde. Ista uero malæ substantia uenenosa quæ profundatur cholera secundum plurimum uidetur præsina, cum ipsa dicta sit de genere fore uenenorum. Ego quidem febrem istam in iuvene quodam uidi complexionis siccissimæ & calidæ etiam ualde cum accidentibus huiusmodi, ut calore uehementi interius & siti, frigiditate extremorum, syncopibus aliquando, & affligebatur perterritum maxime, qui fluxu largissimo uentris superueniente cholerae præsinae aquosæ cessauit febris. In cuius etiam fluxus ob uirtutem laboratum fuit restrictione: & iste quidem inappetibilis factus uix deglutiens & nihil sumens, circa septimam ab inde tebe factus exspirauit. Recte namque illa praua cholera cor & ipsius spiritus vulnerauerat innatos. Ex quoniam quæ sunt huiusmodi cholerae raro emergunt, auctores uidentur sibi inuicem discordare: cum huius artis plurima experimento magis quam ratione capiantur: unde de his quæ raro contingunt certificari non possunt: interuorum quinto.

Propter quartum uero, ad primum quid dicendum uisum. Ad aliud dicendum, quod febris illa non fuerat uera: sed quedam potius inflammatio ex conamine uomitus consecrata & dolore unde 12. de inge. non ponitur febris sed tantum 4. accidentia præterita, uel quod febr. ex alia præerat materia. Ad aliud dicendum:

am: quod hæ cholera sunt deteriores melant-
 cholia subtili, terrea, fermentante terram.
 Sunt enim calidiores & acutiores: licet enim
 illa melancholia in terram ebullitionem & fer-
 mentationem inducat, non tamen est sic cali-
 da & acuta ut hæ. Sed sui quadam hoc causat
 ariditate seu acredine: sicut acrum ebullit
 super terram & fermentat, non sicut aliorum
 aut fructus ferentis euforbium liquor quando
 non est adhuc condensatus in gummi. Aegri-
 tudines etiam quæ sunt ab hac melancholia
 non sunt putrefactione, sed magis quadam
 corrosione, ita quod ipsa est apta ægitudines
 causare sui minori acuitate & tarda penetra-
 tione: non autem cholera & proprie æruginosa:
 cum natura ipsam non pariatur tempore.
 Ad aliud dicendum, quod humor dupliciter
 destituitur ægitudine naturæ, aut quia natura
 non laborat circa ipsum in conservando & re-
 ducendo eum si peccet ad benignum. Et sic
 hic humor derelinquitur à regi. naturæ non
 autem sanguis aut phlegma. Vel dicitur desti-
 tui quia natura non curat de ipsius expulsio-
 ne cum non infestet ipsam, eo quod qualitates
 non habeat vehementer excessivas sicut ali-
 qua melancholia: & præcipue phlegma quod-
 dam. Non enim hæ mouetur nisi per cepto-
 lazium, apprensus tertio naturalium & ita hæ
 cholera non derelinquuntur, ut declaratur à
 regi. naturæ immo in quantum potest studeo
 eas à corpore auertere. Ad aliud dicendum
 quod licet cholera præsina generetur inter-
 dum in venis, natura expellit eam ad stom-
 achum si fortis fuerit. Aut dictum non fore im-
 possibile generari ex ipsa febrem syncopalem
 minutam subtilem. Ad aliud dicendum, quod
 hæ duæ cholera ac æruginosa proportionē ha-
 beant cum febre, non tamen cum causa ipsius
 id est putredine ut offensum. Siue vero ipsa fe-
 bris non constituitur humoralis: neque om-
 nis calefactio febrem inducit putredinis: sed
 vehemens in qua sumus putredinis cor petit:
 & ipsum eiusque calidum non statim peri-
 mit: sed secum inde ad omnia corporis de-
 mandatur membra. Ad aliud dicendum, quod
 multa venenorum quamquam sint talia à po-
 ta forma specifica dicta, ut apparet de ue-
 neh. scorpionis & araneæ: magis tamen su-
 stinentur à natura: quam huiusmodi chole-
 ra: non enim sunt tantæ quantitatis. Sunt
 enim ut venena in multa quantitate suscepta:
 quibus irritata natura mox superius vomit
 foras educit: aut inferius quam parum læden-
 tia quæ mortificassent siquidem retenta. Ne-
 que etiam hæ habent qualitates sic pernicio-
 sas & acutas, propter quod natura conatur
 illico expellere, no cumentum inde percipiens
 ex ipsarum acumine vehementi, proprie cum

stomachus sit membrorum sensibilissimum.
 Similiter & venena quæ exhibentur, alia dulcia
 bus admisceantur, ut eorum mala qualitas occul-
 tetur. Vnde natura sub dulci decepta vede-
 num ad se trahit: propter quod præcipitur
 quarto 6, quod qui timet ne in potu sumat
 venenum, oportet sibi præcauere à cibis do-
 minantium saporum in aceto sitata, aut acui-
 tate vel dulcedine & dominantium odorum.
 Sunt & venena perfida: necem cito inducent:
 ita plurimum subtilis substantiæ liquidæ.
 Ad aliud dicendum, quod translatio illa pra-
 va est, non enim ponit seriem rectam Hippo-
 sed sententiam solam: & illam interdum im-
 perfecte, sicut ex translatione etiam patet ara-
 bica. Sed in ea hic & ubique verba omnino
 & sententiam sapit Hippocratis. Cuius quis-
 dem series: Vlcus autem siue perfectum & c.
 Arabica vero sibi consonans. Quando fuerit
 in corpore infirmi ulcus. Non ergo loquitur
 Hippo. de antracis siue carbunculi idem exi-
 stentis colore, verum ulceris: nec huiusmo-
 di color causatur ex cholera præsina seu æru-
 ginosa, licet viridis efficiatur siue liuidus, sed
 ex melancholia cōcreatur adusta. Induit enim
 quod quando vincit in corpore humor melan-
 cholicus, est color eius aut liuidus, aut viridis.

Questio VI.

Q Vod in empiala non sit frigus interioris &
 calor exterior videtur per Isaac febrium quin-
 to huius oppositum scribentem. Adhuc secū-
 dum Gal. febris generatur in corpore quem admodum ignis ex lignorum
 inflammatione. Sed in hac calor est magis in
 parte infima & profunda lignorum quam in
 parte exteriori aeris aperta. Cum igitur in em-
 piala phlegma vitreum in quo ea profundatur
 sit in corporis profundo illi caliditatem in-
 ducet: forinsecus vero frigiditatem non po-
 tēs sui frigiditate febre caleferi omni quaque.
 Rursus: febris empiala sit ex phlegmate fri-
 gidiori profundius putrefacto, cum sit humo-
 ralis: putrefactio vero sit à calido. Quod autē ta-
 le ubi est calefacit: quo vero deficit frigus ostē-
 ditur, quare in empiala calor erit interioris & fri-
 gus exterioris. Quod autem in dipyria frigus sit
 interioris & calor extra monstratur: quoniam
 sit ex cholera sola vel coniuncta phlegmati vi-
 treo, aut melancholia, sed cholera petit exte-
 riora calefaciens: phlegma quoque vitreum &
 melancholia interiora. Palin. Calor est in
 parte ad quam tendit: huiusmodi autem est ex-
 terior superficialis: cum eius motus sit de cen-
 tro in circumferentiam. Calefient itaque exte-
 riora in ea: & infrigidabuntur interiora.
 Cuius contrarium sentitur Sera. 6. & 4. pri-
 ma ita habente. In empiala interiora infrigida

ri & exteriora calefieri: in lypiria vero contrari-
quorum tanguntur cōsequēter motiua. Quod
autem talis diuersitas caloris & frigoris in ven-
traharum possit existere probatur: quia febris
procedit à corde per arterias & venas in totum
corpus, sicut ratio testatur ipsius. Quod autem
huiusmodi simul vtrāque partem calefacit in-
teriorē scilicet & exteriorē: nō itaq; & reliqua.

Propter primum quidem sciendum: q̄ quid
sit calidum: quidque frigidum & quid interius:
quidue exterius; notum extat & ex multis. Est
autem empiala dicta græce super alia: eo quod
calor est super frigiditatem aut vtrāque super
alteram: quia frigus simul vbique: vt ostende-
tur coniungitur cum calido secundum Gal. &
Halyab. Empi nanque græce supra importat.
& Alii id est alia: inde empiala Lypiria vero di-
citur quasi pinguis: Lipparon enim pingue. Si-
cut nanque pingues calefiunt interius & frige-
scent exterius: eo quod calor obsessus non pos-
sit se in exteriora protendere: vnde proble. 8.
Propter quid pingues vehementer frigescunt:
sic & in hac euenit febre: quare videtur Haly-
ab. lisuriam nominare: & tunc sanius de ipsa
alii protulerunt quam Isaac hanc rationem no-
minis sequentes. Amp. sciendum quod febribus
simplicibus seu cōpositis dispositiones contin-
gūt diuersa caloris aut materiæ causa nomi-
bus differentibus designatæ. Quibusdam enim
febribus inest multa immista humiditas: & vo-
catur londinis. Quando vero calor fuerit adu-
rens intensus, causon dicitur: vel incendium.
Quādo autem is & frigus simul in interioribus
fuerit & exterioribus per omne, empiala dici-
tur ex phlegmate vitreo generata. Est & febris
in qua sentitur calor in interioribus immensus;
in exterioribus vero tepor: Quod ex viscosita-
te contingit humoris & grossitie: ita vt calor
non possit p̄tere exteriora: quæ lisuria dicta.
Est etiam alia in qua frigus in exterioribus sen-
titur graue: quæ acromidos dicitur: id est pri-
uosa. Fit quoque reliqua in qua calor est in-
terius intensus & nociuus: à qua vapores ele-
uantur acutissimi: cum humor non sit viscosus
plurimum: quæ febris appellatur tinidos octa-
uo theoricæ.

Propter secundum vero sciendum: quod au-
ctores differenter valde circa hanc differentiā
sunt locuti. In libro enim de distemperentia
inæquali. 7. apho. secunda prognosticorum.
& aliis cū. 8. theoricæ dicitur: ut apparuit q̄
empiala sit febris in qua simul sentitur calor &
frigus secundum omnē corporis partem. vnde
2. febrium. Empiala febris proprie nominatur
in qua simul febriunt & rigorem patiuntur, &
vtrāque sentiunt secundum idem tempus in om-
ni particula corporis. Quod & proprii nomi-
nis videtur prætata ethymologia importare.

Tertio quoque simplicium pharmacorum scri-
bitur quod est febris in qua habens eam inue-
nit tremorem & duritiem in toto corpore hora
vnā. Et hæc quidem febris erit illa: quam A.
circunloquens ait. Febris in qua sit vnaqueque
duarum rerum in vnoquoque duorum locorū.
Est autem lypiria febris in qua calefiunt intrin-
seca, & frigescunt extrinseca & quæ secundum
Gal. apho. quarta etiam ad febres pernicio-
sorum apostematum interiorum extenditur à
quibus fit attractio à toto corpore caliditatis;
velut à ventosa. Tertio quoque simplicium.
Lypiria est febris in qua interiora ventris incen-
duntur, & eius exteriora sunt frigida, ac etiam
de distemperantia inæquali. Non tamen à Gal.
inuenio ex qua materia determinate ac quo-
modo generetur. Isaac autem & A. cum Serap.
in empiala & lypiria videntur satis discordare,
non solum in nominum altercatione: verum
in opposita causarum assignatione: etiam præ-
cipue in empiala. Inquit enim ille cum Arist.
proble. 27. quod empiala est febris interiora
incendens & exteriora infrigidans: cuius ma-
teria est phlegma grossum vitreum. Eiusque
quædam pars est putrefacta: quædam vero mi-
nime: putrefacta quidem febre generat: im-
putrefacta quoque sui natura congelationem
causa. De lypiria quoque sentit quod eius ma-
teria sit cholericæ cum phlegmate vitreo: aut
cum humore melancholico mixta differens ab
empiala. quia illa calefacit interiora & exte-
riora infrigidat, & pororū foramina oppilat ne
fumus dissoluatur. In lypiria autem omnia hæc
sunt contraria. Interiora enim sunt frigida: &
exteriora calida. Huic quoque A. cum Serap.
aduersatur: dicit quod in empiala infrigidan-
tur intrinseca & calent extrinseca. Cuius maté-
ria est phlegma vitreum comprehensum in oc-
culto & profundo quod infrigidatur vbi est.
Sed quando ei accidit putredo spargitur ex eo
vapor eius quod putruit & dispartitur & in-
flammat in exterioribus. Cū enim esset quie-
tum antequam sibi superueniret putredo non
sentiebat frigidum ipsius aut calidum: cum nō
dum esset putrefactum. Materia enim interius
frigida in loco fortiori agitata calore frigidior
sentitur: vt glaciæ monstrat dissolutio. Fu-
mus autem à materia computrescente deduc-
tus ad quæ extra inueniens ea minus calida in-
trinsecus calidior percipitur. Sicut mixtio in
balneo corpore reddito calido designat. Lyp-
riam vero ponit fieri ex phlegmate: aut ex cho-
lera grossa quandoque. Modum autem gene-
rationis ipsius ex phlegmate dat duplicem: vnū
quidem quoniam quando phlegma inflamma-
tur intrinsecus & putrefit illic calefacit: non
enim resoluitur nisi quando calefacit exte-
riora corporis cum sparsione vaporis calidi. Pro-
pter

per etiam calorem intus existentem, ad ipsum attrahitur reliquus cum virtute: ita vt partes extrinsecæ infrigidentur illo desertæ: & maxime si phlegma vitreum partes oppilet, & possideat exteriores. Alium quidem quia multotiens resoluitur vapor ex phlegmate: qui non putruit: sed eleuatur calefaciens: à quo calidum spatio paruo associatum, separatur modo quo calidum recedit vapore ascendente aquæ: vt apparet in terminis. Et merito quia fuit radicaliter ante putrefieri, frigiditatis immensa. Fit autem ex cholera grossa: quia ea pauca intrinsecus latens putrefit, & illic calefacit. Et quâdo nō resoluitur aliquid ex ea euenit quod dicebatur in primo modo lypiriæ phlegmaticæ. Concurrit enim calor cum virtute ab extrinsecis partibus in quæ intus. Circa prædicta dubitatur & primitus de empiala iuxta Gal. cū ponat in ea calidum cum frigido simul per totum sentiri. Quod non videtur: quia hæc sunt contraria. Huiusmodi vero nequeunt vna commisceri omnino, cum vnum alterum à se depellat. In oppositum: quia vt tactum in empiala calor & frigus in eodem sentiuntur loco. Amp. A tertiam ponit febrem à lypiria & empiala quasi ex his duabus congestam: quam circumlocutione nominans dicit vnam quam duarum rerum in quocunque duorum locorum fieri. Idem de lipparia hæsitatur 2. quia aphor. 4. Lipparia ponitur ex apostemate phlegmonico, interiori uel erysipela consurgere: quod nulli exprimunt prædicti. Dicendum quid ad primum quod eundem locum possumus audire dupliciter. Aut verum & indubitablem, & sic calor ac frigus simul in eo fore non possunt, uel sensualem vel communem, & sic vna existere possunt: unde de distemperantia inæquali. Nō fit accipere particulam sensibilem in qua non existat calidum & frigidum: seu quod licet sensus indicet calorem & frigus simul esse: non tamen intellectus. Iudicium enim sensus non est adeo ratum ut quod intellectus: quod ostendit quis circulus apparet uerus oculo manu protrahens: non autem circino circumducto. Boethius musicæ 5. Quod etiam denotat imago ex uariis constructa coloribus, minutatim quidem de prope percipiuntur, vt sunt diuersi: de longe autem unicus apparet: ceu & uasa in pariete concaua videntur distanter colorum superpositione. Sicque in proposito. Ad aliud dicendum, quod aliter accipit Gal. cum Halyabate empialam, ut apparuit quam Serap. & A. eius amplius consequens rationem nominis. Quam Gal. enim dicit empialam, A. circumlocutione ut tactum exposuit parum enim de nominibus curauit. Ad aliud hæsitatum dicendum quod A. cum Isaac ponit lippariam fieri sine apostemate. Gal. autem multotiens cum eo: ha-

bet tamen modum lippariæ secundum illos præcipue, cum ea quæ intra ardeant & nigeant extrinsecæ. Varij igitur sunt in his febribus intellectus. Hæc igitur est diuersitas in his febribus inuenta breuiter recollecta, & proprie inter Isaac & A. Isaac enim uidetur fortassis propter translationis defectum ab alijs deuiare. Practici tamen latinorum uidentur eum non auditis alijs simpliciter imitari.

Propter tertium quidem sciendum, quod phlegma vitreum uel est multæ quantitatis, uel pauca, uel simul computrescit, aut non: siquidem fuerit pauca quantitatis vt natura simul possit ipsum putrefacere tandem & dominari, tunc calefaciet interius ubi erit putrefactio absconsa vehementer: ita vt prius vapor hic resolutus tendens in extrinsecæ redibit ad frigiditatem: cum fuerit eius materia prius frigida valde, aut secundum diuersitatem putrefactionis phlegmatis & imputrefactionis: quod uidetur Isaac sentire. Si autem fuerit multæ quantitatis adeo ut natura non possit in vna putrefacere & sibi dominari: quod interius est motum calido de potentia infrigidandi reducetur in actum illius: ceu quando nix liquefcit calido motu infrigidat magis, tum propter actionem contrariorum: tumque subtilitatem. Vapor autem hinc resolutus à calido retinebit adhuc quid eius ita ut sentiat frigus interius, & calor extra. Quod uidetur A. tenere. Gal. autem cum Haly. sane sentit in hac febre omnem corporis partem una calefieri & infrigidari: propter phlegma putrefieri partim: partim vero minime: quod nomen denotare dictum est expositum. In lipparia autem nō tantum opponuntur adinucem Isaac & A. cum causas non suscipiant ex contrario, sed ex diuerso magis vt apparuit ex alia causa & modo sentit ipsam Isaac consurgere & ex alijs A. consonans per amplius sermoni Gal. volentis in ea calorem occultari vehementer in interioribus: sicut & ipsi attestatur Serap. filius. Quod & magis approbo. Amp. nosce quod si materia acida & vitrea desuper partes moueatur sensibiles, ita vt computrescat minime rigorem siue frigus inducit absque calore. Quod si amplius mota in putredinem quandam moderatam deueniat, febrem inducet empialam: in qua secundum omnem partem sensibilem calor & frigus sentitur vna. Si vero amplius putrefiat præcedit quidem frigus vt in quotidiana: superuenit autem calor febrilis superato eo vt nequaquam in augmento percipitur: & maxime in statu paroxysmi: febriū. 2. Sufficiat itaque hic breuis sermo in hac inuoluta & utrinque probabili huiusmodi febrium causarum assignatione.

Propter quartum quidem ad primum quid dicendum, iam apparuit. Ad aliud dicendum quod

quod sua via procedit. Aut uerum id naturali quid impediatur. Impediens autem est cetera pars phlegmaris uitrei impurissimi quae mouetur. Ad aliud dicendum, quod licet pars interior incipiat putrefieri: statim tamen occorrit phlegma vitreum motum impurum secundum A. infrigidans. Ad aliud de lipparia etiam quid dicendum apparuit. Ad aliud similiter patet considerata causa differenti & modo generationis lippariae secundum Isaac & A. Ad aliud dicendum secundum A. mouentem hanc dubitationem: quod in huiusmodi terminis attenditur una conditio ut non sit quod prohibeat, sicut diffinitur aqua frigida & humida quando dispositio eius est secundum suam naturam, & non fuerit quod prohibeat. Similiterque de graui descensu. Hic autem est prohibens humor, viscosus, frigidus, inclusus, aut atherogeneus & diuersimode situatus: ut ostensum ex talium febrium generatione modorum.

Circa id quod dictum est in febre empiala secundum Gale. simul febrem & rigorem pati, haesitatur an rigor causetur a calido vel frigido. Quod autem a calido uidetur, quia illud causatur a calido: cuius causa est calida; huiusmodi uero est rigor: ut ostendunt tertiana & caeson in quibus euenit etiam & febrium secundis. Adhuc in rigore sentitur uelut acuum & spinarum perforantium minutis fine punctura. Isaac febriam, unde dixerunt aliqui rigorem non esse aliud nisi puncturam sensibilium partium ex vaporibus calidioribus. Rursus 10. de inge. Rigor fit propter multitudinem & acedinem eorum quae ferantur, & propter uelocitatem delationis & uirtutis imbecillitatem, talia uero magis contestantur calidum. Amplius illud quod mordicat calidum impugnando naturam, ipsumque fugando; & per consequens infrigidando rigorem induit, tale quidem est quod calidum mordax, ut apparebit per amplius, causatur itaque rigor a calido.

In oppositum ut quod a frigido: quoniam Gale. lib. de investigatione, tremore, rigore, & spasmus. Rigor est frigiditas fortis; frigidum autem causatur a frigido, cum generatum producentis sapiae naturam. Palin. Rigor causatur ex contractione calidi de partibus exterioribus ad interiora: quod frigiditas exteriorum ostendit. Sed is motus est frigidus: ea fidi uero contra. Eti. Rigori docent subuenire per frictiones calidas, inunctiones, & calidorum assumptiones. Inducitur itaque rigor a frigido.

In contrarium etiam: puta quod si rigor fiat a calido non contingat a frigido aut contra, quia contrariarum causarum contrarii sunt effectus; secundo de generatione & corruptio-

ne. Sed calidum & frigidum sunt causa contraria, non unus igitur & idem effectus ut rigor causabitur ab eis.

Propter primum quidem tangatur primus uniuersalius qualiter per rigorem & uniuersaliter ea quae apparent in paroxysmis significentur super morbi longitudinem breuitatem, & medium ipsius. Secundo terminorum aliqua subdatur expositio. Propter primum huius sciendum, quod modi seu uarietates quibus cognoscuntur consistentiae seu ordines temporum uniuersalium in adinuicem sunt septem, uel octo: quorum quatuor sunt tanquam essentialia puta paroxysmi anticipatio & postpositio: longitudo & breuitas, fortitudo & debilitas: mos seu modus agnitudinis, seu columbia & incolumbia. Reliqua uero accidentalia sicut accidentium longitudo, fortitudo, & eorum incolumbia, uel ipsorum opposita ut paucitas, breuitas, columbia ipsorum, & tempus declinationis paroxysmi longius priori, uel breuius, & si facilius aut difficilius ferunt quae ipsius accidentia. Et ante post paroxysmum remaneat ab accidentibus modificatus, uel circumpolurus in illis. Si ergo considerant omnes hi aut plures & digniores in adinuicem, puta anticipatio, longitudo & tunc utique agnitus erit in augmento. Si autem contrariante oppositis omnes uel plures postpositio, breuitas, & reliqua: tunc manifeste si materia fuerit digesta, erit in declinatione iam morbus. Si uero calor, uel plures aequaliter accendant: ut in priori uel prioribus paroxysmis, erit in statu, dummodo agnitus non sit quae habeat de sui natura semper aequalitatem & ut in statu esse, cum homogeneis seu aequaliter extensus, aut anticipare sicut agnitus seu augmentatiuus uel postponere semper cum apomasticus siue declinatus. Cognoscere tamen tantandum huius agnitudinis consistentias ex maiori uel minori anticipatione & postpositione, ne cum aliis uel tenore ipsorum plus aut minus uniformi. Cognoscuntur tamen certius digestionem uel indigestionem reuera. Quando autem tales fuerint immixti principium denotant agnitudinis aut materiae fuerit indigesta: iuxta illud ueteris: secundum principia & fines imbecilliora cuncta, hoc crisis & utcumque aphorismorum primis. Propter secundum huius sciendum quod typi sunt tres, uel quatuor rigor, horror, seu horripilatio: frigus & tremor secundum quosdam, unde metra. Est triplex typus rigor horripilatio frigus. Frigus phlegma ducit, rigor est quando cholera pungit. Quandoque poros claudit sex sanguinis terris haec. Est tremor quartus qui circuit omne genus. Est autem typus figura uel imago uenturae febris qui est reuocatio caloris natui de exterioribus maxime.

maxime ad interiora: indeq; refractus non raro. Rigorem autem cōmunius attribuunt cholera: iuxta illud aphor. quarta. A causone habito rigore superueniente solutio &c. Horrorem melancholiz, & frigus phlegmari, ut eorū denotant paroxysmi. Multotiens tamen unum pro alio sumitur: ita ut omnis typus aliquando confundatur sub rigore. unde aphor. quarta. Quibuscunq; in febribus quotidie rigores fiūt, quotidie febres soluantur. Quod autem tremor sit communis circuiens omne genus typi non proprius approbo, cum magis concidat, ut apparebit cum rigore, unde de his. 4. prima. ita horripilatio est dispositio in qua inuenit corpus diuersitate in frigore ac punctiōem in cute & lacertis; & antecedit eum pigritia & contractio, frigus est ut sentiat in membris suis & dorsis lacertorum frigus purum, sentiunt enim ac si nix ac frigiditatis congelatio sit aliqua eis innexa. Isaac feb. 5. Rigor est ut non possit cōtinere membra sua ex tremore & commotione in eis eueniente moribus inuoluntariis; & fortasse est frigus forte; non sit autem rigor fortis nisi in continua & quartana. Videtur igitur omnis communicare in rigore quandoque. Sic igitur rigor aliquando sumitur communiter pro omni typo, sicut apud Ioannem horripilatio; plures autem prout singulare diuisum contra typos ceteros. In diuisionibus quoque omnis typus ponitur horripilatio, diuersificata tamen punctura, quasi actuali, non frigore ac profundatione ipsius, & ueritas est q̄ suscipiens auctores, nullam poterit certam inuenire attributionem typi designanti materiz alicui, eo fortasse q̄ a calido procedit & frigido entibus diuersis. Nosce q̄ typus accidit in febribus interpolatis, non autem in continuis nisi rarius ut apparebit consequenter. Nam in his calor diffunditur per totum, ut maxime, tunc autem typus non potest magis accidere. Gal. vero eius ponit plures descriptiones aliorum rigoris quas omnes mordet, ut q̄ rigor est frigiditas corporis & q̄ est tremor cum frigiditate, & q̄ est frigiditas motiua dolorem causans; ac q̄ est nocumentū in calore per naturam inuēto in omnibus animalibus; & q̄ etiam frigiditas est corpori subito occurrens. Deniq; uero his omnibus notificationibus detestatis utcūque subdit, q̄ rigor est frigiditas fortis corpori adueniens: nec nō trahens ipsum a naturali dispositione ad innaturale: quod per longa conatur declarare; & fortassis aliquid indeterminatū coniacet ac improprium in illo, ut tertio uidebitur dicendum: calidū uero & frigidū nota differentia 15.

Propter secundum autem sciendum, quod ut indicatum diuersificari uidentur in hoc quesito maiores: nam aliquando sonant rigorem causari a calido; & interdum a frigido; & uni-

uersaliter frigiditatem ipsam ut uidebitur per amplius concomitari. Sic etiam ostendit dissolona ipsius attributio febrium diuersarum paroxysmis; & aliis dispositionibus corporum uariis, quid autem de hoc apparebit consequenter.

Propter tertium uero sciendū primitus quid sit rigor: ex hoc enim soluētur coarguta, & quæ uidentur ipsi inesse aderunt reliquis separatis; ac non minus discoloriz causa & oppositionis circa hunc erit manifesta ut sic palcherrime demōstretur quod eius unumquodq; phy. 4. & 2. rigor: unde causetur uniuersaliter & specialiter ostendatur. Propter primum huius sciendum, q̄ rigor est conuentus quis crebrus caloris naturalis & repentinus in corā re omnifariā prater naturam causatus: indeque paulatim ad superficiem ut ad multum refractus. hæc nanque uidetur sufficiens rigoris ratio, eius perfecte denotans essentiam. quod apparet, nam conuentus seu cōcurfus aut motus extat uerius genus, unde principio de accidenti quinti. spasmus, tremor, saltus, rigor & reliqua commune quidem habent genus omnia motum peccantem: hanc autem motus auditus per ly conuenatus, peccans autem per id quod subditur repentinus. talis nanque delinquit in naturam: cum omne subitum naturæ prælatiuum. aphor. 2. hæc autem genere separantur a rigore quæ non cadunt sub motus ambitu: sicut dispositiones uel habitus, ceu sanitas & ægritudo cum suis causis non habet rationem fieri & motus, ut accidentia. Verum facti & quietati: sicut uisum differentia 73. Est enim rigor accidens uirtutis animalis; ut cetera prædicta. Dicitur est aliquis, quia non omnis cōuentus, sed minor aut mediocris, est rigor. Nam hæc dictio, aliquis, quando additur alicui denotat paucitatem. 3. regi. acutorum. Id autem sit additum ad differentiam tremoris: eo q̄ tremor quis sequitur rigorem; & est sicut rigor fortior causatus proprie a calido: licet multotiens improprie sumatur pro typo quocunq;. Cuius quidem gratia notandum q̄ tremor dupliciter accipitur; uno quidem modo prout est motus malus uniuersalistotius corporis: & ita est effectus rigoris ceu quando adest uehementissima punctura cum agitatione quam maxime: & dentiū stridore. Et hoc amplius causatus a calido & ad summū ex latione repentina calidi feroci acuti super partes sensibiliores entēs. sumitur & tremor prout est passio seu morbus officialis secundum Anic. quo partes concutuntur absq; alia passione febrili uel altera contingente: ceu reliquæ neruorum ægritudines, in quo nō percipitur manifeste calor sicut in priori tremore, aut frigus, & differt ab eo q̄ hic potest aduenire toti corpori uel pluribus partibus aut uni. Sed ille communis est omni corpori uel pluribus

teu rigor à quo vt ad vltimum positus est consequitur: vnde de iectione rigore & spasmus: rigor non est nocumentum accidens in membro sicut tremor, neque etiam tremens frigiditatem sentit, ceu rigens. Adhuc in rigore est motus præternaturam omnino, & ideo dictum omnifariam. in tremore autem nequaquam, cum tremor qui est nervorum passio. construatur ex re præter naturam conante. mēbriū sua quantitate nimia vel qualitate praua suppressere: & natura sat agente subleuare, ita ut bellum motuum contrariorum insurgat: tremolosum inducens motum. Et propterea dicit Gale. idest q̄ Plato non recte opinatus est tremorem & rigorem vnum & idem esse. Sed quis dicit Plānem obseruans tunc per tremorem, illum intelligere qui est communis toti corpori multotiens rigor dictus, aut verus (vt dictum) eius quasi effectus: quando omnino causæ rigoris fuerit intentæ. Separantur etiam spasmus, & iectatio, uel titillatio, siue saltus. Videtur enim esse maiores magis extendentes vel etiam contrahentes quam rigor aut tremor, & maxime spasmus: per id autem quod dicitur crebrus dicitur rigor: & ab his atque à sternutatione, tussi, singultu, & huiusmodi. rari enim sunt motus eorum: tremoris autem & rigoris commotiones pulsu etiam spissiores, nisi formicantis forte. Subditur autem caloris naturalis quod si quidem mouet, uirtus regitiua nunc quidem intus: tuncq̄ foras prout obiectum concitat inuatiuum seu oppositum: vnde vigesima septima problematum, calidum quod est in nobis tanquam animal fulgens quæ nūque timebit. Ad cuius quidem præsentiam calidum sequitur permanere subiectum. Ad eius autem absentiam frigidum: idem nanque potest esse interiorum causa, ut nauta qui sui præsentia causa est salutis nauis, cuius absentia submersionis illius, physicorum. Dicit autem in cor, quia calidum nociuum læsum cum sanguine semper concurrit in cor uelut in arcem ac eius principium ut ibidem tueatur & apparens de accidenti. Et ideo Mesue de pharmacis omnium noementorum aduenientium corpori primus occursum est ad cor, uelut ad basim vitæ. Dictum autem repentinus, quoniam quod paulatim occurrat, non causat rigorem, aut dolorem qui ipsū comcomitatur. Quod enim passionem inducit, oportet ipsum subitum esse & multum: ut apparet 4. de accidenti. Debet etiam id esse esse præter naturam omnifariam, ita ut repentina innaturalitas cadat in naturam, & non in dispositionem contrariam, quia magis quid dicitur delectabiliter in naturam, uelut quando calidiori occurrit contemperans id quod frigidius, per quod etiam tremor nervorum morbus separatur à tremore rigorofo. est etiam bre-

uis tempore, ille uero longissimus. Per id uero quod subditur paulatine separatur à veretundia: ipsa enim similatur rigori cum in ea duplex sit talis motus naturæ: primo quidem ad intra, & consequenter ad extra: & in rigore similiter ut quàm multum, ueruntamen in ueretundia citus sit caloris naturalis reditus: non autem adeo in rigore. Dicitur autem motus multum refractus, propter rigorem qui aliquando contingit, sicut conspexi in morte uehementem quam magis frigidum aut ob uirtutis debilitatem, uel materiei superfluum quantitatē, de accidenti, hic enim calor confugiens in cor non reuertitur, per hoc etiam separatur timor & rigor uisus in eo qui potest rigori consociari nunc præfacto. Insufficiens itaque præfacta uidetur rigoris ratio. Propter secundum huius sciendum q̄ rigor apud Gal. & 6. theo. non solum causatur à calido, uerum etiam à frigido. Quod autem à calido monstrant ex febribus tertianis interpolatis (ut tactum) incipientibus cum ipso parossitice, quo etiam terminantur, causæ seu incensiones, iuxta illud aphor. quarta. A causæ habito rigore superueniente soluitur ipse, quod etiam ostendit scintilla cades super corpus hominis, & aqua feruentissima confestim occurrentes. Similiter & nulus me dicamine aspersum acutiori. unde Isaac feb. 5. Causa rigoris sunt calidi & acuti chimi citum exitum habentes. Adhuc istud induci rigorem quod causat conuentum quendam crebrum caloris natini &c. tale uero est calidum excedens impellens calidum naturale, causans quæ ipsius absentiam, cum eo q̄ calor naturæ (ut tactum) confugit in cor tanquam in ipsius tutum, itaq; rigor causatur à calido. Firmant q̄ etiam fiat à frigido, ut phlegma ostendit uitreum, proprie cum frigiditatis fuerit multæ, maxime quæ cum fortiter moueatur ita ut dissoluatur, & hic quidem rigor non fortis ut prior, qui à calido licet illius respectu perduret quàm longissimus, qui & amplius mulieribus accidit quàm uiris, & maxime largam & ociosam ducentibus uirgā. Causatur etiam ab aere & aqua quàm multum frigidis mox occurrentibus, & proprie cum corpus fuerit porosum & natum suscipere quæ adueniunt, cum humores corruptos in exposito, sit etiam rigor quis in quartana compositus aliqualiter ex calido & frigido, cum frigidus de se sit ipsius humor, calida uero putrefactione. Rigor tamen ad quem sequitur tremor & agitatiō totius quàm maior à frigidis eorum grossitie non generatur humoribus. Verum à subterioribus & acutioribus. Adhuc illud quod inducit conuentum quendam crebrum &c. rigorem causat, cum huiusmodi sit eius denotatio. huiusmodi uero est frigidum cum impellat calorem naturalem, & in fugam ponat, uelut sibi opposi-

oppositum: quo siquidem dupliciter infrigidatur subiectum. Vni quidem propter frigidum iam occurrens, aliter propter fugam calidi. Sed in eo qui fit a calore solis aduenit frigiditas, propter secessum calidi: & ideo remissior, licet nunc acutum punctura sentiat interius immerfa: forinsecus tamen percipitur frigus, propter quod fortasse rigor simpliciter non est frigiditas fortassis, sicut testatur Gal. verum potius causa ipsius quandoque, effectusque semper. Inducitur ergo rigor etiam a frigido & sic ab utrisque: quod etiam firmat ex 8. proble. ita. Propter quid horripilantur sine rigescunt a calido & frigido infusi. Soluens ait: id contingere a frigido: quia extinguit calidum: cogitque ipsum abscedere. A calido quidem, quia frigidum circumferentiale repercutitur in unum & fugatur introrsum: ita ut idem differenter tamen: possit diuersis causari, sicut a frigido. p. se amplius: a calido accidente magis. Sed circa predictam causarum rigoris assignationem dubitare contingit: quando enim quis patitur tertianam, & paroxysmus cum rigore debeat superuenire, supposita dispositione omni corporis & continentis, sicut possibile, uniformi rigor tunc incipiens cum paroxismo: unde causabitur non quidem a natura paroxysmi, cum non moueatur nisi mota, neque etiam a materia magis nunc quam prius determinate. quare videbitur causarum eius sufficiens assignatio. Dicendum id contingere a causa exteriori superna magis quam humor confluens cholericus & agitur euentatione in motum determinata periodo; differentia declarata 88. quam siquidem causam medicus ut ipse non habet intueri. Nosce quippe ut particularius colligantur sermones de rigore & maxime Hipp. & una consoni reddantur, quod rigorem aut sequitur febris aut minime. Siquidem id tunc hic rigor paruus, vel forte mediocris, quoniam ad quem febris non consequitur omnino, verum tamen ad magnum consequitur. Rarius tamen euenit ut ad rigorem indifferenter non consequatur febris: ita ut tempore Hippo. semper concomitaretur rigorem febris, tempore tamen Gal. & nunc amplius: quia homines sunt amici gulae & luxurie ociosi repleti sub frigidis humoribus plurimis & paratis alterari. Balneis etiam crebrius utentes rigorem illatum. Aliquando rigorem non consequitur febris de distemperantia quinto de accidenti, & de tremore, iecticatione, rigore, & spasmo: velut quando quis lapsus aere sub frigido ente vicinque se habente denudat incurrit huiusmodi rigorem quandoque. Si vero rigori superueniat febris aut id contingit ex parte materiae magis, vel uirtutis imbecillitate, aut utraque. Siquidem prius aut materia est intra uenas, aut extra. Si quippe sic rigor adueniens in

principiis febrium interpolatarum: si vero intra: uel est quod dictum. A causone habito & siquidem indigesta: & in locum unum impulsas: tunc occurrit rigor siue frigus, secundum illud aphor. quarta. In febribus ardentibus si quae exterior frigida rigeant & reliqua. Vnde in eorundem. 7. In acutis morbis frigiditas extrematum mala. Quod si materiae contingat mole, tunc fit rigor & maxime feb. apostemolarum principiis, cum calor nequeat diffundi superfluis oblesso: uerum contrahitur per amplius ad locum apostematis. 4. prima. Si autem accidit uirtutis imbecillitate proprieque pluries, sic erit ille prius aphorismus quartae, si rigor incidat febre non deficiente, debili uirtute, mortale. si autem utroque modo: tunc rigor in mortem conterminat ut praetactum. Attende quoque quod inter sanitatem & mortem multi accidentium interueniunt gradus intermediis. nam post sanitatem anomala quaedam extat deinde spontaneus quis labor quadruplex: ordine tamen aliquo, cum deterior sit ceteris apostemosis: deinde contractio postea horror siue horripilatio: postea rigor, deinde tremor quos subsequitur, ut tactum, febris: ex febre autem mori aduenit quandoque, cuius quidem causa est extinctio caloris natui. obuiatione contraria, uel regimen eius suffocatiuum. Tremoris autem uniuersalis & prioris causa est multitudo humorum subtilium mordacium uelocissime delatorum super partes sensibiles cum uirtutis debilitate: ita ut tantus interueniat motus & agitatio, ut quis se non possit continere quin dentibus frendeat etiam: quem & febri quartanae, & non cholericae tantum attribuit Almanfor: & maxime talis in ea potest concidere quando fuerit ex cholericae aduisione febris causata, ita ut hic tremor (ut tactum) uehementem sequatur rigorem. Rigor uero modicum immixtus his causis accidit. Per amplius autem minoratis constante uirtute contingit horror. Adhuc autem plus talibus imminutis contractio seu angustia & labor deinceps spontaneus & animalia & tandem sanitas causis his accidentium propulsatis omnino. quinto de accidenti, & decimo de ingenio.

Propter quorum quidem quid dicendum apparuit, utriusque omnium partis rationes prioris uerum concludunt: cum ostendant rigorem fieri a calido & frigido: ut concessum. Ad aliud uero quod tanquam subcontrarium dicendum non esse inconueniens, unum quiddam (ut ostensum) differenti modo a diuersis fieri causis: ita ut una sit prima: mediata secunda, una etiam per se, reliqua uero per accidens, ut problematum nona. Ad ultimum in his quae uidentur diuersis agi causis idem est, quae autem sunt ante has, nihil prohibet esse alias, cum ostensum centesima quin-

tesimaquinquagesima materia curam perfici contrario non solum immediato & per se: uerum per accidens & mediato, cum omne tandem cōcidat in idem & primum.

Questio VII.

Quod hectica non fit incipiendo uidetur per secundum crismum excusantem se à determinatione signorum hecticæ, ita nulla hectica-rum in primis diebus, sed tempore procedente perficitur. Alia translatio. Hæc quidem febris non accidit à principio. Hoc idem sonant sermones Serap. & theo. 8. Amplius, unumquodque agens operatur in materiam dispositam magis, & non in contrariam. Actus enim agentium sunt in patiente & disposito: cum forma proprium appetat susceptiuum: sed spiritus aut humor dispositior est materia ad inflammationem quàm membrum: eo quod substantia est subtilior illo: & omnis talis plus recipit passionem, febrium primo, simplicium quarto, & primi secunda. Quod roboratur: quia esse febrium, ut apparet primo earum declaratur ex caliditate exteriorum: primitus enim accenditur caliditas in aerem balnei: deinde in aquam & postea in parietes illius. Adhuc quarto prima. & Isaac etiam febrium primo. Febris mediantibus spiritu & sanguine uel naturali calore se per totum disseminat corpus. Hoc autem fore non potest, nisi primitus in spiritu & sanguine, idest humore & calore naturæ calor fundetur extraneus: quare uidetur quod omnis in primis febris sit ephemera aut putrida. Rursus, o quam parum est quod quartana accidat incipiendo: plurimum namque euenit in successione ægritudinum putridarum diuersarum differentia 90. Cum autem in materia quartanæ, & humor magis conueniat alijs humoribus, qui sepius febrem inducunt incipiendo quàm cum materia hecticæ, quæ est substantia solida seu membrum: tunc nauc; fiet hectica incipiendo. Idem si hectica fieret incipiendo, iam non esset hectica: cum incipere dicat quid in dispositione fore, hectica uero habitationem: ut apparebit in his quæ deinceps. Hectica itaque incipiendo minime fiet.

Oppositum horum sapit Gal. in pluribus locorum de differentiis febrium cum A. Zoar. Auer. cum alijs medicis uniuersis. Quod & rationibus confirmatur. Cum enim omnes alie ægritudines ab eius occurrant principio propter quid hæc non similiter alijs. Adhuc cum de ratione accidentis sit ut morbos sequatur, uel umbra corpūs: tertio de accidente. & 11. de ingre. si hectica semper alios comitaretur morbos, potius accidentis, quàm morbi rationem induet: cuius contrarium notum: cum tria ge-

nera sint febrium per se morbus existentia. Amplius non agit agens, nisi patiens eius sustinere ualeat actionem. Cum agentis ad patientem oporteat proportionem interuenire, sicut mouentis ad mobile, & intelligentis ad intelligibile. Spiritus autem aut humor corpora subtilia non sunt apta impressionem agentis potentioris susceptam etiam sustinere: uerum in membra petransiens fulciatur solidiora. Itaque hectica fiet incipiendo.

Propter primum uero sciendum quod hectica quid habituatum importat, hectico enim græce habituatum latine. unde 8. de ingre. Dispositiones facile solubiles vocant habituales, idest quasi dispositionales: quæ autem non tales, habituales. habitus enim secundum Boethium in prædicamentis est dispositio firma, uelut dispositio habitus infirmus. Hectica quoque habitum importat: aut quia cum difficultate, uel impossibilitate separatur quando habituata permanferit: uel quia subiecto solido, puta membro aduenit. A quo facta, cum difficultate remouetur impressio. Est autem hectica in pluribus dispositionibus similis phthisi & etiã differens ab eadem, habent enim se uelut excedentia & excessa. Isaac febrium secundo. Nam phthisis uno quidem modo comuni sumitur pro omni consumptione ex quacunque emergente causa: siue præter naturam, siue naturalem: qualis est dispositio quæ accidit decrepitis quando morti appropinquant, unde Almanforis quarto. Qui tali custodiuntur regimine, possibile sit ut ad decrepitam longo deueniant tempore, atque phthisim. Et hectica hæc proportionatur senectuti: quæ quidem euenit non parum ex ægritudine quadam consumptiua. sumitur etiam pro illis qui ad ipsam sunt dispositi apho. 3. puta qui collum habent longum, & epiglottim foris prominentem, & pectus strictum, carne nudum, cum humeris eleuatis, & tortis cruribus & huiusmodi, phthisis in plusquam hectica febris se protendit. Est etiam phthisis quæ consumptionem importat: consumptio omnis corporis cum ulceratione pulmonis. Et hoc quidem modo hectica phthisim superat. Nam omnis sic phthisicus hecticus factus est, & non conuertitur: cum multi hecticam patientur sine pulmonis ulcere. Talis quoque hectica uelut accidens consequitur ad phthisim. Quando enim pulmonis aut pectoris sanies non expurgatur libere: effumans in cor ipsum inflammans febrem inducit hecticam. Hectica quoque ut innuebatur per prius duplex existit. Quædam quidem est cum febre: quæ est calore extraneus fixus in substantia membrorum, ipsorum prohibens operationem, eorumque naturalem consumens humiditatem. colliget 3. Hu-

ins quoque hecticæ febris multiplex assignatur modus distinguendi. Quidā enim ipsam penes corporis humiditates distinguunt. Humiditates autem corporis sunt quatuor: ut innuitur. 7. de inge. per quatuor siccitates distinctæ illis oppositas. Eas quoque Serapio exprimit. 6. & Isaac febrium tertio. Et quarto prima, & 12. ipsius animalium &c. Quarum esse & numerus differentia innouit. 33. Secundum has quoque quatuor humiditates uidetur Isaac interdum species quatuor hecticæ distinguere cui libet suam speciem hecticæ adaptando. nonnūquam uero tres solum magis pronuntiat. Commūiter tamen tres ipsius species distinguuntur; ita ut in primis duabus humiditatibus prima coincidat hecticæ species, theoricæ. 8. Serapio tamen & Isaac ponunt magis putridam ex ipsa fieri. Et ueritas est fortassis, quia huic putridæ tandem associatur hectica. In tertia quoque secunda. In quarta uero, tertia. Has autem humiditates. A. quarto prima: cum febrium primo. nititur ostendere & per consequens hecticam illis occurrentem per humiditatem triplicem in lucerna existentem. Est namque in corpore lucernæ oleum effusum: quod duabus proportionatur humiditatibus primis. Est & humidum corpore licinij iam imbibitum: quod tertiæ redditum est humiditati. tertium quoque humidum ipsius lycinii radicale: quod partes coniungit & retinet in adinuicem: quod quartæ proportionatur humiditati: ut etiam differentia inducitur. 112. Et hic hecticæ modus cum nominibus eius terribilibus incurabilis: nisi manu sanari pronuntiat diuina. Et ista quidem sufficientior uisa est modorum hecticæ distinctio. Quidam uero distinxerunt hecticæ species dicentes: quoniam aut est in humiditatibus propinqui temporis coagulationi: & sic prima. confurgit species, aut in eis quæ sunt uelut caro: & hæc secunda. uel in membris radicalibus duris: qualia sunt ossa & nerui: & ipsa tertia. 10. apparens de inge. Et iste quidem sermo verificatur ab A. quando ad priorem fuerit reductus antedictus: quoniam si denotetur ipso quod primū quod fuit hectica est humiditas propinqui temporis cum coagulatione: non erit sermo uerus, cum ex hac, secunda efficiatur hecticæ species, & non prima, uel præter hoc sit in cordis substantia. Hoc autem dicitur febrium primo ut quod quando complexio corporis naturalis inflammatur: & non adhuc humiditas consumitur existens in ipso: sed uelut ebullitio ostenditur, prima confurgit hecticæ species. Quando autem hæc ebullitio ad consumptionem procedit secunda efficitur species. Quando uero membra similia partium læduntur, ut uenæ nerui & huiusmodi, tunc erit & tertia. Et hi quidem

omnes modi sane intellecti idem satis uidentur protendere. Est quoque & modus distinctionis hecticæ satis famosus: ut quod quædam ipsius est difficilis cognitionis, & facilis curationis: ut prima eius species. Quædam quoque facilis omnino cognitionis, & impossibilis curationis: sicut tertius est modus. Secunda quoque species medium obtinet cognitionis & curationis. Et ista quidem distinctio magis ostendit modum quàm rem: propter quod prædictæ hac magis faciunt scire. Et scias quod Gal. febrium primo & alibi nominat simpliciter hecticam primam. & secundum maiorem partem secundam ipsius speciem: puta cum nondum desiccatur humiditas cordis: nam quando desiccatur ut in fine secundæ speciei, & in tertia, dicitur tabes: secundum uero A. adubul. Est & alia senectutis dicta uel senii. quoniam aduenit ex ea in hora senii: quod accidit in fine marasmi: & ipsa est siccitatis dominiū super totum corpus absque febre. Cuius quidem causa ut plurimum est frigus cum uirtutis imbecillitate: unde membra nutrimento carent. causatur etiam ex potu aquæ frigidæ quando dispositio non affuerit. Eam quandoque causat medicus faciens febrem hecticam marasmodem per potum aquæ frigidæ & in ipsius proiectionem in hanc quidem minus deterrentem transire: unde 10. de inge. Melius est frigidam discrasiam translaturum hominem: cum spe benigna efficientes quid & periclitari: quàm sine spe perire certissime: propter quod in frigidam omnino hecticas febres confestim antequàm deuenientes in tabem moriantur. Non enim qui certissime tabefactus est tentabimus sanare: & si calorem eius extinxerimus. Sed siccitas derelicta senectutis hominem promittit tanto uicturum tempore, quanto resistant solidæ particulæ ad ultimam senectutem. Fieri autem incipiendo intelligo hecticam: cum nulla aliarum febrium antecesserit ipsam, neque ephemera: neque putrida: ut alia quæcunque causarum: immo prima caliditas in corpore accendatur cordis ex causa quadam forti: & si omnes febres fundantur in corde, ista quàm maxime in eius figitur substantia. *Quædam ob hoc dicitur.* Propter secundum autem sciendum, quod aliqui rudium audientes superficietenus sermonem prædictum Gal. & antemissa motiua dixerunt hecticam incipiendo minime fieri: unde febrium primo. Quare quidam æstimant neque aliter posse fieri hanc passionem talem, ab ægitudinibus præeuntibus mox dicendis. Decipiuntur etiam aliqui illic ex serie Gal. tali. Hecticæ cum sine causis pro-catharicis generentur, nunquam ab initio inuadunt: sed transcendent ex his quæ sunt ex putredi-

putredine. Dicendum q̄ his sermo non est simplex: sed magis conditionalis & consequentis destructio: ut apparebit diligenter intuenti eundem & consequentem post plurima. Quorum quidem & aliorum amplius defectus uidebitur consequenter aperte.

Propter tertium quidem sciendum, q̄ febris hectica ut plurimum non occurrit incipiendo: uerum alias consequitur febres & ægritudines. Raroque incipiendo aduenit cum eius causa raro occurrat. unde feb. primo. Hectica febres secundum duplicem fiunt modum, quandoque enim propter causas quàm multum prolongatos: ut & humiditatem corporis consumant cordis. Interdum uero adhuc manente cordis humiditate febres accenduntur uelut lucernarum flamma ex lyncio. Fit etiam hectica non parum ex emitriteo: unde quarto prima. Emitriteus quandoque est de febribus magis interficientibus, quoniam perducit ad hecticam, & ægritudines chronicas & difficiles. Cō surgit etiam ipsa ut apparuit ex phthisi antecedente: nōnunquam uero ex empiimate, & universaliter ex apostemate intus maxime saniato: & propter subtiliationem regiminis & prohibitionem in frigidationis, ut potus aquæ: & propter modicam obseruationem lateris cordis cum rebus in frigidantibus de, foris aut de intus. Multoties etiam in ipsam cadere facit medici necessitas ppter causam uirtutis & frequentiam syncopis dantis in potu uinum & aquam carniū & medicinas calidas, ut de musco. Fit etiam (ut tactum) interdum incipiens hectica. vnde Galibidem. Vna quidem hecticarum generatio dicta est mihi. reliqua uero est quando a principio inuadunt confestim primam generationem similem facientes ephemeris ut tristitia, ira, & labore ampliori simul cum æstu facto. Decimo uero de inge. Rursus ex causonidibus in tabem aut à principio ipsius cō festim hectica contingit febrem præsihens causonidem. Isaac quoque hanc distinguēs ait q̄ hectica quædam est cuius causa est alius morbus: alia uero cuius causa non est alius morbus: quæ consurgit ex inflammatione humoris existentis in concauitate uenarū & arteriarum cordis. vnde recolligens ait. Quia compleuimus causam hecticæ: quæ est propter alium morbum: & causam eius quæ nō est propter aliū morbum: sed perse &c. A. uero positis causis quibus febris euenit hectica, consequenter subdit. Longissimum est ut accadat hectica incipiendo: quasi sint membra radicalia iam inflammata & non inflammetur humor siue spiritus ante illud: immo oportet ut calefiant illa in primis: deinde secundum processionem dierum calefiant ista: nisi accadat causa fortis naturalis. Sermonem quoque de hoc assumpsit Zoar

ita. Vna sit species febrium hectica dicta, quæ ut in pluribus non arripit per se principaliter: sed sequitur aliquā febrium chronicarum corpus exiccantium, ipsumq; dissipantium. quandoque etiam fit propter febres diei. Colligetur quidem 4. Raro accidit febris hectica: nisi post alias febres, sicut post ephemeram in corporibus ad hanc paratis, aut post aliquam ex putridis. Præuenit autem per se in his causa quæ natura sicciores & calidiores uiuentes in laboribus, uigiliis, diæta subtiliori: & amplius si quæ huius aeris dispositione & regionis in iram uel tristitiā peruenerint: febrium primo. Hi utiq; sunt sermones quos de principiatione istius febris per se aut post alias illustres inducere. Qui etiam secundum utranque eorum partem possunt rationibus decorari. Quod enim in pluribus hectica morbos concomitetur alios, ostenditur. Cum unumquodque agens (ut tactum) in materiam formam inducat sibi dispositam pluribus causis caliditatem inducentibus in corpus materia amplius disposita est spiritus: qui est subiectum febris ephemeræ, aut humor qui putridæ, quàm membrū in quo & hectica figitur: eo q̄ rarius causa adeo uehementer impressiua occurrit corpori: sicut etiam in uniuerso conspiciamus. In eo enim effectus grandes mirandi rarius occurrunt. Amplius. natura tuetur in quantum potest solidam partem: puta membrum spermaticū: quod est subiectum & sustentaculum eorum omnium quæ sunt in animali: & maxime cor: quod hecticæ proprium subiectum, non solum secundum contenta in eo, ut alijs plus febrium: uerum etiam secundum ipsius substantiam propriam, quod uero tale fuerit, conseruatur maxime à natura cum sapientia & intentione omni. Fit igitur ut ad multum non incipiendo quod indicat Almeliletu febres ut plurimum antecedens. Quod autem fiat initiando quandoq; ostenditur, quia agens agit, non in quocunque, sed in patiens sibi dispositum. Quod autem patiens non sit dispositum dupliciter potest contingere, aut quia sit nimis durum & compactum resistens omniafariam, uelut ferrum, lapides pretiosi, & maxime adamas: uel quod sit subtile, molle, cessibile, ut aer aut uapor, qui actionem agentis non sustinere potest, sed magis sit transitus in solidius, durius, ceu ostenditur in percussionibus quibus corpora percutiuntur solida non resistente aere, uelut etiam uidere contingit in fulgure quod nō omne patiens reddit sibi dispositum, ut in ipsum agat: sed illud quod est durum, compactum, & resistens. unde Algazel. Fulgur quod est ignis subtilis penetrat herbas & res molles: sed quando res duras offendit: sicut ferrum & aurum, dissoluit ea: ita q̄ eliquæ aurum

in marsupio & marsupium non adurit: & dissolvit ferrum in manibus & homines non adurit: quod evenit: ex eo quod illa resistunt, hæc autem minime. Sit itaque in proposito sapius factum est quod spiritus aut humor (ut ostensum) materia patiens, redditus est conveniens febribus: non autem membrum, propter quod frequentius contingit hæctica post alios morborum. Interdum vero spiritus, aut humor non est conveniens subiectum, propter eorum subtilitatem & molliem, sed membrum durum solidum: & hoc quando causa fuerit quandoque fortis fulguri proportionata. Et quia talis rarius accidit, tardius evenit, ut fiat hæctica incipiendo. Impressio enim modica ita in humoribus & minor in spiritibus inducitur: propter quod in membris calor in calefacto esse: non autem in calefieri tantum: velut in spiritibus & huiusmodi. Amplius, quando fuerit materia summe disposita: non forte agens est in ipsam poterit imprimere: sed disposita reperitur quando ultime: ut cum tam naturalia quam innaturalia in calidum tendant & siccum. Nullus enim ab initio confestim captus est hæctica habentium humidum corporis habitum: febrium primo: sed & frigidum multominus. Quod autem agens occurrat fortis aliquando, iam visum. Quare sic hæctica fit primitus, & non alia. Propter quartum quidem dicendum, ad primum quod ipsi loquuntur quantum ad id quod accidit ut in pluribus in quibus maxime ars consilii. Hæctica vero incipiens advenit in his quæ rarius: ut ostensum. Volens enim, 2. crissum excusare se Gal. a datione signorum hæctice: ait ipsam fore omittendam, tum quoniam in aliis locis de his erat tractaturus: ut primo febrium. tum quoniam signa huius febris habebantur per signa illarum febrium præcedentium, cum ipsa sic rarius contingat. Aliquis autem dubitabit si hæctica incipiens raro occurrit: cum de his quæ sunt raro non sit scientia: verum de his quæ sunt semper aut ut in pluribus. phy. 2. quomodo erit scientia de ipsa posita superius dicendo quod raro potest evenire: & tunc per se sine alijs febribus præcedentibus sit. Dicendum ut apparet in prædicto, & 6. etiam meta. quod scientia non tollitur ab ali quo ex eo quod sit de eis quæ sunt raro: dummodo illud raro causas habeat determinatas: sicut conjunctio Saturni & Iovis in primo ætatis minuto raro cotingit, quia circa finem mille annorum. Corpus etiam temperatissimum de bona habitudine in longorum occurrit temporum periodis, & tamen de ipso est scientia: ut de eius causis & signis, habet. n. causas sufficientes essentiarum suarum, per quas potest aliquando poni inesse & significationes quibus discernit fortificata: & si aliquid raro eveniat dummodo

causas habeat per se determinatas ad aliud, raro de ipso poterit esse scientia. Ad aliud dicendum quod spiritus, & humor pluribus agentibus & febrem causantibus sunt materia disposita, quibusdam autem paucis non, ut declaratum prius. Ad confirmationem dicendum, quod ut apparet per Gal. non solum ex aere calefacto calefit aqua balnei, & inde parietes eius, verum aliquando primitus potest calefieri paries: deinde aqua & tandem aer. & interdum primo calefiunt humores qui spiritus calefaciant, & tandem membra. Aut membra prius spiritibus inflammabuntur. secundum enim quod fuerint causa agens materiam sibi coaptat: cum quodlibet non agat in quodlibet: sed in sibi determinatum. Ad aliud dicendum, quod calor primitus potest in cor insigi ex aliqua grandi causa, quæ quasi immediatius usque in cor penetrat, & ita erit febris, & tunc ille calor deportabitur mediante spiritu & sanguine per totum corpus, non tamen calor erit in eis in calefacto esse quod est febris, cum sit morbus & hic mutationem dicat stabilem in hoc differens ab accidente. differentia 73. sed non in calefieri quod motum denominat ad calefactum esse. Febrium, enim principio cum sit aliqua febris: puta ephemera seu putrida hæctica, una istarum causatur in esse per suum subiectum in calefacto esse, subiecta vero alia non sunt in calefacto esse, sed in calefieri solum, licet nanque in qualibet febrium totum corpus inflammetur, quia tamen non est in calefacto esse, verum in calefieri magis: ideo non sunt aliæ necessariæ febres una existente. Et hanc quidem rationem dissolvere nesciuerunt ponentes spiritum aut humorem minime inflammari, cum hæctica advenit incipiendo dicentes caliditatem nullo modo in spiritibus aut humoribus esse, occultetur tamen propter caliditatem grandem membrorum cum hæctice calor sit intensior calore tertianæ. primo secunda: & quarto de anima. Caliditas enim maior ad se minorem contrahit & extinguit. Motus enim maior minorem depellit & occultat. differentia 90. Ad aliud dicendum, quod per alium modum fit febris quartana et per alium hæcticam, nam quartana fit ex materia frigida & sic putrefactione, quæ omnibus ineptior est ad putrefactionem, cum putredo per calidum fiat & humidum. unde & quidam ob hoc negaverunt quartanam fieri a melancholia naturali. quarto prima. Hæctica vero febris fit ex inflammatione simplici, humiditates vero & maxime primæ cum sint unctuosæ: aptiores sunt ad inflammationem, quam melancholia ad putrefactionem. Et ideo non minus potest accidere hæctica incipiendo quæ quartana. Adhuc grossior fortassis est melancholia, quam pri-

ma humiditates. Ad aliud dicendum, qd hectica magis uidetur hoc nomen sibi acquiuit. se ex suo processu & fine, quam ex eius principio: tunc enim est in sua dispositione cum ipsa sit facilis curationis. Aut dicitur hectica (utrum) ratione compactionis subiecti: cui quidem in iungitur ut humiditatis uel membri. Ad argumentum etiam quoddam alterius partis dicendum qd licet aliquid ut accidens sequatur alios morbos: dum tamen stat & figitur essentialiter operationes laedens: ipsum idem morbus efficitur: ut hectica ex phthisi causata. Et dolor etiam capitis quando fuerit permansiuus. differentia 74. ostensum &c.

Questio VII.

Quod febris pestilentialis sub ephemera reponatur ostenditur: quia aer corruptus perueniens ad cor spiritus complexionem contumipit. quarto prima. sed ephemera fit in spiritibus. Adhuc febris est passio cordis propria. Erit itaque principalior partis eius. Sed hoc est spiritus, qua ipse est radix. Corpus autem cordis est ramus. tertio 11. Ephemera uero dicta est in spiritu fieri: igitur hanc ad ephemeram reducitur. Amplius uidetur hectica magis: quia statim A. post hectica de ipsa negotiatur: quorum autem fit determinatio unius post aliud immediatius, uidentur ad eandem rem pertinere, ut ordo seruetur rei & disciplina. Idem ille febres uidentur esse sub eodem genere: quae eadem curantur cura: cum ad essentiam morbi, causarum & accidentium ordinetur illa. Sed cura eadem uidetur curari hanc febris cum hectica unde Almanforis. 10. Regendi sunt febrientes ex pestilentia ex omnibus, quae in capitulo de hectica diximus. Rursus in hectica non iniungitur abstinencia: neque in ista: imo magis incitantur laborantes ut comedant: cum plures eorum nihil sumere gliscant. Almanfor unde A. Necessse est ut restaurent ipsos supra cibum. Cumque appetitus ipsorum cadit restaurentur ad comestione. nam plurimi eorum qui uiriliter agunt super illud & comedunt uiolenter absoluuntur & uiuunt. Palin. ipsa etiam fit in humiditatibus: sed febris pestilentialis putrefacit quod de humiditate circumdat cor. A. Itaque febres pestilenciales sub hecticarum genere collocantur. Rursus uidetur putrida: quoniam ex putrefactione accidit. aer enim putrefactus humores putrefacit aptiores ceteris quae sunt corporis putrefactioni, quia calidi sunt magis & humidiores. Eri. dicunt ipsam aduenire corporibus humores habentibus paratos putrefactioni, unusquisque enim incurrit agitudine cur erat expositus magis, cum potissima particula ge-

nerationis agitudine sit passuri corporis preparatio februm primo. Erit igitur sub genere putridae locanda.

Oppositum uero huius monstratur: quonia febris putrida est humoralis: hanc uero non est humoralis. unde Isaac februm 5. Plurimi patiuntur pessimos morbos de genere pestilentiali, & febres non de genere humorum. Palin. in febre putrida pulsus & urina alterantur uehementi alteratione: sed in hac minime. Quare quarto prima. Non alteratur pulsus & aqua magna alteratione. Et quandoque est urina in febribus pestilentialibus bona & naturalis in sui substantia & colore & sedimine: & ille cuius est tendit ad mortem: quarti secunda. Eri. A. alium ei constituit tractatum & reliquis februm discretum. Non igitur ipsa erit putrida: sed nec ephemera uel hectica.

Propter primum quidem primitus sciendum quot & quae sunt genera februm 2. quot & quae sunt causae pestilentiae: quidque ipsa & morbus ipsius ostendatur. Primum autem huius omne differentia innotuit 87. Propter secundum huius sciendum, quod cum febris pestilentialis plurimi sit nocuenti pernicietique illatiua: & hoc actione quadam existat: causa ipsius erunt tres, aut quatuor, quae in cuiuslibet naturali experientur actione: fortitudo uidelicet, agentis, dispositio patientis: contactus & mora. Oportet enim in tali actione corruptiua huiusmodi febrem patientis etiam fore dispositum ut in aliis euenit actionibus: cum agentium actus in materiam concidant dispositam 2. de anima. unde primo februm. Nulla causarum sine patientis aptitudine agere aptata est. Propter quod 4. prima. Agens solum cum peruenit & non sit patienti preparatio: non accidit actio & passio. Et ideo prima proble. ait hanc febrem omnibus pestilentiam inferre. Quicumque prae habentes praexistente. Qui enim bonos habuerunt humores, resistunt eorum temperie & uigore aeris corruptioni: quare in problem. etiam Arist. quibusdam ascriptis. Quibuscunque sortiti sunt secundum ipsam generationem ab astrorum impressione quod sunt breuis uitae, uelocius redarguentur, & confumentur pestilentia concitati. Ut enim domus antiqua & imbecillis celerius uento concidit uehementi, quam fortis & noua: sic & hi pestilentia. unde Haly. Non infirmantur omnes homines apud mutationem substantiae aeris: nam corpus cuius chimus non est preparatus euitat aerem, & resoluit eum antequam alteretur ab eo. quare Alexander in proble. Propter quid in pestilentiali constitutione hi quidem moriuntur: hi uero minime. Causam quidem assignat ex complexionis preparatione. Si enim fueritque plenus

plenus chochimia: manifestum q̄ inspiratus putrescibilis aer hunc corrumpit, si uero euchi-
mus nihil aut parum ipsum pestilentialis aer
lædit. Voluit etiam Zoar epidimiam accidere:
quando Deus illam mandat quod præsentis
non est speculationis. Corpora uero huic febrī
proprie maxime disposita sunt quæ plurimo
coitūsa, latorum pororum, humida, multæ
balneationis, & uniuersaliter illa quæ qualitati
putrefactionis aeris sunt homogenea. Contra-
ria uero non læduntur, sed potius contempe-
rantur. Occurrit & hoc agens secundo forte.
Quando enim tale fuerit & in materiam agit
indispositam primitus illam disponendo: & de-
minuam formam inducendo; ut est guttam lapi-
dem contere 8. phy. & apho. complexionum
tertio cum interiorum primo: aer autem agens
est forte putrefactus tum propter ipsius ad nos
immediationem, & inuitabilem ipsius neces-
sitatem. 9. de inge. tum etiam propter eius pu-
trescibilem pessimam qualitatem cum substan-
tia plurima enim huius aeris impressio ab agē-
te, ut declarabitur amplius uidetur quàm à ma-
teriæ dispositione dependere. Etiam tertio con-
tactus scilicet aeris undique intus immediatus
& exterius occurrentis qui in omni experitur
actione naturalis de gene. & corru. primo cum
quo interuenit & tēpus necessario. Quis enim
sic potest velociter manum ab igne actipissimō
separare, ut & caliditatem ipsius nō percipiat?
Neque etiam ignis sine prædictis causis poterit
vllatenus operari, quod tempus in huiusmodi
aeris impressione inerit proprie: cum talis ip-
sius simul putrescibilis impressio non de facili
possit separari ab eodem. Et hæc quidem cum
primis: secundo de causa, & primo secunda in
omni quæritur physica operatione. Agētes
quoque causæ cum patientibus his duobus sul-
citis mediis duplices sunt, uniuersales & remo-
tæ: & particulares propinquæ. Primæ quidem
sunt dispositiones præcedentes ex formis cœli
sine imaginibus facientibus esse necesse illud cu-
ius aduentus ignorata medico, scilicet inquan-
tum tales putrescere faciētes aerem & aquam.
Fiunt & putredines in terræ visceribus propter
causas à medico ignoratas quod ex luminariū
proprie contingit. eclipisibus, & coniunctione
planetarum & maxime Saturni & Martis cum
stellis fixis aut ipsorum adunatione in aliquo si-
gnorum humanorum, & proprie quando præ-
ualuerint in domo uitæ in aliqua coniunctione
maiorum vel aspectu aut reuolutione anni mū-
dani inducentibus prauas temporum constitu-
tiones permutatorum essentiis & naturis. Cau-
sæ uero particulares & propinquæ sunt corru-
ptiones hic sensibiles in aere deprope existen-
tes uel uentis & maxime australibus ex longin-
quis partibus adductæ, sicut evenit in apertio-

ne canernarum, & puteorum diutius conclu-
sorum. Aut propter ineuentationem & con-
strictionem aeris inter parietes & tecta cum im-
mobilis reddatur, uel propter lacunas putri-
das & stagna: & res ut linū in illa immisissas: uel
propter uegetabilia: sicut caules, eruca lactici-
nia acuta & uiscosa. Aut propter baratra uene-
nosam auram expirantia, sicut circa Sardos &
Ierapolim: aut riuum magnam ciuitatem ex-
purgantem uel exercitu multotum perturba-
tum. Et propter arbores malarum comple-
xionum, ut sohac & taxum: nuces: ficus: odo-
res putridos & priuationem ventorum laudabi-
lium, aut propter stercora, & animalium cada-
uera, uel hominum copora occisorum in præ-
lio intumulata, siue incombusta. Nam forsi-
tan ex ethiopia secundum continuitatem influ-
xerunt quædam putrida inquinamenta Athe-
nienſibus habentibus apta corpora lædi ab ipsis
futura causa febris: febrium primo. Est etiam
& modus quis pestilentia quasi mediatus. mor-
talitas enim corrumpit arbores & uegetabilia,
& hæc corrumpunt animalia quæ ea comedunt:
& propterea homines qui eis uescuntur, cor-
rumpuntur. primo secunda. Fit quoque secun-
dum Democritum quando famem sequitur
abundantia, Et propter languida tritica: her-
bas & uarios cibos quando fame hos sumpse-
rint coacti: ut etiam Zoar de pestilentia reci-
tat marochiana. Quando autem pestilentia
ex inferioribus fuerit, iubent medici superio-
ra & lata quærere aeris. Quando uero ex su-
perioribus, inferiora conclusa. Neque miran-
dum est aerem putrefieri, cum ipse fumis ter-
restribus uaporibus permisceatur aquosis, ra-
dijs etiam superiorum permiscētibz ista, neq;
enim permanet in sui simplicitate, tunc enim
non putrefieret cum nullū nudorum simpliciū
possit putrefieri, & ideo cum ignis, inter cætera
elementorum simplicior existēs permaneat, pu-
trescit, minime unde meteo. 4. Omnia alia pu-
trescunt excepto igne, etenim terra, aqua, & aer
putrescunt. Deinceps quidem considerandum
quid sit pestilentia. Et quia est mutatio quædā
facta in aere: primitus sciendum, q̄ mutatio
duplex est ipsius. Vna quidem in eius qualita-
tibus, & altera in eius substantia magis. Muta-
tio tamen in substantia nunquam potest sine mu-
tatione in qualitatibus perfici, cū qualitate om-
nis fiat actio, non tamen e contra. Mutatio quæ
secundū qualitatem est q̄n aer secundum cali-
ditatem & frigiditatem maxime ad dispositionem
peruenit intolerabilem, adeo ut inde messes & ge-
neratio corrumpantur & uita, quod dupliciter
evenit: q̄m aut est symbola mutatio, sicut rabio-
sitas æstatis in calore, & hyemis in frigore, uel
e contra cōuersio, ut malicia frigoris in æstate: &
caliditas hyeme. Et similiter quoquo modo in

aliis qualitatibus. Quando enim aer permutatur intantum, & corpora similiter peruertuntur disponuntur enim similiter tempore probe. prima. Mutatio quidem aeris ipsius in substantia est, ut hæc ad malitiam conuertatur, nõ quod aliqua suarum qualitatuum ualde fortior fuerit facta augmento aut diminutione, licet non sine earum mutatione contingat, & hæc dicitur pestilentia 3. theori. quæ est mutatio aeris in corruptionem & putredinem propter egressionem a temperamento in eius substantia & qualitate. Secundum uero A. pestilentia est putrefactio quæ accidit aeri: similis putrefactioni aquæ remollescentis foetidae. Ingrossatur enim & remollitur uelut aqua quando quis immiscet linum aut canapum uel talia in illam. Ut autem appareat consequenter quid sit morbus pestilentialis sciendum, quod morbus est duplex. Quidam nanque particularis, idest particulariter & diuissim sparsus: sicut qui in eodem tempore & ciuitate differenter hominibus contingit, ut aliis quartana uel tertiana, nonnullis uero phrenitis &c. Est & alius communis, qui etiã duplex, quia quidam est consuetus & cognitus: & dicitur endemicus, seu endimialis quasi ab intras eueniens, & est contingens ratione loci, puta propter aquam uel uentum uel terræ fundum: seu in quibusdam ciuitatibus nephritis abundat, in alijs botium, quod apud Arabes nunquam uel raro est repertum, in quibusdam uena medeni uel ciuiliis sæpe, quam Gal. nunquam uidit interio. 6. & de tali morbo agitur in libro de aere & aqua. Est & alter epidimialis, idest super uel extra eueniens ad differentiam illius qui consurgit ex loco. Solet etiam epidimia, idest superuentus pro pestilentia sumi, & si generatior & existat ipsa. Est autem secundum Haly. morbus pestilentialis multiplex & subditus: uno eodem quod tempore hominum multitudini communis. Multiplicem quoque dixi: ut ostenderem varietatem huius morbi, pestilentialis enim sola agitudinum communis est omnibus probe. prima. Quoniam quædam est pestilentia ex qua febres adueniunt continue: interdum carbunculi, & aliquando dissenteria, uariolæ, morbilli aliquotiens, & alia sicut in libris epidemiarum ostenditur. Dicitur autem subditus ad differentiam morbi endemicus: qui paulatim euenit ex impressione illorum quæ in loco existunt illo. Reliquum autem quod in descriptione subiungitur ad differentiam dictum est morbi proprii. Non enim euenit eodem tempore idem plurimis morbis, sed differens magis: cum ex indebita sex rerum administratione contingat in qua differenter diuersimode peccant. Contingit autem pestilentia & aeris putrefactio secundum plurimum in postremo ætatis, & in autumno. Almanfor & A. Sed circa præfata

hæsitatur, quia dictum est pestilentiam fieri ex putrefactione aeris maxime, quod nõ uidetur, quia 25. proble. quæritur, quare aqua & terra putrescit. Cuius causa assignatur, quia omne calidissimum fit impuridum. Infrigidari enim oportet primum. Ignis autem calidus semper Auer. uero igne plenus. In contrarium dictum est omnia putrescere excepto igne. Ex enim terra & aqua & aer putrescunt, quod & medici testantur cuncti. Dicendum quod aer purus non putrescit: neque ipse prout igni commistus. Vehementer enim calidum a putrefactione præseruat, putrescit autem alius ut impermixtus & infrigidatus.

Propter secundum quidem sciendum quosdam uoluisse hanc febrem ad genus ephemeræ reducere. Quorum motuum cum antedictis fuit: quoniam quædam pestilentia aeris euenit propter simplicem qualitatem sine putrefactione ipsius. Quæ quidem quia cum spiritibus conuenit, qui similiter calidi sunt & sicci, & agritudine promptius contingit in genere proportionali, concludunt huiusmodi febrem de genere febris dici. Sed ista positio stare non potest. Extraneum enim est multum ut hæc febris ponatur ephemera, cum nullam aut modicam ualde convenientiam secum habeat, quod ostenditur, quia febris ephemera in uno sæpe aut plus & rarius in quatuor terminatur diebus, hæc autem ad plures extenditur dies, secundum dispositionem patientis, & fortitudinem agentis. Adhuc ephemera salubris est de se, pestilentialis uero febris plurimum mortifera. Unde Isaac ex hac ait febre saluari rarissimos. Et A. secundum plurimum perdens quod innuitur apho. 2. plures crises sunt ad salutem quam ad mortem, nisi morbus pestilentialis fuerit. Sic igitur propter hæc & alia plurima, ut etiam ostendetur, quibus hæc febris omnino discrepat ab ephemeris, non est dicendum sub illa ipsam locari. Motuum etiam non ualet illorum, imo dupliciter deficit. primo quia ut ostensum est, mutatio aeris in qualitate etiam existente pestilentialis non reputatur proprie, nisi conuersionem causet in substantia. Secundo quia dispositio aeris calida uehementer & sicca, non sic inducit ephemeram, sed potius putridam uel hecticam. unde quarti prima. Febres accidentales causa aeris sicci sunt causa ut febres ueniant cholerica: multo igitur magis fieret quando est caliditas aut cum ipsa in aere siccitas coniuncta hecticæ & non ephemeræ. quod autem non ephemeræ, sed hecticæ, euenit quia spiritus subiecti subtiliter tantum motum aeris non potest sustinere, unde fit transitus ad humores, qui subiecta compactiora & tolerabilia existunt, differentia præcedente. Alij uero uoluerunt ipsam ad genus hecticarum reducere moti antedictis przargu-

præarguis. Et hoc quia sicut in hectica inueniuntur dispositiones laborantibus quasi insensibiles tepidæ, sic & in ista. Adhuc uidetur & hæc in oculis intimis profundari, ut hectica, propter quæ uoluerunt ad illam reducere. Sed hoc etiam satis est longæ quæ ad hecticam adducatur, quod ex grandi inter eas ostenditur diuersitate, quoniam in hac præcipitur euacuatio & purgatio, in hectica uero minime. Et terminatur crisi, non autem hectica, propter quod femotius reducit ad ipsam. Neque etiam motiua ipsorum ualent, quia dispositiones in eis non sunt æquales ut in hectica: sed permittantur diuersis mutationibus. Percipitur enim aliquæ ex ipsa caliditas & inflammatio fortis: & quandoque frigiditas & proprie in extremis & exterius. Et ad summum calent interius, & infri-gidantur exterius: quod hæcticis non fit. Amplius posito quod fundetur interius ut hectica, non tamen expanditur exterius ut ipsa: neque in membris est: sed in humoribus ut ostendetur. Propter tertium uero sciendum, quod ipsa simplicius ad febrem reducit putridam. Modum autem reductionis ipsius. A. cum Ari. proble. prima tetigit dicens: aer putrefit propter expulsionem & sparsionem fumorum in ipso, qui quidem putrefactus ad cor peruenit, quare corrumpit complexionem spiritus qui est in ipso, & putrefit quod circumdat ipsum de humiditate & accidit caliditas a natura egressa, & spargitur in corpore; & sic inde confurgit febris pestilentialis, quod ostenditur febrium primo, quia uero pestilentiosarum meminimus febrium a putredine omnium fientium &c. sic ergo uult eas a putredine fieri. Quod & monstratur ratione sumpta quidem a priori, quoniam febris putrida dicitur, eo quod ex putredine confurgit: sed talis est pestilentialis, quod ostenditur per plurima consideranti: quæ Gal. testatur de ipsa cum aliis. unde primo febrium. Febris pestilentialis fit propter humores aptos ad putredinem existentes, quando occasionem quandam breuiem a continente acceperit animal, quam multum autem ex respiratione incipit, eo qui in circuitu est aere a putrida euaporatione conterminato. Principium autem putredinis &c. Subdit etiam quod corpora copulata aeri in quo pestilentia consistunt semina superfluitatibus plena, præparata sunt iam & per se putrescent. Adhuc tertia aphorismorum, & primo febrium, recitatur dispositio quædam pestilentialis in principio principiantis secundæ epidemiarum posita ita. Carbunculi in cratone & reliqua. Quorum quidem causa erat ut ibi ostenditur putredo. Dictum est etiam per A. hanc febrem putrefacere humiditatem cordis. In hanc etiam concludit Isaac sententiam. Rursus febris putrida euacuat ex re magis calida

& humida, cum hæc sit putredinis causa. Quæcunque enim calida sunt & humida putrescunt prompte, tales sunt humores & aer, sunt enim calidi & humidi aliorum corporis respectu, non autem sic spiritus & membra. Amplius, cuius significationes sunt febris putrida, ipsa que putrida nominatur, quoniam significationes in cognitionem essentia nos deducunt morbi, & proprie cum a substantialiter inhzrentibus fuerint sumptæ. huiusmodi autem significationes sunt in ipsa posita. In ea nanque adest caliditas inordinata, siccitas linguæ, sitis uehemens, anhelitus angustia, eiusque fœtor, inquietudo, nausea, dolor oris stomachi, casus uirtutis, syn-copis, rationis permittio, pulsus diuersus, frequens, paruus, & quandoque uehemens, sudor frigidus, frigus extremitatum, spasmus, & alchuzez, nomitus cholera, solutiones, uentositates, & talia. Quæ quidem aliis non adfunt sic febrium aliarum generibus, nisi putridis. Itidem illa est febris putrida, seu ad illam conducitur, cui procuratio extrat ut putrida. Talis autem est hæc. præcipitur nanque in ipsa phlebotomia & purgatio putredinis: alteratio & ipsius exiccatio & educio: & talia quæ in febribus obseruanda sunt putridis. Ex quibus concluditur hanc febrem propriissime sub putridis locari, si igitur quis assimilatione quadam conatur ipsam febrem ad hecticam reducere: & proprie ad ephemeram: hæc erit extranea & improporcionata ualde. Non autem locatur in tractatu cum aliis putridis, quia non ex determinata, ut alia contingit, materia; uerum potius ex omni. Quod si quis opponat hanc pertractationem simpliciter fore impertinentem: cum hæc febris ex formis tandem contingit, ut dictum est superiorum: quibus cum sint necessarii. Aliquis hic non poterit resistere. Quæ ergo necessitas hæc in medicina pertractari. Rursus hoc supposito quod ex superis eueniat aspectibus, uidelicet eclipsis, ac coniunctione stellarum & diuersitate in his circuli signorum, non poterit quis nisi astrologus intelligere & obseruare. Quid igitur ad medicum? Ad primum quidem dicendam, quod licet motus, & esse superiorum non possit impediri: cum sit necessarius, neque enim in fortunas possumus excoelo depellere, ualemus tamen ipsorum impressiones auertere materiam indispositam reddendam cum dictum sit. Actus actiuorum fore in fuscipiente disposito receptibiles. Et ideo in centiloquio astrologus optimus multum malum prohibere poterit: quod secundum stellas estuenturum: præmuniendo taliter suscepturum: ut cum illud adueniat, modicum aut nihil ipsum afficiat: si nanque astra cum orbe miferam addueant hyeme quandam frigiditatem, illam præscientia muniti ualemus euicare. Ad aliud

aliud multipliciter, dicendum: quia licet non agnoscamus materiam & dispositionem superum: scimus tamen ut medici corpora disposita ægritudinibus pestilentialibus: quæ rectificare possumus, ut & indisposita reddantur illis, quo actio, non accidit superum impressio. Vel licet non cognoscamus per causas superiores pestilentiam futuram, noscimus tamen per causas medias, & signa, puta per dispositionem aeris nos continentis, quam Gal. prognosticorum primo, per cœleste quoddam, seu diuinum signum intelligit. In qua signa pestilentie declarantur satis aduentu ipsius. prima. quarti. Aut & medicus habet hoc præscire scientia astronomie quam in se debet habere, cum astronomia non modicum quid conferat medicinæ. Vnde de aere & aqua. Qui uero ea quæ de re altissima tractauimus rata tenent, & credunt, nouerint astronomiam medicinæ non minimam partem esse. Quod asserit Albumasar introductorii primo: ut differentia ostensum prima. Propter quartum uero, ad primum dicendum quod licet aer putridus perueniens ad cor corrumpat cordis complexionem, non tamen spiritum putrefacit. Spiritus enim non proprie putrescit: cum sit calidus & siccus, subtilis & in motu plurimo, sed inflammatur & resoluatur magis. Aut talis spiritus complexionis corruptio non est in facto esse, sed in fieri potius. Febris autem dicitur esse per id quod est in facto, esse non in fieri, ut in calfacto fore, non in caleferi. differentia prior. Ad aliud dicendum, quod febris quæ est in spiritum, est in insuienti, non autem in innato complantato, qui pars est cordis principalior, radix, & uelut forma, & factor. In vigore namque ipsius uirtus informatiua cor produxit, cum sperma uirile quasi totaliter in spiritum dissoluatur, differentia 36. Sic igitur spiritus fere hincinde suscipitur. Ad aliud dicendum, quod non est hectica, & si detrimetur posteam ab A. quia ipsam pertrahat Gal. post ephemeræ & ante hecticas. Et Almanfor post febris apostematam. Isaac autem magis locat ipsam cum putridis, unde non arguit. Causa quoque huius diuersitatis potuit esse, quia hæc febris non est adeo uere putrida, ut cholericæ uel phlegmaticæ. Quod apparet ex accidentium ipsius etiam ad putridas diffinitate quadam, similiter uidetur in causa fore diuersitas, eo quod aliæ febres putridæ magis sunt ex dispositione humorum ad putredinem aptorum, quam ex fortitudine agentis: hæc uero contra. Quod inquit Isaac intelligēs perfecte quādo dixit febrem fieri de pestilentiali genere, & non de humorum genere: non quod in huius putrefactis non fiat. Sed quod maior causa inexistit in aeris putrefactione, ipsos prius ad hanc habilitatem quam ex uicio humoris proprio, ut in

aliis putridarum. Adhuc cum cæteræ febrium sint essentialiter cordis passionēs, hæc quidem magis cōcomitatur ipsum & affligit. Aer enim putrefactus immediatius ad cor perueniens, quæ sunt in ipso corrumpit, & putrefacit humida: ut fere uelut in aliis causa antecedens non reducatur sub coniuncta, unde quasi causa primitiua immediate se transferat in cōiunctam, quod tamen non audeo simpliciter explicare. Et fortassis hæc est causa quare non expresserunt medici sub quo genere febrium locaretur pestilentia simpliciter præcise. Ad aliud dicendum, quod licet per eadem curetur, & non tamen sunt illa plura eadem: sed pauciora magis (ut ostensum) & minora. Mox etiam Almanfor excipit balneum: aquam calidam & lac, omnis quoque febris in eo, quod febris cum sit mala complexio calida & sicca eadem participat cura. Fuit etiam Almanfor breuis sermone; ut uno non solum eodem uel simili det alterum intelligere: immo more Hippo. suo contrario. Ad aliud dicendum quod ista est una similitudo laræ. Et etiam quod in febre hac non prohibetur abstinencia in quantum est putrida: sed propter causam appetitus qui eis associatur frequenter & similiter, ut bonitate ciborum & potuum refectatur aeris malignitati: sed in hectica non iniungitur abstinencia propter nimiam corporis, & febrilis caloris exiccationem, cum eius caliditas sit tertianæ secundum A. caliditate acutior. Sic igitur non prohibetur eadem minime abstinere de causa. Ad aliud dicendum, quod per humiditatem A. intellexit humorem primum, & non secundum, sunt enim duplices humores primi, uidelicet, & secundi noti: ut sanguis, phlegma, cholera & melancholia. Et secundi dicti humiditates, ut quæ est in extremitatibus paruarum uenarum: ros cambium & gluten, differentia 33. Concedendum itaque quod propriissime aliarum sit putrida. Ad ea etiam quæ alterius partim iam apparet. Expōsitū est enim sermo Isaac. Ad aliud dicendum quod hoc est quasi propriū præ aliis ægritudinibus huic passioni, ut ipsa uehementius ut ostensum quā alie febres inhzreat cordi: ut & nocuentum suscipiatur in corde & non sic in hepate & aliis cæteris suo modo. Propter quod urina naturalis uidetur existere similiter & pulsus cum fuerit ita natura perterrita & succumbens, ut & nullo attentet insurgere contra morbum modo: sed conuerteret se ut corpus gubernet uelut in salutem. Quo circa & urina in morbo etiam diutius sic permanens indicatur in aphorismis morali a Damasceno.

continuum omnino, monstratur: per Galapho. quarta ita. Febres continuæ & periculosa accidunt; aut propter prauam morigerationem putrefactionis; uel propter intrinsecum apostemata. Amplius, si aliqua apostemata intrinseca febrem causarent interpolatam: hæc splenis essent: & renum: cum huiusmodi membra minus sint sensitiua: minoremque colligationem cum corde habentia. Propter quod plures medicorum asserunt hæc; febres interpolatas causare: sed apostemata membrorum huiusmodi febres inducunt continuas; quod monstratur, quoniam splen est membrum carnosum: arteriosum: ex sanguine nanque arteriali subtilitritur, quarto de utilitate particularium. Est etiam rarum multæ materiæ comprehensum: quod autem huiusmodi, quarto: prima ad febres: præparatum continuas. Renes similiter membra existunt carnosæ, calida, arteriis & uenis patentibus non parum coniuncta: quæ febrium continuarum videntur denotare aduentum ibidem. Rursus cuius causa est continua, & effectus ab eadem continuitatem suscipit: quoniam causa & effectus sunt proportionales. Sed apostemate existente, sanies inducitur continua, quæ febris causa per se & coniuncta ponitur cum suo effectu conuersiuo. Idem in apostemate morborum tria genera (ut videbitur) continentur. Quæ quidem tum propter se, tum propter accidentia ipsos concomitantia, naturam humanam febrim appropriatam tanquam in ægritudinem sibi propriam deducunt. Apostema itaque intrinsecum febrem causabit continuam.

Cōtrarium quoque huius ostenditur apho. prima ita. Quia splene male se habente paroxismi: & uniuersaliter melancholici per quartum febricitant. Amplius in diuisionibus, apostema in renibus sequuntur. In principio sui febres permixtæ habentes paroxysmum cum horripilatione: tales autem sunt interpolatæ. Adhuc quinto practica. Diuersificatur lethargus siue sursen frigidum propter febrem adesse & non adesse. Idem tertio prima ponitur melancholia fieri propter apostema meseraicarum: in quo secundum plurimum non est caliditas, febris, aut sitis. Quarto etiam prima. Membra quæ sunt longinqua à corde debilem communatatem cum eo habentia uelut renes non semper propter apostemata febres inducunt, & continuas immo multotiens interpolatas de genere commissarum existentes: & febrium tertianarum, quartanarum, quintanarum, & sextanarum. Rursus differentia febris interpolatæ est ad continuam: quoniam interpolata causatur ex materia extra uasa contenta, continua uero ex intra. Materia uero apostematis extra uasa continetur ut innuit Gal. de ge. apo

stematis in quam plurimis. Adhuc motus est de extremo in extremum per medium. physicorum quinto & quinto de innamentis. Sed quædam apostemata intrinseca qualia diaphragmatis, & stomachi, & uniuersaliter substantiæ panniculosa: uelut apparet primo prognosticorum febres inducunt continuas. Quædam uero febres non adducunt: unde tertio 14. In apostematibus hepatis frigidis non est febris, neque sitis, neque calor. Similiter & in duris splenis. Cum igitur fiat motus de non habere febrem continuam, in habere, aut econuerso motus per medium constituitur. hoc autem medium non uidetur nisi febris interpolata. Quare febris interpolata interdum ab intrinsecis apostematibus causabitur.

Propter primum quidem sciendum, quod apostema est tumor siue grossities præter naturam permutans membrum à sua naturali dispositione in eam quæ extra naturam ex materiæ coëctione uel reumate generatur quarto de accidenti, & 13. de inge. Hæc autem non est uera ratio apostematis: sed potius quædam eius notificatio communis: nam tumor præter naturam est accidens consequens apostemata calidum. Ioannitius. Vera siquidem ratio ipsius est morbus compositus ex triplici genere morbi. differentia 75. In ipso nanque concurrant tria morborum genera: ut mala complexio: praua compositio; & imparis solutio, ut declaratum primo secunda. Cuius quidem causæ uniuersaliores sunt sex. Vis membri uidelicet expulsiua superfluitatum ex superfluo alimenti in eodem accretas. Imbecillitas membri recipientis quod ad ipsum impellitur, materiæ superflua quantitas. Debilitas nutrientis uirtutis membri. Quando enim suum non ualeat alimentum elaborare: in superfluitates conuertitur illi nocentes. Meatum largitas, quibus superfluitates prompte decurrunt. Et sitis ipsius corporis inferior theori. 6. Ipsius quoque superflua quantitas est illius materiæ: ut humor quadruplex; aquositas & uentositas. Et adhuc huiusmodi quoddam à causa primitiua nota. Reliquum uero ab opposita. Cuius quidem generationis modus differentia tangetur subsequenti. Est etiam quoddam apostematum extrinsecum: quod sensibus subiaceret: ut tactui & uisui manifeste. hi enim circumscriptionem ipsius apprehendunt immediate. Intrinsecum autem aliud oppositum, ad quod non sic ex significationibus peruenitur à sensu acceptis deducto. Et ipsum quidem generatur aut in membris interioribus ubicunque: uelut in gutture, pulmone, capsula cordis, uentre cum mery, hepate, splene, intestinis, renibus, matrice & uesica, aut in panniculis ea circumdantibus uel regentibus: siue per longum, latum, uel profundum. Quid autem

autem febris, & acuta visum differentia. 87.

Propter secundum. vero sciendum qd aliqui indistincte posuerunt apostema intrinsecum febrem continuam causare simpliciter: aliqui vero interposita nō raro ut mōstrant arguta, sed quid de hoc, tertio videbitur dicendorum.

Propter tertium quidem sciendum quod ali quod apostema intrinsecum febrem potest in ducere interpolatam: Cuius quidem gratia no tandum primo ex parte materiæ, qd causa febris est duplex. una enim essentialis & prima: reliqua vero velut accidentalialis & secunda. Pri ma harum quoque quædam est mediata: puta antecedens dicta. quædam vero immediata: quæ proprie potest appellari causa coniuncta: eo qd convertitur & coniungitur cum morbo: qualis est fuligo putrida, seu fumus putridus horribilis subtilis à minera putredinis confur gens: febrium primo. locata in uasis, seu ex tra: dummodo continuatione eius cor petat. Et secundum qd continue aut successive ipsum expetet: febris generabitur continua uel inter polata: ut visum differentia 87. cum cæteris. Sed de causa ut accidentali iuuatiua & secun da, quædam attenditur ratione materie apo stematis: alia uero ex parte qualitatis partis in qua existit. Primo quidem modo diuersificatur multipliciter. Quoniam apostematū quædam sunt ex materia calida: puta ex sanguine & cho lera: & phlegmones appellantur ab inflamma tione dicta. quædam uero ex materia frigida, siue dura, molli, aquosa seu uentosa. prima si quidem sunt magis digna febrem continuam adducere cum maiorem homogeneitatem ha beant cum ea. Quæ enim sic sunt celeriores habent transitum secundum Ari. & A. unde primo secunda. Occultorum apostematū ca lida, demonstrat febris concomitans ea, quæ uero sunt frigida, tardius, & ideo febrem pos sunt causare interpolatam magis, quia fumus procedens ex minera putredinis resultans per se redditur insufficiens cordi continuari: im mo motus mineræ eius ex superiorum exagita tione præstolatur. differentia 88. qualis est motus melancholiæ per quartam: cholera per tertiam, & phlegmatis quotidie. Verum quia motus phlegmatis 18. horis laborantem fati gat, à quo uix mundificatur: propterea si ex phlegmate confurgat apostema intrinsecus, ad motum eius additur propter causas continua tis febris: in tantum qd & forte si febrem indi cant, figetur continua. Quod uidetur innui pri ma quarti. ponente apostemata renum causa re febres commistas ex febribus tertianæ: quar tanæ, quintanæ & sextanæ & non quotidianæ. Diuersificatur etiam materia ratione quantita tis multitudinis uidelicet & paucitatis: licet primordialiter hæc diuersitas ex qualitate con

surgit, sicut fere alia quæcunque: eo qd mate ria multa seu quantitate replens continuum & extendens & solutionem inducet inde maxi me. qd si in locis fuerint sensibilioribus, febrem causabit ut sic continuam. Cuius quidem op posita interpolatam poterit causare. Diuersi ficatur similiter natura apostematis in febrem continuam seu interpolatam: causando aut in nullam adducendo ratione dispositionis ma teriæ. Contingit namque cum materia aposte matis suppuretur, ita qd eius subtile effumer. grossum uero eius remaneat incineratum: uel febrem interpolatam causari, aut nullam, uel ut apparet in sclerotizationibus hepatis, sple nis & renum quandoque. Potest & id idem ra tione similiter uariari situationis materiæ: eo qd ipsa in locis vicinis cordi sita & maxime in his quæ grandem cum corde habent affinita tem febrem ut ita afferret continuam: reliqua uero interpolatam magis. Diuersificatur ite dem secundo febris ratione partis in qua con tiogit apostemata intrinsecum multipliciter: quoniam aut illa erit nervosa multæ sensibilita tis apta ex stimulatione reumatis propter do lorem spiritus inflammare: & ita febrem con tinuam inducere. Aut ex parte arteriarum mul tarum in membro existentium: per eas namque ad maiorem continuitatem habet ad cor. spiri tus etiam in eis & sanguis continentur feruen tiores. Adest et in eisdē pulsatio, quæ oīa atte statur caliditati, & generationi febris continua. Vel ex parte carnositatis: membra namque car nosa humidiora existunt porosiora & pluris materie contentiua. Aut similiter ratione ma gnitudinis membrorum, maiora etenim am pliorem suscipiunt materiam, & cordi magis supercommunicant: propter quod eorum in trinsecus apostemata febrem magis causabunt continuam. In reliquis quoque prædictis his dispositionibus oppositis: febris consurget in terpolata amplius. Adiunat etiam usus sexte rum non naturalium secundum contrarium, aut simile ita, uel aliter mensuratus, in con tinuatum seu interpolatarum generationem. In quibus quidem complexio, ætas, uirtus, tempus, & regio &c. talium sunt atten denda. Quæ quidem tum quia fumositate no tiora existunt. tum etiam breuitatis gratia non extendantur in amplius in præsentia. Ex his igitur breuiter uniuersalis demonstratio poterit colligi, uidelicet: quod apostemata intrinsecum febrem amplius causet conti nuam, & quod interpolatam quandoque. Ap parer itaque ex medicorum logiis deducendo quod apostemata intrinsecum febrem poterit interpolatam interdum inducere: ceu quando membrum fuerit frigidum ignobile, a mem bro nobili distans parum, neq; tamen illi ma nifeste

nifeste coniunctum, nullius, uel pauci sensus. Sitque materia eius frigidior, paucæve quantitatis. Per oppositum uero febris insurget continua, quod poterit syllogizari, & apparet. Noscet quod febris ex apostemate consurgens intrinseco non est ephemera, seu quidam æstimant, immo de genere putridarum. unde prima quæritur. Febres quæ sequuntur apostemata intrinseca, fortasse non fiunt ex applicatione caloris ad cor sine putredine, quæ applicatio ephemeram inducat. Hoc etiam apparet, quia exagitatione in huiusmodi febribus currit secundum motum humoris; ita quod adhuc litescente apostemate febris remanet quandoque putrida manifeste.

Propter quartum uero ad primum dicendum, quod apostema huiusmodi phlegmon est. Is autem cum inflammationem importet ex materia sanguinea & cholericæ generatum: febrem continuam inducet, non tamen propter hoc clauditur quod alia apostemata febrem non possint causare interpolatam, quæ secundum morem Gal. phlegmones non dicuntur: immo etiam apostemata calida sensum à membro remouentia quantumcumque fuerit sensibile, febre inducunt interpolatam: velut apostemata cancerata. tertio undecima. Ad aliud dicendum, non propter hoc semper fore necessarium febrem esse continuam, eo quod splen membrum est frigidum, pauci sensus, materię etiam frigide grossæ susceptuum imparate putrefieri. unde ex his materia minime reumatizat & putrefit. Quæ etiam sui grossitudine putrefacta, arterias non potest adeo ingredi, ut accessus eius continuetur, immo motum expetit ex humoris melancholici euentatione. Neque etiam arterię splenis directius respiciunt cor, cum non implantentur ei, sed explantentur magis. Similiter de renibus ut apparuit dicendum, quod illa continuatio cum corde est obliqua satis. propter quod de naturalibus secundo. contra Erasistratē, arterię renibus implantatæ proprie non implantantur, sed explantantur: non enim eis sunt directe suppositæ, uelut uena concaua hepatis, aut aorta cordi. Adhuc etiam carnositas eorum est compacta sensu priuata, non enim sentiunt nisi per panniculum. Neque in eorum substantia uena continetur aut arteria. dif-

ferentia 86. Propter quod apostema splenis, & renium poterit febres interpolatas interdum causare. Ad aliud dicendum, quod in apostemate non semper est sanies. Aut si est, non poterit cor petere, ut uidebitur aliquando. Ad aliud dicendum, quod tria huiusmodi læsionis genera, interdum læsionem ita modicam inducunt (ut declaratum ex suis causis) tam ex parte materię, quàm partis, & situ ipsius, quod febrem non continuam, sed interpolatam inducent.

Ad ea quæ alterius partis etiam dicendum, quod auctoritas Gal. & Rasis concedatur, ut uisum.

Ad ea uero quæ Halyab. dicendum quod in lethargo in principio quandoque non est febris: aut modica impercepta interdum ferè propter quantitatem materię ipsius & frigiditatem. Ad alia consequentia quid dicendum apparuit A.

Ad aliud dicendum, quod licet in apostematibus materia contineatur extra uenas, nihilominus tamen poterit febrem continuam inducere: eo quod fumus resolutus horribilis, acutus, à minera putredinis ualet continuè cor petere, qui positus est causa coniuncta febris & immediata efficiens. Minera uero aqua deciditur magis causa antecedens & materialis, & ita materia & efficiens non coincidunt in idem. differentia 160. Interdum uero sanies adeo est grossa, & cænu-lenta, quod ab ipsa fumus prædictus continuari non poterit cordi, sed euentatione humoris tandem cessante respirat. Neque etiam est simile de materia dispersa per totum corpus extra uenas faciente febrem interpolatam, & de collecta ad apostema licet ponatur ipsa etiam extra uenas existere, quoniam quando materia colligitur in apostemate, aggregatur eius uirtus magis, & ea unita fortior est seipsa dispersa de causis. Et ideo materia uenenosa plerumque existens per totum disseminata, quando in apostema concurrat intrinsecum perimit, remittendo uapores uenenosos ad cor. Vigoratur nanque ex eius congregatione. Et ex hac etiam cancer ægritudo appropriata malitiosior & incurabilius æstimatur lepra totum possidente. differentia 178. Quare materia disseminata per totum corpus extra uasa, interpolatam semper & nunquam continuam ut sic febrem inducet. Ad aliud reliquum etiam quid dicendum, uisum est.

A R N A L D I

de Villanova.

D E F E B R I B V S

L I B E R.



Caput I.



TRACTATVRI de febre, uidendum est Gal. super aphorif. febris nihil aliud est quàm calor naturalis in igneum mutatus. Vel sic secundum Isaac: febris est calor naturalis cursum naturæ supergrediens procedens à corde in arterias: suoque ledens effectu. Duplex enim in corporibus nostris est calor naturalis: unus, uidelicet, qui ab elementis innascitur quæ nostra corpora constituunt ut partes: & iste calor dicitur potentialis. Alius uero est in nostris corporibus calor naturalis qui actualis & sensibus nuncupatur: & iste innascitur a spiritibus & humoribus in corpore existentibus. Et cum iste calor naturalis actualis distemperatura vitali spiritu sit se. Febris igitur aut sit ex principali uitio: siue distemperantia spirituum & dicitur ephmera: aut principali distemperantia humorum & dicitur putrida: aut ex principali uitio seu distemperantia membrorum & hectica nuncupatur: de quibus omnibus prout melius potero tractare proposui. Hæc enim tria genera se. comparantur tribusque sunt in bal. aeri, uidelicet, aquæ & parietis. Aer enim balnei calorem citius suscipit & citius susceptum deponit quam aqua: & hæc assimilatur ephemeræ in spiritus citius inflammantur & uelocius & citius curatur si medicus fuerit sollicitus quàm aliæ. se. sicut inferius euidenter apparebit. A qua uero bal. putridæ assimilatur quæ cum maiori difficultate calefit quàm aer: & tardius infrigidatur. Similiter putrida cum maiori difficultate accidit & difficilior est eam curare quam ephemeram. paries uero bal. hecticæ assimilatur in qua membra consumuntur. Nam paries ipsius balnei est sicut hectica in qua membra consumuntur: ideo difficilior quàm prædictæ curatur. In unoquoque genere febrium est sciendū quod hic tria quandoque distinguuntur siue de-

stemperantur scilicet spiritus humor & membra secundū magis & minus: ut dicam inferius.

De ephmera. Cap. II.

Ephmera sicut dictum est superius est febris quæ sit ex principali uitio seu distemperantia spirituum & dicitur ephmera ad similitudinem cuiusdam piscis qui ephemeron dicitur: qui in mari nascitur. & non uiuit nisi per unum diem: eodem enim die quo nascitur moritur: simili modo feb. ephmera uix ultra unum diem extenditur. peccato uerbo medici uel infirmi interueniente: aut opilatione pororum nimia si usque ad tertium uel quartum diem durauerit: & per periodos currere incipit in putridam uel hectica conuertitur. Febris enim ephmera non dicitur habere nisi unum periodum: nec cum rigore seu horripilatione incipit corpus pa. cum tangitur non sentitur multum: nec pungens: nec mordicans calor apparet: uirginalium non multum distemperatur in calore uel in substantiam à naturali dispositionis urinæ. Ephmera autem aut est symptoma alterius morbi, ut bubonum, & apostematum aliorum calidorū: aut est morbus per se: & hoc pluribus de causis accidit: aut ex nimio labore ca. aere seu fri. ira, tristitia, angustia, sollicitudine, nimio studio: aut propter nimiam sessionem in aqua frigida: aut propter nimiam moram in bal. uel si bal. ex mala aqua factum fuerit: uel si ex malis lignis uenenose qualitatis balneum fuerit calefactum. aut propter medicinam calidam ab imperito medico datam: aut propter superfluam comestionem uel potionem uini fortis: uel propter nimium ieiunium: aut propter corizā: & reumatismum. Si igitur propter solis calorem superuenit alicui ephemeram pa. habet caput calidius reliquo corpore: & facies feruet & rubet: & quandoque rheuma calidum per nares & palatum descendit. Si uero ex calore aeris fuerit: corpus magis incenditur quàm caput: sitim magnam paritur: & desiderium attrahendi aerem frigidum

urina apparet semper colorata plus solito, & pulsus etiam mutatur, & post cibum grauius molestari solet: & si æger sudauerit alleviatur. In hoc enim ut dixi: differt ephemera à putrida: quia putrida in secunda afflictione fortius affligit quàm in prima, cum calor sit acutior per putredinis ebullitionem. In ephemera autem non est sic: quia ut dixi non currit per periodos. Secunda autem accessio ephemeræ nullam infert molestiam aut parvam, & raro transit ad aliam accessionem nisi forte in putridam uel hecticam mutetur ut dixi. Cum ergo ephemera fuerit propter calorem solis vel aerem calidum curetur hoc modo, in aqua bulliant mal. uiol. folia salicis, & uitis, rosæ, & huiusmodi, & ex ipsa aqua fomentetur caput eius ut sudet: postea manus & tempora & pedes ex prædicta aqua ca. lauentur & abstergantur bene cum panno lineo, deinde inungantur oleo ros. uel uiol. cum agresta & lacte mulieris. Item agresta succus cimarum rubi & oleum uiol. & ro. insimul. misce, & in huiusmodi liquore pannus lineus infusus tymporibus & fronti applicetur sepe & sepius. Item constituatur æger in domo frigida & fenestræ sint apertæ, ut uentus frigidus possit libere intrare, & si non fuerit domus naturaliter frigida fiat hoc artificialiter: ut per artem suppleamus defectum naturæ. Ars enim sicut dicit Aristot. imitatur naturam in quantum potest: accipiantur itaque ro. uel 15. spongiæ marinæ magnæ & infundantur in aceto & circumdantur circuncirca lectum pa. aqua currens naturaliter uel artificialiter distillans: uel saltem ante infirmum constituantur folia frigida rum arborum & herbarum per domum aspergantur: sicut sunt cymbalaria uermicularis, crassula, solatri, frondium cænarum pampini uitis, & rami salicis, rosæ uiol. & similia his artificiosa in frigidabitur domus. Et camphoram etiā odoret, etiam intrent bal. aquæ tepidæ & ibi suauiter & molliter fricentur cum manu præcipue in locis articulorum: deinde suauiter cum panno lineo abstergantur, & ex oleo ro. uel uiol. inungantur, & hoc fiat bis uel ter si fuerit opportunum. Syrupum & iulep qui solum sunt ex aqua & zucchero bibant, uel si nimium constipati fuerint syrupum uiol. bibant, & syrupum etiam ro. si non fuerint constipati plus debito, lactucas, portulacas assas, pruna damascenæ, scario. cichoream, cucur. assatas, farinam hordei amygdalas, micam panis prius lotâ in aqua 5. uel 6. uicibus addito pauco zucchero. Similiter succum granatorum bibant cum aqua: possunt etiâ uinum subtilissimum optime lymphatum bibere si ipsum appetunt, tamen in parua quantitate detur, tutius non dare quàm dare est, collocentur in loco molli: & dormiant plus solito: & emplastrum etiâ puocatiuum somni

quod in ca. de phrenesi dictum est fronti & tymporibus applicetur. Et si post hoc aliquod uestigiū laboris uel lassitudinis apparuerit ad baliterum ducatur, & omnia prædicta remedia fiant quousque pa. liberetur. Et si dispositio corporis pa. fuerit plethorica & sanguis ualde abundauerit fac phlōmiam uenæ basilicæ dextri brachij, & se cundū uirtutē ægrī sanguinē extrahas ne forte infirmus in synocham incidat, & hoc dico uiribus ætate complexionē & tēpore permittentibus consuetudine non contradicēte. Et si cholera nimium superabundauerit leniter & suauiter educatur cum decoct. in capitulo de dolore capitis ex cholera factō dicta ne æger in caufonfe. incidat, deinde suprascripto regimine regatur infirmus. Et si febrē huiusmodi patientes per interualla fuerint nimis constipati fiat eis clystere aliquod lenitiuum ut ex mal. mercuriali uio. & fursuribus additis cassiæ. oleo uiol. zuchæ. uiol. & similibus, aqua rosa. oleū uiol. uel ros. & acetum insimul misce: petia in tali liquore infusa frōti & tymporibus pa. applicetur, hoc enim modo curabitur ephemera propter calorem solis uel aeris calidi: uel propter dictā bullitionē per solem uel aerem calidū factā iterando prædicta remedia quousque pa. liberatus sit. Si uero aliquis ephemerā patiat, propterea quod usus est bal. naturaliter ca. indebite ut sulfureo aluminosa ferreo calcæreō & similibus. Et est propter bal. aqua artificialiter calidā quod scitur per manifestationē ipsius pa. tunc curetur hoc modo. Intret bal. aquæ tepidæ & ibi lauet & suauiter fricetur, deinde cū panno lineo abstergatur & cum supradictis oleis infuset: & epithimate isto frōs & tempora epithiment. Recip. sand. & al. & ru. ro. semin. portulacæ an. dra. s. spodii: gumi ar. draragati: an. drac. 2. terantur oīa & puluerizentur & cū aqua rosa. distēperentur uel de succo solatri: uel oleo ro. & succo cucu. & agresta insimul mistis idē facere poteris: detur syrupus ros. uel uiol. & iulep & nutriatur secundū superiorē doctrinā. Si uero qs hāc se. incurrat propter nimiam potationē uini fortis & puri: detur syrupus iulep & syrupus acetosus cū frigida & uomitus pronocetur uel cū uomitu patriarchæ Nicolai uel scarpellæ puocabis uomitū: & à uino oīno abstineat quousque liberatus sit. Superfluū uel aliquē riuū constituat pa. uel saltem in domo fiat aer artificialiter frigidus sicut supra dictum est. Camphorā odoret & huiusmodi frigida, & cū se. sedata fuerit ponatur in bal. aquæ tepidæ & ibi leniter fricetur cū manu, deinde abstergatur & inungatur ut supra dicta superius scripta tribuatur. Et parentur cibaria ipsius cum aceto & cum agresta aqua ros. & succo granatorum & similibus: poma etiam elixa comedat.

Quod si quis ephemeram pa. propter comestionem calorum ciborum solummodo cure-

tur sicut prædicta, uomitum prouocando & omnia per ordinem faciendo sicut nunc dictum est. Et cum se. parum sedata fuerit aqua hordei cum zucchero in bona quantitate in potu detur. Et quia hæc se. prædicta quæ sit ex vini fortis potatione multoties in putridam consuevit conuerti; propter hoc oportet medicum ualde esse sollicitum in cura earum. Si itaque isti patiantur capitis grauedinem, & oculorum extensio & rubedo superuenerit & uenarum plenitudo, etiam urina ruffa cum substantia spissa & oris dulcedo & alia signa sanguinis apparuerint, tunc extrahatur sanguis cum phlebotomia, & etiã cum uentosis, & clysteria mollificatiua & lenitiua fiant & soluantur ueter si fuerit opportunum cum deco. dicta in cap. de dolore capitis ex sanguine facto. Si uero quis ephemeram patiat ex fri. aere uel frigida aquæ introitu q. cognoscitur, quia color cutis mutatus est in plumbeum uel obscurum; pulsus est parvus & uelox, & urina rubea parum immutata, quandoque apparens alba aut plumbea, oculi & facies parum rument, caput graue & frigidum, cutis dura, durior tamen si sit propter bal. aquæ frigida. pa. etiam fatetur se læsum fuisse a frigido acre uel bal. uel infusione aquæ frigida. Cum itaque hæc febres his de causis ueniant curen- tur hoc modo intrat pa. stopham aquæ calidæ & ibi moram trahat quousque sudet, deinde leuiter fricetur & abstergatur corpus eius & inungatur ex oleo camo. & optime collocetur in lecto molli, & bene cooperiatur & sudet & dormiat ibi, & cibos subtilēs sumat & boni nutrimenti & boni sanguinis generatiuos & uinum forte & subtile in parua quantitate bibat & parum comedat, & dum quieuerit si post iterum aliquid de feb. remanserit ad bal. iterum ducatur & ad totum regimen dictū. Electuaria etiam calida ut diacyminum diacalamentum & huiusmodi cum fuerit incoualescentia dētur. Quod si ex ira hæc pal. fuerit oculi rubent & extra eminent & citomouētur, facies rubet, pulsus est magnus & fortis urina plus solito coloratur parū. Si uero ex tristitia uel angustia oculi cōcāuantur & quieti sunt totius corporis debilitas & pulsus debili- or est solito, & facies pallefcit uel citrinat pa- rum; & similiter mutatur urina etiam parum a suo colore naturali. Primo ergo mittan- tur isti tales in bal. aquæ tepidæ & oleo ro. uel uiō, leniter inungatur, post hoc aqua ros. super caput eorum infundatur. Epithimerur pectus eorum & supra caput & supra cor ap- ponatur hoc epithima. recip. sandali al. & ru- bei ro. an. drach. i. camphoræ drach. s. teran- tur & cum aqua ros. confice. Sympus iulep de- tur in potu cum succo granatorum acroso-

rum. Cibaria sua sint frigida & condita cum rebus frigidis sicut acetositate citri aceto & agrestas, & similia a uino & rebus calidis om- nino abstineant, quoniam hæc plus incende- rent & augmentarent ipsam febrem. Ita enim nil aliud est quàm accensio sanguinis circa cor: ut dicit Arist. cum itaque in ira fiat ebullitio sanguinis, & feruor circa cor si nos daremus res naturaliter ea, magis augmenta- remus feruorem & incendium: & sic se. ma- gis augmentaretur & incenderetur. Inten- dendum enim est cum frigidis supradictis: quando ex causis prædictis hæc se. uenit. In- ducatur etiam lætitia & cantus musicorum & instrumentorum coram pa. pulsentur & paren- teseius dent sibi solatium & gaudium. Et si propter amissionem pecuniz uel alterius rei hoc patitur, promittantur sibi similes res a parentibus & amicis. Quod si propter nimium ieiunium acciderit hæc pal. cognoscitur per cor- poris dispositionem maeram & siccam & oculo- rum concauitatem, pulsus debilem & uelo- cem & urina rubea quandoque apparet, & pa- tiens fatetur se nimium ieiunasse. Curatur hoc modo, pa. reficiatur cibis restauratiuis & poti- bus bal. electuariis & inunctionibus que in se- quenti ca. de hæctica sum dicturus.

Quod si aliquis ephemeram patiatur cau- sa multarum cogitationum uel multæ soli- tudinis: quod cognoscitur indicio pa. & etiam quia facies & totum corpus quando- que citrinatur, oculi concāuantur, palpebre graues & molles & ad mouendum tardus sit, & uultus tumidus, urina tenuis, pulsus par- uus, in bal. aquæ tepidæ immittatur & leui- ter abstergatur & unguatur secundum prædi- ctam doctrinam; deinde nutriatur ex cibis facilliter digerentibus & nutrientibus, & uinum optimum & nutritiuum parū lymphatū bibat, prouocetur somnus in eo cum emplastro quod in cap. de phrenesi dictam. In domo frigida col- locetur. Remoneatur ab huiusmodi sollicitudi- ne uerborū interpolationes & aliqui ludj in qui- bus delectetur fiant coram ipso, instrumenta musicalia corā eo pulsentur si in eis delectatur. Quod si aliquis ephemerā inciderit eo q. plus solito comederit aut cibum multū nutrientem aut grossi nutrimenti sumpserit aut cibū male & nenenosę qualitatē, primo ergo statim uomitū prouocemus cū uomitu patriarchæ Nico- lai uel scarpellæ uel eum aliquo uomitū cōne- nienti. Quod si hæc se. per plures dies duraue- rit sic quod quasi synochus esse uideatur, non est materiei digestio expectanda: quia syno- chus & synocha antrax & squinantia materias crudas euacuare iubent. In his enim agri- tudinibus & similibus non debemus materiei di- gestionē expectare, sed statim phlebotomare & uen-

& ventrem solvere cum aqua cal. fructum,
uel aliqua conuenienti medicina & detur syru
pus acetosus: pisanā detur solummodo & lac
amyg. & mica panis ter uel quater lota cum
zuccharo in aqua. Cumque feb. aliquantulum
alleviare inceperit pa. in bal. aquae tepidae impo
natur in quo moram magnam non faciat. Et fri
getur corpus eius ex fursure diu deinde lauetur
bene & abstergatur & in panno lino inuolu
atur & in lecto molli ponatur & quiescat & nu
triat ut dictum est. Quod si feb. diminuta fue
rit scilicet non in totum recessit iterum uirtute
existente forti in bal. mittatur & plus moretur
ibi quam prius & omnia frigida secundum su
periores doctrinam exhibeantur. In principio
tamen huius fe. absque magna cautela bal. in
gredi non debet. Cauendum est enim ne pa. in
huiusmodi bal. laborem patiat ut & ne corpus
ipsius calefiat. Quod si contingat ipsum in bal.
horripilationem pati illico extrahendus est: &
hoc dico de quolibet ephemeram pa. Cum n.
quis patitur horripilatione in bal. p hoc cogno
scitur ipsam febrē non esse ephemerā sed putri
dā: & hoc speciale signū ad cognoscendū ephe
merā distinguere a putrida. Cū n. aeger se balnea
uerit & horripilatio non superuenerit scias il
lam febrē esse ephemeram, & tunc uomitus
prouocetur cum adhuc materia fuerit in ore
stomachi: a qua summi resoluti inficientes spiri
tus induxerint, uel si uenter fuerit solutus si
materia in fundo stomachi fuerit & urina pro
uocata fuerit & phlebothomia etiā facta fuerit
si fuerit oportunum & ordo diēte obseruatus
fuerit & ordo etiam intrandi bal. & inungendi
corpus sicut superius scriptum est obseruatus
cito curabitur quelibet ephamera nec in putri
dam conuertetur. Si autem error in praedictis
contingat: in fe. putridam uel in quotidianam
uel in synocham & similes cito transibit.

Quod si aliquis hanc febrē patitur propte
rea quia usum bal. praetermisit & non balnea
tur ut consueuerat quod scitur indicio pa. in
bal. aquae tepidae immittatur & multa aqua te
pida super eū fundatur & corpus eius fricetur
ex fursure se. comunibus tritis paucis nitro in
simul mistis: deinde lauetur bene ex dicta
aqua & abstergatur eius corpus & ponatur in
lecto. & nutriatur ex cibis facilis digestionis
& cibis extinguentibus calorem: & uinum cla
rum album ualde subtile sibi exhibeatur in po
tu die sequenti si non liberatus fuerit balneetur
& praedicto regimine regatur. Quod si mul
tam sitim habuerit uel si quis hanc fe. propter
sitim habuerit dentur extinguentia sitim in cap
de siti dicta. In bal. aquae tepidae mittatur. pi
sana hordei & etiā aqua frigida cum zuccharo
detur, aqua etiā frigida detur, & nutriatur ex ci
bis humectantibus & frigidis: a labore abstinere.

Quod si aliquis hanc febrē patitur propter
dysenteriam quam habet uel fluxum uentris
aut uomitum uel rheumatismum: succurratur
praedictis agnitionibus & curetur secundum
quod in propriis capitulis dictum est. Si uero pa
tiatur quis hanc febrē propter rheumatismum
seu corizam & tussim & similia: succurrendum
est cito cum phlebotomia: uel uetosis secundū
Rasium: pectus eorum mollificetur & tussis: &
rheumatismus sedetur secundū quod in propriis
capitulis dictum est. A carnibus & uino omni
no abstineant pisanam farinā hordei lac amyg
da. & similia comedat. Cumque feb. quieuerit
in bal. mittendus est & ordinatim paulatim ad
consuetā transeundo: huiusmodi enim fe. cum
ex huiusmodi causis procedit: & cura eius ne
gligitur multoties in pleuresim, conuerti con
suevit. Cum uero hanc feb. quis patitur pro
pter bubones seu apostemata, quod visu di
scernitur, & est pulsus magnus & velox: etiam
spissus: urina alba & cruda, facies rubea & infla
ta & in fine sudor aliquis: tunc infirmus secun
dum Rasium ex parte contraria minuendus est
& locus infrigidandus est: quemadmodum de
apostemate calido ostensum est. bal. uero nullo
modo ingreditur neq. uinum bibat donec il
lud apostema sedetur & eius igneitas & ardor
deprimatur, soluatur uenter eorum & calor
eius naturalis mutatus in igneum ad tempe
riem reducatur cum his quae in praecedenti
bus dicta sunt, & ex cibis frigidis nutriatur
& ipsum apostema ad maturitatem perduca
tur & pus extrahatur. Maturato enim apo
stemate & sanie extracta tollitur dolor & fe
bris: quia remota causa remouetur eius effe
ctus. Nam idem dicit Hippoc. in apho. Circa
generationem saniei &c.

De hethica. seu Cap. III.

HETHICA febris habitualis dicitur ab hethi quod
est habitudo: quia corpori adueniens in habitum
conuerti consuevit: & habet fieri diuersis de
causis. Quadoq. enim fit ex praecedentibus fe
diuturnis ex passione: ut ex longa, ira solici
tudine, tristitia, nimio studio: ex nimio ieiunio
nimio coitu ex longo menstruo. uel hemorrhoi
da fluxu. quandoq. fit ex praecedente pleurisi pleu
resi uel peripleumonia: & hoc ab auctoribus
incurabilis reputatur. Hethica ergo tres sunt
species prima, secunda & tertia: Prima spe
cies hethica fit ex consumptione humiditatis ad
regimen membrorum ab hepate ueniens quae
non dum est digesta nec dealbata nec membris
assimilata: & urina apparet citrina uel subcitrina
uel mediocriter tenuis: & mediocriter spissa
cū petaloidibus resolutionibus & calor continuus
& leuis: & in uolis manum semper est calor.

sed minor post prandium quam ante, & hoc est familiare signum in omni specie heclicæ, & alia signa communia conueniunt, adest tussicula modica membrorum cōsumatio & grauedo & in poris extensio, oculorum concavitas narium acumen, & calor, ut dixi continuus in uolibus manuum & pedum. Et hæc signa magis intenduntur si ad secundam speciem deuenierit & magis si ad tertiam. Secunda species fit ex maiori humiditatis consumptione membrorum assimilatæ nec ex toto incorporatæ ex parte digestæ & ex parte dealbatæ cuius signa sunt omnia quæ in prima specie dicta sunt, sed fortiora & uehementiora signa sunt in hac specie, urina citrina, uel subcitrina, mediocriter tenuis uel mediocriter spissa, in qua apparent crinoidales resolutiones & supernatat ipsi urinae quædam grassities, ut tela aranæ, quam grassitiem Hipp. in pronosticis uituperabilem appellat ubi dicit, grassities in urina ut aranæ tela uituperanda est, & hæc species uix aut nunquam curatur. In tertia uero specie heclicæ cōsumitur ipsa humiditas, tertia quæ ex toto digesta & ex toto dealbata, & fere unum cum mēbro: in qua urina apparet etiam colore & substantia oleaginosa cum quibusdam atomis albis & rotundis, in modum parui frusti carnis uenientis, in qua quandoque oculi sunt ualde concavi, tympana plana, nares ualde acutæ & contractæ & facies fit terribilis & collum ualde gracile, fit & ualde subtile, ossa pectoris discooperiuntur, ita quod possunt omnia uisu & tactu computari, uox etiam fit rauca, & quandoque exilis & debilis fit, & quandoque uix auditur, pulsus fit ualde debilis & subtilis, & totum corpus desiccatur, sic quod non uidetur nisi corium & ossa, & omnis pulchritudo, & claritas corporis recedit, & uenter attenuatur & dilatatur, sic quod uidetur quasi costis adherere, quasi nihil in eo uidetur esse, cutis etiam si eleuetur per se non residet, ultimo cadunt capilli & constringuntur ungues, quæ omnia mortem propinquam pronunciant, & citius si fluxus uentris uel san. superuenerit. Contingit esse heclicam quandoque cum putrida, quod cognoscitur, quia cessante typo pu. calorem heclicæ leuis permanet, & hæc est ualde difficilis ad curandum, quia sicut dicti Bal. Nihil est difficilius ad curandum quam duæ ægritudines contrarie simul in eodem tempore in corpore existentes. Nam si das aliquod euacuatium in uas ad curationem putri, & lædis curationem heclicæ, si e conuerso non euacuas, sed circa restorationem infirmi in fistas augumentatur putrida multum, licet proficias heclicæ. Et ego quendam curauim hoc modo cum cibis conuenientibus ad restorationem per plures dies ipsi sum nutriti, & naturam ipsius fortificauim, quia

ait Bal. Naturæ forti nihil impossibile, educit enim saniem per medium ossis. Natura uero fortificata leui lotura putridam mundificauit. Et postmodum ad heclicæ curam infra scripta adhibui: & sic pa. conualuit. In omni itaque specie heclicæ licet tertia incurabilis sit, & secunda cum difficultate curetur. Primo ordinetur diæta, cum diæta sit potissima pars curationis. Comedant ergo heclici pullos cum farina hordei coctos, & si carnem masticare non possint, si forte iam ad nimiam debilitatem deuenierint, prædictorum pullorum succus exhibeatur lac amygdalarum cum penidiis & dragaganto, lac asininum & caprarum calidum cum ex uberibus extractum fuerit addito pauco zuchcharo & mica panis uel sine ea quotidie sumant, & hoc diæta si non multum febricitauerint. Vnde post assumptionem lactis uidendum est si aeris attractio urina & alia accidentia fortificentur, & tunc non dāmus ipsum lac, sed alia prædicta cibaria, uinum clarum & odoriferum cum prisana hordei optime lympharum bibantur. Syrupus optimus & expertus heclicis & consumptis. Rec. hordei mundi pugillū. i. se. cōium, drach. 2. succi liquiritiæ berberis sebesten amygd. drach. 5. se. mal. bō baci, an. drach. 3. uiu. drach. s. ros. drach. i. se. feniculi peteo. an. drach. i. s. fiat syrupus hoc modo. Accipe quam plures testudines, & discinde eas per membra proiectis earum conchis, & cum uino albo optimo & pauco sale ablue eas bene, deinde coquantur optime in aqua sic quod caro ab ossibus separetur & omnes res prædictæ addantur, & fit os collæ taliter obturatum quod sumus respirare non possit, & addito zuchcharo quantum sufficit fiat syrupus quod utatur quotidie, quia mirabiliter restaurat phthysicos a consumptione. Item comedant ipsas testudines coctas cum hordeo mundo quotidie. Alius syrupus ad heclicam optimus fit ex aqua decoc. pimpinellæ lingæ canis, dragaganti, & hordei mundi addito zuchcharo quantum sufficit. Alius syrupus ad heclicam bonus. recip. ca. ue. scolopendriæ, hepaticæ, in. melle, buglossæ, florum boraginis an. M. i. corticis citri. drach. i. se. best. 40. numero, liquiri. mundæ drach. i. sandalo. al. & rub. se. cydoniorum portulacæ. se. papaueris albi, gūmi, dragaganti, passularum, an. drach. s. ros. (pa. dii. an. drach. 3. gūmi arabici, berberis, se. cōium se. bombacis, crassulæ, testicu. uirid. satyrionis, an. drach. s. i. uiu. b. 2. 5. se. fenugræci. drach. s. zuchchari quantum sufficit & prope finem decoc. istius syrupi imponatur in ea de bona aqua ros. alim bona quantitate & utatur eo quotidie heclici, quia hic syrupus compositus fuit a magistro meo & expertus in hac cā. Syrupus etiā de cucur. bonus est heclicis qui sic fit, cucurbitas uirides in pasta inuoluæ & in furno decoqui facias & aquā cum manibus exprime, in qua gūmi arabici, draga-

ci, dragaganti, se. mal. lactuca, bombacis, cydoniorū papaueris al. & sandal. alb. & ru. ros. an. fac bullire, & addito zucharo fiat syrupus. Syrupus de psillio qui fit hoc modo optimus in hac causa est. Recip. sandal. alb. & ru. ros. dragaganti, gummi arabici, an. drach. 1. s. spodij. se. portula. lactuca se. communium, an. drach. 3. psillii in petia lini ligati. drach. 2. omnia in syrupo ro. bul. addita aqua & iterum ultimo addito zucharo quantum sufficit fiat syrupus & cum coctum fuerit aromatizetur, cum drach. 2. camphorę: & detur cū ptisana, & si fluxus uētris superuenerit detur cū aqua deco. gummi arabici, dragaganti: & fiant remedia in capitulo de fluxu uētris seu liēteria dicta. Electuariū ad restaurationē humiditatis pro hecticis phthisicis & cōsumptis ex quacūq; cā fuerit optimū & expertū. Recip. rosę, zuchari: an. dra. 4. dragaganti, gummi arabici: an. drach. 2. sandalorū alborū & ru. an. drach. 7. se. papaueris al. dra. 1. s. succi liquiritiæ amili se. portulacę scariolę spodij: an. drach. s. garioflorū. drach. 4. cinamomi. drach. 1. zinziberis storacis: an. drach. 2. croci. drach. 1. penid. drach. 2. se. cōmuniū. drach. 2. s. se. cydoniorū. drach. 2. amidi cādi: sebesten: an. drach. 1. se. mal. viol. an. drach. 2. confice cum syrupo ros. in quo sit de bona aqua ros. & sumatur de eo ad quantitātē nucis grossę mane & sero. Electuariū nero quod dicitur diapapauer est optimum in hac causa. recip. succi liquiritię dragaganti: gummi arabici: an. dra. 10. se. papaueris al. amygdalarū: amidi: se. cydoniorū portulacę ro. an. dra. 2. o. se. cōium lactucę mal. bōbācis, sang. dra. an. dra. 2. Syrupus rosatus ēt sepe si nō febricitauerit multum quantū sufficit datur ut est dictū. Aliud electuariū optimū ad hecticā. recip. se. papau. albi. pinearum penid. gummi arabici: dragaganti: an. dra. 5. ligni aloes cinamomi masti. se. cōium mundorū. se. cydoniorū sanguinis draconis: an. drach. 3. syrūpi rosę. quantū sufficit. Quod si fluxus uētris superuenerit detur syrupus constrictius in capitulo de dysenteria positus. Trochisci ēt de spodio & trochisci de cāphora: quos ponit Almasor in capitulo de hectica propinētur & alia remedia cōstringentia in capi. de dysenteria dicta si hec nō sufficiant. Caveant sibi hectici a salis frizis acetosis: & etiā ab ira, tristitia, & a coitu maxime: & ab omnibus cibarijs indigestibilibus. quantū plus possunt. Sint semper in gaudio & leticia toto posse: instrumēta musicalia audiant & coreas & ludos in quibus delectantur quotidie nideant. Et hac de hecticis dicta sufficiant.

Additiones. Quidā iuuenis uidebat hecticus de quo medicus cōsiderauit q̄ p̄tebat sic: citatē hepatis q̄ est usus syrupo uio. & aqua hordei p̄ multū r̄ps & inunctione olei uiol. sup hepar & uia frigida & sanus factus est. Syrupus mira-

bilis: accipe testudines quę reperiunt̄ ī nēmore uel loco testudinū puras carnes. Et si nō habes: accipe cerebella xaponū & lauentur cū uīnio & aqua & ponātur ī olla rudi plena aqua: prius tñ in mortario conuassent: & cū illis admisceant̄ liquiritiæ & succus eius ros. dragaganti: gummi ara. an. dra. 1. s. se. papau. alb. se. portu. lactucę: amidian. drach. s. se. cucur. melonum, cucu. citrulli: an. unc. s. se. mal. uiol. an. drach. 2. spodij. unc. 2. hordei lib. s. penidi. drac. s. se. bombacis: cydoniorū: an. drach. 4. pinearū amygd. uuarū passularū sebesten berberis: an. unc. 2. s. ponātur in olla & os cū pasta & argilla obturet ne fumus exeat: decoque ad consumptionē tertię partis: colentur inter duos baculos per pannū & late admisceat̄ zucharū & syrupizetur & de hoc quantū testa oui capit: sumat cū tribus partibus 2 quę tepi. uel aquę ordei. Syrupus mirabilis ad hecticā. recip. florū boraginis: se. lactucę quinqueneruę crassulę testiculorū uiridiū fatyrionis: an. partes. 2. se. portulacę: basiliconis: se. papau. mal. an. partes. 4. se. cydoniorū bombacis mundi: mal. an. drach. 1. iuibz: sebesten: an. 25. cucur. mundę drac. 2. se. scenogręci: drach. 1. & s. spodij berberis sand. al. & ru. gummi dragaganti: gummi ara. ro. an. drach. 1. uiol. dra. 6. prunorū coctorū: 25. & hoc duo addantur si non fuerit fluxus uētris: & si fuerit non ponantur. Et ponantur omnia p̄dicta in aqua ros. & addito zucharo optimo fiat syrupus & cum pauca cāphora aromatizetur. Syrupus optimus hecticis confortatiuus restauras subtilē humiditatē cōferens his qui sunt deficiati: & facti sunt macilentī. recip. succi boraginis deputati lib. 4. bul. in eo florū boraginis: florū roris marini, se. bombacis, sandalorū citrinorū, berberū ros. capreolorū uitis: an. drach. 2. se. basiliconis drach. 2. zuchari quantū sufficit & ponatur in sine decoct. ipsius musci: ambrę: an. scrupulo. 1. & detur in potu quodidie mane meridie & sero, qm̄ est mirabile. Clystere secundū Serap. cap. de hectici humectās & impingans corpus & cōpetit multū hecticis. Accipe caput arietis & pedes eius & contundantur & proijciantur in olla limpida & fundatur super illud aquę quantū sufficit tritici & hordei mudi an. pugillū unū arietis: camo. an. drach. 1. passularum absque nucleis suis unc. 1. sicuū numero. 10. coquantur tñ donec ad tertiā partē redeāt & colētur, & sumant ex hac decoct. colata lib. s. butyri naccini. unc. 1. olei sisam. unc. 2. olei de ben. unc. s. misce totū & clysteriza semel in tribus diebus, & sic fiat donec corpus humectetur & impinguetur. Renes & totū corpus in noctē ungatur ex oleo masticino uel ro. cum cera al. mista, & forbeat in manē uicellum oui, & parum uini insipidi, deinde ingrediat̄ bal. & parum moretur in eo.

De febribus continuis putridis. Cap. II II.

Putrida feb. alia intra uasa: alia extra uasa. Materia extra uasa: ut quotidiana tertiana fe. erraticę quartana & huiusmodi. Et huiusmodi enim fe. dicuntur putridę. eo quod ex principali uitio putridorum humorum sunt. Causę autem putrescentium humorum sunt: sicut larga dięta & gressa: quies multa: somnus multus & immoderatus: uigilie immoderate: passionēs animę: sicut tristitia ira & huiusmodi: etiam ualde calidus seu frigidus regio. tempus: & huiusmodi. Causę enim putredinis sunt quinque: scilicet multitudo humorum: grossities eorum: & uiscositas eorum: opilatio pororum: & fumositatum retentio. Quarum duę ultimę sunt magis potentes & sufficientes ad putredinem faciendam. Opilatio enim pororum ex quacunque causam retinetur talis fumositates. Ideo dissoluntur & corrumuntur humores & putrescunt in uasis uel extra uasa: uasa autem appello uenas & arterias. Tractaturi itaque de continuis dicamus quod fe. continue sunt ille quę sunt ex humore putrefacto intra uasa. & continuę affligunt patientem usque ad criticam declinationem: sicut sunt synocha inflatiua: synochus putridus: caisson & huiusmodi. Causę autem continuę afflictionis sunt scilicet putredo continua: continua respiratio putredinis ad cor: & defectus materiei propter principalem corruptionem san. Et ideo in synocha est requies nulla: cum in ea istę tres causę continuıtatis cōgregantur. In alijs autē continuis in quibus nisi duę causę continuıtatis concurrunt aliqua requies fit: & licet cholera & flegma & melancholia altera sine utraq; qualitate putredini repugnant. Tamen propter admistionem san. calidi & humidī qui cū eis misceatur per interclusionem uenarum continue putrescunt. sed in quibusdam horum plus: in quibusdā uero minus: & rursus licet humores sint admisti: tamen quandoq; unus tamen corruptus est: & non alii. Et quia de eadem dicta humor. vnus ad corruptionem: & ad putredinem habilior generatur: contingit interdum quod vnus de quatuor humoribus putrefcit. Continuarum fe. alie sunt simplices: alie sunt compositę. Simples sunt quę ex una tantum materia in uasis putrefactę sunt ut synocha. Compositę uero sunt quę ex una materia putrefacta intra & extra uel ex diuersis humoribus putrefactis intus tantum: uel intus & extra sunt: ut emittitę: & prius de simplicibus agamus. *De synocha inflatiua. Cap. V.*

Cum sanguis superabundat in corpore ultra

debitum modum & precipue in spiritalibus & super accendatur: & non putrefcit: facit quandam fe. continuam: quę inflatiua synocha appellatur: & dicitur inflatiua propter multam fumositatem: quę pectus & pulmonem inflat: & etiam totum corpus in hac fe. inflatur. Differt autem synocha inflatiua a synocha putrida: & ab alijs putridis: quia in hac feb. urina non fetet & pulsus est fortis. In putrida tem urina non fetet: & pulsus est inordinatus: constrictio uelocior est quā dilatatio. Item in hac fe. apparet urina ruffa uel subru. in substantia per totum spissa: & non liuens. In putrida uero liuet ipsa urina. Sunt autem signa alia in synocha inflatiua scilicet membrorum grauitas, uenarum plenitudo: calor continuus: rubor oculorum: & faciei: dolor frontis & tymporum. In somno uidetur infirmo quod uideat lampadas quasi luminatas & rubea corpora sicut scarlatum: corpus rubeum: sanguinem: rubeas picturas: & huiusmodi, hęc enim fe. nisi cito curetur in pleuresim terminari consueuit multoties. Curetur ergo hoc modo. Si nil obstiterit fiat minutio in principio de basilica uel quod melius est de uena in fe. quę est inter basilicam & cephalicam extrahatur sanguis usque ad lipotomiam. Multi enim sola minutione huiusmodi sunt liberati. Postea si eius uenter fuerit laxatus competenter detur unc. i. syrapi ros. uel uiol. cū frigida. Si fuerit constipatus usque ad sextum diem denter ei cibaria refrigeratiua & boni san. generatiua: sicut sunt spinachia: borago: lactuca: pruna damas. in aqua elixata succus granatorum: protulaca: scariola: mica panis ter uel quater cū aqua lota addito zucha. & similia dentur: & si nimium fuerit constipatus aliquod suppositorium ex lardo & huiusmodi fiat: & aliquod clystere de ue ex mal. mercuriali frondibus uiol. & fursure decoctis & additis cassia. olei uiol. zuchari uiol. & huiusmodi & fiat clystere. Post diem uero septimum si adhuc plenitudo idauerit purgetur cū deco. cap. uel hepaticę in uenarum febestena scariola: prunorum & uiol. in quare soluantur cassia. unc. 2. tamarindorum & manegana. unc. 1. zucha. uiola. unc. 1. s. Vidi quendam puerum qui patiebatur synocham inflatiuam: qui erat in tantū tamesfactus & inflatus quod omnes medici ipsam pro desperato habebant: cui quidam senex pauper petens elemosynam superuenit cui parentes dixerunt uade cum Deo frater: & ille ait: quid habetis: & illi dixerunt: uide quid habemus: & ostendunt sibi puerum: & ille dixit: ite & accipite pirariam, & omni mane detur in potu de succo eius. drach. l. s. cum syrapi: rosa. uel uiol. uel zucharo solo: & dictam herbam de is. sibi comedere in crispellis coctam: & hoc fecerunt que

que ad dies. 9. & liberatus est pa. In quarto uero die emisit maximam urinæ quantitatem, & curatus est perfectè. Quod si huiusmodi egri tudo cum apostemate fuerit detur ptisana hordei, & cætera supradicta in præcedentibus capitulis. Pro dolore capitis fiat inunctio ex oleo nucum uel uiol. uel populeon & similibus, uel epithimetur frons & tempora de sandal. & ru. uino distemperatis cum aqua ro. & succo semperuiuæ: lauentur manus & pedes in aqua decoc. florum camo. uiol. & mal. & ro. In fe. continuis. recipi absinthij. Mani. r. fac bulire in aceto quousq; uirtus absinthij demundet ab aceto, post. Reci. farinæ hordei. unc. 3. farinæ fenugr. unc. 1. fiat emplastrum stomacho usque ad umbilicum.

De synocha putrido. Cap. V I.

Synochus est fe. quæ fit de sanguine putrefacto & superaccensio. in qua urina apparet rubicunda uel subrubicunda in substantia per totum spissa: & liuens superius & etiam ferens si odoretur. Et notandum quod tres sunt species synochi scilicet: homotenus, augmasticus: epaumasticus: nam secundum proprietatem materie & caloris tenorem diuersificatur species synochi. Cum enim materia est multa & ad successione inepia, & calor est fortis ualde a principio calor fortis operatur: & quia materia est multa consumptioni diutius resistit unum status ægitudinis cito ineipit, & diutius usque ad finem perseverat, & si species synochi qui dicitur homotenus: ab homio quod est unum & tenos quod est tenor, quia uinis dicitur esse tenoris: & uidemus in multis legibus siccis simul aggregatis, in quibus ignis accesus fortiter agit, & diutius perseverat æqualis. urina apparet, sicut dictum est, pulsus magnus plenus & inordinatus, facies rubea, sitis magna, lingua sicca & aspera. Et uniuersaliter scias q. in synocha uel synocha nulla requies uera uel falsa inuenitur: & durat quandoque usque ad diem tertium uel septimum, quandoque usque ad 9. quandoque usque ad 11. quandoque usque ad 19. & ultra non protenditur. Et nota quod urina rubicunda uel subrubicunda in homoteno apparens eadem perseverat usq; ad finem, nec mutatur aliquo modo in colore. In augmastico uero urina rubicunda uel subrub. apparet. deinde rubicunda uel subrub. efficitur. In epaumastico uero e contra accidit & hæc uirtus species saluior est. non Augmasticus est secunda species synochi quæ dicitur augmasticus ab augendo, & quando materia est multa & accensione inepia & calor est debilis, tunc enim ab ipso principio calor leuiter & debilitate operatur & paulatim argumen-

tatur, & longiori tempore manet: cuius similiter est uidere in uiridibus lignis in quibus si ignis accendatur ab ipso principio est debilis lentus: scilicet paulatim incipit fortiter operari & accendi & diu durat. In principio autem nota leuiter incipit, sed ualde grauiter finit, sic quod in tertia uel quarta die grauissime & potissime pa. infestat. Quandoque uero materia est pauca & calor est fortis, & tunc calor a principio agit fortiter, & materiam paucitate sua cito consumit, unum cito incipit declinatio, & sic fit feb. quæ dicitur epaumasticus quasi decrescens, quod est uideri in stuppa, in qua si ignis accendatur, a principio fortiter agit & inflammatur, cito tamen incipit decrescere & lenescere, & omnia symptomata supradicta in hac specie synochi leuiora sunt, & ad bonum ueniunt & isti tales qui patiuntur epaumasticum sine auxilio medici liberantur, quia materia licet sit habilis ad accessionem, tamen est pauca & cito consumitur. Homotenus etiam & augmasticus hoc modo curentur, fiat inunctio scicunda die de uena prædicta uel de uena hepatis, & non tanta, sicut in synocha inflatoria; sed fiat quod san. exies in contrarium mutetur, ut saluetur dictum Hippo. in regimine acutorum dicentis, Quod non debes uenâ obturare quousque sang. in contrarium mutetur colore. Ex purgatio, diæta, suppositoria leuia, clysteria, iunctiones frontis & tymporum, & epithimata frontis sicut simili modo, sicut in synocha inflatoria dictum est. Syrupus ro. uiol. cum aqua frigida uel zuecharum ro. cum frigida detur. Syrupus optimus ad huiusmodi fe. Reci. pruna sicca & dora in aqua. 3. se. portulacæ lactuæ: sandal. & rub. berberum ro. an. drac. quarta. miodrach. sigum ara. dragaganti & psillij. an. drach. 4. iuiuba. 2.5. bul. in aqua cum seminibus prædictis & gummis in subtili sacculo lineo positis & addito zuecharo in prædicta deco. fiat syrupus, & aromatizetur cum drach. 2. camphoræ. Syrupus etiam de aqua citrullorum uel curbi, deco. in pasta uel ipsa aqua curbi. & huiusmodi cum prædicta deco. misceatur & fiat syrupus cum zuecharo. Epithimetur frons & tempora ex sandal. al. & ru. ro. cum aqua ro. mistis & supra cor & hepar apponatur petia in prædicto licore intincta. Ex populeon oleo ro. uel uiol. succo solatri semperuiuæ & similibus loca prædicta innungantur & epithimentur. Ad sitis etiam mitigationem detur syrupus de psillio impleatur etiam sacculus lineus subtilis parum se. psillij uel saltem; se. lini trito, & ponatur in aqua frigida, & cum illa mucilagine laueto lingua: & cum ipso sacculo fricetur, semen etiam cydoniorum in ore teneatur, & eius deco. sitim aufert. Spongia uel pannus lini infusus in aqua deco. mal. se. lini & scenu-

& fenugreci tepidz pectori & thoraci applicetur. Quod si materia fuerit indigesta, & sitis ualde incitetur. pa. detur uas uiscerum, æreum, uel argenteum magnum: quod teneat unam octauam uel plus plenum totum aqua clarissima & frigida in potu detur. Nam ut ait Hippoc. in regimine acutorum. Aquæ autem nullum inueni usum, nisi quia in feb. acutis exhibetur &c. Et ego hoc solo uidi quamplures ab huiusmodi febribus acutis liberatos fuisse. Radatur quoque lingua cum canina uel ligno, & fricetur cum spongia uel salvia infusa in aqua: & succum lactucæ & portul. in prædictis adlitim mitigandam in ore teneat. Pro insomnietate lauentur pedes & crura in aqua, in qua myrtus, uiole, mal. frôdes salicis: lactucæ, iusquiami, & papaueris cocta fuerint: de hac enim aqua lauentur pedes manus frôs & tympora & pulsus: & deinde leuiter abstergantur: postea aliquod de emplastris ad inducendum somnû dictis in capitulo de phrenesi: fronti & tymporibus applicetur. Cû autem in his pal. & in aliis acutis fe. est tanta fe. & insomnietas: q. fere pa. ad mortem deducitur: & nullo modo eos possumus prouocare ad somnum: ultimum remedium quod possumus facere in prouocando somnû est istud recip. ros. drach. 3. se. portulacæ, lactucæ, melonum: anisi, liquir. croci, opii, thebaicæ ap. drach. 1. conficiatur cû aqua frigida: & succo apii: & syrupo rosæ. & detur in potu. Aer etiam alteretur cû spongijs in aceto infusis circum circa lectum suspensis, & frond. cannarum, uitis, salicis, myrti, gladioli, & huiusmodi per domû sternantur, & de super aqua frigida distilletur. Constituaturn etiam distillatio aquæ frigidæ, uel riuius coram eo: quia sic stupor in eorum oculis euenit, fricentur extremitates manuum & pedum eorum cû stamina infusa in aceto, sale, fuligine, & aqua rosæ simul mistis. Et fiant si fuerint necesse ea quæ dicta sunt in capitulo de lethargia uidelicet si ad lethargiâ nideatur tibi parari egrotans. Clysteria fiant ex mal. uiole, branca ur. parietaria: & urtica. ap. M. i. se. lini triti drac. 3. in aqua bul. & colentur, & addito succo blæz mercurialis an. drach. 2. züchæ uiol. olei uiol. an. drach. 1. scab. fisci. drach. 3. mel uiol. dra. 2. iniiciatur per clystere, mica panis ter. uel quater in aqua lota cum aqua frigida & züchæro. mista & detur. Quod si in 8. die non terminetur ægritudo purgetur cum lotura superius dicta, uel fiat syrupus de se. cõmunibus, psillio, capiluei. & uiol. in quo ponatur drac. 1. reubarbari puluerizati, & detur totum in potu. Et quia hæc ægritudo per fluxum san. narium terminari consuevit si in die cretico non fluat ipse san. ex naribus: & signa denunciatiua ipsius san. e naribus debentis fluere præcedunt, sicut sunt dolor capitis,

frontis, stomachi, & huiusmodi & scintillationes uelut ignis coram oculis infirmi apparent: prouocetur cum fetis porci in naribus immisis uel cum spargula: uel cum flõmo narium imposito; uel cum sanguisugis naribus, & fronti appositis, uel fiat flõmia de uena quæ est in medio frontis. Quâdoque etiam in uere superuenit fluxus sang. in naribus, & soluitur ægritudo per se. interdum durat diutius ipse fluxus san. à naribus à nobis dictus. Et etiam quâdoq. natura fortis facit crisi per fluxum san. uentris qui nõ restringatur nisi feb. prius recesserit. Et si ulterius ipse fluxus uentris dureuerit, dentur troisci de spodio & fiant alia remedia in ca. de fluxu uentris dicta.

De caufonide. Cap. VII.

Causon feb. à caumate dicta est, quoniam maximum corpori infert cauma & incendium, & fit ex pura cholera in uenis subtilissimis & arteriis stomachi pulmonis & hepatis putrefacta. Est enim causon de genere tertianæ, scilicet tamen fortior existit & maioris caloris. Una tamen die fit fortior, alia uero die remissior, nec tamen a corpore separatur, & non accidit horripilatio in causonide, sicut accidit in aliis, & accidentia sunt uehementiora in causonide quàm in tertiana secundum quod inferius distinguemus. Signa igitur in causonide sunt hæc. Urina rubicunda uel subru. uel citrina & tenuis, & lucēs uelut ignis in hac se. apparet, adest calor continuus & acutus, totius corporis incendium & cauma forte, dolor capitis frontis & tymporum figitiuus in modum clauorû, qui figerentur in capite, & præcipue in dextra parte capitis & oculorum, consumptio cordis, & stomachi morsus, nigiliarum instantia: os amarum, alienationes multe, pulsus uelox & acutus uel subtilis, sitis persequens, ut eis bibentibus nil sufficiat, lingua cõbusta & deficcata & aspera, & quandoque nigra, facies squallida apparet aliquantula citrinitate perfusa, constipatio uentris propter nimiam siccitatē cholere ex feruore uigenti, & semper continuus est dolor & incēdiu acutissimû, & sine intermissione hæc feb. nisi quia in mane circa horas matutinales aliquantula fit incendii & feruoris remissio: nõ tamē plena requies. Et hoc accidit propter horas sanguinis qui tunc spargitur per membra qui illa hora dominatur. Et nota quod si in causonide hypostasis in fundo urinz permanens sit alba: significat futuram quotidianam: si fusca tertianam: si nigra erraticam; uel quartanam. Item nota quod si in hac fe. & etiam in aliis acutis fuerit hypostasis rubea in fundo urinz continua & persequens & formæ pineæ: est optimum signum: significat enim materiam

etiam sanguineam: quæ tito digeritur & erit digestionis obediens. Item nota quod si in hac fe. & in aliis feb. acutis apparet: urina discolorata & pauca mixtura: ualde malum signum est: & specialiter si nullam facit residentiam in fundo urinalis: dum quiescit per duas uel tres horas. Si tamen in multa quantitate mixta fuerit & frequenter: faciat residentiam bonum signum est: quia est signum digestionis & purgationis per urinam. Item nota quod in hac fe. & in aliis acutis urina pauca fetida, pinguis uel nigra & huiusmodi & mingatur cum difficultate mortem proximam protendit. Curetur igitur huiusmodi passim hunc modum. detur omni mane syrupus acetosus uel oxizaccara uel succus malorum granatorum eum. zucharo mixtus cum aqua se. communium seu cum lacte se. prædictorum. In secundo uero uel tertio fiat minutio de mediana uena, & hoc dico si uirtus ætas & similia particularia in hoc conueniant. Pueri enim & senes non sunt phlebotomandi, sicut uult Aui. Item si uomitus uel fluxus uentris in principio superuenerit, uel p. macilentus fuerit ultra modum minutio non est facienda. Item in tempore nimis fri. nec nimis ca. non debet fieri minutio, nec in tempore nimis uentoso nisi maxima immineat necessitas, & hoc in omnibus acutis feb. & in omnibus aliis ægritudinibus, & etiam in sanis locum habet. Item nota quod in continuis in die secunda uel quarta ad plus minutionem faciamus & non ultra. Et ratio est, quia usque ad quartum diem harum ægritudinum materia est fluxibilis & uirtus fortis: quarta uero die in antea uirtus debilitatur & materia residet: & propter hoc a quarto die in antea non debet fieri minutio quidam uero minuunt in quarto die quod non approbo. Item nota quod si in huiusmodi continuis sequitur fluxus uentris uel uomitus, est malum signum ualde. Fit enim ex abundantia humorum aut symptomatis: & de. 10. uix unus liberatur: quibus hoc accidens propter minutionem sanis superueniat. Facta minutione detur syrupus uiol. uel ros. cum aqua frigida uel zucharum ros. uel triasandal. dicta tenuis iniungatur: quia dicit Hypp. in aphor. Ad ultimas id est acutas ægritudines ultimæ curationes &c. Sic igitur dicta eorum mica panis ter. uel quater lota cum zucharo, scariola lactuca: portulaca: farina hordei, amygd. & huiusmodi dentur in quarto uel octauo die: purgetur cum ista decoctione. reci. capi. ue. hepaticæ scariolæ, boraginis: an. M. s. uiol. drach. s. se. communium contusorum: drach. 2. pruna. 30. iuinbe sebesten. an. 20. hæc omnia in quantitate aque sufficienti coquantur & colentur: & colaturæ addantur pul. p. cassia fist. drach. 2. oximellis simplicis tamandorum, diaprunis zuchari uiol. an. drach.

1. zuchari ros. unc. 1. s. reubarbari triti & positi in succo scariol. depurato. drach. 2. Et si maiori indigeat purgatione adde miradolanorum citrinorum puluerizatorum. drach. 1. s. 2. quæ decoctio. plantaginis. drach. 2. hæc enim decoctio in omni tertiana & omni ægritudine de cholera facta conueniens est & bona: in his tamen ægritudinibus tutior in 14. uel 15. diebus quam ante si competenter possumus differre. Quando uero materia fuerit furiosa currens subito de loco ad locum: tunc statim purgamus: nec digestionem materiei expectamus. Nam synochus & synocha, phrenesis, squinantia. & antrax. pass. illaca, & colica. thenasmon acutissimus & similia materiei digestionem in ægritudinibus non expectabat magister meus: sed statim humorem peccantem euacuabat etiam materia existente cruda. Utatur pa. ca. sonidem syrupis frigidis in præcedenti capitulo traditis: sicut est syrupus de succo cucur. & zucharo. syrupus de se. communibus: syrupus psillatus acetosus uiol. ros. & huiusmodi sitim extinguentibus in prædicto cap. dictis. Detur etiam syrupus rubeus qui fuit inuentus in ultramarinis partibus qui fit de quadam herba quæ sub niue oritur & zucharo optimo in hac fe. & omnibus fe. ex ca. humoribus factis mirabiliter confert. Prouocetur somnus lauando pedes manus frõtem & tympora cum aqua in dicto cap. dicta. & ponendo tympori & fronti emplastrum aliquod ex dictis in cap. de phrenesi. Epithimen tur stomachus: frons: hepar, & tympora: cum epithimate dicto. Aqua frig. in febribus adurentibus competenter tribuantur: sicut est aqua panis bene cocti & bene fermentati: & de bono tritico facti in aqua frigida ponatur: & tandem ibi iaceat donec optime mollescatur: deinde cum panno lineo mundissimo coletur: & si nis adde parum zuchari & colaturam dabis: hoc enim in acutis fe. plurimum ualet: & bene nutrit & calorem mitigat: & aqua ca. decoct. dragaganti zuchari & penidiarum: medulla citrullorum in frigida aqua infusa & data. Et hoc dico si huiusmodi fe. fuerit sine apostemate & sine punctura & dolore pectoris: quia tunc huiusmodi aquæ frigida non competunt. Nam ut ait Hippo. in apho. Frigidum inimicum est neruis pectori ossibus &c. Aqua melonis palestini. in his fe. data optima est quæ hoc modo extrahi dicitur. Accipiat melo palestinus & perforetur, & per illud foramen immittatur zucharum in prædicto melone, & tandem manibus moveatur huc & illuc quousque zucharum liqueat, deinde ipsa aqua tribuatur in potu. Alia aqua optima in huiusmodi fe. quæ dyscrasiam febrilem & incendium & sitim mitigat & urinam prouocat, terantur semina communia ad quantitatem drach. 3. plus uel minus secundum

dum quod nolueris, & super ipsis tritis infundetur pisanam hordei ferventissimam uel saltem aquam simplicem ca. sed non tantum ualeat, & coletur. & adde zucarum & penidiarum. & in potu da. Quod si fuerit uentris constipatio: detur hæc aqua optima quæ quasi uino assimilatur & multum confert in huiusmodi feb. & in simplici & duplici tertiana, alterat enim febrilem dyscrasiam & purgat aliquantulum buli. aliqua frusta reubarbari in aqua, & ipsum reubarbarum aquam colorabit sic quod quasi uinum uidebitur, & addito zucarum uel penidijs uel syrupo uiol. detur in potu. Clystere lenitium uel suppositorium fiat si necesse fuerit pro asperitate linguæ. & pro dolore capitis fiat remedia superius dicta in precedenti capitulo.

De emitritæis, & primo de minori. Cap. VII.

Emitritæi tres sunt species, scilicet maior, medius & minor, curari possunt si medicus fuerit prouidus & circa infirmum sollicitus. Maior uero potius diuina quam humana manu curatur, auctoribus omnibus testantibus, emitritæus quidem est feb. continua ex duobus humoribus, uno in uenis, & altero extra putrefactis. Et dicitur emitritæus ab emi quod est medium & tritæus quod est tertiana. Inde dicitur emitritæus quasi habens mediâ partem sui materiâ tertianam, scilicet cholera. Minor itaque emitritæus fit ex phlegmate putrefacto intra uasa & cholera extra. Vnde talia debent esse symptomata. Urina ruffa seu subruffa, seu citrina, & mediocriter spissa & superius liuens cum appositione manus, pulsus uelox & plenus, lingua apparet aliquantulum nigra & limosa, p. continuo frigore infestatur a primo die usque ad tertium uel quartum diem in uesperis, & postquam frigus minuitur permanet extremitatum frigiditas scilicet manum, pedum nasi, & sic manet infirmus per 18. horas quas habet in summo labore scilicet ab hora uespertina usque ad matutinam, & est cum oculorum grauitate & falso somno. & sic à quibusdam medicis imperitis minus bene iudicantibus propter huiusmodi accidentia & stuporem oculorum lethargia esse creditur, & propter sex horas, scilicet a tertia usque ad uesperas quas habet in falsa quiete. a quibusdam imperitis quotidiana esse creditur, cum non sit. Vnde quisque probus medicus infirmum suum debet assiduo uisitare ut assidua uisitatione qua p. curare debeat cognoscat, & non semper in sola aspectione urinæ confidat, cum urina sit fallax nuncius præterquam in quibusdam morbis, & specialiter in his morbis quæ habent materiam intra uasa. Medius uero emitritæus fit de colera putrefacta intra uasa, & ex phlegmate extra uasa putrefacto. In principio

apparet urina rubra uel subru, mediocriter tenuis, in statu uero aliquantulum, inspissatur seu in augmento, & in superficie aliquantulum limiditatis uel viriditatis uel nigredinis adest, uigilanti instantia, sitis lingue ariditas, & asperitas, dolor frontis, tympanum & aurium, constipatio uentris, pulsus uelox & subtilis. Rigor in hac specie emitritæi de tertio in tertium diem inchoatus sexta uel nona hora diei habet, 26. horas in summo labore, & 12. in falsa quiete. Maior uero emitritæus fit ex cholera putrefacta intra uasa & melancholia extra, & habet 40. horas in summo labore, & 11. in falsa quiete, infestans p. intensissime eisdem accidentibus, sicut in medio emitritæo diximus, scilicet magis ualde, & cum pessimis & malis significationibus & mortalibus, urina apparet in eorum uiridis uel nigra. Et isti tales sicut superius dixi, sunt sancto spiritui commendandi, & solis signis pronosticis relinquendi. Et nota quod quandoque solet fluxus uentris uel uomitus in principio minoris & medii emitritæi superuenire, qui si fiat ut symptomatis tam debili existente infirmo mortem proximam pronunciabis. Si uero cum fortitudine uirtutis & uirtutis materiz pugnantis contra morbum tunc ægritudinem breuem & bene terminabilem fore pronunciabis. Curetur itaque minor emitritæus in hunc modum, a principio detur syrupus acetosus uel oxizacchara cum aqua frigida uel tepida. In tertia uel quarta die fiat minutio uirtute & ætate permittentibus, de uena hepatis & san. secundum uirtutem p. extrahatur. Post minutionem uero detur syrupus rosæ uel uiolæ cum aqua frigida uel zucarum nouum propter confortationem stomachi in 8. uel 10. uel 12. diebus uel ultra, quia huiusmodi ægritudo 7. 9. 11. 14. uel 19. die terminatur ut plurimum, & quandoque usque ad 20. uel 24. diem ad plus protenditur, prolongetur itaque quantum plus potes dare medicinam si uideretur periculum immineri. Desitque hæc decoctio in decima uel duodecima die recipi. polipodii quercini boni & recentis & bene rasi & mundati a cortice exteriori, drach. 4. terantur bene in simul cum drach. 1. s. feniculi & bulliant cum 25. prunis siccis & additis drach. 2. mirabol. citrinorum in fero. manu colatura propinetur, uel detur hæc decoctio optima ad hoc recipi. capi. uen. hepaticæ, an. M. 1. uio. drach. 1. pruna damascena sicca, 30. iuiubæ sebesten. an. 25. polypodii quercini mundati. drach. 1. s. hordei mundi. p. 1. s. feniculi. an. drach. 1. omnia perfecte coquantur & coeantur. & additis tamarindorum drach. 2. pulpe casii. drach. 1. mirabol. citrinorum drach. 5. qui totam diem iaceant ad serenum & additis drach. 1. zucarum uio. mane in aurora tepida exhibeatur in potu.

potu: uel detur aqua reubarbari cum syrupo uiola. & si in hyeme fuerit in autumnno detur oxymel squilliticum uel diaprunis uel electuarii de succo rō. quod si necesse fuerit saepe fiat: & si in 14. uel etiam in 24. transeat agritudo. Et etiam si fluxus uentris uel sang. uel uomitus superuenerit: & æger non uideatur tibi. in totum liberatus, propter hoc non stes quin cum prædictis decoct. & electuarijs purges ipsum dummodo uirtus pati. sit fortis. Quod si phlegma extra uasa remanserit prouocabis uomitum cum aqua se. rad. raparum uel rapistrarum atriplicis seu raphani uel cum uomitino Nicolai, scarpellæ uel patriarchæ & similibus in cap. de uomitu positis. Quod si stupor superuenerit seu subeth fiant fricationes seu cætera remedia in capitulo de lethargia dicta, ut sunt clysteria, emplastra, & huiusmodi in occipitio facta fricationes, prius forti: sicut in capitulo prædicto plene dixi. Dieta tenuis exhibetur si uirtus usque ad statum durauerit, sicut est pitisana colata cum zuccharo. & penidijs mica panister uel quater lota in aqua cum zuccharo & penidijs pruna damascena elixa, cum agresta uel aceto parata dentur, lac amygd. farina hordei cum eodem lacte parata & huiusmodi dentur. Quod si infirmus fuerit ualde debilis, & uirtus non sufficiat usque ad statum, detur succus parus pullæ cum hordeo mundo decoctæ, uel ipsa caro ipsius pullæ intantum decoctæ quod caro ab ossibus separetur. pira grossa & aratura & poma grossa dari possunt, etiam uux iudicæ, succus granatorum, & similia dari possunt. Medius uero emittitæus eodem modo curatur per omnia, sicut minor, hoc excepto, quia in patientibus medium emittitæum debemus insistere quantum possumus cum emplastris, & alijs remedijs prouocantibus somnum in capitulo de phrenesi dictis. Cum isti patientes medium de facili fiant phrenetici. In minori debemus fricationes & huiusmodi facere inhibere somnum, sicut dictum est, cum his quæ in capitulo de lethargia dicta sunt, cum de facili huiusmodi minor emittitæus in lethargiam convertatur. Vnde in aliquo præterquam in hoc non differt cura minoris & medij emittitæi. Eodem enim modo purgamus & digerimus materiam: huiusmodi alia facimus in uno: sicut in alio. Nec differt cura unius & alterius: nisi in duobus dictis. Maior uero emittitæus incurabilis est, ut dixi. cum inuenimus patientem in quantum possumus ipsum pro desperato in curam recipiamus & insistamus cum prædicta cura in cap. de minori emittitæo dicta. Item purgemus pa. cum decoct. senæ, thymi, cuscute, epithimi, uiol. ca. us. scolopendriæ. an. M. s. uiol. drach. i. pruna. 30. omnibus decoctis addatur colaturæ casisefi. tamarindorum: zucchari uiol.

diaprunis: an. drach. 1. lapidis lazuli. drach. 3. reubar. drach. 4. mirabolanorum citrinorum unc. s. per noctem hæc in simul iaceant, mane uero colaturæ propinetur in potu, & faciamus quod possumus: tamen semper huiusmodi pati. maiorem emittitæum pro desperato habeamus.

De tertiana uera. Cap. 1X.

Tertianæ enim duæ sunt species: alia uera, alia non uera & hæc dicitur notha. Scilicet prima de uera agendum est. uera tertiana fit ex cholera ru. naturali pura: & potius in iuvene cholericico sicco & macilento magis intensa: & in æstate & in calida regione & sicca. & diata etiam calida & sicca: & multæ cholere generatiua præcedente: & talis tertiana inter acutas nominatur, quæ tamen per 7. periodos durat est uera, & si transit. 7. periodos est notha. Habet igitur uera tertiana. 12. horas in summo labore. 12. in leptopicijs. & 24. in uera quiete. Urina talium ruffa uel subruffa per totum tenuis: & quandoque crocea uel aurea apparet, & patet tertio in tertium diem infestatur à terra hora diei in antea. prima cum ingenti rigore: scilicet parum durat: postea sequitur calor magnus: pulsus magnus & uelox: sitis, amaritudo horis, & etiam ulceratur os: dolor frontis & tympanum: & quandoque continuus, id est uomitus continuus, & cholericus sequitur. Et nota quod cum dicitur, tertiana uera uel quartana & huiusmodi se. habet tot uel tot horas in labore: intelligitur quod eas haberet ad plus. aliquando enim huiusmodi tertiana uera non affligit nisi per 9. horas uel 10. uel minus si materia fuerit pauca, & sic de alijs. In principio itaque huiusmodi se. detur ad diuisionem materici quolibet mane, unc. i. s. syrapi uiolati, uel oxizacchara cum aqua fri. nisi fuerit cum hoc dolor pectoris: uel lateris, quia tunc miscemus cum prædicto syrupo tertiam partem. unc. penidiarum: & damus cum tepida. Et si fuerit cum hoc fluxus uentris: uel uomitus admiscemus prædicto syrupo. unc. s. zucchari rosa. antiqui, uel damus syrupum ros. Si uero uenter fuerit constipatus damus syrupum uiol. cum tepida uel oxizachara: miscemus zuccharum uiol. & damus. Post uero tertiam uel quartam accessionem, uidelicet in octauo uel decimo die si materia fuerit in stomacho: quod cognoscitur per nauseam: uel uomitum, uel per alia signa supradicta ad hoc conuenientia, educatur materia ipsa: cum uomitino patriarchæ, uel Nicolai & similibus in capitulo de uomitu dictis: uel in ipso femore caloris aqua frigida in multa quantitate exhibeat in potu & digitis in ore immisisis uomitus

tus prouocetur: multi hoc solo curantur: uidelicet cum materia est in stomacho: quæ faciat huiusmodi tertianam ueram. Quod si materia sit in intestinis quod cognoscitur, quia dolor & tortio sunt circa uentrem, & quandoque adest fluxus uentris & ægritudo cholericæ, & tunc educatur materia cum clysterijs acutis & mor dicatiuis superius dictis partim, & partim etiam cum medicinis inferius dicendis. Si uero materia sit in hepate uel chisti fellis quod cognoscitur per urinam multum intensam in colore, & etiam ad quandam spissitudinem accedentem, & calor est ualde acutus. Si uero in spiritualibus fuerit materia, tunc adest sitis intensa: & per potum mitigari non potest. In quocunque prædictorum locorum fuerit materia, scilicet in intestinis hepate uel chisti fellis: uel in spiritualibus digerant secundum doctrinam superius dictam. In 10. uel 12. diebus purgetur pa. cum decoc. ista. recip. ca. uel hepaticæ, scolo pēdriæ, boraginis. an. M. s. florū uiō. florū borag. an. drach. 1. sc. cōmuniū. dra. 2. hordei mundi. P. r. pruna. 30. iuiubæ sebestæ. an. 25. hæc oīa perfecte coquantur & colentur & colaturæ addatur thamarindorum, oximellis simplicis. an. drach. 1. zucchini ro. uiō an. drach. 5. diaboraginati. drach. 1. s. reubarbari triti & positi in succo scariolæ depurato per noctem. dra. tertiā. aquæ decoc. plantaginis. drach. 2. hæc omnia simul mista per noctem simul iaceant ad ferenū. mane uero in potu dentur: quoniā hac decoc. utebatur magister meus in tertianis ueris, etiam & in causone, & in omnibus ægritudinibus ex cholera factis. Vtebatur etiam syrupo laxatiuo ad hoc. recip. uiō. drach. 2. pruna. 50. iaceant hæc per noctem in aqua feruenti. mane uero bul. & colentur: & fiat syrupus cum lib. 1. s. zucchini in quo adde reubarbari puluerizati. drach. 3. aquæ ro. drach. 4. de hoc syrupo sumat pa. unc. 3. uel 4. de quarto in quartum diem in die quietis: & hoc post tertiam uel quartam accessionem: uel purgetur solum cum decoc. mirabolanorum citrinorum: & cum drach. 2. zucchini in aqua cal. per noctem ponantur: mane uero exhibeatur colatura eorum habenti stomachū frigidum cum ca. habenti uero stomachum cal. cum fri. exhibeantur. Et nota q. mirabolani dati cum ca. faciunt plus urinare & minus assellare, cum fri. uero dati contrarius faciunt. Quod si pa. ualde timorofus fuerit in accipiendo decoc. nec consuetus talia sumere antequam detur ipsa medicina seu decoc. per 5. uel 6. dies fiat hoc emplastrum constrictiuum & stomachi confortatiuum, & stomacho apponatur. Recip. san. dra. masticis olibani gumi ara. ro. an. omnia puluerizata cum succo menthæ conficiantur. Cumque medicinam dare uolueris ligetur summitas lacertorum brachiorū & cru-

rium circa mūsculos & digiti manuum & pedū cum aliquibus corrigijs subtilibus seu cordis ligentur, & fiat fricatio extremitatum & lauet sibi os cum aceto uel agrestē uel succo aranciæ: uel limonū: uel pomo acetoso siue malagrana. to acetoso: & nil de eo deglutiat, & ex succo aliquis prædictorum: uel aceto infundatur oculi. Postquā autem biberit medicinā aspergatur facies eius cū aqua ro. uel aqua frigida ad quantitatem unius cyathi proiecta supra eius faciem, & odoret panem assum in aceto, & succo menthæ infusum: aut pulegium uel muscum, quod melius est. Quod si abominatio uenerit pa. & medicinam eijcere noluerit per os panem assum in aceto infunde addito succo menthæ: uel ipsa mentha teratur, & spongia marina uel lana succida intincta in huiusmodi liquore orificio stomachi sæpe apponatur, & in ore eius salfam teneat, & si uult parum de ipsa transglutiat, ut sapor medicinæ aboleatur: deinde quiescat in lecto cal. nec dormiat: nec etiam deambulando uadat nisi prius medicina mouere incipiat. Cumq; medicina iam soluere inceperit uadat parum deambulando per domum possum: possimum. Quod si ipsa medicina non bene soluerit, des parum de reubarbaro pul. cum sero caprino, uel de electuario de succo ro. uel diaprunis, uel aliquod tale cum tepida: uel cum frigida, uel cum aqua prunorum, quod melius est. Quod si propter frigiditatem aeris seu stomachi medicina non duceret sicut debet, tunc panis calidus sicut exit de forno per medium scindatur & in panno lineo inuoluatur, & stomacho apponatur, uel locum cal. uino albo irroratū in pannis inuolutū, immo olla lutea, uel uelica gneæ uino uel aqua plena inuoluta panis, & similia ca. stomacho applicentur. Quod si uomitus superuenerit succurratur cū his quæ in cap. de uomitu restringēdo sunt dicta. Quod si medicina nimis duxerit: teratur axungia, & cum cinere conficiatur, & fiat ex eis emplastrum & supra umbilicum ponatur. Mittatur pa. in bal. aquæ deco. radicis filicis, rapsi, corticis granatorum & huiusmodi stipticorum & dentur syrupi & electuaria constrictiua in cap. de fluxu uentris & dysenteria dicta. Et nota quod si in tertiana fuerit dolor pectoris propterea forte, quia in spiritualibus materia continetur, uel alia quacunque de causa ab inferioribus proueniente, non debet dari medicina nisi prius ipse dolor fedetur & recedat, & tunc omnia particularia considerari debent. Sympus mirabilis contra tertianam. recip. succi plātaginis scariolæ & cicoreæ an. quilibet istorum succorum depuretur, & omnes in simul miscantur & bulliant, & addito zucchini fiat sympus in quo addatur parum crystalli puluerizati, & detur, quia miro modo ualet & sitim extinguit & calorem

& calorem reprimat in ipso. Hora accessio-
nis pedes & crura ponantur in aqua frigida
deco. myrti, malua, uiol. & similibus, frons &
tympana supradicta aqua lauantur. Postea in
ipso calore & feruore intensissimo cum pa. ui-
detur totus comburi, & sitit mirabiliter, detur
sibi in potu uas aeneum uel nitreum magnum
plenum aqua frigidissima & potet ad satietate
& crura & brachia & pedes suos in aqua præ-
dicta frigida teneat deco. myrti & cum subie-
cta. Postea prædicta membra inungantur oleo
ro. & uiol. prius tamen cum panno lineo sub-
tili absterfa, & etiam in lecto ponatur pa. hoc
enim solo plures tertianarios curauit magister
meus. Et hoc debet fieri post tertiam uel quar-
tam accessionem, materia iam digesta. Syru-
pus etiam diaquilon in potu detur pro siti, syru-
pus superius scriptus. pilulum ablutum in ore
teneat. Fiat etiam aer artificialiter frigidus cū
asperfione frigidatū herbarum & aquarum
& huiusmodi per cameram. Electuaria frigi-
da & syrapi frigidi & huiusmodi, & alia frigi-
da in capitulo de causone dicta dentur. Pro
insomniatē prouocetur somnus cum his quæ
in capitulo de phrenesi diximus. Pro dolore
renum ungantur renes ex oleo uiol. ro. agresta
& lacte mulieris simul mistis. Item fasciculum
timarum tenerimarum myrti in aceto deco-
qui facias, quoniam miro modo huiusmodi do-
lorem tollit & hoc sæpe fac. Aliud idem acetū,
agresta, fructus solatri, uermicularis, portula-
cæ, cymbalaria & huiusmodi frigidarum her-
barum in simul misceantur, & addito oleo uiol.
& ro. tepido fiat, & in hoc liquore pannos, spon-
gia, uel lana succida infundatur, & renibus sæ-
pius applicetur. Pro oris ulceratione penidie,
zuccharum, amidum cū zuccharo uiol. & aqua
ro. in simul distemperentur, & ex hoc ulcerata
loca liniantur. Aliud acetum deco. myrti, ma-
sticis, & rosarum gargarizet, quia miro modo
ualet. Item aqua de floribus myrti per alembi-
cum abstracta & gargarizata ad hoc mirabili-
ter ualet. Aliud expertissimum, uitellæ ouonū
bulliant diu in sartagine, & desuper aspergatur
pulis penidiarum, zucchari & amidi, & ex hoc
locus ulceratus seu postulatus sæpe liniatur.
Pro tinnitu aurium succis semperniua, corian-
dri, solatri, uermicularis, hedere terrestris unū
quodque per se, uel omnia simul mista cū pau-
co lacte mulieris & aqua ro. auribus instilletur
quia dolorem tollit. Aliud ad idem per me ex-
pertum elixentur duo, uel tria uel quatuor. oua
gallina sic quod fiant dura: & ab albuminibus
iporum aqua extrahatur exprimendo ea forti-
ter cum peria lini subtili, & talis aqua cū oleo
ro. mista tepida, ac si in sole stetisset, auribus in-
fundatur, quia auribus nihil actū frigidum de-
bet imponi. Pro dolore ergo renum pro ul-

ceratione oris, & pro tinnitu aurium & huiusmo-
di, si ea quæ dicta sunt hic non sufficiant,
sunt remedia ad hoc conuenientia sicut in pro-
priis capitulis dictum est superius. Item no-
ta quod in omni tertiana tam notha quam ue-
ra post tertiam uel quartam accessionem alu-
men, & trifolium cum triphera saracenica an-
te horam accessionis tollit ipsam tertianam
& patientem liberat, secundum quod dicit
Ma. Petrus Hispanus senex in secretis suis. Itē
aliud optimum ad hoc post purgationem ser-
rētur sandali albi & ru. cum serra cū qua fiunt
pectines, uel cum simili serra, & illa serratura
cum succo uermicularis, uel semperuiue cum
syrupo ro. uel uiol. uel syrupo facto de herba
ribes in potu detur, uel cum aliquo succo her-
barum frigidarum & zuccharo in potu detur.
Dieta eorum sit mica panis ter uel quater in
aqua frigida lota, deinde cum zuccharo, uel pe-
nidis, lac amygdalarum, pitana, hordei, farina
hordei, spelta cum prædicto lacte condita, pru-
na damascena elixa, medulla citrulli, & melo
palestinus, uel iudaica granatorum succus cru-
da herba acetosa uel elixa satis est utilis, scario-
la, lactuca, cicorea, spinachia, portulaca, cucu-
hæc omnia elixa, & cū lacte amygdal. condita &
pauca agresta, uel aceto desuper infuso detur,
asparagi etiā elixi optimi sunt. Abstineat a car-
nibus & uino omnino. Quia non pura corpora
quāto magis &c. ut ait Hippo. apho. 10. particu-
læ secundæ. In die uero accessionis, uel nullus ci-
bus detur, uel detur cibus tenuissimus per quin-
que uel saltē quatuor horas ante paroxysmum,
quia in paroxysmis subtrahere oportet &c. ut ait
Hippo. apho. 10. particulæ primæ. Nihil igitur
in ipso paroxysmo dandū est de cibo. & hoc in-
telligas nisi uirtus esset ualde debilitata & ul-
tra modum dissolueretur sicut accidere consue-
uit in cholericis, in his enim cum apparuerint
accidentia uirtutem dissoluentia illico cibus
est dandus, s. in paroxysmo, & ante paroxysmū
etiam in statu. & hoc uult Gal. in commento
super regimine acutorum, & in cōmento aph.
9. primæ particulæ. In accidentibus itaq; uir-
tutem dissoluentibus illico cibus est dandus,
hunc modū tenebat etiam magister meus in
diatando infirmos suos, dabat igitur corpore
debili existente, & in huiusmodi febricitanti-
bus, & in aliis etiam febribus pulsem uel tor-
tam oui, uel prædicta olera cum lacte amy-
gdalarum condita apposito in eis pro condi-
mento frusto uno integro axungia recentis.
Cum uero iam pa. conualuerit utatur con-
fortatiuis & restauratiuis sicut est rosata nou-
uella, diamargariton, triasandali, diarodon
abbatis, electuarius ad restorationem & si-
milis in cap. de hectica dicta dentur. Sy-
rupus confortatiuus & restauratiuus substan-

trialis humiditatis. recip. succi boraginis lib. 4. florum roris marini florum boraginis, sc. bombacis, berberis, endiuiz, sandal. al. & ru. capreolorum, vitis, sc. papaveris albi omnium, an. dra. unius tertiam, se. basiliconis. drac. quartā. omnia hæc tertantur, & in succo boraginis prædicto bulliant usque ad tertie partis consumptionē, & addito zuecharo fiat syrupus, & in fine decoq. adde ambre & musci. an. scrup. i. & utatur quotidie, quoniam confortat spiritus & restituit miro modo. Item intestina porcellorum uel hædorum bene præparata & data, gallina etiā uel perdix quæ est melior decoquatur in pasta in furno inuoluta cum zirbo, ut sua bona humiditas referatur & parum de maiorana uel basilicone cum pul. cinnamomi spice uel galangæ ibi apposito detur, quoniam miro modo restituit. Ad tollendum paroxysmum tertianæ, accipe foliorum urticæ, foliorum salicis, vitis. an. M. i. terantur & cum forti aceto conficiantur, & circuncircā pulsus brachiorum inuoluantur per duas horas in accessione, & similiter circa pulsus probati in domino. Petro can. Experimentum magistri mei alleuian. ualde, & quandoque diminuens, & tollens totaliter paroxysmum sic quod amplius pa. non ledat. recip. oxizacchara. unc. i. s. succi cicoreæ. depurati. unc. 2. aquæ. unc. 4. omnia dentur in potu. Item os de corde cerui puluerizatum & datum in potu est mirabile & probatum. Et digesta materia electuariū de succo rosi uel diaprunis datus multum confert. Item triphera saracenicā ad quantitatem. unc. s. datæ cum unc. i. syrupi ro. & aqua frigida data in mane in die quietis, uel in duplici tertiana in die minoris accessionis mirabiliter dimiuit & tollit quandoque tertianam. Syrupus laxatiuus. compertens in tertiana feruida materia iam digesta, & in acutis & in calore hepatis secundum ma. Tadeum. recip. uio. cap. uen. berberis. an. unc. 4. pruna damascena. 30. manna. unc. 2. mirabolanorum citrinorum. unc. i. reubarbari. unc. s. radicis plantaginis. unc. 2. graminis, pentaphyl. an. unc. 2. terantur & fiant in aqua per diem & noctem, deinde coquantur ad medietatem, & fiat syrupus cum zuecharo: da de co. unc. 2. uel 3. cum aqua tepida. Experimentum contra tertianam. E. V. domini Papæ, medici, probi. digesta materia da. drach. i. centaureæ minoris mense Maij collectæ, uel saltem ipsa herbæ cū unc. 2. syrupi rosæ uel uio. uel cum unc. i. triphera saracenicæ cum aqua frigida: probatum est. Item fiat emplastrum. recip. cimini armoniaci mastice. an. terantur & cum mucilagine psilij distemperentur, & pone super uenas pulsatiles manuum & pedum per horam unam ante accessionem. Et hæc de cura ueræ tertianæ sufficiant.

Videamus nunc de tertiana notha, seu non uera. Notha igitur tertiana seu non uera est illa in qua omnia accidentia superscripta, uel plura conueniunt. Nā differt notha a uera in hoc, uidelicet, quia pa. nothā infestari dicitur debet de tertio in tertium in uespertinis & serotinis. Primo rigore maiore quam in uera tertiana, & calor sequitur non tam magnus. pulsus tardior est in hac quam in uera, urina minus incensa est quam in uera. Variatur enim urina secundum diuersitatem humorum complexionum & temporum. Item differt notha a uera in hoc, quia tertiana uera in 7. periodis longissima indicatur, ut ait Hippo. apho. 59. quartæ particulæ. Vnde tertiana uera nunquam transit septimum periodum, & si ulterius extendatur non est uera, sed notha. Item tertiana notha quamuis in æstate fiat: sæpe in iuuenē, & cholericō non fit, sed magis in senē, & si forte in cholericō fiat fit in hyeme uel autumno. Tertiana uera ut dictum est fit solum cū cholera rupeccat. In notha uero quandoque cholera citrina peccat, & quandoque nitellina. Urina igitur sub citrina, & in substantia citrinæ cholera remissa ad tenuitatem magis accedens quam ad spissitudinem tertianam notham de cholera nitellina ostendit. Vnde adest stomachi nimia repletio capitis grauedo, fastidium, & pa. prædicto modo debet infestari. Quando uero peccat cholera citrina, urina apparet citrina & in citrino colore remissa tempis modiocriter, magis tamen ad tenuitatem quam spissitudinem accedens tertianam notham de cholera citrina ostendit esse, & prædicta symptomata debent esse. Cholera uero æruginosa & cholera prasinā non colliguntur ad putredinem propter facilitatē & furiositatem motus, & ideo non inducunt se nec urinam mutant: urant. Haec in libro feci. Curetur itaque tertiana notha de cholera citrina uel nitellina hoc modo. detur pa. unc. i. s. syrupi acetosi de radicibus communibus facili quolibet mane cum aqua tepida decoq. sem. anisi, feniculi scarile, & mastice, & hoc fiat usque ad decimum uel undecimum diem, & tunc purgetur cum hierapigra Gal. drach. i. uel cū benedicta aut cū decoctione ista. recip. polypodij quercini optimi & nitidis bene rasi & ablut. dra. 3. se. feni. dra. i. hæc duo insimul cōterantur & admisceantur cum radice se. petro. apij asparagi brusci. an. M. s. uio. drach. i. pruna. 30. num. agari. drach. quartis. turbit, esulz. an. dñe tertiam. hæc omnia optime decoquantur in quinque lib. aquæ, quousque ad unam redeant, deinde colentur & colaturæ adde pulpæ cassiæ, thamarindi. an. dra. i. s. mirabolanorum citrinorum & cheb. an. drac. i. reubarbari. drach.

drac. quartis. zuechari uio. & ro. an drac. 1. si est aliqua opilatio in hepate prædictum reubarbarum teratur, & in succo endiuizæ per noctem iaceat, deinde in decoctione prædicta ponatur, & in matutinis tepida exhibeatur. Quod si prædicta cholera uicellina uel citrina in stomacho fuerit prouocetur uomitus secundum doctrinam superius scriptam in cap. de uomitu. Si dentur. drach. 2. de se. myrti trito & distemperato cum oxymelle & aqua cal. in poru uomitum prouocat, quod in quodam sene qui longo tempore passus fuit tertianam notham probauit, & postea dedit sibi. & uomitum prouocauit, postea dedit sibi hieræ pigre Gal. drach. 1. cum tepida, purgatus est optime & conualuit. Quod si post purgationem amplius inuaderet fe. accessio. ante horam accessions detur aur. alexandrina uel rubea cum calida. Si in æstate fuerit dietetur ut in uera tertiana, & alia remedia ibi dicta fiant secundum quod oportet. Si in hyeme aut tēpore frigido & in sene, uel puero dentur pulli, hēdi, pēdices, phasiani, fēniculum borago & similia. Et nota quod si dolor in pectore siue in spiritalibus fuerit semper debemus obseruare illud q̄ superius dictū est. sc. quod infirmo de penidii & dragaganto semper apponamus aliquid, & etiam quod nō purgemus pa. donec dolor quieuerit & cætera ibi dicta obseruari debent. Expertus sum in tertiana uera, & in quotidiana post. 14. diem digesta materia, & purgata per unam horam, uel duas ante principium paroxysmi dare. drach. 2. rubeg. troiscate & drach. 1. cum uino decoctura, & abrotani. & saluiz, quia tollit fe. in breui.

De duplici tertiana. Cap. XI.

DVplex tertiana fit de cholera in diuersis locis putrefacta, & in diuersis horis affligitur infirmus quotidie una die grauius, altera uero leuius. Adest calor magnus & feruens, pulsus uelox & acutus, dolor capitis intensus, uomitus cholericus, oris amaritudo, abominatio, rigor paruus, ita quod deficiente una accessione cū sudore, alia accessio insurgit quandoque. Vnde quidam existimant hanc fe. esse quotidianā uel continuā, sed continua rigore & sudore cognoscitur. Sed quandoque accessio durat per 12. horas ut quotidiana, sed in paruo rigore & acuto calore, & cholericu uomitu discrepat quotidiana. Vrina in hac fe. apparet rubra, uel subru. uel crocea in substantia per totū tenuis in principio, uel mediocriter spissa in statu uel declinatione superius obumbrata, & non liuens. Curetur duplex tertiana per omnia sicut tertiana uera curatur, excepto quod in hac debet fieri minutio in secundo uel tertio die de uena mediana, detur syrupus ro. cum fri-

gida. Utantur eadem dieta eodemque regimine, & eodem modo purgationis, & in omnibus his quæ in curatione tertianæ dicta sunt.

De tertiana continua. Cap. XII.

Tertiana continua fit ex cholera putrefacta in uasis affligit per 24. horas in summo labore, & per 23. horas in falsa quiete. differt autem à causon, quia materia causonidis est in locis uicinis cordi. materia uero huius est in locis remotis à corde. ideoq; symptomata quæ in causone emergunt, eadem igitur signa in utraque ipsarum apparent, sed differunt in quantitate malitiæ, utraque enim fit sine rigore, & utraque istarum uno die affligit magis quàm alio. Tertiana itaque continua eodem modo debet curari sicut causon hoc excepto, quod in tertiana minus frigidis expedit uti & minus tenui dieta quam in causonide. Utatur eodem regimine & eadem purgatione in cap. prædicto dicta, exceptis his dictis nunc.

De quotidiana uera de phlegmate naturali.

Cap. XIII.

Quotidiana alia continua, alia interpolata, alia uera, alia notha. Et primo de uera & interpolata dicamus. Quotidiana uera de phlegmate naturali habet fieri ut plurimum in hyeme, & tēpore frigido in senibus & mulieribus phlegmaticis. Cum enim ipsum phlegma naturale putrescit extra uasa, & non colligitur ad apostema facit quotidianā interpolatā quæ incipit affligere in tertia hora noctis. Primo rigore, deinde calore, & habet 12. horas ad plus in labore, & sex de falsa quiete. Si in declinatione, & sex in uera quiete. Vrina apparet subcitrina uel pallida & per totū spissa, adest indigestio, uētris & lateris extēsis. capitis gravedo, pigrities ad senem & ad motū somnolētia, oris insipiditas, spūti & salinarū abūdātia. Curetur huiusmodi febr. hoc mō. oī mane sumat unc. 3. oximellis de radicibus feni. petro. apii, asparagi, brusci, & radice lupulorū. Digesta materia quod fiet i 10. uel 12. diebus ad plus purgetur cū syrupo laxatiuo magistri mei in quotidiana uera optimo qui sic fit. recip. polypodij quercini. dra. 3. uide licet uiridis & bñ mūdati & triti cū. dra. 1. se. fen. turbith boni & gumosi, esule, agarici. an. dra. 3. pruna sicca 25. prædicta terenda terantur & omnia p noctē in aqua cap. jaceant. mane uero quousque tantum tertia pars remaneat bulliant, & addito zuecharo fiat syrupus, de quo des ante horam accessions digesta materia. drach. 2. uel 3. cum calida. Vel purgetur cum deco. ista. Reci. capil. uen. hepaticæ, scolopen-

driae adianthos: polytrici, cicoree, radicis asparagi, brusci, petro. fen. an. drac. s. agari. hermod. an. drach. 3. polipodij quercini contriti cū pauco se. fe. drach. 1. s. marathri. drach. 3. hæc omnia per noctē iaceant in lib. 3. aquæ: mane uero bulliant quousq; ad unam redeant, colentur & colaturæ addatur pulpæ calsie: triphere saracenicæ zucchini ro. & zucchini uiol. an. drach. 1. mirabolanorū chebulorum drach. 1. s. plus uel minus secundum q̄ magis uel minus uis purgare. Vel purgetur cum benedicta laxatiua, uel cum catarrico, uel cum blāca, uel cum oximelle squilitico, uel cum clareto laxatiuo, q̄ sic fit. recip. lib. 1. polypodij quercini uiridis & boni & cum drach. 2. se. feni. terantur & bulliant in lib. 3. uini boni quousque tertia pars minuatur, postea cola ipsum uinum & adde drach. 3. mellis uel zucchini, cinamomi, folij spicæ, cardamomi festium gariofi. & terantur species ista, & in prædicto uino ponantur & colētur per fasciam uel sacculum, & detur in potu lib. 1. quia bene purgat. Et magister meus cum huiusmodi clareto purgabat delicatos & specialiter gallicos qui mirabiliter abhorrent sumere medicinas & ipse loco medicinæ dabat huiusmodi claretum cum quo optime purgabatur & libenter ipsum fumebant. Item purgabat quosdam cum tragea quadam sua laxatiua, quæ sic fit. recip. turbiti boni gumosi. drach. 1. folliculorum senne, esulæ, hermodactylorum, polipodij. an. drach. s. masticis, semi. feni. & anisi. an. drac. 4. terantur & omnia cribellentur, & addatur zucchini ad pondus omnium dosis est. unc. s. & in qualibet dosi adde. grana. 5. diagridij in pomo cocti, quia mirabiliter ualet contra excessum phlegmatis. etiam arthetis mirabiliter ualet si utantur bis in hebdomada. Vel si uis potes purgare cū pul. petro. supra in passionibus scripto. Quod si post purgationem pa. stomachū suum adhuc sentiat repletum fore prouocetur uomitus cū his quæ in cap. de uomitu prouocando scripta sunt. Post purgationem uel uomitū si adhuc febris durauerit, ante horam accessionis detur mithridatum uel aur. alexandrina, uel adrianum & similia cum calida & inungantur renes cū aragon, cum marciaton agrippa oleo laurino pulegino & similibus. balneum etiam quod in ca. quartanæ dicturus sum corpore mūdicato antequā frigus eū inuadat intret: & ibi aliquis de dictis opiatīs suscipiat. Dētur sibi electuaria confortatiua, sicut sunt diamargariton, diacalamētū, dianthos & similia. Comedat carnes hēdinas, phasianos, perdices, sturnos, minores aues: & hoc dico postquā ægritudo iam 13. diem transuerit, & uirtus valde debilitata fuerit, alioquin si uirtus fuerit fortis & sufficiens usque ad statum & declinationem ægritudinis comedat solum farinam hordei cū lacte amig.

conditam amygdalatum colaturā furfuris feni. & boraginis cum eodem lacte conditam, pira & poma grossa affata quando aquam in qua coquatur radix feni. mistā bibant cū zucci. Cū uero in cōualescētia, fuerit uel cū ægritudo nimis protēditur & uirtus incipit debilitari, debemus dare prædictas carnes aures & pedes prædictorū cum feniculo & boragine coquinas, onasorbilia & similia, demus etiā uinum album & subtile, cū prædicta aqua lymphatū bibant.

De quotidiana notha: & primo de ea que fit ex phlegmate salso. Cap. XIII.

Quotidiana notha fit diuersis modis, quandoque ex phlegmate dulci, quandoque ex phlegmate salso & quandoque ex phlegmate acetoso. De phlegmate uero salso sæpius habet fieri, & fit quotidiana notha, in æstate, quandoque in autumno, qñq; in uere. Vnde in quolibet tēpore anni pōt superuenire. Signa igitur quotidianæ nothæ de phlegmate salso factæ sunt ista. Urina ruffa uel subruffa mediocriter tenuis in principio uel mediocriter spissa in statu & in declinatione & nō liuens apparet. adest oris faldedo digestionis corruptio capitis dolor pruritus & corpus uniuersum, & quandoque scabies, & maxime adest pruritus in inferioribus partibus corporis circa nodos & iuncturas. Pa. in nona hora diei in antea incipit affligi. primo rigore. de inde lento calore, & maxime usq; ad mediā noctē affligitur. Curētur in hunc modum, sumat omni mane unc. 1. syrapi acetosi compositi de radicibus facti cū calida in quo misceatur unc. 1. zucchini ros. noui. post uero quintam uel sextam accessiōnē materia iam digesta, prouocetur uomitus cū aliquo de prædictis uomitibus in cap. de uomitu dictis. Quod si nō fuerit facilis ad uomēdū cū oxy. catartico uel benedicta laxatiua purgetur, uel cū decoc. ista. recip. polypodij. drach. 2. agari. drach. s. epithimi uiol. an. drach. 1. se. feni. & anisi. an. drach. 1. s. terantur hoc oīa & bulliāt cū tribus lib. aqua quousq; ad unā redeāt, colent & in colatura ponantur. drach. 2. mirabolanorū citri. & drach. 2. s. zucchini, & sic per noctem iaceant in simul. in mane uero colatura propinerur. Vel cum ista decoc. alia purgare poteris ad hoc optima, cum qua magister meus huiusmodi febricitantes purgabāt. recip. scariolæ scolopen. boraginis cap. p. an. M. r. radicis petro. apii. an. drach. 1. florum uiolarum & boragi. an. drach. s. hordei mundi. P. r. pruna. 2. 5. coquātur omnia & bul. cū tribus lib. aquæ quousque ad unam redeant, & colaturæ addantur pulpæ colloquin. calsie. an. drach. 2. zucchini uiol. triphere saracenicæ an. drach. 1. zucchini ro. unc. s. reubar. drac. 3. pulpæ mirabolanorum citri. xeb. an. drac. s. Quod si post purgatio

purgationē infirmus nō perfectē curatus fuerit & remanserit aliquid de typo ante horam accessionis detur mufa aenea & mithridatum Adrianum, esdra, uel aurea Alexandrina & similia, quia mirabiliter ualent, dietetur ut in cap. de tertiana notha dictum est.

De quotidiana quae fit ex phlegmate dulci.

Cap. V.

Phlegma dulce quandoque corrumpitur: & facit quotidianam, quae similiter notha est sicut praedicta. In hac enim feb. apparet urina rufa uel subrufa in substantia per totum spissa sicut in colore sanguinis obumbrata parum superius. Circa mediam noctem incipit affligere inter horas phlegmatis & sanguinis lento calore typum non debet habere, quia materia non est ita frigida & humida ut frigus inducat: nec ita cal. & sicca ut rigore inducat, nec ita frigida & sicca ut horripilationē inducat, adest oris dulcedo digestionis corruptio, & ciborum supertorū putrida & fumosa eructatio tāquam ex ouorum putridorum comestione fetor nimis egestionū, grauedo capitis, spuri & salinarum abundantia dulcis. Curetur sic, omni mane sumat oxymel uel syrupum acetosum de radicibus cum aqua decoc. prunorum & marathri, farina hordei, lac amygdalarum, borago cum lacte amygd. cocta, asparagi elixi, lactuca, cicoreae elixate, mica panis lota, & huiusmodi exhibeantur. Cum uero materia fuerit ad expulsionem parata, quod fit in 24. die uel infra, detur haec deco. recip. ca. ue. scolopendriae, cicoreae, ceterach, polytrichum. M. i. radices feniculi, petroselinum, asparagi, brusci. an. M. s. agarici. drach. s. cuscuthae. drach. 2. radices bletae. drach. i. niol. florum boragi. an. drach. s. pruna damasce. 25. omnia in aqua bulliant, ut supra dictum est, & colaturae addatur pulpa castaeae. drach. 2. tripherae sarracenicae, zuchari uio. ro. manne. an. drach. i. mirabolanorum kebulorum. cura. 6. amygdalis dulcibus. drach. 2. Quod si post purgationem aliquid de tepido remanserit dentur aliquae opiatae ante accessionem, ut aurea, esdra, Adrianum & similia.

De quotidiana de phlegmate acetoso. Cap. VI.

Cum itaque contingit phlegma acetosum putrefieri, & quotidianam notham in eo accendi, tunc eius urina apparet in principio mediocriter tenuis uel mediocriter spissa, cum appropinquat ad digestionem, & est in colore glauca lactea uel alba, parum in colore huiusmodi intensa, haec enim feb. in sero incipit affligere inter horas phlegmatis & melancholiae. Primo horripilatione cum lento calore. Phlegma enim acetosum proprietatem habet cum melancholia,

& ideo inducit horripilationem. Adest oris acetositas, capitis grauedo, indigestio uentris, constipatio ueni. & lateris inflatio. Facies in contrarium mutat colorem, quia pallidior fit quam a natura esset. permutatio enim mali coloris non fit ob aliud nisi propter malam digestionem, & necessario sequitur malus color. Unde cum dico iste uel ille est male coloratus necessario sequitur quod male digerit. Cum itaque in phlegmate acetoso excessiue superabundante duae qualitates peccent principaliter. scilicet frigiditas & siccitas digestionem contradicentes, non est mirum si colorem in contrarium permittent. In hac ergo fe. primo ordinetur dieta non nimis tenuis grossior tamen in hyeme quam in aestate. farina hordei cum lacte amygd. coctam spinachiam boraginem, lactucas, & huiusmodi cum praedicto lacte coctas, asparagos elixos, pullam paruam perdicem & minores aues comedant, uinum subtile clarum, & bene lymphatum bibant. Sumant quoque libet mane. unc. 2. & s. huius syrupi cum calida. recip. radices asparagi, apii, brusci, petroselinum. an. M. i. corticum radicum interiorum, sambuci, & ebulli. an. drach. 3. hordei mundi. P. i. bulliant perfecte, & addito melle dispensato al. & zuc. an. fiat syrupus de quo omni mane detur ad quantitatem praedictam quousque materia sit digesta. Vel digeratur materia cum oxymelle squillitico cum syrupo acetoso de radicibus, uel oxymelle facto de radice raphani in uino, in mulieribus uero detur quolibet mane mel cum aqua decoc. radices feniculi. Digesta materia, quod cognoscitur per anticipacionem accessionis, uel per urinam mediocriter spissam purgetur per aquam decoctam ista. Recip. feniculi, epithymi, cuscuthae. an. drach. s. radices bletae, asparagi, brusci, feniculi. an. drach. i. haec omnia in tribus lib. aquae bulliant quousque ad unam redeant, & addantur colaturae pulpae castaeae. & mane. an. drach. s. tripherae sarracenicae. drach. i. s. zuchari uio. & ro. an. drach. s. mirabola indorum emblicorum & kebulorum cum. 8. amygd. dulcibus contriturum. an. drach. i. haec omnia per noctem infusum stent. mane uero colentur & colaturae ad unius globuli quantitatem per aquam detur in potu. Et si medicinas abhorreere uideatur, fiat ad hoc emplastrum supra stomachum & caetera in cap. de tertia tertiana dicta. Quod si constipatus fuerit eius uenter suppositorium aliquod uel clystere fiat. Utatur etiam balneo ante cibum, in mane in quo possint sint rosae & flores camomillae. Et cum exit summat aliquod de praedictis opiatis. Et inungant renes taliū, & spina dorsum ex oleo laurino camomillino & similibus cum butyro mistis, & hoc post bal. & huiusmodi infusiones. Et datio aliquius opiatae fieri debet post purgationem, ante enim quam euacuatio fiat sine purgatio per naturam siue medicinam non competunt praedicta.

De quotidiana de phlegmate uitreo. Cap. XVII.

QVando phlegma uitreū inducit quotidiana-
nam quæ similiter morba est: sicut & prædicta:
tūc urina talis in principio morbi apparet alba
glauca: uel alba cū gleba hu, appārente in ea un-
de in ipso dominio phlegmaris uitrei neli cū fe,
nel etiā sine fe. urina apparet spissa & globosa.
Cū uero iā appropinquat digestio quotidie de
die in diem attenuatur urina. Phlegma etenim
in principio suæ dissolutionis calore existente
debili dissoluitur in quadam frustula: unde red-
dit urinam discoloratam & spissam. In fine ue-
rò suæ dissolutionis calore in eo agente fortius
tanquam in materiam subiectam in subtiles &
aquosas partes dissoluitur siue resoluitur, quæ
urinæ admixtæ reddunt ipsam tenuem & mul-
tam. Cuius simile uidere possumus in niue quæ
si soli exponatur in principio resoluitur in gros-
sas partes, calore uero solis in eam fortius agē-
te in fine resoluitur in partes subtiles: & hæc
symptomata sunt in hac fe. Post tertiam horam
noctis incipit inuadere. Primo adest typus: de-
inde sequitur calor lentus. Adest maxima extre-
mitatum frigiditas: & sentitur circa loca in
quibus materia continetur, & etiam ibi sentitur
tanta frigiditas: ac si ibi esset frustum glaciæ
maximum ubi materia continetur, quod nimis
onerat pa, adest maxima indigestio: & quan-
doque per uomitum: & quandoque per seces-
sum quoddam modicum in modum glaciæ uel
nitri emittit nimis adest intestinorum dolor
& corrosio. Vnde quando Gale. huiusmodi
palsionem pateretur inquit: uidebantur inte-
stina quasi in eo quodammodo terebello per-
forari: sed clysterizatus sum ex melle calido:
& emisi phlegma quale Catagorax uitreū ap-
pellauit. Curerur hæc fe. sic: non nimis te-
nuis diætā iniungatur. Carnes pullinas: & mi-
norum auium, prædictum, sturnorum; phasia-
notum: & huiusmodi similia: & comedant ole-
ra prædicta. Vinum odoriferum, & clarum cū
aqua decoc. radicis fenī, & se. eius bibant à prin-
cipio quolibet mane sumant unc. r. s. oximel.
conditi de radicibus raphani uel oximel. squilli-
tici: quod sic fit. Accipe squillam & munde-
tur & frustatim incidatur & in aceto dimittatur
per duos dies cum M. 3. de radice fenī apii:
asparagi: & petro, deinde bulliant prædictæ radi-
ces cum aceto & prædicta squilla: & addatur
eis se, fen, petro, apij, anisi, & asparagi, an. unc.
2. & coquantur perfecte quousque tertia pars
remaneat, deinde colentur & colaturæ addatur
tantundem mellis dispumati & perfecte co-
quantur. Istud enim est oxymel squilliticum
& compositum: quod ualde comperit in his
fe. Digesta materia, quod cognoscitur per
urine attenuationem sicut superius dictum est,

& anticipationem accessions purgetur pa. cū
hialogodion uel benedicta laxatiua cū aqua
mediani corticis radicis sambuci, ebulli, inte-
riorum coloquintidæ. Et nota quod ista deco-
ctio est expertissima in erraticis febribus, uel
purgetur cum decoctione aliqua de supradic-
tis. Si uero dolor fuerit in ore stomachi pro-
nocetur uomitus cum aliquo de uomitinis in
prædicto ca. dictis. Si uero in intestinis con-
tineatur materia fiant clysteria acuta sicut est
istud. recip. mal. mercurialis senationum pari-
tarie urticæ uiol. brancæ ur. radi. sambuci: ebu-
liam. M. r. cantabri pugillum, idest. addantur
triphetæ sarracenicæ. drach. 2. mellis & olei.
an. drach. 1. s. salis puluerizati uel usti. unc. 1. Ex
in ipsa deco. addatur cucu. agrestis, & maliter-
ræ, & parum de turbith agarico coloquintida
esula & hermodactylis: & utatur. magis acutum
& magis forte clystere fiet sape. Si dolor est
in aliquo membro: & frigiditas inungatur mē-
brum istud unguento aureo aragon, marciatō,
oleo laurino, pulegino, camomillino, & si-
milibus. Cataplasmetur locus cum parita-
ria origano calefactis insimul. Cum fe. re-
cesserit detur diacalamentum, diamargariton,
uel diacyminum cum uino decoct. pulegii &
origani. Gale. etiam quod in cura quartanæ ue-
ræ dicta satis est utile in hac fe. post corporis
mundificationem. Et nota quod in phlegmate
uitreo siue cum fe. siue sine fe. semper debet ap-
parere urina discolorata propter frigiditatis
hementem excessum.

De febre quartana uera. Cap. XVIII.

Febrium quartanarum alia uera, alia non ue-
ra, & notha dicitur. Vera quartana fit de me-
lancholia naturali cum putrefit. Et fit magis
in autumno, sene, & melancholico per 24. ho-
ras affligit, & per 44. interpolat: magnus tre-
mor cum frigore fit in principio accessions, ut
ossa confrangi & distingui uideantur: sequitur
calor leuis & non nimis acutus: & magis durat
in tertia accessione. Pulsus in principio parvus
& tardus & occultus adest, deinde uero magnus
& plenus. Urina in principio palida & tenuis
per totum, deinde citrinescit & fit citrina: & te-
nuis per totum. In fine uero resolutionis ipsius
quartanæ quandoque emittitur: urina nigra &
spissa, & hoc est bonum si in bona quantitate
emittitur quia tunc signum est quod materia
faciens quartanam per urinam purgatur. Et si
etiam durities splenis in quartana uera consue-
uit esse. Curerur quartana hoc modo: primò
subtrahantur omnia cibaria grossum & visco-
sum humorem & melancholicum generantia si-
cut sunt pisces, lac, caseus, fabæ, caules, carnes
bovinæ, bubalinæ, scrophinæ, & similia: hæc
enim

enim sunt maxime durationis causæ quartanæ. Vnde primo dentur omnia cibaria bonum sanguinem generantia sicut carnes pullinæ, elixatæ, gallinarum, capreolorum, perdicum, phasianorum, hazdorum, & huiusmodi coquinatas & conditas cum feniculo, boragine, trifolio, & huiusmodi, & puluere canellæ & zinzii. in parua quantitate potest super dicta aspergi: vitella ouorum mollia in aqua elixata: & panem triticeum bene coctum & bene fermentatum comedant & recentem unius diei. Vinum clarum & odoriferum bibant lymphatum cum aqua decoctæ radicis feniculi, boraginis, scariolæ. In die vero accessions nihil comedant si abstinere possunt, uel comedant saltem in matutinis de prædictis ferculis & parum. Si enim potest abstinere à cibis quousque feb. incipiat declinare satis melius est non comedere quam si comedant. Ordinata dicta, quæ est satis potissima pars curationis secundum Gal. & etiā Auic. dicit quod non omnis ægritudo suo curatur contrario, sed sufficit quandoque solummodo bonum regimen in curatione ægritudinis. Et ad alia remedia medicinalia recurramus. Prima igitur, ponam curam magistri mei ad quamlibet quartanam expertam, & in pluribus per experientiam uidi quos in breui spatio curauit hoc modo. ad materiæ præparationem ipse dabat quolibet mane de isto syrupo cum tepida. recip. succi endiuiz, succi boraginis, succi feniculi omnium per se depuratorum. an. lib. i. succi pomorum dulcium lib. 3. pimpinellæ, linguæ bovis, kalendulæ, lauendulæ, ca. ue. scolopendriæ. an. M. s. prædictæ herbæ bulliant in quam quousque tertia pars remaneat & colentur & collaturæ addatur prædicti succi depurati, & additis zucchini lib. 3. fiat syrupus. Post purgetur hoc modo. dum materia digesta fuerit. recip. mirabolanorum citri. xebu. indorum. an. uncis. nio. larum. unc. i. florum boraginis. unc. s. pruna sicca & lota. 30. omnia insimul perfecte bulliant, & cum fuerint quasi decocta adde epithimi hortensis. drach. i. bulliant tribus bullitionibus & tota nocte sub sereno resideant. mane uero colentur, & addita. drach. i. penidiarum tepida exhibeatur. Item fiant pillulæ & dentur 3. uel 5. ante horam accessions per duas horas quæ. recip. peoniæ, gétianæ, castorei absin. an. drach. i. myrrhæ, oppoponacis, centaureæ maio. camedreos, camepitheos, sene, lapidis lazuli. an. Serup. 2. conficiantur cum theiaca optima & rubea troiscata. an. & fiant pillulæ grosse in modum ciceris parui, & dentur quinque ante horam accessions per duas uel tres horas, quia miro modo ualent. Et utebatur magister meus in die accessions ante horam solū quinque pillulis paruis factis de optima theiaca & myrrha. an. & notabiliter ualebant. In

die uero quietis quilibet mane & sero dabat ad quantitatem castaneæ de isto electuario, quod charissimum inter cetera reputabat & nemini in scriptis unquam cedere noluit: quod. recip. carniū mirabolanorum citrinorum xebulorum indorum. aga. uiol. an. drach. 3. anisi. reubarb. sc. ca. ue. eup. squinati, capparorū, galange, ligni aloes, epithimi hortensis, nucis muscatæ, cardamomi, lapidis lazuli, salis gemmæ. an. drach. 2. confice cum melle & zuccha. an. & des ut dixi. Post purgationem uero mittatur in bal. aquæ decoctæ istarum herbarum per horam antequam innadat eum frigus uel saltem pedes & crura in aqua decoctæ ipsarum calida teneantur quæ sunt istæ. recip. saluiz, lauiaz, rorismarini, pulegij, serpilli, polycariæ maioris & minoris, camedreos, camepitheos, origani, florum camomillæ. an. fasciculum unum, fomentetur & stuphet se bene in prædicta aqua. Et aliqua de dictis opiatis sumat, & hoc post purgationem fieri debet. Sympus magistri Petri Vicentini ad quartanam expertus. recip. camedreos, camepitheos, sene, thimi, epithimi, diptami. an. dr. 2. florum boraginis & sc. eius. an. tres partes radicis fen. petro. asparagi brusci. an. M. s. buglossæ, ca. ue. scolopendriæ. an. M. i. zucchini & mel. lis. q. s. detur ex eo quolibet mane. unc. i. cum calida. Digesta materia purgetur cum decoct. ista ad hoc experta. recip. thimi, epithimi, sene, cuscute, ellebori nigri, camedreos, squinanti, sticados, sc. fen. & anisi, petro. lupilli, cyperi buglossæ, fumiterre, radicis feni. apii, asparagi, brusci, petro. scolopendriæ, ca. ue. omnium. an. drach. s. hæc omnia in tribus lib. aquæ bulliant quousque ad uiam redeant, & colaturæ addatur mirabolanorum indorum. drach. i. s. xebu. drach. i. lapidis lazuli optimæ. loti. drach. 2. diasene simplicis. drach. i. zucchini ros. drach. i. s. detur calida hæc decoct. in matutinis prope diem uidelicet in aurora uel parum ante. Quod si decoctionem sumere non potest purgetur cum his pilulis in quartana uera & notha expertissimis. reci. sc. feni. anisi, melonum, cucurbitarum. an. drach. 2. interiorum colloquintidæ agarici. an. drach. 5. filipendulæ squinanti cassiæ lig. uiol. masticis, piperis albi, euforbii lignial. melliloti, centaureæ. an. drach. 2. anthere assæ fetidæ. an. drach. 3. sene, mirabo. indorum, xebu. cuscute, epithimi, lapidis lazuli, armoniaci. an. drach. 5. oleos. hepatici diagridii in pomo uel pasta cocti. an. drach. i. minus quarta squillæ assæ. drach. i. conficiantur cum succo absinthii addita aqua modica decoctionis casto. & formetur pillulæ in modum orobi & detur. ii. uel 13. uel 5. uel 17. uel 21. uel plus uel minus secundum uirtutem recipientis. Vel purgetur cum paulino, uel hie rapigra Gal. uel theodoricon, empeticon, uel hiera fortissima, uel cum pillulis de quinque generibus.

generibus uel cochijs, & his similibus. Troscisci optimi ad quartanam ueram, siue notham post purgationem dandi, qui ualent contra frigus febricitantium & extremitatum specialiter recip. hircos, succi eupatorii, ablinthij, fumi terre, an. drach. 1. semi. apij, anisi. feni. an. scrup. 1. salis gemme. scrup. 1. & grana. 4. se. cicuta, xebui. an. drach. 1. agari. drach. 1. s. ro. rub. scrup. 4. succi liquiritie spice. an. drach. 2. spodi. eupatorii. an. drach. s. turbith. drach. 3. conficiantur cum bono uino, uel cum succo fe. & fac trosciscos, quorum quilibet ponderet. drach. 1. des. unum cum paucis bono uino albo ante horam accesssionis in qualibet fe. cum frigore, quia miro modo ualent contra frigus quartanæ & etiam quotidiana, continua, uel interpolata. Experimentum quoddam ad remouendum infallibiliter frigus quartanæ accipe drach. 1. 3. bonæ theriacæ & misceatur cum drach. 1. succi menthæ communis depurati, & cum unc. s. boni uini puri albi & odoriferi, & detur hæc mistura ante horam accesssionis per duas horas. Et de eo quod in fundo cyathi remanserit iungatur os stomachi, quia mirabiliter ualet contra frigus ipsius quartanæ. Item si sumantur scrup. 4. mithridati cum drac. 2. succi plantaginis depurati ante horam accesssionis remouet infallibiliter quemlibet typum quartanæ. Item, drach. 2. succi radices rapsi bar. misticum tantum boni uini albi puri & odoriferi in potu dæ quartanarios liberat omnes ad plus infra tertiam uel quartam accesssionem. Et hoc sum expertus in me, & in pluribus alijs quartanarijs. Item os de corde cerui puluerizatum & in potu datum cum uino decoctionis diptami, saluæ, camedreos, camepitheos ante horam accesssionis bibitum mirabiliter ualet. Item pul. tartari & blactæ bizantiz & pul. de cornu cerui qualitercunque hæc omnia, uel aliqua eorum data in potu ante horam accesssionis ualent. Item theriaca cum uino decoctionis maioranæ ante horam accesssionis bibita, & succus hiri ante paroxysmum naribus immissus miro modo ualet. Item oleum rutæcum per os & nares infusum in principio paroxysmi, & statim sumat in potu pa. unum granum musci cum uino puro odorifero, & albo optimo tollit quemlibet quartanæ typum infallibiliter. Vnguentum expertum in qualibet quartana tã uera quàm notha: & iurauit mihi magister Hector Anglicus se cum hoc unguento quã plures quartanarios curasse: quod Reci. succi abrotani, succi rutæ, arthemisiz. an. drach. 1. olei communis, drach. 2. olei laurini. drach. 1. omnia infimul lento igne bulliant quousque succi consumantur. & adde tunc drach. 1. s. cere liquefactæ nouæ & fac unguentum, de quo unguento per unam horã ante accesssionem inter duos ignes iunge renes,

& spinam dorsinã usque ad caudam crurã & splenem umbilicum & uentrẽ & plantam maius sinistre & pedis sinistri, pulsus & tympora, & statim collocetur in lecto, & bene cooperiatur dato aliquo succorum prædictorum in potu cum uino odorifero, & hoc pluries fiat, quia pro certo in breui curabitur quartanarius, & specialiter si præcesserit uniuersalis purgatio. Aliud unguentum ad idem, de quo simili modo loca prædicta inungi debet. recip. succi cucule maioris, succi matricariæ an. cyathũ unũ, misce cum axungia porcina & oleo communis. an. & bulliant infimul usque ad succi consumptionem, & tunc admisce mastice & olibani puluerizatorum. an. drach. 1. ceræ & salis communis. an. drach. 3. inungantur prædicta membra & fricentur fortiter membra hoc unguento sic per totum quod quasi nigredo uideatur per membra pa. Et postmodum collocetur in lecto, & fiat ut supra. Et fiat hoc unguentum in qualibet quartana expertum quo utebatur magister Petrus Maroni de Salerno. Aliud unguentum quo utebatur magister meus ad idem. recip. castorei theriacæ. an. scrup. 5. myrrhe olei laurini. an. scrup. 4. musci ambræ. ana. scrup. 1. conficiantur cum lib. s. mellis despumati, & de hoc inungant stomachum cum incipiunt frigescere plãte manus & pedis sinistri simul & tympora & pulsus & frons similiter, quia hoc unguentum est expertum in prædictis. Et fiant statim duo stuelli de panno uel bombace, & in prædicta mistura intingantur & statim naribus intromittantur: & hoc fiat iuxta bonum ignem, quo facto statim sumat pa. in potu. drach. 1. de bona rubea troscicata cum bono uino albo, & statim pannis mundis calidis optime cooperiatur in lecto, & ad minus fiat in qualibet accesssione in tribus uel quatuor, quia pro certo hoc solo infra tertiam uel quartam accesssionem ad plus magister meus quartanarios curauit. Quiddam etiam Gallicus iurauit mihi, & erat homo fide dignus, quod quamplures quartanarios cum hoc emplastro curauit. Recip. farinæ tritici cribrata, thuris masculi siue albi puluerizati. an. drach. 2. temperentur cum succo menthæ, fiat inde emplastrum, & supra petiam ante paroxysmum tepidum applicetur a primo spondili spinæ usque deorsum supra caudam, & tandiu ibi remaneat quousq; per se cadat, & tunc pro certo liberatus erit, ut dixit mihi & insauit ille bonus homo Gallicus, cui nõ fuisset officium boni & probi uiri mendacia in damnum proximi dicere, eo maxime quia ubi tractatur de humanorum corporum sanitate, & econuerso de mortifero medicamine seu non bono non potest esse quin de exhibentium animarum damnatione tractet, & uerẽ dixit in se & in pluribus hoc experimentum probasse. Tamen nota quod huiusmodi

huiusmodi emplastrum & unctiones prædictæ maiorem habent efficaciam si fiant corpore purgato, quàm si fierent corpore repleto. Quidam dixit mihi quòd passus fuit quartanam sepe per annum, & quamplures curæ sibi factæ fuerunt, & non potuit liberari. Cum autem quadam die in uadere incoeperat eum se. erat eques bene armatus & inuaserunt eum inimici sui, sic quod oportuit cum eis præliari, & transiit horæ accessions durante prælio, & sic liberatus est, & non habuit amplius quartanam. Vidi quendam quartanarium qui in prius paroxysmi iactatus fuit in quodam paruo flumine eo ignorante, & propter illum timorem quem habuit liberatus est. Vidi etiam quendam aliū apud quem factū est quoddam artificiale tōnitruum in principio accessions, qui intantum timuit quòd liberatus fuit. Vnde nota quòd hæc feb. multoties propter timorem expellitur, & specialiter quādo est in declinatione, multi etenim decipiuntur medici in hac feb. curanda, & specialiter nisi sint bene solliciti circa ipsam curam, & quandoque etiam cum tota eorum solitudine & studio ipsam quartanam expellere nequeunt, & propter hoc quartana uocatur à quibusdam uirperium medicorum. Quidam enim medici sunt qui in hac feb. semper assistunt cum purgationibus non attendentes circa alia particularia experimenta, & nunquam ueniunt ad finem curationis ipsius egritudinis. Si quis igitur secundum infrascripta experimēta processerit Deo auxiliante in breui ipsam quartanam de possessione corporis quod inuasit cito tanquam indigne, & indebite possidentem eiiciet sine dubio, & eam perfecte curabit. Aliud ad idem. recip. myrrhæ electæ drach. 2. fiat pul. & cum theriaca quantum sufficit fiant pillule ad magnitudinem ciceris, & da quartanario quolibet die unam. In die accessions lōge ante horam accessions da quinque. Ad idem recip. myrrhæ ad quāritatem ciceris, tere, & cum succo absinthii & rutæ depurato ante horam accessions detur. Et si ex hoc soluat ur uenter optimum est.

De quartana uera non siue notha.

Accidit quandoque cholera aduſtam putrefieri cum ipsa accenditur, & fit fe. quartana quæ non uera siue notha dicitur. Et tunc urinalium debet apparere ruffa uel subru. & tenuis. pa. de quarto in quartum diem affligitur. Primo rigore potius quam frigore uel tremore, calor acutus magis quàm in uera sequitur, pulsus uelox & spissus, & sitis quæ consuevit in tertiana uel aliqua acuta esse in hac feb. adest. Si materia quartanæ est in stomacho ab ipso prin-

cipio cum incipit paroxysmus est dolor stomachi. Et tunc cura istius quartanæ est prouocare uomitum in principio paroxysmi idest antequam incipiat cum aliqua medicina uomitiua. Si uero materia est in intestinis, est dolor intestinorum & tortio, & cum incipit paroxysmus egestio pauca emittitur, sic quòd multum sunt constipati, & hæc partium per clyſteria acuta, & partim per medicinas laxatiuas dictas superius curatur. Si materia fuerit in hepate pa. huiusmodi quartanam. urina accedit spissitudinem & ad nigredinem. Et hæc per prædictas purgationes & per urinam prouocantia curatur. Et si gnum. quartanæ cuius materia in specialibus cōtinetur est, quòd ampullæ apparent in superficie urinæ & sitis non de facili corrigitur ex potu. Quòd si materia quartanæ fuerit in splene ab ipso principio adest durities splenis, & etiam in principio paroxysmi sentit pa. punctiōem & dolorem in sinistro larese circa splenem. Et per purgationem & medicinas & unctiones in præcedenti capitulo, & in cap. de uitio splenis dictas curatur. Cura etiam quartanæ nothæ est quòd ordinetur diæta in quartana uera dicta, & eodem modo regantur isti sicut & illi. Postea in digestionem materiæ detur pa. quolibet mane. unc. 1. s. de oxymelle composito cum radicibus raphani. uel solum cum oxymelle composito uel oxizaccara composita, & dentur hæc cum decoctione florum boraginis & feniculi. Cumque materia ad expulsionem parata fuerit purgetur pa. cum decoc. ista. recip. cap. uen. scolopendrie, ceterach. polythrici, adiantos. an. M. s. radices feni. petro. asparagi, apij, brusci. an. drach. s. sc. fe. & anisi, sene. thimi, epithimi. an. drach. tertiam, uiolarum florum boraginis. an. drach. s. sc. communium. drach. 2. pruna damasc. 25. hordei mundi. P. 1. reupontici. drach. 1. hæc omnia bulliant in lib. 3. aquæ quousque ad unam redeant, & colentur & colaturæ addatur mirabolanorum. cirrinorum & indorum. an. drach. 1. s. & quarta pars. drach. unius reubarbari puluerizati, quod prius iacuit per diem in succo apij depurato, zucchini uiol. & ro. an. drach. s. Et si fuerit de phlegmate aduſto, adde agarici. drach. quartarium. uel purgetur cum oxymelle laxatiuo, uel cum catartico imperiali, uel cum triphera sarracenica. Syrupus etiam diaquilon detur in potu. Et si pa. fuerit fortis complexionis etiam sanguineus multum celebretur sepius minutio. Et si de phlegmate fiat quartana notha uel uera. cuius signum est quòd urina apparet alba & spissa, & frigus maximum adest & multum durans, calor uero non durans, tunc huiusmodi feb. ut uera quartana, uel uera quotidiana, curatur, hæc tamen species quæ quæ sit de phlegmate cum difficultate & uera quartana, & etiam ea quæ sit de cholera

Iera adusta curantur. Vnde si medicus procefferit ad curam earum secundum superius scriptam doctrinam liberabit eos.

De febribus erraticis. Cap. XX.

Confueverunt aliquando in quibusdam hominibus & mulieribus, & specialiter in autumno se. accidere, quæ erraticæ seu planeticæ nuncupantur, eo quod certum terminum accessions non seruant neque certum numerum in accessione habent. Interdum enim mane usque ad tertiam, uel meridiem, uel in sero, uel in galli cantu, uel in media nocte pa. affligunt bis, quandoque quater uel sepius, quandoque semel, quandoque nullo modo affligunt pa. & postea incipiunt, & nullo ordine seruato procedunt. Fiant enim ex phlegmate melancholia uel cholera simul mistis in aliqua parte corporis, & specialiter in autumno, ut dixi. Et frequenter mutantur in quartanam, quia reliquis humoribus pro maiori parte consumptis, quod remanet sumit melancholiæ habitudinē, & facit quartanam. In primis in huiusmodi feb. ordinetur diæta nō multum tenuis nec multum grossa. Postea dentur omni mane uel die uel nocte. 2. oxymellis compositi, uel de radice raphani facti cum aqua calida. Postea euacuetur humor cum aliquibus, quæ cholera phlegma & melancholiam euacuant, sed magis apponantur de respicientibus melancholiam, sicut est lapis lazuli, sene, thimum, epithimum, & huiusmodi secundum quod scriptum est superius in cura quartanæ ueræ, ubi scripta est decoctio ad hæc optima. Dentur etiam quandoque sibi pilulæ factæ ex galbano, casto, sifeseleo, peonia, an. drac. 2. aloes hepatici, uel succottrini. drach. 3. informantur cū uino & malaxentur cum oleo laurino, & fiant grosse in modū ciceris, & dentur 5. uel 7. bis uel ter in septimana in sero. Et si frigore molestantur post purgationem, bal. quod in cura ueræ quartanæ scriptum est satis, est utile & mithridatum, musa zncea, aurea, hederæ, & similia cum uino calida dentur. Et si etiā de dolore capitis conquerantur post purgationem, detur etiā rubea trociscata. Et nota quod in hac pa. non est utile multum cū purgationibus insistere, nisi pa. ex usu habuerit.

De quotidiana continua. Cap. XXI.

Quotidiana est febris de phlegmate putrefacto intra uasa, cuius signa sunt hæc. Urina apparet ruffa uel subrufa, & æqualiter spissa non manifeste, sed cum manus appositione parum liuens & inæqualis, quia quandoque fit fortis, & quandoque debilis, facies tumida, & subalbidæ, sitis modica aut nulla, & habet 18. horas

in summo labore, & 6. in falsa quiete. Et nullo frigore seu rigore molestatur infirmus propter totius materiei positionem intra uasa. Et per hoc a laborantibus minori emitritæo differunt. Subueniendi sunt isti, & sunt curandi quemadmodum pa. minorem emitritæum in diæta, & in omnibus. Excepto quod in minori emitritæo euacuamus phlegma & cholera. In hac uero fe. principaliter insistendum est cum euacuantibus phlegma, sicut decoc. agarici, poly. podij, turbit, mirabo. xebu. & huiusmodi secū dum quod in cap. de tertianis interpolatis scriptum est. Suppositoria & clystera etiam fiant phlegma educantia. Et si fiant stupidi fiant fricationes, & alia huiusmodi in cap. de lethargia dicta. Diætentur simili modo sicut pa. emitritæum minorem. Et si nimis debiles fuerint detur pulla cum hordeo, uel succus eius. Quod si appetitus in eis deficiat quod sæpe accidere consuevit in istis, prouocetur hoc modo. Panem assum. in aceto infusum odorent calidum. Et falam ex prædicto panē in aceto asso infuso, & mentham in ore teneant. Et ex ipsa falsa fricetur manus eorum & pedes. Item caseus, mastix, & olibanum cum oleo ro. in testa oui bulliant supra ignem. Et ex his iungatur stomachus pa. Et alia remedia in cap. de defectu appetitus dicta si fuerit necesse in hac causa fiant.

De quartana continua. Cap. XXII.

Continua quartana est feb. quæ fit de melancholia putrefacta intra uasa tantum, & habet 24. horas in summo labore, & 48. in falsa quiete. Et fit sine frigore & rigore, pulsus in initio est paruus tardus & occultus, postea magnus & plenus. De urina enim non datur certia regula in hac feb. quia diuersimode mutat. urinam. Sed certius signum per quod potes eam cognoscere est illud quod dixi, uidelicet quod tot horas habet in summo labore quot & uera quartana, & tot habet horas in falsa quiete, quot quartana uera habet in uera quiete. Similiter quotidiana tot horas habet in summo labore quot quotidiana uera interpolata, & tot horas habet tunc in falsa quiete, quot ipsa quotidiana interpolata in uera quiete. Similiter & tertiana continua tot habet horas in summo labore quot & tertiana uera in summo labore, & etiā quot habet horas in uera quiete tertiana uera, tot habet horas ipsa tertiana continua in summo labore. Vnde in continua quartana nulla est quies. Similiter in quotidiana continua, & etiam in tertiana continua. Sed quartana etiā fortius affligit de quarto in quartum, & tertiana continua fortius affligit de tercio in tertium, & sic de alijs. Consuevit itaq; quartana continua multoties usq; ad 40. diem & ultra protrahendi,

tendi, & tunc nō debemus insistere nimis cum subtili diætā cū sit chronica ægrotudo. postquā iam 14. diē transiuit, q̄a ut ait Hipp. apho. 23. secundā particulā. Acutæ ægrotudines in 14. diebus iudicantur. cum autē 14. diē transierint iam nō nominantur acutæ, sed chronicæ. Cum itaq̄e alibi dicat Hip. aph. 5. particulā primā. In tenuibus diætis peccant &c. Et tēues & cerē diætā in diuurnis ægrotudinibus, & acutis quibus non conueniunt &c. ut ait Hip. apho. 4. particulā primā. Et ideo ab ipso principio deī farina hordei, ptisana colata, fursus, oua mollia, & huiusmodi similia cum lacte amygdalarum condita, pruna elixa, succus malorum granatorum & huiusmodi. Cum uero ægrotudo transierit. 14. uel 20. diē, & uirtus incipiat debilitari debemus pullam & succum eius, & cārnes minorum auium & huiusmodi sterilia dare. Clysterizetur cum clysteribus in quibus aducentia phlegma & melancholiam ponantur, si cur est hoc. recip. polipodii agar. turbich, sene, thimi, epithimi, cuscuthæ, centaureæ minoris, an. drach. 1. colloquintidæ tritæ. drach. s. radi. ebuli & sambuci an. drach. 4. radicis cucur. agrestis drach. 2. fursuris, se. lipi & fœnugræci omnium an. p. 1. salis. p. s. hoc omnia decoquantur. quousque solum tertio pars remaneat in fundo caerib; & colaturæ addatur. Mellis an. drach. 1. olei. drach. s. triphetræ sarracenicæ. drach. 2. cassiæ. drach. 1. s. benedictæ laxatiuæ. drach. 1. fiat clyster hoc sæpius. Vel soluantur uenter cum decoc. quæ educit phlegma & melancholiam quæ scripta est in cap. de quartana uera, uel cū pitulis uel electuario ibi scriptis, uel emplastrū laxatiuum super uentrē ponatur. In hoc enim loco emplastra laxatiua & unguenta laxatiua, quæ in locis diuersis habui dispersa simul aggregabo. Emplastrum laxatiuum quod si supra uentrem ponatur, & ibi per noctem teneatur uentrem soluit in hac feb. & in omnibus aliis ægrotudinibus in quibus est uentris constipatio competit, & specialiter materia digesta. recip. cētauræ, gith. absinthij, farinæ lupinorum. an. drach. s. mastice. drach. quartam aloes. drach. 2. conficiantur cum succo absinthij, & fiat emplastrum, & tepidum supra umbilicum & uentrem apponatur. Aliud ad idem. bulliant in oleo communi, aloes cicorini. drach. 3. & fiat in modum unguentis, & tunc pul. polpodij, & turbich. admisceatur, & supra uentrem totum emplastretrur. Aliud emplastrum laxatiuum expertum si supra uentrem ponatur, & ibi per noctem teneatur mirabiliter laxat & co utebatur multoties Ma. me. in hydropicis, spleneticis, & in omni ægrotudine repletionali, & in pueris hydropicis, & aliis qui non sunt apti ad capiendum medicinam. recip. radicis ciclamini. dra. 1. radic. cucur. agrestis & foliorum eius.

an. drach. 1. fellis taurini uel naccini cyathos. 3. colophonie, ellebori albi puluerizati. an. dra. 2. ceræ drach. 5. olei ueteris drach. 4. omnia diligenter terantur, & liquefiat, & in unum corpus conficiantur in modum unguentis, & inspissentur, deinde supra pannum huiusmodi emplastrum extendatur & supra uentrem calidum apponatur, ita ut totum uentrē ab umbilico inferius, & etiam parum superius cooperiat, & ponatur in gallicantu. deinde pa. in lecto suo quiescat, & sit bene munitus a frigore, plus enim soluit quam catarticum. Et cum. usque ad 10. assellas soluerit, tunc pa. iuxta focum in mansione calida colloceatur & diligenter totum emplastrum de uentre suo radatur, ita quod antequam ab aqua uenter tangatur sit bene rasum inferius prædictum emplastrum, & uenter cum panno optime sit abstersus, deinde uenter ungatur ex melle. hoc fiat huiusmodi hydropicis ictericis & spleneticis, & similibus his semel uel bis in septimana si uirtus sufficiat quousque sine perfecte curati, quia expertū est. Aliud unguentum laxatiuum quod solum fit ex felle taurino oleo & salis gemma in simul mistis. Unguentum aliud laxatiuum. recip. saluiz bene tritæ. Mame. ellebori drach. 1. olei. drach. 3. omnia bul. in uino albo prius trita bene quousque uinum consumatur, & sit tanta quantitas uini quod supernaret saluiz, post coletur cum uinum fuerit consumptum, & colaturæ addatur. mastice, ellebori al. aloes an. drach. 1. omnia puluerizata, & in uinum confecta simul incorporentur, & addita pauca cera liquefacta fiat unguentum, de quo uenter ungatur & petia superponatur. Et cum restringere uolueris ducatur pa. ad bal. uel saltem iuxta ignem, & radatur optime emplastrum a uentre & inungatur uenter ex melle calido, deinde aspergatur super ipsum mel. Emplastrum aliud quod multoties sum expertus quod si supra uentrē ponatur celeriter soluit. Si supra stomachum uomitum prouocat. Si supra renes urinam prouocat. Si supra pectinem mulieris fetum mortuum educit. Sed case statim cum operatione in suam ad effectum deduxerint quod ipsum statim remoueat, quia nimis educere posset. Et magister Henricus Anglicus Neapoli comorans dixit mihi q̄ in his omnibus hoc emplastrum erat expertum, & nunquam ibat sine eo & sic fit. Recip. lacticiuij drach. 1. cathaputiarum, interiorum colloquintidæ succi tithymali, an. drach. 6. succi cucu. agrestis, ellebori nigri, terebentinæ, an. drach. 4. cocognidij drach. 1. scā laureolæ, drach. 2. succi maliterræ. drach. 6. scā monez, drach. 3. omnia puluerizentur, & cum melle simul conficiantur & usui reseruetur: quoniam hoc emplastrum ad omnia prædicta est expertum. Unguentum aliud optimum laxatiuum

tium quod ualet lapidosi cōstipatis nephreticis, iliaticis, & hydropicis supra pectinem & uentrē inunctum. Et cum inungere uolueris caueat sibi pa. quod non comedat nisi primus. 6. horæ transeant. recip. succi cucur. agrestis, succi interiorum squillæ, radices anabulæ, succi mali terræ, succi radices ebulli, succi radices corticum medianorum sambuci, lactis tithymalli, chimo-leæ. an. drach. 3. uiol. succi cucu. agrestis. & pomorum eius, camomillæ, succi mercurialis, succi radices polypodii, succi herbæ catapuciæ, lau-reolæ, cap. ve. an. drach. 2. diagridij. drach. 1. s. nucis indicæ. drach. 1. euforbii. dra. 1. fellis tauri, aloes hepatici, uel succotrinii. ana. drach. 2. omnes supradictæ herbæ in mense Maij colligan-tur & conficiantur sic, succos catapuciæ cum lib. 3. olei. 7. diebus misce. octauo uero die tan-diu coque donec succorum quantitas consu-metur, & tunc adde ceræ al. drach. 1. & fellis tau-ri, & semper agites donec fel & cera liquefiant postea pul. terendorum addatur & usui reser-uetur. Et hæc de unguentis & emplastris laxa-tiuus in hoc loco ad præsens sufficiant.

De febribus pestilentialibus. propter aeris corrumptionem factis & de regimine sanorum in pestilentia obseruando. Cap. XXIII.

ET quia quandoque contingit aerem corruppi & morbos pestilenciales ibi generari ubi hæc corruptio aeris fit. Ideo de huiusmodi aeris corruptione agamus tã in sanis quàm in ægris utilia aliqua aggregantes. Isti enim morbi ut plurimum fiunt in fine æstatis, & in principio autumnus, quorum signa sunt hæc. aliquando in eadem die minatur pluuiã per tonitrua. & cor-ruscationes, & quandoque per tempus nebulo-sum & non pluit, apparent in aere uelut ignes rubicundissimi, multiplian-tur animalia ex pu-tredine generata, sicut sunt formicæ alate, mus-cæ, & huiusmodi apparêt, & apparent supra ter-ras modi mirabiles animalium & serpentum quæ fugiunt a locis suis propter uehementem aeris corruptionem, aues etiam quæ quandoq; de die uolare consueuerunt de nocte quando-que uolant & dimittunt nidos suos & oua, & non fiat uentus aliquis, aut fiat auster, & tunc est signum quod pestilentia est ibi propinqua. Cum itaque hæc se. superuenit alicui homini uel multis hominibus insimul in principio nõ nideretur multa caliditas & acuitas in huiusmo-di ægrotantibus, neque multum calidi sentiun-tur cum tanguntur huiusmodi infirmi cum oc-cultis corporis partibus & ipsius profunditate maximum lateat nocumentum ex ipsius aeris corruptione generata. sunt enim huiusmodi feb. ualde lentæ & deceptoriz, & sentitur in eis anhelitus ualde fætidus & egestio etiam ualde

fætida, & omnes superfluitates quæ ab eorum emittuntur corporibus, sitim maximam & do-lorem & angustiam in spiritualibus patiuntur, & eorum anhelitus augetur, quandoque cum uomitu & egestione aliquid ualde fætidum & durum emittunt, deinde aliquando eis super-uenit syncopis & subito moriuntur. Vnde pro-pter huiusmodi accidentia reputantur pericu-losissime & perniciosissime huiusmodi feb. Pri-mum itaque & tutius consilium quod possit in huiusmodi egritudinibus exhiberi, & etiam sa-nis est hoc. uidelicet, quod statim cum appa-rent signa pestilentiz superius dicta fugiant in continentem ab illo aere tam infirmi quàm sani, & ad alias contractas tendant seu portentur si commodè fieri potest. Quod si ad prædicta loca sana commodè se transmittere nõ possint forte propter maxima discrimina, uel propter alias causas contradicentes, succurratur prædi-ctis se. in hunc modum. Aer unius particularis cameræ alteretur, in qua sit infirmus & infrigi-detur hoc modo. recip. foliorum myrtillorum lib. 1. s. sandalorum alborum & rubeorum. an. lib. 5. ros. lib. 1. bulliant omnia hæc in aceto & aqua, & deinde ex ista decoctiõe parietes & pa-uimenta cameræ irrorentur, herbæ frigida, si-cut sunt frondes salicis, cannarum vitis cymba-lariæ uermicularis, & huiusmodi per domum sternantur, uel ex solo aceto fiant hæc. Et 15. uel 20. spongiz marinz lotæ in aqua dulci & extor-tæ circuncirca parietes, cameræ aceto fortiter re-pletæ suspendantur uel in prædicta decoctio-ne infusa, hæc enim fortia sunt in rectificando aerem. Aqua etiam frigida per cameram in mo-dum riui ducatur uel coram pa, distilletur. & coram eo uentiletur aer quotidie cum flabel-lo, quia ex tali uentilatione per motum flabelli facta putrificatur aer & prohibetur ipsius aeris putrefactio. Aqua ros. multoties in die super faciem eorum aspergatur. Syrupus acerosus uel oxizaccara, & syrupus etiam ro. & nenufari cum pauca camphora aromatizati cum frigida in potu tribuantur pluries inter diem & no-ctem. Farinam hordei comedant, amygdalas, ci-cera, scariolas, lactucas, & similia cū pauca agre-sta, uel aceto, uel cum succo pomorum citrino conditas, postea in aqua elixas. Et si ul-tra modum fuerint debiles succum pulg, ubi fuerit parum de agresta, uel de prædicto aceto demus eis. Pomum etiam istud semper odo-rent quod optimum est pro sanis, & etiam pro medico, quia mirabiliter ualet contra putrefac-tionem aeris, recip. drach. 1. camphoræ pul. sandalorum. alb. & rub. an. drach. 5. ros. drach. 1. s. foliorum myrti, & sem. eius. an. drach. 2. thuris myrrhæ. an. drach. 1. laudani. drach. 2. aceti fortis. drach. 5. gumi arabici. & dragagan-ti. an. drach. 1. resoluantur omnia prædicta in aqua

aqua ro. & ex his sic resolutis pomum vñ conficiatur quod de manu in manu saepe muetur. Odorent infirmi necnon medius etiam cum vadit per terram visitando infirmos: quia multum confortat, & inhibet aere corruptum. Pomum etiam citrinum, nana, & similia odorent. Aliud pomum optimum, & expertum quod si odoretur, & specialiter a sanis hominibus mirabiliter pferuat corpus illesum ab omni aeris putrefactione pestilentiali, & corrupto ab omni fetore, letitiam generat, & confortat spiritus, & totum corpus in sterilitatem facit conuertere. Rec. ambre musci laudani. ana onc. j. gariofilo. cinamomi alipte muscate ana onc. iij. gumi arabici camphore. ana pondus vnum, omnia hæc puluerizata cum aqua rosata simul ad ignem dissoluantur, & incorporentur in simul, ex quibus omnibus pomum componas ad libitum perforatum, vel non perforatum, & odorandum exhibeas non febricitanti tamen, quia in sanis magis valet. Suffumigatio optima valens ad omnia prædicta ad quæ valet pinum, & specialiter in sanis loquor. Rec. ambre musci. ana onc. j. xilaloes. onc. vi. camphoræ. onc. iij. fiat hoc modo, ambra prædicta ponatur in vase pulchro, & nido supra cineres calidos & cum parum aquæ ro. agitetur diu donec inspissetur, deinde apponantur dictæ species cribratæ subtiliter, & moueantur, & coquantur vt durum fiat in modum marmoris; sic quod projiciatur supra marmorem oleo inuncto, & usui referua, quia fumus eius receptus in pannis, & in corpore super carbones accensos valet magis quam credi possit. Confert enim in tempore pestilenti miro modo sanis, & etiam infirmis; huiusmodi enim fumus epilepticis, & cardiacis, naribus, auribus, & ori ferentibus, putridis dentibus, & gingiuis, coitum prouocat, stomachum confortat, & ad omnia ad quæ prædictum pomum valet, & istud fumigium similiter valet, & ad alia quam plurima. Syrupus continens sanguinem ne ebulliat, variolas prohibet, & etiam sudorem compescit, & in aere calido, & in tempore pestilenti valde utilis est. Rec. succi malorum granatorum acetosorum vuae acerbæ ana lib. vi. castanearum mundarum, aque rosate ana onc. iij. succi polytrici, & acetii acerrimi. ana libr. vnam. Malorum acrium, & malorum cydoniorum ana libr. vnam. coquantur omnia cum libris quat. sei zucchari, & fiat syrupus, & quotidie vtantur eo infirmi & sani, quia ad prædicta omnia miro modo valet & efficax est.

Quod si pestilentialis aer ab inferioribus

insurgat vt ab apertione fossæ terræ vt accidit meis temporibus prope neapolim vbi cecidit in ruinam quidam mons, & exierunt de illo monte serpentes quasi infiniti, & multo struosi, & corruptus est ibi in tantum aer, & omnes de terra quasi mortui fuerunt. Si igitur a tali apertione simili modo confurgat aeris corruptio, vel forte a cadaveribus mortuorum vt hominum, vel equorum, vel aliorum animalium putridorum in loco aliquo existentium ipsum aerem inficiant, vel si forte a malis herbis corruptus sit aer, sicut sunt ebuli, sambuci, volubilis succus cicute, & huiusmodi herbe similes aut minera sulfurea vel aluminosa, & hæc per visum discernuntur, vel forte corruptus fuerit aer a corruptione principali, & putredine a subtertaneis partibus procedente quod cognoscitur per egressum diuersorum & monstruosorum serpentum, & animalium de suis cauernis exeuntium, & supra terram hominibus apparentium quæ sentiunt corruptionem aeris ab inferioribus prouenire, nec possunt in suis locis esse, & sic fugiunt supra terram. Tunc qualitercunque huiusmodi aeris corruptio secundum prædictos modos ab inferioribus proueniat tutior via, & melior est quod huiusmodi homines a prædictis locis tam sani quam egri habitare fugiant si commode hoc fieri potest. Sin autem querantur hospitia alta, & agitata a ventis, & fenestræ sint apertæ, & aer cum flabello verberetur, & in frigidetur cum superius dictis.

Quod si ipsa aeris corruptio a superioribus inferatur, quod cognoscitur per volatum anium contra naturam, quia anes quæ de nocte volare consueverunt, volant de die & econuerso. & per signa alia in aere apparentia quæ superius in principio huius cap. dicta sunt. Similiter vtilior via est, quod tam sani quam egri a prædictis locis se moueant, & querant sana loca. Si autem sint in locis subterraneis, non per terram ambulent nisi prius aer per solem depuratus fuerit, vt accidit circa tertiam, & ab illa hora in antea infirmi in prædictis locis subterraneis collocati sint, & fenestræ sint clausæ, & in frigidetur aer in ipsis. Et omnia supradicta remedia fiant in hoc conuenientia. Aquæ etiam rectificentur distillando, vel saltem coquendo eas, & postea in frigidari permittantur, & exhibeantur vt docet. Caveant sibi tunc sani a coitu, quia multum nocet in passionibus his membra principalia debilitando. Et non ambulent per terram, vt dico nisi prius sol depurauerit aerem. Et si necessitas cogat aliquando eos ire portent semper in manu pomum aliquod de suprascriptis,

& semper odorent ipsum. tutius tamē est stare in camera in qua sit aer particulariter alteratus secundum q̄ superius docui. Diēten tur egri secundum q̄ dixi superius. Sanis vero hedinā pullinā castratinā & huiusmodi carnes cum aceto: vel agresta paratę dentur: quoniam declinare ad acetosa in hoc tempore est valde tutum. Et sint carnes. quibus vrū tur sani vel egri animalis sanissimi: & non egri. Si enim in prędictis animalibus fuerit pestilentia caueant sibi homines ab eis: quia huiusmodi carnes solum essent sufficientes ad pestilentiam inducendum; etiam si non esset pręsens in omnibus eis vtentibus. Vinū quanto plus fieri potest, fugiant: & si non clarum, odoriferum, & subtile sit, lymphetur cum aqua clara distillata: vel cocta: & infrigidata: & declinent quantum plus possunt ad acetosa: vt dixi tam sani quā egri.

De feb. empiala, & liparia. Cap. XXXIII.

Sicut dicit Auicenna in libro suo quarto vbi de fe. loquitur: & Serapio libro 6. cap. de empiala: & liparia fe. Empiala feb. sit de flegmate vitreo, quod est frigidius inter cęteras flegmatis species: quod aut vincit in toto corpore aut in membro vno: & illud quod vincit in toto corpore: aut putrescit totum: aut nō putrescit ex eo aliquid: & tunc ipsum generat in corpore frigus. quod non calefit absque feb. Et si totum putrescit: aut putrescit extra venas: & facit feb. quę dicitur ephemerina habens periodos: aut putrescit intra arterias meseraicas, & venas: & facit fe. cōtinuam. Si autem putrescit. pars eius nominatur empiala: & ipsa quidem facit interius frigus & calorem exterius. Et vrina quidem pa. empialam est magis tendens ad digestionem frigiditatis quā vrina pa. ephemerinam & magis cruda: & grossior ea: & pulsus est grossus superatus: & tardus: & rarus & fortasse sit siccus. omni die: & forte sit fortior in omni tertio vel quarto die: cum materia huiusmodi in corpore est, parua & parue putrefactionis ignea, & fortasse periodus est quatuor horarum: & qñque. 9. & quādo que etiam quatuor horarum & fortasse plus secundum grossitiem materiei: & multitudinem secundum spissitudinem corporis: & grossitiem eius: & debilitatem virtutis: & temporum anni. Et hæc quidem fe. non permanet multum: quod est: quia fortasse moratur. 2. diebus: & fortasse super illud addit: & minuitur fe. Feb. aut q̄ sit in oib. 5. diebus aut in in oib. 7. aut in oib. 10. diebus nō accidit nisi ex flegmate grosso: aut ex cholera nigra: & secundum quantitatem grossitudinis materiei, & eius spissitudinis ex qua ge-

neratur procedit vehemētia periodi eius: & postponitur: & vrina & pulsus & secūdū quantitatem materiei sicut dicit Serapio. cap. prędicto. Liparia vero est fei qua extremitates mēbrorū: & qđ apparet ex corpore infrindatur: & aduritur in ea pfunditas corporis vt stomachi cū siti vehemēti: & cū asperitate linguę, & pulsus est paruus, & lętus: vñ liparia cōtraria est empiala. Iuxta illud. Semp in empialia frigescent interiora. Exteriora calent. cedit liparia cōtra. Et materia huius egritudinis siue fe. secūdū plurimū est flegmatica: & quādoque est cholericā ex cholera grossa. Sed vt simus solliciti in empiala in prouocando vomitū demus syropū acetosum cū calida & secūdū Auic. cū aqua fasilorū raphani aneti calamēti, & diureticorū. Et simus in eis ambabus fe. solliciti de facto valde in vomitū prouocādo. & demus aquā seminū cōium: & prouocatiū vrinā, & potus infrigidantes, & stomachū mūdificantes sicut aqua apij & feniculi cū se. canapino, & geleniabin: & cum fuerit digestio facta demus secūdū Aui. & Sera. infusionē de aloes: quā prędicti auctores in suis antidotarijs describunt: qm̄ multum confert. Et demus pillulas de eupatorio hierapigra Gal. & similia. Secundū Aui. & Sera. sicut camomilla: mellilo: nm̄: fursur mcdulla cartami, vrtica: centa. minor anetū almuri & mel. comedant aquā cicerū: & muri, & cyminū, & siclas, & asparagos: & feniculum cū oleo de amygdalis dulcibus condita, secūdū Serapionē pullos, perdices, & parua volatilia in campis, & nemoribus habitantia, vinū subtile: & odoriferū. mediocriter lymphatū bibant. In practica vero rogerica dicitur q̄ in empiala digeratur materia cum oximelle squillitico: & purgeť cū hierapigra, vel cū hieralogodion s̄m descriptionē: antidotarij particularis. Tertio die post purgationē fiat stupha cū herbis istis: scilicet calamēto organo mentastro ruta: folijs lauri: camomilla mētha, salvia, rore marino, & similibus herbis calidis, & odoriferis, & cū exit a bal. tergatur cum panno, & ex hoc vnguento inungatur supra spinam, & renes, & stomachum. & circa brachia, & crura: & tibias, quod sic fit. Rec. succi absinthij, feniculi, abrotani, balsamite, agrimonie, verbenę ana onc. ij. coquantur in oleo cōi, vel in oleo nucum: vsque ad consumptionem succorū, & additis onc. iij. cere fiat vnguentum. Quod si pp hoc non fuerit egritudo iam dicta curata dētur opiare sicut rubea trociscata aureę, & huiusmodi cū apparuerint alices, & oscitationes ter vel quater añ horā accessionis. Itē reiteretur pđicta purgatio. Dent ēt electuaria calida sicut diacalamētū dianthos & huiusmodi. Itē fiat

fricatio in tibiis, & nentose circa spatulas, & res apponantur. Scias uero quod liparia sicut dicitur: fit de cholera subcitrina putrefacta, & ex phlegmate, & melancholia in stomacho uel intestinis putrefacta accidit in æstate detribus in tribus diebus periodus eius. Et primo superueniunt ei alices & oscitationes: deinde rigor, postea frigus, deinde calor, & in medio caloris superuenit frigus intollerabile in interioribus. Et ratio est, quia dum putrescit cholera subcitrina pars trahitur ad cor, & facit ipsum febricitare, & pars trahitur ad sto-

machum & intestina, & dissoluit phlegma vitreum, & melancholiam, & ipsum calefacit, ut potest videri de Sole & glacie. Ex illorum igitur dissolutione membrorum interiorum sequitur infrigidatio. In principio igitur lipariæ confert geleniabin secundum Serapionem cum se. caniabin, & in fine infusio de aloë, & hiera pigra, & aqua sceniculi, & masticeis, endiuia, apij, & troscisci de ros. Et vniuersaliter oportet ut regimen lipariæ magis declinet ad subtilitatem. Et hæc ad laudem omnipotentis sufficiant.

PHILONII

DE FEBRIBVS

LIBER.

De diffinitione & diuisione febrium in generali. Cap. 1.



FEBRIS est calor extraneus accensus in corde procedens ab eo mediante spiritu & sang. per arterias & venas in totum corpus, & inflammatur in eo inflammatione quæ nocet operationibus naturalibus.

Hanc diffinitionem ponit Aui. in prima 4. c. 1. Et est bona, quia conuertitur cum suo diffinito & facit ipsum differre à quocunque alio & cum hoc datur per genus & differentias, Galenus in 1. apho. com. 16. Febris est calor naturalis mutatus in igneum. Aliæ multæ diffinitiones ponuntur ab aliis, sed pro nunc ista sufficiunt. Dicitur autem febris à ferreo feruens, pro eo quia in totum corpus feruorem inducit & ebullitionem. Nunc autem sciendum secundum Auic. in loco allegato, & secundum Gal. in mech. particula 3. in principio, quod tria sunt genera febrium distincta penes tria quæ in eo corpore humano reperiuntur. Nam omnia quæ in corpore humano reperiuntur sub triplici genere sunt: quia aut sunt membra continentia, aut humiditates, aut spiritus sub quo ponitur, quod nunc naturalis calor, & fumus, & vapores. Et ista diuisio intelligitur quantum ad res corporeas: non autem quantum ad animam nec ad virtutes nec complexionem & similia, quæ sunt incorporea. Si ergo inflammatur

spiritus primo & subiectiue inflammatione quæ manifeste nocet operationibus consuetis à natura dicitur ephimera ab ephimero pisce, qui ultra 24 horas non uiuit, & eadem die, in qua suscipit spiritum uitæ moritur: & est generatus per viam putrefactionis, & non propagationis. Si autem aliquis de 4. hum. putrescat, & inde fiat feb. primo & subiectiue, tunc dicitur feb. putrida humoralis, quia primo & subiectiue in hum. fundatur & radicitur. Si uero totum corpus inflammatur ex prima & subiectiua inflammatione cordis & membrorum radicalium corporis: tunc dicitur feb. ethica ab ethis græcæ, quod est permanens dispositio latine. Auic. autem comparat membra corporis radicalia parietibus balnei vel ollæ. Et humores corporis aquæ balnei vel aquæ bullienti in olla. Et comparat spiritus aeri balnei, vel vaporibus eleuatis ab olla bullienti. Subdiuiduntur ista tria genera febrium in suas species. Nam ephimera quædam est à causis primitiuis extrinsecus aduenientibus, ut est calor solis, frigus, & similia. Quædam propter actiones corporeas, ut motus corporis. Quædam propter actiones & animales, ut ira, & tristitia. Febris autem humoralis subdiuiditur: nam quædam est de sanguine, alia de cholera, alia de phlegmate, alia de melancholia, alia est de comist. aliquorum istorum. De sanguine autem duobus modis fit febr. aut de multo sanguine sine corruptione, & sic fit sinocha. Aut fit de sanguine corrupto,

& putrefactio & sic fit synochus, unde uersus. Si
nocha de multo, sed synochus ex putrefactio
Adhuc hæc species sc. sanguineæ subdividitur
scilicet in augmasticam & peraugmasticam &
homotens. Febris autē cholericā diuiditur in
continua & interpola. Continua duplex est
quædam est de cholera pura putrefacta intra ue-
nas remotas à corde & ab orificio stomachi, &
hæc uocatur tertiana continua. Alia fit de cho-
lera uel phlegmate falso putrefactis in uenis
circa cor uel circa orificium stomachi, & hæc
species uocatur caufon. unde Ga. 4. amph. con-
clusio 5. nulla inter caufon & tertianam diffe-
rentia est quantum ad materiam unde generā-
tur. Tertianā interpolatā autē quædam est ue-
ra seu pura & ista fit de cholera rubea pura &
subtili extra uenas putrefacta. Alia est tertiana
non pura quam medici uocant nothā seu non
ueram & ista fit de cholera grossa in substantia
quæ quidem cholera grossa generatur per cō-
mixturem cholere ruberæ cū phlegmate. Ista
autem tertianā interpolatā aliquando est sim-
plex quando scilicet materia non putrefit in
duobus locis uel materia est pauca in quantita-
te. Febris autē phlegmatica subdividitur, quia
quædam fit de phlegmate putrefacto intra ue-
nas, ut dicit Aui. in prima. 4. tract. 2. c. 1. de fe-
bribus putridis. ibi. Putredo. Et ista feb. conti-
nua adhuc est duplex. nam quædam est in ue-
nis remotis à corde, & ista quamuis sit cōtinua
& inseparabilis: tamen uenit ei quædam uehe-
mentia seu exacerbatio per quā cognoscitur
ac si haberet paroxysmū, ut dicit ibidē Aui. Alia
fit de phlegmate putrefacto in uenis quæ sunt
prope cor: & ista est continua & non habet ad-
ditiones nec diminutiones in sua continuatione.
Alia fit de phlegmate putrefacto extra ue-
nas: & ista dicitur quotidiana interpolata. Et
adhuc hic subdividitur secundum qd fit de di-
uersis speciebus phlegmatis ut uidebitur infra
domino cōcedente, & etiam secundū locū pu-
tredinis in profundo uel in superficie secundū
quod sunt duo species. sc. liparia & epiala. Fe-
bris autē melancholica sic fit: quia melancholia
quandoque putrefit intra uenas & facit conti-
nuā sed raro ut dicit Aui. in prima. fen. 4. ca. de
feb. quartana periodica & aliquando putrefit
extra uenas & facit feb. quartanam interpolatā.
Et ista subdividitur, quia quædam est de
melancholia naturali q̄ est fax san. Alia est de
melancholia adusta. Et alia de melancholia quæ
attinet sanguini. Alia de melancholia quæ atti-
net phlegmati. Alia de melancholia quæ atti-
net cholera. Et illa quæ est de melancholia ad-
usta est duplex, quædam est melancholia adusta
per adustionem melancholiæ naturalis. Alia est
per adustionem aliorum hu. Et adhuc subdividi-
tur, quia aliquando fit feb. melancholica cū ma-

teria minoris quantitatis & magis grossa quā
in quartana, & tunc fit feb. quintana, sextana
quæ ut plurimum sūt de materia melacholica
phlegmatica uel phlegmati attinente. Et alia
quæ non est tantę grossitiei, est tamen maioris
quantitatis & fit quartana. Hæctica autem sub-
diuiditur, quia quædam est hæctica quæ non est
feb. & ista uocatur hæctica senectutis sine ma-
rasmon. Alia est hæctica quæ est feb. Et ista ha-
bet tres species secundum cōsumptionem triū
humiditatum nutrimentalium iam extra ue-
nas existentium ut uidebitur in processu domi-
no adiuvante. Et hæc est recta diuisio febrium
in generali secundum quod genera diuiduntur
in suas species. Febres compositz subdividu-
tur secundum combinationem febrium con-
tinuarum & interpolatarum secundum quod
cōnectur in istis uersibus. Paruus hemitriticus
in uenis phlegma recondit, Exterior cholera
medius conuertitur illi. Pessimus humor inest
in uenis fel coquit extra. Præter iam dicta Aui.
subdiuidit hoc genus feb. sic. Quædam sunt feb.
acutæ aliz non acutæ. Et acuta secundum Ga.
diuiditur in acutam peracutam & perperacu-
tam. Item quædam sunt chronice & aliz nō chro-
nice. Et ista subdividitur, quia quædam est chro-
nica conuersiua, alia non conuersiua. Et quædam
sunt nocturnæ & aliz diurnæ. Et quædam sunt
leues & salubres. Aliz molestę multū cum ter-
ribilibus accidentibus. Aliquæ sunt dimitten-
tes & aliz inseparabiles. Et inseparabiles quæ-
dam sunt quæ diminuantur, alie sunt quæ intē-
duntur, aliz quæ sunt similes in accessionibus
& afflictionibus. Et quædam habent rigorem,
aliz tremorem: aliz frigus & aliz affligūt sine
istis. Et aliquæ sunt simplices aliz compositz,
& sunt quædam continuæ aliz interpolatę. De
cōtinuis autem quædam est pestilentialis, alia
non pestilentialis. Quædam est fe. syncopalis
humorosa quædam syncopalis non humorosa
uel minora. Item quædam sunt feb. cum appo-
stemate: ac pleuresi & feb. pestilenciales cum
bubonibus. Aliz sine apostemate ut caufon ter-
tiana & similia. Et quia fe. ephimera inter alias
feb. citioris terminationis & facilioris existit
curę & etiam minoris lucri, quia eix cognosci-
tur nisi postquam recessit: ideo de ea prius nos
expediamus.

De feb. ephimera in generali. Cap. II.

Ephimera est febris ex inflammatione spiri-
tuum procedēs per totum corpus cuius ter-
minatio est brevis.

Causæ istius feb. possunt esse multæ. nā ali-
quando fit a causis primitiuis ut est caliditas
aeris uel solis & uenti orientalis & frigus exte-
rius. Aliquando fit propter balneū in aquis sti-
piciis

Pecis foras exteriores claudentes, ut sunt
aque calumniole. Aliquando propter cibum
calidum: aliquando propter uinum sumptum
aliquando fit propter actiones animales, ut est
angustia, tristitia, cogitatio, ira, timor, & gau-
diu, somnus & longa quies & uigilia. Aliquando
se fe. ephi. propter dispositiones corporales si-
cut dicit Auer. qz sunt in duplici differentia,
nam quædã sunt dispositiones quæ sunt action-
es ut est labor & tranquillitas nimia, & epatua-
tio, dolor, syncop, fames sitis, ex omnibus istis
potest uenire ephi. Alię sunt dispositiones cor-
porales quæ non sunt actiones seu motus, & pos-
sunt causare ephi. ut est oppilatio in corpore
satieta, nautica, iam in stomacho recepta,
apostema, clausio pororum exteriorum omnia
ista possunt causare feb. ephi. Et quia iste ephi.
aliquando morantur in feb. putridam, quando
non bene digerant, Aliquando ad ethicam ut ac-
cidit aliquando cholericis & consumptis quan-
do non bene gubernantur, uel eis imponitur
seignium triduum &c. Ideo ponemus duo
genera signorum, scilicet signa propria, & si-
gna permutationis.

Signa propria ephi. Incipit ergo ephi. cum
aliquali rigore & calor profundatur. Et aliquan-
do adest pigritia & somnus, & profundatio
seu submersio pulsus. Et in augmento calidi-
tas non est ita mordicativa sicut feb. acuta-
rum, immo est leuis sicut caliditas hominis
exercitati, aut sicut caliditas hominis quando
nimis potauit de puro uino. Et si in prima die
urina est naturalis habens hypostatum & cum
hoc pulsus est bonus, tunc est ephi. in ephi. yrina
non multum alteratur: nec ostendit dominium ali-
cuius huiusmodi facit feb. putride: ut est tertian-
na & feb. sanguinea: quod si urina est bona &
pulsus ordinatus, & non frequens magna fre-
quentia tunc est fe. eph. quamuis aliquando io-
ca apparet urina infecta propter superabundantiam
hum. calido, ut est larg. & cholera in cor-
pore ephimerati existentium. Similiter pulsus
diuersus aliquando paruus & debilis secundum
diuersitatem ephi. & diuersitatem particulari-
um. Aliud autem est signum quod facit ipsam
differre a fe. putridis & acutis, & est quod prin-
cipium eius sit leue, & sit tangatur corpus eius
caliditas nec additur nec crescit sicut fit in alijs
feb. acutis. Et in statu non ueniunt accidentia
multum fortia nec terribilia, sicut in alijs feb.
nec feruor nec ebullitio nec magnus dolor. Et
in plurimum crescit per sudorem leuem sicut
fit sudor in latitudine sapientis non multa qua-
titas. Et si in ea apparuerit dolor capitis & re-
cedit totaliter post recessum feb. & eius eradica-
tionem, signum est quod illa fuit ephi. Si uero
est magna exuberantia sudoris, non est ephi.
sed alterius speciei. Signa permutationis ephi.

mere ad alias feb. sunt primo quia ipsa declinat
sine dolore & humoresitate. Et si forte sudor
& non eradicatur feb. nec permittitur ad alias
feb. & pulsus post sudorem ostendit reliquias
feb. & si affuerit dolor capitis ille remanet ulq
traditum naturalem. Omnia ista signa permuta-
tionem faciunt ad putridam uel hecticam ostendunt,
quando tamẽ mutantur ad hecticam ista
sunt intensiora, & cum hoc diutius durant, &
ultra hoc locus arteriarum est calidior & feb.
remanet uniformis & est augmentum caloris
post refectionem pulsus durus & equalis & paru-
us. Si uero permittitur ad feb. putridam appa-
ret diuersitas in pulsu. ita quod aliquando est
frequenior aliquando magnus, & aliquando
est minor caliditas mordicativa in tactu & in
urina non apparent à principio signa digestio-
nis. Si autem permittatur ad feb. languineas ut
est sinocha, tunc apparent signa repletionis san-
gui. cum rubore faciei & tumore non consue-
to, & pulsus est plenus.

Cura ephi. in generali, si p. ephime fuerint
cholericis & macri uel ephi. sit. ex fame uel ex
labore uel angustia oportet quod isti nu-
triantur cum cibis boni nutritiuenti & facili
digestionis, ut est hordeatum, auenatum, amig-
dalatum, & ut sunt parui pulli galline uel per-
dices & comedat laqueas & portulacas coctas
cum laqueis amig. & bibant aquam frigidam uel
aquam borderi uel uinum mulz a que mixtis
Et in istis non oportet expectare declinationem
feb. nam si isti non cibentur, cito efficietur
hectica, uel caderent in feb. putridas. Et in hoc
crabatur aliqui antiqui, qui indifferenter in
omni febre imponunt ieiunium triduum ut
dicit Gal. in lib. de inge. sanatis. Si uero
ephimq. fuerit ex apostemate uel ex oppila-
tione, tunc isti non sunt cibandi nisi post mani-
festam declinationem, & similiter in alijs specie-
bus, si habent suum decursum aqua frigida, quia
cum ista feb. solum fit in spiritibus sine mate-
ria grossiori, sola infrigidatio est melior tutan-
cum in ea non indigemus materia euacuatio-
na, ideo de directo nulli eorum purgandi sunt
nisi habentes repletionem, oppilationem &
nauseatiam satietatem. Et pro tanto non sunt
prohibendi ab aqua frigida, dũ tamen non ha-
berent apostema in stomacho uel hepate uel
splene, & in alijs interioribus membris. In fine
autem paroxysmi potest poni in balneo aque
dulcis, quia humectat & aperit poros & inuat
ad exhalationem vaporum & inducit sudorem.
Et sic compertum dum tamen non habeant feb.
ephi. ex oppilatione in interioribus, quia tunc
non cõpetit, p. quia balneum facit cõmotio-
nem in humoribus p. oppilationem cõchitis, quod
quidem humores non suerati putresceret & bal-
neatio generaret egitudinem putridam, ut dicitur.

Aui: Et dum tamen nō habeant ephimeram ex
nāscatiua satietate. donec illa prius euane-
scat. Et similiter habentes catarrum cum effi-
mera balneandū nō sunt. Si uerō ephi. est ex op-
pilatione pororum exteriorum, uel ex oppila-
tione in membris interioribus. ualeat fricatio
suauis & longa, & non balneum. Vñs genera-
libus ad particularia accedamus.

De cura ephimeræ in speciali. Cap. 111.

Ephimera a calore exteriori fit aliquādo pro-
pter calorem aeris uel uenti orientalis uel au-
stralis, uel propter calorem balnei, ut frequen-
ter accidit parturientibus longam moram in
balneo facientibus, uerum etiam frequenter ac-
cidit a calore solis, ut accidit aliquādo illis qui
stant uel uadunt in sole tempore calido, maxi-
mè discooperto capite. Tunc enim sol calefacit
spiritus animales, qui magis declinant ad
partes exteriores, quā uirales uel naturales.
Et tunc illi supercalefacti & inflammari inflam-
mant alios spiritus usque ad cor, & sic fit febris.
Et post expanditur per totum corpus, & iste est
unus modus. Alius modus est quod aer cali-
dus per solem uel aliter attrahitur ad cor, pro-
pter quem inflantur spiritus eius, deinde fit
processus a corde ad totum corpus, unde in il-
la quæ fit propter calorem solis primo incipit
a cerebro & in capite: quia forte tale caput nec
corpus non est mundum: imo repletum & per
caliditatem solis dissoluntur uapores calidi
calefacientes spiritus. Et in illa quæ fit ab aere
calido fit impressio in corde propter attractio-
nem aeris calidi ad ipsum.

Signa sunt aggrauatio & inflammatio & do-
lor in capite: maximè quando ibi est repletio:
anhelitus magnus, & calor maior exterius quā
interius: quia partes apparentes corporis sunt
magis calefactæ a calore solis & a calore febrili
& interiores a solo calore febrili. Et scitur ex
iudicio patientis: quia ipse dixit se fuisse uel ste-
tisse in sole uel aere calido per longam morā.

Curatio istius est: quod ungatur caput cum
oleo rosaceo uel niolaceo actu frigidis & to-
tum pectus, uel ab alio embrocetur cum oleo
salicis, & dictis oleis mixtis cum decoctione
herbarum frigidarum infrigidata. Et si sit de-
tur sibi aqua frigida fontina uel tacea lactis a-
migdalaram clarificati cum aqua frigidissima,
& hoc continuetur usque ad declinationem.
Et tunc ponitur in balneo aquæ calidæ & ca-
put embrocetur cum aqua calida: quia humec-
tat & resoluit calorem febrilem & uapores &
fumos ab exteriori calore in corpore genera-
tos, & remouet malam complexionem & reli-
quias febris. Vnde hæc embrocatio cum rebus
supradictis melior est, quā si fieret sola ma-

defectio secundum Aui. in e. proprio. Deinde
revertatur paulatim ad dietam consuetam ca-
uendo calorem.

Ephimera a frigore aeris exterioris uel a
quæ, ut accidit natantibus uel aliter stantibus
in aqua frigida. Et ista ephi. fit propter clausio-
nem pororum, quæ clausio uel constrictio est
causa retentionis fumorum & uaporum, pro-
pter quā retentionem inflantur spiritus
& fit febris ephimera.

Signa habentur ex indicatione patientis, &
pulsus non est ita paruus sicut in illa quæ fit ex
tristitia & angustia: attamen paruus est, & qui-
do præmitur manus supra corpus, calor ma-
gis sentitur augmentari quā si esset ex tristi-
tia, uel displicentia, uel tedio seu angustia, pul-
sus etiam est uelox propter necessitatem factā
a fumis uaporosis retentis cum spiritibus non
potentibus exhalari & resolui propter clausio-
nem pororum. Oculi etiam nō profundantur
imò aliquando inflantur propter retentionem
uaporum. Urina aliquando est alba: ideo quia
calor naturalis est quasi extinctus, & aliquan-
do est colorata: quia calor intus recluditur &
fortificatur circa hæpar & etiam circa uias uri-
nales.

Curatio. Melior cura istius est sudor: ita
membra omnia, excepto ore, ut anhelare pos-
sit cum pannis cooperiatur donec sudet. Et si
per se sudare non potest, ponatur in balneo
aquæ calidæ in qua decoctæ sint res apertiuæ:
ut est mentastrum balsamita, ambrosia, fenicu-
lum, apium, & petroselinum cum suis radicibus,
& fricentur fricatione leui, & non madescent
uel ungentur, donec sudent, & balneum aeris
calidi uel saltem calefactio præcedat balneum
aquæ, deinde ungantur & embrocetur capita
eorum cum oleis apertiuis, ut est oleum de ane-
ro, & oleum de been, & de camomilla. Deinde
cibentur cum bonis cibis subtilibus facilis di-
gestionis, ut pulli gallinarum & perdicum ca-
pietis lactans & similia. Et bibant uinum
album mediocriter limphatum. Caueat a potu
aquæ per se uel a frigido exteriori, & a cibis fa-
cientibus pororum clausiōem & oppilatio-
nē, & ex balneis stipticis & poros claudētibz.

Ephimera si fiat ut fit frequenter ex balneis
aluminosis calidis: quia retinentur fumi & fiūt
febres ephimeræ: sicut immediate dictū est. &
frequenter talis ephimera perducit ad peridæ.
Signa cutis est tensa, pulsus paruus & uelox, uri-
na alba & tenuis non habet oculos nec facient
ad inferius demissos nec profundatos.

Curatio istorum talis est sicut cura ephime-
ræ factæ a frigore, diutius tamē debent stare in
aere balnei calidi, & in aqua calida similiter: &
per consequens non tardetur inunctio cum o-
leis apertiuis, & teneatur apertiuum regimen
& euchimium

& echimum cauendo semper repletionem ei
bostur & potum.

Ephimera propter cibos calidos. Primum
fundamentum istius est in hepate & in spiritu
naturalis: propterea quia uirtus cibi calidi ci-
tius ad hepata attingit. Unde dicit Auic. quia il-
la quæ fit a calore solis, ut plurimum est cere-
bellaris & in spiritu animali. Et illa quæ est ex
balneo est cordialis & in spiritu vitali. Ista ex ci-
bis calidis proueniens est hepatica & in spiritu
naturalis.

Curatio fit per administrationem ciborum
frigidorum, ut lactucarum portulacarum & ma-
lorum granatorum & similibum. Et euacuentur
cum cassia, uel cum succo prunorum, uel cum
tamarin. & manna granata, & dentur medici-
na frigida, ut est triasand. & aqua endiuie uel
oxizaccata, siropus rosac. iulep cum aqua hor-
dei. Et super hepata & caput ponantur epithima-
ta ex sand. & ros. & aqua ros. & end. cum pau-
co aceto & camphora & succo lactucæ & por-
tulacæ & similibum herbarum frigidarum. Eph-
imera ex uino curatur cum uomitu & solutio-
ne ventris, & cum eis quæ immediate dicta
sunt, & caput embrocetur cum oleo rosaceo, &
succis frigidis, quando ibi est dolor, & in decli-
natione ponatur in balneo. Et fiat talis cura, si-
cut dictum fuit in capitulo de ebrietate in lib. 1.

*De speciebus ephimera propter actiones animales
ut sunt accidentia anime, & propter som-
num & quietem & uigilias. Cap. IIII.*

Ephimera ex tristitia & angustia, ista species
est aliquando propter motum & reclusionem
spirituum ad partem interiorem & conculca-
tionem eorum uersus cor unde fit febris.

Signa sunt dimissio oculorum & profunda-
tio eorum propter resolutionem, & facies est
discolorata tendens ad citrinitatem, propter
profundationem caloris naturalis & spirituum
circa partes interiores, & pulsus est parvus, &
aliquando durus propter duritiem arteriarum, &
urina est ignea, & quandoque pa. sentit ardo-
rem eius, & acuitatem propter siccitatem in ea
dominantem: & quia calor & spiritus ex tristi-
tia & angustia interius recluduntur.

Curatio. Primo uitanda sunt ista acciden-
tia, a quibus talis fe. procedit, & utatur lætifi-
cantibus, & intrer balneum aque calidæ & non
acreum, & olfaciat redolentia frigida ut sunt
rosæ, uiolæ, sandalus, & similia. & caput & pe-
tus ungantur cum oleis frigidis & epithimen-
tur cum pannis madefactis in muscillagine plu-
li & camphoræ uel in succis herbarum frigida-
rum. Vinum odoriferum mixtum aquæ iungat
eos, & omnem hominem uenientem in hunc
mundum. Post audiat pulchras cantilenas, &

musicæ instrumenta & reliqua lætificanda.

Ephimera ex ira fit propter motum subiti
spirituum ab interioribus ad exteriora: pro-
pter quem motum spiritus inflantur, & fit
feb. ephimera cum omnis motus localis colli-
siuus & confrictiuus sit causa caloris: imo &
incendii aliquando, ut dicitur secundo me-
theororum.

Signa ex iudicio patientis ferè & assistentium
habentur, & cum hoc adest rubedo faciei: nisi
timor cum ira misceatur, sicut accidit illis qui
cum enisibus nudatis se uolunt uerberare: tunc
enim iterum calor & spiritus ad interius reuer-
tuntur cum sanitate, & sic facies pallida uel ci-
trina non sine causa efficitur, & adest inflatio
faciei similis illi qui dormiuit uel studuit super
libro capite dimisso. & oculi rubei, & hoc pro-
pter motum spirituum & san. ad exteriora &
urina tineta, & pulsus plenus & magnus & fre-
quens, & si fortè concomitetur ei timor: tunc
fit pulsus aliquantulum diuersus.

Curatio, quod stet in tranquillitate, & mute-
tur eius intentio ab ira ad res lætificantes ue-
lunt carilena, hystoria, fabula, & lectura libro-
rum hystoriarum enarratio casuum, & acciden-
tium in mundo, & inspectio localium magni
ualoris: & ponantur in balneo aque calidæ, &
ungatur cum oleis frigidis uel temperatis, &
cibetur cum bonis cibis facilis digestionis. &
quæuis Auic. dicat, quod non detur eis uinum
uerum & purum fortè sed debile & limphatum:
unde in ira competit eis in declinationis.

Ephimera ex gaudio. motus in gaudio fit
spirituum ab interioribus ad exteriora sicut in
ira: sed in ira talis motus fit subito, & in gaudio
uerò paulatinè: ideo raro accidit inde febris e-
phimera. Si tamen aliquando accidat: habet
tunc talia signa.

Signa sunt debilitas pulsus & tarditas eius
propter exhalationem spirituum, caliditas non
tanta sicut in ira, nec urina tineta, nec oculi sunt
ita rubei, & habet aspectum oculorum & faciei
bonum & gaudentem quæuis habeat feb. Et
pulsus non est ita frequens sicut in ira.

Curatio ferè talis est sicut in ira cum leuiori-
bus tamen in frigidantibus mitigatur: quia in-
ter animæ accidentia gaudium & lætitia huma-
næ naturæ amabiliora existunt. Tristitia ue-
rò & angustia corpus, & animam & operatio-
nes impediunt: quo nihil clarius nostris men-
tibus elucescit. Gaudium ergo & delicia mo-
deratè temperata hominibus lapsis afferunt ma-
gnam fructum & iuuentum.

Ephimera ex timore causatur sicut ephime-
ra ex tristitia. nam in utraq; spiritus ad interio-
ra reducantur. sed in tristitia paulatim in ira
subito, & hæc est differentia inter utranque.

Ephimera ex uigiliis habet sua signa, nam

uigilia præcesserunt, & adeſt ſuccleſio palpebrarum, & profundatio oculorum propter conſumptionem & reſolutionem humiditatum orbiſque & paruum oculi. urina apparet conturbata propter indigeſtionem quæ in ſuperfluis uigiliis non perfectè celebratur debilitas pulſus diſcoloratio faciei. Et iſta ſigna aliquando commiſcentur uel mutantur: proinde ad maiora inſpicere debemus.

Cura talis eſt: ſicut dictum eſt in ca. de ſomno. ſ. prouocetur ſomnus & ſtet in quiete & tranquillitate, & embrocetur caput cum decoctione herbarum frigidarum & humidarum, ut ibi dictum eſt. & utatur balneo & bonis cibis humectatiuis & bono uino: quia conſert eis.

Ephimera ex ſomno & quiete, aliquando ex ſomno & longa quiete retinetur uapores multi ab hu. reſoluti, qui calefaciendo ſpiritus per commixtionem, uel iuxta poſitionem inducunt feb. ſpiritualem. Signa ſunt quia ſomnus & otium præceſſerunt ſine conſuetudine, & pulſus eſt plenus & humorosus, caliditas in tactu non eſt multum acuta. Cura eſt uigilare & non dormire, & utatur fricatione temperata.

De ephimera propter diſpoſitionem corporis quæ ſunt actiones, ut eſt labor. Cap. V.

Ephimera ex labore fit: ideo quia exercitiū & labor inordinatus caleſcit corpus & ſpiritus. Ex qua calefactione ſpiritus inflammatus cauſat feb. ephi. Iſta autem feb. moleſta eſt inter alias ephi. quia nocet ſpiritibus & uiribus animalibus & uitalibus. Signa habentur ex dicto pa. & ſodaliū: quia nimis laborauit non conſueſcit. Et quia iuncture inter cetera membra propter motum collisionis & fricationis magis ſupercalchunt, ideo calidiores tactu reperiuntur & corpus ſiccum. Et ſi ex labore non ſuperfluo accidat ephi. tunc corpus non eſt ſiccum. 1^o humidum, & e conuerſo. Si eſt ſuperfluus labor quia non fit ſudor nec humectatio in corpore. Et quia in latere ſuperfluo partes pectorales multum laborant & exiccantur, ideo accidit eis ſitis & toſis ſicca, & pulſus durus & paruus & debilis: durus propter ſiccitatem, paruus & debilis propter reſolutionem hu. & caloris naturalis & ſpiritus factam in labore.

Curatio eſt quod utatur dicta reſumptiua capiendos cibos facilis digeſtionis & boni nutrimenti, & utatur otio & tranquillitate, & ponatur in balneo aque dulcis calide, & ungatur totum corpus præcipue iuncturæ cum oleis temperatis, & dormiat & requieſcat ſumendo hordeatum & auenæ, & pullos gallinæ & perdicis & capretum in ſuo tempore & piſces ſquamoſos de aquis mundis, & uinum limphatum, parum tamen comedat quia

cum digeſtiua ſit debilis, non tantum poſſunt digerere ſicut prius: perinde debent uti etiam cibis parum quantitatibus & multo nutrimenti ut ſunt cibi ſupradicti, & parum apiculæ bene præparatæ & uizella ouorum ſorbilium & reſticuli gallorum & ſimilia.

Ephimera facta propter euacuationem fit aliquando propter commotionem hu. & tunc ſpiritus mouentur impetuoſe & ſuperflue: qui quidem motus inflammât ſpiritus & fit ephi. Aliquando hæc fe. fit propter medullarum, ideo quia nimis calefaciunt corpus & ſpiritus cum ſuo ſuperfluo calore. Et quandoque uenit poſt phlebotomiam propter commotionem quæ fit in humiditatibus & ſpiritibus, & propterea quia phlebotomia facit redire uapores humi. ad naturam cholere & cum calefactione & inflammatione illorum uaporum inflammatur ſpiritus & fit ephi.

Curatio, ſi fluxus ſuperfluit retineatur cum cibis & poribus reſtrictiuis confortatiuis & cum medicinis ſtipricis interius ſumptis & exterius miniſtratis ſupra ſtomachum, & applicentur actu calida propter eius confortationem. Et melius emplaſtrum eſt lana inſuſa in oleo maſticino & nardino calidis, & lana expreſſa & dictis oleis aſqualiter ſtomacho applicetur, uerum tamen dicit Aui. quod circa cor & hepar debent poni res refrigerantes.

Ephimera ex dolore corporali, intantum dolor aliquando calefacit ſpiritus, & inde ephi generatur. Signa ſunt præſentia dolorum in brachio uel tibia uel oculo uel dente uel inteſtiniſneſ in aliquo loco uel corporis. Curatio eſt quod remoueatur ille dolor ſicut docetur in ſuis cap. propriis, deinde fit illa quæ dicta ſunt in ephi. ex labore.

Ephimera ex ſyncopi fit, propter diuerſam commotionem in ſpiritibus, quæ commotione ſequitur calefactio in eis & inflammatio & fe. Signa ſunt quia ſyncop. præceſſit: nodum eſt naturalis dies & pulſus eſt diuerſus, aliquando debilis quâdo uincit caliditas. Curatio eſt quædo curatur ſyncop. ſicut fuit dictum in ſuo cap. Et dentur cibi laudabiles & facilis digeſtionis ut dictum eſt in ephi. ex labore, & detur citius num odoriferum competeriter limphatum & fugiat triſtoſa.

Ephimera ex fame fit, quia uapores corporis & calor acuumtur quando calor non inuenit nutrimentum & inde feb. generatur. Signa ſunt pulſus paruus & debilis & quandoque durus. Curatur aſſumptione hordeati uel auenæ ſi in principio poſtea dentur cibi laudabiles & ualet eis balneu aque dulcis calide & embrocatio ſuper caput eius & dormiat & requieſcat.

Ephimera ex ſiti fit per eundem modum ſicut ex fame & curatur per eundem modum aqua frigida.

de; & si misceatur succus malorum granatorum est bonum.

Ephimera ex oppilatione aliquando poris cutis exterioris oppilantur propter frigora ab extra aliquando propter balnea stiptica, & aliquando propter adustionē sol. ut dicit Aui. Et quando hæc sunt vapores retinet & coartantur & sunt causa inflammationis spirituum & feb. ephi. & hoc propter defectum respirationis. Et si tunc inflammetur san. multus in corpore existens fit tunc synocha ex inflammatione san. & spirituum sine aliqua putrefactione.

Signa si sit a causis primitiuis, ista oppilatio habetur ex indicatione pa. ut quia transiuit per loca niuosa uel stetit per tantum tempus ad frigus quod cutis fuit oppilata & inspissata & vapores non possunt exhalari. Item tarde incipit declinare maxime si declinent sine euacuatione. Et si oppilationes sunt magnæ pulsus est paruus.

Curatio est quod ponatur in loco temperato & mediocriter pannis cooperiatur & suauiter per totum corpus cum manibus fricetur. Et postquam feb. cessauerit comedat auenatum aut cibos de genere speltæ & ius pulle cum ciceribus becuris & cum aliis aperitiuis rebus ut pet. aut cibetur cum paruis auibus similiter preparatis. recedete autem feb. si uidetur quod ibi sit repletio san. per se uel cum aliis hu. fit phlebotomia. & si sint grossi hu. digerantur & purgetur prout oportet, & in fine competit balneum aquæ dulcis decoctionis capilli ueni. & camo. & fæniculi & melliloti.

Ephimera ex nauascatua satietate à tali repletionem generantur vapores mali ex quibus intenditur caliditas & inflammat spiritus & fit ephi. & magis fit in hominibus choleris; ut dicit Aui. in suo cap.

Curatio est si ista satietas est nouella & cibus adhuc est in sto. prouocetur uomitus uel fiat purgatio cum clysteribus aut cum pharmaco & utatur abstinentia moderata. Si affuerit eructuatio acetosa significat indigestionem stomachi. & tunc utatur aliquo electuario confortatiuo ut diagalangis diatriopipereon, & ungatur stomachus cum oleo masticis & oleo de absinthio & nardino in quibus calidis lana succida infusa, superponatur, & à cætero caueat sibi à tali mortali peccato, quod si continuetur non solum corpus necat, immo & animam perire facit. Eccepiat cibos leues facili digestionis & in parua quantitate & stet in loco temperato postquam paroxysmus transferit & dormiat & famescat donec satietas sit transacta &c.

Ephimera ex apostemate quando apostema est in interioribus sic in pleureti uel in peripleronia, & tunc feb. sunt pu. propter effusionem ad cor. sed aliquando ueniunt aposte-

mata in tibijs uel in aliqua parte corporis exteriori, ita quod hu. de genere cholera descendit aliquando in paruo temporis spatio & in tali descensu calefiunt & inflammantur spiritus & fit fortis feb. ephi. cum intolerantia & magna siti in comparatione ad alias eph. Et hoc frequenter uidetur fieri precipue in domino Arnaldo chomite fuxi bonæ memoriæ. hoc etiam frequenter fit in quibusdam furunculis externis euenientibus & in panaricijs & aliquando in alijs apostematibus extrinsecis, & hoc uocant uulgares raicum febr. siue ista apostemata fiant à causis primitiuis uel antecedentibus, sicut sunt repletio præterita & oppilatio intrinseca uel extrinseca, uel ictus uel casus, & ut plurimum fiunt istæ ephimera ex apostematibus sanguineis uel choleris ut in herisipila. Et cognoscuntur per ardorem & rubricationem loci & per pulsus uelocem & plenum per sitim fortem.

Curatio si ista apostemata ueniunt frequenter consideretur a quo hu. fiunt unde si fiant a sanguine fiat phlebotomia præueniendo illa apostemata ne fiant uel illa ulcera quæ aliquando consueuerunt sequi talem descensum hu. et si est de genere cholera præueniendo purgetur ista cholera & sic de alijs hu. simpliciter uel commixtim. Et si de facto habet illa apostemata curentur sicut in suis propriis dicitur. ca. si deus permiserit tantum de uita, & non comedat nisi post declinationem perfectam & tunc utatur diætâ frigida & humectatiua, & caueat a uino nisi post cibum sumat uinum subtile & bene lymphatum. Et circa illa apostemata ponantur emplastra sicut medico uidetur, et postea dicitur. Et ut plurimum debet esse frigida & debent poni secundum Aui. in uia quæ est inter apostemata & cor, ne isti sumi quæ eleuantur ab eo ueniunt ad cor.

Ephimera ex calore interdum ex calore aeris uel ex calore solis uel balnei accidit feb. ephi. ueruntamen ut plurimum fit ex calore solis. Primum enim quod in hac feb. leditur, est caput. & ideo spiritus animalis prius inflammatur & post uitalis propter attractionem aeris calidi ad cor. & signa sunt quia laborauit uel itinerauit ad solem & aerem calidum ibi stetit diu in aere balnei calidi & similia.

Curatio fit cum rebus infrigidantibus intus & extra inungendo caput & pectus cum oleo ros. & nenufarino & stet in loco ad frigiditatem declinui & potet aquam frigidam in siti sua, si medico uidetur expedire & in declinatione febr. balneetur in aqua dulci tepida & de aqua tepida super caput eius effundatur, quia aqua tepida humectat et resoluit fe. ut dicit Aui. Et alia sunt species feb. ephi. parum magis aut parum minus ad istas possunt reduci, quia ephi. uix cognoscitur nisi postquam paroxysmus totaliter recessit.

recessit: ideo dicitur qd eph. est facilius curare & difficilis cognitionis; quia ut plurimum natura eam curat sine adiutorio medicinarum.

Declaratio in febr. eph. Primo quaritur utrum ex nauseatiua satietate possit febr. eph. generari: & probatur qd non, quia talis nauseatiua repletio diminuit, & obtundit: immo etiam in parte exstinguit naturalem calorem, igitur, &c. tenet consequentia, quia febr. non fiunt nisi ex inflammatione & ignitione naturalis caloris, ut dicit Gal. in apho. conclusio illius can. humidæ dietæ omnibus &c. probatur antecedens per Isaac in lib. de fe. ubi vult quod multitudo cibi & potus calorem exstinguat naturalem. Et Gal. super illo ampho. & qui crescunt: & exemplum extrinsecum ibidem positum, ut si multa ligna maxime viridia paucis igni apponantur, necesse est quod ignis extingatur. Secundo arguitur sic, Talis repletio est causa frigidorum morborum, ergo non est causa febr. cum febr. & morbus frigidus sint contraria: & contrariorum effectuum contrariae sunt causae: antecedens probatur per Gal. 2. de morbo. cap. 3. ubi dicit sic: idem contingit, i. generatio multorum morborum frigidorum ex nimia abundantia cibi. licet enim sit corporis nutritivus, tamen conveniens causa est frigidorum morborum. Tertio ex tali repletione generantur hu. crudi & indigesti, igitur &c. tenet consequentia quia tales magis habent infrigidare q̄ calefacere, antecedens probatur per Aui. in proemio can. in fen. 2. supra prima c. 15. de his quæ proveniunt ex eis quæ comeduntur &c. Oppositum dicit Gal. 8. de inge. & Avic. in prima. dist. 4. Et probatur ratione, quia talis repletio nauseatiua potest inflammare cor & spiritus inflammatione nocente operationibus nocimento sensibili & notabili, ergo potest nauseatiua satietas causare febr. consequentia est not. & antecedens est Gal. 6. de ingen. ubi vult quod ex crapula sit inflammatio cordis, & spiritus, & quandoq; apostemata. Pro isto dubio est notandum, quod talis repletio est duplex: quædam est ad quam sequitur eructatio acetosa, & raro talis facit febr. quia significat dominium frigiditatis in stomacho. Alia est ad quam sequitur eructatio fumosa, & talis bene causat eph. Et modus est iste, quia ex tali crapula resolvuntur multi fumi calidi, qui inflamment spiritus ad febr. maxime si stomachus sit calidus, & cibi assumpti calidi, vel speciatim, ut vinum purum non limphatum. Secundo nota secundum Gal. 8. de ingenio, & Avic. in loco allegato, quod eph. de qua est sermo ut plurimum accidit corporibus cholericis in quibus ratione caliditatis in eis dominantis ascendunt fumi resoluti à tali repletione calidi, qui inflamment spiritus. De materia autem

generationis istius dicunt aliqui qd isti fumi resoluti à tali repletione sunt multi & grossi, & vadunt per totum corpus, & causant oppilationem, & claudunt poros cum sua grossitate qua oppilatione stante dictorum fumorum resolutio eorum fieri non potest ad extra, & sic reclusi fortificantur & reuerberantur & multiplicantur deinde inflammentur, & sic inflamment spiritus, sicut inflamatur exhalatio calida & sicca in nub. frigida & humida inclusa, ut patet in metheor. & sic fit eph. Et per hoc ad rationes, ad primam, quando dicitur quod talis repletio diminuit & obtundit calorem naturalem &c. dico qd verum est de illa ad quam sequitur eructatio acetosa, vel dico qd quavis in principio obtundat, tamen postquam natura incipit ipsam digerere eleuantur in tali digestionem & actionem fumi calidi multi & grossi qui inflamment spiritus, similiter dicitur ad secundam. Tertio nota quod ex frigore exteriori per accedens. scilicet claudendo poros cutis non fit debita euctatio nec exhalatio fumorum & vaporum, nec superflua per eos expelluntur, & tunc tales fumi sic retenti per modum statim dictum calefaciunt spiritus, & sic fit febr. eph. Sed oportet quod sit frigus forte ad claudendum poros. Quarto dubitatur si ex accidentibus animæ potest febr. eph. generari. Et probatur quod non primo accidentia animæ non sunt filia febr. eph. igitur ab eis non potest generari: antecedens est notum, & consequentia patet, quia omne quod generatur à suo simili generatur. 7. metaph. Secundo accidentia animæ non possunt alterare cor nec spiritus, ergo &c. consequentia not. antecedens probatur, quia accidentia animæ sunt immaterialia: spiritus autem & cor sunt materialia, nunc autem immateriale non potest agere in materiale per comen. 7. metaph. Tertio accidentia animæ infrigidant corpus humanum: ergo non causabunt in eo febr. tenet consequentia, quia febr. eph. fit à rebus calefacientibus, antecedens patet, quia timor, angustia, & tristitia, & similia infrigidant corpus, ut dicit Haly tertio tech. comm. 11. Et ex accidentibus animæ, & commento istius. Abstinere vero, confirmatur, quia si ex accidentibus animæ febr. eph. causaretur, sequeretur, quod ut plurimum corpora humana haberent febr. eph. consequens est falsum ad experientiam, & consequentia nota est, quia vix possumus liberari ab illis accidentibus animæ. Oppositum dicit Aui. in prima 4. trac. primo ubi ponit febr. eph. ex accidentibus animæ, ut est etiam positum in c. 4. istius septimi lib. & probatur ratione accidentia animæ possunt inflàmare cor & spiritus inflammatione nocitiua operationibus naturalibus, igitur &c. consequentia nota & antecedens probatur per Gal. & Haly 3. tech. can. & concl. 16.

conclu. 16. ibi. Et ex accidentibus quæ acci-
 det &c. Et per An. in quarto. casu. sen prima
 ubi ponit fe. effi. ex accidentibus animæ.
 Pro isto dubio est. notandum secundum q
 dicit Haly in tertio tech. com. 15. Et secun-
 dum q dicit Auic. in distinctione secunda pri-
 mi libri. can. doc. 2. summa prima capitulo.
 14. de his quæ proueniunt ex motu animali
 quod accidentia animæ nihil operantur in
 corpore nisi mediante motu spiritus & calo-
 ris naturalis & san. nam quædam accidentia
 mouent calorem naturalem & spiritum ab
 exterioribus ad interiora: sicut ira & gaudiū.
 Ira quidem mouet ipsum motu forti, & gau-
 dium mouet ipsum paulatim. Aliqua sunt
 accidentia quæ mouent spiritum & calorem
 naturalem ab exterioribus ad interiora: sicut
 angustia & tristitia & timor tremor timores
 & tremores terror tamē maxime subito mo-
 uent. Angustia & tristitia paulatine mouent
 ab exterioribus ad interiora. In tali ergo mo-
 tu subito maxime ab exterioribus ad interio-
 ra spiritus, quæ sunt subiectum fe. effi. circa
 cor super calefaciunt ratione multiplicatio-
 nis & conculcationis & inflammantur. & fit
 fe. effi. vt dictum est supra. Et hoc maxime fit
 in ira & timore. pater igitur, q ex accidenti-
 bus animæ effi. potest generari. Ad rōnes
 qñ dē q nō sunt similia fe. effi. & omne q ge-
 neratur a suo simili gñatur. 7. meta. Dico q au-
 xores habent verum in substantijs, non autē
 in accidentibus. vel dico quod haberent ve-
 rum in generatione per se: scilicet acciden-
 tia animæ generant febrem per accidens, sci-
 licet ad motum caloris & spiritus.

De fe. acuta. Cap. VI.

Acuta fe. continua est illa quæ cum veloci-
 tate sui finis. dicitur esse magna. hæc est
 diffinitio quam ponit Gal. 2. ampho. com.
 16. ibi. Acutorum morborum &c. Alio mo-
 do dicitur fe. acuta &c. est quæ mouetur cum
 velocitate, & est in ea timor. Ista autem fe.
 acuta & continua non transit. 14. diem. Nun-
 quam enim acuitas egritudinis cū fortibus
 accidentibus continuis. 14. potest pertransi-
 re. Ista autem fe. acuta & continua cito ad
 mortem vel ad salutem terminum suum præ-
 parabit. Et ista talis in sermone portugalen-
 sium quorundam simpliciter infirmitas nun-
 cupatur.

Causæ fe. acutæ est putredo humorum me-
 ch. particula 11 in prin. istius autem putrefa-
 ctionis causa est conculcatio & euentationis
 prohibitio quia hu. quando coartatur & non
 expirat, putrescit & inflammatur in eo calidi-
 tas extranea ex qua fe. generatur 3. tech. com.

mento. 91. ibi. Ferunt enim si ita contingat
 iam ergo apparet per illud q dicimus q pu-
 tredeo est causa retinens fe. Et si vis vt ipsa di-
 catur causa coniuncta, dic cum Haly ibidē
 ita, q putredo humorum cum effumatione
 ad cor est causa immediata fe. Et causa putre-
 dinis est prohibitio euentationis & concul-
 catio. Et causa istorum est oppillatio & cau-
 sa oppillationis est multitudo vel grossities
 vel viscositas humorum, vel alia causa clau-
 dens vias & meatus. Istæ autem causæ sunt a-
 dinuicem conconcatæ, quia vna sine alia
 vix poterit esse. Et istæ sunt pro causis coniu-
 ctis. Causæ antecedentes sunt. nimia cor-
 poris repletio multorum humorum vel vi-
 scolorum vel nimia venarum desiccatio in
 æstate, quæ tunc humores calidos sibi attra-
 hunt ex colerico genere vt scribitur. 4. am-
 pho. com. 54. ibi. scilicet acutorum morbo-
 rum &c. Causæ primitiue sunt aeris exte-
 rioris nimia caliditas acuitatem vel ebulli-
 tionem in humoribus inducēs vel mala qua-
 litas alia vt eius corruptio vel putrefactio vt
 apparet in aere pestilentiali: similiter frigidi-
 tas aeris exterioris faciens clausiōem poro-
 rum exteriorum & fortificationem humorū
 calidorum in corpore quasi per antiperista-
 sim. similiter nimius motus, & immoderata
 exercitia in feruore æstatis. Similiter nimia
 vigilie & angustie & cogitationes & longe
 abstinencie. Omnia ista faciunt mediate vel
 immediate ad acuitatem humorum corpo-
 ris & eorum furie augmentationem & exci-
 tationem.

Signa fe. acutæ continuæ sunt communi-
 ter dolor capitis calor & fe. intensio. Et in ta-
 ctu videtur q calor penetret ad interiora ma-
 nus vigilie angustia corporalis intolerantia
 sitis & ardor pulsus velox & vrina rubea tin-
 cta aliquando ad citrinitatem intensam vel
 rufedinem decliuis omnia hæc significant
 morbum esse acutum & motus eius velocis-
 simus. Et Galenus in primo de fe. ad Glauco-
 nem ponit signa, continuarum & non defi-
 cientium fe. quia non habent rigorem nec ti-
 pum sicut interpolatæ, nec fe. ista cessat in
 24. horis sicut cessant interpolatæ. Et si i pul-
 su fuerit inordinatio aut inæqualitas in di-
 uersis percussionibus & pluribus est signum
 magnitudinis & acuitatis fe. & q non est de
 deficientibus, idest interpolatis. Si humores
 fuerint cholericis eius fe. vtique acutiores e-
 runt. 4. de causis pulsuum comment. 7. Et
 sequitur, si phlegmatiores mansuetior. qui-
 dem erit fe. proprium est enim fe. maxime a-
 cutis quod habeant pulsus velocem. quarto
 de causis pulsuum. comment. 15. & cau-
 sa istius est, necessitas attractionis aeris ad
 in-

infrigidandum cauma cordis & partium circumstantium. Aliud signum est quia cum somnietate & vigilijs propter vapores ascendentes ad caput loquuntur in somnijs & fit frequenter in eis parafrasis. & somnia eorum sunt terribilia. Et cum istis supradictis signis alia particularia concurrunt, ut est ætas tempus regio aer & regimen præteritum &c.

Iudicia in fe. continuis. Primo dicit hypocrat. Acute ægitudines in 14. diebus iudicantur. 1. terminantur. 2. aph. aph. 23. in com. crisis in acutis ægitudinibus non multum moratur tempus. Secundo iudicatur crisis in sexta die esse illauidabilis. 2. amph. commento. 23. ibi acute ægitudines.

Tertio quando incipiunt signa digestionis apparere: tunc est finis principij ægitudinis. in sententia. 1. de crisi. capitulo. 18. Quarto iudicatur crisis esse futuram per ista signa vel quando aliqua eorum antecedunt & ponuntur a Gale. 3. de crisi. cap. 2. sic. Et antecedunt supple crisis venturam quæ fiet per euacuationem aliquando per apertionem exituræ diuersa commotio in corpore ægri & vehemens, & id est quod accidit ei inquietudo estuatio & permixtio in sensu profundus somnus alteratio in anhelitu vertigo grauitas sui corporis, & adueniunt dolores capitis & dolores in collo & in alijs locis plurimis corporis, & accidit eis quandoque tintus & somnus in utrisque auribus & videtur coram se similia radijs, & currunt lachrymæ eius absque volutate & retinetur vrina eius, & tremit labium eius interius. Eraduenit ei in vno membro tremor & accidit ei obliuio & negat cognitionem eius quæ est ei præsens quàm videt, & aduenit ei rigor vehemens & antecedit paroxysmus fe. eius secundum plurimum horam in qua consuetudo eius erat vt veniret, & aduenit ei inflammatio vehemens & fitis intolerabilis: & clamatur & salit sicut dolorosus; deinde præcedit ex eo sudor exuberans aut vomitus plurimus aut soluitur venter eius subito aut procedit ex eo san. plurimus & accidunt ei species diuersæ ab istis aut omnes earum simul. 3. de crisi. cap. 2.

Quinto, primo quod consideratur in ea id est crisi maius signum est digestio vrinæ & egestionis & quod expuitur ex pectore. Et ego præsens sui multitudini infirmorum quam comprehendi in hora crisi. & nunquam vidi aliquem eorum mori quibus aduenit crisis post digestionem materie. tertio de cri. c. 3. igitur primum signorum signantium bonitatem crisis præsentis & maius ipsorum est digestio. ibidem & sequitur in sententia. Et secundum signum est quod fe. in die crisis indicata per diem indicationem, & tertium signum;

est quod fiat secundum naturam ægitudinis ut si est fe. adurens, tunc necessarius est fluxus san. narium; aut rigor fortis & postea sequatur sudor, cal. & humidus comprehendens totum corpus aut euomat aut egerat chole-ram plurimam. tertio de cri. c. 3. Sexto in non deficiente febre si labium aut oculus aut supercilium aut nasus distorquetur; aut non videat aut non audiat iam debili existente corpore quodcumque horum fiat iam prope est mors. 4. amph. amph. 46. Septimo ubi in fe. non deficiente dispensa superuenerit & desipientia mortale est ubi supra amph. 50. Octauo quibuscunque in febribus aut in alijs ægitudinibus voluntariè, oculi lachrymantur nihil inconueniens quibus vero non secundum voluntatem inconueniens est 4. ampho. amph. 52. Nono quibuscunque in dentibus febribus limofitates fiunt fortiores & diuturniores fiunt fe. ubi supra ampho. 53. Decimo febricitanti sudor omnis superueniens non deficiente fe. suppositione post cõ summationem sudore malum, prolongatur enim morbus & humores plurimos signat. 4. amph. amph. 59. Vndecimo quibuscunque in febribus aures surdescent. Nam a naribus fluens aut venter turbatus soluit ægitudinem 4. ampho. amph. 60. Duodecimo quibuscunque in fe. ictericia superuenerit ante septimum diem malum est. 4. amph. amph. 63. Decimotertio quibus in fe. in 7. aut 9. aut 11. aut 14. die ictericia superuenerit bonum, si non dexterum hypochondrium durum fuerit id est si non habuerit durum apostema in hepate. si vero non: non bonum id est si non venerit in diebus supradictis non est bonum signum ibidem. amph. 65. Decimoquarto in fe. circa ventrem cauma forte, & cordis morsus vel tremor malum ubi supra amph. 99. Et sequitur in com. hæc accidentia sunt mala & vltimate pessima, quia vite fundamentum igneo calore est calefactum. Iste ampho. intelligitur in fe. continuis in quibus infirmi aliquando dicunt: cor meum ardet. Istud cauma venit interdum propter apostemata in stomacho vel in membris vicinis. Decimoquinto iudicat Hypo. in fe. ex somnijs timores aut spasmi malum. 4. amph. amph. 67. Decimosexto in fe. spiritus offendens malum spasmus enim signat amph. 69. Decimo septimo in fe. acutis spasmus & circa viscera dolor fortis, malum ubi supra. apho. 69. Decimo octauo quibuscunque in fe. vrinæ cõ turbata velut subingalium his capitis dolores aut adfunt, aut aderunt. ubi supra amph. 72. Quædam autem homini vrinarum turbata existunt quæ scilicet hypostasum grossam & lociter faciunt quæ cum sit velocitate mor-

bi cessantis signat. 4. ampho. com. 72. Et sequitur ibidem. quæ vero hypostasim non faciunt & turbatæ existunt si virtus sit fortis, longum morbum protendunt, si debilis, mortem ibidem. Decimononò quibus in septima terminatur ægrotudo his nubem claram rubeam. 4. die habet vrinam & alia signa secundum rationem. 4. amph. amph. 73. & sequitur in com. Vnde non solum nebula rubra in quarta die & 7. crîsim significat sed & alba ad hoc certior & dignior est, & hoc magis si nebula in medio sit etiam suspensam continuam quolibet & æqualis & ibidem.

Vigesimo iudicium per vrinam; sic vrina quæ vna die, habet hypostasim laudabilem & alia die, non significat quod quidam humorum recipiunt digestionem. alij vero non, & ideo longâ ægrotudinem significat. 2. prognosticorum commento 26. & in cañ. Hipp. idem dicit. Ertu considera si virtus sit fortis potens expectare finem longi morbi, vel non, & secundum hoc iudica & dicte ægrum.

Vigesimo primo vrina al. cum fe. acuta significat frenesim vel mortem.

Vigesimo secundo vrina nigra intendens ad croceum in circulo cum feb. acuta sine alleviatione patientis mortale est.

Vigesimo tertio vrina siue aliqua hypostasi in fe. acuta talis permanens nihil boni significat & quia communiter medico præsentantur vrinæ continue & amici cupiunt scire de ægro & petunt à medico quid videretur vobis. Ideo continemus hic inspiciendo dicta Hippocratis in prognosti. & bene seruiunt nobis in istis fe. acutis continuis & in acutis conuersiuis & in peracutis & in alijs feb. interpolatis compositis. Dicamus lego si secundum Hippo. Vigesimo quarto iudicium per vrinam sit tale. Vrina est laudabilis quæ hypostasim albam & subsidentem æqualem & continuam atque leuem habebit & sic permanens vsque ad crîsim erit. Est enim fidelis & nuncia salutis, & significat breuitatem ægrotudinis, quæ vero cum hypostasi prædicta modo vero sine ea est diuturnitatem ægrotudinis significat nec est omnino fidelis. secundo prognosticorum cañ. 26. Et sequitur in com. circa medium quod si fuerit in ea sedimen. i. in vrina laudabili tunc oportet proculdubio ut sit in ea nebula alba. Et oportet necessario ut sit color vrinæ æqualis in citrinitate & substantia eius media inter subtilitatem & aquosam grossitiem sicut vrina asini. Vigesimo quinto vrina rubra nimis cum sua sibi simili hypostasi longâ ægrotudinem signat. est tñ nuncia fidelis, & certa sperande salutis. 2. prognosticorum cañ. 27. Et sequitur in com. Ista vrina signat diuini san. cum aquositate, & dicit ibi Ga. q.

in ægrotudinibus quæ sunt a sanitate quæ est magis inuatiuus in humoribus non est timor. Et illa aquositas quæ est cum sanguine indiget digone. Vigesimo sexto nebula pedes in vrina si al. bona, si nigra mala. vbi supra cañ. 29. & Gal. in cō. dicit quod nigredo denūciat mortificationem, vel calorem excessiuum. Vigesimo septimo cum vrina clara & citrina fuerit: indigesta signat ægrotudinem 2. prognost. cañ. 30. Et sequitur in com. Color vrinæ naturalis est æqualis citrinitatis. Et sequitur. Cūq; huius substantia fuerit tenuis signat quod ægrotudo non digeritur. Et sequitur vrina naturalis i colore suo temperato in citrinitate & in substantia sua æqualis ita ut non sit subtilis sicut aqua nec grossa sicut vrina asini & bestiarum &c. Ibidem timendus est igitur infirmi defectus. Et sequitur in com. Et si cū tali vrina clara & citrina virtus ægri fuerit fortis potes spectare digonem iuuetur infirmus alias morietur. Vigesimo octauo vrina mortis si gnatiua & fidelis & certa est aquosa aut fetens aut nigra siue lutosi. i. grossa vel turbida vbi supra cañ. 32. Et rō dictorum est; quia vrina aquosa arguit inobediētiā materię vltimatæ & impotentiā virtutis digestiue vltimatæ signat. Cā secūdi, quia fetor signat mortificationem vel aduersionem. Cā tertij est, quia nigredo signat mortificationem vel aduersionem. Cā quarti quia si sit in principio vel augmento signat cōturbationem in humorib. vltimatā & tūc est mortalis. Si aut talis vrina venerit in statu aut declinatione non: quia venit per viā mundificationis quæ hu. & supfluitates ei cōmiscetur, & Ga. in cō. vrina aquosa est cuius substantia est tenuis & color eius albus signat indigonem humorū in fine vltimo & debilitatē virtutis facientis digonem. Vigesimo nono prognosticar. Hip. sic in principio prognostico i principio. Primo in oī ægrotudine ægri faciē pñorabis. vtrū similis sit sano & erit si sibi sano similis sit quod si sit optimū, si verò cōtrariū, pessimū est & magis malū si infirmi facies sit similis faciebus mortuorum ut si nares acutę oculi concaui tpa plana color viridis niger pallidus aut plūbeus quibus apparētibus infra triduū ægrotudinis non pcedere fluxu vētris vel superfluo vomitu aut supfluis vigilijs vel abstinentia immoderata, oīa ista signa sunt mortalia quia substantialis & radicalis humiditatis signat cōsumptionem & virtutis debilitatē & caloris naturalis exhalationem facta à calore febrili & molestia eius.

Trigesimo si in somnijs palpebris subclasis sola alba videantur sine fluxu ventris præterito naturali vel artificiali nec hoc habet, in consuetudine, timendum est de morte vbi supra. Trigesimo primo si labia torqueantur aut nares aut palpebrę aut supercilia mortale est maxime cum debili virtute & si sequa-

tur amissio sensus per se vel cum istis prædi-
ctis mortale est. Trigesimo secundo in non
deficientibus fe. si quæ quidem extra frigida
fuerint quæ uero intus ardeant, & sitim ha-
beant, mortale est. quarto ampho. ampho.
48. Et dicit Galenus in commento quod non
intelligitur nisi in fe. peracutis & continuis
& in fe. furiosis & non in alijs, nec in febr. ter-
tianis quæ calidiores sunt alijs. Et sequitur
in commento causa horum accidentium a-
postema est calidum de phlegmonū genere
vel herisipilarum quæ sunt causa sanguinis
attrahendi ad membra ubi supra. unde &
incenduntur interiora & cutis & exteriora
& frigescent. hæc ille, & pro concordantia.
Trigesimo tertio in acutis morbis frigiditas
extremitatum malum 7. amph. amph. 1. & vi-
de causam in commento, quæ immediate di-
cta est. Et pro concordantia in dolore forti
circa ventrem extremitatum frigiditas ma-
lum est. 7. amph. amph. 26. & vide commentū
& causam. Trigesimo quarto si testes aut
virga contrahantur aut minuantur non tam-
en occasione dol. mortale est. Et secundo
prognosticorum manuum mobilitatis signa
sic pernorabis. In febr. acuta & in peripleu-
monia & in frenesi & in dolore capitis si ma-
nus tulerit ad caput aliquid positurus vel al-
iquid collecturus huc illic quæsierit, vel de
vestibus quasi pillos enulserit vel festucas de
pariete decerperit, malum signum & morta-
le est. Nimis longum esset si totum librum
prognosticorum hic vellemus affigere. Sed
secundum Gal. in secundo prognosticorum
commento 6. vocetur hic pronosticum hoc
& est pro. Trigesimo quinto summa in om-
ni prognosticatione, quæ est super illum qui
moritur & quæ uiuit est comparatio inter
fortitudinem ægritudinis & inter fortitudi-
nem infirmi quando est. ergo ægritudo for-
tior, moritur infirmus proculdubio. Et quan-
do debiliior est virtute infirmi non moritur
secundo prognosti. comment. 7. ibi. Bonum
est modeste fe. &c. Et no. ibidem quomodo
oportet cōsiderare tres principales virtutes,
quæ quidem cognoscuntur debiles esse aut
fortes ex debilitate vel fortitudine suarum
operationum. Trigesimo sexto si liuor mix-
tus viridi in unguitibus & digitis affuerit mor-
tem aduenire non dubitatur. Secundo pro-
nosticorum. cañ. 8. Si autem vis scire signa
sumpta ab alijs exeuntibus vide in pronostifi.
Hippo. & in alijs libris: sed considera bene
in supradictis 2. quia res quæ in ultimo sunt
contrarietatis rebus naturalibus sunt in vi-
timo significantes perditionem 2. prognosti.
com. 32.

Trigesimo septimo iudicium febricitanti

bus non fortiter nec omnino in superficiem
permanere vel minuire corpus aut contabe-
scere malum est magis eo quod secundum ra-
tionem. sit hoc enim idest non minuire lon-
gitudinem ægritudinis. hoc enim. i. contabe-
scere imbecillitatem virtutis signat. 2. amph.
amph. 28. sequitur in commento. Si enim fe.
maior sit & velocior macies fiet velocior.

Trigesimo octavo temporibus siccis febr.
nascuntur acutæ & breuissimæ ex humoribus
cholericis 3. amph. comment. 7. ibi. Ægritu-
dines vero siccae &c. intellige de regionibus
& complexionibus & ætatibus calidis & sic-
cis. unde in hispanorum regnis & in orien-
talibus regionibus fe. acutæ & cholericæ fre-
quenter fiunt, in alijs vero frigidis raro.

Trigesimo nono in non deficientibus febr.
si quæ quidem extra sunt frigida fuerint quæ
vero intus ardeant & sitim habent mortale
est. 4. ampho. ampho. 48. Significat enim
apostema in visceribus esse hæc ille.

Curatio februm acutarum contrinuarum
Nunc autem volo pro amore dei & utilitate
communi aggregare aliquas generales can-
per quos quis possit regulariter in febr. put.
operari.

Primus est in febr. acutis putridis. scimus
sanitatem non posse fieri nisi putredo primi-
tus terminetur, ideo oportet illam prius au-
ferri de intentione domini Galeni. 10. de in-
ge. c. 2. in principio.

Secundus si aliquis fe. put. vult curare prius
mitigabit putrefactionem, & intentio sua e-
rit in febr. & in putredine. In febr. autem duobus
modis intendat. vno modo: vt curat il-
lud quod adest & venturum prohibeat. In
putredine quoque intendens curet eam in
putredinem quæ dixi. verba sunt Gal. 10. de
inge. c. 5.

Tertius, quicumque putrefactionem auferre
voluerit ad remouendam oppillationem quæ
est causa eius intendere debet, quia remanen-
te causa effectus utique semper remanebit.

Quartus can. est Auic. in prima quarti tra-
ct. 2. cap. intentio ad curationes febr. putri-
darum quando febr. est multæ vehementiæ &
acuitatis & non iuuenis virtutem fortem re-
sistentem & tolerantem, tunc magis vien-
dum est infrigidatione non vltima, quam
euacuatione nec digestionem. Dico non vltima
quia quæ excellenter infrigidant, extin-
guunt innatum calorem, primo de febr. ad
Glauconem cap. 10. Si autem virtus est for-
tis, & resistens abscinde causam & expelle
humor. & abscinde cibum & non infrigi-
des infrigidatione, quæ prohibeat resolu-
tionem.

Quintus, quotiescunque virtus est de-
ficiens

Sciens medicus sit occupatus in quando co-
plexionem contrariam ei, quare debes illam
calidam complexionem infrigidare, & virtu-
tem cum cibo viuificare, vbi supra virtus e-
nim viuificata redit ad causam digerendam
& expellendam. Sextus infrigidatio in fe-
bre non est facienda cum rebus stipiticis & desic-
cativis vt sunt aliqui troscisci istius virtutis,
nisi hoc fieret post digestionem & euacuatio-
nem materię. Septimus vbi dubitatur de
specie & natura se. subtilia regimen, & caue
vt paroxismo ventrem inuenias euacuatum
virtute hoc tolerante. Octauus omnes fru-
ctus recentes nocent febricitantibus: cum sua
ebullitione & corruptione in stomacho, ideo
febricitantes ab eis sunt prohibendi. Auic.
in prima 4^{ti} capitulo. Intentio generalis ad
curationes se. pu. Nonus est autē ibidem
virtute forti existente & sanguine superabun-
dante, vel si cum hu. viueente san. cognoscit-
ur abundare, tunc flebotomia cunctis me-
dicinis conuenientior existit, maxime quan-
do vna est rug. grossa & non citrina, ignea ex
qua timeretur victoria cholere & acuitas eius
ppst flebotomiam. Decimus ptesupposi-
ta virtutis constantia solutio ventris mino-
ratur. subtilibus lenitiuis flebotomiam se-
quatur & hu. superabundantis residui sequa-
tur euacuatio. Aut. vbi supra scilicet in pri-
ma sen. quat. tit. 2. c. Intentio ad curatio-
nes viles se. pu. Vndecimus in continuis
se. acutis venter lenificatio cum solutiuis le-
uibus non laboriosa est plurimum commen-
danda. sententia Auic. ibidem. Duodeci-
mus si per singultū, vel nauseam, vel per do-
lorem stomachi, vel aliter cognoscitur q. hu.
ad stomachum, declinat illico vomitus est
pronocandus. Si per rugitum & gurgulatio-
nem in intestinis ptesumitur materiam in-
ferius deriuari, per solutionem ventris est
euacuanda, quia vnde cūque reperit natura
inde ducere oportet per conuenientes re-
giones. Decimus ultimus euacuatio eradica-
tiua ante materię digestionem exercenda nō
est, nec in calida, nec in frigida, nisi materia
fuerit furiosa, & non quiescens & terribilia
inducens accidētia. Iste canon est Hyppoc.
primo amphibi digesta medicari & non cri-
da moueri. Et similiter est Auid. in prima sen.
4. loco superius allegato. Et causa istius est
quia per istam euacuatiōem ante digestio-
nem materię impeditur digestio nocitiua, &
indatiuum cum nocituo permiscetur pro-
pter motum quem dicta euacuatio in humo-
ribus inducit, ad quem etiam motum moue-
tur malignum absque digestionē sui.

Decimus quartus i dominio sanguinis, vbi

de flebotomia sumus solliciti non oportet
digestionē expectare. Solis alijs hu. & nō san-
guini debetur expectatio digestionis. Deci-
mus quintus cum natura ad crīsim mouetur
perfecte non indiget medicaminibus, si autē
imperfecte oportet nos iuuare eam & mino-
ritatem sui roboris adimplere, vt crīsim per-
fecte operetur cum vtroque, scilicet virtute
& medicaminibus. i. ampho. comm. 22. ibi
scilicet. Digesta medicari. Decimus sextus
si in aliqua feb. continua cōmpetit flebotō-
mia illa in principio est exercenda. Cum e-
nim postponitur flebotomia apud princi-
piū egitudinis amplius ad eam non est in-
tentio & fortasse intestus per aduentum de-
bilitatis. Iste est Auid. in prima quarti tit. 2. c.
Intentio ad curationes vniuersales & c.

Decimus septimus euacuatio cū medicina
in die interpolationis vel minoris afflictio-
nis & in hora diei frigidiori est facienda, &
nō in die paroxismi vel maioris afflictionis.
Aui. ibidem. Decimus octauus si se. acutis-
sima fuerit vinum balneum & epithyma rel-
inquantur & ad aquam frigidam conuertā-
tur, quia magnum iuuamen ad se. extinguen-
dam prestat & eius acumen, sed tamen
non valet ad purgandum putredinem cum
vna vel sudore vel egestionē. mech. particu-
lula. i. r. quasi in col. 3. Decimus nonus quō
circa si omnia fortiora sunt. scilicet cor, he-
par, & cerebrum, & se. sit acutissima, da aquā
frigidam sine dubio. si senior vel decrepitus
non fuerit impossibile est enim decrepitum
fortem inuenire. Galenus ibidem. Vigesi-
mus si multitudo sang. & viscositas humorū
& angustia & oppilatio corporis primo fle-
botomo succurrimus deinde humores attri-
tamus & post poros aperimus & diluamus
secundum ordinem nature. mech. particul.
i. r. colum. 2. Vigessimus primus ante om-
nia virtus requirenda est, quā si sit fortis &
expedit purgari, intrepidus purgabis. Si au-
tem fuerit defecta nequaquam purges aut
modicum quod virtus ferre valeat. aut prius
virtus cum aliquibus confortetur, deinde
purganda purgantur ibidem. Vigessimus
secundus si in febr. pu. putredo est propter
oppilationem, aperiat illa. Et si propter
humorum multitudinem minue eos si pro-
pter grossitiam & viscositatem attenuentur
& subtilientur. Et si causa est composita
medicinam secundum compositionem cau-
se compositione ibidem. Vigessimus ter-
tius si frigidus aer attractus ad cordialia an-
te omnem medicinam attingit. ideo vt ipse
refrigeret & in feb. acutis naturaliter, vel
artificialiter est procurandus.

Vigefimusquartus aliquando propter magnam molestiam morbi nociva ægritudinis ministramus verbi gratia si sincopis fuerit cum febre necesse est infirmo vinum dare & ius carniū. & propter hoc oportet ut ad illud quod magis necessarium est festinemus. mech. particula. 7. colum. 9. Vigefimusquintus, si est necesse ut multum extrahatur san. aut hu. & virtus sit debilis non semel, sed paulatim & multis detractionibus minuat, si autem fortis, semel & multus extrahendus est. mech. particula. 9. colum. 9. Vigefimus sextus, in febris in laxando medicus sit auarus, quia melius est partem magis relinquere quam totum exquisita euacuare ut dicit Auicenna in 4. primis. Vigefimus septimus, medicus in reficiendo debet esse audax & largus, quia omne peccatum quodcumque sit magis fit in tenuibus dietis, quam in grossioribus, ut dicit Hipp. 1. apho. Vigefimus octauus assiduare gutturi patienti ægritudinem calidum aliquid ut remaneat humidum & non exsiccetur in curis earum est iuuatiuum valde, Auicenna in prima. 4. c. de cura. febr. acutarum per ipsum, illa autem cum quibus hoc fit secundum Auicenna, ibidem sunt mucillago psylli & mucillago granorum citoniorum, & succus portulacæ & succus liquiritiæ ut sedetur sitis. Curatio particularis febr. acutæ continuæ in primis ergo iuxta doctrinam. 23. cañ. constituitur acutè febricitans in aere frigido, ita quod camera sit munda a superfluis & roretur cum aceto & aqua rosata vel saltem cum aqua frigida & sternatur cum folijs salicis & vitis & canne. Et circa lectum & parietes camere ponant canne & rami & folia supradicta & folia & flores nenupari & lentiginis aque. Et isti rami debent colligi ante ortum solis & odorant violas rosas lauda. vel fiat sacculus cum illis cum modico camphoræ, qui quidem sacculus aliquando aqua rosa & aceto roretur & continuo odoretur. Et si in dicto sacculo addas de se. papaneris & floribus nenupariis, melius valebit. Secundo iuxta tenorem novi canon. virtute forti existente si videtur quod san. superabundet solus, vel cum alijs humoribus in magna quantitate fiat flebotomia de basilica in magna quantitate secundum quantitatem plenitudinis, tamen prius consideretur si adest congestio, & illa cum clisteri molliuio vel suppositorio remouetur, vel cū clisteri iniiciatur succi sicclij olei viol. quar. j. sal. draj. Si autem se. est ardentissima & videtur quasi coagulare, extrahantur succus melonis cucur. & cucu. & lactis & addito zuccaro & oleo vig-

la. fiat clistere & ad j. li. istius addatur scis communis camphoræ ana dram. j. fiat clistere & tepidum iniiciatur. laxat enim & infrigidas, causa quod in intestinis est & caliditatem annullat & extirpat.

Istam autem flebotomiam in secunda vel in tertia die sequatur vna medicina minoratiue virtute hoc tolerante iuxta tenorem decimi canon. Recip. florum viola. unc. j. florum borag. & buglossæ ana. unc. vi. vinico feruore bulliant in j. li. aquæ & colentur in colatura dissoluatur oxalicæ. unc. j. Post sortem frictionem coletur & exhibetur, vel in dicta colatura dissoluatur cassia. si. vel manna granata vel reubarbarum dissolutum in aqua endiuie. Ista enim commixta vel simpliciter exhibeantur iuxta indigentiam interni & industriam medici. His sic expletis & dum ista cteguatur, debemus intendere ad digestionem materię digeratur ergo materia cum sirupo acetoso facto cum zuccaro & aceto & aqua. quia dicit Auicenna multotiens inueni rem. que digerit & subtiliat & euacuat & infrigidat sicut est sirupus acetosus vel ozizaccara, quæ sunt de succo malorum granatorum acetosorum aceto & zuccaro ad eandem intentionem in causis etiam calidissimis, ubi est sitis & ardor & febris intensa valet sirupus de papa. & sirupus nenupariis, sirupus rosa. & viola. & sirupus endi. sirupus de se. portulacæ quem ponit hebdomadæ, & sirupus limonium & de ribes & succus granatorum aqua extracta a cucurbita in furno coctæ. Si materia est commixta aliquali ter & quod essetibi phlegma ut interdū assidet de phlegmate salso vel alia specie humoris grossi, tunc addenda sunt cum supradictis aliqua incisua, quæ non excedant multum in aliqua qualitate, ut est endiua cicorea cum radice adiantos radix epij & cetera. bossa, vel digerantur cum aqua cicerym in qua prius graminis virgula & radix feniculi perbulientur cum modico atem. Cognita autem digestionem materię si est acuta calida purgetur cum hac decoctione. Recip. florum viola. boragin. & buglossæ ana. unc. j. bulliant vinico, feruore & in colatura dissoluatur cassia. munda. unc. j. reubarbari temperati in aqua endiuie. dram. j. vel sic in dicta decoctione temperentur amaritodi. unc. j. & vj. bulliant iterum vel bene confricentur & colentur & ministrentur addendo de electuario de succo rosato. dram. iij. vel magis vel minus secundum virtutem ægri. vel detur manna granata cum reubarbaro.

In materia autem phlegmatica si est grossa & viscosa fiat ei talis medicina. Recip. polipodij querci. recentis & mundi florum violę & boraginis & buglossis passu. munda. ab arill. ana. unc. i. fiat decoctio in qua dissoluatur cassia si. munda. nunc. j. scamonea decoctę in coctano grana. x. vel loco eius ponatur reub. unc. vj. purgat phlegma cum portione cholę. aliqui in dicta decoctione addunt collata pul. diaturbith cum modico spice nardi. Aliqui etiam ponunt in dicta decoctione radicem ebulli & anisum, & sic euacuant phlegma. Ista enim facienda sunt casu. vniuersalibus bene obseruatis. In materia supradicta grossa & viscosa phlegmatica, quod scitur: ex præterito desiderio & copioso regimine, vel piscium vel fructuum ingenti cibatione, & ex habitudine plana cum sputamine aquo. loco. & aliquando spisso & similibus. In talinquam casu pro digestiuo sirupus acetosus commodè tribuitur cum aqua cicerum & viregarum graminis. Et si addatur aliquid de sirupo de absinthio bonum erit. Sirupus enim acetosus non solum subtilem materiam digerendo ingrossat: immo & tenacem phlegmaticam incidit & dissoluit vt dicit Hebe. & Auicenn. Pro solutionis autem quidam ministrauerunt mirabolanos, sed non inueniunt in eis intentionem secundum quam operentur. Stringunt enim poros post solutionem vt dicit Auicenn. & exasperant viscera vt ipse asserit in intentione generali ad curationes generales feb. putridarum & dicit ibi quod si fuerint necessarii quod dentur post digestionem integram materię. Dicit tunc Stephanus Arnaldi in defensorio vite, quod mirabolani mira in feb. faciunt, quia frigidi sunt & a remotis hu. attrahunt. sed bene intelligit quod dentur post perfectam digestionem materię. fiat ergo sic. Reci. corticis mirabolani citrini. unc. j. chebulido. si esset materia composita ana. unc. ij. conterantur grosso modo & temperentur per totam noctem in viij. unc. lactis amigda. dulcium. Deinde Recip. tamarindi. unc. iij. violę iniubarum. unc. j. zuccari. unc. j. fiat levis decoctio cum qua limphetur potio mirabo. post perfectam frictionem & colaturam eorum & offeratur vna quantitas secundum vires ægri ad leniendum materiam & ad reprimendum calorem. Alius potus secundum ipsum. Recip. reubar. unc. j. & vj. succi rosar. unc. iij. aquę calidę. unc. ij. zuccari unc. j. Dicit etiam ipse, quod scamonea cum pauco mentha & violę in ptisana vel cum zuccaro in lacte amigda. est conueniens. Ponit &

tiam ipse quod si. ij. dram. scamoneę pulueri zatz. ponantur in coctano inuoluto in pasta & coquatur donec pasta sit. perfecte cocta sub cineribus vel in furno & abijciatur scamonea & illud coctanum vel pomum offeratur erit delicatum laxatiuum, & purgat cholę in delicatis sine calefactione epatis cum zuccaro vel penidijs & pul. sanda. & sirupus viola. & fiat ad modum electuarij, vel conseruę & patet vt supra. Si igitur materia feb. magis fuerit phlegmatica quàm cholęrica fiat sic. Recip. corticum mirabolę. chebu. unc. j. bellericę turbit ana. dra. ij. remolliantur per sex horas. in j. ll. aquę tepidę cum duabus unc. carniū passulorum ad calorem feruentis aquę in duplici vase seruere permittatur, deinde coletur & colatura offeratur secundum vires ægri. Si autem in ista fe. continua fuerit phlegma salsum cum cholera mixtum quod scitur ex salsedine oris & in ieiunio in salsedine sputi, exuntis cum rascatione, scuratione & ex si. ti continua & pruritu & scabie præterita vel præsentē. Tunc post digestiuum in quo virtus epithimi & passulę inueniatur purgetur talis hu. sic vt curet fe. & scabies euangescat. Rec. seri caprini. ll. j. ponant in eo violę. unc. j. absinthij. unc. vj. bulliant vnico feruore & in colatura dissoluatur tamarindorum. unc. j. Et post perfectam frictionem & colaturam dantur sero vel in medio noctis cognita digestionē materię. Et valet in fe. & in scabie si continuentur. Si autem materia feb. tendit ad melancholiam fiat sic. Recip. foliorum senę. dram. iij. passula. munda. ab arill. onc. j. epithi. dram. j. agarici. dram. vj. omnia temperentur per sex ho. in duabus. li. aquę deinde bulliant vnico feruore & colaturę addatur manę granatę. dram. io. vel magis vel minus. veruntamen sena decoctionem nigram reddit & obest quamplurimum hominibus cholericis & siccis in habitudine ideo &c. Ergo loco illius fiat sic. Recip. polipodij querci. passu. munda. anisi epithimi. ana. unc. vj. fiat levis decoctio in sero caprino in cuius colatura dissoluatur tamarindorum. dram. vj. offeratur colatura, vel purgetur cum reliquis appropriatis. Tamarindi enim cum sua acredine & frigiditate, & euacuatione alterant malam complexionem calidam febrilem, & euacuant cholęram & humorem adustum, & ideo habent duplex inuamentum.

Hoc autem non est ignorandum, quod hectica febr. continue veniunt interdum cum cacochimia propter conculcationem humorum, & tunc sunt multi mali humores, & paucus bonus san.

& tunc flebotomia nō est excedenda. Dicit. n. Aui. in quarta distinctione primi. c. 2. Cum ergo alicuius fuerit sanguis paucus bonus, & fuerint in ipsius corpore multi mali humores flebotomia bonum rapit & malum relinquunt. Istam autem cacochimiam indagabis per faciei plenitudinem inconsuetam, & per calorem vergentem ad plumbeum vel cinericium vel rubeum mortificatum per dimissionem purgationis consuetę per vomitum vel per secessum factum per artem vel per naturam cognoscitur & per crapulam & regimen crapulosum & per quietis & otij amorē & per cessationem passionum consuetarum, & sunt species guttę in quibus propter longā durationem & abstinentiam non solum boni, immo & mali humores consumuntur. Si militer accidit quando multi humores erudi in corpore reperiuntur tunc enim flebotomia est, multum impediens, ut dicit Aui. in loco allegato.

Dieta febricitantium acutę, circa quam aliqui canones universales sunt præmittendi. Primus est Hyppo. primo ampho. ampl. 16. & transumptive. Aui. in capitulo de curatione febricitantium scilicet humida dieta omnibus febricitantibus conferunt & maxime pueris & alijs sic assuetis refici. Secundus in morbis acutissimis totalis simpliciter cibi competit prohibitio præsupposita virtutis constantia de intentione Hypp. primo ampho. amph. ibi. Ad vitimas agnitudines &c. Tertius in morbis acutis in quibus virtus est debilis non competit totalis bibę prohibitio. primo amph. ibi. Contemplari autem oportet. Quartus, in morbis autem acutis in quibus competit cibus ille debet dari subtilis & non grossus. Causa istorum trium canonum est ut natura magis occupetur in digestionem materię morbi & non diuertatur ab ea ad digestionem cibi. Quintus cuiusque accidit se & natura est sicca non cibem penitus ante, si non egreditur sex perfecte. Iste est Aui. in prima quarti. cap. 2. capitulo de curatione febricitantium. Sextus, necessarium est paroxismos & exacerbationes stomachos febricitantium vacuos invenire ne natura ad cibum conuersa digestionem & expulsionem materię morbi desistat. Septimus est Aui. intentio curatiua, in omnibus feb. putridis omnes fructus nocent febricitantibus cum ebullitione sua & corruptione in stomacho, ideo febricitantes universaliter quasi execratos debent eos evitare. Octavus est Stephani Arnaldi in defensorio vite. Non est utile nec licitum febricitantes febre putredinali nimis herbis crudis & nutriti nisi sint multe necessitatis, quia na-

turam fatigant in digerendos sicut nec fructibus est bonum vii. Nonus, cibaria grossa, & impura & ad putrefactionem conuertibilia sunt apud febricitantes dimittenda. Decimus cibaria stupida nequaquam febricitantibus conferunt nisi excedens sit lassitudo ventris. Undecimus dulcia cibaria in acutis feb. non sunt utilia nisi pectus aliquantulum patiatur. Inter cetera cibaria acutę febricitantibus utilia & amica prisana colata, & non colata obtinet principatum postquam hordeatum apud me sit colloatum. Duodecimus, potus aque hordei prius alijs potibus strenuus & melior invenitur & competens. Decimotertius, communis dieta omnium febricitantium sit facilis digestionis & nusquam secundum poros detenta. Decimusquartus, ubi virtus est debilis & status remotus plus de cibo & grossiori est ministrandum, ubi autem virtus est fortis & status propinquus nihil de cibo aut parum de subtiliori est concedendum. Inter utranque dispositionem istorum oportet medicum concedere secundum estimationem, veritatis propinquam, quia quantitas offerendorum certis literis denotari non potest ut dicit Galenus in tech. Decimusquintus, corporibus calidis & siccis cito resolubilibus non solum semel sed bis in die cibus est exhibendus & talibus multum valent frigida & humida. Si tamen viscosa non sunt nec multum nutritiva mech. particula. 8. col. 3. & hoc fit quia in istis multum timemus de hectica. Dieta particularis febricitantium acutę. Cum ergo videris fe. peracutam quam poteris indagare per calorem & fe. multum intensam, & aliquando cum magno dolore capitis & per inquietudinem & angustiam magnam, & per alia symptomata terrorem facientia, ista inquam ostendunt morbum esse peracutum, & materiam peracutissimam & velocissimam modum habentem fortem & venit crisis in quarta die quibus sic apparentibus nihil pernitus pro cibo ministrabis, solam autem aquam hordei propinabis vel aliquos sirupos vel potus alteratiuos ut est sirupus acetosus oxizaccara tulep Alexandrinum, Rob de succis frigidis vrob de agresta & rob de succo acetos & rob de fructibus acedule, & similia. Si tamen esset infirmus in ætate puerili vel iuuenili vel esset complexionis calidę & sicce vel esset multum rare habitudinis cum apertione & raritate, pororum quod apparet quia frequenter in sanitate ex modica causa sudabat vel si habet in consuetudine comedendi plurimum & frequenter, vel si aliter est debilis multum. Si enim aliquid de istis vel maior pars invenitur concedimus

et auenarum, vel hordeatum clarum in primis tribus diebus & si crisis sit in quarta die illa die nihil damus de cibo. Si crisis usque ad septimum diem differat dictos cibos concedimus usque ad sextum diem inclusivum & succos malorum granatorum & sirupos alterantes ardorem febris acutae. In septima autem nihil cibate nec medicinale penitus est offerendum: sola enim aqua hordei in magnitudine sitis in parva quantitate est tribuenda. Vbi autem agritudo procedit usque ad 11 vel 12 concedimus hordeatum factum cum lacte amigdae & cum lacte, q. se. frigidorum maiorem, & auenarum similiter conditum & ins parua pulla cocta cum lactucis vel frusto cucurbitae viridi vel pisciculos squamosos boni saporis de aquis currentibus maxime impetuose super lapides & aliquando pro appetitu concedimus de pomis, vel picis obseruatis ad hyemem coctis in catenibus cum aliquantulo de zuecero. Aliqui dant auenam fractam vel candarusum cum lacte amigdae & ponunt in quo aceturum. Nos vero in eo ponimus granatorum propter sapiditatem & in frigidationem vel parum de succo vel aceto sitate limonum vel pomi citrini vel arange, per hoc enim appetitus roboratur, & cibus sapidiior & frigidior inuenitur aliquando datur colatura suffusus frumenti cocti cocta ad mediocre spissitudinem cum pauculo zuecero. Comeditur etiam mica panis frumentiter vel quater lota in aqua frigida & vtilius cum aqua rosae non fricatis manibus, refrigerando enim nutrit si super spargatur zuecari panis, sed non tantum refrigerat. In regnis hispaniae medici & medicae multum videntur iure cicerum betuorum. Aliqui concedunt spinargia & lactucas per aequales partes coctas cum lacte amigdae & se. frigidorum maiorem, conceditur & dictum lac bullitum & super sparsum super panem iter lotum super sparsio zuecero. Dant etiam pruna dama scena in aqua frigida lora & temperata seu remollita. Aliquo etiam concedunt racemos hyemales in tempore vindemiarum suspensos, vel lactucas & portulacas & parum endiuitas in aqua quae abiecta addatur aceturum & comedantur. Ista enim sustinent naturam & non argunt, immo minuunt & non sunt grossa immo ad latus subtilitatis magis trahunt. Similiter panis simile solutus in aqua frigida, & est secundus panis frumenti succus granatorum mellicratum parua commixtionis, ita quod ibi sit multum de aqua & parum de melle vel zuecero. Illa autem quae trahunt ad latus grossitiae sunt perdices pulli gallinarum capretus & extremitatum eius oua sorbilia & auiculae campestres pedes &

auriculae porcellorum pedes mutonis perferre cocti pisces squamosi de aquis mundis currentibus ex semine cucurbitae, & tantum de amigdae dulcibus extrahatur lac & ponatur cum auena fracta vel cum spelta munda fracta, & coquantur ad perfectionem & offerantur. Si autem esset multum debilis vel indigeret fortificatione virtutis, fiat cibus albus cum dicto uenato addendo pulpa galinae bullitae & zuecarnum. Quantum ad potum febricitantium acuto potest quod vinum postponatur & totaliter relinquatur nisi in simplici vel in nimis virtutis debilitate sed detur aqua hordei vel detur interdum aqua in qua temperetur & malaretur mica panis similis vel panis hordei & offerantur. Sed nos nequaquam habentes feb. pur. balnearo dimittimus, nec eis cataplasmata nec emplastica frigida nec calida, nisi post purgationem totius corporis. Cum corpus perfecte purgatum fuerit balnea & lauacra & epithymata fieri iubemus megarechni particula videlicet colundello tertio. Alius modus, & opinio quantum ad modum gubernationis istorum febricitantium acuto est apud aliquos de hispanis ut ego vidi nam in illis regnis hispaniae multi de illis inueniuntur, & est quod febricitantes non frequenter mutant lectum, immo nec lintamina permittunt mutari usque ad crisin, dicunt enim quod calor lecti attrahit calorem & vaporem ad extra, & sic minuitur febrilis calor, & natura feruentius operatur in digestionem materiae feb. quando patiens statim calore reflexionis sui corporis quam si frequenter acri frigido exponeretur. Et dicunt quod non valeret tantum si lintamina recentia in calore solis vel ignis calefierent, quia non tantum est similis calor corporis. Et si quis hoc perspicue dignaretur intueri aliquam veritatis scintillam inueniret. Et ideo communiter operando quando agri in lecto existentes se discoopunt existentes, faciunt eos melius cooperiri in primo de feb. ad Glauconem in cura feacutarum dicit. Continua vero febris quibus quidem status non procul a 7. esse debet & est virtus fortis, & ea quae aetatis sunt concordant certe & valde subtiliter oportet dietare, quibus autem procul a 7. est status totius egritudinis, aut ea quae virtutis non sunt bene robusta secundum principium quidem grossius, prope vero statum tenuis & in statu & in crisi existentibus tenuissime dietare. Haec sunt verba Galeni ubi supra. Et prociho iubet ibidem Galenus dare prisanam & hordeatum & mellicratum, nisi feb. esset ita fortis quod mellicratum ratione mellicrati, committeretur in cholera. Et iubet ibi da-

re candarusum per quod intelligo hordeum mundatum fractum grosso modo aut auena & spelta mundata & simili modo fracta. Iubet etiam dari panem lotum per aquam frigidam &c. Et sequitur in fine. In vero calidis & caufonibus. quando primo videris digestionis signa: eris audens aquam frigidam dare bibere in multitudine dationis commensurans horam & regionem, & etatem, consuetudinem & naturam. hec ille. *philos. phil.*

Declaratio in fe. acuta continua. primo intelligendum secundum Galenum in de differentiis febrium, quod prima causa in febr. put. quantum ad curam consideratur plenitudo corporis quo ad vasa vel quo ad virtutem. secundo consideratur oppillatio viarum & pororum. Tertio consideratur detentio materię & prohibitio respirationis & euentationis propter conculationem ex qua conculatione hu. sequitur putrefactio & ex putrefactione fumus eleuatur. qui proueniendo ad cor facit fe. hęc sunt verba Galeni vbi supra. Et in isto continetur in sententia. modus generationis febris putridę & causę eius & modus cure.

Secundo nota. quod in cura febr. secundum Galenum mech. particula 8. col. primo quod in fe. putrida causa fe. permanente necessarium est primo putredinem excludi. deinde malam complexionem curari. Ex isto sequitur quod alteratio malę complexionis debet sequi purgationem materię & remotionem putredinis. Et sequitur etiā q. epithim. ata frigida sup. hepar, vel sup. pulsus vel sup. frontē & tpa in principio nec augmento apponenda non sunt sicut faciunt aliqui ignorantes medici in arte medicinę abortiui. Tertio notandum quod in fe. acuta aliquando competit flebotomia, sed aliquando postponitur propter indigestionem ciborum assumptorum vel humorum qui adhuc stāt semidigesti circa epar & venas eius. ideo in prima & secunda die omittatur flebotomia. In tertia autem die interdū postponitur. propter motum materię fe. acutę quę vt plurimum est cho. vt dicunt autores, motus autē cho. in tertia die celebratur & tollitur communiter ante flebotomiam: ergo in prima die flebotomia dimittenda est propter constipationem, in secunda propter crapulam, vel indigestionem, in tertia similiter propter insultum materię chol. Et ideo aliqui in cōtinuis fe. non flebotomant vsque ad 4. diem attamen si san. vincit: fac a principio flebotomiam nisi virtus aut ætas aut crapula non consentiant, vel cibus indigestus nouiter assumptus. Hęc enim solent flebotomiam impedire ne fiat a principio vt dicit Gal. in libello de flebotomia. Quarto in ordine no-

tandum quod medici præcipue Ani. & Iohā. nīcius diffiniunt se. per calorem dicendo q. feb. est calor extraneus &c. Sed hoc videtur falsum, quia si sic: tunc ad feb. esset motus; consequens est falsum. igitur & illud ex quo sequitur, quod consequens sit falsum. probatur per Auer. 3. col. 3. c. 1. vbi dicit quod omnis morbus est mala dispositio, modo dispositio est de prima specie. qualitatis ad quam non est motus 7. physicorum probatur consequentia, quia calor extraneus acquiritur per alterationem in qua est motus igitur &c. Secundo ad idem, si prædicatio esset veratūc calor caperetur pro corpore calido aut pro sola qualitate a sufficienti diuisione data a Gal. in comen. Et qui crescunt non primo modo, quia fe. est motus & morbus est accidens, & accidens non est corpus nec 2. quia feb. mouetur a corde in totum corpus, vt ponit Auic. in diffinitione. modo nullum accidens mouetur de subiecto in subiectum, quia accidentia indignantis naturę sunt. parum enim possunt mutari aut nequaquam vt ponit autor 6. principiorum. Tertio sequetur quod duo contraria essent in eodem subiecto adequato: consequens est falsum. contra Arist. in post. prædicamentis, & contra Gal. in j. de complexionibus. probatur consequentia, quia in fe. lipparia interiora sunt frigida. Et tamen per se fe. est in corde, ergo calor febrilis & frigus simul essent in eodem loco, quod est absurdum. Oppositum dicit Ani. in prima 4. c. 1. dicens quod fe. est calor extraneus &c. Et probatur ratione fe. est mala com. ergo vel est mala com. calida. vel mala frigida vel mala humida. non frigida non humida nec sicca per se. quia nulla istarum apparet ad sensum tactus. ergo est mala calida. consequentia nota est. antecedens est Gal. 8. de inge. cap. 1. vbi dicit quod fe. est quidam morbus ex mala complexione corporis &c. ergo fe. est calor extraneus præter naturam quod fuit probandum.

Pro ista questione est notandum quod. capiēdo calorem præter naturam pro corpore calido sic feb. non est calor præter naturam, quia febr. est morbus, & omnis morbus est accidens morbi, modo accidens non potest esse corpus, imo distinguuntur. ergo fe. non est calor præter naturam sumendo ly calor pro corpore calido. Confirmatur, quia tunc sequeretur, quod duo corpora essent simul in eodem loco adequato, quod est cōtra Arist. 4. phi. probatur consequentia, quia feb. est simul cum spiritu & sanguine, & sic corpus esset in corpore simul & esset corporum penetratio, quod est falsum, quia nullus dubitat quod calor naturalis & spiritus sunt corpora, vt dicit haly.

Haly. 3. tech. commento illius cas. Et ex accedentibus animæ. Item notandum est, quod aliqui dicunt, quod febr. est calor sumendo ly calor pro caliditate sola in spiritibus, & sanguine existente & in toto corpore. Et isti bene dicunt, quamvis non bene declararet, qualiter & per quem modum febr. est calor propter quod est notandum quod quando Avic. & Gal. dicunt, quod febr. est calor extraneus accensus in corde procedens ab eo in totum corpus mediante calore & spiritu, nō intelligit quod eadem caliditas numero quæ est in corde moueatur a corde & transeat ad totum corpus, sed ille calor qui est in corde causat alium calorem extraneum in sanguine, & venis, & arterijs propinquis cordi, & ille nouiter causatus generat alium & ille alium, & sic procedit ad totum corpus nisi sit aliquod prohibens & est simile de ista ferrea cuius grossa extremitas posita in fornace calefacta a calore fornacis, exinde calet pars sequens & illa calefacit aliam, donec caliditas venit ad magnam distantiam, & vel est simile de stupha protensa in terra, si ignis ponatur in vna extremitate tota stupha inflammabitur vsque ad aliam extremitatem non est tamen intelligendum, quod prima flamma vel caliditas quæ erat in prima extremitate transeat ad aliam, sed illa prima generat aliam & alia aliam, donec tota stupha est inflammata, vel est simile de candella, quia nō est eadem flamma vel caliditas in fine, quæ fuit in principio, sed prima generat aliam, & alia aliam, & sic per continuam generationem flammæ ardet tota candela successiue, quia caliditas cum sit accidens nō transit de subiecto in subiectum, sed cum sit magis acquiraris agendo multiplicat species suas per diversa subiecta propinqua. Tunc respondet ad quæsitum & pono 4. conclusiones. Prima est cum dicitur quod febr. est calor extraneus, &c. Dico quod ista prædicatio est effectus id est quod ille calor extraneus accensus in corde facit febr. multiplicando suas species mediante sanguine & spū per venas & arterias per totum corpus ita quod febr. est effectus caloris extranei cordis multiplicantis species suas mediante sanguine & spiritu per venas & arterias vsque ad totum corpus ut dictum est. Ista conclusio probata est per notabile immediate dictum. Secunda con. pro inuenibus disputare volentibus. Febris nō est calor formaliter probatur, sanitas nō est formaliter calor temperatus, igitur nec febr. est formaliter calor distemperatus, igitur tenet consequentia, quia sicut se habet sanitas ad temperamentum sic egri ad distemperamentum per Gal. 1. de morbo, probatur antece-

dens, quia calor naturalis temperatus solum est instrumentum virtutum spirituum & operatio membrorum & hu. sanitas vero dependet ex temperamento omnium istorum, ergo sanitas non est calor temperatus. Secundo confirmatur con. si febr. esset cal. formaliter distemperatus tunc se. & sanitas libiop. non differrent specie consequens est falsum patet, quia febr. & sanitas sunt contraria, & contraria differunt specie, ut habetur in post prædicta consequentia probatur, quia calor naturalis temperatus & calor febrilis distemperatus non differunt formaliter in specie sed sicut intensum & remissum quæ in specie non differunt, quæmet & Gal. 1. de differentijs feb. &c. Tertia con. febr. est calor distemperatus extraneus effectus ad istum sequitur quod febr. est effectus vel malæ dispositionis causata immediata calore extraneo vel a calore præter naturam probatur per supra dicta & probatur ratione si febr. esset calor præter naturam vel esset in genere causæ efficientis materialis formalis vel finalis & sufficiens ad quæsitum, quia non sunt plures causæ non materialis, quia calor præter naturam nō est materia febr. nec in genere causæ formalis, ut visum fuit in 2. conclusionibus, & quia substantialis forma introducit subito & non successiue, nec in genere causæ finalis, quia si quis est operatio, ergo est in genere causæ efficientis quod est quid magis notum, ergo febr. est calor effectus & nō formaliter quod huius probandum. Sed circa hoc intellige quod istæ locutiones quamvis intendunt ad veritatem & sint vere, tamen quedam modo trahunt secundum sensum medicum modo sic est quod consideratio totius medicine nō pertinet ad sensum 3. tech. com. illius cas. Quam forte aliquis non sec. Et medicus est artifex sensibilis ubi supra ibidem. Omnibus his sensibus iudicatis. Ideo magis intendere debemus ad realitatem causæ quam ad argumentum quod nimis pertinet medicine non est aliud nisi medicum inuestigare qualiter egger ad sanitatem reducat, verba sunt Gal. 9. de ingro. can. 18. Ideo aliter est dicendum secundum medicos loquendo, & sic hæc con. Calor præter naturam in corde & in alijs membris & febr. sunt idem penitus secundum medicum probatur Calori præter naturam in corde existenti & in alijs membris & febr. debetur idem modus curandi, ergo sunt idem secundum medicum, quia medicus sumit differentiam in rebus ex parte finis, quia finis me est curare ægritudinem & sanitatem conservare & probatur antec. edens, quia si idem mediciois remouetur se & calor præter naturam, & illud intendit Avicem. in diffinitione sua, quando

do dicit. Si intendatur se. in corde intensio-
ne prima; &c.

Er per hoc ad rationes ad primā qñ dicitur
q sequeretur, q ad se. esset motus dico quòd
haberetur locum si se. esset calor formalis. sed
quia non est calor nisi effecting; ideo non va-
let. Ad secundā, vnde dicitur si predicatio
esset vera, tunc calor caperetur pro corpore
calido aut pro sola qualitate &c. Dico q
feb. est calor sumendo ly, calor pro caliditate
sola & ad probationem dico, quòd ille idem
in numero quæ est in corde non mouetur ad
rotum corpus, sed ille causat alium, & sic de
aliis donec per totū corpus sit expassus. Ad
tertiā dico quòd non valet quia quamuis
in liparia interiora sint frigida, tamen non
propter hoc sequitur quòd cor sit frigidum;
quia quando dicitur quòd in liparia interio-
ra sunt frigida illa est quædam propositio in-
definita nō vniuersalis; & sic patet quid dicat
ad omnes rationes. Quarto in ordine no-
tabiliū nota quòd in acutis ægri. medicus
debet habere mentem ad dies indicatiuos &
ad ceticos, vnde si crisis debeat fieri in 7. die
per sudorem: tunc in 4. quæ est eius indicati-
ua habebit aliquid de sudore vel vapore pro-
cedente ab opere naturæ. Si autem crisis de-
beat fieri per vomitum in 7. die in 4. habebit
nauseam vel vomitum in parua quantitate &
sic intellige de omnibus diebus ceticis in
comparatione ad omnes dies indicatiuos &
demonstratiuos; & fere nunquam. 6. dies est
bona ad laudabilem exitum. Quinto nota-
dum est quòd non solum feb. acuta continua
immo fere omnes ægri. curabiles habent 4.
tempora scilicet principium augmentum, sta-
tum, & declinationem. Principium est cum
manifestum nocuumentum & debilitas & fra-
gilitas in volutis agilibus inuenitur; & enim
hoc nullum signum digestionis in vrina ap-
paret; nec in sputo, nec in egestionē. Augmen-
tum autem est quando exacerbatio vel paro-
xismus augetur & anticipat horam & lon-
gius efficitur; & calor & sitis angmentantur;
& similiter alia accidentia feb. augmentantur
& alienatio modica vel valde occulta sit tūc
feb. est in augmento. Et si tūc signa digestio-
nis incipiant apparere tūc erunt signa præ-
terita, signa augmenti magis certa. Status au-
tem est quando accidentia & synthomata fe-
bris continue vltimantur, vt est in infirmitas ca-
lor sitis intolerantia; & tūc apparere perfe-
cta digestio in feb. curabili vel sananda. Si
tūc nulla digestio apparere erit signum mor-
tale; tūc in quartā est primus status feb.
acutæ. Declinatio autem scitur per qualita-
tes & dispositiones contrarias dispositioni-
bus supradictis, vt quando calor & sitis; &

alia accedentia diminuantur & æger man-
ifestam sentit alienationem cum bona tole-
rantia & appetitus ad cibum aliquantulum me-
lioratur & confortatur & præcessit crisis est
aliqua manifesta euacuatio; tūc est decli-
natio prædictæ feb. acutæ & vrina apparet re-
missa & pulsus bonus & equalis quamvis de-
bilis. Et secundum ista tria oportet eos purga-
re & diætare & flebotomare secundum can-
superius scriptos, vnde cum magna molestia
& synthomatū angustia signū est; quòd est
brevis temporis & citæ terminationis & vo-
cabitur acutus vel peracutus vel peracutissi-
mus; quòd idem est secundum quantitatem
molestiæ synthomatū & talis cito ducit æ-
grum ad mortem vel ad vitam. Et ista bre-
uitas vel prologatio ex breuitate vel prolo-
gatione suorum principiorum cognoscitur.
Correspondere enim principium alijs tempo-
ribus secundum proportionem; nam si in
prima die apparuerit signum digestionis in
vrina tūc in illa die est extra principium &
incipit augmentum; & sic alia tria breuia in-
ueniuntur. Sexto sciendum quòd in feb. acu-
tis continuis & ardētibus semper debemus
intendere ad infrigidationem & rectificationem
hepatis. Aliquando embrocis aliquan-
do epithomatibus frigidis obseruatis tamen
can. supradictis; & ideo dicit Aui. in illo. c.
Curationes feb. acutarum; & embrocata he-
par cum feb. infrigidantibus est res maxi-
mè & magis iuuans. nam cum æquatur he-
par, est in eo maior pars rectificationis & for-
tasse rectificat aquam; id est vrinam. Septi-
mo nota secundum Aui. ibidem quòd quan-
do medicus videt aliquem febricitantē som-
nulosum & forte habet humidum nasum
& multitudinem salivæ tūc non facias em-
brocationes capiti, nec epithimata refrigera-
tia nec somnifera, sed stude in trahendo ma-
teriam ad partem inferiorem eum elisten-
tibus & fricatione partium inferiorum; &
hoc sit ne cadant in lithargiam. Et si forte ap-
paret rubor in facie & naso non est malum si
lan. cum setis porcinis a naribus extrahatur;
& hæc est sententia Amicn. vbi supra.
Octauo scias secundum Gal. 1. de crisi. c. 14.
hoc dicit auctoritate Hippo. quòd agnitudo
non vocatur acuta vt plurimum nisi cum fe-
bris est continua; & dicit in c. 17. quòd agnitudo
in qua venit crisis eam velocitate; & in 4.
die est talis in fine acutatis; id est non potest
esse plus acuta. 3. de crisi. c. 48. Et ponit ibi q
Archigenes non vidit hoc nisi his nec ipse
Gale. hoc vidit nisi semel. Ego autem istum
causonem vidi tempore meo vna vice in vi-
ro iuvene, & alia vice in muliere similiter in-
uene quot amplius videbo Deus scit; cui
sit

fit honor benedictio & gloria.

De tertiana vera. Cap. VII.

Tertiana est in triplici differentia: quædam est tertiana continua: alia est interpolata & ista diniditur quia quædam est vera & alia nota, sed de tertiana continua pro nunc taceo, quia eadem causa & eadem materia est veræ tertianæ & causonæ, quia nulla est inter causonem & tertianam veram differentia quantum ad materiam unde generantur ambe fe. Ambe. n. nascitur à cho. ru. verba sunt Gal. 4. amph. 59. ibi est. Tertiana vera, dicimus igitur quod tertiana vera est feb. interpolata proueniens ex cho. ru. extra venas putrefacta, ista autem vocatur a Gal. primo de febr. ad Glauco. c. 5. Et ab Aui. tracta. 4. primæ. fen. 4. cas. c. de tertiana absolute tritæus. Circa quod est sciendum quod cho. aut putrescit intra venas, aut extra. si putrescit extra venas facit fe. tertianam interpolatam. Si cho. putrescit infra venas remotas a corde facit continuam. Si autem putrescit in venis proximis cordi vel in venis oris stomachi vel hepatis tunc facit causonem de quo postea tractabitur.

Causæ veræ tertianæ quædam sunt primitiue: alie antecedentes alie coniuncte. Primitiue vt nimius labor & exercitium maxime in tempore calido & longus vsus rerum multiplicantium choleram & calefactionem hu. sicut sunt allia rapiperata & res in quibus multe species ponuntur, & vsus zingiberi viridis & vini puri acuti calidi & vsus nectaris. omnia ista multiplicat cho. ru. quæ augmentata & multiplicata vltra mensuram in corpore nequit gubernari: immo destituta à gubernatione naturæ conculcatur & non euentatur, & putrescit in loco mizeræ & extra vasa & sic. causat tertianam interpolatam affligentem vna die & alia non.

Causæ antecedentes sunt multa chole. in corpore existens & nondum a regimine naturæ derelicta similiter cōplexio calida & sicca cholericæ, quæ cōplexio quæ citius recipit fe. est cōplexio calida & sicca. 8. de inge. c. 7. Alia cōpōt esse mala cōplexio calida vel calida & sicca hepatis. nā tales parati sunt ad feb. vt dicit Auic. in 3. can. fen. 14. c. 14. de signis malitiæ. complexionis calidæ. Causa coniuncta tertianæ quædam est præcedens vt est conculcatio & non euentatio humorum. Alia causa coniuncta subsequens istam cōculationem est putrefactio istius hu. cholerici. testem habemus Halyrodopam sic dicentis. chimus. n. non putrescit donec prohibeatur eius respiratio & non prohibetur eius respiratio. donec multiplicetur: vt non toleret eius virtus

ipsum & cessat a regimine eius. & quando natura cessat a regimine eius & putrescit. hæc ille. 3. tech. com. ibi. Euacuationes enim si ita contingat. Effumario verò quæ sit à putrefactione vel inflammatione sumi exeuntis a minera sunt causæ coniunctissimæ fe. putridarum tam continuarum quàm interpolatarum simplicium & compositarum.

Signa tertianæ veræ ponuntur a Galeno primo de feb. ad Glauco. c. 4. sic. Ea quæ cum vehementi rigore incipit conuenit potius tertianam quàm aliquam aliarum fe. esse, & sequitur. Alia vero signa sunt caloris quantitas & qualitas & arteriarum motus sequitur calorem enim multum & aerem esse oportet. pulsus autem magnos veloces & spissos & absque qualibet inæqualitate præter febrilem rigorem enim sentiunt ac si corpus pungeretur cum aliquo acuto. magis quàm frigido & lingua & vniuersum corpus est siccissimum in tertianis & sequitur cuius enim tertianæ venæ omnino paroxysmi tempus est breue horarum alicubi. 4. 5. vel 6. aut ad longissimum. 11. vel 12. de fe. ad Glauco. c. 9. ponitur etiā à Rasi in diuis. quia ista febr. incipit cum horripilatione simili puncturæ acutæ & non prolongatur spacium horripilationis nec concutuntur propter eam. dentes nec est magnum frigus sed vt si cum acubus, vel spinis pungeretur & aliquando infrigidantur manus & pedes. Et dicit Aui. quod si paroxysmus transit 12. horas non est tertiana vera: immo notha. Incipit enim paroxysmus cum vehementi rigore maxime in primis paroxysmis ac si acubus vel spinis pungeretur. Et quamuis rigor sit vehemens cum frigore tamen paulatim & velociter minuitur cuius oppositum fit in quartana: vrina est rubea tendens ad igneitatem cum subtilitate substantiæ vt plurimum, & si tangatur corpus sentitur magna caliditas non tamen penetrat manum si diu super corpus teneatur. si cur sit in causone & in alijs fe. continuis acutis & dicit Auic. quod accidentia quæ accidunt eis sunt vigilie sine grauitate capitis nisi in quibusdam non puris tertianis & adeest fitis furor & ira & odium locutionis & pulsus acutus & velox per. comparisonem ad reliquas fe. & non æqualis constrictionis & dilatationis est tamē in principio paruus & in statu paroxysmi fit magnus & resoluuntur paroxysmus cum sudore, & si alia particularia concutunt tunc certum signum est quod est vera tertiana vt si est iuuenis cholericus, & tempus æstas & habitudo corporis macra & regimen præteritum multiplicans cholecum diæta & cibus & potibus calidis & siccis vel si habet iuuenem uxorem, & vsus fuit coitu

coitu immoderato; & dicit Constan. quod proprium est huic feb. habere vomitum cholericum ægestionem tinctam & citrinam maxime post tres accessionem vel 4. Et dicit, q. sæpe habent puncturam in hepate propter choleram sang. mixtam. Et dicit vltorius Galen. Et iterum videmus in tertiana vera quamuis materia eius sit cho. ru. plusquã in ceteris fe. tamen febricitantes maiorem rigorem atque tremorem habent quã ceteri febricitantes. Et quanto materia erit purior. idest cho. pura. tanto rigor est fortior. 5. de morbo. c. 8.

Iudicia in tertiana.

Primò iudicat Hippo. tertiana vera in 7. periodis indicatur longissima. 4. amp. amph. 59. Item dicit Gal. 1. de Feb. ad Glau. & in li. de differentiis Fe. li. 4. c. proprio.

Secundo iudicatur per Gale. quòd tertiana est sine periculo primo de febr. vbi supra sic. Certa aut tertiana longissima in 7. periodis iudicatur cum eo quòd est sine periculo. 1. de feb. ad Glau. ca. 9.

Tertio iudicatur. sic tertiana vera velox est & brevis. & vicinam facit crism in æstate tamen breuior in hyeme verò longior. sicque æstas morbos abbreviat. 1. amphi. comm. 12. ibi proximos & consistentias.

Quarto dicit Gord. quòd primus paroxismus est debilis, & secundus fortior tertius fortissimus quartus fortissimus omnium ibi enim est status & fortissima accidentia in vltimo acuitatis, & à cætero incipiunt paroxismi gradatim deficere vsque ad 7. qui parvus est vel nullus in vera tertiana nisi error incidat ex parte medici vel infirmi. & hoc debet medicus prædicere.

Quinto dicit Rasis in diuisione. quòd status istius fe. est in 4. paroxismo & frequenter finitur in eo & non transit septimum.

Sextò & cum vides principium cum rigore & statum cum sudore exuberante: tunc nò dubites quin ipsa sit putra. 7. Haly. 1. Theo. Si tertianarijs vlcera in labijs fiat & naribus fe. finis significatur.

Curatio veræ tertianæ.

Primò hic debent notari omnes illi cã. vniuersales qui fuerunt scripti in ca. de febr. contin. acutis, quia quamuis tertiana non sit continua, est tamen acuta quia in 14. diebus terminatur vt statim dictum est, (auctoritate Hippo. Sed primus generalis cã. spectans ad curam tertianæ trahitur à Gale. primo de fe. ad Glau. capitulo de cura tertianæ veræ sic certam igitur tertianam tamquam à cho. ru. motam fortissime humectare & infrigidare oportet maxime in quantum possumus contraria enim contrariorum sunt sanatio-

nes vbi supra. Secundus est Gal. ibidem sic. Cholere enim ru. humor omnium eorum qui in corpore siccissimus simul & calidissimus existit prouocare. igitur eum qui ad ventrem fluit humorem euacuare per vomitum, illum verò qui deorsum fluit eodem modo per euacuationem inferiorem. hæc ille ibidem.

Tertius est Gal. ibidem in forma. cibaria vero quæcunque humectant proficua sunt istis tertianis: supple nisi in se habuerit aliquam malam qualitatem paratam putrefactioni.

Quartus cã. est Haly. de regali dispositione in li. 3. secundæ partis. Cura tertianæ & omnium febr. pu. stat in euacuatione humorum facientium eas & in extinctione caloris, & quia tertiana vera materia non est: tanta quantitatis sicut est calor. ideo in hac feb. magis intendimus ad alterationem quã ad euacuationem, quamuis competens euacuatio semper sit præmittenda vbi competit.

Quintus non parum qui tertianam paritur ventris constipatione molestantur: ideo non laboriose sed leuibus laxatiuis aut cliste rilenituo a principio oportet clausam porticum aperire & linire intestina & hu. nocentes pro viribus diminueret & mitigare.

Sextus sicut comestio fructuum recentium corpora humana ad se præparat putredinales, sic etiam ad earum augmentationem, & conseruationem alimoniam & alimentum videntur præstare. ideo non solum in tertiana, immo in omni feb. pu. sunt postponendi.

Septimus est Rasis ad alman. li. 10. cap. de tertiana inter comestione & inuasionis principium sit lóguu tempus scilicet, quòd nutriatur tribus horis aut duabus antequam fe. accidat aut totidem horis postquam febr. recesserit. hæc ille.

Octauus est Serap. in li. 6. Cum ergo declaratur digestio in vrina tunc oportet euacuare materiam per partem ad quam declinat iste cã. quantum ad priam partem confirmatur per Hippocra. ibid. Digesta medicari Et quantum ad secundum confirmatur per eundem ibi. Vnde cunq. repetit natura & c. Nonus si in declinatione paroxismi super superuenierit in quocunq. tempore totius egri, venerit vtiliter expectandus est. nisi ipsum aliquod malitiosum fintho. vt est sumptis sequeretur.

Decimus in principio paroxismi a somno & potu abstineant febricitantes, somnus enim materiam ad intra recludit, & potus naturam digestionis & expulsiōis materię cogit retrahere.

Vndecimus est Gordo. in suis vrinis. Nunquam in tertiana feboromia competit, nisi post

post tres aut quatuor accessiones, ita etiam, quod signa digestionis appareant, & virtus sit fortis: *apote obouera...*

Duodecimus est eiusdem ibidem in principio tertianæ non dentur mirabolani, quia laxant in principio, & in fine constringunt.

Decimustertius scamonee non datur in principio tertianæ, quia inflammabilia est, ideo non competit cuiquam in æstate, idem Doctor ibidem: *lib. 2. de morbis...*

Decimusquartus nullum acetosum datur si mul cum prisanæ, quia vnum aliud corrumpit nisi expectetur tempus, quod vnum primus stomachum exierit: *lib. 2. de morbis...*

Decimusquintus reubar. cho. purgat calefaciendo, & post se calorem dimittendo: idcirco in aqua end. temperandum est, ante eius dationem. *lib. 2. de morbis...*

Decimus sextus cum clisteri aut aliquo laxativo ad interiores partes statim materia trahatur, vbi raptus eius timeretur ad caput. caput quoque ne illam recipiat, confortetur: isti enim cæn. & alij prædicti in capitulo præceden. obseruentur. *lib. 2. de morbis...*

Cura particularis veræ tertianæ. In primis si reperitur constipatio iuxta doct. 5. cæn. fiat tale clistere lenitium & molliuim. Recip. maluz, bismaluz, violariæ, branchæ vrsinæ ana. m. i. furfuris. p. i. fit decoctio, & in colatura dissoluatur cassiæ si. mundæ. vnc. i. & se. olei violæ. vnc. 2. salis communis dram. i. & s. fiat clistere ad quart. 5. detur de mane & statim fit talis sirupus: *lib. 2. de morbis...*

Recip. end. non lotæ, scariolis, lactuca, portulacæ, rostri porcini, hepaticæ summitatū papæ ana. m. i. 4. se. frigidorum minorum florum violæ, florum nemusæ, ros. ru. ana. unc. 5. aceti al. unc. 3. zuchari panis lib. i. fit sirupus & in clarificatione ponatur se. portulacæ. sal. al. spodij. ana. dram. 2. campho. dra. i. Iste sirupus infrigidat & ingrossat materiam choleriscam, & ipsam digerit si magna est putrefactio & oppilatio, quod scitur per longum paroxysmum, & malitiam eius. detur iste sirupus cum aqua decoctionis cicerum, vel detur cū aqua hordei simpliciter. In quarto autem die, & post secundum paroxysmum iuxta tenorem quinti can. detur ista medicina euacuatiua cholere rub. & molliens ventrem. Recip. carniū prunorum damasce. i. 5 numero, viol. vn. i. tamarindorum vn. 3. bulliant omnia vnica bullitione, & post fortiter cum manibus fricetur & coletur, & colaturæ addatur cassiæ si. mund. vnc. i. fit potus, & iste est aliquando tantæ virtutis quod tota se. recedit: & aliquando excusat nos ab omni alio labore: quia radices se. truncat. Post tertium autem paroxysmum in die interpolationis, si urina appa-

ret rubea, & aliquantulum spissa, fit flebotomia de basilica, & extrahatur de sanguine secundum quantitatem repletionis. Ego autem tempore meo feci fieri hanc flebotomiam frequenter in tertiana & iuvene cholerico, cuius vrina erat ignea, ostendens dominiū cholere magis, quam sanguinis: & semper me bene reperi, & hoc fit propter infrigidationē, & enervationem: quæ flebotomia inducit & diminutionem feruoris sicut apparet quādo olla bullit fortiter & propter magnum feruorem & ebullitionem aqua resiliit ad extra, & si notabilis illius aquæ feruentis quantitas auferatur, feruor vtique diminuetur, & aqua exterius non saltabit. hæc allegoria declarat quantum flebotomia vel minoratiua pharmacia in feruore humorum, & in tertiana & se. putrida afferat. iuuamentum similiter in peracutis. Si autem in istis temporibus venit vomitus cholericus, vel egestio cholerica nullo modo sistatur nisi multum superfluat, quia curatio sunt veræ & notæ tertianæ si aliquid de phlegmate cum cholera eijciatur. *lib. 2. de morbis...*

Si vero per hoc paroxysmus non videatur minui, iterum purgetur patiens cum dicta medicina, vel cum ista. Recip. volubilis minoris florum violæ, boraginis, & buglossæ pass. mundæ ab arill. ana. vnc. i. fit decoctio in qua dissoluatur mannæ granatæ vn. i. vel cassiæ si. mundæ. tantumdem reubarbari. dram. i. Gal. primo de feb. ad Glau. vult quod sit clistere de succo cicule cum sale & oleo ros. & zuccaro rubeo: *lib. 2. de morbis...*

Et vult Gal. ibidem, quod quando signa digestionis apparent, detur de absinthio, de cuius puluere secundum aliquos dantur dram. 2. vel detur de decoctione eius facta in aqua cum zucharo, vel secundum Gal. extremitates eius ponantur in mellicrato, & sumat patiens, ad corrigendum stomachum. *lib. 2. de morbis...*

Tunc etiam antiqui scilicet post signa digestionis balneabant in aqua dulci tepida, & valet eis. vt vult Galen. ibidem: cauendo tamen balnea naturalia. & æquā salsam, propter clausuram pororum. Idem dicit Serapio. sic. si febr. est parua, tunc oportet, vt balneetur infirmus, & antequam ostendatur digestio, & proprie si effecti consuetudo illius, & si non, pa. non balneetur, donec signa digestionis appareant: hæc ille. Iam enim sciunt vulgares, quod veræ tertiana brevis est terminationis, ideo nunciales non ponuntur in balneo, sed sufficit eis, quod sudent in fine paroxysmorum: *lib. 2. de morbis...*

Et post quartum & quintum paroxysmum abluimus pedes, & sibiæ cum aqua tepida decoctionis foliorum salicis, & vitis, & cannæ, necnon manus, & brachia, vt calor interior remanens

uens post pororum apertionem exterius expellatur. Post tamen talem lotionem bene se pannis debet cooperire & ab aere frigido corporis eius non tangatur.

Item post euacuationem eius sufficientem, & stomacho ieiuno existente si calor fortis, in corpore & regione hepatis calida sentiat, secundum Rasis in decimo ad Almanforem epithima frigidum hepati est superponendum, ita quod pannus lineus infundatur in aqua rosa commixta cum sandalij vel sit tale epithima. Recip. aquae endiuiae aquae rosa. ana. li. s. sand. al. & ru. ros. ru. ana. dra. 2. spodij dra. 1. caphoraz. dra. s. aceti. vn. 2. sit epithima. Preter iam dicta cognita tertiana vera per signa supradicta & quia affligit vna die & alia non, & quia vomit cum conuenientia particularum & paroxysmis non extenditur ultra 12. horas, tunc a principio facto clisteri mollificatio ordinetur aliqua ex istis, scilicet sirupus rosa. aut violaceus sirupus acetosus vel ozizaccara, quae fit ex octo partibus succi malorum granatorum acetosorum & 4. panis zucari.

Sirupus acetosus sic fit. bulliat zuchatum cum aqua, & tunc addatur in clarificatione acetum al. & detur non cum prisana, sed cum aqua praebullita & in frigidata, sirupus enim acetosus & ozizaccara sunt communia in materia cholericæ eo. quod acetum est mors cholerae & vira malitiæ, ut dicit Hippocrates. Valet etiam sirupus nenusaris sirupus de papauere sirupus de se. portulacæ quem ponit Hebe. Et dicit Rasis decimo ad Almanforem capitulo proprio cum aeger fortis inuenitur & est diu, quod non fuerit solutus pondus mirab. citri, in aqua fermenti die ac nocte infunde. deinde manibus fricatum cum dra. 30. tereniabim, id est manne granatæ miscetur in mane in potu tribuatur, vel si quartâ pars tertie vnius scamoneæ tribuatur cum iulep & aqua tanta quantitate, quod vna vice sorberi possit, vel, ut dicit ibidem Rasis cum hoc factum fuerit aut febris nullo modo accidet vel parum per alieniabitur. Et sequitur, quod si patiens est debilis & fuerit æstas vnaquaque die supple in die interpolationis sumat hoc medicamentum. 20. pruna damasce. & 10. dram. tamarindorum dissoluantur in duabus. li. aquæ & coquantur in manibus fricata, & colata miscantur, & addatur colatura dra. 10. zucchari & antequam dormiat, in potu sumatur in crassum post solutionem tiberetur cum hordeato vel aliter prout decet, & stet & dormiat & quiescat in loco temperato tendente ad frigiditatem & humiditatem, non tamen sit locus reumaticus, tamarindi enim habent magnum effectum in febre. quia fri-

gidi sunt & sicci & purgant chole. & ideo dupliciter infrigidant, vno modo de per se. quia frigidi sunt alio modo per accidens, quia euacuant choleram rub. quæ est causa febr. & caloris, sed quia sicci sunt miscentur cum eis pruna, quæ sunt humida. Confortant tamarindi stomachum debilitatum, ex vomitu, & valent in febr. habentibus sincopim.

Fiat tale restauratiuum. Recip. pul. tria. fan. pul. diapapa. ana. dram. 4. pul. diadraganti frigidi. dram. 3. conseruæ violæ. vnc. vnam zucchari panis quarr. 3. fiat mixtura ad modum zucchari rosa. detur vnum colear plenum, & post sumat de aqua hordei. Si autem vis, ut sit magis cordialis adiungatur pul. diamargariton sine speciebus vel addantur margaritæ iacinti, rubini, & saphiri, & os de corde cerni, & aurum & argentum limatum, & foliatum, & corallus addatur. Et istud valet, & est necessarium quando habent sincopim. Viola condita in conserua sunt valde bona in lenificatione ventris, & valent constipatis. Et istud iulep est multum refrigeratiuum & ingrossatiuum materię cholericæ, ideo valet ante digestionem materię, & post. Recip. succi cucur. aquæ cucur. ana. lib. semper. cillâ ginis philij quarr. 1. aquæ end. aquæ rosæ succi malorum granatorum acetosorum aceti. al. ana. vnc. 4. zucchari panis lib. 1. & s. fit iuleb. & coquantur ad perfectionem, & in clarificatione ponantur. 4. le. frig. minoris sand. al. & ru. rosa. ru. spodij. ana. dram. 1. camphoræ dram. s. Ego reperi in quibusdam additionibus Serap. quod ista Reuerenda quæ sequitur est probata ad tertianam. Recip. opii. dram. 4. croci. amigdalini. cardamomi. storacis rub. & iusquiami baccarum lau. ana. dram. vnam. conficiantur cum melle, & detur ante horam paroxysmi. Scribitur etiam in primo libro hyranidarum, quod cor. auis quæ dicitur. corur. circumligatum collo. luna deficiente sanat tertianam. Dicit etiam Petrus hispanus, quod trisera saracenicæ data cum decoctione trifolij, & alleluia sanat tertianam, detur tamen in quantitate, quod purget. Dicunt tamen quidam quod si tertianarius bibat de succo arnaglosse quantum æsta oui gallinæ potest capere tribus vicibus ante horam accessionis, curat tertianam veram.

De tertiana notha.

Tertiana notha sic dicitur quod non est cognita in malitia & duratione paroxysmorum & in toto tempore suae durationis, nam eius paroxysmi longiores sunt, & totum tempus durationis longius quam vere tertiana.

Causa fit autem tertiana non ex cholera grossa putrefacta extra venas & ista cho. facta est grossa propter admixtionem phlegmatis, ita quod commiscetur adinuicem, & fit unus hum. qui nec est cho. nec purum phlegma, sed talis chole. grossa non pura non sunt duo hu. sed vnus hu. ista etiam commixtio cho. potest fieri cum melancholia secundum Serap. dicit Auic. quod in hoc differt tertiana no. ab emittiteo: quia emittiteum faciunt duae materiae separatae in diuersis locis existentes, quarum qualibet retinet suam formam & suum nomen. Tertiana autem notha fit ex vna materia vnam formam & vnum nomen retinente, & in vno loco putrefacta composita ex duobus humoribus.

Signa nothae tertianae non sunt ita pura sicut tertianae vere: immo sunt commixta. Et Auic. facit calidum de differentia inter vtrunque quia paroxysmi verae tertianae consumuntur 2.4. hor. vsque ad 12. & si istas transiit, non est vera: vt plurimum. In tertiana vero paroxysmus vt plurimum se extendit vsque ad 7. horas, & corpus velociter calefit extremitatibus adhuc frigidis remanentibus. Et vera tertiana terminatur in 7. periodis, nisi accedat error ex parte medici vel infirmi. In tertiana vero notha non ita cito calefit corpus nec est tantus calor nec etiam ita fortia accidentia. Paroxysmi autem nocte durant ultra. 12. horas & extenditur duratio eius aliquando vsque ad 21. menses: &c. & est cum disconuenientia particularium vt quia est senex vel stauicus & tempus hyemis & alia huiusmodi. Et secundum quantitatem additionis paroxysmi super. 12. horas secundum hoc cognoscimus elongationem eius a vera tertiana. Item in tertiana notha non ita cito apparent signa digestionis sicut in vera, nec ita cito extenuatur corpus sicut in vera, nec paroxysmus terminatur, cum multitudine sudoris, sicut in vera tertiana.

Iudicia in tertiana notha. Dico quod tertiana notha, & in tertiana duplex & tertiana nocturna volunt omnes esse longa, & tarda terminationis propter quod dicit Galenus primo de febr. ad Glauco. capitulo 9. Sec. Aliam vero non certam tertianam vidi. Aliquando quidem autumno incipiente vere

terminante vel cessante vt supra. Et sequitur ibidem. Aliud signum est quia non vera tertiana affligit ultra. 12. horas nec calor eius est cum acumine, nec est pungitiuus: nec est tantus ardor sicut in vera.

Cura tertianae nota. Prima regula generalis secundum quod nota tertiana accedit ad veram, & secundum quod ab ea distat in signis, & in alijs, secundum hoc cura eius differt a cura verae tertianae.

Secundus canon. Ex quo materia notae tertianae est composita ex chole. & flate, sic etiam medicina digestiua & euacuatiua debet esse composita ex simplicibus digerentibus & euacuantibus vtrunque hu.

Tertius. si sirupus acerosus quia flaz. incidit & cho. digerit vt Auic. competenter in notha tertiana potest ministrari.

Quartus quia in nota tertiana status longus est a principio ideo in ea diara non tantum subtilietur sicuti veratimmo cibis & potibus est sustinendus egrotans vt virtus possit expectare vsque ad agriudinis statum. In primis igitur fiat talis sirupus. Recipe: end. nouelle non late scariola portulaca rostri porcini adiantos virgularum graminis rad. apij. & fen. & cico. ana. m. r. zuc. libr. 1. aceti al. vnc. 3. fiat sirupus & detur cum aqua cicerum r. cognita digestionem materiae purgetur sic. Recipe: polipodij quercis dram. 1. an. dram. 5. florum violae & borag. & bugloss. ana. vnc. 5. fiat decoctio in qua dissoluatur cassia. munda. vnc. 1. reubarb. dram. 5. fiat potus vel in dicta decoctione dissoluatur trisere saracena quae in hoc casu habet specialem aspectum. vnc. vnam. pul. diatubis dram. 1. & in dicto sirupo potest addi radi. brusci & sparag.

Dicit etiam Auic. quod nihil inuariat eos tantum sicut vomitus post cibum. Et dicit quod quando vrina eorum est grossa fiat feboroma de basilica. Item vomitus multum vel si veniat sponte vel alter in principio paroxysmi. Bonum digestinum in tertiana nota secundum Auicem. & est sirupus acerosus factus cum rad. apij. fen. & cum seminibus eorum. Et post 7. diem detur decoctio absinthij, est enim iuuatiua & subtiliatiua materiae & stomachi & confortatiua similiter aqua fen. & apij. & dicit Auicem. quod in aqua hordei decoquantur hisopus, origanum & calamitum, & vtraque spica, & sic pro digestino vel detur aqua hordei mixta cum aqua cicerum.

Postquam autem signa digestionis apparent in vrina, purgetur cum hac medicina quam poni t. Auic. Recipe. hierepigr. dram. 5. succi lactucae eupato. ana. dram. 3. se. apij. mirabo.

citrini & chebulorum ana. dram. 5. se. melonis & cucur. & citrulli se. apij & polipodij bedegar. ana dram. 10. rurbith. dram. 1. cassia. dra. 6. pass. enucl. dram. 20. sebesten. 30. numero. ficum. 10. mell. ro. dram. 15. fiat apozima de quo sumatur vnum vitrum plenum cum 6. granis de scamonea. Et sequitur. Et fortasse necessaria est medicina fortis, & dicit Haly. Si videris hanc febr. prolongari cum signis san. vt est rubedo coloris, & magnitudo pulsus minue venam hepatis & extrah. san. secundū virtutem. Et si non, euacua flegma per vomitum & per secessum, & valent trocisci de spodio, & vitatur semper digestiuo aliquo vitatur cibis subtilibus confortantibus, & hoc post digestionem, tempore accessionis non cibetur, vt natura occupetur circa morbum & materiam eius dicit Haly.

Dieta patientium tertianam. Consilio meo recurre ad ca. de fe. continuis acutis. & ibi reperies inclusue dietam tertianarum, quia tertiana inter acutas computatur quando est vera, & eligantur ibi speciales can. ibi positi, & comedant hordeatum auenatum, & micam panis ter lotam coctam cum lacte amigda. & colaturam furfuris similiter coctam, & lac amigda. coctum & missum super micam panis sparso zuccaro potest sumi in vera tertiana. Ias parua pulle alterate cum lactucis, & portulacis, vel frustis cucurb. virid. Et si esset tertiana nota intus in pulla, possunt poni folia per. & radix eius & cicera betuca & crocus. in vera tertiana comedantur lactuca portulaca crude parata cum aceto, & quando coquantur coquantur cum lacte amigda. cum aceto. Similiter si cocte sumantur cum aceto non est error. Fructus autem hoc loco non competunt, sed vitandi sunt precipue vna, & ficus aliquando tamen ad vigorandum appetitum, & ad reprehensionem cholerae competunt melones & cucurb. & pruna matura in parua quantitate. Similiter guindola. poma, & pira cocta sub prunis cum zucharo & similia. Potus autem sit aqua hordei, & aqua per se bullita, & infrigidata, & post statum in declinatione detur: vinum clarum bene commixtum aqua. Vnde dicit Auic. Et non timeas post declinationem potare eos vinum plurimum commixtum: vinum enim fractum per commixtionem confert quantitati residui eius in resoluendo quibus necessaria est resolutio, & succurrit penetrationi aqua eum fortitudine sua per commixtionem quae est in eo de calefactione pauca quare infrigidat vehementer & humidat. hec ille ca. proprio de tertiana.

Declaratio in tertiana:

Primo notandum secundum Gale. primo

de crisi. cap. 14. quod febr. interpolatae habent suas correlatiuas de febr. continuis. vnde dicit Gale. talia verba. Tertianam quidem & eius correlatiua de febr. continuis sunt breues, & quartana & eius correlatiua de febr. continuis sunt longae & prolixae, sed faciens paroxysmum omni die idest quotidiana & eius correlatiua de continuis sunt prolixae, veruntamen minus prolongantur quam quartana. haec ille.

Secundo intelligendum quod duplex tertiana & duae tertianae, & tertiana non volunt semper esse longae, tamen quia materia est multa vel diuersis in locis putrefacta quae quidem loca forte ignorantur praeter hepar, quod in omnibus percipitur esse lesum in tertiana, vt plurimum tamen quia virtus aegri debilitata, & egritudini resistere non potest perfecte, ideo in istis casibus da operam modo digerendo nunc aperiendo nunc purgando catartici vel flebotomia saluando semper virtutem.

Tertio nota, quod tertiana terminatur de necessitate sicut dicit Gale. 3. de crisi. cap. 3. aut cum vomitu cho. & egestionem eius aut sudore plurimo in toto corpore. Et ex isto apparet error illorum qui negant vomitum in tertiana, quia per illum debet curari.

Quarto dubitat Gordo, & bene, vtrum in tertiana & in febr. cholerica competat sirupus acetosus: cum de se sit subtiliarius, & materia de se sit multum subtilis, immo magis viderentur valere ingrossanda quam subtilianda. Recipiendo, quod in materia cholerica subtili non competunt subtiliaria quantum ad digestionem materiae, sed potius ingrossanda; sed bene competunt ratione oppilationis & putrefactionis, quia cum eius subtilitate aperiunt oppilationes, & cum eorum sic citate resistunt putrefactioni. Et cum istis ponantur rose spodium & alia quae ingrossant. Et quia sunt frigida alterant malam complexionem. Ideo dicit Auic. in ca. de cura. febr. pu. in vniuersali, q. multotiens inuenitur res q. digerit & subtiliat & euacuat, vt est sirupus acetosus. Quinto notandum q. in feb. acutis simpliciter, vt plurimum spectatur flebotomia usque ad 4. diem. In prima postponatur propter constipationem. in secunda pp. crapulam vel indigestionem. in tertia at postponitur pp. motum maxime cholerae, quae est de tertio in tertium, & quia tales fe. vt plurimum fiunt de cho.

Sexto sciendum q. quando est paruus lapsus accidentaliter alicuius membri tunc indigemus modica medicina quantum ad pondus, & ad gradum, vraccidit quando est similis complexionem & aetati & tempori & arti & consuetudini &c. Et qn morbus est contra naturam membri, & corporis: tunc indigemus forti

forti medicamēta in alterādo & corrigēdo in quantitate & in gradu & indigemus longiori tempore in ministrando. Exemplum ut si quis habeat hepar calidum vel naturaliter vel à principio generationis, & cum hoc incurrat ex accidenti caliditatem, tunc minor medicina sufficit quā si esset frigide complexionis naturaliter & accidentaliter calefieret, similiter si cholericus & iuuenis, & in ætate incurrit tertianam tunc minor est lapsus & ægri citius & cum lenioribus medicinis curaretur quā si esset stāticus, & senex & in hyeme. Sed si quis habeat hepar calidū accidentaliter, & non naturaliter, tunc debemus eleuare medicinā, tot gradibus quot eleuatur complexio accidentalis. Et hæc est intentio Ga. 3. tech. ibi. Si decem quidem numeris. Et Gal. in com. illius. In morbis quidem minus &c. & Auic. in 4. primi c. 1.

Septimo debemus reducere ad memoriā quod feb. continua correlatiua febr. tertianæ interpolare, & similiter correlatiua quartanæ & quotidianæ quāuis sint continuæ & inseparabiles tamen magis affligunt in die, & in hora motus eorum huius in qua debebat fieri accessio si esset interpolata, ut tertiana continua magis affligit & fortior sit in tertia die. Idem dico de continua quartana quia magis affligit de 4 in 4. Idem de quotidiana continua. Et hoc dico propter medicos paucos scientiæ & speculationis quæ iudicant tales se esse duas febres vel iudicant esse febrem compositam & tamen non est nisi vna.

Sed nunc oritur dubiū, quia tu dices, qualis igitur differentia est inter species emittiteorum. Exemplum parui emittitei quo est, compositus ex quotidiana continua, & tertiana interpolata & nunquam separatur affligit tamen magis de tercio in tertium sicut in tertiana continua. Dico quod in paruo emittiteo & similibus sunt paroxysmi manifestiores, quia veniunt cum maiori frigore, & rigore, vel tremore iuxta naturā materiæ. In tertiana autem continua sufficit quod magis affligat de 3. in tertium cum maiori caliditate & incensione. &c.

Octauo notandum ut dictum est in cura auctoritate Ga. in libr. de fe. ad Glauco. quod detur absinthium &c. Et causam istius ponit Serap. in suo lib. cas. proprio dicens quod in absidio duæ sunt virtutes: vna est constrictiua alia est resolutiua, ideo oportet ut detur post digestionem & non ante, quia si ante digestionem materiæ ministraretur magis restringeret quā resolveret nec laxaret, ideo datur post signa digestionis quia absinthium calidum est in primo, siccum in secundo. Et dicit mesue, quod est compositum ex substan-

tia calida quæ dat sibi amaritudinem, & viscositatem & facit ipsum a peritium oppilationum & per ipsam caliditatem, datur ei solutio ventris. Intrat etiam compositionem eius substantia terrea stiptica secundum quā acquiritur ei, ut sit membri confortatiuum & partium laxarum congregatiuum ut dicit idem doctor. Et maior est in eo stipticitas quā amaritudo, quia ergo in tertiana stomachus est debilitatus & laxus propter vomitum & potum aquæ, & hepar etiam propter transitum huius à toto corpore ad stomachum & per ipsum transeuntium, ideo post signa digestionis, detur absinthium ad confortationem dictorum membrorum. Absinthium educit choleram per ventris solutionem à stomacho & intestinis & ab hepate & a uenis, & mundificat eas ab humo. aquoso & cholerico, ideo datur ad laxandum simul & confortandum medicamenta supradicta. Dos autem eius in decoctione, vel in infusione est a dra. 5. usque ad 8. & in pul. dram. 2. usque ad 4. potest ergo dari in tertiana post signa digestionis ad purgandum choleram stomacho, & a uenis, & hepate & ad confortandum eos.

De causone.

Cap. VIII.

Causon est feb. acuta continua ex cho. rub. putrefacta in uenis quæ sunt prope cor uenis hepatis vel oris stomachi, vel in multis partibus corporis. Dicitur causon à caumate quod est incendium, quia causon idem est, quod incensio. 7. amphor. commento. 4. ibid. Si febr. non a cholera habeatur. Causon igitur interpretatur incendium vel cauma ut dici versus. Semper ait causon ardeo, ut cauma sum &c.

Causæ quædam sunt primitiue alie antecedentes alie coniunctæ.

Primitiue autem sunt omnia quæ ab exterioribus accidunt & faciunt ad acuitatem, & multiplicationem chol. rub. sicut est nimius calor aeris & fortis æstus cum calore intenso & labor corporalis excessiuus maxime in tali aere, & nimius usus, & comestio rerum calidarum, ut sunt alliata, piperata, & similia ut nectar, zinziber conditum & nimia ira.

Causæ antecedentes causonis sunt nimia caliditas hepatis aut uenarum totius corporis. Ista enim solent calidos hu. & acutos producere & generare, similiter multa chol. & hu. ca. in corpore generari & multiplicari & similia precipue chol. rub.

Causæ coniunctæ sunt primo ch. ru. puram

venis proximis cordis; vel in venis hepatis, vel oris stomachi putrefacta quæ quidē cholera iam est destituta a regimine naturæ, vt est clausa & conculcata & putrefacta. Alia causa coniuncta secundum Auic. potest esse phlegma salsum in eisdem venis. Similiter cōculcatum non euentatum, & putrefactum quamuis Gal. teneat contrarium, 3. de crisi. cap. 13. vbi dicit sic. Causon autem non generatur nisi ex cholera. Idem dicit, 3. ampho. commento. 30. ibi. Ultra vero hanc ætatem; quia non videtur aliquibus quod à phlegmate salso, tam terribilia accidentia possent puenire. Et si forte sit cau. ab illo phlegmate salso, vt vult Aui. tūc fit illa species quæ durat vsque ad septimum diem, quia phlegma tardius & cum maiori difficultate digeritur & expellitur.

Signa causonis sunt caliditas continua atque asperitas lingue à principio cum quadam citrinitate, & post efficitur nigra propter adustionem & adest vehemens sitis, & priuatio sudoris nisi in crisi. Et quasi nulla in causone reperitur distinctio temporum morbi, quia fere æqualia sunt tempora accidentium in terribilitate & fortior est caliditas in interioribus quā in exterioribus, quia cau. interius est prope cor & partes vicinas, ideo dicunt sepe estuare, & ardere ideo continuo sitiunt. assunt vigiliæ & inquietudo permixtio rationis dolor capitis sitis intolerabilis pulsatio temporum propter vehementem motum arteriarum profundatio oculorum propter magnam consumptionem humiditatum orbitarum. Debilitas appetitus vrina citrina ignea pulsus frequens propter magnam necessitatem attractionis aeris & aliquando sunt surdi propter accessionē cholerae ad organum auditus. Aliquando myti propter remissionem cholerae ad organum locutionis vt plurimum adest constipatio ventris.

Indicia in cau. Primo primus medicorum Hippo. 4. ampho. ampho. 58. dicit sic. A cau. habito rigore superueniente solutio fit. Et pro concordia si superuenerit ei qui habet cau. rigor consumitur se. eius 2. de crisi. e. 3. Et causa istius est quia cho. ru. inter venas manens secundum crissima natura exterius expellitur & natura eam cogit penetrare per lacertos & carnem vsque ad cutem.

Secundo si cau. in æstate & iuueni contigerit non est ita timendum quoniam multus calor facillime materiam sepe irritat eamque citò dissolvit. 2. amph. com. 34. in fine commenti ibi. In morbis &c.

Tertio si cau. quod incendium interpreta- tur, si iuueni contigerit in hyeme nimium si-

gnat huc ex cremis, & est peius quā si con- tingeret in æstate. Fortis est enim ignis quo aqua non extinguitur. Galibidem.

Quinto causon accidens in senibus, periculosior iudicatur per eandem rationem.

Sexto si cognoueris causonem & videris aliquod signum digestionis iudica ipsum ter- minare per vnam de 4. crisis, scilicet per vomitum aut per solutionem ventris aut p sudorem aut per fluxum san. narium quod- libet istorum superueniens causoni est signū bonum signis digestionis precedentibus.

Septimo quibuscunque in causone tremo- res fiunt alienatio soluit. 4. amph. amph. 28. Gal. tamen non tenet istum amph. quia non est consuetudo dicere quod ægri. soluitur si in periculosiorem mutentur. Et sequitur in- com. Materiam, vnde nascitur causon intra venas & arterias est, qua si mutetur ad ner- uos: in primis fit tremor, & ex nervorū pas- sionibus cerebrum quod est eorum fundamē- tum patitur, & sic necessario fit alienatio cō- eiusdem.

Octavo causon brevis terminationis est: quia vt plurimum in quarta, vel quinta terminatur die, & ad longius in sepius non.

Curatio causonis. in principio ponantur cau. generales & notetur illi qui fuerunt po- ssi in cura se. acutarum in generali in ca. 6. istius 7. lib. Sit ergo primus canon. Festinan- da est a principio in causone euacuatio mi- noratiua. Et quia furiosa est materia ipsam se- que eradicatione digone apparante maxime.

Secundus si vrina fuerit citrina vel subci- trina & pulsus non multum plenus flebotomia non est celebranda quia magis inflamma- retur cho. per remotionem san. freni eius.

Tertius si vrina sit turbida vel r. & spissa, & pulsus plenus flebotomia debet a princi- pio celebrari.

Quartus si in cau. competat flebotomia il- la à principio est exercenda, quando enim postponitur flebotomia apud principium ægritudinis post non est ei intentio & fortal- sis interficit propter aduentum debilitatis. Iste cau. est Auic. in prima 4. tract. 2. c. Inten- tiones ad curationes vniversales &c.

Quintus, habentes causonem subulatio- ne indigent regiminis. in vltimo. nisi timea- tur casus virtutis: tunc enim necessarium est vt cibentur; quamuis non appetant & res quas sumunt sint actu frigida. Auic. in ca. proprio.

Sextus si obliuiscantur aquam potare pro- pinetur eis aqua frequenter; quia sum. ne- quaquam debent sustinere.

Septimus quando in habente causonem superfluit fluxus san. nariū vel aliunde oportet.

ut ut restringatur ne virtutis debilitas magnificetur, & ne habens corporis nimium relaxentur.

Octavius capita patientium causonem rebus infrigidantibus sunt defendenda vel infrigidanda ne cho. vel fumi eius ad ipsum ascendat. Et in hoc casu valet oleum ros. cū aceto & sand. cum aqua ros. & vigilia & alia sinthomata cū rebus appropriatis mitigentur.

Nonus casus est Gal. in passio. Primo euacuetur cholericus huius per vomitum aut ventris solutionem; deinde caliditas eius acuta remanens extinguatur, & hoc certissime fit: si aqua frigida in bona quantitate potetur.

Decimus quia ut plurimum sunt constipati. ideo in prima die vel secunda lenitio elisteri feces expellantur.

Vadecimus est Ras. 10. ad Almanforem proprio sic. Ergo igitur quacunque nocte, & apozimate prunorum & tamarindi est tribuenda, ventres quotidie bis aut ter soluantur.

Duodecimus quia materia causonis ardentissima est prope corruptionem & ad ipsum continuè euaporans; idcirco frigida cordialia sine interuallo parari sunt ministrandi.

Curatio particularis causonis. Primo stat in ratione quod isti constituentur in camera ubi sit aer frigidus: quæ aspersa sit & rotata cum aqua frigida & aceto, & circa lectum ponantur folia & rami salicis & cannarum, & vitium & quercus & malignanati quæ sint collecta ante solis ortum & sternatur camera cum iuncis & folijs vitis similiter collectis. Ista omnia & similia alterant aerem, qui attractus ad pulmonem & cor ipsa infrigidant & cauma eorum refrigerant paulatim. Deinde iuxta doctrinam tertij casus. Si urina est rubea & spissa sit flebotomia de mediana, vel basilica & hoc fit à principio secundum doctrinam. 4. casus. soluta constipatione. Et si ista flebotomia à principio non fit. dimittatur, deinde in eadem die vel saltem in sequenti propter timorem accidentium, & molestia & furiositate materię de hac medicina.

Recip. florum violæ. borag. & buglossæ ana vnc. vj. prunorum siccorum. 20. numero fiat decoctio in qua dissoluantur tamarind. cassiæ si. mund. ana vnc. 6. renbarbari temperati in aqua end. dra. 6. fiat potus, & offeratur in aurora quia in principio si quid vs mouendū mox. in statu aut silētiū adhibere melius est à principio iuxta doctrinā. 9. casus. ad alterationem & infrigidationē materię & qualitatē eius fiat talis sirupus quæ digerit & ingrosat & infrigidat materiam ne furiat per venas saliendo. Reci. endiuia lactuce scariolæ. portulacæ, rostri porc. hepatici foliorum & summitatum papaueris capilli veneris recentis,

ana m. j. florum violæ ros. ru. florum nenupari. lentig. aquæ font. ana vnc. i. & se. frigidorum minorum. ana dram. 2. fit decoctio in aqua fontana vsque ad li. i. & s. & in clarificatione cum zuccaro. li. i. & s. addatur aquæ end. aquæ ros. succi malorum granatorum acriū ana li. s. spodij, sand. al. & ru. caphoræ se. papa. ana dram. i. & s. detur cū aqua hordei vel cū aqua frigida in mane & in sero & in vespere & in medio noctis si potū desiderat. Et si egritudo ista cum vehementia sinthomatu & inquietudo & incendio vltimatis venit & in secunda die aliqua signa digestionis apparere incipiunt & creditur terminari in quarta tunc nihil quod sit cibale ægro est tribuendum iuxta doctrinam. 5. casus. & Hippo. quia ad vltimas egritudines vltimæ curationes sunt potentes ad perfectionē. ampho. 6. Sed quia virtus pp abstinētiā deficit. ampho. comm. 5. ideo contemplari oportet ægrotantem si sufficit cum tali dicta usque ad statū egritudinis & utrū ille prius deficiat & tunc dandū est aliquid de cibo vel de supradictis quia nutrit, & detur aqua hordei & detur auenatum clarum non spissum, vel mica panis multotiens lora in aqua frigida, & cum lacte se. cucur. & melonis mund. vel ipsum lac amigd. cum se. cucur. factum cum aqua frigida. Potus autem qui dari possunt secundum Aui. sunt sirupus acetosus & muscillago se. end. & portulacæ & melonis & sirupus de papauere nigro.

Vtcrius pro potu ubi sitis videtur esse inextinguibilis & infirmus iuuenis estuat & desiderat aquam frigidam potare. Poter de aqua frigida quantum in vno haustu potest attrahere, donec iterum sitiat cum arsurā. Et tunc iterum alium capiat haustum & c. Istis tñ conditionibus obseruatis. Prima est quod non sit decrepitus secunda quod non sit manifesta debilitas in aliquo membro principali vel immediate principali deseruienti. 3. q. se. non sit ex frigida materia. 4. quod non sit virtutis debilitas. 5. quod materia non sit cruda, immo digesta. 6. quod non sit oppillario magna & manifesta. 7. quod morbus non sit in principio sed in declinatione. 8. quod sit vehementia sitis, & patiens appetat aquam frigidam. Inquit Gal. in passionario. Certissimè autem extinguitur si pa. bibat aquā frigidā & multā frigidā. Pōt. et succum malorum granatorum cum aqua frigida bibere: potest etiam sumere in defectu virtutis ius paruæ pullæ coctæ cum lactucis vel portulacis & cucur. cum agresta & tenet locum sibi & medicinæ, vel secundum Ras. potest dari mica panis multotiens in aqua frigida lora & mixta cum lacte a quo extractum sit butyrum addēdo

do parum zucari. Si ergo vides egrum multum sitire & aquam frigidam desiderare, & videtur ei quod alij potus non remoueat si tim conditionibus obseruatis si non habet apostema in aliquo membro interiori & sit consuetus eam bibere ministra ei aquam frigidam sicut statim dictum est, & fac alia remedia supradicta. Cum ergo videris habentem causonem quod ei incipiat sudor dimitte eum sudare stando propere ne se discoopariat & sudet quantum sufferre poterit, vel si incipiat fluxus sanguinis narium vel fluxus ventris: rege ipsum secundum canon. supradictos habendo oculum ad tenorem virtutis.

Declaratio. Primo intelligendum secundum quod dicit Rasio ad Almanfi. quod in agnitionibus, quae sunt a materia furiosa duabus de causis medicina laxativa danda est a principio. Prima est quia isti humores furiosi digestionem spectare non possunt quia continue de loco ad locum impetuose mouentur vt dicit Gal. in amplio. comm. Digesta medicari &c. Alia causa quia si in principio euacuari non fuerint in augmento, vel in statu perniciem afferunt, & si propter grossitatem materiae vel aliter non das medicinam laxatiuam in principio non praesumas ipsam dare in statu, sed quiesce ne naturam impedis, verba sunt Rasi vbi supra.

Secundo no. quod Rasi in loco allegato habet in causone apponere super hepate & corpannos infusos in aqua rosae. Et dicit quod si non habet apostema in interioribus nec sitio est debilis nec hepate bibit de aqua frigida in frigidata super niuem tantum quantum potest donec facies virid. sit & habeat tremore.

Tertio dubitatur vtrum causon possit fieri ex cholera superincensa non putrefacta. Et arguitur quod sic si illud, quod minus videtur inesse inest, ergo & illud quod magis sed minus videtur esse quod ex sanguine superincenso non putrefacto generetur febr. quam ex cholera. igitur &c. consequentia tener pro locum a minori. Minor probatur quia sanguis paratior est putrefactioni & ideo minus videtur quod possit inflammari sine putrefactione cum vtraque qualitate sit paratus putrefactioni. Quod autem ex sanguine non putrefacto, sed inflammato possit fieri febr. hoc pater in sinocha.

In contrarium sunt omnes auctores ponentes causonem fieri ex cholera putrefacta in venis proximis cordi vel in venis scto. vel epatis. Primo nota quod intentio fuit aliquorum quod causon potest fieri ex cholera aquosa & inflammata sine putrefactione immo etiam a mala sola complexionem introducta in corpore, & istius opi. fuit Gariopontus in additionibus

passionarij. d. Causon alia ex humore, alia ex qualitate. Si ex hu. dissoluitur, si ex qualitate extinguitur. haec ille. & hoc probat ratio ante oppositum. Ista oppositio est contra mentem Galeni tertij de cri. c. 3. & 3. amph. com. illius. Ultra vero hanc artem, vbi vult quod causon fiat a cho. ru. putrefacta intra venas proximas cordi.

Secundo no. quod sanguis est multum amicus naturae in tantum quod non purgatur cum laxatiuis sicut ceteri humores nisi laxatiuum esset multum violentum: & tunc ultimo expelleretur ideo quia magis amicus naturae, & propter hoc magis est sollicita de generatione & conseruatione eius: quia propter defendit ipsum ab omni corruptione, & putrefactione quantum potest. Et si natura ei dedit complexionem in qua maxime fundatur putrefactio, hoc non fecit vt in eo causaretur putrefactio, sed vt esset aptior generationi membrorum & nutritioni eorum, quia nutritio fit per calidum & humidum, secundo de generatione. Et hoc dico propterea quia licet sanguis supercalefiat, tamen non ita cito putrescit sicut alij humores, quia natura defendit ipsum, & in hoc dat operam quantum potest.

Tunc ponitur talis conclusio. Causon non generatur ex cholera superincensa non putrefacta, probatur. quia causon ab omnibus ponitur sub genere fe. putridarum, etiam per Aui. qui dicit quod causon fit a cholera putrefacta. Probatur secundo quia ad putrefactionem duo requiruntur scilicet conculcatio & non euentatio humoris in vno loco, vel in locis pluribus. Secundo requiritur calor faciens bullitionem & commiscens purum cum impuro, sed sic est in cholera, quia ipsa conculcatur in locis supradictis, & ibi venit vel causatur calor extraneus & sic putrescit & facit fe. putridam.

Ad argumentum. si illud quod minus videtur inesse inest, ergo & illud, quod magis conceditur maior aliquibus conditionibus obseruatis: quae videri habent in logica & ad minorem minus videtur inesse quod ex sanguine superincenso non putrefacto generetur febr. quam ex cholera. Dico distinguendo vel ex parte qualitarum illorum humorum inter se comparatorum, & sic conceditur minor. Vel ex parte instrumenti, scilicet naturae & sic negatur minor quia natura magis sollicita est de sanguine quam de cholera & magis satagit circa eius custodiam, ideo non ita cito putrescit sicut cholera. Sanguis autem quamuis aliquando supercalefit, & inflammatur ex sui multitudine facit fe. quae reponitur sub genere fe. effi. & hoc non contingit fieri ex cholera.

Quarto, queritur, quæ species caufonis fit molestior an illa quæ fit de cholera rub. an illa quæ fit de phlegmate falso. Dico quod si molestia attendatur penes acumen & molestiam accidentium, dico quod illa quæ fit de cholera est molestior, quia maius incendium & acumen habet. Si autem molestia attendatur penes durationem & difficultatē eradicationis, sic est molestior quādo est ex phlegmate falso.

Quinto notandum quod caufon habet causam efficientem & est putredo cholera quæ facit morbum, qui nominatur caufon, & habet accidens, quia dolorem capitis, & vigilias, & sitim, & sic ibi est morbus, causa morbi & accidens morbi, unde putrefactio & corruptio propriæ & innatæ & substantialis humiditatis ex indigentia caloris naturalis superabundante calore alieno. Istam diffinitionem ponit Gilbertus.

Sexto nota, quod duæ sunt causæ citæ terminationis caufonis. Prima est ex parte naturæ & morbi primo quia morbus est multum intentus & molestus & natura ipsum diu sustinere non potest, ideo nititur ipsum cito expellere; quia natura non suffert longitudinem morbi, cum ultimata malitiæ accidentium terribilitate. Alia causa est ex parte materiæ & quæ est multum subtilis & cito euaporabilis.

Septimo queritur, utrum accidente putrefactione in vno humore alij humores putrefiant, probatur quod sic, quia sunt commixti adinuicem, & sic non videtur quod unus putrefiat sine alio, consequentia est bona & antecedens pro maiori parte est Gal. 2. prognosticorum commento. 38. ibi. Laudabilis vero vomitus. Vbi sic dicit Gal. Hippo. ergo videtur ne aliquis sit humor purus, sed quod sint per mixti simul.

Octavo sic. Sicur se habet calor naturalis ad digestionem ita se habet calor innaturalis ad corruptionem & putrefactionem, sed calor naturalis sic se habet ad digestionem quod omnes humores simul digerit & generat, ergo calor innaturalis eos simul putrefacit & corrumpit. Maior est nota, quia contrariorum contrarij sunt effectus & minor est Auic. in doctr. de humoribus.

In oppositum ad omnem putrefactionem alicuius humoris notabilem sequitur febr. ergo putrefacto vno humore si alij putrefiunt data vna se. omnes alia aderunt quod est falsum & contra mentem Galeni lib. de differentiis feb. & 2. de crisi.

Notandum pro prima ratione, quod commixtio est duplex secundum philosophum. 2. de generatione. & 4. meteo. Quædam est vera commixtio in qua omnes partes miscibilium adinuicem commiscantur, ita quod in tali

commixtione quodlibet commiscibilium perdit formam suam, & in mixto introducitur noua forma. Alia est commixtio in qua miscibilia suam propriam retinent formam, & ista non dicitur vera commixtio, sed potius debet dici iusta positio.

Secundo notandum quod humores quamuis sint simul in venis, veruntamen quilibet retinet suum proprium nomen & formam, & omnes simul aggregati dicuntur massa sanguinaria, & hoc patet quia natura eos segregat in hora nutritionis, & attrahit sanguinem ad generandum & nutriendum carnem & melancholia ad nutriendum ossa & sic de alijs.

Tertiò notandum quod aliter se habet calor naturalis ad digestionem iuuatini, & aliter se habet calor præter naturam ad corruptionem rei putrefactibilis, quia calor naturalis est vniformis & vniformiter agit in materia præiacente, vt ex qualibet parte generet in simul quod aptum natum est generari, & sic simul & generaret chilum; & ex chilo simul generaret mores successiue, tamen quia totus chilus simul non posset recipi in venis hepatis ita quod in fine actionis vna pars est sanguis alia cholera alia melancholia, alia phlegma. Calor autem innaturalis agit distincte, & difformiter in re quæ magis parata est putrefactioni & corruptioni, & cum hoc natura sategit custodire & regere res corpori necessarias & iuuatinas & illas iuxta posse defendere. Cõstat autem quod res quæ putrefiunt extra regimen naturæ sunt & ab ea non gubernantur.

Tunc fit prima conclusio. humores non sunt simul mixti secundum primam mixtionem, scilicet in qua noua forma miscibilium acquiritur, sed bene sunt mixti mixtione secundæ de qua dictum est in primo notabili. Secundæ conclusio est. Putrefacto vno humore non est necessarium alios humores putrefieri, patet per rationem factam post oppositum.

Ad rationes ad primam quando dicitur, quod humores sunt commixti, dico quod non sunt mixti prima mixtione, sed secunda quæ est quædam iuxta positio, & sic vnus potest putrefieri alio remanente saluo, quia est extra regimen naturæ & natura de eo non est sollicita, de alijs vero sollicita est & illos gubernat, & sustinet.

Queritur octauo quare caufon magis generatur ex phlegmate falso quàm ex alijs humoribus frigidis. sicut est melancholia aut phlegma &c. Primo notandum est ex primitiuis vt dicitur primo can. doctrina. 4. cap. 1. quod phlegma falsum fit ex phlegmate tenui quod saporem non habet, vel parum saporis cui commiscetur cholera sicca adusta & facit ipsum phlegma falsum & ipsum calefacit,

& istud phlegma est cholericum & omnibus speciebus, phlegmatis est acutius & siccus & lenius. Cum igitur phlegma falsum post choleram sit, magis calidum & acutum. Ideo ex eo post choleram, maxime fit causon.

Nono queritur. Si causon pot fieri ex cholera putrefacta in venis remotis a corde sicut in venis proximis cordi. Respondet Aliquod causon potest fieri ex cholera putrefacta in venis totius corporis. hoc dicit in ci. proprio. Et videtur quod iste sit mortalis propter multitudinem materie.

Decimo notandum quod raro accidit causon in senibus & si accidat, est mortalis, quia multitudo adest materie cum virtutis debilitate pueris autem & iuuenibus non sic, ideo non sunt ita periculosi. Similiter dicendum est de mulieribus maxime phlegmaticis, quia in morbis minus periclitantur egrotantes.

Vndecimo sciendum, quod aqua frigida subtilis & passibilis est ideo si fumatur in parua quantitate cito inflammatur a calore innaturali, & causam febris forficat, sicut patet in ramusculo fabri in aqua madefacto aggregante carbonem ad oculum fornacis: tunc enim ignis fornacis magis forficatur, ut patet ad experientiam. Similiter accidit in administratione aque in causone, quia si detur de parua quantitate statim inflammatur, & si detur in magna quantitate, ut quantitas suppleat substantiam eius subtilitatem ne inflammetur, sed se extinguit.

Duodecimo dubitatur de administratione aque frigide. Dicitur enim quod detur post digestionem materie. Sed contra, quia illud quod digerit & in frigidat & ingrossat materiam cholicam debet in principio ministrari aqua frigida est huiusmodi igitur &c. consequentia nota est & maior est Aliuca. de cura febrium putridarum in vniuersali, & minor nota est de feb. hoc dicitur modis morborum.

In oppositum. Nihil quod crudificat materiam & ipsam reddit compacta debet in principio & ante digestionem ministrari, sic est de aqua frigida &c. Dico quod non debet ministrari ante digestionem materie, patet per rationem ante oppositum, & patet auctoritate Gal. mech. particula complexa quasi colum. 6. vbi dicit sic. Aqua non purgat eos, scilicet malos humores, sed cruditatem augmentat quamuis cum bibitur quiddam quietis & refrigerationis egri patiantur. Nam causa febris & apostematis non solum permanet, sed augmentata, & a digestionem remota est, vbi supra, & sequitur. Necessarium est iterum, ut aqua illa intendatur & calefiat, cum frigiditas eius non stet ante fortitudinem febris unde necessario se confortatur & induratur magis quam

fuerit propter oppillationem quam in poris facit, & conclusionem dissoluendorum quo circa febr. sit diuturna, hæc ille ibidem. Et sequitur etiam aliquando virtutem aliquorum membrorum magnam in corpore actionem habentium defectam facit si ea debilia inueniuntur siue ex generatione siue ex illo tempore. unde penitus ab illis actionem amputa libid.

Et ponit Galenus Membra quibus nocet aqua frigida aliquando nocet meri quod non potest transglutire, aliquando nocet stomacho, quod non potest digerere, aliquando orificio stomachi, aliquando hepatis & in alijs diafragmati, alijs pulmonibus, alijs renibus & vesicæ &c. hæc ille ibidem. Et sequitur quibusdam citissime anhelitum grauat & spasmus & tremorem facit in nervis. Quare dico, quod qui hoc audiat formidat aquam frigidam febricitantibus ministrare. ibidem. Et sequitur immediate illis ergo non debet dare aquam qui quidem membra habent debilia, & in quibus nobilium membrorum apostemata sunt calida siue frigida siue mollia, siue dura. Et qui oppillationem habent aut humores crudos aut putrefactos. mech. particula 3. col. 7. Et sequitur. Sed tamen si signa digestionis apparent apostemata absente da aquam frigidam maxime si quædam membra non habent frigida unde suspicentur actionem eorum defecturam postea. Nec nocet heri si pilatio apostematis, si purum sine commixtione alterius sit, set cura curatio eius est. ibidem. Et in illo apparet opinio falsa illorum qui dixerunt, quod aqua frigida competit ante materie digestionem.

Decimotertio intellige secundum rationem, vbi dicitur quod omni die detur apostemata mariorum & prunorum, & bene quia ista cum hoc sunt laxatiua sunt refrigeratiua, ita quod habent laxare choleram, & cum hoc in frigidant causam caloris remouendo & alterando & in frigidando.

De synocha. Cap. IX.

Synocha est febris continua ex multitudine sanguinis non putrefacti & respirationem prae sui multitudine non habentis.

Causæ synochæ antecedentes sunt sanguinea complexio inclinata ad multum sanguinem generandum, unde posito quod homo sanguineus eisdem cibarijs vescatur quibus melancholicus, magis tamen de bono sanguine in sanguineo generabitur & multiplicabitur quam in melancholico, & hoc est ratione complexionis quæ ad hoc est inclinata. Alia causa antecedens est multus sanguis iam in corpore existens, & ipsa vasa repleta & foramina.

Causæ enim primitivæ sunt dimissio exercitij, ut dicit Gale. 9. mach. colum. 2. Similiter multum exercitium non assuetum comestio & frequens usus ciborum multiplicantiū sanguinem, sicut sunt carnes electæ & bonum vinum maturū & vitella ouorum & similia.

Causa coniunctæ sunt multitudo fumorum à tali sanguine euaporantium, & respiratione non habentium, immo retenti calefaciunt sanguinem & spiritum & sic febr. reposita est sub specie effi. factæ propter oppilationem pororum & retentionem vaporum & fumorum à sanguine resolutorū, quia ab eadem causa fit & per eundem modum quamuis inter eas sit differentia.

Causa autem retinens illos fumos est oppilatio pororum cutis vel oppilatio pororum & viarum interiorum, ita quod ebullitio, & supercalefactio sit causa oppillationis suffocata caliditate, sicut dicit Auic.

Signa synochæ ponuntur a Gal. mech. particula 9. col. 2. ubi loquitur de illo iuvene qui habebat fe. sanguineam & est febr. calidissima pulsus æqualis velox & magnus & spissus, & fortis & calor in volis manuum & non est mordacitius & vrina in colore, & liquorē est vicina vrina sanæ. Ego dico, quod ut plurimum est rubea & spissa adest & grossities corporis & multitudo carnis. Et per ista signa notum fuit Gal. quod erat febr. synocha ex oppilatione propter multitudinem sang. orta, & propter prohibitionem dissolutionis, & propter grossitiem corporis &c. Adest etiā rubedo coloris & plenitudo venarum & extensio membrorum ac si haberet alices. Et addit Auic. q. habent ruborē in facie, & oculis & inflatione venarum temporum, & repletionē corporis ultimam: & non est fe. cum rigore & habet constrictionem anhelitus. Et quandoque accidit eis profundatio somni ac si haberet subeth & ante commotionem eius scilicet febr. adest granitas in corpore, & regimen præcessit multiplicans sanguinem. Et adest pruritus in naribus & fatigatio membrorum præcedit, & in somnijs vident res rubeas vel sanguinolentas. Adest grauitas & dolor frontis, & accidit eis difficultas locutionis & caliditas extēla vaporosa propter humiditatem quæ sentitur tactu non ita sicca sicut sentitur in causone vel vta tertiaria vel in acutis.

Iudicia in synocha. Primo dicit Auicenna in capitulo proprio. quod profundatio somni & difficultas sermonis in synocha & in synocha est malum signum.

Secundo apostema gutturis in synocha, & in synocha est malum signum.

Tertio si habentes synocham non flebotomantur subito moriuntur aut in nimiam mo-

lestiam & timorem veniunt, nisi fortuna ex vi nature eis faueat cum fluxu sanguinis narium aut cum sudore megatechni, particula nona colundello quarto in fine colundelli.

Quarto synocha frequenter mutatur ad fe. putridam vel hecticam dicit. Ani. nisi cum flebotomia cito succurratur.

Quinto si signa digestionis in ea tarde appareant tarde fiet crisis eius maxime si febr. sit tepida. Et si signa digestionis usque post tertium aut quartum diem expectant, signum, est quod crisis non veniet in septimo. Et aliquando venit crisis eius in quarta die.

Sexto quando apparent pustulæ liuidæ aut nigræ, signum est mortis.

Septimo si oculi lachrymantur sine voluntate flendi, sed propter malitiam morbi, & adest difficultas anhelitus, est signum mortis.

Octavo iudicat Gal. sic. Neutra tamen harū specierum. i. synochæ & synochi sit in macris, & frigidis corporibus: sed in carnosissimis multum sanguinē habentibus. 9. de ingenio. c. 14.

Nono iudicat Rasis. hæc febr. sepe in causone mutatur nisi à principio cum refrigerantibus & debita flebotomia extinguatur. 10. ad Almanforem. c. 5. in fine capituli.

Curatio vniuersalis fe. synochæ. Post cano. Gal. 9. de inge. cap. 9. Quicumque curare voluerit synocham faciat infirmum flebotomari extrahendo multum de sanguine fere usque ad sincopim quasi omnes autores tenent istum canon.

Secundus est Ani. 1. 4. canon. Si sanguis inuenitur aquosus subtilis vel multum cholericus infrigidandus est & ingrossandus.

Tertius si sanguis fuerit multum grossus subtiliandus est.

Quartus, mundificatio humoris ipsum sanguinem subtiliantis vel ingrossantis sequatur flebotomiam post eius digestionem competentem.

Quintus, apertio pororum cum fricatione & similibus post euacuationem cum flebotomia, vel aliter factam in retentione synochæ est multum iuuans & necessaria existit.

Sextus si a principio propter medici absentiam vel propter aliam causam flebotomia neglecta fuerit: postea quocunque tempore medicus ad infirmum venerit: exercenda erit præsupposita virtutis constantia, ut error in principio factus in processu corrigatur. Ani. cap. proprio.

Septimus si patiens synocham flebotomia non sustinet, cum alteratiuis, & aperitiuis, & euacuatius est insistendum. Et si possibile est cum verosis & sanguifugis ut superfluitas humoris sanguinei diminuat, & eius qualitas alteretur.

Octauus casus est An. in c. proprio. Flebotomia, & sumere in potu aquam frigidam quandoque excusat ab infrigidatione alia.

Nonus habentes sinocham regimine indiget subtiliatio, & comestitionis diminutione.

Decimus augmastica quamuis plus indiget minutione, secundo homotena, tertio peraugmastica, quamuis in illa specie flebotomia erit priuanda.

Vndecimus est An. si autem morbi initium sit propter nimium cibum, quem comederat infirmus, & adhuc in ventre sit coadunatus, oportet quod vsque ad diem secundam, vel ad tertiam flebotomia suspendatur.

Curatio particularis sinochæ. Ista ægrotudo non suffert pigritiam nec ignoratiam medici, propterea quia potest mutari in deteriolem, ut dicitur in nono iudicio, ideo canonibus obseruatis à principio. & iuxta tenorem primi canonis, flebotomia fiat de vena mediana, quæ ab inferius, & superius euacuat, & extrahatur sanguis vsque ad sincopim ferè, vel saltem paulatim, & frequenter de sanguine auferatur, deinde dentur refrigeratiua sicut est rob, qui fit de succo vûe acerbæ, & rob qui fit de acetositate citri, & rob de ribes, & rob factum de succo granorum acedule, & detur siropus limonû, & siropus qui fit de succo cucurbitæ, & de succo vel aqua acetosæ, & de succo granatorum acrimum. Et detur aqua frigida iuxta tenorem octauî casû in magna quantitate, obseruatis conditionibus dictis in cura vaisionis. Et si eger fuerit debilis, ciba ipsam cum medulla panis loti cû succo granatorum muforum, & aggregata, & da ei aquam hordei, & refrigera ipsam cum muscillagine philij, & da zucarum ros. secundum Ras. si adest constipatio fiat lenitium clistere galinæ coctæ cum maluis, deinde purgetur cum tamarind. & prunis, & cum manna & cassia.

Sequitur siropus de se. portulacæ secundum Hebe. extinguens inflammationem & feb. & auferit sitim, & confortat stomachum, & hep. par supercalefacta. Rec. succi end. cocti & despumati. li. 2. se. portulacæ vnc. 2. toratur se. & super ipsum fundatur succus, & stet in vase lapideo die ac nocte coquatur lento igne ad consumptionem medietatis, & addatur zuccari lib. 8. addendo in clarificatione acetû albi, succi malorum granatorum actium ana. vnc. 1. & se. Idem potest fieri de aquis distillatis, sed non tantû, videlicet sicut succi, quia in eis distillatis remanet virtus ignis, quia dicit philosophus. Quod semel est calidum semper retinet aliquam virtutem calidi.

Similiter er, videlicet rob qui fit de succo herbæ acetosæ, quæ videlicet tantû sicut rob. de ribes ut dicit Hebe. Recip. succi acetosæ lib. 10.

coquantur lento igne, donec consumatur tertia pars suc. & post dimittatur stare donec faciat residuatiam, & iterum coquatur lento igne vsque ad spissitudinem. Aliqui exponunt soli donec fiat spissum, sicut etiam faciunt de succo agrestæ. Et ista valent ad debilitatem stomachi factâ à causa calida, & videlicet ad solutionem ventris à causa calida, & cum hoc extinguit sitim. Et fiant similes medicine donec extinguatur. Valet etiam oxizaccara simplex & iulep Alexandrinum, & siropus rosaceus, & violaceus & cetera similia.

Declaratio in sinocha. Primo queritur cum multi hominum sint pingues, grassii, & carnosi, & pleni sanguine, quare aliqui eorum patiuntur sinocham. alij vero non. Ad hoc respondet Gal. mech. particula 9. quasi col. 5. in fine. colum. ubi dicit. Complexiones vero, & corpora bonos humores habentia, de quibus dissoluitur fumus aeris si oppilationem multam habent ducuntur ad se. continuam sanguineam, quæ sinocha nuncupatur. Quando vero mali & acuti humores sunt cum calescent ad putredinem festinanter incidunt, boni vero, & temperati non cito, sed tarde putrescunt. hæc ille. Paret igitur ex dictis Gale. quod aliqui habent multitudinem sanguinis & humorum. Et si tales habeant oppilationes, tales cito cadunt in feb. maxime si humores tendant ad acuitatem. Alij vero quauis sint crassi & pingues vel carnosi, non tamen habent oppilationes, humores eorum bene euacuantur, & a natura gubernantur, & sic non cadunt in feb.

Secundò intelligendum secundum quod dicit Auice. in prima fen. 4. cap. de synocha, quod synocha est de summa febrium, quæ est inter se. putridas & inter se. effi. differt enim a feb. effimera, quia primum quod in ea calescit est humor, & primum quod in effi. calescit est spiritus. Differt etiam a febr. putrida, quia in synocha non est putredo sicut in putridis, est tamen febr. acuta, & talis synocha non est effi. nec ethica, nec putrida. Ex quo sequitur contrariæ quod ista præpositio vniuersalis est falsa, omnis fe. aut est effimera, aut putrida, aut ethica, sed ista est vera, omnis feb. vel est effimera aut humoralis, aut ethica.

Tertiò dubitatur si sanguis manendo san. possit putrescere & facere febr. Dicitur quod sic, quia sang. in se habet duas qualitates, scilicet caliditatem & humiditatem, quæ sunt principia putrefactionis.

Quartò sciendum quod istius febr. autores primo Gal. in 9. mech. & Anic. in 4. canon. in e. proprio, ponunt tres species specialissimas. Prima vocatur augmastica ab augmento, quia continue procedit augmentando vsque ad crissim & ista inter ceteras est deterior, quia plus de

de fumis, & vaporibus malis continue genera-
rur, quàm natura possit resolvere. Secunda
species vocatur peraugmastica, quia à princi-
pio perfecte augmentata, id est, quòd princi-
pium augmenti est nequior horarum eius. Et
ista procedit continue diminuendo usque ad
ad crism. Et in ista natura magis resolvitur, &
consumit de fumis, & vaporibus quàm de ma-
teria aggritudinis dissolvitur, & ista species est
leuioris, & certioris curationis, & terminatio-
nis. Tertia species vocatur hec etena, quasi æ-
qualiter hominem tenens. Et ista à principio
ad alia tempora non recipit augmentum nec
declinationem, sed æqualis in afflictione, &
accidentibus indicatur. Et ista species est me-
diocris in malicia inter alias duas species, &
sic remanet usque ad crism. Et in ista genera-
tur tantum de fumis, & vaporibus quantum
resolvitur, & morbus, & natura quasi contem-
dunt de pari donec aliter succumbat.

Sed nunc restat dubitare si qualiber ista-
rum specierum febr. habeat quatuor tempo-
ra, sicut ceteræ aggritudines curabiles scilicet
principium augmentum statum, & declinatio-
nem. Pro quo notandum, quòd in principio
cuiuslibet febr. ea naturalis, & innaturalis ob-
nuant sibi invicem, & uterque calor maxime
naturalis in principio est sopitus, & non fit
magna actio, tunc inter eos, & ideo in princi-
pio non apparet mala, nec fortia accidentia.
In augmento vero, quia natura median-
te calore naturali, & spiritu sentiens noctu-
mentum agit fortiter contra calorem innatu-
ralem, & causam eius, & incipit materiam di-
gerere, & tunc accidentia fortificantur pro-
pter aggrauationem virtutis regitiue, quæ
tunc posita est in tribulatione, & angustia
propter pugnam. Propter quòd aduertend-
um, quòd processui in febr. est duplex, vel
enim consideratur à parte materie, vel à parte
temporum morbi. Si à parte materie sic est
processus in istis febr. sanguineæ speciebus,
quia sang. est multum obediens naturæ, & de
si sang. est melancholicus, & grossus, & non
fortiter egit in illum, fit prima species, si
est paucus, & subtilis, & natura agit in il-
lum, fit secunda species. Si mediocris, si-
militer agit natura, & fit tertia species. Si
autem iste processus consideretur à parte tem-
poris morbi, & ex parte digestionis materie,
sic dicimus cum Galen. quòd omnis morbus
curabilis habet quatuor tempora manifesta,
vel occulte quo ad accidentia, vel quo ad di-
gestionem, vel indigestionem materie, &
positò, quòd in istis speciebus quantum ad
sensum, vel ad intentionem accidentium non
apparent tempora distincta veridice loquen-
do in eis considerantur, & reperiuntur ista

quatuor tempora quo ad digestionem ma-
terie, & eius expulsionem si morbus est cu-
rabilis. Quinto queritur quare similis distinctio
istarum specierum, scilicet augmasticæ, &
peraugmasticæ, & homotene non sunt in fe-
cholericis sicut in sanguineis. Dico quòd cau-
sa est, quia maior aptitudo sanguinis est ad pu-
trefactionem, vel ad meliorationem quàm in
alijs hum. Primo ad putrefactionem, quia in
se. duo habet principia putrefactionis, secun-
do ad meliorationem, quia amicus naturæ est
& morbi, qui ab eo fiunt non sunt ita per-
iculosi.

Sexto queritur quare non est aliqua spe-
cies istius sanguineæ, quæ sit tota principium
sicut est aliqua quæ est tota augmentum alia
itorum statuum, alia declinatio. Ad hoc dicitur quod
aliqua species esset tota principium nunquā
illa curaretur, quia principium est illud tempus
in quo nulla signa digestionis apparent. Nun-
quam signa digestionis apparent nunquā
se. curaretur quia digestio præcedit expulsionem
medicines.

Septimo dubitatur, si flebotomia debet
exerceri in processu istius aggritudinis, scilicet
in 5. vel 6. die posito, quòd à principio non fa-
cta. Videtur, quòd non per Hippo. qui dicit, quod
a principio si quid videtur mouendum, mo-
ue, in statu autem silentium adhibere melius
est. 2. amph. Ideo dicit Avicenna com. 4. trac. 2.
c. 7. Intentiones ad curationes vniuersales cū
inquit, & cū postponitur flebotomia in prin-
cipio aggritudinis non amplius est ei in re. Respon-
deoque, quòd in se. sanguineis post prin-
cipium & in omni tempore si necesse est, & ap-
parent signa dominij sanguinis est fienda fle-
botomia, præsupposita virtutis constantia, quæ
san. non habet euacuationem artificialem, ita
bonam sicut est flebotomia, ideo si à principio
non fuerit facta, postea est facienda, & tunc ad
Hippoc. & Auicenna dico, quòd verum dicit in
bono regimine ubi non cadit error quia à
principio non fuit facta, & iste error potest cor-
rigi post flebotomiam in processu aggritudinis
factam.

Octauo nota hæc gratia exempli, & ad con-
firmationem. 7. can. curam quæ facta fuit cuius-
dam comiti, qui vocabatur dominus Petrus
comes de Hosteilis in regno Portogalæ. Erat enim homo pinguis, plenus, qui deiecit
in synochā, ut reuertit inhi homo fide dignus.
Medici vero volentes ipsum flebotomare nul-
lam venam inuenire potuerunt, quia abscon-
derant præ nimia carne, & pinguedine. Erat enim somno lentus, & quando propter
nominem vocabatur respondebat, & statim
revertebatur ad somnum. Et medicus

affluens habuit copiam sanguinarum, & ap-
posuit corpori eius, & in tibijs, & fronti, &
inter spatulas, & per latera, & postquam fue-
runt repletę expergefactus est, & post ciba-
uit illum cum iure pullę, & auena. & sanatus
fuit. Laus Deo.

In declinatione autem istius febr. si adhuc
remanet febr. quę ita cito non potest extirpa-
ri fiat tale electuarium. Recip. spo. sand. al.
& ru. 4. se. fri. ma. & mi. ana dram. 2. succi
liquiriti. dram. 2. & se. gummi arab. & dra-
gantia. amigda. ana dram. 1. camphorę.
dram. 1. conferuę nenufaris, vi. 1. zucca. quod
suff. fiat electuarium in bolos, vel ad modum
restaurantis.

Nono dicit Galen. quod statim a principio
flebotomia competit, nisi impediat virtutis
debilitas aut nouella repletio. sed dicit quod
vt plurimum in istis duabus ægitudinibus
virtus in principio reperitur fortis: ista autę
repletio nouella expectanda est vsque ad secu-
dum diem.

De syncho. Cap. X.

Synochus est febr. acutę continua ex putrefa-
ctione sanguinis generata, ita quod est in-
telligendum quod Galen. de crisi. capit. 14.
versus finem. cap. dicit sic. Veruntamen cum
san. incipit putrescere non remanet verus san.
sed declinat ad chole. Et non potest ibi fieri fe.
ex sang. putrefacto. Et hoc est quod dicit Au-
icen. in prima quarti cap. proprio. ibi. febrem
fieri opinatus est. Galenus huic opinioni
contrarius est Auicen. & ceteri doctores po-
nentes synocham fieri a putrefactione sang.
generata. quamvis Galen. hoc non neget
expresse.

Causę synochi 3. habet. synochus easdem
causas primitiwas, & antecedentes sicut
synocha, veruntamen in causa coniunctę
synochę est, multitudo humorum reentor-
um sine sanguinis putrefactione, sed cau-
sa coniuncta synochi est, putrefactio san-
guinis.

Signa etiam talia sunt in syncho sicut in
synocha, nisi quia in syncho febr. est ma-
gis intensa & calidius mordacius, & pul-
sus inordinatus, & vrina rub. grossa spissa,
& innaturalis, & in synocha non sic fit. Et
pulsus in syncho, est maximus fortis, &
equalis in duritie, & molitie stabilis se-
cundum, quod in sanitate magnitudo, &
spissitudo, & secundum magnitudinem,
& paruitatem febr. nono. mech. colum. pri-
mo. Et sequitur ibi. Porro hę significatio-
nes sunt vniuersales in his duabus febr. scilicet
syncho, & synocha. licet tamen vna si-

gnificationum putredinis in vrina, & pul-
su, & calore, liquore, & hypostasi a sana
vrina mutetur. in pulsu autem, quia ab or-
dinatione, & stabilitate egreditur. In ca-
lore quia pungitius, & mordacius ta-
ctus est mech. particula. nona. colum. 2. in fi-
ne colum. Et nunquam in hac febre sen-
titur interpolatio, sicut in aliis febribus
continuis.

Curatio synochi sumitur ad experientiam
& a Galen. mech. particula. 11. colum. 4. in hęc
verba. Si virtus fuerit fortis in febr. conti-
nua propter hum. & sangu. in putredine exi-
stentem statim flebotomia nisi fatieras stoma-
chi prohibeat, est fienda. Oportet enim
flebotomiam donec cibus digeratur suspen-
di, sed vt plurimum virtutem fortem inue-
nimus in principio huius febr. vbi supra.
Et sequitur ibidem, quod si æger nondum
fuerit. 14. annorum nequaquam est flebo-
tomandus.

Postea purgetur sicut dictum est superius,
in cap. de synocha cum rebus mundificantibus,
& alteretur eius mala complexio, prout
in synocha dictum fuit. Veruntamen de-
bemus addere aliqua aperitiua propter oppi-
lationem malę complexio.

Si autem cum ista febr. haberet hepatis de-
bilitatem, dentur isti troscisci, quos ponit
Auicen. Recip. spod. dram. 3. se. portulacę.
dram. 6. gummi dragaganti. amigda. ana. dra-
3. succi liquir. dram. 7. refrigerant enim, &
confortant stomachum, & hepar. Vel fiat
sic. Recip. ros. rub. dram. 2. berberis. dram.
2. & se. cucu. & melonis, & citruli, & por-
tulacę, & spodij. ana. dram. 1. gummi dra-
gantia. & arab. amigda. ana. dram. se. reu-
barbari croci camphorę. ana. scrop. 1. fiant
troscisci cum aqua end. & dentur cum aqua
hordei. Ex istis potest fieri restauratiuum cum
zuc. & conferua ros. & est, magis gratiosum
ad sumendum, vel detur trialanda. di. dra-
gantum fri. & ista valent in vtraque febr.
sanguinea, quia vtraque similis est in cura,
& c. quasi.

Dięta istorum sit, q. comedant hordeatum,
& auenatum, & ius parue pullę bullitę cum
lactucis, & agresta, & frustis viridis cucurbi
& micam panis ter lotam, & coctam cum la-
cte amigda. & quatuor se. frigidorum com.
vel cum lacte amygd. potest sumere secun-
dum aliquos lentes prius bullitas, & ite-
rum in alia aqua coctas cum per. & paruo
oleo addito aceto, vel succo malorum gra-
natorum, & iure cicerum rub. vel betuco-
rum, & poma, & pira cocta cum zucca. & su-
mat malagranata, & potest vti cucurbi.
bullita cum lacte amigda. Et comedas ali-

aliquando melonem & citrullum. Et utatur end. nouella lactacis. portulacis. Si uenter est constipatus, comedat puretram de maluis & spinargijs & mercuriali paratis cum lacte amigda. vel soluat. cum decoctione prunorum & cassia. & tamarind. & manne granate, vel cum chisteri lenitino. Aquam autem frigidam in synocho non damus nisi postquam signa digestionis apparuerint. mech. particulari nona. quasi col. 7. Et si dolor capitis superuenierit: oleum ros. cum aceto. mixtum capiti superponatur. Et uidelicet oleum viol. & nenufaris auribus immitatur; & similiter naribus olfaciant. Et similiter odorent ros. & sand. & folia salicis & camphor. *Si uigilijs vexantur; fiat dormitorium de succis herbarum frigidarum & huius. semper uia vermicularis solatrum umbilicum ueneris lactuca portulaca papa. & se. eius lentigo aque vnguentum populeon. Ista capiti applicentur in dolore capitis, & in uigilijs nisi esset catarus, vel nisi esset somniculosus paratus ad subeth, vel litargiam. Communis & magis uisatus porus istorum acute febricitantium est aqua hordei. sed in magna estuacione, & angustia sitis damus muscillaginem psilij, & succu granatorum vel aliquem de situpis, & rob. supradictis cum aqua frigidissima confidentes, quod aliqua ex istis remoueant maliriam aque frigide cui commiscantur. Si autem patiantur cardiacam succutatur cum aromaticis frigidis, sicut dictum est in cardiaca, & stomacho, & regioni hepatis superponatur hoc emplastrum. Recip. omnium sand. dram. 3. rosa. rub. farina hordei. ana vnc. i. camphoræ. dram. 2. fiat emplastrum cum aqua ros. Si autem ueniat somnolentia, extremitates fortissime fricentur, & acerum fortissimum cum digitis, & plumis naribus immitatur, & vapor aceri fusi super regulam ardentem sentiantur, & exciteur clamoribus; vel aliter timendo de litargia, vel applicata, quia isti vapores in magna copia ad caput ascendentes ibi causant subeth lithargiam, vel apoplexiam. Et hoc tenet uerum in omni feb. & dolore capitis. Si autem habent sitim intolerabilem, bibant aquam frigidam cum paruo aceto. Et fiant sacculi de se. citoniorum, & de semine psilij, vel sit sic secundum Gordonium. Recipe succi uiz acerbae, succi acetosa, succi lactuce, succi malorum granatorum aceti al. ana vnc. vnam coquantur in lento igne. addatur zuccarum candi zuccari al. al. ana quod suff. fiant pillule, & teneantur sub lingua.*

Declaratio in synocho.

Primo intelligendum est, quod si aliquis patiat. synocham, & à principio non suc-

curatur cum extractione sang. per fiebotomiam aut non. ipsum non expellit per fluxum san. narium, vel aliter, vel si aliter cum refrigerati vis cito non succurratur, vel talis synocha inflatur cito in synocham de putredine san. conuertitur, quia san. propter retentionem humorum, & vaporum, & conculcationem eorum, & defectum expirationis putrescit, & sic de synocha fit synochus, quæ eo feb. grauior, & maioris periculi, & sic intellexit Galen. in 20. de crisi. capitulo 14. & ibi loquitur de synocha, & synocho. Synochus etiam potest generari ibi. absque synocha precedente: quia san. in se potest putrescere cum in se habeat utraque principia putrefactionis, & corruptionis. Secundo notandum, quod Galen. secundo de crisi capitulo 6. quasi in medio ca. dicit sic. Et tibi quidem sufficit, ut cognoscas esse huiusmodi febr. quod generata est, ex eo chole. pura. & quia ipsa est inflammatoria adurens, & quia ipsa est acuta valde. Et propterea quidam medicorum nominauerunt hanc febr. nomine proprio quod est, synochus. hæc ille. Ultra uero hoc Galen. in secundo de crisi in capitulo 14. negat febr. fieri ex sang. dicens sic, quod si ad aliquod membrum currat sang. solus remanens secundum naturam suam, & figuram apostema, & fit nomen illius apostematis apud grecos uocatur phlegmon cuius deriuatio est ab inflammatione, & febr. quæ generatur ex eo est febr. leuis, & salubris, & febr. cui magis assimilatur, est febr. dici eueniens ex apostemate carnis mollis, quæ est in emunctorijs, & locis alijs. hoc enim apostema non fit nisi ex sangu. solo sano, uero sangu. sed declinat ad choleram ubi supra. Et sequitur immediate. Constat ergo, quod genera febr. sang. omnia sunt tria, propterea quia febr. quæ prouenit ex sang. proportionatur ad chole. enim sang. quando putrescit declinat ad chol. ibidem. Et secundum hos sermones negat ibi Galen. febr. fieri ex sang. ipso remanente sang. quamuis in nono particula mech. & nono de ingenio dicat oppositum, ut. finit dictum in principio istius cap. Synochus est, cum putredo sang. est in toto corpore, quia in omnibus partibus corporis, mech. particula. 9. colum. 1. in fine colum. Et sequitur. Dico ergo febr. huius putredinis synochum esse continuam, quandiu putredo permanserit. Putredo enim semper est, in humidis rebus maxime calidis cum dissolutione, vel euentatione caruerint, sicut uidemus in sordine, in stercore, cum una pars aliam conculcauerit. ibidem. Vide ergo quomodo Galen. iniuste accusatur &c.

Non ergo faciamus dubitationem de eo quod Gale. expresse ponit quia se. putridam ponit san. putrido generari secundum ipsum.

Tertio in ordine declarationum queritur si ex san. putrido extra venas potest se. generari. vtrum illa sit continua vel continua, vel interpolata. Et videtur q. interpolata, quia materia putrefacta extra venas facit interpolata, & consequentia patet in phlegmone ex auctori Gal. ut dictum est in declaratione secundo antea.

Pro isto dubio est sciendum secundum Hippo. 4. amph. amph. 64. in quibuscunque feb. quotidie rigores sunt quotidie feb. solvuntur. Et feb. interpolata quæ venit cum rigore quotidie in paroxismo illa feb. soluitur, & annullatur. Et secundum Gale. in com. posito quod illa se. solvatur post paroxysmum, quedam male qualitates retinentur, & remanent intra corpus quæ sunt causa reversionis ipsarum se. & meo iudicio illæ qualitates sunt præcipue in loco minere, in quo est talis caliditas, & dispositio materie ibi veniens iterum conculcatur, & putrefit. Et iterum natura facit paroxysmi. insultum faciend. contra materiam morbi. Et hæc est causa formalis paroxysmi. Causa autem materialis est ipse hu. putrefactus, & materia antecedens in corpore superabundans. Causa vero efficiens paroxysmi est, natura quæ conatur inimicum nocivum cum sua vi expulsiua extra corpus eicere. Causa autem finalis paroxysmi est sanitas quam non semper intendit & hæc est similitudo de furo a quo fuit extractus panis noviter in quo post extractionem panis remanet caliditas, & habirudo ut iterum cito fit caliditas similiter est similitudo vasis in quo per longum tempus acetum fuit conservatum quo perfecte evacuatione si vinum in eo reponatur cito fiet acetum &c.

Secundo nota quod feb. efficitur continua tribus de causis. Prima est sumus materie intra vasa, quia tunc de directo sumi a minera elevari non possunt venas exire immo per rectum repertum canalem ad hepar, & cor effluunt, & elevantur. Secunda causa continuitatis est se. proportio humorum ad putrefactionem ut patet de san. quæ ex utraque qualitate conveniens est, & proportionatus putrefactioni. 9. de inge. Tertia causa continuitatis se. est multitudo materie. Causæ autem interpolationis sunt contraria istis. Cum ergo san. inter omnes humo. sit maioris quantitatis cum etiam sit magis aptus putrefactioni, sequitur q. ad locum minere continue fluit ratio ne quantitatis, & continue putref. rone qualitatis, & sic continua facit se. & hoc de isto dubio. Sans Deo viuo, & vero. quia situs mate-

ria putrefacta extra venas non est eam sufficiens ut se. fiat interpolata sed bene cum paucitate materie, quia si materia esse multa, & putrefactioni parata bene faceret contiuam, ut patet in phlegmone, & in bubonibus fe. pestilentialium.

Quarto queritur quare ex apostemate cholerico fiat se. continua, & non interpolata, cum materia sit extra venas. Ad hoc dicendum q. situs materie intra vasa non est causa essentialis putrefactionis interpolata, quoniam bene iunget, sed multitudo materie, & aptitudo cursus eius, & putrefactionis est causa putrefactionis continua. quod ergo materia cholerica est habulis ad fluxum, & penetrationem ad locum minere, ideo continuam facit putrefactionem. & per consequens feb. sen. & quia in maiori quantitate est ceteris hu. similiter.

Quinto nota, quod in sanguineis se. non est expectanda digestio materie quia san. maxime est digestus, & quia citius cognoscitur quæ aliæ species se.

Sexto sciendum quod corpora calida & humida paratiora sunt ad incurrendum synochum & synocham.

Sexto Ga. Cuicunque dominatur ista consilia secundum calida, & hu. putredo cito festinat in eo. cum etiam in sanitate putrefactioni vicinus sit, quod precipitur ex stuporis putore, & urinz putrefactione, & egestionem atque anhelum: quia natura horum est quasi hirci in horribilitate odoris, propter quam plurimos morbos. 8. de ingenio. c. 12.

De febre quotidiana. *lib. 1. Cap. XI.*

Feb. quotidiana est feb. interpolata affligens omni die ex materia phlegmatica extra venas putrefacta perueniens. Nunc autem sciendum quod fe. quotidiana sicut multæ aliæ egritudines habet causas primitivas antecedentes coniunctas.

Causæ se. quotidianæ primitivæ possunt esse frigiditas & humiditas aeris exterioris, longus usus rerum frigidarum, & humidarum vel est usus fructum recentium, & piscium. Similiter quies & longum otium, & dimissio exercitij consueti. Etiam frequens balneum & dulcis aqua, & frequentis crapula &c.

Causæ antecedentes sunt nimia repletio humorum in corpore præcipue phlegmatis secundum suas species, ut est phlegma vitreum vel album.

Causa coniuncta est phlegma putrefactum extra venas effluens vique ad cor, & inflammatio illius fumi in corde est, causa putrefactionis, & conculcatio, & non euentatio illius phlegmatis secundum suas species.

Signa

Signa istius fe. colliguntur à Gal. 2. de crisi. c. 7. sic. Feb. faciens paroxysmum omni die & cum procedunt cum ea dies tunc quod accidit eis in primis horis paroxysmorum est frigus in eo, quod apparet de corpore, & extremitatibus eius non est rigor verus, & reperitur in pulsa diuersitas, & corrumpitur ordo eius in principio paroxysmorum feb. & remanet de illa diuersitate aliquid in hora augmenti paroxysmi, & non reperitur in eo, velocitas & magnitudo, & fortitudo: sicut in tertiana nec sentit tantam inflammationem nec anhelitus est magnus, & frequens nec tantus appetitus aquae frigidae: sitis est minor quam in ceteris se. Et sequitur. Et vrina à prima die eius est secundum quod est in principio quartanae, nec aeger forsitan sudat in ea in primis diebus, sed in eo quod est post cum prolongatur in ea dies, & tunc fit in ea sudor: haec est sententia Gal. ubi supra. Et sequitur in sententia quod alia particula conueniat, vt quia est complexionis frigida & stetit diu in otio, & quiete & multitudine cibi. Et propter hoc accidit saepe pueris & communiter accidit circa lesio stomachi, vel hepatis & praecessit frequens nauseatina satietas, & tarditas in digestionem & eructationes acetosae inflatio hypochondriorum & color infirmi rendit ad albedinem, tempus est hyems & regio & complexio humida &c. haec est sententia Gal. de crisi. c. quinto.

Si ergo quotidiana sit a phlegmate dulci in primis paroxysmis non venit frigus nec horripilatio nec rigor donec pertransuerint plures paroxysmi. Si sit à phlegmate vitreo, vel acetoso frigus est magnus valde, nec iste rigor nec frigus veniunt ita cito sicut in tertiana sed paulatim & primo in extremitatibus, & postea sicut mixtus. Et sequitur vomitus phlegmaticus in principio paucitas sudoris, sed crisi appropinquante dissoluitur materia, & in omnibus speciebus dolor stomachi, vel splenis & discoloratio faciei & priuatio sitis & cacochimia, & casus appetitus sunt signa communia.

Si fiat à phlegmate falso adest sitis & frigus nimis, rigor similiter, & maior caliditas, & siccitas & sapor in ore falsus. non plangamus ergo papirum recolligendo signa quotidianae. Incipit ergo quotidiana de phlegmate dulci cum paruo frigore in extremis, & pulsus est paruus, & occultus, & vaporosus, & terminatur cum modico sudore, vel nullo in principio, sed propinquante crisi fit sudor nimis & de facili vrina est remissa in principio, & spissa, & aliquando subtilis propter oppillationem, sed appropinquante digestionem materia fit rufa vel subrufa in tantum, quod aliqua

do iudicatur caliditas hepatis, & non est, adest tumor faciei, & color plumbeus, vel pallidus vel liuidus, os habet humidum, & non fuit. In phlegmate vero vitreo maximum frigus sentitur, & in acetoso similiter, nimius tamen quam vitreo, in dulci autem minus omnibus, quia quanto phlegma est frigidius tanto causat maius frigus.

Indica in febr. quotidiana. Primo indicat Gal. de fe. ad Glauc. ca. 9. Amphimerina, id est quotidiana longa est & non sine periculo.

Secundo conualescentes effrenati, vel non bene gubernati ab amphimerina saepissime molestantur, nam debilitas digestiue, & non debita vel immoderata cibi, & potest assumptio est, phlegmatis causa superflui augmentandi.

Tertio adolescentem quippe cholepticum & siccum in complexione nunquam vidi caput huiusmodi fe. primo de fe. ad Glauc. c. 7.

Quarto vniuersum corpus in huiusmodi fe. scilicet quotidianis inuenies plenum indigestis huiusmodi.

Quinto indicabis tempus durationis paroxysmi, & interpolationis, & secundum quod materia est magis, vel minus compacta, & viscosa, quae cognoscitur per tarda signa digestionis in vrina. Et communiter dicitur, quod durat paroxysmus per 18. horas, & interponat 6. secundum viaticum.

Sexto iudicabis cognita specie febr. principium certitudinis istius fe. est usque ad 48. dies, & terminus sit eradicationis usque ad 64. dies.

Septimo indicatur in li. vocabulorum, si venerit vomitus in principio accessionis, & sudor multus in fine eius, cito egritudo terminabitur, quia obedientia materiae, & virtutis fortitudo iudicantur.

Octauo abbreviatio, & alleuiatio paroxysmorum, & suorum temporum iudicant illam esse citè terminationis & sanationis.

Nono si saepe fiant sternutationes post istarum egritudinis sunt bona signa, quia indicant fortitudinem expulsiuam.

Decimo iudicamus materiam incipi digerere per mitigationem accedentium, & per mutationem coloris vrinae, & hypostasin eius, & per gurgulationem in intestinis, & instillationem, & per abominationem.

Vndecimo si isti in declinatione patiuntur aliquam inflammationem pedum, & tibiarum non miseris si alia bona signa apparent, sed fac ipsum abstinere à nimietate cibi, & potus, & fac ipsum sudare & confortare digestiuam.

Duodecimo breuitas paroxysmorum, & multus sudor breuitatem egritudinis denotant,

tiant, quia paucitas materię, & obedientia eius denotatur. Curatio vniuersalis feb. quotis. Et primo cas. vniuersales permittantur.

Primus est Gal. de febr. ad Glauco, cap. 12. Vniuersum tibi dietę regimen, calidum incisuum sit.

Secundus si amphimerinam patientes cum difficultate euomant, subtiliatione indigent humorum, qui stomacho sunt inmiscati, vel adherentes.

Tertius competenter in principio paroxifmotum istius febr. vomitus prouocetur, vt materię antecedentis & coniunctę quantitas aliqua extirpetur.

Quartus incisio, & subtiliatio materię, & consequens euacuatio in hac egritudine vsque ad finem continuandam intra tamen vnā horam euacuationis, & aliam morā sufficiens, & regimen cōferēs sunt a medico expectanda.

Quintus omnes species istius febr. conueniunt in tribus, in principio scilicet in molificatione naturę moderata, & in promocatione vomitus, & in administratione retum subtilianij & incidentij & diureticorum. Auic. in c. proprio in prima quart.

Sextus, quoniam debilitas digestiue stomachi & hepatis est causa phlegmę multiplicandi. Ideo stomachum & hepar & splenem conuenienter aperire & confortare.

Septimus secundum elongationem, & vel appropinquationem status a principio egrit. secundum hoc eger dijudicandus & dietandus, & magis vel minus de cibo ministrandum.

Octauus, nunquam in principijs paroxifmi dormire permittantur, nec in statu. ne expulsio materię impediatur. In declinatione autē si famescēdo dormiant, iuuat eos virtute hoc tolerante, quia tunc digestio, & consumptio grossorum chilorum celebratur.

Nonis, nullus presumat cibare pati, quoti dianam durante paroxifmo, sed post, vel ante per magnam pausam, nisi virtus multum fuerit defectiua. Gal. in passio. lib. 6.

Cura particularis fe. quotis. Et primo quādo est a phlegmate dulci naturali, quia tale phlegma san. est imperfectē decoctus. Et sciatur per saporem dulcē in ore & per alia signa supra dicta. & tunc iuxta tenorem 4. cano. digeratur materia sic. Reci. rad. brusci, sparagi, graminis apij fen. cicoreę pet. ana. vnc. 2. conquassata in aceto temperentur per sex horas. si non adest tussis, tunc addatur end. scariolę politrici, adianthos, capilli veneris, mentę ab sinthij ana. vnc. 1. & s. end. & scariolę se. brusci & sparagi ana. vnc. 1. ros. ru. florum boraginis & buglossę, corticis citri, & coriandri preparati ana. dram. 3. zuchari lib. 2. fit sir-

pus, & detur cum aqua cicerum rubeorum, & spicenardi, incidit enim materias grossas, & confortat stomachum & cor, & alterat qualitatē febrilem. Et poterit addere scolopēdriam camedreos, & petro. macedo. & similia. potest etiam digeri materia cum sirupo acetoso, in quo bulliatur hyssopus, vel sumatur cum decoctione hyssopi, & cicerum ru. vel cum oximelle diuretico. postea purgetur sic. Recip. polipodij querc. recentis & conquassati. vnc. 1. florum boraginis & buglossę ana. vnc. 5. pass. mund. ab arill. vnc. 1. & se. fiat decoctio, & in colatura temperentur corticis mirab. chiebul. vnc. 1. in mane fricentur fortiter & colentur, & offeratur colatura. Ista enim decoctio euacuat phlegma quod est antecedens & cōiuncta causa fe. quoti. & post stomachum corroboratum & confortatum dimittunt. vel in dicta decoctione dissoluatur pul. diaturbith. dram. 3. agarici dra. 1. fiat potus. Et ista iterentur, in principio tamen potest fieri clistere, & medicina laxatiua vel lenitiua cum cassia. quę secundo dario purgat phlegma, & cum pul. diaturbith. Nos vero interdum damus eis iuxta tenorem 6. can. sirupum de absinthio, vel decoctionem absinthij & mentę cum virgul. graminis & radice fen. & an. vel si est multū delicatus fiat iulep ex aquis distillatis mentę & absinthij & florum sambuci, & radice fen. & petro. & apij cū zuccaro. deinde fit bolus deauratus ex diacarta. vnc. 5. & dram. 1. & s. pul. diaturbith. excepto iure de magis vel minus. Raro ministramus pill. quia materia est in stomacho & non indigemus longa attractione.

Sed iuxta tenorem 3. can. prouocetur vomitus tali modo. Rec. oximel squilliticę aquę rafa. ana. vn. 1. tepidum offeratur. & post prouocetur vomitus cum pluma, alleuiat enim totum paroxifmum & materiam antecedentem & coniunctam euacuat. Aliqui enim dant rotulas rasani gall. & post duas horas mouent cū pluma & oleo. Si infirmus sentit inflationem, & gurgulationem intestinorum, & abominationem & nauseam stomachi, signa sunt subtiliationis materię, & tunc medicina laxatiua per inferius vel vomitiua est ministranda, & tunc securē potest dari catarticum aliquod vel pill. stomachicę aliquāliter acuatę. Phlegma salsum si fuerit in causa istius febr. quoti. digeratur materia cum oxizaccā composita & aqua calida, quia secundum omnes aqua calida habet magnam proprietatem in phlegmate salso in lauando stomachum & temperando salsedinem eius. Et quia hæc species phlegmatis componitur ex phlegmate dulci, & ex cholera, ideo indiget medicina digestiua & euacuatua vtrinque humoris. digeratur igitur ista cum sirupo de hyssopo. & oxizacca

simplici. Et euacuatur cum medicina composita ex mirab. citrini. & che. vel indis. & eupatorio & absinthio, & vuis pallsis, & prunis & cassia. & pulvere diaturbith, agarico in pil. vel in colatura. Et si istud phlegma reperitur esse circa hepār, quod scitur ex pruritui & aliquali scabie. Danda sunt diuretica ad prouocandum vrinam & purgetur cum polipodio & epithimo, & senē coctis in sero caprino, & post confortetur stomachus cum trociscis de spodio, & de sand. & de camphora. *Phlegma vero acetosum* cognoscitur per acetosum saporem in ore, & per oxirismiam frequentem, & per eructuationes acetosas, & quia melācolia habet partem cum phlegmate in ista specie, ideo in digestiuis, & enacuatuius miscentur medicina eis ambabus appropriatē. similiter in phlegmate vitreo, & iste duar species phlegmatis sunt frigidiore, & magis compacta, ideo sunt ad digestionem, & eradicationem inobedientiores, & ad curandum tardiores, & sunt paroxysmi earum longiores & frigidiore. ideo indigent fortioribus digestiuis & euacuatuius. Digeratur ergo materia cum oximelle diuretico, vel squillitico, & sirupo de fumo terrar, vel oxizaccara, sed in apozimate cum quo ista sumuntur ponantur aromatica, vt spice. galangis & ciperus, vel pro digestio detur ptisana cum modico pipere, deinde prouocetur vomitus cum se. rafa. & atriplicis vel cum rafano lardato cum elleboro alabiedrio elleboro, vel cum electua facto ex succo squillar & zuccaro, & confortetur hepar, & stomachus cum trociscis berberis, & de absinthio, & potest interdum dari coctura de radicibus apij cum aqua distillationis absinthij. Et purgetur cum diasenē, & diaturbith, vel cum polipodio, & senē, & epithimo, vel cum turbith, & fumo terre, vel cum chebul. & indi. & hierepigra, & hierarufina acuatīs cum pulpa colloquintide, & sal gemmę & cum pillulz stomaticis similiter acuatīs, quę omnia dimitto medico sapienti particulariter operanti. *Hic nota secundum Gerardum Crem.* quod si tres guttae succi mercuriali calidi in aurem vel nares dextram mittantur, statim remouet tipum, probatum est, vt dicit in principio paroxysmi ponantur pedes in aqua calida, in qua sint coctę herbe calide. Et fiant vnguenta & olea calida cum stasilagria, & picro. & dauco, & castoreo ad vngendum latera, & dorsum, vbi sentiunt dolorem, & stomachus intus & exterius cum absinthio, & menta, & hisopo, & calamento cum mastice confortetur post perfectam euacuationem per vomitū vel secessum, &c. sirupus etiam de menta videlicet in isto casu, similiter sirupus de absinthio.

Dietā. Primo caueant ab omni repletionē cibi & potus, & a cibis multum humidis, vt sunt pisces recentes, & omnes fructus recentes huiusmodi, & lac, & sit tota dieta sicut primis can. inclinet ad in scissionem materię ideo competenter ministrat ius cicero cum betur eorum cum petro, & spice, & paruo oleo, & sale, & ius parue pullę cum petro, & hylopo, & croco. Et de herbis vratur menta, aneto, bora. fen. petro. apio. Et concedimus aliquando de pulla sic parata & extremitates capreret. Et damus aliquando vinum subtile bñ limphatum. Et ista concedimus quando timemus debilitatem virtutis; non intret balneum nisi post signa digestionis. Ingrossatio autem dietę, & eius subtiliatio relinquatur industriae medici quo operatur in arte. Si vrina aliquando appareret rufa, vel subrufa, & virtus est fortis, extrahatur de san. cum mensura, dum tamen euacuatur a membro lęso. Dicit Gal. in passio. q. in ista febr. dandi sunt cibi calidi, sicut est piper, & ruta, & anisum. Et iubet dari vinum subtile al. coloris. In accessione nihil dandum est de cibo nec de potu nisi in fit accessionis aquam hordei cum gramine & rad. petro. Et ad comedendum detur pullus coctus cum petro, & croco. Et secundum Galenum ponatur ibi piper & cimi. Et docet ibi Gal. dare pedes lactantium quadrupedum coctos cum acero, & pule. &c. Vinum ergo non detur stomacho ieiuno, quia quod lędit sanos, lędit infirmos. Comedat auenatum hordeatum cum lacte amigd. Multa particularia occurrunt in passionibus, & diuersi appetitus veniunt, ideo desideratis, & appetitis aliquid est patienti offerendum secundum industriam, &c.

Declaratio in quotidiana. Primo sciendum qđ a principio vrina est al. propter phlegmatis frigiditatem, & est spissa propter eius humiditatem. Sed quando materia incipit digerē efficiē rufa aut subrufa cum substantia mediocriter tenui aut pingui propterea, quia natura conuertit illud in digerendo ad naturam san. & aliqui de hu. & superfluitatibus digestionis cum vrina extrahuntur. *Secundo nota,* quod dictum fuit in signis quod pulsus est moll. & latus, & debilis, & diuersus, vnde dico, quod mollis propter humiditatem, latus propter extensionem arterię mollificatę quę facilius extenditur propter nimiam humiditatem, & est tardus propter paruitatem caloris, & est diuersus propterea quia aliquando non dominatur super materiam, & tunc pulsus est fortis, aliquando materia est magnę resistentię, & natura tunc non potest dominari, & tunc pulsus est debilis, & sic fit diuersus. *Tertio intelligendum,* quod sc. quotidiana

quæ à Gal. vocatur amphimerina non dicitur quotidiana ex eo, quia quotidie affligat; sed ideo quia generatur de phlegmate putrefacto extra vasa, quia tertiana duplex affligit etiam omni die. sed tamen propter hoc non dicitur quotidiana, sed duplex tertiana. nuncupatur. Dicitur autem à Gal. vbi supra amphimera ab am. quod est circum & meros, quod est dies, eo, quod in circumeundo omnibus diebus suos reitet inultus, vt dicit Gerardus. de cremo.

Quarto intelligendum est secundum, quod dicitur in 7. li. pantech. quod paroxysmi quotidianæ, & aliarum fe. in quibusdam sunt longi & in alijs breues; & hoc accidit propter vnum trium. Prima causa est natura materie nam si materia est multa grossa, & viscosa, & frigida fe. & paroxysmi eius erunt longiores, si autem calidior & subtilior minus viscosa, tota fe. & paroxysmi eius sunt breuiores. Secunda causa est fortitudo, vel debilitas virtutis: virtus. n. fortis citius digerit, & expellit debilis autem tardius. Tertia causa est figura corporis. si corpus est spissum & viscosum, & oppilatum, & pori eius sunt clausi, & oppilati tota fe. & eius paroxysmi sunt longiores. Et si corpus est subtile & rarum, & pori eius sunt aperti tota fe. & eius paroxysmi erunt breuiores, quia materia cito exhalatur.

Quinto sciendum quod quando fe. quoti- sit a phlegmate acetoso quamvis sit frigidum tamen autores iubent dare troiscos de ros. & de berberis ad confortationem stomachi, & de hepatis. & ad refrigerandum complexionem febrilem. Sed quia sunt frigidi ideo debent dari cum aliqua decoctione aperitiua, & calida vt est decoctio anisi maræ & carui ad aperiendum. Et troisci dantur ad temperandum calorem fe. & medicinarum calidarum quæ continue ministrantur, pōt quod dantur intelligi quod nunquam in ista fe. nec in alia res calida per se sine commixtione frigidorum debent dari vt materia fe. vel eius mala qualitas non augmentetur. Dantur etiam isti troisci, vt dictum est ad confortandum stomachum, & hepar quæ multum sunt debilitata propter vomitum, & purgationes, vt ipsa confortent, & stipticent. Et ista ministranda sunt post digestionem & purgationem materie.

Sexto sciendum, quod ex istis duabus speciebus phlegmatis, scilicet vitrei, & acetosi possunt generari alie febr. quæ ponuntur ab aliquibus doctoribus. scilicet epiala, & liparia. Vnde epiala dicitur ab epi, quod est supra, & alior quod est frigus quasi frigus desuper id est, in partibus exterioribus. Ideo dicitur, q epialia est febr. in qua exteriora frigescent, & caliditas interiorum nimia sentitur, & hoc est.

quia ad partes exteriores mittitur phlegma vitreum & ibi remanet exassum super membra sensibilia, & sparsum tamen pro tunc nondum est putrefactum, nec super calefactum ideo infrigidat multum membra exteriora. Et fit calor febris, quæ est ab alia materia phlegmatica interiori putrefacta per iuxta positionem sui contrarij augetur, & cremet partes interiores, & non potest calefacere exteriores nisi post magnum tempus: ideo dicitur q paroxysmus eius durat quasi per 24. horas. Et dicunt aliqui quod vt plurimum conuertitur in quartanam; vt paroxysmus tantum durat quia materia est multa & compacta, & grossa, & stiptica, & virtus debilis sopita. Et ppter hoc videtur continua quia quasi vnum paroxysmum attingit diu, & tamen non est continua. Et est alia species istius febr. phlegmaticæ quæ vocatur liparia & eius interpretatio est epiala conuersa. Et in ista frigus interiorum concutitur & exteriora calescunt propterea, quia cholera, vel phlegma salsum expanditur supra membra exteriora & ibi putrefit & interiorum est vitreum quod opus magnum spacium putrefit & expanditur exterius, & de hoc sunt compositi versus. Semper in epiala frigescent exteriora. Interiora calent liparia vertitur. Et præter has fe. scribitur in pantech. lib. 8. de feb. compositis & causis, & significationibus earum quod est vna fe. flauica in qua sentitur calor nimis in corporibus interioribus, & de illa materia sic putrefacta cito ascendit fumus acutissimus in corporibus exterioribus. Et hoc fit quia hæc materia non est viscosa, & sic filijs est calor in interioribus & exterioribus, & hæc fe. vocatur chimoros, & iste calor durat ad curationem paroxysmi, & venit omni die, & ibidem ait hoc parum, quod est quæda fe. in qua sentit infirmus calorem, & frigida rem simul in corporis interioribus, & hoc contingit quando fe. nascitur ex putredine phlegmatis vitrei. Calor enim iste fe. est, propter putrefactionem flatus. Frigus enim est extra aliqua parte flatus nondum putrefacti, & vocatur hæc fe. hyselus, & interpretatur hyens tonga, vnde sciendum quod licet Constan. imponat sibi quod ipse fecit pantech. tamen fallitum est, quia Ras. composuit ipsum sicut ego reperi in quodam antiquissimo li. vbi expresse ponitur in principio. Incipit liber Ras. philosophi, veruntamen Constan. mutauit titulum & prohemium hisaach. etiam christianus composuit viaticum & non Constan. vt faceret Gerardus cremo. super eundem librum. Percant ergo latrones quæ metunt, & non seminauerunt & ponunt falcem in messia aliena. Septimo intelligendum, quod sicut dictum fuit in principio in signis datis à Gal. in secun-

unde erit quod in primis diebus huius fe-
 ger non sudat, & causa est materia nondum
 digesta, nec est habilis nec subtilis, ut exeat
 per sudorem. Sed cum elongantur in ea dies in
 quibus natura facit, & digerit & subtiliat di-
 ctam materiam & grossam, & illa efficitur di-
 gestina & subtilis & habilis expulsionem, tunc na-
 tura resoluit illam materiam in fumum quam
 mittit ad cutem, & ibi conuersa in vaporem
 aqueum in sudore, per poros cutis exterioris
 emittitur, unde ad sudorem tria requiruntur.
 Primum est aperio pororum. Secundum est
 mollicies cutis. Tertium est fortis natura po-
 tens digerere, & resoluerere illam materiam &
 ipsam ad superficiem cutis expellere. Constat
 autem quod in primis diebus huius fe, ista no-
 existunt, ideo sudor in principio non exit, ut
 primo dictum est.

Octauo dubitatur si vinum competat in quo-
 tidiana cum sit fe. & omnis fe. est morbus cali-
 ditas, & siccus, secundo de morbo. c. 1. Si er-
 go datur vinum, augmentabitur fe. quia omne
 simile additum suo simili facit illud maius, &
 facit ipsum furere. 2. amph. c. 1. 4. ibi. In mor-
 bis minus periclitantur aegrotantes, &c. Ad
 hoc dicendum, q. vinum competit in hac fe. si
 cut dicit Petrus hispanus quem in suis clarifi-
 cationibus sequitur Gordonius, unde fe. quo-
 tidiana est a phlegmate falso non ita de directo
 competit quia digerit, & aperit, & prouocat
 urinam, & cum hoc quod potius est conser-
 uat naturam dummodo sit album vel clarum
 debite per se vel per commixtionem aquae, &
 ibi etiam iubet dare cibos calidos, & vinum al-
 & subtile, & contradicit ibi medicis indoctis,
 quae dant cibos frigidos in hoc. & tales cre-
 dunt extinguere fe. & extinguunt spiraculum
 vitae. Gal. ubi supra. Et responde mihi quare
 non daretur vinum, quia piper & cuminum
 & ruta eis conceduntur, & multo magis, vinum
 cum sit amabilius naturae.

Nono dubitatur de vomitu utrum compe-
 tit, & videtur q. non, quia quando aggritudo
 materia eius est super diafragma tunc compe-
 tit vomitus. Et quando est infra diafragma co-
 petit pharmacia quae ducat per inferius, sed ma-
 teria quotidiana est infra diafragma quia in
 stomacho, ergo &c. consequentia est bona, &
 antecedens pro maiori est Hippo. 4. ampho.
 ampho. 18. ibi. Supra diafragma dolores sur-
 sum, pharmacia inferius indigere significat,
 ubi supra. patet minor de fe. & per omnes au-
 thores. Secundo probatur, quod non compe-
 tit saltem in principio quia digesta medica-
 ri & non mouere cruda. Ad hoc dicendum, q.
 vomitus competit in quotidiana. Primo quia
 quia submouet, & subleuat materiam, quae
 multum est inuiscata & tenax, Secundo quia

partem eius euacuat & minorat eius quantita-
 tem quapropter alleniat paroxysmum. Tertio
 quia stomachus multum granatur in hac pas-
 sione, ut dicit Gal. 1. de fe. ad Glauc. quia mate-
 ria coniuncta fe. quot. pro maiori parte in sto-
 macho continetur, & ad ipsum finit ideo expe-
 dit ut ipse stomacho alleuetur, ne superueniens
 cibis in eo corrumpatur cum illa materia mix-
 tus, quarto quia ad expellendum est, breuior
 quam si per inferius purgaretur. Et tunc ad
 primam rationem dico quod ampho. intelli-
 gitur quando non adest fe. sicut dicit Gale. in
 com. in fine eius. Ad secundam, quando arguitur
 quod materia nondum est digesta dico quam-
 vis in principio materia non sit digesta, tamen
 vomitus iuuat ad digestionem illam mouen-
 do &c.

Nono Bern. de Gordonio magister bonus
 bene loquitur de 4. humoribus in quatuor
 partibus diei naturalis, & hoc secundum in-
 fluentiam superiorum & inferiorum bene di-
 uidendo diem naturalem in 24. horas. Secun-
 dum hoc regnant 4. humores quilibet per 6.
 horas & quilibet in suis horis magis mouetur.
 Vnde sanguis regnat in ultimis tribus horis
 noctis, & in primis tribus horis diei sole orien-
 te sequitur motum solis qui est in oriente, &
 hoc facit ratione conformitatis, quia dignior
 humor & dignior planatus, & hoc de radice
 superiori de radice inferiori, quia natura in
 nocte generat sanguinem propter fortio-
 rem digestionem & mouet ipsum in illa hora ut à su-
 perfluis mundetur. Cholera autem mouetur
 in 6. horis sequentibus sequens, secundam qua-
 dram motus solis quae est calida & sicca & hoc
 quantum ad radicem superiorem, ratione au-
 tem radice inferioris, tunc mouetur, ut non
 inflamment sanguinem. Melancholia autem
 mouetur in alijs 6. horis sequentibus quae est
 quadra frigida & sicca ratione radice superio-
 ris ut per suum motum caliditas & humiditas
 san. temperetur & purgetur a superfluitatibus
 melancholicis. Plegma vero mouetur per alias
 sex horas sequentes quae est quadra frigida, &
 humida ratione conformitatis. Et ut tunc san-
 guis à superfluitatibus phlegmaticis mundificetur.
 Et istae horae sunt inaequales secundum ascen-
 sionem signorum. Quilibet enim hora durat
 tantum quantum medietas signi vnius cuiusli-
 bet ascendit vel oritur super orizontem, & de
 hoc stant versus. Tres lucis primas, tres no-
 ctis tenet & imas Sanguis, sed cholerae sex con-
 uenit esse sequentes. Ater reliquas humor
 sex occupat horas. Postremis regnat sic phleg-
 ma sequentibus horis.

Decimo intelligendum quod phlegma quod
 generatur ex nimia frigiditate acidum efficitur,
 quod autem ex nimio calore salum fit. Si

autem generetur a paruo calore dulce fit aut si ne sapore. 3. ampho. com. 13. ibi. Si vero hyes austrina fuerit.

De quartana. Cap. XII.

Quartana est febr. interpolata de melancholia. Extra vasa putrefacta proueniens paroxysmum de quarto in quartum diem faciens. Ista diffinitio trahitur ex dictis Gal. 2. de differentiis fe. Circa istam materiam intelligendum vt prius tactum est in c. r. istius. 7. li. quod melancholia quandoque putrescit intra venas, & facit fe. continuam & hoc accidit raro, vt dicit Auic. in prima. 4. c. de quartana. Et aliquando melancholia putrescit extra venas & facit inter interpolatam. Et ista potest subdiuidi, quia quedam generatur de melancholia naturali, quae est proprie fe. san. & illa melancholia naturalis generatur, quando sanguis, & alij hu. generantur. Aliquando ista melancholia a quacalis quartana generatur est melancholia adusta, quae facta est per adustionem humaliorum, vt dicit Gal. 2. de crisi. quod quando san. putrescit de subtiliori parte eius efficitur melancholia. Et praeter hoc quedam quartana fit de melancholia, quae magis trahit ad naturam san. Alia est, quae trahit ad naturam cholerae, & sic de alijs.

Cause fe. quartanae sunt omnia quae iuuant & multiplicat in corpore melancholiam siue illa sit naturalis, scilicet fe. & colametum san. & aliorum hu. siue illa melancholia veniat per adustionem san. & aliorum hu. Exemplum primi sicut sunt longus vsus, & comestio rerum multiplicantium hu. melancholicum. Et primo de pane. panis militij, & panis opirus, & panis arsus lentes fabae, & substantia omnium leguminum castaneae & caseus salitius & antiqui pisces salsi & desicati. de carnibus autem est caro, bouina, leporina, ceruina & omnis caro salsa, effumata, caules &c. Exemplum secundi sicut est vsus rerum adurentium san. vt sunt allia piper nasturtium sinapi forte vinum nectar aqua ardens, omnes species herbe, & grana excellenter calida & praecipue nimis labor, vt quando longa itineratio in tempore aestiuo & in diebus canicularibus. similiter longa ira frequens & continuata nimia tristitia similiter longe fe. praecedentes in quibus san. & alij hu. aduruntur & putrescunt per magnum calorem conuertuntur in melancholiam, quae non euacuatur immo remanet in corpore, & putrescit, & facit quartanam. similiter passionis plenae iuuant in vtraque causa, vt est oppilatio apostema durities & similia, & ad hoc iuuat complexio radicalis, & fluens melancholica, quae ad hoc est inclinata, vt generet melancholiam. similiter tempus autumnale, & alia par-

ticularia tendentia ad frigiditatem, & siccitatem &c.

Signa quartanae sumuntur a rebus naturalibus, & a rebus non naturalibus, & a rebus contra naturam, vt dicit Costan. in pantechn. & implicite. Auic. in c. proprio. Ex rebus naturalibus vt est, melancholica complexionis male coloratus colore citrino vel cinericio vel fusco vel plumbeo & membra paucae carnis, & macra, & nigra in colore.

Sumuntur etiam a rebus non naturalibus quia fuit vsus cibis quorum natura est generare melancholiam sicut sunt caules, & cauleus antiquus, & carnes salsae, & effumatae, omnes species leguminum caro leporina, & ceruina vel quia fuit vsus rebus sanguinem adurentibus vt nimis labor tempore aestiuo, longus vsus specierum, s. piperis zinziberi, & similiter herbarum vel seminum calidorum vt alliorum sinapi nasturtij erucae & similibus, vel quia diu stetit in frequenti ira & tristitia, vel quia fuit in multis & frequentibus vigilijs, vel quia praecesserunt fe. longe, & erraticae. omnia ista iuuant ad multiplicationem melancholiae, & quando febr. periodica adest, & ista in maiori parte praecesserunt, significatur quod illa est quartana.

Sumuntur etiam a rebus contra naturam primo a morbo, quia affligit de quarto in quartum, & est morbus frigidus, & siccus quo ad materiam saltem antecedentem quamuis calidam propter putrefactionem. Sumuntur etiam signa ab accidentibus morbi, quia quartanae incipit cum frigore paucio deinde augmentatur. frigus deinde minoratur prope statum paroxysmi sicut fit in febr. phlegmatica, sicut dicit Auic. Deinde expanditur calor per totum corpus cum horripilatione, non tamen est vehemens calor sicut in tertiana & est maior quam in quotidiana. Et dicit Auic. quod non comprehendit totum corpus, sed est cum horripilatione mixta cum frigore & aliquantulo dolore, quasi frangantur ossa. Et ista sunt propter grossitatem materiae, & frigus eius. Et venit aliquando talis compressio & confrictio, quod dentes strident. Pulsus est in principio paruus, & durus & tardus, & occultus: ac si esset pulsus senis. Vrina in principio est alba declinans ad viriditatem cum priuatione digestionis, & post principium diuersificatur vrina secundum quod diuersificatur generatio melancholiae ex diuersis hum. vt dicit Auic. Et in quartana reperitur etiam arida, & sicca cum colore plumbeo, & nigro.

Si melancholia quae facit quartanam sita san. adusto antecedunt signa san. & forte fe. sanguinea praecesserunt, & vrina est ru. & adest conuenientia particularium: vt est aetas complexio tempus &c. & pulsus est plenus magnus.

Si a phlegmate adusto. paroxysmi diutius durant, & accidit eis maior frigus & longius, & sudor tardior & vrina grossior, & durities in pulsu minor, & venit talis quartana post feb. phlegmaticas. Si est a cho. adusta pulsus est velocior, & paroxysmus incipit cum horripilatione, & frigore in carne, & cum sudore in fine paroxysmi. Aduenit eis ira, & furor & forte præcesserunt feb. cholericæ. Si a melancholia, signa iam sunt dicta.

Iudicia in quartana. Primum iudicium est. Auic. in prima. 4. in c. proprio. Raro durat quartana quin in splene sit oppilatio aut dolor aut durities. Secundo iudicat Hipp. Estiue quartanæ vt multum sunt breues, autumnales vero longæ maxime quæ ad hyemem coniunguntur. 2. amph. amp. 25.

Tertio febribus inordinate vagantibus quartanæ futuræ sunt certius tamen circa autumnum. 3. progno. cap. 29.

Quarto quartana quæ non venit cum apostemate splenis vel aliqua passione eius, non ita longa nec ita mala sicut si veniret cum eis, quia talis perducit ægrum ad hydropisim.

Quinto prognosticat Aui. quartana quando est salua. i. quando est sine apostemate, & sine alia ægritudine, & bene gubernatur, non est periculosa, & liberat ægrum a malis ægri. & multis: sicut est melancholia, epilepsia, & spasmus: quia materia à qua generatur est sicca, & quantum est de se, est egritudo sine periculo quamuis longa sit.

Sexto iudicat Aui. quando in quartana non accidit error: non durat ultra vnum annum: quia sicut egræ acute iudicantur per motum lune, sic & cronicæ per motum solis. Et aliquando durat vsque ad duodecim annos quando male gubernantur, aliquando per duos, aliquando per vnum cum dimidio.

Septimo si quartana bene gubernetur, & regatur in autumno & hyeme cum bona diæta, & purgationibus, & digestiuis debitis, & splenis, hepatis, & stomachi obseruatione in tempore veris frequenter curatur ante finem maij.

Octauo quartana quando fit ex melancholia ex sanguine generata, est breuioris spacij & citioris cure deinde illam quæ fit ex cho. deinde phlegmate: deinde melancholia, & hoc dicit Bern. de Gord.

Nono iudicat secundum Raf. & est considerandum an fe. & eius accidentia & suæ accessiones longitudo minoretur & quæ currunt in ea, & hoc bonum est. hæc ille. 10. ad alman. c. de quartana.

Decimo cognosces, & indicabis statim egræ per fortissima accidentia, & deteriora cum status sit fortius tempus omnibus temporibus morbi. Haly. de reg. dispositione. c. proprio.

Vndecimo iudicabis digestionem materiarum istius, & alterius morbi per mitigationem paroxysmorum, & minorationem eorum. Haly. ibidem.

Duodecimo iudicat Gal. in primo de fe. ad Glau. c. 8. sic iter deficientes. i. interpolatas acutissima, mitissima est tertiana: longissima vero, & sine periculo quantum in seipsa est quartana vbi. 8.

Decimotertio iudicium sic Hippo. in 4. aph. amph. 30. & extenditur ad omnem feb. interpolatam. Quibuscunque exacerbationes sunt, vel paroxysmi si in qua hora febr. dimiserit, in crastinum eadem hora accipiat descripta id est longa.

Decimoquarto est Hipp. sic. A quartanis habiti non valde a spasmo apprehenduntur, si vero apprehendantur & superuenit quartana, soluuntur. 5. amph. amph. 7.

Curatio quartanæ. Et primo aliqui casus. vniuersales curatiui permittantur, in quibus in generali cura quartanæ continetur.

Primus est Haly. in 3. de reg. dispositione, & est etiam Aui. in prima. 4. In quartana si vides in pulsu magnitudinem, & velocitatem non multam & vrina est ru. grossa, & habitudo plena, & ætas iuuenilis acceleranda est sanguinis minutio de vena basilica aut de splenetica de manu sinistra. Et si sang. exit ru. & clarus, statim claudere venam, & si niger aut turbidus: aufer de san. secundum mensuram necessitatis.

Secundus est Haly. ibidem. Nisi sang. multum videatur abundare, nullo flebotomia est attendenda propter causam supradictam.

Tertius nullum medicamentum forte laxatiuum in principio quartanario est offerendum, quia talis hu. melancholicus diu remanet crudus, & propter suam grossitatem, & duritiem in principio non poterit euacuari, sed bonum, & subtile euacuabitur, & grossum, & indigestum remanebit, & sic fe. magis confortabitur, de clystere lenitio & minoratiua purgatione non negligendo.

Quartus est Haly. ibidem. Taliter ingenitum est in quartana cum cibis, & potibus, & herbis, & fructibus aliquibus, quod venter declinet ad molliciem. Et constipatio cum istis euitetur vel saltem cum molliuio clysteri.

Quintus est Haly. ibid. prohibe quartanarios a cibo in hora accessione, vt naturam in resistendo morbo potius occupetur.

Sextus sequitur immediate. In quartana non oportet vti balneis, nisi cum status eius aduenerit, & declinatio inceperit.

Septimus tota die quartanarijs contrarietur generationi cholere nigra.

Octauus ab omnibus autumnalibus fructibus, & alijs recentibus quartanarij sunt prohibendi.

Nonus caueant ab aere frigido, & in aere calido, vel temperato sit habitatio eorum.

2. 1. 1.

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

adventi: 1916 17

S can't make it

END OF PAGE 2

ag. & mercuria

gette, & print

Postquam autem fuerit purgatus; & acci-

Et iterum purgabitur cum hac solamnia quæ

Et iterum purgetur cum hac colatura. quæ
purgat cho. ni. Rec. pas. abarill. mund. itineab
linthij. florum borag. polipod. quercet. epib.
anili

an. ana. unc. s. fiat decoctio in sebo caprino & in colatura temperetur corticis mirab. emblicorum & belliricorum ana. unc. i. per totā noctem, & fricentur fortiter, & colentur, & colatura offeratur. Et est intelligendum quod quando in vrina apparet rubedo tunc cum digestiuis dicunt ministrari aliqua frigida simul cum euacuatuiis vt end. scariola scolopendria & 4. se. frigida maiora & minora sand. & ros. & similia, & hoc ad reprimendum calorem rerum calidarum pro electuarijs detur tria san. rosata nouella, & zucarū ros. In causa calida in viatico iubetur dari apozima de radicibus apertiuis cum sirupo de absinthio, & iubetur materia purgari cum vomitu. Comedat tamē ante vomitus prouocationem per tres horas rotas rafa. gall. temperatas in melle. & post cum pluma, & oleo vomitus prouocetur. & in fine paroxysmi si est possibile sudor prouocetur. Et ego habui in mea iuuentute se. quartanam presentiens paroxysmum euenire intrabam lectum & pannos calidos aliquādo regulam calidam pedibus faciebam applicare aliquando cucurbitam plenam aqua calida, vt dāna frigoris euitarem, & sic transibat frigus & postea veniebat calor, & post. sudor in fine paroxysmi, & aliquando prouocari vomitum in principio paroxysmi, & ante principium post acceptationem cibi, & sic continuando dimisit me se. in fine septembris, quæ inceperat in vigilia sancti Laurentij immediate præcedentis, nullos tamen fructus recentes comedi. Laus Deo viuo, & vero. Dicit Auic. auctoritate Gal. sic Gal. inquit sanauit plurimam gentem a quartana sic. dedi eis in potu post digestionem solutiuum. deinde dedi eis in potu succum absinthij, & inde dedi eis triacam. Et dico quod assa, & piper singularia sunt in tamēra valde. hæc ille. Vltra hoc ponunt multi autores, quod quædam quartana magis attinet san. alia magis flati. & sic de alijs. Et secundum hoc diuersificatur cura secundum diuersitatem humorū a qua talibus melancholia generatur. Si ergo in aliquo præcessit morbus sanguineus, & complexio infirmi sit sanguinea, & apparet venæ plenæ, & vrina ru. & grossa, & pulsus plenus, & alia particularia conueniant: tunc dicitur quod quartana est a melancolia facta per adustionem san. & tunc detur medicina digestiua, in qua non sit calefactio sicut est oxizaccara, & sirupus de prunis, & oxifen. & tiel. ros. & zucarum ros. & viol. & pitana, & sirupus end. & sirupus scariolæ, & similia. & dentur mala granata. deinde detur medicina, quæ purgat san. ab hu. adustis, & melancolicis post prouocetur vomitus in principio paroxysmi facta prius seboromia de basilica. deinde purgetur cum ista colatura. Recipe carnium

prunorum damasce. rs. numero pass. mund. iunbarum sebesten florum boraginis, & buglossæ viol. ana. unc. i. fiat decoctio in qua dissoluiatur corticis mirab. citrino. vn. i. cassiæ. vn. se. detur pro vna dosi, & videlicet in ea sanguinea & cholerica.

In quartana procedente a melancolia generata ex cholera, vel in qua cholera habet partem, & præcessit tertiana, vel alius morbus cholericus & pulsus est velox, & vrina citrina & cholerica, & alia particularia conueniunt, & tunc digeratur materia cum oxizaccara vel sirupo viol. & ros. & viatur lactucis portulacis borag. & spinargijs, & mecurialijs, & fumoterræ in suo tempore. deinde purgetur cum decoctione supradicta, vel digeratur materia cum sirupo de capillis veneris, vel cū isto sirupo. Recipe dianthos capilli veneris scariol. end. rostri porci. ana. ma. se. frigidorum minorum se. brusci aqua. unc. 3. scolopendr. corticis tamarisciana. unc. i. zucarū quarta. 5. sit sirupus, & detur cum aqua scolopendria, & purgetur cum oxifen. & manna, & cassiæ, & similibus.

In quartana autem de flate in qua vrina est grossa, & sitis parua, & complexio phlegmatica, & forte aliquis morbus phlegmaticus præcessit. Et alia particularia conueniunt tunc detur apozima de radicibus apertiuis cum seminibus calidis apertiuis pro digestiua cum menta & absinthio, & melle ros. Purgetur materia cum turbith, & agarico, chebulis, & diacarthamo, & pulpa colominthidæ. Et in omnibus istis respiciantur causæ vniuersales, quia vomitus in isto casu multum videlicet, quia phlegma, vt plurimum ad stomachum concurrit, & ideo prouocetur vomitus in principio paroxysmi, & post perfectam euacuationem in isto casu multum valet tyriaca, & metridatum, & similia. deinde gubernetur, vt supra dictum est. De quartana facta a melancolia, cura posita est ante omnes.

Sed est hic intelligendum, quod triaca magna, & metridatum, & aurea Alexandrina, & similes medicinae debent ministrari post digestionem, & euacuationem materiae, & non ante: quia magis mouerent materiam, & dissoluant sine consumptione, vel euacuatione eius. Dixerunt aliqui quod succus absinthij distemperatus cum aceto datus tribus auroris continuis curat quartanam. Idem dicunt de succo berbenæ distemperato cum vino. hoc intelligitur purgata materia sufficienter. Item ponit Haly. de regali dispositione, quod locuste longæ suspensæ ad collum curant quartanam. Scribitur etiam in primo libro chirannidarum quod cor auicu-

la, quæ torquet collū, quæ vocatur in lingua beernensium tortura luna deficiente: si suspēda ad collum patientis quartanam curat. Ista sunt experimenta & potius empirica. Conferua facta de radicibus apij et conferua quæ fit de floribus tamarisci, valet in isto casu. Similiter vsus cassiæ, cum epithimo & folliculis senæ, valet in isto casu.

Vel fiat sic. Recip. conferuæ radicis apij. vñ. 2. cassiæ, passatæ per sedacium, dram. 3. folliculorum sc. vñc. 1. epithimi. vñc. 1. conferuæ buglossæ, dram. 7. zuccari panis vñc. 2. fiat mixtura, & offeratur stomacho ieiuno qualibet die, dram. 5. cum vino decoctionis lilifagi. Dicitur quod succus rapsi barbari datus ter ante peroximum per vñam horam curat quartanā. Flebotomia de saluatella sinistra manus in hora accessions curauit multos, me vidente quanuis sit contra regulas artis. Ex sanguine a fini, & succo corrigiæ, & aceto si fiat quasi vnguentum, & vnguantur quartanarij, sanat eos. cit. 2. Cor leporis in panno missum, & suspensum in collo idē facit empiricum est succus calamenti sumptus cum vino añ horam accessions curat quartanam. Gordonius. Omnia ista intelliguntur cum bono regimine, & purgata materia. Vnguat spina dorsi tum oleo benedictæ, & oleo de lilio, & vnguendo arogon, & marciatō, in hora magni frigoris balnea humectantia valent in fine quartanæ quia tunc materia iam est subtiliata, & sic euacuabitur per sudorem, ante autem non valet.

Declaratio in quartana. Primo sciendū quod iuuenes nouiter vxorati si multum in principio continent cum vxore frequenter incurrunt in hanc febrem. Principio ratione nimii coitus virtus debilitatur, & mali in corpore multiplicatur in humores, & sic in se decidunt frequenter, quæ ratione mali regiminis prolongantur, & in quartanam conuertuntur. Ideo prohibendi sunt a coitu si cito volunt sanari.

Secundo queritur quomodo locusta suspēsa ad collum curat quartanam dicitur quod si ista empirica aliquid operentur illud faciunt a tota proprietate quæ est virtus absconsa. dominus forma specificam illius rei mediāte certa alicuius vel aliquorum corporum super celestium influentia.

Secundum tunc dubitatur quæ est illa tota proprietas. Iuxta hoc multa dicta dixerunt autores. Nam Auer. in 5. collo. videtur dicere quod sit complexio. Alij dicunt quod est forma substantialis illius compositi. Alij dicunt quod est eorum mixtum. scilicet forma, & substantia, & complexio quæ Aui. vocauit totā substantiam in doctrina. 3. sen. primi causa. c. 15. quā

dicit quod res quæ non est operans a materia nec qualitate, illa est operans, & tota substantia. Nota hic quod intentio Auer. ut supra fuit quod complexio propria sub ratione quia declinat in qualitatem obiecti sub debita proportionē. illud dicitur tota proprietatis. Verius, & clarius loquamur dicamus quod tota substantia vel proprietas per quam mixtu operatur aliquem effectum, cuius productionis causa naturaliter loquendo est ignota. Est quidam virtus, vel naturalis positio consequens immediate formam substantialem rei acquisita cum influenda corporum in praecelestium ad hoc speciale influentiam habentium in introductionem forme, & videtur esse de mente Aui. in secunda sen. primi doc. 2. summa propria c. 15. & in libello de viribus corde trac. primo. ultimo unde Arnaldus in trac. de causis sterilitatis ait sic. Dicitur autem proprietas propria natura ad quam aquirendam propria & substantialis forma mixtionis disponitur sicut accidit cuilibet mixto. & hæc natura occulta dicitur tum ignorata ut plurimum, tum quia via rationis nunquam cognoscitur, sicut cognoscitur decium complexioni qualitatis complexionales. Et proinde complexio dicitur natura. non quia propriæ nominari potest. Et viam etiam rationis cognoscitur tota autem proprietas nunquam nisi per viā experimenti cognoscitur. Et in hoc cognoscitur intellectus quod in aliquibus operantibus medicina præfuit experimentum quæ ratio. quia multa stant in experimento quod nunquam fuerunt nec de presenti stant in ratione.

Secundo cognoscitur intellectus quod non omne experimentum potest vallare ratione nec confirmari. Ista autem proprietas potest sic describi proprietas est quidā virtus vel naturalis positio consequens immediate, & inseparabiliter formam substantialem rei adductam super ipsam sub determinata proportionē adiuuante celesti influentia. Et supradictis patet quod tota proprietas non est complexio. patet quia si sic ille q̄ haberet eādem proprietatem haberent eādem vel similem complexionē. consequens est falsum, quia reubarbarum, & tamarindi a tota proprietate attrahunt choleram, & tamen non sunt eiusdem complexionis.

Tertio intelligendum: quod in quartanam secundum dicta autorum vñq̄ apparet diuersa secundum diuersitatem colorum humorum ex quibus fit quartana. unde non apparet diuerse in qualibet specie quartanæ sed secundū diuersas species humorum a quibus generatur talis melancolia. vñ si fiat a melancolia sanguine vrina sit rubea, & spissa, & si cholericā, sit citrina, vel subcitrina. Si autem fiat quartana a phleg-

phlegmate adusto: vrina apparet alba: in colō
re, & spissa in substantia. Diuersificatur etiam
vrina secundum diuersitatem temporum: mor-
bi etiam secundum digestionem, vel indige-
stionem medicinae morbi.

Quarto intelligendum est, quod dictum
fuit in 7. iudicio: quod quartana, quae fit ex
melancolia sanguinea est salubrior, & breuior
& est verum; & causa istius est, quia sicut dicit
Galenus, in 2. de complexionibus, c. 6. in ca.
q. san. omnibus humoribus melior, & conue-
nientior natura existit. cho. veto nigra est sicut
sedimen, & fex, sanguis propter hoc iste. Et per
consequens egritudines facit a melancolia. lo-
giores, & tardiores sunt ad curandam. Et pro-
pter hoc dicit Galen. quod in egritudinibus,
quae fiunt a san. qui est magis iunatus in hu-
moribus, non est timor 2. prognosticorum
com. 27. ibi vrina rubra & c.

Quinto intellige quod dictum fuit in secū-
do can. generali, quod signis sanguinis appa-
rentibus fit flebotomia & c. & si non apparent
non fiat flebotomia. Et si fit flebotomia, & san-
guis apparet rubeus & clarus laudatur vena,
& plus non exeat, quia si fit, virtus debilita-
bitur, & non poterit resistere morbo, & sic fle-
botomia est causa mortis, vel longitudinis e-
gritudinis. Et hoc dicit Haly. 3. de regali di-
spositione, c. 30.

Sexto memorandū est de 9. can. in quo di-
citur, quod balneum non competit nisi post
statum, & apparente declinatione, & causam
istius reddit Haly. ibidem. quia balnei interest
humores subtile euacuare, nunc autem ista
materia quartana est multum grossa, & com-
pacta, & tunc per balneum illud quod est sub-
tile euacuaretur, & grossum remaneret augmen-
tans materiam morbi, & facies ipsum diutius
corpus affligere, & permanere. Et tunc tu di-
cis, isti casus docent, quod non debemus eua-
cuare nec balneare nec fortia diuretica mini-
strare. Quid ergo faciendum? dico secundum
Haly. quod competit tenuis frictio modera-
ta, & levis cum moderatione cibi, & potus, &
hoc competit, vt fiat dilatio pororum, & ma-
teria attenuetur, & possint interea debilia di-
gestiua, & laxatiua administrari, & similiter ci-
bi, & potus in quibus sit digestio, & minora-
tio materiae, & per consequens quartana eius.

Septimo dictum fuit in 1. iudicio & c. q.
digestio materiae istius, & alterius morbi co-
gnoscitur per paroxysmorum mitigationem,
& minorationem eorū. Et causa istius est, quia
accessio febr. sit instabilis non interpolati tem-
poris, nō nimium custodit si firma, & stabilis,
tempus interpolationis non dimittit tunc ergo
eius dissolutio dura erit, & instabilis de ne-
cessitate facilis erit. Et hoc est quod cōter a lai-

cis dicitur q. quando feb. mutatur dimittitur.

Octauo p. declaratione tertij iudicij in quo
dicitur febribus inordinate vagantibus quar-
tanæ venturæ sunt. Sciendum q. fe. inordina-
te vagantibus sunt fe. quæ non custodiunt tē-
pus certum paroxysmorum, sed aliquando in
3. aliquando in 2. aliquando in 4. & sic de alijs
faciunt paroxysmum & Hippo. vocat eas
in alio loco errantes. & Gal. in passionario. vo-
cat eas planetas, quia omnes planetæ sunt
errantes, & deuiantes a via solis, quæ est linea
æcliptica sub qua sol. semper mouetur, unde
Hipp. autumno vero, & estinorum multa, & fe.
quartanæ errantes, & c. 3. amph. amph. 3. Et se-
quitur in com. feb. errantes in autumno sunt ex
inordinatis autumni complexionibus, & c.

Nono dubitatur de melancolia cum sit fri-
gida, & sicca quō potest putrefieri quia vtraq;
qualitate repugnat putrefactioni. Et iterū Ga-
len. 2. de complexionibus, c. 2. dicit quod nullius
rerū proprietas est vt putrefiat ex sicco nec
ex frigido. Ad hoc rñdet Gordonius, q. quam-
uis melancolia sit frigida, & sicca virtualiter tñ
est humida, & liquida actualiter ratione cuius
humiditatis actualis & liquiditatis in casu co-
arctationis & nō euetationis pot. putrefieri ad fe.

Decimo clarificat causas longitudinis & ab-
breuiationis paroxysmorum, & interpolationis
hoc conuenit secundum q. materia est multa
vel pauca, & secundum q. multum, vel parum
resistit putrefactioni: quia ergo melancolia est,
grossa, & non est apta resolutioni diu affligit,
& paroxysmus eius longus: quia cuius materia
frigida est sicca, & vtraque qualitate putrefa-
ctioni resistit, & ideo et longam facit interpo-
lationē. Phlegma at facit paroxysmum longum,
quia materia est frigida, & viscosa, & non cito
dissolubilis, & paruo tēpore durat interpo-
latio quia materia multa est, & parata putrefa-
ctioni rōne multæ humiditatis, & ideo quasi
non interpolat, aut est in falsa quiete. Cho. aut
parum affligit, quia materia subtilis, & cito re-
solubilis, & interpolatio eius est intra quoti-
dianam, & quartanam, quia ratione siccitatis
non ita cito putreficit sicut phlegma, & ratione
caliditatis non tantum moratur sicut melan-
colia. San. autem non facit febr. interpolatam
cum paroxismo, & interpolatione.

Vnde cimo scias, & intellige secundum Ga-
len. in 2. de criticis diebus in capi. q. aliquando
inuenimus quartanam prolongari usque ad
numerus multorum annorum, & inuenitur
alia quartana, quæ terminatur in tot diebus
sicut facit numerus periodarum illius quarta-
næ quæ fuit multorum annorum. Ego vidi
febricitantem, quæ solam febricitabat semel
in 30. diebus, & ista durauit per triginta an-
nos solares. Laus Deo. Amen.

De febribus compositis. Cap. XIII.

Compositæ febr. sunt multæ, ut dicitur Gal. 2. de crasi. 10. & 11. & 12. Et dicit in fine capituli 11. quod: formæ februm singularium sine apostemate sunt tres, una est ex phlegmate, alia est ex cholæ, alia ex melancholia. Et tu si exercitaberis te ipsum & visitatus fueris in cognitione cuiuslibet earum singularium secundum suam singularitatem non est tibi difficile cognoscere compositionem earum, quæ ex eis componuntur. hæc ille. Quia ergo istæ compositiones sunt multe, quia aliquando continue cum continuis, & aliquando interpolate cum interpolatis, & aliquando interpolate cum continuis componuntur, & illud scribere, & narrare esset longum, remitto te ad Galenum 2. de crisi capitulis allegatis, & ad li. de differentiis febr. & suff. nunc nobis ponere compositionem continuarum cum interpolatis. Et ultra hoc compositionem febr. interpolate tertianæ cum quotidiana interpolate. Unde præsupponitur ex dictis Gal. ibidem, & ex dictis in 6. cap. huius septimi libr. quod quilibet trium humorum potest putrescere intra venas, & potest causare feb. continuam, quilibet etiam potest putrescere extra venas, & potest causare feb. interpolatam. Et istorum humorum quilibet potest putrescere intra venas & alius ab eo extra venas, secundum hoc possunt causari tres species febr. compositarum, quæ dicuntur emitritei. Si enim phlegma putrescit intra venas tunc faciunt febr. continuam quæ non separetur nec interpolata, & si cum hoc putrescit cho. extra venas facit tertianam interpolate, & sic sunt duæ febr. scilicet continua ex phlegmate, & interpolata ex cho. & sic est prima species emitriteorum, quæ dicitur parvus emitriteus.

Secunda species est contraria isti, & fit, ex phlegmate putrefacto extra venas, & ex chol. putrefacta intra venas, & sic tertianæ continua componitur cum quotidiana interpolate, & vocatur medius emitriteus.

Tertia compositio fit ex melancholia putrefacta intra venas, & ex chole. putrefacta extra ista fit ex quartana continua, & ex tertiana interpolate, & est tertia species emitriteorum. Et de isto stant versus antiqui. Parvus emitriteus in venis phlegma recondit. Exterius cholæram meditur conuertitur illi. Pessimus humor inest maiori sed coquitur extra.

Quarta compositio est ex tertiana interpolate, & quotidiana interpolate. omnia ista habent causas, & signa, & curationes

sicut habent suæ simplices ex quibus componuntur.

Causæ compositionis istarum febrium est, compositio mali regiminis & usus rerum multiplicantium phlegma, vel cholæram, vel melancholiam simul in eadem mensa, vel per longum tempus unum humorem & per aliud tempus alium, exemplum primi, ut quando in eadem mensa quis in principio mensæ comederet cerasa pruna guinidola, & post comederet pastillos cum multo pipere, & biberet nectar aut vinum forte. Exemplum secundi, ut si quis per totam ætatem fuisset usus cucurb. & melonibus, & multitudine fructuum & in fine autumnii se subito mutaret, & vesceretur allijs, & cepis & sinapi, & porris, & nasturcio & speciebus calidis. Mutationes etiam temporum ad qualitates oppositas sunt similiter causæ istarum fe. compositarum. Mutationes etiam ætatum cum regimine disproportionato ætati, & complexionem. Et quando isti humores diuersi, & multi in quantitate sunt in corpore generati, si putrescunt in corpore faciunt istas febres compositas.

Signa parvi emitritei sunt, quia inuenitur febr. continua, quæ nunquam eradicat, & ista est lenta. Pulsus inordinatus aggrauatio oculorum, & est feb. remissa non multum adurens sine æstuatione. Et ista sic existente superuenit patoxismus tertianæ cum quadam horripilatione, vel rigore ac si spinis pungeretur, & post succedit calor magnus cum magna inflatione, & siti, & vigilia, & terminatur cum sudore, & vomitu, & post paroxysmum remaneat feb. lenta moll. & in ista febr. dies tertia est similis primæ, & quarta secundæ, & hoc est propter motum cholæ quæ est de tertio in tertium.

Signa autem medij emitritei, tunc enim est febr. continua semper cum nimio calore, & ardore, & siti & vigilijs, & inquietudine. Et postea venit paroxysmus quotidianus cum modico frigore, & cum quodam quasi stupore, & sitis quæ prius erat aliquantulum recessit, & aliquando venit vomitus &c.

Signa maioris emitritei, & fit exterius nimia frigiditas a melancholia putrefacta intra vasa, & tertiana interpolate facta a cholæ. putrefacta extra vasa. Et dicitur quod in ista febr. vrina est aliquando remissa in calore, & fortiter in substantia propter malam melancholiam, aliquando intensa, & citrina propter cholæ. & adest timor, & sollicitudo, & communiter sunt splenetici cum dolore in latere sinistro, & habet somnia timorosa horrenda & falsa cum falsis imaginationibus, & siccitas in corpore est magna, & calor fuscus, & sitis, & vigiliæ. Ipsa autem

autam sic stante continua venit paroxismus de tertio in tertium cum quadam horripilatione, & urina est intensa. Et postquam paroxismus finitus est, iterum remanet febris continua.

Si autem febris tertiana interpolata componatur cum quotidiana interpolata hæc signa sequuntur, & primo sunt posita a Ga. 2. de crisi. c. 9. sicut sententia. Fe. incipit cum horripilatione, & diuersitate in pulsu, & postea venit caliditas per totum corpus, ita quod iam videatur, quod veniat status paroxysmi, & antequam finiatur idem paroxysmus iterum redit horripilatio, & pulsus iterum fit paruus, & minor quam fuit, & debiliior & tardior, & vehemioris raritatis, inuenies etiam calorem separari ab extremitatibus, & multiplicari in ventre, & pectore.

Ista febr. est composita ex tertiana, quæ separatur, & ex fe. faciente paroxysmum: omni die, & eius compositio est secundum commixtionem, & compositionem quam greci vocant emitriteum. Et crisis fe. compositæ ex tertiana, quæ separatur, & ex faciente paroxysmum omni die quam dixi grecos nominare emitriteum fit si cum ea est euacuatio cholerae, & phlegmatis. 3. de crisi. c. 3.

Iudicia in speciebus emitriteorum. Primo istæ fe. communiter sunt tardæ terminationis, & fallaces, ideo si statum debilitate virutis sunt multum dubiæ de morte.

Secundo dicitur sic paruus emitriteus frequenter conuertitur in litargiam pp. somnolentiam quæ fit a relatione humorum facta a phlegmate quod est putrefactum intra venas quæ continue fumant ad caput, quia ut plurimum facta a phlegmate sunt causa somnolentia.

Tertio iudicamus sic. medius emitriteus sepe conuertitur in frenesim: propterea quia sumi eleuati a materia cholericâ intra venas putrefacta continue caput ascendunt, & ratione longæ durationis faciunt apostema: non tantum.

Quarto maior emitriteus ut plurimum est, mortal. quia materia putrefacta intra venas causat continuum, & longum morbum, & natus multum debilitatur a duabus fe. ideo eis non potest resistere, & sic succumbit, solus autem deus potest ipsum curare, quæ solus sanat languores, medici vero ministri eius sunt in morborum curationibus.

Quinto dicit Auic. quod festinemus in dando decoctiones supple laxatiuas ante digestionem materiae: timetur enim si res, id est apostema in ventricul.

Sexto semper emitritei sunt dubij de salute ubi virtutis debilitas reperitur.

Curatio Fe. compositarum. Primus casus est Auic. in sententia. In speciebus emitriteorum magis intendendum est ad euacuationem ma-

teriarum per ventris solutionem quam ad alterationem per extinctiua caloris.

Secundus morbi compositi cum medicinis compositis sunt procurandi.

Tertius simplicium norma curabis compositiua.

Quartus est Auic. ubi supra, ante euacuationem præcedit digestio verum tamen aliqua possunt præcedere lenitiua materia enim emitriteorum pro maiori parte est grossa.

Quintus in curatione emitriteorum considera quis hu. componentium superabundet, & de digestiuis, & euacuatiuis illius hu. in componenda me. magis est apponendum.

Sextus dicit Auic. quod emitriteus durat aliquando vsque ad 7. menses ideo cito succurrendum est cum digestiuis & euacuatiuis non fortibus donec materia sit digesta.

Cura particularis parui emitritei. Et primo digeratur materia cum rebus calidis ratione materiae stantis quæ magis abundat, similiter addantur frigida ratione cholerae, & discrasia febrilis. Et fit talis sirupus. Rec. rad. fen. & petro. & apij cicorea. & brusci ana vnc. 2. Ista ponuntur ratione stantis scariola. end. enpa. ana vnc. 1. & se. 4. se. fri. mi. se. brusci. ros. ru. spod. florum nenufana. dram. 2. camphora. dram. 1. acci al. quart. zuc. lib. 2. fit sirupus quæ vtatur toto tempore ægitudinis cum aqua graminis, & cicerum ru. & spicenardi.

Cognita digestionem materiae purgetur sic. Recip. florum violæ boraginis & buglossæ volubilis minoris quæ gerit florem alb. polipodi quercis ana ana vnc. 1. fit decoctio in qua dissoluatur cassia. mund. vnc. 1. agari. pul. pul. diaturbithi ana dram. 1. & se. vel magis vel minus secundum vires infirmi. detur in aurora, vel purgetur cum electuario de succo rosa. & pul. diaturbithi. Ista digestio, & euacuatio continetur vsque ad finem curæ. In istis enim emitriteis quia materia est grossa potest ministrari sirupus de bifancijs, & in supradictis purgationibus reubarbari, dram. 1. & spicenardi, dram. 1. & camphora.

Deinde propter nimiam corruptionem, quæ est in humoribus omnes species emitriteorum videntur quasi morbi pestilentiales, ideo tractandi sunt, sicut epidimiati quoad defensionem cordis, & aliorum membrorum principalium. Ideo fiat tale cordiale. Recip. sem. & corticis citri, vel saltem limonis rad. tormentillæ pul. triafanda. pul. diamargariton. rosa. rub. ana dram. vnam. spicenardi. dram. sem. camphora. scropoli. vnam. conseruæ buglossæ. ana. vnam. zuc. carib. lib. 1. fit mixtum admodum zuc. carib. rosa. Et post fit talis sacculus. Recip. rosi rub. florum nenufar. violæ. florum camo. ana vnc. 1. sem. corticis citri. dram. 2.

sand. muscat. dra. 2. caphorē dram. 3. conqual sentur omnia, & ponantur in sacculo, & aspergatur aqua ros. & aceto, & frequenter odoretur, idem de ros. & sand. muscat. & cāmo. & absin. & parua menta fiat sacculus supra stomachum, & ista continenter paulatim purgan. & continue agrum viaticis salubribem pro virtutis defensione nutriendo.

Pro medio emitriteo fiat sic si istud phlegma est putrefactum intra venas, & facit quotidianā interpolaram, & cho. putrefit intra venas, & facit continuam, tunc cho. est in maiori quantitate, & ideo plus debemus ponere de digerētibz, & euacuantibz cho. & ideo fit sic. Rec. end. nouellæ non lotæ scariolæ rostri porcini hepaticæ lactuca. ana. m. 1. capil. vene ris recentis politici, & dianthos. rad. apij. & per. & fen. & brusci, & graminis. & sparagi. ana. m. se. 4. se. frigidorum mi. ros. viol. florum nenuf. ana. vnc. se. campho. dram. 2. spodij liquiritiæ ras. ana. dram. 2. zucca. lib. 1. & se. fit si rupus, & detur cum aqua end. & scolopend. addatur absinthij. vnc. 2. in sirupo. Purgetur sic Recip. florum viol. boraginis, & buglossæ polipodij querc. ana. vnc. se. an. 4. se. frigidorum mi. ana. dram. 3. fiat decoctio in qua dissol uatur cassiæ. mund. tamarind. ana. un. se. pul. diaturbith. dram. 1. & se. reubarbari. agarici. ana. dram. se. secundum magis aut minus. Itē rum fiat restauratiuum electuarium supradictum. Dicta autem sit eūclitna cum bonis cibis paratis cum rebus aperitiuis. & c.

In maiori emitriteo dicitur quod non euadet habens ipsum propter peccitatem materiæ, & longitudinem egritudinis. veruntamen semper confortetur natura, & digerantur materia per istum modum. Recip. succi sumite terre succi lapacij acuti, succi boraginis, & buglossæ succi endiuiz succi lupuli ana. quart. 4. sem. frigidorum mi. seminis brusci epithimi floru viol. nenuf. seminis acetosæ berberis, ana. dram. 3. fiat sirupus cum zuecaro lib. 1. & se. detur cum aqua scolopend. & tamarisci. purge tur sic. Rec. florum viol. boraginis, & buglossæ epithimi seneana. vnc. se. polipodij. dram. 3. anisi. dram. 2. fiat decoctio in qua dissoluatur cassiæ. mund. vnc. 1. mirab. indi. dram. 3. epithimi pulue. dram. 1. & se. detur in aurora. Et dicit Auicenna in prima. 4. in cura emitritei. quod Gale. & qui fuerunt ante ipsum curabant emitriteos cum aqua hordei in qua erat, virtus piperis, cui aliqui contradixerunt, quia piper inflamat febrem, & aqua hordei pigra facit materiam. Et Auicenna ibidem tenet secum. Gal. dicens quod generalis caū. est quod iste egritu. curantur cum medicinis compositis ex infrigidantibus, & calefacientibus, vt discernat natura inter duas virtutes, & occu-

petur infrigidantium cum febr. & partibus cordis, & calefacientium cum materia. Et quis est, qui curet emitriteum absque hoc, quasi dicat nullus. Paulatim ergo digeratur, & paulatim euacuetur materia. Ex istis infra scriptis possunt fieri trocisci aut pillule quæ non sunt multum laxatiuæ aut electuariū aut restan ratiuum ros. rub. liquiritiæ sicut est spodium spicæ reubarba. semen endiuiz, & portulacæ, & cucurbitæ cuscutæ crocus. reuponti. lacca gummi arabici cacabe. semina acetosæ eupato rium, & anisum. Et in laxariis ponatur aloë absinthium, & mirab. agaricus. epithimus reubarba. sene. & cassiæ. & c.

Dixerunt aliqui quod smaragdus lapis pre ciosus suspensus ad collum a tota proprietate curat emitriteum. istas pillulas ponit Auicen na, & asserit quod valent ad emitriteos, & ad febres cronicas ledētes viscera. maxime quan do materia vincens est phlegmatica. Re. aloes masti. corticis mirabol. citrini reubarb. succi eupato. succi absinthij ros. rub. ana. partes æ quales, croci partem mediam fiant pillule cū aqua endiuiz, & dosis eius est dram. 2.

Declaratio in emitriteis.

Primo sciendum secundum Auicen. in prima. 4. capitulo proprio, quod inter medicinas quæ profunt in isto casu est absinthium romā num ad rectificandum materiam, & vt faciat venire egritudinem ad statum dummodo nō festinemus in dando ipsum, & non detur nisi post septem dies. Et cum inceperit apparere signa digestionis, nam si ante sumatur, facit accidere angustiam, & nauſeam, & cum sua caliditate, & siccitate cum stipticitate facit eos rardos ad euacuationem, & hoc intelligitur quando datur ad euacuandum in sua dosi.

Secundo iuxta dictum Auicen. in cura maioris emitritei de administratione aquæ hor dei in qua sit virtus piperis, quando dicit, vt discernat natura inter duas virtutes, & c. Tūc queritur vtrum sit dare quintam virtutem natura lem, scilicet discretiuam quæ discernat ca lidum à frigido, & calidum applicet materię morbi frigide, & frigidum applicet discretiuz, & materię morbi calide, & videtur, q. sic auctoritate Auicennæ in fine primæ fen. 4. in cura emitritei. Item arguo auctoritate Auer. qui eam expresse ponit in 2. & 3. col. in c. de acci dentibus virtutis stomachi. In oppositum arguitur quia videtur quod Gal. & Auic. & alij sunt diminuti ponentes solum 4. virtutes naturales, & non ponunt virtutem discretiuam. Ad istam quæstionem dicendum, quod aliqui tenent secundum Aue. q. est dare quintam virtutem. quia ad hoc quod aliqua virtus attrahat aliquod attrahibile oportet, quod illud sit discretum, & dictum alias non posset

posset attrahi. & sic virtus discretiua, vel separatiua preparat illud subiectum virtuti expulsiuæ, vel attractiuæ. secundo patet ad experientiam quia hepar digerit chylum, & preparat ipsum, vt sit nutrimentum toti corpori antequam sit attractio ad membra nutrienda oportet, qd sit segregatio superfluitatum & quælibet vadat ad suum locum, & hæc est vna via. Aliter tamē dicit Iordanus de turre supra. 3. de morbo & dicit quod salua reuerentia Auer. non est ponenda 5. virtus scilicet discretiua, & dato quod sic non est, naturaliter consideranda a medico, & ratio est, quia si actus ille quem tu imponis fieri per virtutem discretiuam potest compleri per alias virtutes naturales, non est necessarium quod illa virtus ponatur in esse, quia virtutes, & operationes aliæ ex alijs cognoscuntur. Sed ille actus, vel operatio potest compleri per alias virtutes naturales ergo, & c. consequentia nota antecedens patet, quod potest compleri per virtutem expulsiuam, & per virtutem retentiua operante virtute digestiua, quia attractiua fit post expulsionem inconuenientis, ita quod expulsiua membri expellit quod sibi non conuenit, & attractiua alterius membri attrahit expulsum tanquam conueniens. Et hoc vere intelligitur in generatione humorum & segregatione eorum abinuicem, quia digestiua operante virtus expulsiua expellit ab hepate per suum meatum ad cistim fell. superfluitatem chol. similiter per suum alium meatum superfluitatem melancoliz ad splenem retinendo quod melius est vsque ad tempus. Et in hoc iuuat virtus attractiua membrorum illorum ad quos fit expulsio rei nutrientis, vel non-nutrientis.

Et adhuc circa hoc est sciendum quod discretio potest intelligi dupliciter quædam est discretio aliquorum existentium in potentia, quæ quamuis apparent quod sit vnum tamen sunt plura in potentia, vt in massa sanguinaria. Et est alia discretio aliquorum, quæ sunt in actu sub diuersis formis, vt in coloribus. De prima discretione loquendo dico quod non potest compleri per virtutem expulsiuam, & attractiuam, quia attrahibile oportet quod sit distinctum & discretum loquendo de secunda discretione talis potest compleri per virtutem expulsiuam & retentiua operante virtute digestiua, quæ preparat, & digerit tales res, vt quælibet earum expellatur a loco in quo est, & virtus attractiua aliorum membrorum attrahat quamlibet rem ad locum vbi necessaria existit. Qui etiam vellet speculari ad hoc talis discretio humorum potest compleri per virtutem retentiua & expulsiuam, quia hæc sunt distincti formaliter simul, tamen sub quadam acerbatione, & accumulatione, & hæc

est snia medicorum, quia ista quinta virtus posita, quod sit, tamen non est necessaria medico, quia non facit ad finem medici, quia finis imponit necessitatem rei, quia medicus non tractat de virtutibus nisi ratione finis, scilicet vt instrumenta earum corrigat, sed virtus discretiua non habet instrumentum, quia quælibet virtus naturalis operatur per complexionem, & tunc dicitur, quod tot sunt naturales uirtutes quot sunt combinationes complexionum, sed non sunt nisi 4. quia calidum, & hu. est instrumentum virtutis digestiue. frigidum & hu. expulsiue frigidum, & sic. retentiue calidum, & sic. est instrumentum attractiue. Et non sunt plures combinationes possibiles, ergo non plures virtutes. Et ad Auer. dicitur quod ipse locutus fuit velut purus philosophus. nos vero loquimur sicut medici loquuntur in ratione finis, scilicet, vt sciamus corrigere instrumenta istarum virtutum quando virtutes sunt defecte. Et si Aui. vel Gal. vel aliquis ponat istam virtutem discretiuam ponunt ipsam tanquam actum completum ab alijs virtutibus naturalibus, scilicet expulsiue, & retentiue, & attractiue, cooperante digestiua. Aliqui vero dicunt, quod ista discretio fit a virtute corporis regitina, & operæ naturæ.

Tertio sciendum quod Auic. in fen. 2. 2. 3. in c. de signis doloris iuncturarum, quod species guttæ compositæ sunt secundum diuersitatem hu. in corpore existentium simile etiam est dicendum de se. compositis. Nam si aliquis cholericus vult vti regimine refrigeratiuo comedendo lactucas & herbas frigidas & fructus frigidos & hu. & res generantes phlegma, & hu. crudos, vel vtatur nimia repletionem nauseantia satietate, & cum hoc vtatur rebus cho. generantibus post longum vsum rerum phlegmaticarum, & isti hu. putrescunt, vel destituuntur a regimine naturæ, & faciant commixtionem non veram, & generent guttam compositam ex diuersis hu. Similiter similes hu. faciunt diuersas se. compositas secundum diuersitatem, secundum compositionem, & secundum positionem hu. intra vel extra vasa, secundum hoc sunt diuersæ species emittiteorum, & aliz feb. sicut ponitur. 2. de crisi. & c.

De ethica febre. Cap. XIII.

Ethica est nomen latinum, & est extractum à greco. Dicitur autem ethica ab ethis quod est habitudo vel habitus propterea, quia ista egriam videtur habituata & fixa. Ideo dicitur. 2. de crisi. c. decimo quod ethica dicitur ab effixione. Ethica secundum fratrem Io. de Ianna dicitur ab ethis quod est mos. vnde ethicus ea cum penultima correpta, idest moralis,

& hæc ethica idest scientia moralis. Papias vero dicit quod ethica est, genus febr. cuius tres sunt species prima. 2. & 3. De prima leuiter infirmus curatur, de secunda vix, de tertia nunquam. Quantum igitur spectat ad propositum dico quod ethica est duplex quædam est cum feb. & alia sine feb. quæ vocatur ethica senectutis siue marasmus, de qua postea videbitur domino adiuuante. Prima autem diffinitur sic. Ethica est febr. continua membris radicalibus subiectiue adhærens, & humiditates substantiales, & nutritmentales, & totum corpus consumens, & habet causas antecedentes primitiuas & coniunctas.

Causæ primitiuæ sunt omnia illa extrinseca quæ calefaciunt, vel inflammant membra radicalia, & possunt facere effi. vel pu. aliquibus non bene dietatis, vel gubernatis successiue potest fieri feb. ethica, ita quod causæ primitiuæ istarum sunt etiam causæ primitiuæ ad hoc aer facit exterius dicens quicquid est causa causæ est causa causari, quia qui occasionem damni dat dampnum sibi dedisse videtur.

Causæ autem antecedentes ethicæ sunt species fe. effi. vel fe. pu. acutarum maxime illæ quæ sunt cum inflatione, & aduersione. Alia causa potest esse prohibitio cibi, & potus in tempore quo deberet dari, & maxime hoc fit in hominibus cholericis, & maeris quibus aduenit febr. continua cholera adurens, ut causon, & ei prohibetur potus aquæ frigida, vel aquæ hordei similiter fe. quæ fit cum apostemate. Vnde si ieiunium triduanum imponatur complexionem calida, & sicca existente in ethicam deueniunt. 8. de inge. ca. 6. intelligitur si prius febricitauerit. Vlcus pulmonis propter quod prohibetur pulmo a perfecta euentatione cordis, & sic inflatur cor, similiter nimia caliditas hepatis aut pulmonis aut stomachi aut similitum.

Causæ coniunctæ ethicæ sunt caliditas, & siccitas cordis consumens humiditates nutritmentales eius, & similiter aliorum membrorum similiter mala complexio æquali in eisdem membris introducta a febr. præcedentibus, vel a mala complexionem diuersa præcedente, & duranti vel ab omnibus alijs causis cito, & fortissime malam complexionem calidam, & siccam introducentibus in corde, & in membris radicalibus, & ipsa consumens.

Signa ethicæ febr. sunt fe. equalis vniformis sine paroxysmis, & interpolationibus, ita quod semper calefacit corpus nec vna dies plus aggrauat quam alia, nisi ibi esset mixtio febr. pu. Cutis est arida, & sicca sine humiditate. Caliditas istius febr. tangendo non est intensa sicut, in febr. putridis, immo in primo tactu videtur suavis. Et si manus remanet per aliquod spacium super eutem, fit caliditas fortior, & vide

tur augmentari, & aliquantulum mordicare, prorsus est paruus, & debilis, & frequens propter siccitatem arteriæ Caliditas augetur post refectionem, quod licet fit in alijs fe. non tamen ita manifeste. vinctuositas apparet in vris, & egestionem.

In secunda specie ethicæ vris est vinctuosa, & furfures in ea apparent, & extremitates manifeste discarnare & nodositates crescunt, & ideo apparet manifesta distinctio.

In tertia specie ethicæ facies apparet hypocratica nares acutæ, oculi concaui tempora plana aures frigide, & contractæ, & pulpæ eorum inuerse, & totius faciei color pallidus aut plumbens aut terreus, & habent pannum in facie ac si pul. super faciem spergeretur. In ethicæ etiam reperitur maior calor in volis manuum & in plantis pedum.

Signa permutationis effinera ad ethicam sunt permanentia fortitudinis caloris, nam fe. effi. v. plurimum incipit declinare post duodecim horas, & si non declinat immo remanet in eodem statu vsque ad tertium diem tunc fit ethica.

Signa quod ethica sit composita cum fe. putrida sunt quia putrida facit interpolationem per sudorem vel aliter, semper tamen remanet caliditas, & siccitas, & semper crescit extenuatio, & arefactio, & alia signa supradicta, & durities in pulsu, & paruitas, & debilitas maior est in secunda quam in prima, & in tertia quam in prima, vel secunda. Et in secunda de crescunt extremitates, & iuncturæ videntur decreseere propter carniū consumptionem. Pulsus ethicorum sunt debiles, & parui veloces seu frequentes, parui sunt propter debilitatem caloris naturalis etiam per consequens virtutis, & sunt veloces seu frequentes propter necessitatem quam inducit febr. ethi. Ga. hæc in quarto libro de causis pulsuum com. 16. Et calidius, quod fit in ethicis est locus venarum & articularum scilicet in volis manuum, & plantis pedum, quia ibi terminantur venæ & arteriæ, &c.

Iudicia in febr. ethica. Primo notandum, quod Ani. in prima sen. primi docet de humoribus c. in principio capituli ponit humores, & ponit humiditates, sed quædam istarum humiditatum sunt superfluitates aliæ sunt non superfluitates, quarum prima est in foraminibus extremitatum partium venarum membrorum simplicium, & ista humiditas non habet nomen, sed circumloquitur, & vocatur prima humiditas de secundis.

Secunda humiditas est humiditas roalis, quæ spargitur super omnia membra simplicia & ista est apta nata conuerti in membrum quando corpus causaret nutritmentum, & apra, ut mem-

membrum humectet quando exiccantur a forti exercitio vel ab alia causa, & ista vocatur ros: tertia humiditas est illa, quæ parum ante congelata est per vltiorem actionem, & est nutrimentum, quod quia iam quantum est ex parte complexionis in nutrimentum, & membrorum substantiam conuertitur, sed ex parte essentia nondum conuersa est in substantiam, & essentiam, & in similitudinem membri totalem. Et ista humiditas vocatur cambium, quia de proximo cambiatur & mutatur in glutinum quæ est quarta humiditas, quæ continet membra simplicia.

Dicit ergo Aui. in prima fen. 4. trac. vltimo. & concordat Serap. in capitulo proprio quod ad consumptionem humiditatis, quæ vocatur ros, sequitur prima species ethice, & est simile de oleo quod continetur in lampade. quando autem prima humiditas incipit consumi, quæ vocatur cambium tunc fit secunda species, & est simile de oleo quod est iam bibitum in substantia lichini, post consumptionem istarum duarum humiditatum quarta humiditas, quæ vocatur glutinum incipit consumi, quæ conglutinat partes membrorum simplicium, tunc est simile de humiditate substantiali ipsius lichini per quem partes lichini continuantur, & tunc est tertia species ethice. Prima igitur species difficilis cognitionis & facilis curationis. vt dicit Aui. Tertia autem species est oppositum, quia est facilis cognitionis, & impossibilis curationis. Secunda autem species in cognitione, & curatione tenet medium.

Curatio Febris ethice. In primo aliqui can. generales sunt præmittendi: vt exinde cura eliciatur. Primus can. est Gal. in 10. mech. quasi in col. 14. ethicis nihil aliud est, necessarium nisi refrigerare, & humectare eorum corpora. Secundus est Gal. ibidem. Et hic vero quia non oportet purgari nec calefieri calor balnei nocet, nam augmentabis calorem, & siccitatem. hæc ille vbi supra.

Tertius est Galen. in decimo mech. quasi in fine sexti col. Nutrimenta ethicorum necesse est esse frigida, & humida aut temperata sicut pitisanam, & humida iura, & mund. panem.

Quartus, cura enim ethicorum similis est, curæ siccam in stomacho complexionem habentium, sed tamen ethicis frigidiora sunt necessaria propter multitudinem caloris eorum.

Quintus est Aui. Si coguntur propter necessitatem dare res, quæ faciunt citam humiditatem vel humectationem, & illæ sunt calidæ, vt aqua carnis, & vinum, oportet quod antecedant, vel sequantur res infrigidantes. Iste autem est Aui. in prima 4. in cura febr. ethice.

Sextus. Si ethica accidat propter apostema aut lesionem in aliquo membro, vt est hepa-

tis calefactio necesse est, curare illud apostema aut membrum lesum corrigere & preparare. Septimus, infrigidanda aeris est de rebus magis iuuantibus ethicos similiter indui pannis lotis in aqua in qua sunt, rose, & folia salicis aqua ros. & troscisci de camphora non modicum iuuant eos. Aui. ibidem.

Octauus. odora camphor. & ros. sand. & madragoram papa. & aquam ros. & similia iuuant ad eorum curam.

Nonus est Aui. vbi supra. Emplastra infrigidanda quibus oportet eos curare sint aromatica: nam ipsa sunt propinquioris iuuamenti, & proprie super pectus & partes vicinas, & sint actu frigida sine stipticitate nam stiptica desiccant, & prohibent virtutem medicinarum profundari, & ad interiora penetrare, non tamen tantum retineantur, quod voci, & anhelitui inferant nocumentum hæc ille in sententia.

Decimus quies & somnus & tranquillitas, & præseruatio a fame tristitia, & ira, & odio, & angustia, & siti iuuat in ethicorum curatione.

Vndecimus lectus eorum sit de natalicijs frigidis ex pannis lanens cum coto intermedio similiter, & coopertura, & non sepeliantur in culcitra plumacea nisi super ipsa coopertoria de corijs paratis extendantur. Et si lectica eorum statuatur super aliquod vas aque plenum esset eis bonum, vt dicit Aui.

Decimus secundus est Aui. in loco alleg. in sententia in ca. rememorato infrigidantium eos in fine capituli. Lectus eorum sit prope cursus aquarum, vel saltem currat aqua si siringam prope lectum, & ibi sternantur, & circumponantur succi & folia, & rami salicis folia. can. & herbarum frigidarum, & similiter herbe naturaliter frigide in frigida aqua madefacte.

Decimus tertius lac caprarum, & asine nutritarum in pascuis frigidis & hu. & proprie asine vsuratum eradicat fe. ethicam, si possibilis est ei eradicatio Aui. ibidem.

Decimus quartus lac muliebre sugendo abvber, & sumptum conuenientius est omni alio lacte.

Decimus quintus lac a quo extractum est butirum est vtile ethicis infrigidando eos.

Decimus sextus lac competit ethicis a principio vsque ad finem.

Decimus septimus ius parue pulle alteratæ cum tenera cucurbita, & aggrega remittit eorum calorem nutriendo.

Curatio feb. ethice particularis. Primo iuxta tenorem Septimi can. constituatur in loco vel in camera humida vbi attrahat aerem frigidum, & humidum, & si naturaliter non habetur, fit rorando cameram cum aqua fontina vel puteali, & sternendo ipsam, & circa lectum

ponendo folia, & ramós falicis, & caufanarū cū iuncis, & rof. viol. & nenufa. & lentiginis aqua, & papa. & folia vitis albę. Et fit talis facculus quem odorabit iuxta tenorem. 7. can. Rec. omnium fand. rof. ru. fe. lactuce, & portulacę, papa. al. rad. mandragorę. ana dram. 3. fe. iufquami camphorę. ana dram. 2. florum nenufa. dra. 1. & fe. opij tebaici. dram. 1. fiant do. facculi hæc odoretur vnus & alius per interualla vnus post alium, & ifta continuentur. At iuxta tenorem finis. 7. can. camifę quas indurari funt, immo & diploides propter factam dealbationem iterum lauētur in aqua in qua decoctę funt summitates pa. & lentiginis aquę & malua, & lactuca, & folia falicis, & fimilia. Et fi in aqua ifta post colaturam ponatur camphora, & troscifi eius: efflet melius. & tales pāni deficcantur in vmbra, & induantur eis, & mutet frequenter lectum, & vestes, & lin-teamina.

Iftis fic ordinatis diętetur fic. Habetur parvus pullus, vel parua pulla, & coquatur cum lactucis, vel portulacis, vel frustis cucur. Et comedat cucurbitas & carnes pullę, & offas in iure eius, & ficut dicitur de pulla fic potest dici de alijs auibus viuilibus præterquem de degentibus in aquis. Et iuxta tenorem primi can. vtatur cibis, alijs frigidis ab hu. vt est hordeatum auenatum, & farina de fpelta, & colatura furfuris cum lacte amigd. & 4. fe. frigidorum ma. Poffunt etiam ifta fupradicta parari cum lacte vaccino a quo extractum est butirum. Mica etiam panis ter lota in aqua frigida, & expreffa & cocta cum dicto lacte, vel cū lacte de fe. frigidis iuuat eos quia nutrimentū iftorum naturaliter eft frigidum, & refrigerat hepar, & cor, & fang. venarum obtemperat, & contrarietur febri, humectat corpus. Alius cibus fit de cancris fluuiatilibus ita, quod carnes eorum extrahantur a corticibus eorum lauentur cum lexiuo facto de cineribus vitii, ficut docet Auic. Alius cibus fit de carnibus limaciarum coctis cum fen. propter viscofitatem, & post extrahantur a cafulis, & post comedantur, ficut faciunt cathalani. & vere in hoc frequenter inueni iuumentum. Potus iftorum fit aqua hordei, & fi vinum bibant illud fit multum limphatum clarum, vel aliqua liter rubeum, & nutritium, & aliquando fumat lac amigd. Et fequendo doctrinam primi can. vtatur pifcibus ifquamofis de aquis munit bullitis in aqua cum pet. Pifces tamen mar. non funt viles: vt falmo, & alofa, & luceus, & ceteri fimiles. Item vtatur lacte amig. bullito, & proiecto fuper offas, vel pecias panis cum zuccaro. Item vtatur cibo facto cum lacte a quo extractum fit butirum, cum mica panis & zuccaro, vel cum farina hordei, & fimilibus

& iuuat eos etiam poma cocta fub cineribus cum zuccaro miniftrata, & lactuca coctę cum pul. gallinarum, iuxta tenorem vltimi cano. Et fcias iuxta tenorem. 13. cano. & fecundum autores nostros, quod lac eft de rebus magis iuuantibus eos. Vnde lac fit mulieris bene nutritę bonis cibis frigidis & humi. & fumatur ab vbere iuxta doctrinam. 14. cano. Si hoc noluerit fumere vtatur lacte alina, vel faltem caprę quę nutriatur herbis frigidis, & humi.

Et quando miniftrari debet ifta anima fia fit propę infirmum, & quanto citius poterit calidum ab ore fumatur de mane, & poftea fuper dormiat. Et lac a quo extractum eft butirum iuuat eos, & quia in ifto quarto libro iam fecimus mentionē de adminiftratione lactis, ideo recurramus ad capitulum quartum quartilibri ad curam malę complexionis ficcę stomachi. & fac ficut ibi docetur.

Balneum comperit aquę dulcis non multum calidę quia multum calida multum calefacit, & multum deficcatur, fed fit aliquali ter caliens tepiditatem, & cibo digefto in ftomaco ponatur in tina plena tali aqua fcilicet dulci in aqua fuit coctę her. frigida, & hu. & non fudet dicit Aui. fed post exitum a balneo vngatur cum oleis frigidis hu. ficut eft oleum violę & nenufa. Et vult Aui. quod in exitu a balneo, vt humiditates per poros non exhaleant, fpar-gatur paulatim aqua quę nō fit multum frigida, ficut eft aqua æftatis quę aliquali ter fit tepida per calorem folis, & in tali aqua pannus lineus fit madefactus, & liniatur inde corpus simul. deinde fter in lecto fine calore, & fine fudore. Et dicit Aui. quod fi ante balneum mulgeatur fuper corpus eius lac, efflet bonum, & post exitum a balneo, & in vnctione cum dictis oleis capiat aliquid iuffellum de rebus humectantibus: fic eft iuffellum paruarum adiu, & gallinę, & fimilium, & fic fter in tranquillitate, & fomno fine anguftia, & triftitia, & fine ira, & fine labore, & poterit vinum clarum fubtile cum multa aqua non tamen immediate post lac. Et caueat a fudore nifi efflet feb. putrida. Et caueat a ftebotomia & purgatione, quia ifta fe fine vitio hu. eft.

Condefcendendo ad apothecam fit talis firus ad infrigidandum, & humectandum ethicos. Rec. summitatum papa. al. foliorum lactuca portulacę enal. fcariolę hepaticę. ana m. r. 4. feminum frigidorum mi. fe. malua, & malua uifci ana. dram. 3. iuiub. febeften palliatum mund. ab arid. liquiritia raf. ana. vnc. r. & fe. rof. ru. florum viol. & nenufa. ana. vnc. r. zuccari albiff. li. 2. & fe. fit firus quę vtatur frequenter cum aqua hordei. Et fi aliqua fpecies fe. putrida efflet ibi commixta, poffunt addi ifta aperitiua hordei, Et fi aliqua fpecies fe. putri-

purida esset ibi commixta; possunt addi ista apertiuia vt est cicorea gramen & rad. & se. brn sci & se. frigida mi. in maiori quantitate.

Sumat etiam de isto electuario. Recip. pul. papa. pul. diapenid. sine speciebus vel diadraganti pulueris triasand. pul. elect. resumptiu. ana dram. 2. conseruæ tortucis factæ per frustra id est coonseruæ resudinis memorialis conseruæ ros. & viol. ana vnc. 1. conseruæ nenusi. vnc. semis zuccari panis. lib. 1. fiat mixtum ad modum zuccari rosa. vel potest fieri in tabulis sed non tantum valet; quia virtutem ignis si tamen sit in talibus fundatur zuccarum cum aqua ros. & end. In isto casu valet sirupus de papa. & viol. & ros. Erindigemus in isto casu magna cordis infrigidatione. quia in ista febr. cor principale subiectum cum alijs membris radicalibus. ideo valent principaliter illa, quæ refrigerantur cor sicut elactuarium diamargariton sine speciebus, & sicut margarita vtrunque, & vtraque corallas, & iacintus smaragdus, & ceteri lapides pretiosi ros. camph. viol. sirupus viol. nenusi. ros. & c. Ista confectio valet in ethica, quæ non multam calefacit, & nutrit abundanter. Rec. fisticorum pinearum pistacearum amigd. dulcium. ana vnc. 14. se. frig. maiorum mund. ana vnc. se. pass. mund. ab abarrill. vnc. 1. se. maluz, & bismaluz, & citonij, & bombacis mund. se. papa. al. ana dram. 2. incorporentur omnia cum zuccaro, & vtatur pa. Panperes enim non possunt abundare pecunijs, ad multa medicamina habenda, sed istis lenibus gubernentur.

Istud vnguentum, quod sequitur valet multum si pectus, & latera vngantur. cum eo non calido sed sic est. Rec. cerealæ nouæ quart. 1. olei viol. li. s. butiri sine sale. unc. 2. liquefiant omnia simul ad ignem, & postea colata in mortario proijciantur; in quo stylactis mulieris puellam lactantis, & parturientis li. s. gummi arab. dragaganti infusorum in aqua ros. ana. unc. s. camphoræ dram. duas ducantur tantum in mortario donec fiat vnguentum albissimum, & valet in ethica & phrifi & in marasmon. Magister Bern. de Gordonio ponit aliam formam vnguenti. Recip. medullæ cerui, & vituli butiri sine sale. axungie gallinæ recentis dragaganti gummi arabici infusorum olei nenusi. olei viol. olei de cucurbita olei de salice ana. vnc. 1. ceræ al. quod sufficit fiat vnguentum bonum est, verum tamen illæ medullæ & axungie sunt calidæ, sed post infusionem mittantur in mortario in quo sit aqua ros. & lac muliebre, & erit melius, & magis frigidum.

Magister poncius de sancto Egidio ponit hoc electuarium. Rec. candi penid. ana unc. 3. pinearum pistacearum amigdalorum dulcium

seminis papa. al. seminis bombacis maluz bit. maluz, & citoniorum bene albi est rubei troscilorum diatodon dianthos ana vnc. semis seminis lactucæ, & portulacæ quatuor seminum frigidorum maiorum mundatorum ana vnc. 1. ros. mirtilorum omnium mundatorum ana vnc. 1. ros. mirtilorum omnium sand. spodij. rasuræ eboris ossis de corde cerni, blactæ bisancti coralli albi, & rubei ana drachmam vnam, sirupi de papa. quod sufficiat, fiat ad modum opiate. Prevalent alia supradicta electuaria, quia in isto multa calida, & sicca ponuntur & c.

De marasmon.

Cap. XV.

Ethica senectutis est marasmon, seu tabefactio totius corporis ex dominio malæ complexionis sicæ sine febr. Nam marasmon consumatio interpretatur. 9. de inte. c. 2. in fine capituli. vnde marasmon interpretatur tabefactio seu arefactio corporis, & humiditatum substantialium secundum Galenum. 8. de causis pulsuum.

Causæ Ethicæ senectutis. Et primo ponantur causæ primitiue.

Prima potest esse potus aquæ frigide, stomacho stante ieiuno, & debili vel si assumeretur post immoderatum exercitium virtutem debilitans, & poros aperiens, & calorem naturalem resoluens. Propter quod aqua potata cito attrahitur ad viscera totum corpus refrigerat. Alia causa primitiua potest esse nimia caliditas aeris. resoluens liquefaciens humiditates substantiales corporis propter quod calor naturalis resoluitur & debilitatur, immo destruitur, & frigiditas & siccitas subintrant & c.

Causæ antecedentes sunt debilitas, calor naturalis, & virtus nutritiua non in ultimo debilitata adhuc existens. Alia causa possunt esse mali vapores frigidi eleuari ab aliqua materia frigida in corpore existente qui vadunt ad cor, & ipsum infrigant. Alia causa antecedens potest, esse resolutio caloris naturalis non ultimata; sed si continetur, efficitur causa coniuncta.

Causæ coniunctæ. Prima est mala complexio frigida dominans in corpore cum debilitate totius corporis. quia prohibet virtutem digestiuam, & nutritiuam a suis operationibus, sicut accidit in fine senij. Similiter superflua infrigidatio facta cum potibus, vel medicinis, vel emplastris in patientibus febres. Similiter consumptio, & resolutio caloris naturalis, & similia his.

Signa ethicæ senectutis ponit gal. in 4. lib. de causis pulsuum in c. 10. dicens quod in ethica senectutis quæ est sine febre pulsus est parvus, & rarus. Et Avicenna addit quod est tardus. Aliud signum

grum est arefactio, & exiccatio corporis mani-
festa, & non adest calor, immo ut plurimum
reperiuntur frigidi in tactu ut plurimum vri-
na est, alba subtilis aquosa. Et isti in dispo-
sitionibus suis sunt sicut senes decrepiti.

Iudicia in ethica senectute. Primo dicit Au-
cen. quod huic egritudini postquam est confir-
mata non est cura. Et si ei esset ingenium cura-
tionis, similiter esset ingenium curationis mor-
tis in prima sen. 4. c. proprio.

Curatio ethice senectutis si curari debet
curatur cum calefacientibus, & humectanti-
bus. Et humectatio fit cum cibus, & potibus
calidis & cum balneis aque dulcis sicut dictum
fuit superius. Insuper secundum Auicennam
fiat humectatio cum clysteribus humectatiuis
sicut est clystere factum cum brodio capiti,
& pedum arietum, & ouium, & cum clysteri
facto ex colaturis factis ex caponibus, galli-
nis, & phasianis, & perdicibus. Nam dicit rosa-
rius, quod quando aliqua colaticia vel iura
nutritiua in liquida substantia per partem infe-
riorem iniiciuntur per modum clysteris, non
mirum si stomachus attrahat aliquid ad dige-
gerendum, & nutriendum, vel forte ipsa inte-
stina aliquam digestionem dicto clysteri ope-
rantur & per venas melaericas ad hepar mirt-
untur aliquae partes ad nutritionem & cor-
poris humectationem, & cum hoc humectat
viscera, nec in talibus ponendus est sal nec spe-
cies, timendo mordicationem & subitum exi-
tum. Et quantitas clysteris sit, l. i. f. & offerat-
ur quater in die naturali. Lenis autem frica-
tio post refectionem inuat. similiter lac coctum
cum lapidibus valet multum, & sicut mel est
inimicum habentibus ethicam, sic est iuuati-
um habentibus ethicam senectutis. Et inuat
eos omnis cibus humectans facilis digestionis
in quo non est viscositas, sicut iura carni-
um, & aqua carnis, & vitella ouorum forbilia. Et
vinum subtile odoriferum in digestibili quan-
titate confert eis, etiam emplastra, & vnguen-
ta dicta in ethica tamen attineant calidi-
tati conferunt eis. Cauenda frigida exteriori
& ab illis quae humiditatem consumunt.

Declaratio in se ethica.

Primo notandum quod species se. ethice
apud latinos non habent nomina specificata
sicut habent multae aliae aegri, ut est dolor capi-
tis hydropisis lepra, & egritudines renum, &
intestinatorum. Et causa istius est quia, ut pluri-
mum prius venit ad secundam speciem ante-
quam cognoscatur, & fortasse ad tertiam.

Secundo queritur quare in ethica non ita-
cito consumitur cambium vel glutinum sicut
ros. Dico quod ros est subtilioris substantiae,
ideo citius consumitur, ideo ad consumptionem
eius sequitur prima species ethice se. si-

cut dictum fuit in iudicijs. Alia causa est quia
natura, & est magis preparata ut fiat membrum
cambium, & glutinum sunt magis digesta, &
preparata ut fiat pars membri quam ros ideo
diligentius a natura custodiuntur, ideo tardius
consumuntur.

Tertio scias, quod dictum fuit superius in
cura particulari quod post balneum aquae cal-
idae vngendi sunt cum oleis, & vnguentis fri-
gidis. Et causa istius est, quia per calorem ba-
nei pori aperiantur & humiditas nutrimentalis
attrahitur versus partes exteriores, & tunc
quia pori sunt rari, aperti tales humiditates
subtilitate exhalarent, nisi fieret pororum clau-
sio cum unctione oleorum, & vnguentorum
frigidorum vel cum roratione aquae quasi fri-
gida. Per ista enim pori clauduntur, & humidi-
tas nutrimentalis ingrossatur, & in substan-
tiam membrorum conuertitur. etiam corpus
infrigidatur & humectatur.

Quarto scias quod Gal. in lib. de mala com-
plexione diuersa in col. 5. concludit quod ma-
la complexio diuersa est quandoque causam
lae complexionis adequatam. Tunc enim mala
diuersa est, in termino suae actionis quando
mala diuersa est introducta, & dicit haec verba.
Cum autem omnia prima corporis mem-
bra integre, & perfecte sunt calefacta. dicitur
illa febr. ethica quae est fixa, & hoc ideo quia
do eius essentia tunc non consistit in humidi-
tatibus id est humoribus, & spiritibus tantum
sed est praeter hoc in corporibus quibus adest
fixio, & cum hac se. non est passio nec dolor.
Et estimat pa. quod nullo modo sit in eo fe-
bris, quoniam non sentit caliditatem. haec ille.
Ex istis dictis patet quod in ethica licet sit su-
percalefactio in humoribus, etiam in membris
radicalibus, tamen se. non sumit nomen nisi
ab illis quibus subiectiue, & principaliter su-
datur. Si enim spūs primo, & principaliter su-
percalefiunt sic erit se. effi. & si hu. sic erit febr.
humoralis. Si membra principaliter supercale-
fiunt, erit ethica. Ita quod quamuis in vna
quaque omnia ista tria scilicet spiritus & hu-
mores & membra radicalia supercalefiant, ex
aliqua se. tamen illa se. non habet nomen nisi
ab eo in quo subiectiue, & principaliter inest.
Ideo contingit, quod nulla febr. cuiuscunque
speciei sit potest dimittere feb. effimera post
se, quamuis effi. post se possit dimittere alias
duas species, & c. quia non est verisimile quod
membra radicalia supercalefiant quin spiritus
& humores prius calefiant, & inflammentur
non tamen subiectiue, & principaliter. ideo
quando vna est non est alia, nec omnes simul
existunt.

Quinto dicit Gal. in mech. parti. 6. col. 1. qd
se. effimera debeat in aliam se. mutari, muta-
bitur

bitur in putridam, vel in ethicam: sed hoc fit ut plurimum in calidis, & siccis corporibus. Si medici errent in regimine eorum cum abstinencia, & negligentia humide diete. Primo mutatur in acutam postea in ethicam. In calidis vero & humidis, quia sunt putrefactioni parati: effimera mutatur in sinocham præsupposito prædicto errore, & quod permaneat. Et si non curetur ut oportet aut moritur aut in ethicam mutatur. ubi supra.

Sexto nota, quod ethica per se sola est sine vitio alicuius hu. Et ideo nec flebotomia nec purgatio ei competunt, nisi esset composita cum putrida: tunc enim potest utrunque competere. Sed tunc dubitatur quomodo mala diuersa, & mala equalis simul esse possunt in eodem subiecto. Dico quod sic quia ardentibus lignis solidis adhuc stupet in concavitatibus eorum contentæ & inflammatae possunt simul ardere & inflammatis stupis, vel arstis ligna solida remanent inflammata: similiter nec sudor eis competit nec artificialis euacuatio eis competit, nec exercitium.

De sudore. Cap. 16.

Propterea quia febr. aliquando ad bonum aliquando ad malum per sudorem terminatur ideo bonum est quod post declinationem febr. de sudore fiat mentio. Vnde sudor est humiditas exiens a corpore per poros cutis facta ex vaporibus a corpore resolutis iuxta corporis superficiem condensata. Vel dico cum Gordo. quod sudor est vapor humidus ab interioribus resolutus iuxta corporis superficiem condensatus. Sudor sicut ceteri effectus habet quatuor causas, scilicet materialem, efficientem, formalem, & finalem.

Causa materialis sudoris est materia, vel humiditas vel hu. in membris, & eorum porositatibus existens.

Causa efficiens est calor dissoluens & conuertens talem humiditatem in fumum siue illa caliditas sit interior siue exterior.

Causa formalis, est frigiditas condensans illum vaporem, vel fumum iuxta cutem & illa frigiditas non est absoluta, sed comparata. Videmus enim, quod in alembico quamuis sit calidum vaporem rerum distillabilem condensari.

Causa autem finalis est, purgatio corporis a superfluitatibus, ut per eas actio nature non impediatur.

Causæ sudoris quædam sunt primitiue quædam antecedentes, & quædam coniun-

ctæ. Primitiue sunt, sicut nimia caliditas aeris nimius labor maxime in tempore calido balneum & insufflatio venti australis. Magna coopertura pannorum, vel plumaceorum, vel pellium.

Causæ antecedentes sunt hu. vel humiditates in corpore existentes.

Causæ coniunctæ sudoris est fortis calefactio, & subtiliatio illius humiditatis, & ingrossatio eius sub cute & raritas, & apertio pororum per quos exit, quia si essent clausi aut constipati, ut accidit in hydropisi nunquam exiret sudor. Dicit Constan. quem sequitur Gord. in isto quod sudor est duplex; quidam est naturalis qui fit à bona, & perfecta crisi, vel in diebus iudicatiuis, & in exercitijs temperatis, vel in tempore æstiuo. in tali enim sudore nocitiua expelluntur & non vtilia, & iste est cum bona tolerantia, & alienatione. Alius sudor est innaturalis & diaforeticus & synthematicus, ut apparet in nimijs doloribus & in morientibus.

Signa sudoris.

Primo si sudor sit multus; multitudo materię aut eius aquositas, & subtilitas significatur & fortitudo virtutis liquefactiue, & expulsiue & significatur raritas pororum. Paucus autem sudor est signum paucitatis materię, vel viscositatis eius & grossitiei: aut significatur debilitas virtutis.

Sudor autem rubens signum est, domini sanguinis. si citrinus cholera significatur: si albus phlegma: si niger melancholia.

Tertio autem fetidus corruptionem & putrefactionem humorum significat. Similiter possunt notari singularia per saporem: quia dulcedo eius significat san. &c. amaritudo choleram & sic de alijs.

Iudicia in sudore.

Primo iudicat Hippo. Sudores febricitantis si ceperint boni tertiani quintani septimi, & qui in nonadie, & undecima, & decimaquarta, & vigesima, & vigesimo prima, & vigesimo quarta, & vigesimo septima, & trigesima, & trigesima prima, & trigesima quarta, & trigesimo septima, & quadragesima. hi sudores egritudinem iudicant: qui vero non ita sunt: dolorem significant, & longitudinem egr., & conuersionem. quarto. amphorif. amphor. trigesimo sexto omnes isti dies sunt critici. Et sequitur in commento non solum sudores, sed etiam egestionem multam, & urinarum quantitas, & apostemata post auricles laudabiles sunt si in diebus criticis appareant. Et sequitur in eodem commento. Morbi enim hos terminos transeuntes non crism cum sudoribus sunt facientes nec cum egestionibus.

bus, sed potius cum dissolutionibus paulatim exeuntibus, vel cum apostematibus, hæc ille.

Secundo indicat Hippo. per sudorem. sudores frigidi cum acuta quidem fe. facti mortem significant. Cum molliori uero fe. longitudinem egritudinis significant. 4. amph. ampho. 37. causa est, quia significat, quod multa & quod calor naturalis est extinctus, vel propinquus extinctioni.

Tertio ubi in corpore sudor ibi narrat egritudinem. 4. amph. ampho. 48. Et causa istius est, quia si materia morbi spargatur necesse est totum corpus sudore purgetur. sudor enim nihil aliud est nisi purgatio nature a nimis superfluitatibus: tunc crisis esse probatur bona. Aut humiditas morbo cogente a corpore dissolvitur, quod quando fit ex solis locis est, ubi regnat infirmitas. Gal. in com. eiusdem.

Quarto docet Hipp. iudicare per sudorem sine fe. sic multus sudor ex somno sine aliqua causa manifesta factus. Significat quoniam corpus plurimo cibo utitur. Si vero cibo. non accipienti hoc fit. significat quoniam enacuatio ne indiget. 4. amph. amph. 41. Et sequitur in com. Si enim ex cibis est facile soluitur. Si autem ex humoribus euacuentur. Multus enim labor & fatigatio sudorem facit ergo quando in humoribus, vel cibis digerendis laborat natura. fit sudor necessario. Et sequitur in fine commenti. Multus enim sudor duobus modis fit aut ex multo cibo ante morbum accepto quæ est causa huius materie: aut ex cibi in morbo assumpti multitudine quæ si fuerit ante morbum purgetur. præsens vero abstinentia corrigatur, ibidem. Ex isto habes quod repletio antiqua scilicet humorum corrigatur per purgationem, & nouella per abstinentiam.

Quinto febricitanti, omnis sudor superueniens non deficiente fe. malum: prolongatur enim morbus & humores multos significat. 4. amph. amph. 56.

Sexto docet Auicenna. 2. fen. 4. tract. 1. & post multa verba dicit sic. Sudor interceptus malus est, & significat longitudinem ægritudinis propter multitudinem materie, & non conuenit habenti eum. flebotomia nec solutio ventris propter debilitatem suam, immo clisteria leuia. Et quando post sudorem non venit leuitas non est bonum signum, & si facit augmentum in ægritudine est malum signum: posito quod fit per totum corpus. Sudor festinus in principio egritudinis est malus: quia significat multitudinem materie, nisi causa in eo sit humiditas aeris, aut propter pluuiam multam tunc est minor malitia. Auicenna. capitul. de signis sumptis ex parte

sudoris.

Septimo dicit Hippo. In sudore rigor malum est. 7. amph. amph. 4. Et Gal. dicit in com. quod accidentia crisis non facientia crisis, sunt signa crisis discrete. id est male terminationis sue mortis cum natura in his sit præterita ita, ut morbum fugiat. unde rigor in sudore malum est. hæc ille. Cum isto ampho. concordat Auicenna. in loco all. sic. Et quando cum sudore horripilatio accidit, non est bonum immo malum, quoniam horripilatio significat expulsionem hum. mali nocentis, in corpore, & illud significat, quod sudor non mundificat immo mouet de hum. malis illud cuius acuitas est fracta &c. & significat, quod ibi est multa materia.

Octauo quia fe. ut plurimum criticant per sudorem, ideo ponamus hic conditiones bonæ crisis, quas ponit Gale. 1. ampho. comm. 20. ibi. Ea quorum crisis fit, & quorum facta est &c. Prima conditio est, quod fiat cum purgatione & non cum apostemate. Secunda est ut purgentur hu. nocui qui sunt causa morbi. Tertio quod fiat alteratio morbi. Quarto, quod fiat cum alleviatione patientis. Quinto quod fiat post apparitionem signorum curationis. Sexto quod fiat in die critica. ubi supra fuit allegatum.

Nono in ordine dictorum iudicat Auicenna. cap. vlti. all. & dicit sic. quando debilitatur virtus & pulsus & sudat frons parum, est signum magnum, si vero cadit pulsus, est signum mortis. Iudicat Auicenna ibidem de sudore ad bonum, & dicit quod sudor bonus cui conuenit, ut sit per ipsum crisis completa, est ille, quæ fit in die critica, & est communis toti corpori abundans super ipsum, & alleviatur infirmus, & sequitur in bonitate: illi qui non est, per totum corpus, & succedat leuitas &c.

Curatio sudoris.

Primus can. generalis non remouetur sudor donec materia sit perfecta purgata, & eger sentiat alleviationem manifestam virtute stante fortis.

Secundus ægritudinibus consumptiuis sicut est. ethica. & phthisi non competit sudor.

Tertius est Constantinus in viatico sic. cum autem sudor adeo augmentatur: ut inde virtus debilitetur, oportet ipsum restringi. Restringatur ergo sudor discooperiendo corpus, vel minuendo coopertorium, & si sit ex nimis cibis assumptis, inducantur ieiunium & abstinentia. Et si propter corporis repletionem, digeratur & purgetur hu. peccans ita quod fiat diminutio in hu. superabundantibus quæ sunt materia sudoris, deinde vnga-

ungatur corpus cum oleo ros. & oleo aenusa. & salicino, & oleo citoniorum, & quolibet per se, vel simul mixtis. Vel sit sic. Recip. rosa vnc. 2. sand. ru. balau. vnc. 1. gallarum frondium mirthæ. ana vnc. 1. coquantur omnia in aqua quibus lib. aquæ vsque ad tertiam partem & coletur & addatur olei ros. lib. 1. & coquantur iterum donec aqua sit consumpta: & de isto oleo frigido vngatur pa. maxime pectus, & latera. Et poter de sirupo ros. vel iulep cum aqua frigida stibelletur cū stibellis: vel aspergatur pectus & latera cum panno in aqua frigida madefacto, & dormiat solus in lecto duro & sit male coopertus.

Si autem volumus sudorem prouocare co-operiat se bene pa. & ponat caput infra co-operimenta & anhelet infra & ponat cucurbitam plenam aqua calida ad pedes, vel ad latera. Et aliquando vngatur par. cum oleo camo. & laurino vel vino & vngatur dorsum & totum corpus. Item piper & cinamomum calamus aromaticus reuponticum piterum reubar. costus cassialig. carpobalsamus sansuccus succus mentastri mixta, vel separata bulliant in oleo vngatur vt supra dictum est & prouocabitur sudor. Vel sit suffumigium simbrisis protensis cum castoreo, & calamento & carpobalsamo, & se. vrticæ & carui simul tritis vel coquantur herbæ calidæ in olla: & fumus sedendo in sella perforata recipiatur. Mentastrum teratur, & succus eius bibatur cum aqua mellis. calefacit fortiter & educit sudorem. Haly. de regali dispositione, vel fiant balnea & stuphæ dictæ in spasmo & paralyti. & sic sudor prouocabitur Deo dante. Alius modus est prouocandi sudorem quem modum pro nunc dimitto.

Declaratio in sudore.

Primò sciendum secundum Hyppo. 4. amphi. amphi. 42. quòd sudor multus calidus, vel frigidus superfluens suppleante signa digestionis & non in die critica; talis enim sudor si sit frigidus, significat longiorem egritudinem; calidus vero minorem designat. Et sequitur in commento. Cum ambo multos humores significent, frigidus frigidus, & calidus calidos. Vnde huiusmodi calidus minorem designat infirmitatem. frigidus vero maiorem designat egritudinem, quia multam materiam cum paucò calore ostendit, e contrario verò calidus sudor multum calorem cum pauca materia, & ideo minorem ostendit egritudinem, vbi supra.

Secundò intelligendum secundum quod dicit Gal. in primo amphi. com. 15. præternaturam, quia si cursus corporis est auctoritate. Diascori. & ipse probat quòd sudor est secundum cursum naturæ & natura dominans ip-

sum vicerit nò ad cutem superfluitas cibi madatur sensibiliter. Sudor enim in laboribus & nimijs exercitijs, vel caloribus extra naturam fit & fagationibus. hæc ille.

Tertio nota quòd Hypp. primo prognosticorum cano. vigesimonono docet prognosticari per sudorem sic. Sudor bonus & laudabilis existit si in die critica fit & agrum liberat. Est etiam bonus qui fit in toto corpore, & eger ex eo liberatur & sanior, & fortior efficitur. qui vero nihil horum fecerit, id est inuultis. Frigidus autem est malus peior si in ceruice, & in capite solo. in acuta quidem egritudine mortem significat, cum lenta vero prolixitatem significat egritudinis. Et Gal. in commento dicit quòd ille qui fit in solo capite & ceruice. quamuis sit calidus est mortalis. idem dicit Auicenna.

Quarto dubitatur quomodo cum acuta febre potest venire sudor sicut dicitur in secundo indicio auctoritate Hypp. Dico quòd Gal. in dicto commento ponit quomodo hoc potest fieri dicens sic, quod sudor frigidus non emergit ab illo loco in quo est calor febrilis, quia si ibi necessario est calor febrilis, necessitate sudor calefieret, sed cum sudor exit per cutem, quæ si sit frigida, necessario sudor exiet frigidus in interioribus calefcentibus. sudor igitur frigidus in egritudine acuta fit, sicut cum humalibubi putrescit, & cum hoc calor naturalis deficit, & febrilis non potest venire ad extrema corporis propter oppillationes. vel propter aliud cum agit in illis & conuertit aliquam partem eorum in vaporem, ille vapor veniens ad superficiem corporis, & cutis inuenit ibi frigiditatem & ingrossatur & exit, vel exit primo & post ingrossatur in cutis superficie, & intellige, quòd iste sudor non infrigidatur tantum sub cute quin exeat per poros qui adhuc sunt aperti ratione caloris febrilis præcedentis: sed quando est super cutem infrigidatur.

Quinto clarificat Gordonius dicens quòd si sudor venit ex causis intrinsecis vt plurimum venit de nocte & magis in hyeme & magis in dormiendo, quia in istis calor naturalis est fortior. Si autem venerit à causis extrinsecis, magis venit in nigiliis, & in estate & in die. Et dicit Auicenna, non fit sudor frigidus nisi iam ceciderit caliditas innata. quare non conseruat humiditates immo separatur ab eis, & sudor primo venit in parte anteriori: quia pars calidior est secundum ipsum Gor.

Sexto nota, quòd si in die indicatiua natura facit aliquam similitudinem sudoris & in die critica sequenti non venit ille sudor circa finem status: quia natura est sopita & negligens tunc medicus debet incitare & iuuare naturam in prouocando sudorem quia coadiuto-

res nature sumus.

Quinto nota quod postquam homo sudavit per bonam pausam & volumus quod amplius sudet: debemus paulatim abstergere sudorem, ne sudor remanens super poros cutis claudat eos, & hoc fiat ter vel quater suauiter cum panno calido sine euentatione: & sudet usque ad fatigationem sudantis, sententia est Aui. c. simili de accidentibus febrium.

Octavo scias sicut dicit Aui. in secunda fen 4. in iudicijs sumptis à sudore, quod ista signa distinguuntur aliquando per tactum: vt si est calidus vel frigidus: aliquando per calorem: aliquando per quantitatem &c. Vnde scias q in bona crisi debet venire sudor calidus per totum corpus & debet continuari equaliter usque ad finem terminationis. Aliquando sudor est multus propter consumptionem humiditatis subtilis, vel propter calorem fortem resoluentem humiditatem in corpore: aut propter multas humiditates in corpore aggregatas aut propter raritatem corporis, & pororum cutis, aut propter fortitudinem expulsiue & debilitatem retentiue. Sudor autem parvus fit propter causas contrarias istis.

Item per tactum: quia aliquando sudor est frigidus. & tunc significat humores & extinctione caloris innati. Et si apparet in morbis acutis: mortem significat. Et si in morbis chronicis, vel lentis longitudinem morbi signat. Calidus autem significat humores calidos & abbreviationem egritudinis. Et ista debemus considerare: si veniat in principio egritudinis vel in diebus iudicatiuis. Et per colorem similiter distinguitur, quia albus dominium phlegmatis ostendit, & rubens dominium sanguinis, liuidus melancholiam: croceus, vel citrinus choleram. Similiter ex parte odoris: quia foetidus corruptionem significat equalium humorum. Ex parte similiter saporis, quia eius dulcedo dominium sanguinis, amarus choleram: ponticus melancholiam, & stipticus similiter insipidus phlegma salsum. Ex parte substantiae seu liquoris: quia viscosus & grossus signat humores grossos & viscosos subtilis attestatur super humores subtiles: & intellige quod aliquando pori sunt ita aperti: & sanguis ita subtilis quod si iste sudet & sudor abstergetur cum panno lineo, ille sudor videtur sanguineus.

N I C O L A I

N I C O L I

De Febribus Epitome.



Febris quid sit.



FEBRIS, ut ait Auic. 4. primi est calor extraneus accensus in corde, procedens ab eo mediantibus sanguinem, & spiritu per arterias, & venas in totum corpus ita, quod noceat naturalibus operationibus. & Gale. in lib. de mala complexionibus dicit, febris est morbus in complexione non frigida, nec humida, nec sicca, unde calida, & siccitas sequitur calorem. caloris autem præternaturalis duplex est differentia. alia quando egreditur mensuram caloris naturalis: alia quando egreditur naturalitatis proprietatem, per quam non existit conueniens instrumentum virtutis, licet sit in gradu non excedens, ut sit in febre pesti. cuius calor sepe est remissior naturali, tum per suam malam proprietatem occidit, & calor extraneus faciens febrem non est præternaturalis per mensuræ excessum; quia iratus febricitet, sed per proprietatem malam; quæ dicitur improprio. & hæc ab Isaac. Auic. autē 5. volūquit, duplex est calor innaturalis: vnus, qui omnino est præternaturalis, & vitæ oppositus, qualis est cadauerum, & membrorum corruptorum: alius est innaturalis secundum quid, qualis est, qui est medius inter naturalem & præternaturalem absolutè. & hic habet similitudinem, secundum quam talis calor innaturalis ponitur sub triplici gradu innaturalitatis, quorum vnus est versus latus caloris naturalis in primo gradu innaturalitatis, qualis est calor innaturalis extraneus vitæ mensuræ illius, & hic non nocet operationibus, vel non omnibus: alius est versus latus caloris, qui omnino est innaturalis, qualis est in extremo extraneitatis proprietatis caloris innaturalis versus summum, qualis est calor febricitii putridi in hora mortis. aut qualis est calor membri existentis in via cor-

ruptionis, ut in herpete, vel cancro: & tertius est medius inter duos dictos, qualis est calor febris, maxime febris salubris. & de duobus ultimis dicitur calor innaturalis in definitione febris positus. de medio loquitur Gal. in 1. de Diff. & ait, qui est sicut semiputredo, quæ est media inter sanie, quæ ad bonum est simpliciter in genere suo, & putredinem omnino ad malum, quare calor febrilis videtur tenere medium inter naturalem, & absolute præternaturalem. verum tamen febrilis calor alius, ut ait Gal. leuis est, & facilis, alius fortissimus, & quasi igneus, & alius inter hos, sed omnis est extraneus naturam.

De febris subiecto.

Primum subiectum febris est calor, secundum est totum corpus. unde Auic. inquit de eph. cum caluit aer, & peruenit ad cor, fit febris, deinde per totum corpus spargitur. hic calor non necessario est in omnibus cordis partibus, sed in spiritus, vel humore, vel substantia, vel alio proportionabile, & semper simile cordis ventriculus peruenit ad calorem febrilem. primo, quia est calidior, & magis aptus inflammationem sanguis est subtilior, & nature spiritus vicinior, & mouetur motu continuo. Quidam improprie assignant febrim tertium subiectum, & est membrum; a quo causa febris prius manifestatur, vel est tamquam in minera, vnde eph. ex sole caput, in putrida sanguis, aliquando hepar, in phleg. stomachus, & in melancolica splen.

Calor febrilis quomodo consideratur.

CALOR extraneus est qualitas visibilis, improprio proportionabilis cordi, in quod cum imprimatur mutat calorem naturalem à sua naturalitate, & distemperat, hæc Isaac, & calor febrilis ait Auic. defertur in totum corpus, nisi sit quid prohibens quantum ad calorem febrilis intentionem tantum in putrida non est semper necessarium: calorem febrilem expandi ad membra per vapores.

rem putridum; quia talis vapor potest alterare cor, & non expandi, vel vapor sit paucus, potest per anhelitum expelli: vel aliqua materia pauca quantitas, sed malè vicina cordi, quæ ob malitiam causabit febrem. calor vero febrilis in spiritu prius, & sanguine posterius defertur per arterias, & venas ad totum corpus, non tamen immediate ad quamlibet partem eius, sed ad alias per præsentiam suam idest sang. & spiritus, & ad alias, ad quas non pervenit arteria, nec vena, per simplicem alterat alterando partem post partem. calor autem hecticæ in membris habitatus, & factus, existens, & inde pendens in eis, nec in eis amplius existens in produci ad sui conservationem requirit transmissionem sanguinis, & spiritus ad membra, in quibus est, & sicut calor naturalis perficit primo omnes operationes cordis, & totius corporis, sic innaturalis nocet operationibus primo vitalibus, deinde naturalibus, & postea animalibus, sed non æque omnes leduntur. Et quidam sunt parati capite magis ledi, alij stomacho. leditur operatio a calore febrili, vel per se, vel per accidens, per se, quando destemperat temperamentum membri, quod erat perfectum, operationum eius: per accidens, quando aliud membrum destemperat, cuius temperamentum requiritur ad operationes primi, ut calor febrilis aliquando ledit, generationem sanguinis destemperando temperaturam hepatis, quæ est læsio per se, aliquando ledit eandem operationem destemperando temperaturam stomachi, quo destemperato non preparat stomachus hepatis materiam convenientem, pro generatione sanguinis, unde fit mutatio in membro vivente, aut deferente virtutem, spiritum, vel sanguinem, mutant & id quod recipiunt.

Februm differentia

Febrium differentia alie sumantur à substantia, alie ab accidenti, si à substantia, vel à forma, vel à materia, in qua, si à forma, vel à magnitudine, & parvitate, vel à modo impressionis caloris in tactu sanguinis, ut pungentes manum, suaves, ardentes, vel sicce, si à magnitudine, vel parvitate consideratur quantitas caloris, & qualitas. quantitas est subtilis caloris, veluti vaporum calefactorum, qualitas est gradus estenuati, vel remissi idest secundum magis, vel minus, quæ non sunt specificæ differentia. magna, & parva febris triplicem habet modum: primus quando est magna in quantitate, & qualitate caloris, ut tertiana, continua, & phlegmatica è phlegmate falso aut contrà parva, ut ephemera, secundus est magna in quantitate, & non in qualitate,

ut, ut synoca inflata, tertius quando est magna in qualitate, & non in quantitate, ut causon, contra parva magna etiam dicitur, quæ perseverat. mediocris est, quando pro aliquo tempore habet magnam caliditatem, & pro aliquo parvam in quantitate, & qualitate.

Corpora ad febrem parata.

Corpus aliud alio paratius est ad febrem, ait Isaac, quatuor de causis scilicet ob similitudinem in complexione, ob raritatem in compositione, ob fortitudinem agentis, & ob longam continuitatem actionis. minus aliis disposita sunt temperata in complexione, & compositione: quia fortitudo virtutis eorum resistat causis imprimentibus. verum ait Gal. paratissima est crasis calida, & sicca: quia est conformior crasi febrili. deinde calida, & humida, & proprie ad febres putridas. corpora frigida, & humida, & frigida, & sicca sunt longinquiora. idem dicendum est de sexu, ætate, & huiusmodi rebus naturalibus: non naturales ut ætas, regio calida, & sicca &c. præparat magis corpora ad febres. & primas tertias, secundas autumna, tertias vero & demum hyems.

Februm cause quot sint.

Cause febrium sunt quatuor, nam dicitur, subiectum, in quo formalis est calor extraneus, efficiens est triplex, scilicet efficiens proprie, augens, & conservans. prima est triplex scilicet primitiva, antecedens, & coniuncta. hinc coniuncta non potest esse febris sine antecedente non potest esse humoralis nec ephemera absque primitiva ad hecticam sufficit coniuncta, tamen & alie adesse possunt, causa augens, & confirmans dividitur in antecedentem, & primitivam & nulla harum ad esse febris necessario concurrat conservans vero alia est intrinseca, & est eadem cum generante vel efficiente: forma enim quæ dat esse rei illam etiam conservat in essentialia extrinseca omnino diversa ob efficientie, harum causarum alia est naturalis, aut non naturalis, aut præter naturalis, naturalis ut humor in corpore qui exit cursu naturæ in quantitate, vel qualitate: non naturalis, ut aer, præternaturalis, ut apostema, de efficientie, & augente ait Gal. sicut neque caloris, neque ignis unius est generationis, & augmenti modus, sed aut propter motum immoderatum, aut putrefactionem, aut copulationem alterius, caloris aut

sunt retentionem effusio num cholerae, aut immissionem substantiae calidae: ita febrium causae ad hos reducuntur modos, & omnis causa, quae potest generare, & augere febrem, potest & eam confirmare. primus autem qui alteratur in corpore, est spiritus, secundus humor, tertius pinguedo, quartus caro, quintus membrano sa, & nervosa corpora: tandem cartilaginosa, & ossa. Gal. causas efficientes octo numerat, scilicet premotivas, unam passivam. prima est obvia tio solis, vel ignis, & id generis. secunda cibus, & potus calidus actu, vel potentiam. tertia est medicina superfluae calida, quarta est & excita tio, & motus nimius. quinta affectus animi. sexta defectus nutrimenti. septima pororum con strictio, & prohibitio transpirationis eius, quod a corpore debet dissolui, ut sit a frigidityte. octava est causa passiva quae est extenuatio cor poris facile calorem suscipiens, finis febris est laedere operationes.

Febrium signa generalia.

Signa febrium generalia sumuntur a rebus natu ralibus, non naturalibus, & praeter naturali bus, a naturalibus ut a complexione calida, aut sicca, ab habitudine macra, an carnosa, vel pingui, ut raris texturae, vel densae, ab etate, & a sexu, a non naturalibus constitutio aeris cali da vel frigida, &c. praeter naturalis, ut an prete ritae consuetudines fuerint calidae, vel frigidae humorales, vel non, & quae propriae re gionis, an operationes sint mutatae, an aequali tas corporis in complexione, & habitudine sit mutata sine totum corpus vel pars, an aliquod exiens e corpore sit mutatum a con sucto, ut urina, egestio, & sudor. Avic. reducit signa ad novem genera. scilicet quae declarant ma gnitudinem, vel parvitatem, mordacitatem, vel suavitatem, secundum quae genus febriliu, ut tertianam, vel quotidianam. tertium quae ma liciam febrium. quartum quae digestionem, vel indigestionem. quintum quae crisin. sextum sa lutem, vel contra. septimum quae habitudi nem corporis. octavum quae tempora morbi nonum quae dispositiones febris, & ex qua spe cie fiat.

Morbi tempora.

Tempora morbi considerantur tripliciter, scilicet secundum essentiam eius, secundum quod varia tur, ut calor extraneus in febre. secundo secun dum actionem naturae in materiam morbi. respicit causam morbi. tertio secundum actio nem materiae, vel qualitatis eius in naturam, cuius effectus est morbus. essentiali calor ex traneus declarat quatuor tempora. scilicet initium

quando incipit, augmentum quando. scilicet calo r augetur &c. actio naturae in materiam de no tatur per principium, quando nondum appa rent signa digestionis. augmentum quan do incipiunt, statum quando apparet comple te, & declinatio, quando materia causa diges ta extra ducitur. initium igitur temporum uni versalium morbi est, ait Isaac quando incipit morbus, & eius accidentia paulatim veniunt quosque plura, vel omnia appareat. augmen tum cum nuntiatio complentur accidentia. postquam accidentia indicantia morbum e runt perfecta, deinde molestiora & acutiora fieri incipiunt, & durat, quosque natura, & mor bi repugnatio ostenditur. status autem hora, in qua morbus in omnibus suis partibus, manet se cundum unam dispositionem. declinatio est ab initio crisis mitigatis terribilibus accidenti bus furoribus usque ad salutem. initium vero tem porum particularium est paroxysmorum quan do caliditas est intrinseca inclusa, exterius non co prehensa apparet. augmentum, quando calidi tas ad extra panditur & manifesta, & apparen ter additur. statu quando est in totum expansa, & addita. declinatio quando minuitur, absque quia ad interiora includatur.

De febre Ephimera.

Febris ephimera fundata est in spiritu: quae in viginti quatuor horis saepe qui escit: aliquando ait Haly. videtur pervenire ad triginta & duas, & ad quadraginta & octo. parum durat, ait Avic. quia accensa in resubili est, quae velo citer accenditur, vel alij dicunt, spiritus non conservat qualitates impressas, vel talis spiri tus est influens, qui cum fiat a cibo resolvitur in viginti quatuor horis, quaeque prorogatur per accidens, quando scilicet frigus contra adveniens cordi non permittit iam resolveri. aut ieiunium triduanum, durat vero per plures horas aliquando per pauciores, vel ob multum spiritum in corde repletum, vel ob eorum facilem vel diffi cilem resolutionem, vel ob raritatem, & densi tatem corporis. spiritus inquit Viati. in quibus accenditur febris, sunt vitales primo & per se, deinde alij. Ephimera alia est vera & per se, & est quae antecedit putridam, & hecticam, alia accidentalis, ut quae sequitur apostema. hi sunt parati ad veram qui sunt calidi, & siccissimi deinde qui calidi & humidi, causae reducuntur ad quatuor genera ab Haly. serapi. Isaac. primum est quod calefacit, vel infrigidat sume. & obstructions facit, ut calor solis &c. sec. sumitur intra ut cibus calidus, ter. exercitium corporis, vel animae laboriosum, quar. apostema in collo, sub ascellis, matrice &c.

Febris ephemere signa generalia.

Signa generalia primum est, quod fiat à causa primitiua noua: secundū vrina est similis sibi sano, nec mutatur in substantia, nec cōtentis, sed in colore, fortasse, nec in odore: tertium sine rigore: quia non ab humore. quartū ait Isaac, pulsus parum mutatur: quintū anhelitus parū mutatur à naturali. sextū calor est mitis, quia est in spiritu. septimū nullum est accidens malignum, vel forte non tūm est declinatio cum sudore, vel uapore benigno, inquit Haly, si vis cognoscere, utrum febris sit Ephemera, in principio misce egnum in balneo, si nullum sentiet rigorem: est ephemera vel hectica, si sentit, est putrida, sed hoc periculum non facias nisi in assuetis balneo.

Ad aliud genus febrium permūtatur ephemera, ait Auic. quando declinatio est longa, & non mundificatur pulsus, & non recedit dolor si affuerit, nec alia acciderit, nec sudat: verū ad hecticam mutatur, si calor durat fixus & in arteriis ad tactū sentitur maior, & post cibum augetur, & pulsus magnus durus, & minor, cutis aspera, & sicca, si corpus est plethoricum, facies inflammata, & totum corpus; uertitur in synocam sine putredine, si horripilatio, uel typus; transiit in putridam, & urina est indigesta.

Curatio Ephemere febris.

Fuge causas primitiuas illam conseruantem, ac sit parum frigidus, purus, & cum floribus, & odoriferis alteratus frigidis. omne nimium fuge.

Balnea egnum per horam in aqua dulci uetus ratio sit frigida, & humida facile digestibilis & boni succi. & ad Glanc. uinum sit tenue album, nisi doleat caput, nec plethora bubo laesit. intentio huius sit duplex, ait Auic. remouere calidam, & siccam dyscrasiam, & resistere causae facienti eam.

Ex angustiis animae si fiant, motus spiritus factus est ad intra, & cōstrictus inflammatus est in corde. deinde per totum corpus expansus est calor, signum est ignea urina, & mordi cians, oculi sicci, ac profundi, facies citrina, fusca, uel uiridis, pulsus paruus debilis, & paruus durus. Cura est ut fugiat omnia exsiccantia, balneū fiat, fricetur leuiter, & ungatur oleo uiolaro, nenupharino. ait Serap. comedat cibos laudabiles, dormiat loco suauis. Porio respicit tres intentiones, primo causam, quam remouet cum lenificantibus, & secundo calorem febrilem, quem remouet cum frigidis, & humidis, lenificantibus & odoriferis, & pone ait

Auic. super pectus epithima ex mucillag. succis, & aquis boni infrigi. tertio respicit accidens quod est exsiccatio, & ariditas corporis, & compiletur cum dicta resumptiua, & electuariis &c.

Cura febris ephemera facta à tristitia, & timore sit ut supra.

Si facta est ab ira, rubet facies, & oculi tremunt ob resolutionem spirituum, inflatur facies, uox alta, urina citrina, sed non acuta, quod cholera tendit ad extra, pulsus est uelox, elatus, magnus. cura est duplex, scilicet causa ablatio & caloris febrilis extinctio. sed adā igitur primum est ira, sint delitiae ait Serap. balneum, ait Serap. & Auic. non fiat nisi post febris recessum. infunde caput postea aqua rosata, & pectus cum sandalibus, & camphora, dormiat. cibi sint frigidi, non bibat uinum, ait Haly. sed potius aquam frigidam, ait Zoar. syrup. de buglossa, & Almā. succum granati muni rob. de ribes malorum acetosorum, acetositate citri, & spiritualia epithima cum oleis, succis & aquis frigidis & odoriferis. remoue inquit Serap. acuitatem urine, da cassiam, syrupum violatum, thamarindos, & semina cominaria.

Si febris etiam à mora in aere calido, anhelitus est magnus, & frequens, corpus aridum ad tactum, urina non multum tracta, fuge omnia calefacientia, bibat aquam frigidam cum zuccharo, balneum sit ante cibum, postea unge totum corpus cum oleo rosato, & nenupharino, aceto, & aqua rosata admixtis. igitur.

Si cōuenit ob moram in balneo, sitis est intensa, & alia, quae dicta sunt de aere calido. cura quoque est similis. dormiat in aere frigido, bibat aquam frigidam, corpus mergatur in aqua tepida, in qua decocta sunt ordeum, & id gneris. deinde unge eum oleo uiol. & chamemelino tepido, bibat uinum hyemaphatum, in fine ait Auic. pone inquit Ras. super cor sand. aquam ros. camphoram, & puluerem rosatum.

Si febris fiat ab opilatione pororū, cutis haec. opilatio raro est inseparabilis, his qui febriunt ob aquam stringentium, uel ob infrigidationem, multum constipatio coexistit his, qui propter intensionem solis febriunt: medio modo se habenti hi qui propter laborem febriunt. sed qui ob iram, tristitiam, uigilias, uel indigestionem, uel bubonem, his raro sit constipatio. Si igitur cutis arida, & sicca facta fuerit à calore solis, ignis, frictionibus & id generis, & calor est acutus in toto corpore cum siti angustia, & huius. post abscissionem causae extinguenti calorem febrilem dicta, & poru, moretur in aere humido parum calido, balneum fiat aque dulcis, in exitu unge cum oleis frigidis, & humidis, q̄escat, & dormiat.
cibus

cibus, & potus humidus sit & parum frigidus, & facilis digestionis, altera calorem cum frigidis humidis cordialibus præsertim intrâ. si obstructio facta sit à frigidi, paucus sentitur ad manum, sed postea palam sit pulsus parui ob frigus extra, ueloces, & continui ob caliditatem submersam intrâ. difficultas est anhelitus, facies palida, ait Viat. frigus, & pondus in capite, catarrhus in trachea, urina ait Auic. alba. curâ est, ut remoueas causam præsentem, si atigitur exercitium. locus sit remotus à uento, & à frigore ait Haly. frictio lenis, & mollis lenis, inquit Alman. & prouoca sudorem inquit Mes. in declinatione ait Alm. ingredia-
tur balneum usque quo sudat, deinde ait Auic. ungue cum oleis aperiniuis, & anethino, chamæ. irino, & huiusmodi. cibus inquit Auic. declinet ad caliditatem, & aqua mellis valde est utilis. & Alm. uinum forte, sed limpharum.

Si febris facta sit ex balneo stiptico, curâ sit, inquit Auic. & Alman. similis curâ facta à frigore.

Si facta sit ex dimissione frictionum, cutis est mollis, grauiasunt membra, urina grossa, turbida, grauis odor, & deiectio appetitus. stet in aëre luminoso claro, fiat balneum post declinationem, & sudet in eo, fiat frictio cum fursure, & farina fabarum, & ordei, amigdal. amararum & seminis, itera balneum, absterge gradatim. da cibos frigidos, & humidos, uinum album durum, limpharum.

Si febris fiat ab agitatione, oculi stant fixi, facies citrina, curâ est similis curâ facta ex uigiliis. detur uinum album, subtile, limpharum, & prouoca somnum.

Si ephamera fiat à uigiliis, facies ut Auic. & serap. est citrina ob malam digestionem, oculi rubent, & ait Auic. grauitas palpebrarum, & inflatio, pulsus debilis ad resolutionem spirituum, & durus ob siccitatem arteriarum. curâ est, ut remoueas causam, alteres discrasiam & corrigas symptomata. i. indigestionem, & exiccationem corporis. prouoca primùm ait Serap. somnum cum embrochis super caput, frictio fiat pedum, & manuum, ut materia trahatur ad infra. cibus sit humidus, facilis digestionis, uinum sit insipidum. balneum est utile post hoc uinum limpharum.

Si Ephamera facta est à somno, somnus ante actus declarat, inflatio palpebrarum & faciei, & oculi tardi motus, urina grossa propter admixtionem superfluitatum prohibitarum resoluti in somno, pulsus plenus, mollis, corpus uaporosum, rauceudo uocis, opilatio narium, pigritia animæ & corporis. faciei decoloratio: curâ est remotio causæ, & alienatio febrilis caloris. locus igitur sit luminosus, parum calidus

& siccus. ita scilicet exercitium fiat, & frictio extremitatum. sudet in balneo, & lauetur in decocto chamæ melliloti, anethi, stricados, & similitum. ait Auic. cibus paucus frigidus, & humidus, non bibat uinum, alteret cor cum frigidis temperate, & cerebrum cum siccis temperate, cum quibus misce aliquando resoluentia uapores sine attractione.

Si ex nimio quiete fiat ephamera, corpus est uaporosum, graue, tardum, pulsus plenus, uina grossa cum multo sedimine, & plurimum non iuncta, æger letus. curâ est curâ dictæ.

Si fiat ex nimio motu, nam spiritus uniuersales accenduntur, & agitantur humores & inflammantur ob continuitatem spiritus cordis. signa sunt antecessio laboris, dolor & debilitas iuncturarum. corpus siccum, ait Auic. & Serap. pulsus, ut Gal. & Auic. est paruus, & debilis, urina subtilis, & acuta ob resolutionem attrahendi aerem. curâ est remotio, & alienatio febrilis caloris. locus sit humidus, & parum calidus, uel frigidus, lectus mollis, quies, ait Isaac. & Serap. fac odores, non calefac, nec sudet ait Alman. non balneetur ualde ait Isaac. sed funde aquam tepidam super artus, absterge, & unge oleo uiolato fricando, & Serap. cum oleo nennupharino, si hepar est calidum, uel chamæ, & de been, si dispositio sit contraria, unge collum, & caput, & spondilia. cibus ait Gal. humidus, & sæpe ait Serap. ob restorationem. uinum minus solito & limpharum inquit Serap.

Si ephamera fiat à calore solis in capite, calidum est caput, oculi sicci, uenæ temporum plenæ, oculi rubent, facies citrina, uel rubea ait Haly. urina est subtilis, citrina, aut parum rubea. curâ est similis curâ facta à caliditate aeris. sed magis uerte te ad caput. locus sit frigidus, odoret sandalos, & frigida ait Haly. & Gal. uult, quod infundatur oleum rosatum, aut omphancinum in frigidatum in puteo super commissuram coronalem usque ad declinationem. & Haly. pannum laneum in aqua rosata aceto, oleo ros. & sandalis, & iteres. idem Alman. oleum uiolatum cum lacte papaueris iubet Serap. nisi corripa adsit pluries balnea ait Auic. inquit Serap. funde super caput decoctum cannæ siccæ, florum nennupharis, & ros. in declinatione cibus sit mica panis loti cum zuccharo lactuc. portul. cocum. & id generis. potus sit succus granatorum cum zuccharo, uel iulep rosato, uel uiolato, uel aqua hordei. & nisi catarrhus auget, da carnes leues, & uinum album, limpharum.

Si ephamera fiat à fame, locus sit humidus & parum frigidus, letitia, quies, somnus multus post cibum, cibus ait Auic. frigidus, & humidus parum, & cito digestibilis. da parum,

& saepe ait Auic. & non expectes, ait Ras. Declinationem, uinum debile, limphatum, iulep, aqua, hordei cum zucharo. balneum fiet & fundatur super caput aqua repida, unge cum oleo uiolato, de cucurbitis &c.

Si ephamera à siti fiat, humecta, & in frigidam plus, da iulep uiolatum, de cucurbitis, uel nenuphar. cum aqua frigida, nisi materia sit in stomacho, da ait Auic. aquam fructuum, & granatorum, inquit Alm. cibus sit triticum multoties ablutum cum zucharo, in fine balneetur, deinde quiescat, cibetur, & bibat. prifana ait Auic.

Si fiat à cibus, & potibus calidis, urina est magis rubea, quàm in aliis ephemeris ob lesionem hepatis, ait Ser. hepar ait Constan. est calidus tactu, stomachus, & hepar, & siccatas, & incensio, os succum est, & amarum, dolor capitis, rubedo faciei, & oculorum, pulsus & anhelitus maior, cibus uomatur, si fuerit in stomacho: sin minus, fluat uenter cum lenientibus, ait Alm. aer frigidus, & non comedat, nec uinum bibat post declinationem, bibat aquam hordei, comedat non carnem, sed condita cum aceto, & granata muza, da syrupum acetosum cum aqua frigida. Si sitis infestet, da aquam frigidam, aut hordeaceam cum iulep. & ait Serap. stude hepatis cum in frigidantibus: & prouocantibus urinam, da syrupum acetosum cum uino granatorum, si cibi fuerint grossi, ait Alm. febris manet multos dies, ut synochus esse uideatur, & facit opilationes, & febres putridas, aer sit temperatus, dormiat ad cibi digestionem, deinde balnea, & nutries subtiliter, per aliquot dies non exercitentur, uinum album, clarum, lymphatum, aut syrupum acetosum, & ante fiat exercitium leue uel frictio, solue uentrem cibus onustum cum succo fructuum, Ras. iubet phlebotomiam si color est rubeus ualde, & cetera consentiant.

Si fiat à uino multo, & potente, aer sit frigidus, & humidus, frica ait Haly extrema gescat, & dormiat ad digestionem uini, & Alm. bibat aquam frigidam plurimam & robur cum frigidis paulatim, sedata febre, ingrediarur balneum, & funde super caput multam aquam frigidam, sit cibus frigidus, & humidus facilis digestionis paucae quantitatis, uinum fugiat, si in capite remanserit grauitas, & in oculis rubedo, & extensio, ait Alm. phlebotomia, & uentosectur, & soluatur cum succo fructuum.

Si fiat à med. calida seda ait Mes. caliditatem, & acuitatem cum frigidis, & humidis & inquit Alm. cum aqua frigida admixtis, ciba ante declinationem completam, ait Auicen.

Sicut ephamera, quæ sit a sole, plurimum est cerebralis, in spiritu animali, & quæ ex bal-

neo, cordialis & in spiritu uitali, sic quæ ex cibus, & medicina est hepatica, & in spiritu naturali.

Febris ephamera non uera facta primo, ex inflammatione spiritus uitalis quæ uox habet species, & totidem causas, scilicet syncopim, naurem, putridum inspiratum, uenenum, & apostema in anterioribus, cura facta a syncopi quandoque neritur ad syncopim, quandoque ad causam, quandoque ad calorem febrilem, cura facta a naure, sit aer temperate frigidus, odoriferus, ex rebus frigidis moueatur parum, non dormiat usque ad declinationem febris, & tunc balneetur in aqua simplici calida, aut in decocto rerum temperatarum, deinde ciba cum frigidis, & humidis, odoriferis, uinum sit debile, clarum odoriferum, lymphatum, deinde dormiat, & si quid caloris remanserit, extingue cum frigidis, humidis intra, & extra, si febris, fiat ex ueneno, remoue ipsum, deinde febrem, si fiat ex apostemate, pulsus ait Gal. 2. de Crisi est magnus, uelox, & frequens, calor in toto corpore non multum mordeans, facies rubea, urina ait Auic. alba, aquosa ob rapum materie ad apostema, declinatio est cum sudore. Cura est prima ad habonem, & eius causam, scilicet ad discrasiam febrilem, ter ad accidentia, fuge uinum, carnem, Serap. balneum Haly, aerem calidum, iram, motum, frictiones membri lesi, dietam grossam, & calidam, fiat phlebotomia, & fluat uenter, ait Auic. & Haly, in frigida uiam inter ipsum, & cor.

Si ephamera fiat a dolore, calor est in toto corpore, anhelitus frequens, & aliquando magnus, & uelox, aliquando contra, item pulsus, uigilia, inquietudo, urina tincta, & quandoque aquosa, cura est remotio doloris.

Si fiat ex catarrho, cura non est negligenda, ait Alm. quia sit aliquando pleuretis, uel peripneumonia, & id generis, fuge uinum, carnem ait Viac. & balneum inquit Galen. 8. metho.

Ephamera non uera facta ex inflammatione spirituum naturalium, habet nouem causas, & species. Loppilationem, nauetiam, satietatem, materiam in ore stomachi contentam, uentris constipationem, fluxum, sudorem, coitum, uomitum, medicina calagrans, humidi, opilatio ait Auic. sit in poris cutis ob ipsi similitudinem eius naturalem, & paucitatem abluitionis, & multitudinem ciborum, & ob frigiditatem, & abluitionem cum stypticis, & adustionem solis, & quandoque sit in uillis uenarum, & meatibus earum, & orificiis, & uis earum, hæc opilatio relata ad uenas est duplex una in uenis magnis, & maxime profundis.

& han-

& hanc plurimum sequitur intus spiratio, & inde putrefactio, & sic febris putrida alia in paruis, & iuxta cutem terminatis. & hanc sequitur febris ephemeræ non uera: ex his habes, quod quædam opilatio faciens febrem præbet causam materiale, ut opilatio mîscerum, & uenarum magnarum profundarum aggregans superfluitates humores, & parans eas ad inflammationem, quædam præbet causam efficientem, ut est opilatio pororum, & capirum uenarum paruarum, & arteriarum & ipsorum meatuum contiguarum simul, quæ prohibet transitionem uaporum, calorem, spiritum, & humores inflammatos.

Signa febris ephemeræ ab opilatione factæ sunt difficiliora, quia est febris humoralis, ut ait Auic. accidit enim quinque, frigus, & horripilatio, & durat usque ad tres dies, & aliquando pertransit, idem Ras. 13. com. ait & si opilatio est modica, brevis est, si multa, durat ad dies & si cum hac fuerint humores frigidi grossi, & viscosi, fiet synocha sine putredine. si corpus erit in æqualitate: sin minus, in putridam. idem ait, hæc febris accidit sine causa primitiua opilante poro cutis, sed ex cibis grossis, quorum superfluitates opilant in tertia digestionis meatus, per quos fluit superfluitas tertia, sine sudor. unde fit multa caliditas, & repletio, quare si non habuerit causam manifestam, & in primo periodo fuerit multa purgatio, erit ab opilatione carere, ait, rigore caliditas est similis ephemeræ, urina digesta, ait Rabi. in diuis. si in primo die febris erit ephimera, in secundo augetur, urina tingitur, pulsus fit uelox, & anhelitus, facies, & oculi rubet est ab opilatione.

Verum si accidentia sint magna, & forria, ait 8. comp. ephimera transitura est in synocham, uel acutam, Cura est remotio causa: opilationis, & discrasie febrilis, & accidentium. aer sit temperatus, gaudeat, moderare moueatur, fiat balneum da mellicratum cum petros. & post tres horas comedet per duas horas ante paroxysmum. sed antequam fiat balneum, præcedat euacuatio, & aperitio, & febris sit in declinatione. Si secunda accessio est minor prima, balneum fiat, urina sit digesta, & pulsus uero significet putredinem. & ingrediatur per y. horas ante paroxysmum. ubi diu moretur, nisi accidens malum adueniat, & frica cum fari na hordei, & sale. quo ad euacuationem inqt Auic. non facias aperitionem ante euacuationem. fiat phlebotomia. nam ait Gal. 8. metho. nullus febriens ex opilatione ad putredinem uenit in initio phlebotomatus. & Ras. in di. di. si rubedo adsit, pulsus plenus, corpus carnosum, calidum, & humidum tactu. & Auic.

si repletio est magna, & fiat in interpolatione uel lentitia, quia alio tempore agitareretur humores, & misceret bonos cum malis. & ait Auic. item ex altera parte si dolor accidat extrinsecus. si igitur opilatio est propter multitudinem humorum, fiat phlebotomia. si ob uiscositatem, incide. facta enacnatione aperi opilationem cum oximelle, mellicrato facto cum calamento, hisopo, origano.

Sarictas nauseatiua est duplex, una quæ ad fumosum, alia quæ ad acetosum, & hæc duplex, alia à caliditate faciente ebullitionem, alia à frigiditate calorem innatum minuyente quæ sit à caliditate, sit febris raro, quæ à corruptione cibi in stomacho, eleuantur uapores multi inflammati, qui retenti maxime in partibus stomachi, hepatis, & aliorum nutritiuorum inflammant spiritum naturalem, ad quod adiuuat materia multa, quæ ad ipsa membra calefacta attrahitur, & calefit. spiritus naturalis inflammat uitalem, & fit febris, quæ ait Gal. aliquando est cum fluxu uentris, & curatur facile, aliquando cum constipatione, quæ non sic facile uertitur plurimum in putrida præsertim si chylus corruptus transit ad hepar, & fiat chymus corruptus. ait Auic. non excedit tres dies. ut plurimum, scitur autem, quod est ephimera, quia pulsus est similis sano.

Signa huius febris sunt eructatio fumosa acetosa, foetida, grauitas stomachi. inflatio, appetitus deiectio, nausea si fumosa erit, ait Const. sitis, ardor, morsus cordis, æstus fumosa, oculi, & facies cubent. si acetosa, rugitus acetosus, inflatio, & rugitus maior, urina cruda, subtilis, aquosa, deinde turbida, pulsus paruus, non multum frequens.

Cura respicit causam, discrasiam febrilem, & accidentia. aer sit frigidus ait Alm. si est fumosa, vitet solem, laborem, iram, cibum, coitum, donec purificatus fuerit stomachus. locus sit odorifer, si cum fluxu euacuationis sit abunde, ait Gal. 8. meth. balnea, ut reliquæ, quæ sunt in uenis resoluantur, & ciba. si in declinatione. si euacuatio fuerit superflua, ciba. si uel balnea, & unge uentrem cum oleo ab sinthii facto in duplici uase. & si morsus est in uentre, superpone multoties filtrum infusum in dicto oleo. in acetosamelius est oleum nardinum, in fumosa, oleum citoniorum, flores uitis, & hipoquistidos in forma ceroti. hæc confirmat Haly. ait quidem Auic. fluat uenter, si materia fluens erit causa, donec ructus sint sani. deinde fac balneum, & ciba. si uero non fluat uenter, tange corpus, & nide grauedinem, unde sit, si in alta parte, da diatrion pipercon. deinde fomenta cum decoc. dictis. si in infima, sint clysteria, & suppositoria non acuta, si uentris est morsus clyste-

riza cum oleo fabino, adipe anseris, uel gallinæ uel capræ. si flatu adlit cum oleo rutaceo, & decocto seminis cumini, apij, fœniculi: si uentura fuerit cum aqua mellis, & pauco oleo, si corruptio in stomacho pseueret, uomere, deinde ciba & omittit styptica. Ras. in diuis. somnus sit longus, cibus sit lenis, boni succi, & permittit styptica. si nimium fluat uenter, ait Aui. quo ad causam ait Alm. solue cum succo fructuum nec expectes, q. febris decedat. In fumosa. idem Auic. Ras. indiuis. phlebotomia, si rubedo est magna, sed ait Auic. in declinatione, si magna sit necessitas.

Si ephéméra fiat ex materia in stomacho contenta, adest nausea, tremor labij inferioris, grauitas in stomacho, aliquando inundatio in ipso. cura est similis superiori. cum calida uomat, & oxia. ait Guil. si non pót uomere, expelle per inferiora cum clystere acuto, ait Alm. uel solutiuo pharmaco. cum mundus fuerit. s. ut neq; nausea, ructus fumosus, mordicatio, & grauitas non angat, balneum fiat, & ciba.

Si Ephimera fiat à phlebotomia, cura cõpletur cum extinctiuis ebullitionis, & fumositatis cholerae quæ si multa fuerit, educe cū aqua fructuum. s. thamarindorum, prunorum, casis, & id generis.

Si fiat à fluxu uentris, uel uomitu: aer sit parū calidus. letus sit, dormiat, & quiescat, non surgat ad sellam, cibi pauci, boni succi.

Si ex sudore accidat, cohibe, non abstergendo ipsum, auertendo, permutando ægrum de loco, ad locum, ungendo cum stringentibus:

Si fiat ex coitu, cura est ut dictum est proprio cap.

Si fiat ex medicina solutiuā, uel uomitiuā edu. si causa est frigus, aperi poros. si calor medicinae, exingue.

De Febre Hectica.

Febris hectica ait Aui. est calor extraneus accensus in substantia cordis, & membrorum innatam consumens humiditatem. & ait Auerro est morbus calidus, & siccus sine materia. diuiditur autem in tres species, quæ potius debent dici modi distincti penes tres gradus consumptionis. qui distinguuntur penes consumptionem quatuor hum. ex primā humiditate ait Serap. potius accenditur febris putrida: quā Prima humiditas lapit multum. naturam humoralē. Gal. 7. meth. quatuor distinguit species siccitatis. prima fit in substantia membrorum solidorum spermaticorum, sec. in substantia carniformiū. ter. est consumptio humiditatis diffeminatæ per poros membrorum in modum roris, quarta fit ex consumptione humi-

ditatis existentis in capitibus uenarum paruarum. Isaac facit quatuor species hecticae adaptans eas quatuor humiditatibus secundis: unam penes gluten. secunda penes cambium: tertia penes rorem: quarta penes humiditatem, quæ est sine nomine. ait Ras. 16. con. una est desiccatiua, alia consumptiua, & tertia arefactiua. prima igitur species hecticae sicce est quando nondum accidit consumptio in humiditate coinnata cordis, & substantifica, glutine. s. & cambio, nec in parte, nec in toto, sed in parte in primis duabus humiditatibus. s. sanguinea, & rorida. quia non sunt coinnatae, & substantificæ, sed ex harum calefactione potest calefieri gluten, & cambium ebullire, & consumi. Secunda species est, quando consumitur in parte humiditas coinnata, quæ est cambium. quo immediate nutriuntur particule, quæ est uerus cibus. ter. quando caliditas consumpsit omnes liquores cordis, & fit, ut consumat substantiam. i. substantificam humiditatem membrorum, quæ est gluten. conseruationum substantia eorum. Primus modus hecticae dicitur ueluti principium, secundus augmentum, i. secunda species. tertius status. i. tertia species. inquit Sera. hectica febris diuiditur in duas species: una sequitur ex aduersione caloris, altera fit senibus absque febre, quando extinguuntur caliditas per resolutionem, quæ dicitur à Filagiro senecta.

Signa hecticae notantur undecim. primum signum si post omnes horas suspectas: dederis cibum, & post cibum per unam, uel duas horas augetur calor ait Galen. in l. de bile. quandoque ait Ras. 16. con. assumpto cibo fit quædam species febris in uenis stomachi, & est caliditas superabundans in eo, quæ declinat cum declinatione uehementis nutrimenti, sed hectica perseuerat. post cibum additur calor in hectica, quando non habet materiam causam ad inducendam talem inno-uationem inuasionis, sicut putrida habent febres: & ait Zoar. additur strictura anhelitus cum calore dicto, & pulsus sit magnus. Serap. & Isaac iudicant tunc hecticam esse secundæ speciei, cum calor post cibum est. ait Galen. quod omnis arida caliditas, ut calx irrorata humido promptiorem, & maiorem caliditatem ostendit.

Secundum signum est, ait Gal. Aui. & Ras. arteria: sunt calidiores, & locus cordis, quā alia: partes corporis, & magis patet si facies balneum rerum aperientium brachia, ubi est pulsus: quia calor magis manifestus fiat. causa est, quia calor hecticae maior est in corde, & arteriis, quam in aliis locis. in febre putrida est multitudo uaporum, qui expanduntur fere per totum corpus, ita quod ubique calor

lor in corpore occurrit tactui cum multitudine uaporum.

Tertium est, quod ablato augmento caloris, qui fit post cibū, calor hecticæ semper æqualis permanet, ut ait Galen. in libro de tabe.

Quartum calor multus non sentitur à tactu, uelut in putridis; in quibus flamma uidetur tactui ob multitudinem uaporum.

Quintum calor est imbecillis, & paruus in prima specie, in secunda magis, & in tertia magis, quàm in secunda. ramen si diu tangendo persistis, calor est mordax, & maxime in marasmo; quia fundatus est in substantia grossa.

Sextum ait Galen. in l. de mala compl. diuer. æger non sentit febrem, imo uidetur si bilem habere, quando talis calor factus est & habitus.

Septimam ait Ras. urina est oleaginea, quæ in ea sit oleum, & egestio unctuosæ, & pinguis, & quidam aiunt, quandoque habet resolutiones similes peraloidibus, & quandoque ad modum fæci fracti, quandoque in substantia tenuis, & quandoque spissa, quandoque abscolor; in pluribus est spissa superius, & subrufa inferius tenuis in superficie manu opposita, lipida, pinguedo enim ait Guil. dissoluitur à pectore, & quandoque est similis sanis, & maxime circa principium, & medium.

Octauum pulsus ait zoar, est durus ob siccitatem, & Auic. paruus, frequens, & debilis.

Nonum ait Rabi, digiti calefiunt ob modicam carnem, & quia est in membris radicalibus collocatus calor.

Decimum plurimum est tussis sicca, & quandoque humida, & ob tussim, & siccitatem, quandoque æger spuit sanguinem, quia aliqua uenula frangitur.

Vndecimum quandoque dolor est punitius in sinistra spatula ob colligantiam, quæ habet cum spiritualibus, & ob ascensum alicuius feruidi uaporis & aliquando genarum rubedo, & frõtis cal. hæc Ferra. unde ait Guil. color est plumbens, & liuidus ob spirituum, & sanguinis paucitatem, aliquando parum citrius ut in cholericis, quibus hectica succedit post cholicas.

Inquit Iudæus si febris remanet uno septem tepida in eodem statu est hectica: si duabus sep. iam dominata est. si per tres, confirmata est, & Ras. decimo ad Alm. ait, si in eodem statu calor non augeatur, nec accidentia ulla aliarum febrium infestauerint putridarum.

Signa specialia primæ speciei sunt, ait Galen. & Auic. si ephimera transit duodecim horas absque declinatione, imo continuatur usque ad tres dies, & fortis ad manum medici est hectica; & addit Serap. color fit niger, & extenuatio, & citrinitas, & addit Guil. urina pinguis absq; renum dolore & caliditate.

Secundæ speciei signa ait Isaac, & Sera. qd si uerum dictis signis post cibum æger sentiat augmentum caloris, & addit Alm. facies extenuata & oculi concani, caro diminuta, & cutis exsiccatio, idem Haly. Auer. & Auic.

Tertiæ speciei signa ait Gal. Auic. & Isaac sunt, quod magis profundantur oculi, fit lipitudo sicca, supercilia grauiæ, oculus somnolentus clausus absque somno, cutis ait Galen. arida, puluerulenta, aures ait Ras. minorantur, plana sunt tempora, & Auer. palpebræ citrini coloris, & Gal. deperditio carnis omnino, uenter adhæret dorso, pellis, Auer. mirach rugosa, & sicca: pulsus, ut Auerro. uelut chorda tensus, uelox, & debilis, pili uidentur oblungati, pediculi oriuntur Auic. si hectica facta fuerit ab aliquo membro læso, semper læsio membri palam erit ribi. Alm. cum capilli cadunt, & uenter soluitur, mors est propinquæ, & quandoque ribi inflantur, ut plurimum moritur infra tres dies, ait Ger.

Curatio hectica febris.

Febris hectica ait Auer. est mala complexio calida: & sicca absq; materia. quare una est curationis intentio. alterando, quæ est infrigidare & humectare, & quia hectica quandoque sequuntur mala accidentia, alia est intentio, quæ est eorum correctio infrigidantia & humectantia, ait Gal. modificanda sunt: quia calor naturalis est debilis, & corpus subtile. infrigidantia ait Auic. non desiccant, ut trochisci de caphora nec calefaciant, ut uinum: quædo nocent. & infrigidantia sunt non proportionata calore febrili, sed remissiora. sed loco gradus fortis adde ad quantitatem, uel reitera per multas uices. humectantia sunt in gradu proportionata: quia non uehementis impressio nis. & si non sunt in gradu, adde ad quantitatem uel reitera. quare recte ait Auer. 7. collig. plus in hac febre indigemus humectatione quam infrigidatione. Fugiat igitur aer frigidum, ait Auic. non sit in cubiculo ignis, nec fumus. & Gal. multi. hominum, quia aer calefaciunt. hyeme uero si necesse fuerit fiat ignis è lignis ualde siccis, addit Gui. nocet et aer siccus moruosus, mora ad ignem, solem & uentum, & autumnus maxime nocet hecticis. animi accidentia, q̄ exiceant, fugiat, ut ira, motu corporeu, nisi lentum, frictionem siccam, balneum calidum

calidum, nigilias, calidos cibos, & siccos, & qui inflammantur, & conuertuntur in humores acutos, item siccos, & frigidos ualde: item potus tales: hæc Haly, & Rasis fuge amara, falsa, & acuta, duræ digestionis, tardæ penetrationis, ut uiscosa. fuge quæ habent superfluitates, acetosa, frixa, uerusta, mel ait Galen. est fugiendum maxime, & omnia dulcia, acetum, nisi mixtum, ad in frigidationem cum multa aqua. frigida aqua multum est inimica, fugiat ieiunium, famem, & sitim, omnem immoderatam euacuationem, & præsertim coitum, nocet ait Auicenn. multus cibus, & potus una uice datus. aer sit temperatus, & æstate locus terrenus, uel uersus aquilonem, uel stratus foliis, & floribus odoriferis, frigidis ad aerem temperandam. hyeme ignis mouet catarrhos, exiccat, quare meliora sunt uestimenta, gaudeat cum amicis, non dormiat cum plumis, comedat succum prisanæ frigidum & panem optime custoditum infusum in aqua frigida, aquam hordei, & hordeum dat Auicenna, alii micam panis coctam in lacte amigdalari, uel iure pullorum cum zuccharo, & penidiis. Isaac. panis bis lotus cum aqua frigida, & infusus in uino albo leui, lymphato. alii mixtum cum lacte amigdalorum & zuccharo si fluat uenter: alii olera frigida, & humida, alii cerasa, pruna, cocume. & id generis: alii pisces fluuiorum, & caneros, testudines, limacias, ranas, lac, caseum recentem non salitum. Auicenna oua sorbilia in aqua decocta: alii carnes hedi, agni, fasciani, perdicis, pullorum, auiarum paruarum, si uictus sit fortis. Galen. testes in lacte decoctos Auerro. pullos & capones nutritos ex frumento, & amido: alii agrestem non acerbam, uel succum granarorum dulcium, uel muzorum, uel arantia matura, quando eis admiscuntur species quæ R. cardamomi vinci. vna liquiri. cinamo. ana vnc. 2. croci dragm. 2. Auicenn. in potu dat aquam hordei cum zuccharo decoctâ, & iulep Galen. uinum parum ponticum, aquosum, album, aromaticum. Et Galen. pluries in die ciba, & Auerro. & ad minus ter. in digerendo non des potum, ait Galen. sed post digestionem, da copiose, quia distribuitur quam cito cibus, aquam frigidam paulatim assumptam in corporibus nondum siccis dat Gale. Alm. & Isaac.

Lac hæcticis maxime est utile præsertim humanum, deinde asinum: quia ait Gal. minime caseatur, & cito penetrat ad omnia membra, sed inquit Alman. lac non caseatur, si parum zucchari tribuatur, sal etiam

idem efficit. post lac asinum est lac caprinum, ait Alman. Auicenna, & Auerro. eradicat enim hæcticam lac asinæ, nisi addit putredo, & eradicatio sit possibilis. quartum locum tenet lac uaccinum, à quo extractum sributyrum. Guiliel. sit stomachus mundus, & detur lac cum zuccharo, nisi singatur proprio ore. al. sit robustum, iuuenis, & moderatum exercitium faciat. inquit Galen. se primo met. nutriatur asina herbis frigidis, & humidis ait Serapio. ex aqua dulci Auerro. dat stomacho ieiuno, & debili vnciâ una primo die, & postea auge paulatim usque ad medium rotulum idest mediam libram. Isaac dat vnci. 2. lactis, uaccini si corpus careat multa nutritione in primo die, demum utque ad quatuor. dandum est lac ait Alman. si corpus macrum, & siccum fuerit ualde unde non conuenit primæ speciei. Auicenna & Serapio. dant à principio ad finem. & Auicenna inquit si putrescit in stomacho, solue leuiter, & abstine à lacte. Signa corruptionis sunt scilicet calor accensio, anhelitus maior, pulsus frequentior ætatus. vrina coloratior, & acutior, siue intensior. ait Isaac. si uentris solutio accidat: extingue lapidem, uel calybem bis, uel ter in lacte.

Si hæctica ait Galen. decimo met. cum putredine, aut herysypilate aliqua fuerit, non facias balneum: sin minus, auidacter fac, & præsertim in marasmo. addit Auicenna & ubi cibus indigestus sit. & Rog. si cum reumate sit. balneum aquæ frigidæ ualde competet primæ speciei, nisi debilis esset intus. sed balneum prius fiat in calida deinde nisi dubium addit, submergatur statim in frigida. quia est ultimum in cura aut gradatim à calida ad minus calidam deueni utque ad frigidam. & melior aqua ait Auicenn. est decoctum rerum in frigidantium, & humectantium, ut folia cucur. ait Serapio. hordeum, uiol. nenuph. & huiusmodi. & Alman. misce lac cum aqua, nisi toleret aspersionem lactis super caput. & Rog. coque in aqua balnei pedes, & capita arietis: & Plate. miscet ouorum albumen, & uirellos cæca. calor aquæ ait Haly sit suavis. absterge postea cum spongia, deinde unge oleo, ait Serapio. uiolato. nenuphari cum cera alba collata: humectant enim & conseruant humiditatem aquæ. uel Rec. oleorum frigidorum, & humidorum q. bulliant in eis, medulla cancrorum fluuiarium, carnes limaciarum, testudinum, & ranarum ad consumptionem tertiæ part. olei. cola fortiter, & unge spinam. mora autem sit in balneo donec caro humida appareat. ait Gal.

Galen. donec ait Isaac, membra rubicunda & inflammata sint, pinguescit enim corpus, & augetur caro. Haly, parum stert in concha. & Auicen. separetur uelociter, ingredietur balneum ait Gale. in l. de tabe, digesto cibo, idem Auic. ait. Serapio. autem sedeat in balneo post hac nix una, & post cibum. scilicet digestum alium. Haly. bis in die balneabis, & Auicen. ter, si uirtus est fortis.

Curatio hecticæ simplicis per potionem, non cum putrida aliquando uertitur ad causam introducentem, uel consumentem, aliquando ad discrasiam febrilem, aliquando ad membrum, à quo habet originem, aliquando ad dispositiones corporis secum complicatas, & tandem ad accidentia corrigenda. frigida igitur, & humida deatur ait Auicen. in principio trochif. de campho. cum iulep acetoso, in aurora aquam hordei cum cancri. & ad uesperam mucillag. psylli, nisi timeas de frigidityte stomachi. aqua hordei sit vnc. vi. cum trochiscis infrigidantibus, Haly dat aquam hordei cum zuccharo, & postea uiam iulep, aut syrupum de papauere. uel de iuinbis vnc. 2. cum frig. Rog. dar syrupum restauratiuum de testudinibus. Ferr. syrupum cucurbi. cum diapapanere. Guil. restauratiuum de carne, & lacte. Gilib. electuarium de testudine nemorali cum colatura & syrupo deiure testudinum, qui maxime impingnat. sed quia laxat, adde stiptica grata. nutrit gallinas cum brodio, cum quo decocta sint decem uel duodecim. ranæ fontium, item stillatum ex his. multum enim impingnant & cancri fluuiales cocti cum sumach comesti.

Ad extra ait Alm. panni in aqua rosacea infusi in niue infrigidata cum camphora, & spodio ponantur supra pectus, postquam cibis descenderit, & antequam comedat, & tepesfacti fuerint, permutantur. Haly ponit pannum infusum aqua ros. & sand. aut in ceroto ex aqua rosata, succo portulacæ, cucurbitæ, semperuiæ, oleo rosaceo, & uiolaro. Auicen. magis laudat vndiones cum oleo de cucurbitis, papau. nenupharino, salicibus, & uiolis. ung. optimum R. assungit, gallinæ, medullæ cruriū uituli, buthiri, recentis sine sale, medullæ ceruine, sepi hircini ana un. 5. assungit anatis, serpentis cocti ana vn. 3. mucill. psylli. sem. citoniorū ana vnc. 1. draga. gūmi arab. ana vnc. 1. olei uiol. amigd. dulciū ana un. 1. 3. ceræ citrinæ q. l. ut sit bene fluxibile. & cum eo repido inunge pectus ante, & retro. Guil. ponit centrum uitellos onorum in uase, in quo æger sedeat, & eos per anum su-

gat. est ultimum ad spasmus de inanitione.

Si febris putrida coniugatur, uel materia putrescat, Isaac expellit cum mundificantibus absque caliditate & siccitate ut est succus lupul. zuccaro ros. iuinbis, manna, & cassia, zuccharo uiolato.

De Hectica senectutis.

Hectica senectutis, ait Auicen. quarta primi est hectica febris, & quæ plurimum accidit senibus, & dicitur senecta. dicitur etiam hæc proprie marasmus, & tabes, quæ ait Galen. de Tabe. corruptio corporis uiuentis ex siccitate. Haly. marcor. est duplex ait Galen. de differen. naturalis, & accidentalis, naturalis peruenit ex actione caloris naturalis in humidum radicale: accidit decrepitis, & non est proprie ægritudo. accidentalis, quæ pueris accidit & aliis, quæ est composita uel simplex. & hæc scilicet simplex ex sola siccitate fit cum temperantia actiuorum. composita est duplex: una est siccitas, & caliditas, siue illa caliditas sit febris ut tertiæ speciei hectica, uel febris putridæ liquefactiua: siue non sit febris, sed mala complexio calida, alia siccitas & frigi. quæ proprie dicitur hectica senectutis, & eius fundamentum prius est in corde quam in aliis membris. Rab. in tertia par. cuius cor est siccum cum siccitate incompleta, prouenit cito ad senectutem. tamen uiuit aliquibus annis: cui est cum siccitate completa, uenit ad phthisim id est consumptionem, uel tabem. accidentalis ait Serap. oritur ex multitudine morborum præcedentium, aut dolorum. fit etiam ex frigore dominante cum debilitate corporis, aut ex potu aquæ frigidæ in hora non apta: & ex dimissione exercitii, aut ex malis uaporibus frigidis eleuatis ad cor, qui infrigidant eius complexionem, aut ex caliditate, quæ resoluit, & liquefacit humiditates, aut ex superfluitatibus, & id generis.

Signa ait Galen. de tabe, pulsus paruus, & rarus, anhelitus frigidus, & rarus, pectus frigidum totum, & urina ait Isaac, cruda, alba, & subtilis, ructus, Rog. & Gilib. acetosus, & nulla sitis.

Hæc siccitas confirmata in corde, cito inducit ad mortem, deinde quæ in hepate potest aquæ in stomacho, consumptio, quæ oritur ab aliis est tardior, & deuior. cura ait Galeno septimo method. & Auicen. est humectatio, & calefactio. fugiat igitur omnia infrigidantia, & exiccantia.

tia balneum, ait Auicē. competit. cibi calidi, & humidi, facili digestione, paucæ quantitatē & multi nutrimenti, facili descensus, & citæ penetrationis; cum pauca viscositate vinum subtile, odoriferum, paucæ quantitatē. lac muliebre, asinum ex vberibus tractum, mel est vtile, & uinum in frigida tate. ait Serap. carnes pullorum, & oua. odores gratos calidos. Auicē. lac decoctum cum lapidibus est ualde utile, & mel est ultimum in iuramento. si debilitetur, ait Serap. da thiriacam, mitridatum, uel diamusculum in potu. & Isaac. syrupum de zingib. Const. corroborat hepar cum ligno aloë, xibz. galanga piper longo, cinnamomo, gariofilis, spica, & huiusmodi super cibaria. Galen. 7. metho. inunge uentrem cum oleo nardino, ita ut sit semper unctus. uel masticinum uel opobalsamum. adde ceram si uis, ut adhæreat magis; uel si frigus sit unge cum lana infusa, & melior est lana fuccida. & unge stomachum cum dictis oleis, & sæpe excita appetitum cum dando in potu mel rosatum cum uino albo decoctionis ciperi, radicū capparis, & acori. si superfluitates in stomacho apparent, vome uel cum lenitate educ. intestina præhumecta, & impingua. Clystere ait Serap. fiat ex decocto pedum, & capitum agnorum chamemillæ, hordei, tritici, anethi cum oleo sesamino, & butyro, & aliquando oleo de beē. idque tribus diebus, & post aliquos dies, iteremus. balneum ait Serap. sit decoctum chame. sampuci, liliorum, & id generis.

De febre putrida.

Febbris putrida dicitur à subiecto proprio putrido, uel à putredine sui subiecti. causa coniuncta est duplex altera instrumentalis, & immediata, non tamen per se, & is est uapor putridus, qui per se non est causa febris putridæ, sed in uirtute humiditas putrida, à qua elenatur. alia est coniuncta per se, & est humor putridus. & secundum quod uariis est humor, uariatur feb. & eius curatio, & eo remoto, remouetur febris. unde ad esse febris putridæ semper est necessarius humor putridus, non multitudo humoris non putridi. quia icterici febrerent, quibus multitudo cholæræ est in toto corpore. dixit Auicē. humor recipiens putrefactionem, aut est cholera talis modi, ut ab ea uapor egrediatur. qui sit subtilis, ualde fumosus: aut sanguis, ut uapor subtilis, aut phlegma, ut uapor spissus, aut mela, ut uapor fumosus, spissus,

puluerulentus: ex his uerbis habes adesse febris putridæ non esse necessarium humorem putridum esse in corde sed sufficit, ab humore putrido esse communicatum cordi uaporem putridum, siue fuliginem putridam. norant quod in febribus putridis, nunquam tota causa antecedens transit in coniunctam cum sit morbus fiens. unde non reperitur putrida febris absque utraque materia antecedente, & coniuncta. sed in aliis morbis materialibus potest reperiri corpus absque materia antecedente, ut in spasmo de repletionem, cum iam tota materia factura spasmus fluxerit; non est in corpore spasmato materia, quæ respectu illius spasmis sit materia antecedens, licet aliquando fuerit, ut cum pars fluxerit, & pars adhuc fluit.

Diuisio febrium putridarum essentialis est diuisione sui subiecti, quod est humor, uel res reducibilis ad humorem. & secundum hoc est aut ex sanguinis putrefactione, aut cholæræ. dicunt, quod humiditates in membris remanentes ex secundis humiditatibus licet non possint esse causa materialis, nec efficiens febris; possunt esse causa dispositiua ad febrem putridam, nam cum membra defecerint ab expulsiōe, ipsarum reliquæ in ipso corpore redeunt ad interiora, & miscentur cum humoribus, qui impuri facti destituntur a natura unde putrescunt, & febrem generant. Alia diuisio est accidentaliter, & tribus modis, nam sumitur à modo situs humoris putridi, ut febris putrida. alia est de materia collecta in uno loco, ut in apostemate, alia de sparsa; quæ aut est in uenis & arteriis, aut est in carne, & raritate membrorum. secundus modus. secundo modo à modo motus ipsius: quando alia est continua, quam greci synocham appellant: alia interpolata, & continua est, quando humor putridam febrem generans est intra uenas, nam synchæ fiunt à materijs, quæ intra uenas commiscuntur, ait Alexan. sanguini & putrescunt. Haly ait intra uenas, & arterias. febris est materia collecta, dum est uno loco, ut apostemate, uel alicuius membri raritate, ut pectoris: quedam sparsa, quæ est in uno loco quandoque facit febrem continuam, quod est quando materia est collecta in aliquo membro nobili interiori, aut quando est ualde multa, quique non in membro aliquo interiori, & præcipue quando propinquum fuerit cordi, aut membro multarum arteriarum. & tunc est interpolata quia

quia est collecta in membro exteriori non magno, nec cordi propinquo, & quando materia non est multa, & est in membro aliquo interiori a corde remoto, sicut si esset materia collecta in renibus, matrice, uel recto intestino fierent febres interp. ut tertianæ, quartanæ, quintanæ, & mixtæ. ex apostemate interiori, ut plurimum fit febris continua præsertim ex materia calida ex frig. interp. & apostema magnum multa materia replente, & extendente dolorosum, item ex materia subtili faciunt continuam, ex grossa inter item quando suppuratur facit continuam. quando non, nullam, uel inter item apostema in membro magni sensus, uel in membro cordi uicino, uel quod cum corde habeat colligantiam facit ut plurimum continuam. ex dictis habes, quod omnis febris interpolata est putrida, sed non omnis continua est putrida. & ex continuis frequentius fit interpolata quam contra. putridarum quedam sunt cum symptomatibus, & quedam sine, quæ rarissimæ sunt. quæ cum symptomatibus & præsertim multis, ac fortibus, laboriosis dicuntur: quæ non, non.

Causa continuitatis febrium, ait Auicenna. est hæc. cum accidit putredo in uenis, difficile resoluitur. hæc putredo ob duas causas. primo ob continuitatem, quæ est in quibusdam uenis cum aliis, & putrescit omnes res, quæ est ei uicina, aut parata est putrescere. & ex uno uicino reducitur ad aliud: secunda est, quia illud, quod est comprehensum in uenis, est maioris continuitatis ad cor. has causas cordinant alie, & quibus est, quod uapores, & fumi capinoli in febre continua sunt positi in profundo corporis: unde difficiliter fit eorum dissolutio, & de eis est soliditas, & densitas corporis uenarum, in quibus continentur, prohibens facilitatem resolutionis eorum. & de eis est ipsorum multitudo, quam uirtus non potest perfecte resolvere. quare remanentes continuitatem faciunt febres, donec causa ebullitionis, uel putredo fuerit totaliter, uel ut plurimum sublata. & de eis est opilatio fortis: quia humores non finiunt, siue euaporant, quidam reducunt causas continuæ febris ad quatuor. ad continuam in uenis putrefactionem fumorum, coarctationem respirationis, prohibitionem, & directionem ipsorum ad cor ascensionem.

Causa interp. febrium est similis causæ fluxus rheumatici periodice confluenti ad aliquod membrum. hæc causa, scilicet inter. consideratur in duobus scilicet in eradicatione paroxysmi, & in reditu cuius secun-

dum plurimum. causa eradicationis est completa resolutio uaporum, qui ascendebant ad cor, aut humorum in corde retentorum, qui resoluti remanent, sicut è lignis uis cinis, non cinis quidem ut lignorum uisurum, sed plus, & minus cineri similes sunt, prout plus, & minus grossicie, uel terrestritatis, uel acritatis, & subtilitatis participauerit humor, quo incinerato cessat calor febrilis. causa autem completæ resolutionis uaporum, in interpolatis est, quia materia a qua surgebant, non habet continuitatem cum alia materia, quæ per eam disponderetur ad ebullitionem, & putrefactionem, antequam ipsa incineretur, & cesset ab ea uaporum eleuatio, sed eleuatorum fit prius completa uaporatio. hanc tamen coadiuant alie, quæ sunt locatio uaporum in extrinsecis, & locis porosis, raris, unde facile resoluuntur, & uaporum ipsorum paucitas, quam potest complere uirtus, & finire. consumit uero calor putredinalis materia, quæ prius erat in uenis, postquam acquisiuit in eis dispositiones propinquas, & præuias ad putrefactionem. expellitur à uirtute expulsiua uenarum, quæ non possunt sustinere molestias. Habet interpositionem circuitus, & typos, quia humor quem putrescere oportet, non putrescit simul, & semel quod est, quia putrefactionis præparatio in ea non est completa, sed paulatine in eo procedit. & addit Auer. putrefactio, quæ in humore, quia extra uenas existit, fit, est eius, quæ in humore, qui intra uenas, est contraria propter uaporationem, quæ fit per porositatem membrorum. unde sumitur in his circuitus, & eradicatione febris, non solum fit per insensibilem euaporationem, sed per sensibilem, euacuationem materiæ. dixit Galen. interpolatæ quatuor sunt causæ, scilicet fluxus materiæ ad locum putrefactionis paulatim, & intermissus. secunda est libera fumorum exhalatio tertia est remotio materiæ a corde secundum directionem, & non localem distantiam. quarta est impedita fumorum respiratio ad cor.

Causæ periodicationis febrium, ait Galen. in lib. 2. de differ. feb. sunt duæ, scilicet de fluxus humorum in aliquem locum, siue membrum, & congestio materiæ ibi, quoniam materia adunata in membro est causa motus paroxysmi morbi. causæ congestionis sunt uirtutes naturales non fortes, & ordinatæ a natura, uelut si attractiua attrahat plus quam sit necesse, & eo tempore quo nondum erat opportunitas, & præter has porum membrorum, quæ

irrigant superfluitates sunt sani, secunda causa congestionis est duplex, scilicet caliditas addita particulæ adiunæ, apertio meatuum siue canalium particulæ, in qua est caliditas, & resolutio humorum circumstantium, & illarum subtilizatio sequentes ad illam caliditatem unde habilitantur ad fluxum, superflua etiam caliditas debilitat particulam, & dolere facit unde disponitur ad recipiendum, influit enim humor in his, quæ dolent, & dolor est secunda causa, dolor exacuit materiam, ut fluere faciat ad locum dolentem, ait Galen. decimotertio method. & causa est quoniam uirtus expulsiua non efficit operationem suam nisi quando aliquod sensit nocumentum, unde cum dolor est in membro, & sensus rei contristantis mouetur ad expellendam illam rem, & si facile non potest, conatur, & hinc sequuntur motus spirituum & sanguinis, humorum propter expressionem suam adiunant membra uicina compatiencia, quorum motus expulsiua sumit, quando autem materia adiunata fuerit, non putrescit semper, nam si multa est, uel maligna uel ambo simul latet: quoniam uirtus caloris non potest ei dominari, unde derelicta necesse est, ut putrescat, & postea morbus, & si ardeat morbum illum cessare, & per causas dictas iterum materiam ibi currere, redit morbus. Cause reditus paroxysmi febris sunt duæ scilicet una est, remansio reliquiarum caliditatis febrilis in loco minere, Primæ putredinis, quæ caliditas est causa, qui denuo alia materia moueatur ad locum minere illius, quæ ibi putrescit, & febrem facit, & præter hoc, ut quidam uolunt, remanet qualitas ueluti quartanæ excitandæ siue præparandæ in quartanam, secunda inuentio causarum putredinis, quæ fuerint in materia primi paroxysmi, ipsi instantibus, necesse est alia materiâ putrescere, & paroxysmum redire, sed si nulla ibecillitas in nascitur particulæ, nec currunt superfluitates, quiescit morbus ille, finita eius superfluitate per euacuationem eius uel incinerationem: quia non sunt ibi cause re aggregationis materiæ, nec per uia congestionis, nec defluxus: nam membrum ueluti hepar, siue etiam uirtus, & mala complexio cum malo regimine est causa, qui generet humorem malum paratum putrescere.

In die interpolationis corpus non dicitur sanum, sed ægrum, considerata mala dispositione membrorum, in qua remanet corpus in tempore interpolationis, per quam maxime sensibiliter læduntur operationes aliquorum membrorum, per quorum lesionem alia materiâ aggregatur, & ad locum minere pu-

trudinis expellitur. Dixit Galen. in con. apho. febris illa, quæ de se corpus mundificat, non est molesta, quæ non est molesta, & Rasot & conti. febris si tepescens fuerit, salubris erit. sin nō, fallax, & deteriores febres, ait Anic. sunt inseparabiles, in quibus putredo est intra uenas, deinde, quæ eradicantur, quarum putredo est in toto corpore sparsa, aut in pluribus corporis partibus, febres continuæ sunt interea pollatis deteriores, ob continuam afflictionem, & quia sunt cum seuioribus accidentibus, & magis prostratæ uirtutis, ait Rasot in con. in febribus, in quibus corpus separatur cum ultima prauitate non erit fallacia, ueluti paroxysmi illarum fuerint cum ultima lentitia, & prolixitate: quoniam huiusmodi febres nō sunt cum apostemate, nec cum putredine maligna humorum, nam a febre, quæ accidit cum altero horum duorum, non separatur corpus cum paritate bonæ, febrium continuarum alia sunt uere continuæ, alia non de quibus ait Anic. quod quæque componuntur quædam febres putridæ interpolatæ, sed tali compositione, quæ fiat in forma febris inseparabilis, & illud est uerbigratia quando incipit aliquis humor putrescere in loco, deinde incipit alius de genere suo, aut de alio, & ob hoc secundus paroxysmus tempore declinationis primi paroxysmi, deinde continuatur, febris autem continua multifariam diuiditur, nam alia reseruat materiam suam ad unicam expulsionem, non quod tota omnino euacuetur, sed maior pars, & maxime grossior, & subtilis in declinatione sensibiliter, uel insensibiliter euacuata, & ut plurimum hæc febris terminatur in una septimana, alia non reseruat, & hæc est longa, & plures facit crises, aut per euacuationem, aut diminutionem, aut equam perfectè finiatur, & hæc difficilis iudicari, alia diuisio febrium, alia sunt uere symptomaticæ, quorum uniuersum tempus est unum a principio usque ad finem, & hæc uniformiter mouentur, nec habent exorescentias, alia equiuocæ, quia fluxus habent ciremitis, primæ dicuntur conclusæ ueræ, & propriæ, & sunt sanguinæ, quia sanguini non inest motus periodicationis, sed solum uniformiter mouetur, causa est putredo in uenis propinquis cordi, ut in ea quæ ab hepate ad cor est, in ea quæ est in corde & pulmone, alia sunt ueræ, sed non propriæ, & hæc habent exorescentias occultas in cæphlegmatica, uel melancolica, sed conclusa nō dicitur sanguinea, & cholerica dicta causon. conclusarum ueræ, & propriæ tres sunt species, sagnasticæ, pagmaticæ, & omotenus, primæ uniformiter a principi ad finem augetur, secundæ uniformiter minuit, 3. stat in suo esse, & uere

conclusarum alia est adustiva, intensiva, & hæc est causon, quæ facta est, aut ex humore cholericoputrido, aut non putrido, sed vsto, & incenso, quæ est vehemens incendij, cito liquefaciens, & consumens corpus, unde liquefactiva dicitur, & arsiua à Gal, quæ vt plurimum est mortalis, alia non est arsiua, nec intensiva valde, & est sanguinea, febres æquinoctiales continuæ quædam exacerbantur per tertium, & dicuntur tertianæ, quædam omnidie, & febris sanguinea, in eo quod sanguinea non habet exerescentiam, sed in eo quod aliqua pars subtilis sanguinis conuertitur in cholera, & sic febris de tertio, in tertium, sed pars sang. grossa non fit melancolia, imo cholera. Alia diuisio, Febris alia acuta, alia non acuta, sed chronica, acuta dicitur morbus ratione quantitatis, vel qualitatis, aut situs, quantitas, vt quia materia sit multa, & sic synocha inflatiua dicitur morbus acutus, qualitatis, vt quia materia eius sit vehementer calida, vt cholericæ, situs vt in squinantia in materia situata in epiglotti. morbus morbus dicitur acutus tripliciter, scilicet ratione sue essentia, vt quia sit febris multa, caliditas, vt febris tertiana, continua, causon, & synocha, ratione quantitatis, vt morbus grandis, ratione nobilitatis membri in quo est, & secundum hunc modum synopsis, & apoplexia, & spasmus dicuntur acuti, ratione accidentium, quando seua sequuntur accidentia, vt dolor fortis, & quandoque vna tantum, quandoque duæ, quandoque tres concurrunt, vt in charabito, qui est morbus acutus ratione cause, morbi, & accidentium, non acutus est oppositus acuto in causis febris, aut acuta propter predictas conditiones postulat, quod sit brevis terminationis, & cito deueniat ad statum, ob suam magnitudinem, quam natura tolerare non potest, & non ex virtutis debilitate, vel alia causa, hectica tertie speciei licet ex virtutis debilitate cito terminat ad mortem, non tamen est nec dicitur febris acuta ob conditiones dictas. Februm acutarum, aliæ sunt acutæ absolute, quæ in 14. diebus iudicantur, quædam non acutæ absolute possunt in 7. diebus iudicari, si valde sint acutæ, & ante quandoque, vt in 4. & 3. & dicuntur peracutæ, acutæ absolute acutæ plus, & minus iudicantur ex varia aeris dispositione, tempore anni, & regionum in caliditate maiori, vel minori, unde Auer. 2. collig. morbi qui sunt acuti in terris. Hipp. existunt in nostris peracutæ, illa febris, quæ transcendit 14. diem, non dicitur acuta absolute, sed quodammodo, quam ad 20. & hæc sapit naturam acutæ, quia debilitatur virtus, acuta absolute est ordinati motus à principio vsque ad finem, non absolute, tamen incipit,

enim debiliter, deinde forficatur, & iterum diminuitur, acutari alia est liquefactiva, & cito consumptiva hum. corporis, alia non. liquefactiva, & acuta in iuuentute magis sunt ob cholera multitudinem & sunt difficilium symptomatum, & citius terminantur, senioribus, & pueris febres diuturnæ magis, quia humores eorum sunt terrestiores. Chronica febris ait Gal. 2. de diebus crit. est illa, quæ incipit à principio, sui cum moru leni, & tardò, deinde prolongatur, morbi hi ait, Gal. in aph. acutorum morbi sunt materia inuiscata in membris, scilicet in loco radicis, vel minere morbi, & est tarda digestionis, vt in sple nead quartanam, & in extremis, chacetis amphemerina, & chronicarum alia est, quæ eradicatur omnino in declinatione paroxysmi, & est interpollata, alia quæ reincipit statim, & est continua, & locatur in numero acutarum conuersuarum ambæ possunt in 40. diebus terminare.

Inquit Auer. quædo humor putrescit extra venas, & non est causa alia, veluti materia putrida in concanitate pectoris, vel in ventriculis cordis, vel in apostemate danti, putredinem continuam cordi, fit febris periodica, & si cholera putrescit, fit tertiana, & quæ currunt cursu eius, vt synopalis minuta, si melancolia, fit quartana, & deinceps quintana, & c. si phlegma, fit quotidiana, & quæ currunt cum ea, vt empiala, typhiria synopalis humoralis, harum scilicet inter aliæ sunt veræ interpollatæ, aliæ non veræ, vt harum febrium alia est pura, facta ab humore, alia notha, & facta à pluribus, quorum vnus dominatur, harum febrium aliæ innadunt cum typo, vt cum rigore, horripilatione, frigore, oscitatione, extensione, somno, & pigrizia, quædam sine typo, primæ eradicantur, secundæ cum harum resoluntur paroxysmi sensibiliter per manifestam evacuationem, quidam insensibiliter per incinerationem materie, vel insensibilem, harum etiam quædam habent paroxysmos ordinatos, quædam non, cause ordinationis paroxysmi in ordinationis sunt secundum Auer. quinque prima est ex parte materie, quæ diuersa est in multitudine, paucitate, grossitie, subtilitate, viscositate, & eius opposito, quare ex ea quandoque mouetur parum, quandoque multum, & quandoque subtile, quandoque grossum, secunda ex materia, pro vt illa vnus paroxysmi differt à materia alterius, veluti si materia huius paroxysmi esset cholericæ, & alterius phlegmaticæ, tertia causa est malum regimē egri, vel astantium, vel inopia rerum, quarta est à virtute egri, quæ si sit debilis, non potest vniformiter mouere materiam, quinta est multitudo, sine vehementia sensus egri, qui

ex parua causa percipit nocumentum, vnde stimulata mouet materiam. Harum paroxysmus alius brevis est, alius longus, quoniam non vna species morbi, neque eadem multitudo superfluitatum, neque similiter accendi omnes paroxysmos, neque euaporari decet: nam materia amplior, frigidior, viscosa, & grossa longiorem cit paroxysmum: contra, breuiorem: virtutis robur, & raritas, breuiore. & paroxysmorum alius inuadit, & inuenit finem alterius, & subintrat, vt antequam febris terminet, paroxysmus inuadit, aut antequam primus finiatur, alter superuenit. sed & alij sunt coalternantes euenientes cum quiete media inter primum, & secundum. item paroxysmorum alius est festinus, alius tardus. festinus quia materia est multa, sicut phlegma, aut subtilis, vt cholera, aut virtus fortis, & sensus vehemens, & via lata. Februm interpol. alia semper anticipat inuasionem, alia postponunt, alia eadem hora inuadunt. causa prima rum est materia diuersa in grossitate, & subtilitate, quae si fuerint in dispositione, quod pars subtilis incipit prius putrescere, tunc talis morbus sit semper postponendo: quia semper materia, quae in postremum reseruatur, est difficilioris motus, cum sit grossior facta. idem dicendum est de materia diuersa in viscositate, frigiditate, & id generis: adiuuat diuersa corporis dispositio in sensibilitate, & sensus obtusione: quando enim sensus est acutus, materia stimulat naturam, vt citius expellatur. vnde anticipat. item paroxysmi interpol. februm alij velociter consumuntur, alij extenduntur. item alij sunt multorum, & senorum accidentium, alij paucorum, & mitium: & alij habent quietem longam, vt quartanarum, alij breuiem, alij medianam.

Sanguis stans sub forma sang. nec conuersus, nec declinans, ad naturam alterius humoris mouetur vniformiter continue, nec est ei circuitus. & phlegma mouetur in diem. cholera in tertium, melancolia in quartum.

Omnes febres praecedat putrefactio in materia: cum enim incipit opilatio, incipit supercalefactio, & putrefactio, & humorum eleuatio, & ipsorum retentio, a quibus saltem remissus caloris gradus accidit. dixit Hip. labores spontanei praecipue labor vlcerosus manat morbos, & Ras. in superficie corporis est morsus similis morsui acui. vnde ait Auic. lassitudo membrorum, & Ras. sentiunt ponderositatem membrorum sui corporis absque causa illam faciente. vnde sunt tardi motus, & pigritia. patiuntur oscitationem, quae accedit ob vapores malos, qui communicant membris praecipue spiritualium, & mandibularum. quare membra mouentur ad eos expellendos: &

praeterea falsus ex iisdem vaporibus communicatus nervis. & Ras. subdit abundat in eis sputum, & mucilago narium multiplicatis materijs ex indigestione, & ex vaporibus ad ipsum eleuatis. & ponderosum est caput: & somnus excitabitur, vel turbabitur: quia vapores humidi cerebro communicant. & adfunt vigiliae, quia vapores nitrosi cerebro communicant. labor erit in vigilia, & anhelitus horribilis, non boni odoris, cum amaritudine oris, & siccitate. constrictio anhelitus ob vapores communicatos spiritualibus. facies inflata, & citrina ex inflammatione sanguinis in hepate, & venis, accidit etiam sudor, vomitus, vel similis euacuatio, tensio hypochondriorum ex vaporibus, vel ex vento, ex indigestione multiplicata. item: pulsatio tympanum, & capitis ex materia sanguinea, & communicata: & dolor capitis ex vaporibus ascendentibus. debilitas appetitus, syncopis, & debilitas corporis, & frequentia pulsus ex dictis causis. ait Ras. 16. con. curatur haec praeparatio ad febrem cum euacuatione, & zucchero rosato: etenim rose proprie conferant huic passioni: sit enim ex humore malo incluso in corpore, & mirobal. nigri conferunt, & coriandrum cum zucchero scilicet tritum qualibet die, & cuscute, & ameos, & pollicaria. Cum absque causa primitiua quis febre inceptit, qui prius non febricabat, febris est in humoribus. secundum signum, cum febris incipit a rigore, frigore, & c. ter. est inaequalitas pulsus, & caloris. quod accidit a materia febris grauantem naturam. quartum est calor mordax, non suavis, qui mordicat sicut furmus oculos, & nates: quia calor febris putride fundatus est in subiecto magis deso, quam calor ephemerum. tamen in ephemera a calore solis claudente poros facta est mordax, item calor hectice. quintum habet multas inuasiones, tamen nec synocha, nec capson habent paroxysmum. sextum remanet semper in corpore reliquiae, siue male qualitates, per quas omnino non mundificantur: tamen alij volunt tertianam resolui, sed non sine sudore. septimum est vrine indigestio, aut digestio occulta. in principio putridarum non est hypostasis in vrina, & ait Auic. est vrina valde tincta, vel mordicativa. octauum putride vt plurimum sunt cum siti, dolore capitis, & nigredine linguae maxime apud statum, & inquietus est eger.

Signa a quibus possumus sumi. qui humores faciunt febres humorales, sunt ait Auic. prima quar. res naturales, non naturales, & praeternaturales. naturalis, vt etas si iuuenis, in qua dominatur cholera, indicat febrem cholericam. si adolescentie, sanguineam: si pue-

puerilis, uel senilis phlegmaticam, & melancholicam, item si complexio sanguinea, declarat sanguinem, si uir significat humorem calidum: si femina, frigidum. si habitudine pinguis phlegmaticam febrem: si carnosa; sanguineam. si macra, rara, cholericam. si macra densa melancholicam. Ex rebus non naturalibus, si cibi præteriti per menses, si regio, si anni tempus fuerit calidum; calidam. item considera in his pulsum, urinam, humorem exeuntem, appetitum, anhelitum, & consuetudinem febrium, ueluti si æger solitus est affici febre tertiana, & si talis constitutio temporis adferat febres tertianas. uerum ait Ras. 16. con. maius signum est dispositio in qualitate caloris: quoniam si declinauit ad uaporem, & lenitatem febris erit sanguinea: si pungens, feruens, & mordens, ab aliqua cholera, scilicet citrina, uel nigra: si primo in tactu fuerit diuersitas in locis, quasi penetraret per colatorium, erit de phlegmate.

Signa febris à putredine sang. sunt tria. primum signum est citius terminationis, ut in quatuor, uel septem diebus. hæc maxime accidit corporibus carnosis, sanguineis. uentibus diæta sang. multiplicatiua, & maxime tempore ueris, constitutione, & regione cal. & hum. ait Auic.

Cholericæ febris signa sunt. quatuor: primum motus eius est tertianus, & hoc de cholericæ simplici, non de composita; duplex. ii. tertiana facit quotidie paroxysmum. Sec. est acuta febris, idest breuis, & citi motus ob materiam subtilitatem, & hæc in 7. periodis iudicatur longissima. tertium calor est mordax ob multam choleram, & causa est caliditas cholera coniuncta siccitati. quar. in cholericæ est salubris: quia cholera est lenis supra naturam idest subtilis resolutionis, & obediens naturæ: & quoniam facit quietem magnam tam in paroxysmo, quam in exacerbatione. quare ad facilem materiam resolutionem salubrior est febris cholericæ: quæ ad calorem sanguineam, & phlegmaticam, quia calor est acutior. hæc ex Auic.

Phlegmaticæ febris signa notat Auic. quatuor, prim. inuadit quotidie, sed auit magis in uesperis accedere: quia illa hora phlegmati est proportionalis. secundum calor est lenis, quia est fundatus in materia humida, & frigida. tertium est longa ob tres causas, scilicet ob viscositatem materie, ob multitudinem, & ob frigus complexionis suæ. quartum est parum spatium interpollationis, & quietis, & debilitas oris stomachi à qua corripitur eger: quoniam stomachus est uelut receptaculum phlegmatis, unde sequuntur syncopis, & passionis cordis, casus appetitus: in phlegmatica est

pulsus lenis, & in hectica durus. quamquam aliquando in phlegmatica fit durus, & maxime in latica, in qua cito corpus extenuatur, ob debilitatem appetitus. unde parum comedit, maxime quando multum phlegmatis à capite descendit in pectus, quod stans super diaphragmate corrumpitur, & corruptionis nocumentum cordi communicatur. unde accidit exsiccatio in humido substantifico, similis exiccationi hecticae. quæ exiccatio communicatur tandem arterijs. quare fit pulsus durities. sic etiam in hectica aliquando reperitur pulsus mollis, ut quando procedit à sanie in pectore contenta, cuius humiditas communicatur arterijs.

Quartanæ febris signum primum Auic. ait est longi motus ob frigus materie. quare est longa ab grossitiem materie. secundum est longa. tertium accidentia sunt remissa: ut calor non est intensus, & acutus.

Dixit Alex. si eger erit in colore irceo, idest filigineo, & insomnietatem patiat, & circa utilitatem domus solitudinem gerat, & æta te iuuenili sit, febris est de cholera. si color albus, & pallidus, & natura piger, aut in opere fixus febris est amphemerina ex phlegmate. si plumbeus, quartana est.

Continuarum febrium proprium, ait Gal. 2. de differ. feb. est non horrere sumendo horrorem pro omni forti sympt. quia materia mala non rapit per sensibilia membra: tamen ait Alex. per accidens potest euenire, uel quia aliquod aduenerit accidens subito naturæ terrorem inducens, unde calor retrahitur ad interiora, & exteriora rigere: aut quia natura nouam pugnam contra morbos, uel materiam morbi inchoet, uel morbus, contra naturam. quare calor retrahitur, & retractus vnitur, & materiam expellit super membra sensitiua criticæ, uel non criticæ. aut quia in dicta pugna natura nocumentum materie præcipiens irritata aliquam eius partem super membra expellit: aut quia aliquis humor extra uasa positus circa membra sensitiua quietus, postea ex pugna ipsa, uel alia de causa mouetur super membra dicta, & horrorem infert. quare ait Gal. 2. progn. com. 4. in principio febrium acutarum contingit aliquando frigidum extremitatum, aut quia humor non expellitur super membra sensitiua. tamen expelluntur acuti vapores mordicantissimi, qui horrorem causant. aut quia reuocatur calor intra ob malam, & uenenosam proprietatem febris & suæ putredinis & propter motum materie malam, & impetuosum, unde infrigidantur exteriora: aut quia ante aduentum febris continuæ superueniat rigor, qui postea febre superueniente sequitur: aut quia

quia virtus retentiva adeo debilitatur, & relaxatur, quod materiam in vasis continere non possit, unde symptomatice materia mouetur, & efficit horrorem: aut quia febris continua composita sit cum aliqua interpollata, aut composita cum aliquo apostemate. unde Gale. ad Glau. in prin. febrium continuarum, non erit rigor, & si erit frigus, extremitatum, aut horripilatio, hoc erit ex apostemate magno in ventre, vel renibus in augmento, & statim dicunt quidam posse rigorem fieri: quia materia habet digestionem, quam natura expellere potest super membra sensitiva.

Secundum signum est, quod pulsus est, ut ait Alm. diuersus, & male ordinatus: quia si stote est maior diastole: & quandoque tendit ad magnitudinem, & fortitudinem, & quandoque contra, causa est, quia in continuis cor, & arteria laeduntur magis, quam in interpolatis. quare Auic. cum videris pulsus valde diuersus in febre, & illa diuersitas non fuerit ob accidentia, neque ob causas primitivas neque in principio paroxysmorum, sed solum propter febrem, iudica febrem illam esse continuam.

Tertium dixit Alm. febres interpollatae terminantur intra spacium vigintiquatuor horarum: tamen aliquando aliqua tertiana notha pertransit, & aliqua ephemera, sed nulla continua terminatur.

Quartum ait Auic. non associatur febre continuæ de significationibus eradicationis alijs, scilicet praedictis, idest alijs ab horrore, & similibus. & hoc quia non finitur cum sudore, vomitu, secessu, vel alia euacuatione manifesta, sic quod desinat in infebrecitationem, vsque ad finem.

Quin. ait Auic. est assiduitas caloris, sed diuersitas eius, nam in augmento augetur quandoque, & quandoque minuitur.

In continuis febribus, ait Gil. semper vrina nigra, vel viridis, vel liuida distincte vel cum oppositione manus apparet, quoniam in eis calor est fortior, & magis consumptius. inter polata contra. & interpolata incipit cum rigore, aut horripilatione, & finit ut plurimum cum sudore, & in principio vomitus.

Febris continua si fuerit cum superfluo calore, & acuitate accidentium de genere adurentis, febris facta ex cholera, quæ est inflammatoria, adurens acuta. si cum superfluo calore, non acuto, sed vaporoso, est conclusa vera. si sine superfluo calore vaporoso, erit conclusa non verè, nec proprie.

Febris liquefactiua signa ait Ras. 16. con. est emissio fauillarum ad manum tangentis, quæ cito corpus consumunt, & ad dispositionem tornatilem deducunt in vrinis, & egestionibus plurimum supernatat pinguedo.

Ut cognoscas in principio febris in quo genere collocanda sit, an scilicet tertiana, an quotidiana, considera signa propria vniuscuiusque speciei, & accidens; nam si febris vno die accidit, & alio non, tamen accidentia tertianæ non sunt pura, nec fortia, sed mixta, hæc non est tertiana, aut est tertiana non pura, quo circa ad cognitionem febris aduerre.

Cum febris incipit à causa primitiua carēs rigore, & calor est vaporosus, pulsus eius non est mutatus imminens magnifice, & vrina est multum digesta, & in fine sudor, vel vapor egressus est e toto corpore, & ex his egerallenuationem senserit, quasi nihil sentiat, hæc febris est ephemera.

Quando febris inceperit absque rigore, & signa adiunt repletionis, & regimen fuerit ad repletionem, pulsus fuerit fortis, magnus, latus, vrina ruffa, & circulus ruffus, emmens, inflatus, sed sanguis non sit acutus, adfit asthma, & inflammatio, & non manifestantur in venis signa putrefactionis, & calor erit multus, & vaporosus, & pulsus erit velox, est synocha ex calefactione sanguinis, sed cum aderunt prædicta signa, ac præterea signa manifestæ putrefactionis, & restrictio pulsus, erit ad interius magis, & vrina maioris acuitatis, & minoris digestionis, & caliditas sit vehemens magis, & sitis, & calor in toto corpore æqualis, & non plus in corde & pectore, & regimen fuerit ad putrefactionem, & durauerit vsq; ad diminutionem, est synocha putrida.

Si inuasit absque causa primitiua, tamen cum horrore, & morfu illato in corpore ad modum puncturæ acus in princ. & in ipso tempore pulsus fuerit occultus & anhelitus restrictus, & paruus ultra solitum, deinde incipit caliditas, & non erit spatium longum dum dominabitur corpori perfecte cum inflammatione, siti, & vomitu cholericæ, & caliditas erit sicca, fumosa, deinde declinabit, & terminabitur post ad vomitum, & postea fiet alienatio in capite, & vrina erit tenuis, hæc febris erit tertiana, & maxime si terminantur, & mundificantur venæ post duodecim horas, vel ante à febre, & si hæc accidentia appareant omnia, sed vrina non fuerit rubea grossa, nec pulsus, erit tertiana notha.

Dum verò incipiat febris cum frigore debili, & est pura, & non mordens eius caliditas, & postea cum spatio longo, difficilis erit eius expansio, & quando expanditur, non sit abundantis inflammationis, nec sitis intensa, pulsus paruus, tardus, sed magis diuersus quam in tertiana, & paroxysmus prolixus, & vrina alba, nec remanebit sudor apud separationem ipsius, & erit aliquod residuum, & regimen

gimen ante actum, & tempus, & consuetudo absque causa primitiua, erit febris quotidiana, & si hæc accidentia sint absque frig. & separatione; erit quotidiana continua, & proprie si aggrauatur in tempore paroxysmi.

Quoties autem febris incipit post febrem erroneam, aut post magnitudinem splenis aut aliquem morbum melancholicum, & rigor erit quasi contundens ex profundatione eius in corpore, & difficulter calefit. & secuta calefactione vehementior fit calefactio in quantitate, & qualitate. vrina est indigesta, pulsus quasi ligatus interius trahens valde cum paruitate, & tarditate, & calor est aridus, & siccus; febris est quartana continua.

Tandem ait Ras. 16. con. si febris accidit post dolorem stomachi, vt plurimum febris erit quotidiana, si post dolorem splenis, quartana, si post dolorem hepatis, tertiana.

Dixit Gal. in lib. de Typo. typus est ordo inuasionum, & remissionum, & periodus est tempus intensiōis, & remissionis. typus largè, & strictè dicitur. sed proprie est, qui antecedit febrem interpolatam. & typorum alij primi, qui paruam habent inuasionem, & longam remissionem, vt tertiana, & quartana. alij secundi, qui longam habent inuasionem, & paruam remissionem, vt quotidiana; & prolongati, tertiani. alij stantes qui semper in eisdem horis semper inuadunt; alij moti, qui horas nunc antecediunt, nunc postponunt: alij simplices, qui habent vnā inuasionem. alij tandem compositi. typum febrem antecedentem, præcedunt duæ dispositiones, scilicet pigrizia, & fractio membrorum, scilicet lassitudo, quæ aliquando copulatæ sunt cum alicibus, & oscitationibus. causa pigrizæ est materia, quæ expanditur paulatim super membra; & non mouetur, sed quieta manet. causa fractionis est eadem, sed maior materię copia. sed si fractio erit intensa, sicut verberati, materia iam incipit moueri. quare si materia stat est fractio vno modo. si mouetur paulatim, dicitur lassitudo vlcerosa, siue apostemosa. Aliæ sunt, quando totum corpus extenditur, & maxime spiritus, & brachia, & oscitatio quando os aperitur. causa est materia pauca vaporosa, quæ veniens ad musculos spirituum, & mandibularum excitat expulsionē. Typi proprie dicti species sunt tres, scilicet horripilatio, siue horror, rigor, siue tremor, & frigus. horripilatio, & horror dicitur ab horrore quod est frigere cum extēsiōe pilorum totius corporis, & cutis. nam efficiens horripilationis est vaporosa, vnde mutatur velociter ad cutim. dicunt quidam, quod horror est dispositio intensior horripilationis; & quidam, quod differunt secundum lo-

cum ita, vt horror sit dispositio magis profunda. Rigor ait Auic. est vt æger non possit continere sua membra ex commotione, & tremore eueniente in eis in motibus inuoluntarijs. est compositus ex tremore, & frigore, tremor fortificatur occasione mouentis, & frigus occasione humoris. sed rigor, & tremor, ait Auic. 3. col. sunt motus virtutis expulsiuæ in musculo, vt expellat humorem ludentem sua frigiditate, & caliditate. tremor idē est quod rigor: sed differunt secundum magis, & minus, & dicitur tremor, quando rigor fortis: & quando tremor est parus, rigor. frigus ait Auic. est, vt æger sentiat in suis membris, & dorsis lacerorum suorum frigus parum. si sine motu malo inæquali: nam si esset cum punctione, horripilatio esset, uel rigor. quia, cum sentitur frigus in spina dors, & laceris & per totum corpus, dicitur frigus. maxime autem sentitur in dorso; quia maior copia materię expellitur ad posteriora, & facilitatur impressio frigiditatis in posterioribus frigiditate nuchæ coadiuuante, & nervorum ab ea ortorum.

Typorum causæ aut sunt primitiue, & extrinsecæ, aut corporales, & intrinsecæ. primitiue aeris frigiditas, aqua frigida proiecta subito super corpus, aqua feruentissima, ut ignis scintilla. intrinsecæ sunt duæ. scilicet ex parte uirtutis, & materię. ex parte uirtutis in se, aut sui instrumenti. i. caloris naturalis. nature aut ex parte qualitatis ipsius, aut motus eius per membra. unde Gal. 10. meth. rigor est ob multitudinem, ut acredinem eorum, qui feruntur super membra sensitua, & ob uelocitatem delationis eorum, & uirtutis imbecillitatem. in li. de Typo. rigor accidit, quoniam corpus leditur, quia calor naturalis leditur. & quoniam morus materię est inequalis, accidit toti corpori concussio in vtriusque motibus. ait Auic. in c. putref. rigor, vel frigus, & horripilatio vt plurimum fiunt ob frigus humoris, aut quia humor mordicat laceros, aut ob profunditatem caloris ad interiora tendentis ad partem materię, aut ob debilitatem uirtutis, ob frigus aeris. & quandoque causæ extrinsecæ mouent causas antecedentes ad rigorem causandum. sit aer calidus, sol exercitia, & id generis repentina operatur superfluitatum impetum, quæ impetuose venientes ad cutim eo tempore densam, non potentes resolui, coadunatæ sub cute nocent, & mordēt, & horripilationem faciunt. quare ait Gale. in lib. de Typo. res se habent sic, & ait Plata. quod res aduenientes corpori cum quiete, & paulatim non sentitur: sed oportet, vt veniat cum forti mora. & subdit causa dictorum accidentium est duplex, scilicet humor: qui non remo-

remouetur in venis motu vehementi, & sub-
to, sicut mouetur extra venas expulsus; &
quia intra venas non mouetur nisi permixtus
alijs humoribus, extra, solus, sec. est membrum
& est duplex scilicet vna quia vena assueta est
ipsi motui, quare inde non patitur: sec. quia
membra sensitiua, quæ sunt extra venas, sunt
valde sens. & venæ parum: nam cum humo-
res per lacertos, & carnem penetrant loca,
per quæ transeunt, purgant, & vt quasi vene-
num mordent. hæc accidentia eueniunt ob
mobilitatem, vel immobilitatem: videmus
enim per se plures si quiescunt, angustiam su-
stinere, vel pigritiam, vel fractionem, si moue-
tur, rigorem, si plurimum exercitatur, tremor
reminducunt: nam res nocua cum quieuerit
non multum molestat, si mouentur, maximū
dolorem excitat. argumento est dolor oculo-
rum, quibus clausis si quid occurrerit, parua
molestiam sentiunt, si moueantur, maxime.
vnde Auic. pri. 4. humor frigidus stans, in mē-
bro non sentitur, nec lædit, quia est quiescus,
& illi consuevit membrum in quo est. quo-
circa acquisitus est medius modus complexio-
nis inter complexionem humoris, & comple-
xionem membri, nec virtutis imbecillitas est
causa horum, sed est causa respectu materiæ
congregandæ, expellendæ, & consumendæ
antequam aggregata grauet, & lædat, & irri-
tet virtutem expulsiuam, quæ finit eam aggre-
gari: & non expellit neque consumit eam:
nam cum materia aggregata irritat expulsi-
onem necesse est, vt virtus sit fortis ad expellē-
dum, si causa esse debet dictorum accidentiū.
retractio autem sanguinis cum calore, & spi-
ritu ad interiora est causa horum. retrahitur
quidem vt resistat materiæ lædenti, aut vt di-
gerat, & quando materia est intra venas in
pluribus venis stans, frigescent exteriora, vt
aliquando in febre continua: quando est spar-
sa extra, retrahitur calor, & frigescent extre-
ma: & exteriora, vt in interpolatis. quando
est collecta in vno loco, vt in apostemate fri-
gescent exteriora, vt in febre ab apostemate
facta. dicunt quidam quod causa tremoris
est, quod cum calor renactus sit ad intra, debi-
lis remanet virtus alijs in membris extrinse-
cis depauperatis calore, materia est causa ty-
porum sua qualitate calida, vel frigida, quæ
ambæ mordicatur sunt. mordicatio ait Aui.
materiæ calidæ est apud panniculum regen-
tem primum, deinde alijs partibus lacertorū.
materia verò mouetur velociter: quia vt in
ictericis est materia calida & non est rigor.

Frigus non accedit ex materia calida, &
frigida mixta, & rigor, & horripilatio possunt
accidere, frigus non accedit ex sola caloris
retractione, & rigor, & horrip. possunt in fri-

gore non accedit motus, & concussio, quæ vt
accidant, oportet, vt frigus fiat per retractionem
caloris. frigus verò est in profundo, &
in superficie, & horripilatio in superficie. dif-
fert etiam rigor ab horripil. nam humor mor-
dens, qui est causa horrip. est in cute tantum.
Sed qui facit rigorem, est in membris: quæ
sunt, sub cute deinde in horripilatione frigus
est remissius, vel minus durans quam in rigo-
re ter. in horripilatione motus est remissus,
quasi occultus superficialis, in rigore est for-
tis concutiens membra superficialia, & pro-
funda. & quandoque tantum augetur, vt fiat
tremor, adeo vt collisio dentium. quæ in hor-
ripilatione potest percipi frigus, & vt fiat pū-
ctio tanquam à materia faciente eā: in rigore
sentitur frigus positium, non sentitur pū-
ctio: si punctio, non frigus: in rigore motus
occupat totum corpus, & est accidens virtutis
expulsiuæ, & tremor rigoris non est peni-
tus motus præter naturam, sicut tremor quia
partim fit à re præter naturam, & partim à
re naturali, quæ conatur expellere rem læden-
tem: sed tremor est motus præter naturam, &
tremor rigoris est brevis, & tremor longus, ri-
gor factus à materia calida est, quando perci-
piuntur in exterioribus frigiditas, & in inte-
rioribus caliditas, à materia frigida sentitur
frigus in interioribus, & exterioribus simul, &
parum, aut nihil sentiunt, rigor factus à mate-
ria delata per membra declaratur, quia sequi-
tur eius euacuatio per vna, & secessum,
vel sudorem, quia in reditu caloris à profun-
do sepe dissoluit aliquid humiditatis, & ex-
pellit: sed factus à vapore calido, vel frigido,
aut vento non sequitur euacuatio: aliquan-
do enim causa tremoris est ventus grossus in-
inclusus in loco solido.

Inquit Hip. 5. apho. mulieribus rigores ex
lumbis magis, & per dorsum caput ascendunt.
viris retro magis, quàm ante veluti in cubi-
tis, coxis, & alijs partibus extremis. rigor hoc
loco sumptus est pro omni typo, in lumbis
mulierum, quia habent matricem neruolam
in posteriori parte virorum, quia posterior
est frigidior anteriori. signum est raritas, &
porositas partis anterioris, & est pilosus, &
carnosior, & plus sanguinis habens. extrema
sunt frigidiora, & densiora non potentia be-
ne calefieri ob remotiones caloris. vnde cir-
rigent, incipit ab inferiori parte dorsi, & as-
cendit ad caput. quoniam hic locus est frigi-
dior, & ventosior, & spissior, & minus sangui-
nis habens. dixit Ras. 18. conc. rigor vehemēs
calefit velociter, quidam tardè: & debilis qui-
dam tardè. & debilis quidam calefit velociter
quidam tardè. pri. fit ex melancholia. sec. ex
phlegmate vitreo. ter. ex salso. quar. ex grosso
non

non vehemens frigiditatis. & vna species est, quam sequitur febris, & vna quam non sequitur. & ter. quoniam mors, quæ est cum casu virtutis, quæ non potest sustinere membra. rigor ait Gal. de accid. à quacunque causa perueniat, qui est fortior & breuior à primitiuis, vt plurimum accedit macris, & latorum pororum, & præsertim si malis, & pungitiuis chymis, sine repleti ab antecedentibus vt plurimum crassis, densis, ac opilatis. post rigorem sequitur magnus calor, propter ea quod intra erat retractus absque euentatione & vnitus, & ob confractionem, & collisionem partium angustuosam, vt videmus in corporibus laborantium, & currentium, qui calefiunt, & si starent in sole. quare rigor absque febre est ob multos humores crudos generatos, similes vitro, qui humores non sunt putrefacti, quoniam post rigorem accenderetur febris.

*Vniuersalis curatio febrium
putridarum.*

Gale. 2. metho. ait. febris humoralis curatur per contrarium. quod verum est in febre absque materia, sed in Tech. inquit febris putridæ duplex est curatio: alteratio, scilicet & euacuatio, & Auerr. 7. collig. intentio est remouendi malam complexionem, & malam materiam, nam tibi noscende sunt res naturales, & præternaturales. & quidam aiunt, ex dictis sex satis est, scilicet cognoscere febrem, ægri complexionem, ætatem, virtutem, æris complexionem, & consuetudinem ægri. & 10. meth. ait solue febrem præsentem euerte. quod generatum est, prohibe generari. & 2. metho. inquit considera morbum, causam morbi, & symptomata. & Auicem. prima quæritur in medicanda tali febre quandoque; vertitur ad febrem, vnde in frigida; & humecta: quandoque ad materiam, quare matures, & digeratur, aut euacuetur, aut diueras digestio est alteratio faciens cessare putredinem, manente substantia, ita quod tunc sola remanet intentio alterationis discrasie. nec satis est ad remouendam febrem digestio materiz: quia remanet vt videtur innuere Auic. 2. 4. & Galen. secundo prog. sed 2. meth. sumitur, quod cum putredine concurrat causa eius, quæ est ex indebita humoris transpiratione, & accedens concurrat causæ eius, quod est defectio eorum, quæ transpirare debent: quare præter intentionem sumptam à putredine, emergunt duæ aliæ: vna ad prohibitam transpirationem remouendam: altera ad transpirandum, quod retinetur. & quia prohibita transpiratio habet causam opilationem. vnde alia surgit intentio ad aperiendum, &

exopilandum: & quoniam opilatio quatuor habet causas scilicet primitiuam, vt frigiditatem exteriorem, sordiciem cutis, & id generis: & tres corporales, scilicet multitudinem humoris, grossiciem eius, & viscositatem. quocirca quatuor insurgunt intentiones curatiue. pri. ad remouendam causam primitiuam. sec. ad euacuandam multitudinem. ter. ad subtiliandum grossitiem, quar. ad incidendam viscositatem. & quia euacuatio est necessaria, & aliquando humor ob subtilitatem est ineptus euacuationi, ingrossandus est, & quia membra febricitantium leduntur, & debilitantur: hinc alia intentio ad membrorum confortationem. ex his igitur intentiones curatiue 12. colliguntur. prima scilicet à febre, & est alteratio caloris eius, nouem à causa febris: vna à causa primitiua, aliz à causa corporali, id est à multitudine humorum, à grossitie, viscositate, subtilitate, opilatione, prohibita transpiratione, transpirandorum retentione, à putredine. vnde prima sumitur à subiecto febris, quæ est membrorum confortatio: duodecima ab effectu febris, & est accidentium rectificatio. quare ait a Gale. 2. metho. inspicere has omnes intentiones, vt intelligas, quo auxilio primum & magis, quod minus secundum, & quod adhuc minus tertium, & vide quod prima medici intentio est febrem abijcere. secunda putrefactionem expellere. tertia retenta respirare. quarta opilationem remouere. quinta causam opilationis expellere. sed Gale. 2. metho. ait quodcumque inuenitur est, vltimum est secundum methodum resolutoriam in curatione. vnde quod est primum intentione, est vltimum resolutione. quocirca primum causas opilationis remouebis, secundò opilationes aperies, tertio retenta transpirabis: quar. putredinem expelles: quint. calorem qui remanserit, exstingues. verum non semper medicus potest ordinem regularem seruare. itaque in vehementi caliditate febrili cogatur quandoque à curatione febris incipere, quandoque ab euacuatione secundum totum. i. cratiua, quandoque ab euacuatione secundum quod. i. minoratiua. itaque ait Gale. intentio curatiua est triplex, vna minuit calorem, & augeat causam, & hanc improbo. secunda causam amputat, & calorem negligit. quod virtutis in febre fortissima, quam æger sufferre non potest. & eius virtus non fit potens. vnde ait Auicem. si virtus est fortis, abscinde causam, expelle humorem, abscinde cibum, & non in frigides in frigidatione, quæ prohibeat resolutionem, si virtus est debilis, in frigida, &

vinifica virtutem . & cum facta fuerit fortis, rede ad causam . tertia est consideratio accidentium, quæ quandoque cognuit vti contrarijs, & morbo, & causæ, ac postea fit, vt aut morbus diuturnior euadant, aut magna cum difficultate curetur, aut vtrunque accidat : veluti quandoque coacti fuimus in febre exhibere vinum . ob debilitatem stomachi ; cuius gratia fit syncopis . omnes intentiones supra dictæ sunt à re præter naturam ; sed oportet etiam indicationem sumere à re naturali, & præcipuè à complexione, & maxime ea, quæ tunc est, cum febris incipit . dixit Galen. 3. de tuen. sanit. non sufficit scire, quid sit operandum, sed cum quibus & quo modo : sed quia natura est operatrix depulsiōnis morborum, & rerum præter naturam tres corporis membri naturas conseruat, vt eis mediantibus morbi fiat expulsio . quare curatio non sit morbo contraria, vt non sit similis naturali dispositioni . sicut enim curatio fit per contraria, sic conseruatio per similia .

Non obliuioni tradas cor, & etiam alia membra, à quibus febris originem ducit, quare scopus circa febrem sit contrarijs vti, circa materiam digerere, & euacuare : digestio contrariatur indigestioni, & putrefactioni, non quantitati replentis, sed euacuatio est principalis scopus, & digestio accessoria ferè, quoniam in omni materia non est digestio necessaria, vt in furiosa ex putrefactionis causis est putrefactio . quare si à frigiditate densatum est corpus, rarefice, si à caliditate & siccitate dilata poros cum caliditate, & mollitie : grossos, & viscosos humores subtilia, & incide, siue fluidos redde . nam subtilitas est contraria grossitiei, & liquiditas viscositati : si multi fuerint, euacuabis .

Putrefactioni ait Galen. 2. metho. oppositur digestio, eūo, & infrigidatio : digestio enim est oppositum formale, nam facit eam cessare, sed cessata remanet humor euacuandus, & quia omnis materia putrida est calida vt cholera per se, & phlegma per accidens ; in cholera necessaria est infrigidatio : in alteratione, & in digestionem, & in principio, sed in phlegmate remissa in principio, sed competit digestio cum calidis subtiliatis, & incisuijs ; in processu eūo cum eisdem, in fine si discrasia calida remanserit, infrigidatio : & hoc pacto putredinem remouemus febrei vero id est calori, & præternaturalitati caloris contraria est infrigidatio, & calida aromatica, quæ corroborant calorem naturalem, vt resistat præternaturalitati, & eam depellat . verum inuestiga, quæ medicina tandem morbum, causam morbi, & sym-

ptomata curent . omnes dictæ intentiones putridæ febrei conueniunt, tamen secundum alios reducuntur ad tres scilicet digestionem, euacuationem, & alterationem : nam intentio subtiliationis humoris grossi, & incisionis viscosi, & ingrossationis subtilis, & expersionis opilationis ad digestionem reducuntur . Intentio sumpta à prohibita transpiratione, & à detentione eorum, quæ transpirare debent, ad euacuationem sumpta à putredine, ad alterationem reducitur .

Non moueas materiam indigestam nisi in tribus casibus . primus quando materia est sanguis putridus, siue non putridus, in quo ait Auicem. prima quartæ non conuenit digestio . sec. quando materia est fumosa, & est illa, quæ est vehementer calida acuta, velociter de loco, ad locum mobilis, & malignitate, & venenositate participat . hæc materia non sinit ægrum quiescere, & facile tendit ad membra principalia . ter. quando humor fuerit multus grauians suam multitudinem super naturam . tunc Auicem. ne æger recumbat, minora materiam, exceptis his tribus . Materiam indigestam non euacuabis, non quia fortasse multiplicatur euacuatio boni humoris, quæ erit causa, quod natura non perduret vsquæ ad statum, vel si duret, non cum fortitudine, cum qua possit expellere malum humorem : tamen quia multiplicatur euacuatio humoris subtilis, qui etiam resoluitur à natura . unde nil prodest, sed laedit virtutem, tamen quia forte miscebitur in euacuatione malignum cum bono : itaque ferret morbus fortior .

Et scito, quod si in principio medicus videret ob multitudinem materię non posse iuuare, sed ægrum moriturum siue euacuet, siue non ; non euacuet . nam, ait Galen. commen. in constantibus morbis morituros non debere medicari . quidam addunt quartum casum, & est quod auctoritate Galen. 13. metho. & Auicem. quarta primi de apostematibus occultis, materia minoranda sit phlebotomia, & solutione ventris : phlebotomia quando apostema est sanguineus aut defluxus est cum sanguine ; solutione quando defluxus est aliorum humorum non cum san- si quidem in principio fiat euacuatio diuersa, præsertim si materia sit multa .

Ad aperiendas opilationes ait Ga. 2. metho. si vis aperire prius præuacua multitudinem, quod nisi feceris, maiorem opilationis dispositionem ages, repugnantibus sibi inuicem intentionibus .

Vbi virtus est debilis, non euacues, sed prius refocilla . sed Ras. 18. concl. in febribus humorum nihil est laudabilius euacuatio-

tionem: quando hæc febris est ignis inflammatus superfluitatibus. adheret autem eis, & virtus dissoluitur, & sequitur mors, sed euacuatio minoratiua ante digestionem in principio fieri potest cum medicina euacuante exsoluendo cum materia illa exigerit: eradicatiua, nisi completo statu, & tunc solum in casu, in quo videas materiam non debere crislum facere, unde Auic. non facias euacuationem eradic. & ideo moueas donec vincat natura, & digerat. quod est in fine status perfecte. & tunc etiam expecta naturam, quæ solet illo tempore mouere, quæ si tunc mouet, aut parata est mouere, dimitte eam. Sin moueat: moue in hora motus eius, scilicet completa, & expectata. si igitur non mouet per totum diem vicinum; moue tu in die frequentiori. & si mouet motu diminuto, aut lento; adiuua. & cum euacues, euacua per regionem conuenientem, & non contra partem materię euacuantis per conuenientia loca de digestionem, & euacuationem ait Auer. 7. collig. euacuatio, quæ fit aperiendo opilationes, fit incidendo humores grossos, & subtiliando & digerendo. & rectificando illud quod potest rectificari. & expellendo quod non potest rectificari. & hoc fit maxime in in omnibus febribus, & præcipue quæ sunt incensue, & etiam in omnibus temporis eius quando materia putrida non rectificatur nisi rectificando quod non potest rectificari. & expellendo quod non potest rectificari.

Alterationem euacuatio præcedere debet Gal. 10. meth. quando in frigidis in frigidando nullo modo intendendum est ad dispositionem tantum ita scilicet quod intentio ad causam relinquatur. quare in frigidatio fit tanta, quod causa febris non augeatur. unde Auic. prima quarti non des trochiscos in frigidatiuos, scilicet & stypticos. vt de rosis, & de spodio, nec zuc. ros. in febre putrida: nã licet in hectica concedamus, id fit: quoniam curatio hecticæ super contrarietate morbi est posita; putrida non solum super contrarietate, sed etiam super abscissione causæ, quæ dicti trochisci, & alia similia prohibent: propter ea quod styptica opilant, & transpirationem prohibent, & sic ad putredinem faciunt. idem confirmat Auer. 7. col. tamẽ in duobus casibus ante digestionem, & euacuationem possumus vt frigidis stypticis: vnus quando causa febris esset fluxus ventris, aut vomitus, virtutem prosteruens, secundus quando fieret magna à corpore transpiratio, aut sudor plurimus, quo virtus prosterneretur. post digestionem, & materię euacuationem vt licet alterantibus frigidis & stypt. extinguunt enim reliquias caloris, confortant membra, & quã

do ante euacuationem danda sint alterantia frigid. sint & humida, ac talia, vt alterando putredinem mundificent, & abstergant. & ait Aui. in die parox. non curabis febrem, scilicet cum in frigidantibus, quia prohibent citam resolutionem, & ter. paroxismi, & hoc nisi caliditas fortia induxit accidentia de siti, vigilijs, inquietudine, & id generis, aut nisi fortiter resoluendo virtutem frustra erit: nec solum ad intra, sed ad extra alterantia non adiunxeris, nec ad extra nisi materia minorata, præsertim styptica. nec conceduntur virtute imbecilli, sed forti, quæ in frigid. non sunt intensæ: quia essent causa indigestionis, augendæ opilationis, febris, & debilitandæ virtutis. & hoc cauendum est non solum in febribus remissis, sed etiam in acutis. & caue ne in frigidatio tua cadat in principio paroxif. cum sit hora abscissionis materię, nec in augmento, nec in declinatione, cum sit hora resolutionis materię & sudoris. sed fiant in statu. quæ est hora feruoris. quidam concedunt in fine augmenti, quidam in die interpollationis, & etiam parox. per multas horas, vt Alex.

Euacuatio alia est communis, quæ ab Auic. dicitur exsiccatio, alia propria, communis respicit materias communes corporis, & illas solam euacuat: propria proprium, quæ facit febrem, siue sit causa antecedens, siue coniuncta. propria est duplex, altera minoratiua, quæ febris partem abscindit, altera euacuatiua, quæ totam febris materiam communis. fit vt plurimum in principio morbi, propria post communem euacuat, & quibus obuiat, sed propria proprium humorem minoratiua potest fieri cum aliqua materię portio est digesta: eradicatiua, cum perfecte tota minoratiua cū medic. leniori virtute, vel dosi. communis præparat ad minorationem, & hæc ad eradicationem. communis, & propria possunt fieri per pharmacæ solutiua, vomitiua, per sanguinis missionem &c. sed aduerte, quod tres materię species in corpore febrientis è febre putrida reperiuntur: quædam seruant suã naturalitatem, quamquam secundum primas qualitates mutatz. sint ad calorem febrilem. & hæc sunt materia febris putrida, neque antecedens, neque coniuncta, quamuis aliquando contingat ex febris malignitate vel errore fieri materia antecedens, & deinde coniuncta febris putridæ, & hæc non egent euacuatione nisi si quantitatem excedant naturalem. aut in causam vertantur antecedentem. & tunc fiat vt per naturæ exonerationem, & allevationem melius, & citius natura febri resistat. nec materia illa communis exuberans, & qualitate alterata relinquatur nature. quæ vacare habet circa febrem, & materiam eius, &

derelicta corrumpatur, & fiat materia antecedens, & tandem coniuncta febris. unde febrem angeat, & prorogat, vel in deteriore dispositionem mutet. hæc materia non in febriente respicitur, tamen in pluribus ut in ephemera: cum homo est valde repletus, & in hectica primæ speciei; unde euacuanda est ob præseruationem: propterea in putrida febriente insunt aliæ materiæ, scilicet aliæ quæ sunt in eo necessario & etiam in ephemera, & hectica, quædam contingenter. quæ reperiuntur in omni febre siue ephemera, siue putrida, siue hectica & sunt duplices; quia quædam semper sunt in stomacho vel venis mesar. in orificijs earum, ut materiæ quædam fecales, & mucosæ, & chylosæ. quædam in venis cum sanguine quæ sunt aquosæ, serosæ, vel vinctuosæ. & præter has duas in putridis reperiuntur aliæ materiæ vaporosæ magis, ut vapores corrupti à materia appropriata coniuncta febris putridæ eleuari qui peruenient ad corporis superficiem: quia non omnes petunt cor. sed quidam ad ambitum corporis non expulsi. Id est retenti ob aliquam causam. secundum totum, vel secundum partem ingrossantur ibi vapores etiam corrupti mixti simul cum calore febrili à corde ad membra. vapores etiam eleuari à causa antecedenti febris, quæ omnes materiæ alterantur à calore febrili, & disponuntur, ut corrumpantur, & misceantur etiam cum vaporibus corruptis, aut inflammantur maxime quæ sunt vinctuosæ, & prædictæ materiæ tandiu in corpora reperiuntur, quandiu durat febris quæ quotidie generatur, & alteratur. materiæ autem contingenter in febribus repertæ non reperiuntur in hecticis, sed in ephemericis, ac multo magis in putridis: sed nec semper, sed in quibusdam corporis dispositionibus. & hæc sunt aliquando sanguis, aliquando cholera, phlegma, vel melancolia, & aliquando sunt materiæ in stomacho generatæ per viam indigestionis fructuum, herbarum, & huiusmodi præter supradictas necessario repertas, & prædictæ materiæ omnes dicuntur communes sicut & primæ, unde necesse est ut etiam illo modo euacuantur, imo multo plus cum alteratæ sunt magis dispositæ corruptioni quam illæ. quæ naturam plus grauatur, tertiæ materiæ febris putridæ sunt materia approprianda febris, quæ est duplex, scilicet altera quæ verè computruit, & dicitur materia coniuncta febris putridæ; quia ipsa posita ponitur & febris, & remota remouetur, altera, quæ nondum computruit: sed est sub dispositione, sub qua si in corpore remaneat, necessario putrefieret actu. & esset materia coniuncta febris, & hæc dicitur causa antecedens febris putridæ. pos-

sunt etiam hæc tres materiæ adaptati febris tumoralis non putridæ & quibusdam ephemeris veris, ut quæ sit ab opilatione, nauseatiua facie, bubone, vomitu, fluxu ventris, & huiusnam. in omnibus his febribus materiæ peccantes debent euacuari. sed materiæ quæ sunt propriæ febris putridæ. nunc dicemus de euacuatione communium, deinde propriarum materiarum.

Quocirca palam est, quod materiæ communes in diuersis corporis partibus sunt locatæ, quædam in venis, ut sanguis, vel alius humor sanguini mixtus mixtionis forti, & vnta, vel non vnta, sed potius separata, ut aquosæ materiæ, & serosæ, quædam in stomacho, intestinis, & mesaraicis: quædam iuxta corporis superficiem, ut vaporosæ, & vapores ingrossati, quædam in diuersis partibus, ut venis, vel receptaculis, quæ tamen possunt petere stomachum vel intestina, & quia vnaqueque materia debet euacuari per conuenientem regimē, & loca situationis earum sunt quinque: igitur Auic. quinque canones ad earum conuenientem euacuationem, direxit.

Primus & vltimas ad materias communes contingenter repertas, tres medii ad necessario repertas. quare primus ait. Auic. cum sanguis vinxerit, aut fuerit cum humore, phlebotomia est conueniens, si vrina fuerit rubra grossa, non citrina ignea, ex qua timeatur apud phlebotomiam victoria cholera, & acuitas eius, neque liuida, neque alba, ex qua timeatur phlegmatis crudititas: nam vrina rubra grossa significat abundantiam sanguinis, & complexionem radicalem sang. quamuis æger laborat morbo alterius generis.

Secundus est de materia necessario reperta in stomacho, intestinis, & primis venis. unde post phleb. si necessaria sit, fiat debilis solutio ventris, id est lenitio, si siccus fuerit venter, & sit vltimitas, id est medicamentum euacans materiam propriam febris, neque laboriosum vel loco lenitiui fiat clystere.

Tertius veni ad humidas serosas, & aquosas, & hæc sunt, quæ vrinam prouocant debilitate ut syrup. acetos. cum radice zpii, & huius. & hæc est conueniens regio materiæ aquosæ, & serosæ.

Quartus postea veni ad materias vaporosas, & fac sudare ægrum, & aperiri poros, ut excludantur vapores nondum ingrossati.

Quintus si humor tendit ad stomachum per signa declarantia fac vomere debilitate, & cum syrupo acetoso, & aqua calida, si ad intestina adhibe, quod leuiter soluat. quod si natura id per se efficiat, sine, & non diuersifices. tamen si ex. g. quis sudaret

ante paroxysmum; sudor non est pars materię febris. si postea accederet rigor, ac in fine, siue declinatione sudor: sed est alius humor. primus, & quin impleantur, quando materię repertę fuerint; ita quod etiam augmento, & statu vniuersalibus, vel particularibus, & si non inueniuntur in aliquo tempore nō moueas, alij tres, qui diriguntur ad materias necessario repertus non solum in principio, vniuersali, sed et in particularibus debēt obseruari omni tempore, quando materię dictę reperiuntur in dictis febribus. v.g. vit sanguineus quadragenarius carnosus ob captiuitatem multa comedit ex fructibus, & herbis, & post febrilem phlegm. vidi vrinam rubream grossam. iussi clystere, ac postea feci phleb. sequenti nocte accepit in aurora vnc. ij. syrupi acetosi vt digestio materię appropriatę febris fieret. post solis ortum exhibui cyphum aquę hordei cum vnc. j. zuc. rubei, vt venter leniretur per abstersionem, ante cenam per duas horas exhibui vnc. iij. aquę capil. vene. quę digerit materiam, & vrinam prouocat, serosos excludendo humores. & post horam vnā & mediam iussi eum fricari leniter cum panno aspero calefacto vt vapores excluderentur. & quamquam feci cooperire, non sudauit. post cenam per tres horas passus est nauseam, & assumpsit aquam tepidam cum pauco aceto, & cum digito euomit humores viscosos tendentes ad colorem citrinum, vel viride. tunc sumpsit mel rosatum colatum, & syrup. dictum ana vnc. j. & post solis ortum recepit clyst. ex decoctione blitis, maluę, & fursuris cum zuc. melle, & oleo comuni, & sale. prædicta cautiones non in omni febre putrida impleri possunt omnes, quia medicus non semper vocatus est in principio vniuersale, & quia aliquando prædictę materię omnes non reperiuntur, & saltem sanguis indicans phleb. & ob nocumentum, quę occurrere possunt. tamen semper implendi sunt hi: quia ad materias necessario repertas diriguntur. hoc facto processu cura febris phlegmaticę nunc euacuationem materię appropriatę aggrediamur.

Phlebotomia euacuat materiam appropriatam febris hum. febres vero, quibus competit phleb. sunt duplices: nam in vna peccatum est, in sanguine solo stante sub forma sanguinis, siue sit sanguis contradistinctus alijs humoribus, siue sit massa sanguinea, & peccatum ipsius sanguinis: potest esse in quantitate, aut qualitate, aut in vtraque, aut est peccatum in sanguine tum solo, sed cum alio humore mixtus mixtione mala, quę sequi possunt sanguinem. alie sunt in quibus

peccatum est in vno vel pluribus aliorum humorum, & tunc autem cum eo peccat, vel cum eis peccat etiam sanguis, vel non. si igitur sit peccatum in sanguine solo, phlebotomia statim à principio nulla expectata digestionem. quoniam est obediens, & aptissimus educi: quia est digestus: sine mala complexione, & subiecto non peccat: vnde vena incisa statim fluat sanguis. sic per dictas rationes illico fiat phlebotomia. si mixtus est cum alijs mixtione vnita; si peccat in quanto; si sanguis solus peccat, aut mixtus cum alijs in qualitate, & illa mala qualitas, si est coniuncta putredini eo pacto secundum quod sanguis, vel alij humores cum eo non multum sit remouens à sua naturalitate, nec sit factus inobediens fluxui per suum malum modum substantię illico à principio facienda est phlebotomia non expectata digestionem. quare his tribus casibus fiat copiosa eradicatiua, quamquam in primo casu facienda est ad defectum animi, in secundo minus, & in tertio minus, quam in secundo consentiente complexione, habitu, consuetudine ætate, & huius. quocirca Auicenna. prima quarti cum phlebotomia postponitur à principio non est vt amplius intentio: quia si eam fueris tantum, & ralem, qualem in principio fortasse interficiet ægrum; nam quotidie hum. alterantur, & remouentur à suis bonis conditionibus: vnde debilitatur virtus non bene regulans humores. & terminus ait Auicenna. quarta primi non est post quatuor dies, sed etiam post quadraginta, & quatuor si circumstantię consentient. si peccatum magnum fuerit in qualitate solius sanguinis, vel cum alijs ita, vt non possit fieri phlebotomia digere, ac postea fac eam, non eradicatiuam, sed minoratiuam, consentiente ætate, & alijs. sic si in qualitate, & quantitate peccet solus, vel mixtus, & peccatum sit paruum; statim incide venam; si magnum prius digere. Auerro. septimo collig. ait, quod phlebotomia fiat vbi sanguis signis apparent, sed melius est, vbi est quantitas, & non malitia, quare maius iuuamentum phlebotomię expectatur in synocha inflammatoria, deinde in febre, in qua peccat in quantitate cum vno, vel pluribus humoribus: deinde in qua, & quanto, & equali simul: postea in qua sanguis solus in qualitate secundum peccat. tandem in qua sanguis cum alijs in qualitate peccat. verum ait Galenus. vbi est rigor fortis, & prolixus, quia significat abundantiam humoris crudi, ne minuas, & precipue si calor corporis, & regimen præteritum attestabitur, & caliditas

sequens fuerit brevis, & debilis. & Auic. de phleb. consulo, vt dimittatur vbi sanguis est bonus, & humores alij peccantes: quando euacuabitur sanguis, qui non peccat. vnde debilis sit virtus, nec fiat puleb. in abundanti humore crudo, nec in multis febribus acutis: nam in febre continua, in qua corpus attenuatur, cito quæ est causonica febris adurens, & adducens cito faciem ad tenuitatem cuius hum. sunt vehementis subtilitatis. non fiat minutio, timetur enim cholera ebullitio, & furia, & phlegmatis incrudatio vltima. & si quando necessaria sit, reiteretur, & præsertim vbi alij humores dominantur: quoniam in tali phleb. euacuatur multum eius, cuius euacuatio non est necessaria, idest sanguinis, secundo quia minus aliorum humorum quam sanguis euacuatur. tertio quia debilitatem natura resistendo in crisis. quarto aliquando reddit alios humores deteriores euacuando frenum eorum, cum plures erunt necessaria euacuationes. quinto ait Auic. postpone sanguinis euacuationem. quoniam & natura sic facit, & reseruat ad postremum, nec deserit nisi coacta, & ipsa peccatū sang. sepe corrigit. Auic. ait in febre sanguinea cum aliis humoribus sic in principio fiat parua phleb. in processu copiosa: quia quandoque contingit, quod materia iam multum diminuta, & natura dominante residuo materię eger liberetur toto, sed ad euacuationem materię per medicinalia transeamus. Ait. Gale. in meth. plurimæ medicina sunt calidæ, & siccæ febrem augentes. & Auic. plurimum digestiuium, & euacuatorium est calidum, & siccum. tamen quedam medicinæ sunt frigidæ & sunt lenitiuæ, & minoratiuæ, vt thamarindi quidam sunt calidæ, item eradicatoriæ materierum vt electuarium de succo ros. verum ait Ras. 16. con. auctori. Hip. non des febrienti medicamen laxatiuum ante 14. diem, quoniam carnes febricitantium ante hoc tempus sunt calidæ valde, vnde attraherent ad se medicamen illud celeriter, & si medicina fuerit abundans, interficiet eum celeriter. si modicum, augebit febrem, & longiorem faciet spatium morbi, & ducet ad ictericam, & si medicamen fuerit forte, id quod non poterit corpus attrahere, laxabit fortiter, & inducet spasmus ex violentia succitatis corporis. quod si eger saluabitur, & tollitur febris eius post euacuationem subuerteretur postea, & interficiet. quare in forti febre non sumas laxatiuum forte, nec calefactiuium, nisi opus fuerit.

Secundo exhibe in febre putrida medicinam appropriatam humori peccanti: quoniam si fuerit aliter, mala inducit accidentia, & la-

boriose, & angustiose euacuabit, & quandoque quod frenum erat humoris peccantis educet. vnde humor furiosus euadet. sit leuis, quoniã fortis agitat humorem, & inquietat, & periodum incitat. non sit valde stypticum, ne opilatio noua fiat. & in euacuando, ait Auer. 7. collig. sequamur naturam toto posse.

Ter. non moueas ait Auic. in die paroxysmi si fuerit possibile: quia motes medicamenti contrariatur morui naturæ mouentis materiam è centro ad circumferentiam, & medicinalis è circumse. ad centrum. quare posset interualla antecedente febris fieri agitatio vehemens quæ posset esse causa defluxus ad principalia, & secundum naturam naturaliter operans mouet materiam, & facit crism in die paroxysmi. coacte tamen aliquando mouemus vt si febris accederet quotidie, aut conclusa non proportionalis, aut materia esset venenosa, & & furiosa, aut natura in die crisis moueat lene, vnde egeret auxilio, quo non exhibito timor esset, ne materia moueretur ad aliquod membrum principale. vomitus tamen securus, quàm secessus pot. prouocari in die paroxysmi, quia humores in paroxismo turbati mouentur sursum, & vt frequenter ad os stomachi, fiat etiã in die meliori, vel declinatione, nisi in declinatione fieret euacuatio manifesta, vt sudoris copiosi, vel egestionis. si declinatio fuerit cum euacuatione, melius est vt loco phleb. fiat scarificatio in anclis, vel secus anum apponantur sanguifug. & secessus prouocetur per clysteria. si febris nunquam cessaret omnino, euacuatio fiat cum tepescit: vel hora frigiditatis, vt in aurora.

Quar. ait Hip. vbi natura repit, ibi ducere oportet, si euacuet per convenientes regiones. & Auic. non agas in euacuatione partem contra partem euacuationis naturæ quæcumque sit euacuatio illa: quoniam eius humores faceres redire per illud, quod facis in dispositione ad dispositionem motus paroxysmi. Idem ait non diminuas à prio. humores. per medicinas quæ faciunt statim redire paroxysmi. vt facit scamonea sola exhibita in prin. tertianæ. nam inflammat humores, & paroxysmi. fortior redit. & mirabolani citrini in tertiana, chebuli in quotidiana, & indi in quarrana: quia opilant, & addunt ad putrefactionem. vnde redit paroxysmus maior.

Quin. cum in principio materia est cruda, & multa, & virtus non fortis, aut times ne debilis per euacuationem euadat, ad digerendū residuum, tunc da medicinam fortem debile, idest dimidium dosis, aut virtutem eius, & projice substantiam.

De vomitu ait Gal. 10. meth. qñ humores impetū faciūt ad os stomachi, vomitu prouocant illos

illos: aliter autem non oportet præter naturam prouocare. & Auic. cum natura mouet humorem ad uomitum. s. quacunque hora particulari, uel uniuersali in principio, uel processu, præcedentibus, uel non præcedentibus aliis euacuationibus; non diuersificis eam ab eo: scilicet sed adiuua. si expedit. & Paul. si declinant, & non excitatur nausea; non fiat uomitus, ait Ras. 16. con. non detur febrienti medicinam uomitiuam, ut uomat ante septimū diem: quoniam si vomeret, & in insultu morbi, in principio ultri, pateretur dolorem stomachi, asthma, tumorem ventris, alienationem & per medicinam uomitiuam intellexit: fortem, siue detur ad minorandum, siue eradicandum ob agitationem, quam poneret in materia non digesta. & idem ibi ex secundo epid. ait euacuatio cum laxatio in febris. est melior, quam cum vomitio: quoniam euacuatio cum uomitu est fallax.

Clystere laxatiuum in omni febre putrida, uel acuta, ante uel post phlebotomiam, ut ait Auic. quarta primi est multum utile; cum ob exsiccationem, quam facit febris, tum ob materias in intestinis contentas non corrumpantur, uel inflammantur: tum per expulsiōnem uaporum maiorum, qui sunt in eis: & retenti sunt causa doloris ventris, deiectionis appetitus, & id generis accidentium maiorū: tum demum ob materias, quæ resudant à mesaraicis ad intestina, ut excludantur. Nec lenitiuum per os assumptum idem præstat: quia laxat stomachum, deiecit appetitum, & licentiam præparat, quocirca ait Auic. prima quartæ clyst. vsum sibi esse maxime dilectum. itaque quidam alternis diebus, quidam quotidie clystere iubent, hinc ait Auic. provide, ne occurrat proximus; nisi ventris sit vacuus à febris, & aliis materiis in intestinis contentis, vsum clyst. maxime sit: post phlebotomiam & alias euacuationes minoratiuas; & eo magis quando materiæ sunt in inferioribus ventris, sed quando in superioribus medicina lenitiua per os assumatur. & hoc in loco considera ægri dispositionem, & aptitudinem ad hanc uel illam sustinendam. Rabi ait in 13. par. cuius virtus est fortis, clysteriza, cuius est debilis fac suppositorium, fertur 4. regu. acu. q. qui habent carnem raram, leuem, & facilem resolui, & est pinguedo, uel macies dominans; omnia purgantia sunt dubia; & timorosa, sed curandi sunt clysteriis, & suppositoriis: in febris acutis non facias clystere acutum, nisi accidens aliquod cogat, imo nec in principio febrium putidarum: quoniam mouent materiam, & si accidens inflet, ante clyst. acutum fiat lenitiuum. & ait Auic. quarta primi clystere acutum debilitat he-

par, & producit ad febrem post principium tamen in putridis è materia frigida conceditur, ac magis si solutiuum exhiberi non possit, & materia purganda sit in locis propinquis intestinis, stomacho, uel capiti. unde ait Auic. quarta primi enema est medicamentū nobile in attrahendis superfl. à mēbris principalibus superioribus. si verò materia esset in venis remotis, ad quas virtus acuti clysteris peruenire non posset; ipsam non administrēs. fortasse. n. agitarēt materiam, & non educeret.

De euacuatione per urinam ait Auic. prima quartæ non prouoces urinam nisi præcedant dictæ euacuationes, præsertim post euacuationem minoratiuam. reitēra si opus fuerit ad mundificationem intestinorum, stomachi, & mesaraicarum, hepatis, & venarū emulgentium à materiis in eis contentis: nā si diuretica inueniunt materias malas in dictis locis, mouerent eas versus hepar, & obstruerēt ipsum: si in hepate mouerent eas ad venas, & eas obstruerent, & augerent febrem: sed mundificatis his omnibus diuretica sunt valde utilia, ut ait Auer. 7. collig. nam tunc præcipiunt reliquias materiæ, quæ remansit, & opilationes aperiunt, & febrem amputant. Vfus eorū sit in febris phlegmaticis & aliis omnibus chronicis, & incipe a debiliore, & gradatim ascende, & præsertim, in his qui sustinent ardorem urinae, quia cum calidis misce frigida & quoniam aliquando, ait idem, inducunt angustiam, inquietudinem, & corruptionem stōi membra principalia ut in declinatione diureticorum adde masticem, uel zuc. ros.

Post prædictas euacuationes si opus fuerit, fac sudare, quæ prouocant urinam subtiliando humorem deducunt eum ad aqueum humorem, quæ sudorem, subtiliando humorem deducit illum ad quandam humiditatem subtiliorem illa, prouocatiuum sudoris, & urinae non exhibeatur ante euacuationes prædictas, nec post si remanserint opilationes in poris cutis, quia opilatio augetur diuersimodo materias illuc, quæ non possunt sudore euacuari, quia prius aperiantur pori cutis. Sic a debiliore sudorifico incipe, dixit Auerro. 7. collig. si materia febris fuerit frigidus humor & siccus abstinendum est ab his, quoniam sicca non debent quartanariis exhiberi. & si uis, frangē siccitatem cum succo liquiritiæ, & zucchero uiolato. nec in febris valde acutis sudor est pronocandus, & in quibus timetur arefactio corporis, & consumptio, nisi materię essent contentæ extra cutē; & id cante fiat adhibendo frigida, & humida intra, & extra, qui corrigant arefactionem. prouocatur sudor ab extra, & ab intra. lenia sudorifica omni.

omni tempore morbi intus, & extra possunt applicari fortia non stante plenitudine maximo quæ ab intus, ne materias deducerent ad uenas, & uersus cutem, & in opilationem adderent.

Euacuatio insensibilis est omnium postrema, ideo Auic. supra. post prouocationem urinae, fac sudore & aperi poros, id est si insensibiliter euacua. sed ait Galen. 10. metho. prohibetur fortis aperiio pororum stante plenitudine maxime in facili resolubili, ut raris, lenibus, subtiliorum humorum, & spirituum uel ætate ut in pueris, constitutione aeris calida, & sicca aut in pestilentiali. & ii. metho. non rarifices nisi euacuato corpore, corpus nec partem nobilem: calefacere. n. hypocondria & præcordia non est semper infallax, sed fiat in illis infirmis, quibus nihil est superfluum in toto corpore, & Gal. ibidem, crebra applicatio & immutatio auxiliorum præsertim resoluendorum maximum malum in his, qui non sunt phlebotomati, & est non maximum in phlebotomatis: nam in phlebotomia etiã in synocha febre apra nata est nocere incensa enim viscera multo calore amburantur & affantur. & Gale. 10. meth. quando instat magnitudo febris, ut in synochis, non utens vino, nec balneo, nec vnctione rarificante: sed tunc cum apparet humorum digestio, quæ significant virtutem fortem: & tempus frigidum, cum igitur leuiter transpirare uolumus, eligamus calida in primo gradu: cum fortiter, calidiora, sed non multum eleuata, & prius fiant leues frictiones: & quando inunctio sit cum oleo solo, absterge postea, ne opilatio sequatur: si cum oleo mixto, cum aqua, vel uino, non est necessaria abstergio.

¶ Duodecimi dictum est, esse intentiones curaturas febris putridæ, inter quas est leniticum medicamen, ut manna, cassia simul, vel separatim in bolis, vel cum aqua hordei, sed maior in dosi dissoluta item conditum recens de violis, succus granatorum. in febre phlegmatica, vel melancholica optimum lenitium est ius galli decrepiti à vnc. vi. vsque ad lib. i. Clystere lenitium sit cum intepulli, nitellis ouorum, & oleo uiolato. ait Gale. in li. de Cly. constrictio egestionis ægritudinem auget, & facit furere humorem, debilitat operationes naturales: & corrumpit animales inducendo grauem somnum, & mentis alienationem. recitat Ioannitius Clyst. mitigans febrem R. vitellos ouorum n. 3. croci chirar 12. olei rosæ vnc. 2. vini cocti vnc. iij. compone cum aqua hordei. mitigat ait Ras. inflammationem, & siem valde.

Vacuant materias serosas contentas in gib

bo hepatis, & uenis, quæ leniter prouocant urinam, ut in acutis aqua seminum comminuum frig. & emulsio eorum bibita ad vnc. iij. aut aqua solatri, endiuic, scariolæ, & id generis. in phleg. aqua fœniculi, vel pluvialis, in qua bullierint radices apii, vel fœn. aut cicer rubeum. prouocantia dentur post lenitionem, siue processerit phlebotomia siue non.

Materias communes sitas iuxta cutem euacuant prouocantia leuiter sudorem, ut aqua hordei cum zuccharo in acutis bibita ad vnc. iij. in aliis febribus vinum album debile limphatus ad vnc. iij. post lenitionem ventris, & prouocationem urinae, postea cooperi, ut sudor exeat. ait. f. dinami. bulliat semen lini in aqua, & liga in pannum bene expressum, & pone super stomachum calidum.

Materias communes prædictas euacuat vomitus. sed caue, aiunt quidam in acutis: quia febris sit intensior, nisi humor irruat ad stomachum. tunc si expedire prouoca cum aqua hordei tepida, & modico aceti, aut syrup. acetos. vnc. iij. in phleg. oximel simplex sumpto uomituo circiter quartum horæ prouocetur, uomitus digito, uel penna.

De opilatione sit remouendo causam primitiuam opilantem si adfuerit, leuiter fricando torum corpus ante cibum, omittis prius superfluitatibus, incipiendo à superiori ad inferius. quidam fricât cum aqua decoctionis florum chamæ, meliloti calida. quidam cum oleo chamæ solo, uel mixto cum uino albo debili, uel cū aqua, & fiat quotidie frictio semper diuturnior, & asperior. Auferunt ad causas opilationis corporales digestiones humorum opilantium, & syr. acetos. simp. est digestum omnium humorum.

Post digestionem si materia perfecte digesta fuerit, & febris est de reseruantibus materiam ad unicam criticam expulsionem, dimitatur naturæ. si tamen ea non moueri, eradica, si uerò non fuerit perfecte digesta, aut non fuerit febris reseruans materiam ad unicam expulsionem, minora eam minoratio non debili.

Ablationem, & prohibitionem putrefactæ. quidam complemento, ut frigida, sicca, ut acutum, aqua ferrea, acetosa, granatam muza, acetositas citri quendam prohibent ut sandali, rosæ ut camphora, & quædam à proprietate, ut sunt calida, ut cinnamomo cortex citri, capiluene, ficados, eupatorium, & Theriaca.

Inflammationem febrium acutarum extinguunt syrupi uiolati, nenuphar, cucur. de endiuia, iunib. manus christi, triasan. narcotica lenia, ut syrupus de papauere nigro. Ras. 17. con. R. sand. citri. vnc. ii. ros. vnc. x. semina laet. citrul.

citrul. spodii ana vnc. i. fiant trochisci. da vnc. ii. cum aqua rosata. liberatur pateriens à febre acuta uno die.

Alterantia ab extra non debent regulariter administrari, nisi pauca existente materia, aut multum minorata. aliquando coactis à summa inflammatione utere: sed caue in debilib. & extenuatis. quare embroca hepar, quia equatur eius complexio, & venarum. sed ne valde infrigides præsertim hora sudoris, & resolutionis: nam esset causa longa morbi. sic cor, sic caput nisi gravitate, vel catarrho aliquo teatur. sic renes, sic testes, sic stomachum. Ad confortationem virtutis, & membrorum exhibe cibos opportunos, & extingue malam complexionem, quæ deicit virtutem.

A proprietate febrem aufert, si in nomine saluatoris scindes ramos ebuli & cum vino albo des ante horam paroxysmi. & catene dormiat. quoniam aufert omnes febres, item hepar leporis tritum, & datum cum aqua scorpio. ponatur in lib. i. olei Luna decrefcente, vel quando est in gemini, & unge spinam tertiam: quartanarii, & quotidiana sterco gattæ cum oleo de lilio inunctum tenuem febrem sanat. coagulum leporis in pollice manus detectum sanat. ster. hum. bibitum cum melle, vel vino conuenit omnibus paroxysmis. Qui vult à putridis febribus præseruari, vitet causas, & maxime facile putrefactibilia, quæ opilationes intrinsecas generant, aut poros cutis obstruunt, vitet satietatem nauseatiam, & quæ prohibent bonam digestionem, vitet superfluitates in qualitate, & quantitate, & aggregatæ euacuent, & sepe vtatur his quæ putref. resistunt siue cum qualitate vt acetosa siue à proprietate, vt aromatica, & vnc. i. theriacæ cum aqua calida in omnibus decem diebus, tempore hyemis præseruat à febre putrida, ab epilepsia, & à colica, & sanitas fit omnium membrorum.

De febre sanguinea.

Febri sanguinea est calor accensus in sanguine. & hæc est duplex. s. sine putredine. & putrida. Serap. febris, quæ ab initio ad finem est vnius paroxysmi. s. ex sanguine, qui calefit calefactione sola, & sit febris similis febri ephemera: quia est humoralis sine putredine. quando aut putrefit proprie in instrumentis magnis, accidit febris, quæ est acutior illa, & est humoralis putrida. sed dubium est, vt rum sanguis putridus remoueat, aut conuertatur in alium humorem. putrefit ait Galen. sanguis. uel quia non transpirat, uel quia non regitur à natura ob multitudinem. & putrefactus seruet analogiam paroxysmi tertianæ. quia pars subri-

lior conuertitur in naturam bilis flauæ: crassior nigre, sed subtilior est velocior. unde prius. sed ad cognoscendam febrem, calor est suauis, & mitis si est sanguis putrefactus stans sub forma sang. quia stat in materia humida. si factus sit cholera, calor est mordax, & acutus, quæ sit ob multitudinem sanguinis est media inter ephemeram, & putridam. & vsque ad quartum diem stat sub forma sanguinis, sed postea vertitur in choleram. & ait Gale. non dicar aliquis, qd putrefactio sanguinis, quæ est in venis dicatur putrefactio vniuersalis adeo vt omnes humores siue massa sanguinis tota putrefiat: nam cum natura eos rectificare non potest, membra nutrimento priuantur & virtus caderet, & mors sequeretur.

Sanguis non est causa alterius febris quia est uicius temperamento: quia non calefacit alios humores. sed alii putrefaciunt sanguinem. febris sanguinea non putrida dicta est ab Auic. febris profundæ somni facti à multitudine vaporum ascendentium, condensatorum, & humectantium cerebrum, & à medicis dicitur synocha inflatiua: quia causat inflationem ex multitudine vaporum. dicitur etiam astmatica, quia causat difficultatem anhelitus: quia replet uenæ, quæ sunt circa cor reddunt anhelitum frequentem.

De causis febris sanguineæ ait Gal. 9. meth. opilationes factæ à multitudine sanguinis quæ maxime sunt circa ora venarum, & arteriarum, & pori cutis non sunt potentes generare synocham sine putredine, nisi quod transpiratum fuerit multum, & calidum. nam cum dixit. dicitur calor tegi interius strictis poris, non oportet existimare certissimam factam esse desitatem, vt nulli eorum qui sufficienter subtiliati sunt humorum concedat quod exterius fluere: neque enim hoc in ossibus, uerum erit nondum in carnibus, & cute augmentatus esse sanguis conculcatur, & conculcatus calefit sicut accidit fegetibus cum uirides conculcantur in horreis sic à sanguine multi summi eleuati non potentes præ gravitate nature, & opilationibus educi ex corpore, sed retenti inflammantur, & inflammant sanguinem, cuius inflammatio peruenit ad cor, & facit febrē. & Girar. augmentatus sanguis peccat quantitati & aggrauat naturam suam nimia quantitate. & non subleuat, seu depuratur. plurimi igitur vapores ab eo resoluti, & non educiti ipsum calefaciunt, & spiritus naturales & vitales in venis, & arterijs contentos. & sic fit febris synocha inflatiua sine putredine. quoniam autem coniugetur repletio, & opilatio fit febris sanguinea putrida. alia causa est primitiua, ut aer calidus, & exercitium. item aquositas in sanguine multa facta à fructibus aquosis quales

talī humiditas facit putrefactionem, item humor crudus factus ex fructibus, ut pomis, pyris, & melonibus. & hæc febris dicitur synocha.

Febris sanguinea à principio ad finem remanet semper eodem modo, & dicitur omotonus: aut augetur paulatim, & dicitur angustica: aut paulatim minuitur, & dicitur paugustica. quando augetur, est, quia id quod putrescit est plus, quam id quod resoluitur quando minuitur contra. quando remanet, tantum est quod putrescit quantum quod resoluitur: initium. verò harum specierum febris erit, cum nondum apparuerint signa digestionis, vel contrarii eius: cum inceperint apparere: erit augmentum, cum perfecte, erit status. dixit Aui. febris sanguinea sine putredine quandoque mutatur in hecticam. qđ potest accidere ob approximationem rerum frigidarum ob quas calor naturalis multum minuitur in membris. quare non possunt nutrimentum regere, sed præ penuria nutrimenti. postea inflammantur, & accenditur calor, qui est febris hectica, quod rarissime contingit. & Auicem. si aliquando in tali febre sanguinea in frigidetur multum caput, mutatur in letargum: si cerebrum, in subet: si sanguis descenderit ad pulmonem fit peripneumonia: si ad paniculos pectoris fit pleuresis: si ad ventrem hydrops timp. si in crisi per viâ derivationis, fiunt varioli, & morbilli. durat vt ait Auic. febris sanguinea vsque ad 7. dies & resoluitur per sensatam euacuationem sanguinis narium, mensium, excretionum cholericarum, & sudoris quandoque facit etiam apostemata in emunctoriis, & pustulas in cute.

Signa generalia febris sanguineæ sunt hæc ait Alm. hanc febrem præcedunt grauitas, scilicet membrorum, pigritia, extensio, plenitudo, & dispositio, quæ lassitudini. s. extensuæ, vel apostemose assimilatur. in somno. est superfluitas, & amentia, & stupor, & maxime post somnum longum, in capite grauitas, & precipue in fronte, tympanibus venarum exuberantiū in toto corpore, pruritus in oculis, naribus, & locis, vbi ventosas apponere consuevit, vel fieri phleb. Isaac addit ruborem coloris corporis, & calor in superficie. & quidam dicunt, percipitur ut sensus nerberati cum te contundente, non fatigante cutim.

Signa specialia recitat Gal. 9. meth. quæ reperit in iuueni febrienti febre sanguinea non putrida. & hæc sunt febris sufficienter calida: qui calor ait Serap. est similis calori febris ephemere, mitis, non mordax. pulsus est equalis, maximus, citus, spissus, & vehemens, & arteria nec dura, nec mollis ob humiditatem

mollicentem, est magnus ob fortitudinem virtutis, & obedientia instrumenti, est plenus ob multitudinem sanguinis, & frequens ob necessitatem. vrina in colore, & substantia est similis sanis, ac citrina Alm. est rubea spissa. color rubeus est in facie, & oculis, & Alm. in naribus. inflatio faciei, & oculorum, & temporum, & repletio maxima. incipit hæc febris ait Alm. & Auicem. sine tremore, & rigore, sed cum calore & nullam habet interpolationem. in mane tamē ob aeris temperiem sentit æger aliquam remissionem, inflammatio est fortis, ait Alm. sed talis apparēt egro: sed mitis calor uidetur medico. adest dolor capitis pulsatiuis, inquit Gal. de iuvene. ob repletionem arteriarum capitis cum inflammatione, & grauitate, ait Sera. adsunt, ait Guiliel. uigiliæ insuauēs, inquietudo, & maxime si vapores fuerint mordicatiui, aut plurimi sed si mites, pigritia, grauitas corporis, & profundus somnus, ait Gal. reliquit cōsuetæ exercitia. & Alex. copiosus vini uetusti, crassique vsus, & multæ carnis Ras. constringitur anhelitus. idem affirmat Auic. & Serap. Ras. tactus eius est sicut corporis balneati. Auic. non sudat nisi apud crīsim, prurit nasus, cadunt lachrymæ ex multa humiditate laxante contentiū oculorum. Zoar. accidit sitis in augmento, & statu cum siccitate linguæ, & ariditate. Gerar. apparēt lampades ante oculos licet tenebrositas adsit ob vapores sanguinis rubeos. Guil. uident in somnis res rubeas. Ferr. est dulcedo in ore ex fumis resolutis, & sanguine inspissatis circa linguam. Auer. 4. colli. adsunt suspiria, & inquietudo.

Signa synochæ de putredine sanguinis sunt pulsus, ait Haly, qui nimium est diuersus, & urina rubea alichina: Guil. vrina fetet, perturbata, & liuida, & pulsus inordinatus.

Signa cōia vtrique febre est pruritus in naso, & loco unctionationis, & phleb. difficultas anhelitus, profundatio somni, & caliditas per totum corpus æqualis: tamen in putrida est magis similis caufoni, & sitis est maior, & uigiliæ, & inquietudo, & tristitia, & in putrida pulsus maior est systole quam dyastole, in inflata contra. ait Gerar. synocha putrida magis consuevit euenire tempore pestis, quia sequuntur alia accideria in statu mala, ut uariolæ, nimius sanguinis fluxus est e naribus, difficultas anhelitus, & herysipela. dixit Alex. si hæmor. uel alius sanguinis fluxus clausus fuerit, maximum signum est synocham esse. Aaron ait. Febris sanguinea, quæ cōtinuo augetur est maligna adurens: quæ continue minuitur, est salutaris, quæ in una dispositione permanet medio modo se habet. secundæ

cundæ speciei non cœnit declinatio vsq; ad 3. uel 6. dies.

Signa longitudinis, & breuitatis febris sanguineæ dixit Auic. sumuntur ex festina signorum apparitione, uel tarda, & symptomatum malorum.

Inquit Alm. 17. con. si patienti hanc febrem accidit subeth, aut uigilia ob multam inquit tudinem perlectum, & uenter est inflatus, & sonat cum percuitur, ut tympanum, uel est molli inflatione non cessante, & apparent in corpore puncta minuta, sicut morsus pulicis, recede ab eo: nam ait Isaac. causa eius est fumus pestilens factus ab ebullitione humorum corruptorum cum extraneo calore, & maxime si in extremitatibus apparuerint petiæ liuidæ: significant enim uisionem humorum, & calorem naturalem ferè extinctum. Difficultas anhelitus magna signum est malum & 2. meth. ait quod nisi in aere frigido senserit refrigerium, non est bona spes, & cum hoc uirtus est debilis, & digestionis signa non apparent, necessario morietur. ait Ras. 17. con. uidi in febre sanguinea ex putredine sanguinis, & multitudine fieri sursen, & subeth, aut lethargus accidat, lethale est uentris stipricitas significat choleram moueri sursum. Passio. ait. si synochus habuerit excrementas, longiorem efficiet febrem, & non sine periculo fertur, quod si eis somnus sit laboriosus, & a somno surgunt grauiorés, & huc, & illuc inordinate se mouent, & cum magna angustia sine signis digestionis, talia mortem significant, & eo magis si apparent in corpore pustulæ nigre, liuidæ, uel igneæ.

De signis bonis ait Ras. 17. con. ex Hippo. 2. de humo. synopsis in febre multum sanguinea ex inflammato multo sanguine uirtute forti est satis inuatiua, quia in frigidat corpus, & extinguit febrem.

Si in synocha urina multum incensa albâ, & continuam habuerit hypostasim, breuem, & eucratam esse significant. si rubeam, leuem, & continuam habuerit, longam, sed eucratam. facilis respiratio, bonus anhelitus, facilis motus bonum pronunciat. urina incensa sine hypostasi, & cruda persistens significat à longe timorem: incensa cum mala hypostasi breuem, & discratam aiunt quidam quantum est ad primam apparitionem signorum digestionis: tantum ab illa apparet ad crismum: unde si apparet in prima quarta, crisis erit in prima 7. si in prima 7. crisis erit in 14.

Curatio.

SYNocha inflatiua, & putrida sunt acutæ, qua

re non dant inducias. diæta sit earum rerum, quæ sanguinem minime augent, ut caro, & uinum. & id in febre, & post eius remotione, quæ facile putrescunt, caue: ne in putridam, febrem uertant inflatiuam, uel putridam augeant caue quæ actu, uel potentia calefaciunt ut ignis, suffumigium, ira, tristitia, strepitus, uigilia, labor. caue multum cibum, & retentionem omnem superfluitatum. totum uerò regimen ad frigidum tédât cum pauco sicco, ut sanguis ingrossetur, & hum. minuat, & utere semper diætâ tenui, & magis in statu habitata ratione complexionis, compositionis, ætatis, & id generis: nam qui sunt rari, habent debile stomachum, qui in subtili diætâ nimium attenuantur, & si uirtus est fortis, ait Haly. cibâ spinac. cucur. porulaca, lactuca, cucum. aqua granatorum. & Ras. da aquam hordei, & si uirtus est debilis, adde ius pullorum. & Serap. postquam lenitur natura, da aquam hordei, & non ante. & si natura est sicca damus eam cum aqua granatorum mazorum cum secantiabin. si non est sicca, da lentes excoctas, Auic. ait, prima recentia, & medulla citrulli, & cuscute in sicca, in non sicca natura & pyra odorifera. di. cit Roger. si status est p. pinquus, uix da lac amigdarum, & nebulas. potus ait Gal. 9. meth. sit aqua frigida nisi qd prohibeat, si natura est sicca, ait Ser. a qua prunorū, cucurbi. cū zucc. aut iulep. uiolato aqua citruli. post apparitione digestionis aqua frigida, aut cocta cū pauco zuc. aqua hordei cum zucch. aqua cum aceto, uinū granatorū, uinū leue, bene lymphatum præsertim in declinatione, in qua reficies cum largiori uictu, & tunc regimen sit ueluti febris phlegmaticæ, quia phleb. & regimen præteritum reprimēbunt calorem, & hum. & frigidita. induxerunt. hora optima ait Passio. sit in prandio.

De aliis rebus non naturalibus sit camera uersa ad septentrionem in æstate, uel tērenā, sæpeirrorata aqua. & ornata floribus, & foliis uitis, salicis, & huiusmodi. odoret mala citronia, persica, & id generis, & fiat ampulla aquæ ros. ferè plena cum puluere rosarum, uio larum, sandalorum, & pauco camphoræ. Gai deat tamen si stuporem, ac somnum profundum corripere eum, cum frictionibus, & ligaturis excita. quotidie egerit. regimen in putredinali declinet ad frigidum, & acetosum sanguine inflammato cholerico ad frigidum & hum. & ingrossandum aquoso ad siccum, grosso per phlegmā, aut nelacholiam ad subtiliandum, & incidendum.

Ait Gale. 3. meth. syncharum curatio est phlebotomia, & aquæ frigida potio, sed ait Rabi. 10. particula sit potio post digestionem, si fuerit cum putredine febris: si uerò sine putredine,

eredine, datur expectata nulla digestionem nec
p̄mittas phle. quia si habebis intentionem
ad causam euacuandam augebis febrem: si ad
discrepantiam detinebis multos humores in cor
pore, & si ea quæ dicta sunt alias, memoria re
nueris, euacuatio habet plures intentiones,
& alteratio vna. unde prius est euacuandum
quam alterandum. intentiones quæ respici
debent, sunt sanguinis repletio, materiæ alte
rius malæ, vel corruptæ in corpore inuentio,
quæ est aut materiæ communis, aut materiæ
accidentalis sanguini mixta, vaporum à san
guine eleuatorum multitudo, obstructio por
orum. & hæc quatuor in vtraque synocha cō
siderantur, sed in putredinali aliz duæ, scilicet pec
catum substantiæ sanguinis in subtilitate, aut
aquisitate, & in grossicie, vel viscositate, &
sanguinis putredo. quare necessaria primo est
sanguinis euacuatio. sec. mundificatio sanguinis
& corporis ab aliis materiis. ter. resolutio va
porum. quar. apertio. quin. æquatio substantiæ
sanguinis quæ potest dici digestio. sex diges
tio, quæ est putrefactionis correctio, & pro
hibitio.

Primum igitur phle. est eger nulla expecta
ta digestionem, & nulla hora electa, si febris ait
Gal. 9. meth. adfuerit à sola obstructione, ut
sunt, qui synocha laborant inflatiua, & in sy
nocha facta ex multitudine humorum sine opi
latione & putredine, sed in synocha ex putre
dine, quia impossibile opilationem, & putre
dinem sanari ex phleb. aliis etiam indiget au
xiliis. & ibidem ait. nisi phlebotomati fuerint
in summam venerint discrepantiam, nisi fluxus
sanguinis copiosus, vel sudor apprehenderit,
& suffocabuntur, vel in synchyma deciderint
vel debilitatur vasorum natura ob calorem,
& 2. meth. non solum in inflatiua, sed in pu
tredinali statu à principio vena est secanda:
nam ait Isaac. non totus ebullit sanguis, & pu
trefit, licet sit totus aptus putrefieri ob conti
nuitatem, & transitum eius per vniuersas cor
poris venas, actu tamen aliquando putrefit in
vna, vel pluribus partibus, & aliquando pu
trefit in toto, sed non totus. Haly. inquit in
primo. 2. vel 3. die quo mouetur sanguis, inci
datur vena nigra, vel basilica. & Rabi. vena ni
gra, quæ est vena cordis & Viar. considera vir
tutem, ætatem, complexionem, tempus, aerem,
& consuetudinem, quæ si omnes conveniāt,
& maxime virtus incide venam, sed ante sta
tum, in statu, & augmento eæue, & præfer
rim phlebotom. copiosam: nam in his duobus
temporibus non virtuti confidemus egri.
quare tunc regimine extinctio vtemur, in phle
botomia respice stomachi dispositionem, &
cibum digestum, aut non. si non est digestum
pomatur, si necessaria sit phlebotomia subi

to. sanguinis quantitas sit ad synchyma, vir
tute forti, & ætate uigente, tam in putrida,
quam in non putrida sanguinea. hoc docet
Galen. Serapio. & Ras. qui ait si est debilis vir
tus non una vice, sed bis incide venam: & ad
dit. & ciba illum cum medulla panis, & aqua
granati muzzi, vel agreste: deinde minue A
uer. autem ait ducere ad synchyma non est na
turale, immo erroneum. quia natura id non
facit nisi in casibus malis. & intentio debet ef
se ad extractionem sanguinis secundum quan
titatem, unde remaneat debitus. & Gal. intel
lexit usque ad infrigidationem. & idem Gal.
9. meth. ait. quod necesse est. tantum auferre
sanguinis, quantum uirtus tolerat. & 2. meth.
si multum sanguinis euacuatum fuerit, aut nu
triendo febrem augebis, uel non nutriendo
virtutem dissolues. dixit Isaac, si pectus do
let, phleb. hepaticam: si non mediariam. & di
cunt quidam, quod peccante sanguine solo
in quantitate fiat è vena brachii dextri: si acu
tus, & multus è vena sinistri propter feruorem
cordis. & Auic. ait. si synchyma superueniat p
viam resolutionis, & cibo subtili, & quiete re
fice: si propter morsum stomachi à cholera post
phlebotomiam per plures horas ait Gal. exhi
be cibum. & 9. meth. præcepit ut dormiat ad
corroborationem virtutis defectæ ob sangui
nis emissionem, & dormiat usque ad primam
horam noctis. ciba etiam cum pane & agreste
succo. & 2. meth. patientes synocham phlebo
tomati plurimi in 5. die crism habuerunt: qui
dam ad 7. longius autem nullus. & Haly. un
de autem febrem extirpabis, aut breuem fa
cies, nec timebis mortem. Dixit Auic. si vena
non permittatur incidi, incide venam frontis,
aut appone ventosas in loco convenienti. idē
Viar. ait. scarificatio cōpetit, si uirtus est for
tis: quia sola uirtus morbo repugnat: & aliæ
circumstantiæ non adiuuant. si aliæ uigent, & vir
tus non; nihil facies. & si natura aperiet hæ
morrhoides, uel sang. narium, non impedias
nisi synchyma superueniat.

Materiæ communes ante phlebotomiam
euacuande sunt, quando in stomacho, in inte
stinis, & uenis mesaraicis essent materiæ ma
læ corruptæ, quæ possibile esset, ut ad uenas
per phlebotomiam attraherentur, & præfer
tim si satietas nauseatiua, & regimen in
ordinatum in potu, & cibo præcesserit.
cum uerò repletio suffocatiua cogeret, sta
tim phlebotom. est, & postea uenter le
niatur, & quando materiæ essent ualde
paucæ, aut materiæ contingenter contine
rentur in uenis: has materias communes
euacuat decoctio prunorum, thamarin
dorum, passularum, terreniarum & cassia, ait
Serapio. & Alman. cum succo granatorum
acer

acerborum. & Viar. cum mada, & violis. & nisi lenitum tale possit exhiberi; ait Ser. fiat chylerele. idem affirmat Auicenna & quoniam materiz contingenter reperiuntur plures, quam possint; predicta lenientia educere, vel sunt in venis remotis, ad quas non perueniunt educum medicina illis apta prædigestis; ut ait Auicenna cum mirab. citrinis, & indis, & fumoterræ, cassia, & id generis. & hæc euacuatio fit, ut mundificet sanguine a materiis corruptis cholericis, & adultis cibi mixtis; vel cum aliis appropriatis; aut cum reubarbaro si cholera mixta esset cum sanguine non adultis; & cum educantibus phlegma, & melancholiam. Tertia intentio est pororum apertio; & quarta est vaporum resolutio, quæ duæ complentur per frictionem; & inunctionem aperitiuam. ante phlebotomiam fiat frictio leuis & inunctio post. & si phlebotomia sufficeret ad febrem sedandam, ad resolutionem reliquorum vaporum, sufficeret lenis illa frictio, nisi multitudo vaporum remanserit; tunc frictio facienda est cum mandili mediocriter aspero; & postea ungendum est corpus cum pauco oleo chamæmelino, & vino albo subtili paruo, & aqua decocta ampliori simul mixtis, & calefactis; & sedata inflammatione; ingrediatur balneum temperatum, & cum fursure; ait Rasi in diuisione. frica multum; & iterum; deinde dormiat, ut sudet.

Quinta rectificat sanguinem; unde ut vult Galenus attenuantibus; & aperientibus; & mundificantibus sine caliditate, ut febrem non augeas. & id fiat inquit Auicenna post phlebotomiam uel aliam euacuationem; si ph. fieri non possit. unde potest exhiberi syrupus acetosus; acetosus, aqua seminum communium, vel capiluenensis, endiuiz; & id generis; & hoc in sanguine viscoso, & grosso, qui si multum sit grossus; & viscosus; digeratur cum calidis, qui non obstant febrī, quæ non sint eleuata in gradum. Si sanguis sit subtilis ait Auicenna ingrossa cum robur, syrup. iniubarum, qui fiat ex decoctione iubarum, & cum zucchero fiat syrupus. sed parua sit zucchari quantitas. lentres in aceto acetoso forti decoctæ sanguinem ingrossant.

Sexta quæ est in synocha putrida; est cum eis quæ prohibent putrefactionem, & remittunt eam, ut cum succo granatorum mazorum, & cum granatis muis.

Intentio ad infrigidationem est, ut de-

tur aqua cocta, & infrigidata si non est, ait Auicenna quod prohibeat. & addit; scias; quod esse contentum infrigidatione; & dimittere phlebotomiam & solutionem ventris, est addere in oppilationem; aut eam facere, quare additur putredo; & caliditas in reliqua dispositione sua; & quoniam inquit Auicenna septimo colligit hæc febris habet latitudinem in colore secundum magis; & minus; & quæ est fortioris caloris, dicitur ardua, unde secundum hanc sunt digerenda frigida magis; & minus. & ait Rasi in diuisione. si tardatur phlebotomia in sua dispositione; aut omittatur, stude in dando aquam frigidam plurimam, tantum quod sarietur, aut infrigidetur; & tremat si febris deserit eum; sufficit tertia si reddit; iterum usque quo declinet, & fiat lenis; & tunc rege regiminis febris phlegmaticæ tribue igitur, cum ingens est necessitas; nisi quando febris synocha erit ex apostemate in stomacho; hepate, matrice, vesica, diaphragmate, pulmone; aut pectore. signa necessitatis est quando est vehemens febris inflammata, & cor pulsat; & tremat post assiduationem febris secundum illam dispositionem difficilem duobus diebus; aut tribus; & non exstinguunt eam. extinguentia alia datur ergo subito in potum tantum quod sarietur; res enim valde frigida verè perueniunt ad illud, quod est necessarium; & si hi non bibunt aquam frigidam superuenit eis synopsis paululum; & venæ sciuntur in ventribus eorum; & in panniculis cerebri, quia largus sanguis fluit e naribus & moriuntur; quoniam arteriæ propriæ sciuntur; & si arteriæ non sciuntur; contrahitur anhelitus; & præfocantur subito; quare potui aquam frigidam præbere; ex hoc enim non sequetur nisi debilitas febris; & eius spatii prolongatio; & aduentus apostematis duris in visceribus; & Auicenna septimo colligit. quando omnia particularia; & vitæ concordant in febre ardua, & æger multum desiderat aquam frigidam, non est digestio expectanda; quia æger ante digestionem consumeretur; nam si expectares; digestio esset mala; sicut nebula nigra. & tunc aqua frigida exhibitio non proderet; materia enim quæ calefacit febrem; qualis est hæc, cum sit multitudo caliditatis; non est priuata digestionem nisi ob malam qualitatem acutam; tum propter grossitatem; aut viscositatem. & quando hanc infrigidabis materia erit digesta statim, danda igitur est aqua tanta, ut æger fiat pallidus, & tremens, & ad pondus lib. 4. hæc

languinem inflammatum, & subtiliatum à febre in frigidando ingrossat, ne ad principalia descendat, & febrem extinguat. Natura enim confortata benignos humores trahit ad se: subtiliores per sudorem, vel ventrem excernit, & fluxum sanguinem narium pronocat. & hæc aqua, ait Passio, si possibile est, detur in die critico. Auicenna, melior hora est vehementissimæ ebullitionis, & est status quo ad accidentia, siue euacuatio facta fuerit, siue non. Alman. si non prius succurratur phlebotomia, quam lingua nigra fiat, & accidentia causonis superueniant, cura fiat cum infrigidantibus: nam tunc conuenit humectare, & infrigidare magis, quam sanguinem humidum extrahere: quia tunc phlebotomia cholera rubeam bullire facit, & ualde corpus inflamat. infrigidantia ait Haly. sunt aqua granatorum dulcium acerbiorum cum squingibin, aqua thamarind. Viat. addit psyllium, syrupum uiolatum, & prunorum aquam. Auicenna aquam lentium, & lactucæ, & aquam hordei. sed vna nocte infundatur semen psylli integrum in aqua cocta, mane coletur, & colaturæ addantur zuccharum & tribuatur: nam sitim summè extinguit, & ventrem lenit. Serap. clystere factum ex aqua lactucæ cum mucillagine psylli, & oleo rosato tollit inflammationem, & tremorem cordis: item aqua uirgæ pastoris salicis, psyllium cum oleo uiolato. Ab extra ait Serapio. est cerotum ex oleo rosato, aqua citrulli, cucurbitæ, & insquiami posurum super stomacho, & hepate, & portulaca trita, in declinatione. da trochiscos de camphora ait Auicenna. ad consumandum residuum caloris febrilis, & ad confortanda membra resoluta, eorum substantiam minuendo. ex dictis agitur palam est, quod in augmastico fiat phlebotomia maior, magis subito, infrigidatio maior, & citius aquæ frigidæ exhibitio: in peragmastico contra scilicet maior phleb. & minor infrigidatio. & homotonus potius tēdat ad augmentum.

De cholerica febre.

Febbris cholerica alia fit sine putredine, quam quidam uocant cholericam inflatiam, siue causon inflatum, alia cum putredine, quæ aut est continua, aut est interpollata. & Auicenna, ait, febres cholericæ sunt tres, tertiana continua, tertiana periodica, & causon, & tertiana tam continua quam interpollata alia est pura, alia non pura, quæ notha dicitur.

Febres cholericas interpollatas, siue continuas ait Galenus secundo de Crisi, facit cholera, quæ est pura, aut mixta. pura fit ex chymo in hepate generato simul cum aliis humoribus, qui dicitur generatus generatione prima, & est cholera naturalis dicta cholera rubea: aut generatione secunda quæ cholera fit ex putrefactione sanguinis cuius subtilis transit in cholera puram. hæc est multum subtilior prima, sed differt, quod est causa, & materia febris cholericæ continuæ. alia, ait Auicenna potest esse causa, & materia continuæ periodicæ, & causonis, mixta, siue innaturalis est cum per aduersionem ingrossatur aut ingrossatur per admixtionem phlegmatis, uel melancholicæ cholera naturalis mixtione unita: quia fieret, si non esset unita, non una febris, sed composita, quæ haberet duos paroxysmos, dixit, cholera innaturalis potest esse causa febris cholericæ, nothæ, interpollatæ, & continuæ, sed ait Auicenna, causa non puræ tertianæ est cholera grosse substantiæ per mixtionem phlegmatis cum ea, uel melancholicæ cum ea, licet rarius: quia obsecitatem difficile coniungitur, si phlegma, quod ei admisceatur fuerit grossum, fiet cholera uicellina: si subtile aquosum, citrina, quidam dixerunt à cholera pura non generari febrem putridam, quia eius multa siccitas resistit putrefactioni. quare ait Auerr. quod causa febris est sanguis aut alia humiditas, in qua dominatur cholera, unde potest recipere digestionem, & reuerti ad suam naturam. cholera prassina, & eragiposa non faciunt febrem, quia cum sint ueluti uenum, natura expellit ad uentriculum: & si facit febrem, non uacat periculo magno.

Causæ primitiue mouentes antecedentes febrium cholericarum sunt labor, solitudo, ira, furor, siuis, estus, uigilie, cibi, & potus calidi, & sicci, & pharmaca similia.

Febres cholericæ sunt de genere acutorum & præsertim causon, & post eum tertiana continua, & post eum tertiana pura, & tertiana periodica non pura secundum quendam modum acuitatis, tertiana autem notha maxime periodica aliquando non seruat morem acuitatis febrium.

Febres cholericas quandoque antecedunt hæc signa, scilicet sensatio puncturarum in corpore & maxime in dorso, somni diminutio, uigilie, deiectio appetitus, morsus aliquando, & ardor in ore stomachi, acuitas in egestionem, & citrina, & dextri temporis dolor.

Signa generalia harum februm alia sunt communia, alia particularia communia sunt: nunc decim, sitis, angustia, inquietudo, impatentia, alienatio, nausea, amaritudo oris siccitas labiorum, scissio eorum, dolor capitis siccitas ventris, ut plurimum. Sitis est ait Auicenna ob exsiccationem oris stomachi, angustia, inquietudo, & impatentia ob acuitatem, & inflammationem cholerae stimulantem vehementer naturam. alienatio ob ascensum cholerae ad cerebrum. nausea, & amaritudo oris ob motum cholerae ad os stomachi, siccitas labiorum, lingue, & totius corporis, ac scissio, quia facile cholera recipitur in labijs, cum sint partes oris magis extremæ & carnosæ & tenues stipticus, quia motus cholerae non est ad intestina, sed aut ad exteriora, aut ad extrema, aut ad cutem.

Tertianæ periodicæ primum signum est rigor, quasi acuum punctura, vel punctio aquæ bullientis. causa ait Serap. est cholera citrina partium ignearum, quæ cum cadit super membra sensibilia mordet. quare submergitur calor naturalis versus profundum. unde sequitur tremor in extremis, morditatio in partibus sensitiuis. non prolongatur autem frigus, imo tendit ad calefactionem, & dentes non concutuntur, & in primis diebus rigor, ait Auicenna est fortior. & Zoar. quæ cum aqua calida effusa fuerit super aliquem repente.

Secundum signum est caliditas inflammantis corpus ex acuitate cholerae, unde fit sitis, sed non moratur nisi parum donec veniat status. Sed caliditas est acuta valde ad manum, quia eleuatur cum uapore, sed postea manus uincit eam: febris autem maligna est acutior, & magis lædens manum, & in causone manus semper plus inflammatur à carne egri, quia caliditas causonis est magis in interioribus, & est acutorum vaporum, quod manus reprimere non potest.

Tertium signum ait Serapio. est diuersitas pulsus, quoniam in principio pulsus est parvus, quia calor nondum est expansus, in augmento maior, & in statu minor, quam in augmento, & maior quam in declinatione. magnus est ait Haly. quia uirtus est fortis, quia cholera leuis non grauat eum. est velox, sed equalis, & anhelitus est diuersus in principio ab augmento, & statu: quia in principio materia grauat magis uirtutem, & calor naturalis suffocatur plus sub humore. Auicenna ait, pulsus in tertiana est fortior, quam in alijs putridis, & Auer. quando calor extraneus generatur in humore putrido admiscetur calori naturali, & tunc crescit, & iudex pulsus:

hic pulsus est inordinatus, & æqualis: phlegmaticæ uero non.

Quartum signum sunt accidentia; nam ait Auicenna in tertiana sunt nigilix sine gravitate capitis, nisi in quibusdam non puris, sitis, furor, odium loquendi, & audiendi, & amor solitudinis: quia auditus organum cum sit siccum, læditur a uerbis percutientibus. & sentit ebullitionem in hepate. & sentit in eo puncturam propter acuitatem, & ebullitionem cholerae in felle.

Quintum ait Galenus ad Glaucon. urinae sunt rubrae, clares, aut subignæ, id est citrinæ, uel sub citrinæ ob calorem, est subtilis ob siccitatem.

Sextum ait Galenus. 2. de differentiis feb. sedatur hæc febris, aut uomitibus cholericis, & id est proprium eius signum, aut egestionibus cholericis, aut sudoribus. & hoc fit ait Val. in tertio, aut quarto periodo, quia tunc materia est magis digesta, & apta expulsionem, & finitur secundum omnes cum sudore, qui est uera tertianæ solutio. in prima accessione ait Isaac sudor est paucus: quia materia eius non est bene digesta, & calor febrilis deficiat eum. conuertitur autem uapor cholerae in sudorem ueniens ad cutem ibi à frigiditate cutis, & aeris, & aliquantulum condensatur, & fit sudor.

Septimum est ætas iuuenilis, & ætas calida.

Octauum si in illo tempore sint multæ tertianæ, si urina fuerit ualde citrina, & in primo periodo non aderit nubes, prorogatur ad 7. periodos. est subtilis substantia, sed subtilior quæ fit in causone.

Propria autem signa febris tertianæ puræ ait Galenus secundo de differentiis febrium sunt. quod longitudo unius paroxysmi per maxima est duodecim horarum, secundum signum est, quod status fit cito, quia cito corpus calefit, tertium si eger bibit aquam uel uidetur corpus humectari præsertim in statu. quartum signum est, quod in septem periodis est longissima prima accessio, ait Isaac, permanet quatuor horas, aut sex, aut octo, & accidentia sunt parua: secunda, accidentia longiora, & similis primæ, & permanet decem horas. in tertia incipiunt superfluitates terminari, & ebullire, & accidentia sunt molesta: in quarta augentur accidentia, & prorogatur paroxysmus aliquando usque ad quindecim horas, uel sexdecim: in quinta sunt minora, & in sexta tenuior, & in septima terminatur. Rabi Moysi in decima part. ex mente Galeni recitat undecim signa puræ tertianæ. ob quæ

medicus statim in principio eam cognoscit, primum est rigor fortis, & cutis pungitur. secundum est sitis, & inflammatio, quæ non prolongatur. tertium est fortitudo pulsus toto tempore. quartum est status accessionis principio proximus: quia diffusio caloris per totum corpus est æqualiter. sextum est calor acutus ad manum, sed debilitatur, & vincitur à manu. septimum est exitus vaporis calidi cum bibitur aqua cocta: est vomitus cholerae citrinæ, vel ventris fluxus, vel urina copiosa cholerica. nonum est sudor vaporosus, calidus, & æqualis in toto corpore. decimum est post hæc omnis eradicatio, & cessatio completa febris. undecimum est paroxysmus non transiens duodecim horas, verum ex dictis signis duo sunt potissima. scilicet rigor in principio & sudor in fine: nam ait Auicenna. cum vides principium cum rigore, & statim cum sudore exuberante, verè est febris tertiana pura. dixit Gilib. in tertiana pura, vel non pura si post apparitionem signorum digestionis interdum duplicetur accessio, non est timendum: quia interdum cum morbus fit acutior, salus est propinquior. & id est in quartanariis.

Dixit Galenus primo ad Glaucon. vinum prohibeatur antequam ægritudo digeratur: quia est prouocatiuum, & commotiuum humoris & putrescendo eos auget. putrefactionem. quare incipiente digestionem detur vinum aquosum. hæc confirmat Auicenna.

Curatio simplicis tertianæ ait Serapion. completur per curationem malæ complexionis, & multitudinis materię eius: quare opus est alterare, & euacuare. sed prius digerere, ut vult Haly. quare quinque competunt huic curationi. scilicet lenire, & educere materias communes, euacuare materiam propriam, digerere, & prohibere putredinem, alterare, siue extinguere calorem febrilem, demum corrigere accidens.

Præter lenientiam si necesse fuerit usus vomitus in principio competit in tertiana, & omni febre interpollata spontaneus, vel leuiter prouocatus, quia alleviatur totus paroxysmus: nam qui patitur interpollatam, & in paroxysmo nulla fit euacuatio, in tempore interpollationis totus est ponderosus, & grauis & cum pauca alleviatione. deinde ait Auicenna. non des pharmacum, sed prius digeras. & Auicenna. non prouoces urinam in principio cum emulsione seminum. & alii addunt nec sudor prouocandus est. & ait Auicenna. cum apparent signa digestionis, & crisis, & natura euacuat totam materiam: bene est, si non totam, adiuua in illa parte, in qua agit, ut si per vomitum, tunc adiuua vomitum, si vero ipsa non mo-

nerit quicquam, tunc mone per fluxum ventris, & euacua ventris cum medicina benedicta: quia nihil est magis congruum huic euacuationi quam fluxus. Dixit Auicenna. post euacuationem criticam, aut factam tempore debito, sed natura nisi adiunta, non potuit, prouoca urinam, & sudorem: quia sunt aptæ ad consumendas, & finiendas reliquias materierum.

Tertia intentio completur cum frigidis, & acetosis. dixit Gilib. cura tertianæ sumatur à causa antecedente, quæ est cholera rubra naturalis, subtilis, liquida, imbibita in membris. hanc oportet inspissare cum frigidis, & sunt semina communia, herba frigida, ad ditis sandalis, & spodio. syrup. acetos. quia acetum penetrat in uenas, alterat, & resistit febrili discrasia. & ait Auicenna. sumat omni mane syrupum acetosum, & post duas horas aquam hordei. scilicet die interpollationis. nam in die paroxysmi aqua hordei non est danda, quia nutrit.

Quarta intentio fit cum extinguentibus calorem febrilem. unde infrigidandum, & humectandum est & ait Auicenna. cum aqua hordei & iulep. quidam dant trochiscos de camphora cum aceto, semine portulacæ, sed fiat post digestionem, ventriculo forti, & hepate, & iulep factum ex aqua portulacæ, florum nupharis. in quibus infusum fuerit psillum per noctem, aromatizatum cum duobus granis camphoræ est vltimum. De approximandis extra. prius bene minorata materia, dixit Alman. hepate in nocte vacato ventre pannus in sandalis, aqua rosata infusus apponatur. & Auicenna. ponat pedes in aqua frigida ad attrahendum residuum caloris. sed caue in die paroxysmi, & crisis. & ait si post crism remanet calor inseparabilis, da syrupum acetosum cum facis diureticis, vel de duabus, vel quinque radicibus, ut residuum materię prouocetur per urinam.

In tertiana pura facta ex cholera generata per aduersionem ex sanguine regimen sit frigidius, & humidius, & diara parumper crassior: quia diuturnior est. dixit Fidelis succus corrigiolæ bibitus ante accessionem per unam horam prohibet paroxysmum, & succus pimpinellæ bibitus in ipsa accessione tollit aut minuit ipsam.

Curatio tertianæ non puræ.

Dixit Galenus ad Glaucon. non quolibet die cibandus est in tertiana non pura, ut in die paroxysmi, nisi uirtus sit debilis, sed dixit Haly. in die accessionis refice cum

medulla citrulli, aut cucur. refrigerant enim & humectant, & vrinam prouocant. si absq; cibo durare non posset, da decoctum cum fure, zuccharo, & oleo amygdalarum dulcium, aut prifana cum zuccharo. & si morbus prorogeretur, & euacuatio facta sit, da anes pullos, & huiusmodi. sed caue, quæ sunt tardæ digestionis, fatigant enim & debilitant uirtutem. unde phlegma augetur. declinet cibus ait Auicē. ad paruam caliditatem, & absterfionem: sed si materia est frigida, ciba cum aqua ciceris, uel ut ait Galen. cum prifana condita cum pipere, origano, hyssopo, & melicratum bibat. si materia calida, cum sicla, & asparagis, aut cum aqua hordei, & ciceris. Detur uinum ait Haly. cum manifesta fuerint signa digestionis, album, subtile, non ad modum vites, & aquosum, quoniam ante digestionem calor febrilis augetur, & cholera, & liquefcit humor, & in totum corpus diffunditur opilationem facies, & miscetur cū bonis, & eos corrumpit.

Antequam ait Auicē. euacuationem facias. eradicationem, si digestio amplior quam in pura, quia materia est minus obediens, & quando materiae communes expellende sunt lenientia clystera, quam potabilia sunt magis absterfina, & acuta, quia humor est viscosus, & hic magis in principio quam in processu. Syrupus ait Auicē. sit syrupus acetosus cum geleniabin, aut acetosus de radicibus simplex per quatuor dies, compositas per alios: in primis enim diebus sit simplex ne deferat materias in primis venis contentas ad venas longinquiores, unde fiat opilatio. post septimum datur, ait Serap. decoctio absynthii, & Galen. ad Glauc. quia subtiliat materiam, & stomachum confortat. sic ait Auicē. aqua apii cum geleniabin, & trochisci de rosis, & Haly. trochisci de rosis. cū spodio, & hoc post quartum decimum diem, & præterea prorogeretur, detur ait Serap. & Auicē. decoctio eupatorii, & trochisci de eupat. quæ confortant hepar, & conferunt febri chronice. Auer. 7. collig. aperit opilationes, nisi ad sit vehemens calor: tunc enim humectandum est, & refrigerandum. deinde redi ad aperiendum his factis si humor tumultuauerit, & appareant signa digestionis, euacua. eradicatione quia subtile euacuaretur, & remanet grossum sed melius est ut subtile remaneat cum grosso: quia ipsum subtiliat, & dixit Haly. inter euacuationem, & euacuationem interfit tantum temporis, quantum possis confortare corpus & maturare humorem, & non contrahatur euacuatio: quia debilitat uirtutem, & in hac febre semper misceas euacuantiā cholera cum aliis, ueluti si bilis est: cum puriora

misceas cholagoga, & phlegmagoga. sed prius inquit Auer. remoue caliditatem, & siccitatem à medicina. & Haly. ait finita accessione in princip. uniuersali, si natura est dura, & sicca, molli cum cassia, thamar. & id in materia communi, & in propria febris, si ex profundo hepatis uadat materia ad intestina, laua intestina cum clystere conuenienti phlegmati, uel cholera. sed in principio ait Auicē. sint lenitua, postea solutua. & ait Gal. ad Glauc. multi sanantur, si post cibum uomant, & Haly. si humor declinat ad superiora, & subdit Haly. si ad gibbum hepatis declinauerit humor prouoca vrinam cum rebus mediocribus, si ad superficiem sudorem, & idem si febris prorogabitur, & uideris signa sanguinis, incide uenam: & Auicē. si uenæ fuerint grossæ cum rubedine sed præcedat clystere lenituum, non acre. quando autem materia fuerit concocta da medicinam eradicationem, quæ repetenda, si in pauca quantitate detur.

Tertianæ factæ à cholera uitellina diata sit crassior, quam in facta à citrina. dixit Auer. 7. collig. quando febris erit lenta, & multi, & longi paroxysmi, qui non sunt ex cholera pura, sed ex uitellina, quæ frigidior existit: tunc stude rer debes plus in aperiendo opilationes, quæ in frigefaciendo complexionem. debiles medicæ sunt quæ uirtutem habent aperitiuam, absq; forti caliditate, ut capiluen. rad. apii, fœniculi frangendo. siccitatem eorum cum liquiritia, & caliditate cum niolis floribus nenup. & seminibus communibus. & stude ponere in medicinis quæ confortant membra principalia, ut masticem, spicam, & syrupum squingibini, & ponas in medicinis. laxa. quæ euacuant cholera cum quantitate phlegmatis, frangendo tamen caliditatem, & siccitatem eorum.

Ad tertianam puram à proprietate. ualeat succus acetosus ante accessionem sumptus. ite succus uuæ acerbæ mane datus. ualeat panis prius in aqua calidus locus. deinde in frigida, & in illa expressa adde agrestā, & in tertiana pura, item succus cicoreæ, & plantaginis ante accessionem sumptus. ite ad tertianam puram R. succi endiuie scariolæ, rostri porciniani unci. s. succi granat. muz. vn. iiii. zuc. albi vn. iiii. fiat syrup. & da in die accessionis. Mundi. R. succi fœn. plantag. aquæ rosana vn. ii. adde parū nini, & acet. ti, & bibe ante accessionem. p. duas horas. tertiana non habet curat ligare apium sup pulsus brachiorum per duas horas ante accessionem. alii dicunt apium aquaticū cū sale & filigine vsum. urtica maior cū multo sale rufa digesta materia si post quinque accessiones emplasteretur sup pulsus brachiorum statim curat tertianam. tria grana coriandri cum uno sorbili. post tertiam, uel quartam accessionem ante. solis ortum. tribue

agro id ignorant. idem facit herba coriandri ante ortum solis supposita capiti, ignorant agro: unge ante paroxysmum egrum cum succo ocimi mixto cum stercore hyrundinis, multas ataneas coque in lucerna, & tritas appone temporibus ante paroxysmum & pulsibus brachiorum. oculi cornicis, uel piscis aurati ad collum appensi tollunt tertianam. item R. summitates foliorum uitis teneras, & summitates urticæ tenere, pista, & adde parum aceti accetrimi, & in mortario distempera, unge pulsus brachiorum, & tempus ante accessionem. succus hiperici bitus cum aqua calida ante paroxysmum tollit eum. pimpinella, uel eius succus curat tertianam, sua folia missa in aqua benedicta in nomine sanctissimæ trinitatis bibat ante accessionem uel post, certum est remedium. tria folia uerbene, & tres radices sumptæ ante accessionem tertianam curant, debent tamen prius resolui in aquam. de radicibus plâraginis idem cum vnc. iiii. vini mixti cum tantundem aque. radices gentiane vna bibita ante accessionem curat tertianam notham chronicam. folia iusquiami trita, & sumpta cum vino ante accessionem. per duas horas immobilizando materiam prohibet paroxysmum, datur igitur minorata materia. Curatio tertianæ cōtinuæ tam ueræ, quam non ueræ est eadem quæ interpolata, tamen differt in hoc, quod materia est copiosior in cōtinua, deterior, & magis timenda. Cibi ait Auic. sint tennes, frigidioris, & humid. qualitatibus. unde caue uinum, & expelle omnes superfluitates. Digestio fiat cum fortiori digestiuo, quia materia est magis resistens, & forte magis mixta sanguini, & aliis humoribus non putrefactis, qui non sunt materia febris quando eger æquatione, & sequestratione ab illis. adde, quod materia continuaturum est magis sparsa per totum corpus, & in uenis remotis. unde Ras. in diuis. dat syrup. de prunis in auro, & aquam hordei post duas horas, si natura fuerit sicca, si uero fluuida per duas uices in die non dat, sed succum granatorum mizorum tritorum cum suis interioribus. Auic. da syrupum acetosum factum cum seminibus frigidis. Mes. in Antido. syrup. de prunis & syrup. nenuphar. In euacuatione si phlebotomia est necessaria fiat statim copiosa, & hora quietiori, clysteria sint leniora, quam in interpolatis. & Auic. in principio ne desolutum nisi materia fuerit furiosa, sed da quæ leniunt, & educunt feces communes, ut syrup. viola. & aqua fructuum apparentibus signis digestionis, nisi signa alia appareant, euacua cū diamanna,

syropo niol. elect. de succo ros. syrupo prunorum Mes. cum reub. De uirna ait Auic. quæ continua est declinatio ad prouocationem uirna, sed loco, & tempore. de uomitu, hic est conueniens in interpolatis, & magis utilis. De alteratione ait Ras. in diuis. extingue quantum potes calorem præsertim in meridie cū aqua cucurbitæ, melonis indi, citrulli, & muscillagine. psilii in sero, & da aquam frigidam, quando æger uult, & comedat fructus frigidos & hum. nam hæc via est securior: propter ea quod plurimum eorum cerebrum affertur, & stomachus ita, ut spasmetur, sit tortura. syrup. utilis R. quinque radicum vnc. ii. capiluea. politr. ros. scolopē. hepaticæ, endiu. scariolæ ana m. s. fem. papau. albi, portulacæ, lactucæ, endiu. sandal. ana vnc. i. lupu. fumir. borag. ana m. s. hordei mundi, feminum corrian. frig. ana vnc. ii. ros. rubea. uolarum, nenuph. ana vnc. iiii. fiat decoctio. & cum zuch. & aceto forti fiat syrupus. In omnibus febribus nothis in senibus, melancolicis, phleg. hyeme, & regione frigida datur succus chamæ. mane per tres dies colatus, & mixtus cū zucharo, & pulnere liquiritiæ. adosus est ab vñ. i. vsq; ad 2. & quia parum succihæ, infunde in lacte amigdalaru dulciu, uel in aqua hordei. pot. et fieri infusio ex florib. camæ, siccis in aqua hordei, uel endiuæ, & hmōi. scolop. & rassis barbas. uel camedreos daturim hac febre prosperè.

De Causone.

Causon ait Auic. est duplex. scholericus, cuius causa est cholera multa putrefacta, aut in uenas totius corporis, aut in uenis, quæ sequuntur partes cordis propriæ, aut in uenis partium oris stomachi, aut hepatis, & Ras. addit pulmonis: qui humores cholericus putrescunt, & sparguntur per totum corpus, & perueniunt ob suam putredinem ad nimum calorem similem ebullitioni. Ex toto corpore raro accidit, sed plurimum ex partibus, quæ sequuntur cor, & aliquando ex partibus stomachi, aut hepatis. tertiana continua ait Serap. ex materia sparsa in uenis totius, quæ ebullit, & inflamat. causon ex materia, quæ ebullit apud cor, stomachum, hepar, & pulmonem, materia uero causonis est cholera naturalis, quæ ut uult Isaac. putrefacta est aut non putre, dum multiplicata sit in partibus cordi uicinis possit facere causonem. Girard. idem affirmat, quod conuenit cum ephemera causon: cui magis nocet uolubilitas caloris quam horribilitas putredinis: tamen & fit à putredine. causon nothus fit à phlegmate falso iam putrefacto in uenis, quæ sequuntur partes cordis, & tale phlegma falsum, ait Auic.

est cholera aquosa & fluxibilis per phlegmatis aquositatem: hæc febris est phlegmatica, quo ad accidentia cholerica, quæ cholera quo ad virtutem vincit phlegma: non fit à vitellina, quæ est complexionis falsæ, quia est crassior, vnde vapores grasti, non pungentes: non è sanguinea quia eius vapores sunt mulcres: nam si melancolia, quia grossi & eius grossities repugnat inflammationi: causeris, quando cholera, quæ mixta cum phlegmate quo ad virtutem dicitur causeris nothus, fumosus: quando equè cum sang. sed maior quo ad virtutem dicitur tum fumosus, inter tertianam continuam, & causeris. ait Galen. 4. apho. nil differt in materia, nisi quod illa est in tertiana in vno loco, in causeris in alio. causeris his plurimum accidit, ait Haly. in quorū venis plurimum cholera adunatur, fit in diebus calidis, & siccis à qualibet causa procatartica. causeris ait Alm. à phlegmate falso est deterior facto à cholera non ratione accidentium, quia tunc grauior in cholerica, sed longitudinis eius, & difficilis cura, & sic ait Auic. breuior tertia continua: quia habet grauiora accidentia. causeris acutissimus est ait Gilib. propter incensionem cholera, quia vicinatur cordi, & quia coarctata est eius putredo in strictissimis venis: vnde si à principio apparent omnia signa bona, vel mala, terminabitur in prima quarta, vel infra, & aliquando extenditur, ad 7. & si transgreditur, fit alia febris. Crisis causeris ait Auic. est, quia ut plurimum consumitur vomitu, aut fluxu venteris cholerico, aut sudore, aut sanguine narium: quia ebullit & ascendit, & rumpit venas cum vrinis albis, & in colore remissis, & crassis, & leuibus subsistentibus. apostema quorum aliquo emulcoriorū soluit causeris: si sine his redibit, vel dolor crurium & expuat grossa nisi materia fuerit euacuata: si materia est supra diaphragma, soluitur causeris per apostemata in emulcorijs cerebri: si infra, per apostemata interiorum. Causi primum signum ait Hip. 4. reg. acut. est lingua aspera, sicca, & nigra valde, & ait Alm. labia citrina & lingua vel nigra secundū ait Hip. est secundum ventrem, morbus, & dolor. & Gilib. punctio stomachi ob acredinem exponit Gal. humorum. tertium ait Hip. po. egestionem siccam ob calorem citrinum. Gord. ait quandoque est fluxus ventris, quandoque non. per Gilib. si fluxus est cholera abundantia, quantitatiua: si constipatio, est qualitatiua. vnde si quantitatiua, aderit fluxus cholericus, & vomitus, vel virunque cholericum. quar. ait Hip. & sitis vehemens, & continua, & est dicit Auer. 4. collig. proprium signum huius febris, nisi, ait Auic. sit fortassis par-

ua. causa sitis ait Viar. est, tum materia eius in venis oris stomachi, & concantatis hepatis. necess. est, ut sitis confortetur, & contrahatur, quamquam etiam adsit sitis propter spiritualia. quin. infunt vigilia ait Hippo. ob siccitatem, & Auic. ait quod infantibus inest profundus somnus ob vapores elenatos. sextum aliquando ait Hip. delirant ob cholera repentem ad caput vtrair. Gal. sep. ait Hippo. fractura ossium, & labor, & est species lassitudinis vlcerosæ, quæ fit à mordicatione humorum digmum, quorum pars intrat in intimos lacertos prope ossa. octa. est calor, inquit. Viar. intensius, molestissimus, natura inimicus ob materia acumen. & Auic. calor in exterioribus non est ita fortis, ut in interioribus, quia materia parum extra enaporat. nonum ait Alm. & Auic. è febris, quæ à corpore non separatur, id est verè continua omni die quod non fit in tertiana continua: quare est sine typo. decimū non est cum sudore, nisi quando recedit, dum modo crisis fiat per sudorem. ait Alm. Vnde decimū pulsus est velocissimus, magnus, & frequens. ait Gordo. & Guil. tandem ait Alm. quæ signa eueniunt in tertiana notha sunt in causone, sed fortiora. Haly. sequuntur eam sitis maxima, alienatio, angustia, acutio, & propinquitas ad perditionem. & Gord. inquietudo, malitia tolerandi, syncopis, tremor cordis. & Gil. vehemens capitis dolor, frontis, ac tympani, tinitus aurium, citrinitas faciei, rubedo oculorum, instabilitas, tremor cordis, tussis sicca, & quandoque nausea, & vomitus. Causonis nothi signa ait Hip. 4. reg. acut. sunt fluxus ventris, & Gale. videtur humoralis, sed si materia est in stomacho corrumpens cibum, est cibalis. si in hepate, chylosus. & Alex. non verus causeris habet sitim, sed non nimiam aut multum intensam, neque nigredinem linguæ, neque vomitum: depositio cholerica est, sed magis corruptio, non est in ore amaritudo, sed potius falsedo. in vero causone lingua est amara, vigilia, inquietudines, & magis in vero quam in notho. Gord. si causeris fuerit ex phlegmate falso accidentia erunt remissiora, tempus hyemale, & diata phlegmatica præcessit, & affligit horas 18. vrina ait Rabi. aucto. Gal. in 3. epid. Subtilis in febre acuta adurenti significat humores multos, ac crudos in venis, quæ sunt in gibbo hepatis, & maxime in causone facto à cholera citrina, vel phlegmate falso. ex ipsa materia, quæ est subiectum febris. & in facto à cholera pura potest vrina apparere cruda ex crapula nouella, vel alia materia posita circa hepar, & vias vritides, quæ non est subiectum febris. Gord. est rubra, & tenuis, lucens, ac scintillas,

ignis : & quandoque ex nimio incendio
viret in superiori parte , & interdum nigrescit , & Gord. aliquando est in princ. cruda ob multitudinem opilationis , aliquando tincta ob resolutionem cholerae , aliquando liuens turbida ob multitudinem opilationis , & putrefactionis , dicunt quidam , quod vrina rubicunda , ignea subtilis liuens superius causonem de cholera significat , si non sit subtilis : sed rubicunda absque igneitate , causonem de sanguine cholerico . Si ruffa magis grossa , livida superius , causonem de phlegmate falso : recipit enim rubedinem a cholera , & grossitiem a phlegmate , inquit Gal. in com. prædic. Si causon est ob materiam contentam in stomacho , vel hepate , est ibi magna inflammatio ; si in pulmone , lingua est nigra , & magis desipiunt , & habent dispnoeam cum ore aperto . & magis appetunt frigus aeris , quam aquæ potum , ait Alex. & Rabi vt supra , varietas vomitus in acuta febre adurenti est signum humoris crudi in venis , quæ sunt iniunctæ intestinistinis , & concano hepatis . Causonizantes aliquando sunt muti , aliquando surdi . si virtutes , & sensus sunt boni , & corporis leuitas , & calor per totum corpus , & bonitas appetitus , ait Isaac non est desperandum . si rigor ait Hip. in causone deuenit , morbi sit solutio : quia concutitur materia ad extra , & id in die critico . post signa digestionis vt ait Ras. 16. con alio modo est malus , facto rigore necesse est , ne sudor , vel vomitus , vel alui fluxus sequatur , in causone magis sit rigor , quam in tertiana continua : quia materia tertianæ est in ventis magnis , & amplis , & sparsa ad multas venas , & grossior , quam illa causonis . aliquando in rigore illo sit alienatio : quia materia expellitur ad membra sensibilia . signa mala , ait ibi Gale , est rigor in principio vigiliæ , fastidium , sitis , vrinæ nigrae subtiles , & pauca sientes , adusto cholerico humore , frigus extremitatum , ait Ras. ibidem . & dicit etiã si in causone repente rubea fiat facies , & oculi cum ponderoso eloquio , & horribili morietur eodem die : rigor in principio gutta sanguinis e naribus , in secunda die singultus , dolor in visceribus , sudor frigidus in quarto mortem , aut longitudinem significant . & vbi exit sanguis non est rigor : quia materia est in tra venas , hæc com. & Isaac . causon in pueris , ait Auic. est leuior ob humiditatem . hi abhorrent mamillam . & acescit lac in stomacho , Gor. ait , si icteritia in causone fiat ante 7. morietur . Gale. 3. dynam. antequam causon fiat , dolor sentitur & capitis grauitas , & dolor antrum cum fornicatu , & tremore .

Curatio , Viat. inspicere quatuor morbi tempera , quæ cognoscuntur optime per signa di-

gestionis , & cruditatis . & non dar inducias . vnde sis sollicitus : curaigitur causi veri ait Auic. est qualis tertianæ continuæ , & puræ non veri vt tertianæ nothæ . sed regimen ten dat ad frigidius , & hum. quam in tertiana , & magis vtatur cordialibus . quare viret ægetæ rem calidum , siccum , itam , strepitum , motu laborem , frictiones asperas , vigilias , salita , & acuta tam in cibo , quam in medicina alteratiua , & solutiua , vt vult Hipp. 4. reg. acutorum carnes , vinum , non des cibum in augmento , Alex. iter in balneo aquæ dulcis tepidæ vsq; ad caput . sed caue , ait Gal. vbi est repletio . vnde Auic. inuat id in declinatione , sed tendat ad frigidum præsertim , in quibus est febris e phlegmate falso . quare confert in vtroque causone . finis est vt alterentur reliquæ caloris , & consumerentur reliqui humores , dicta vlt que ad quartum sit nulla , ait ibi Hip. nisi , ait Constan. sit puer , complexio cholerica , rara compositio , & vsus comedendi . hi ait Viat. comedant prisanam , panem ter lotum cum zuccaro , & bibat aquam cum zuc. succo gran. muzorum , cucu. citrul. syr. viol. in augmento si innanitus sit stomachus , in primis quatuor diebus . si febris est terminatura , da stō macho debili mellicratum , syrup. vio. vel ros. vel succum granatorum . Alm. dat micam panis infusam in lacte acetoso , absque butiro , cum zuc. bibat aquam hordei . Gord. dat præter hæc lac amygdalarum lactucam , portulacam , ius pullorum . & Gnil. scariolam cum agresta , succo granatorum , acetos. citri. cibis utilis sit ex penidijs , & medulla panis lota , & dissoluta in iulep. rosato vel viol. cum medico aquæ rosatæ in qua granum camphoræ ponatur . cibis , ait constan. detur in extremo diei , & maxime in aurora ob aeris frigus Gal. 1. ad Glanc. quando signa digestionis completæ apparent da aquam frigidam considerando complexionem , &c. & si dederis ante , da cum zuc. iulep. vel syrup. acetoso , vt diu non moretur in stomacho . & ait Rab. in 13. part. liquefacit carnem , & pinguedinem . vnde exhibenda est aqua frigida . hidromel aquosum da , vel de zuc. multum in vna vice , quia primum extinguendus est calor : quia pauca quantitas auget eum . & Auic. detur syrup. acetos. scilicet & emulsiō seminis endiuia , & melonis indi . item aquæ cucurbitæ coctæ in sugno cum zuc. ad vnc. iiii. quod lenit ventrem vel ad vnc. vj. & aquæ cucur. citrulli coctæ cum zuc. & detur assidue . ait Alm. aquam frigidam bibat , vsque dum facies viridis fiat : calor autem extinguetur , sudabit , & liberabitur . melior autem est aqua anguriæ in paroxismo , quam aqua pura , quia restaurat , & addit in sanguine faciendo frigidam qualitatem . de syrup.

nilibus est syrup. nenusa. violat. cum aqua cocta, in qua infusum fuerit semen psillij. integrum die, ac nocte. vel Rec. succi grana. aceto. agrestis, berberij, citoniorum, aceti ana lib. i. succi malorum acetosorum, pirorum acetosorum, & acetos. citri. ana libr. v. zuc. albissimi lib. iij. fiat syrup. & aromatizetur cum sandalis citrinis, rubeis, & pauco camphoræ, vel Rec. succi acetos. citri. vel limon. lib. iij. bulliant in eis berbe. vnc. ij. fiat sy. & aromatizetur. vel Rec. sand. spodij, succi liquiritiz, dragag. sem. portulacæ, berbenæ ana vnc. j. reubar. vnc. v. pulueriza, & liga in petia bulliant in aqua mellonis, vel citrulli, in qua psillium fuerit infusum. & cum zuc. fiat syrup. cum pauco camphoræ. vel Rec. syr. acetos. simp. de nenusa. de papan. ana vnc. iij. s. misce & da vnc. iij. cum aqua frigida, vel aqua portulacæ. De aqua ait Alm. bibat multum cum iulep, & succo granatorum, nisi apostema intus fuerit, vel hepar debile, valde conferunt trochisci de camphora, & valent ad ardorem urinæ ad extra, ait Alm. super hepar, & cor ponantur panni in aqua ros. infusi. quidam statim post lenitionem id faciunt vnde ait Alexand. in frigida statim, quia putrefactio in dies plus augetur. & nisi timor esset in summo non des. ait Girard. mucillag. psillij, sem. portul. & huius multum nisi calor sit vehemens. De euacuatione, medici nihil dicunt. de digestionem, quia materia est furiosa, & quando non esset alteratio, quæ potest dici & digestio, sit curæ initium. in euacuatione respice materias communes, & necessario repertas. vnde vomitus confert, ait ibi Hip. & clystere, & serum lactis in potu, vt soluat. leniunt thamar. & singulis noctis tribue ait Alm. ex apozemate prunorum, & thamar. donec bis, aut ter quotidie venter soluat, & leni in principio ait Auic. quia exsiccantur feces, valde. Auer. 7. collig. dat quotidie aureos. x. thamarin. infusorum in aqua scilicet sine syrupo, vel alia re dulci, deinde dat aquam hordei. clystera alterantia fiant ex succo cucurb. cocum. melo. indi. cum par. j. succi lactucæ & portulacæ par. ij. decoct. violarum par. vi. aut coque lactucam, portul. viol. semperuium, maluam in aquis stillatis, & Rabi. fiat ex aqua, & oleo, vt calorem adurentem abruptas. confert in his cassia, zuc. viol. & id generis. de materiis contingenter repertis Auic. vult sanguinem minui in principio phleb. si æger erit sanguineus, & causon factus fuerit ex cholera à putrefactione sanguinis generata, & præcipue si noadum totum subtile sanguinis conuersum fuerit in choleram, sed ratione materiæ propriæ febris Auic. non consentit phleb. quia ait, inflammabit fortasse eos, facit enim ebullire humo-

res motos, cholericos, & incrudat phlegmaticos. idem affirmat Guil. & de sang. è naribus quia acuit humores & nocet quando cholera non est sic mixta sanguini, vt sequatur cum in euacuatione. cuius signum est urina subtilis, ignea, sed non est permixta. verum mixta est, quando est grossa, & rubea, & tunc fortasse Auic. confert, quia minorabitur materia febris. Gord. nunquam in causone fiat phlebotomia in euacuatione minorat. ait Auic. quando indiget euacuatione, euacua statim cum his, quæ ad febrem tertianam, nec differas si materia est prana, & multa, & Viat. in parte purga, & remoue materiam cum thamar. prunis, violis, cassia, & huius in magna dosi, vel in parua si misceas. electuarium de succo ros. in vero, in notho reub. vel agar. nam ait Auer. 7. collig. licet purgare in principio cum attractiua. in augmento ait Viat. non euacues: quia natura remouebitur à regimine febris & proprie in crisi facienda. euacuationem eradicationem ait Auic. facias apud digestionem completam. vnde in medio tempore digere cum syrupo non acetoso, quia maxime acuit. facta tali euacuatione, da prouocantia frigida.

Dicitur quod decoctio foliorum, vel florum rassi barbass. bibita cum syrupo mitigat calorem, item cimbalaria bibita emplastrata, ite portulaca cum farina hordei cocta emplastrata super stomacho, ventre, & hypo. & repetita. item oleum de ranis innunctum fronti, & timp. item semen pastinacæ tusum, & bullitum & cum zuc. fiat syrupus. & cum eadem decoctione exhibeatur. curat statim febrem, acetum, in quo bullierit absinthium inunctum super pulsus & tempora. mitigat calorem.

De febre phlegmatica.

Febris phlegmatica dicitur communiter amphimerina, vel quotidiana: quia per totum, vel ferè totum diem affligit patientem. pueri, mulieres, senes, otiosi, ennuchi, & id generis capiuntur ab hac febre. causa ait Auer. 3. collig. est opposita causa cholericæ.

Huius alia est continua, ait Serap. cuius humor putrescit intra venas, alia interpollata, quæ extra, & in tertijs humiditatibus. quæ fit à phlegmate naturali, puta dicitur, quæ ab in naturali, vocatur notha. verum raro repetitur. innaturale est falsum, dulce, acetosum, & vitreum. & tot species sunt quotidianæ nothæ, quæ sunt periculosiores cholericis ob grossitatem phlegmatis ob opilationes, quæ sunt ab eo, & ob interpol. quæ est valde brevis. dixit Auic. longius tempus eius est augmentum, quia materia est grossa, viscosa, tarda accendi & tardatur apparitio digestionis 18. dies. vnde

de longior est declinatio eius: quàm tertianæ: eradicationis eius est inter 64. dies. dixit Gord. sicut febris quartana raro reperitur continua, sic quotidiana raro interpollata.

Febrem phlegmaticam futuram esse significant, ait Gal. 2. de crisi nausætiua satietas plurima, tarditas in digestionis, eructuatio acetosa, somnolentia, pigritia ad motiones, appetitus defectio, gravitas totius corporis. & Guil. vrina grossa, & alba.

Febbris phlegmaticæ signa demonstratiua ait Gal. 2. de differ. feb. est primum quod incipit à frigore extremorum, & ait Alm. in dorso, ait Serap. sentit ille cui scilicet febris aduenit, frigus ob partem phlegmatis, quod non putrescit adhuc: & in fine febris facit horripilationem ob phlegma, quod iam computruit, & ignitur, ait Gal. phlegma putrefactum non mordicat membra sensitiua valde, unde accidit in ea rigor, sed frigus in superficie corporis, & extremitatibus: proprium enim est rigoris phlegmaticæ, quod frigeat superficies corporis, & extrema sine tremore, & est difficultas calefactionis corporis, & prorogatur mora, & tempus augmenti.

Secundum signum, quod corpus difficile calefit, ait Galen. sed Alm. tempus frigoris est prolixum, & vix calefit: & vt plurimum calefit, & iterum frigit: quia phlegma hoc est grossum, & viscosum. & Auic. frigus non venit subito, sed paulatim ex extremis in totum corpus.

Tertium ait Gal. ad Glauco. calor roridus cum quadam acedine inuenitur à manu: quia ait Ser. ex tali humore vapor eleuatur sicut ex lignis viridibus. & Haly. humiditas est ob phlegma, & pauca caliditas ob putrefactionem, & calor ait Alm. non est vt in tertiana vehementis incendij. & calor ait Gale. 2. de differ. non est per totum corpus æqualis. sed manus sentit in vno loco asperitatem, in alio lenitatem, quasi calor coletur per cribellam. quadam pars putrescit, quadam minime, quare ait Auic. tactus calor in primis est debilis, & vaporosus, deinde si positio manus proregetur, sentit acuitatem debilem, & non equalem, & ager non desiderat aerem frigidum, & aquam frigidam, vt tertianarius.

Quartum pulsus est inæqualis, & paucus in principio & in augmento est inæqualis, quia materia grauat virtutem, est debilis ob virtutis imbecillitatem, est paucus ob frigus phlegmatis. sic Gale. sed Haly. pulsus est minor pulsu quartanæ, tertianæ, & spissior. paucus est quia virtus deficit à frigore, dissoluitur, & angustatur à multitudine eius. spissus est, vt reciperet magnitudinem. est rarus ait Auic. ob frigus materię, est debilis ob multitudinem.

& Girard. pulsus est mollis ab humore latus ob descensionem, & multitudinem, tardus ob caloris paruitatem, diuersus in fortitudine, & debilitate: quia nunc materia dominatur naturæ, aunc natura materię, & est breuior, & rarior pulsu tertianæ, & quartanæ in quolibet tempore.

Quintum vrina est in principio alba & subtilis ob cruditatem, & in fine rubea, & grossa ob decoctionem, & quandoque quia noua materia mouetur, definit febris omnino, re-dijt alba, & postea rubea, & grossa. & hæc Auic. alio modo.

Sextum ait Gale. 2. de crisi non habet anhelitum magnum, frequentem, nec inflammatum. & Alm. est expiratio maior inspiratione: quia maior est necessitas emittendi fumos putridos, & capinosos, quàm attrahendi aerem frigidum.

Septimum ait Galen. 1. ad Glauco. vomitus sunt phlegmatici, & quæ per ventrem excernuntur, frigidiora, crassiora, & aquosiora, & totum corpus indigestis humoribus est refectum. nisi ait Serap. complexio agri sit calida, aut eius, cuius cholera prohibetur ire ad venas in vijs vrinæ, & non ad intestina. unde in his aliquando est egestio citrina.

Octauum longitudo paroxysmi est longior quàm in tertiana, & inuasio vt plurimum est in fine diei iuxta noctem, ait Alm. & Serap.

Nonum, ait Gale. ager nunquam immunis est à febre. idem ait Serap. & secundum calorem, & pulsum, quoniam ait Auic. materia cum grossitie est multa. unde non potest tota resolui, imo manet, vt cinis humidus, quare ad fallam quietem tendit. effusio vero caloris relictæ aggregat materiã pro nouo parox. tamen si materia est dulcis, & benigna, & aliquando salsa, soluitur à febre in 12. horis, & aliud tempus est verè quietum.

Decimum omni die inuadit vt ferunt omnes medici, dixit Gal. ad Glauco. quotidiana vera quotidie anticipat, vt primo die inuadit in primam horam, secundo in secundam, tertio, in tertiam. non vera postponit vt primo die in tertiam horam, secundo in secundam, & tertio in primam.

Vndec. ait Gal. 2. de crisi. sudores non erunt in principio vniuersali, & ferit ait Alm. esse paruos, & viscosos ob grossitiem materiæ. quare Auic. paucitas sudoris est proprium signum: quoniam vapor phlegmatis difficile penetrat per poros ob grossitiem, & viscositatem. sed cum materia est digesta, vt in statu, tunc incipit sudor: nam significat materiã subtilem, & fluidam.

Duodecimum dixit Gale. de crisi non petit aquam frigidam, & pius sit, quàm in alijs febri-

febris. & si sitit ait Serap. non est ob phlegma, sed ob putrefactionem, & Auic. propter falsedinem. vnde ait Serap. & Gerardus est in lipidum, horridum, vel mali saporis, vel cum mucillagine viscosa, tamen processu temporis, si putrefactio fuerit magna, & maxime ex phlegmate in ore contento, os & lingua exsiccatur, & aspera fit, & nigra, tamen quod adhaeret ei, est viscosum.

Decimum tertium ait Gal. 2. de crisi fortasse laesio est in stomacho, vel in hepate. Serap. & Ras. est dolor stomachi, & nausea, vel vomitus, deiectio appetitus est signum commune in omni phlegmatica. ait Guil.

Quartum decimum cum prorogatur, facies inflammatur, & fit viridis ob fortitudinem phlegmatis. Gal. Alm. Auic. & Viat. ait calor est viridis ob frigus mortificans: citrinus ob calorem putredinalem.

Quintum decimum ait Auic. rancus acetosus ob diminutam digestionem praesertim in principio & augmento.

Sextum decimum Gal. 2. de crisi, & Auic. inflatio laterum fit ob exspilationem, & multiplicationem venti, & proprie dextri hypochondrii in principio, & augmento. in statu minoratur ob digestionem factam in materia.

Decimum septimum ait Sera. magnum fit splen ob grossiorem materiam, praesertim in statu. dixit Auic.

Decimum octauum incipit cum graui, & profundo somno ob eleuationem vaporum humid. ad caput, nisi humor sit salus.

Decimum nonum aliquando aggrauat praesertim in principio parox. virtutem adeo ut fiat syncope non vera, sed ait Auic. ob debilitatem oris ventriculi, casum appetitus, & priuationem bonae digestionis: & quandoque ait, zoar ob declinationem caloris ad medium, & eius extinctionem factam ab humido peccante.

Vige, sumitur a rebus naturalibus, ut complexione frigida, & humi. etate puerili, sexu foemini, compositione densa, habitudine pingui: a non naturali, ut hyeme, & id generis.

Summam signorum colligit Rabi a Gal. 2. de crisi. haec sunt septem. primum febris in primis diebus non incipit cum rigore, sed postea. & frigida sunt extrema. secundum pulsus inaequalis, & corruptus in ordine in principio paroxif. tertium non sentit inflammationem vehementem, & sitis est minor quam in alijs. quartum non sudat fortiter in primis diebus cum indigestione vrinae. quintum forte non fit haec febris absque lesione stomachi, & hepatis. Sextum sub hypochondrio fit inflatio. Septimum color est inter citrinum, & album in statu. dixit Gilib. quaedam sunt acci-

dentia superuenientia, ut dolor capitis cum grauitate, & praecipue occipitij, abundantia salinarum, stupor sensuum, & hebetudo, indigestio, & granedo maior post cibum, dolor stomachi, sensio laterum, & rascationes, & emissiones plurimae sine causa manifesta, facili deludatio, fastidium cibi, & potus, insomnia aquarum, & balnearum, & huiusmodi contingit aliquando augere febrem in die tertio, vel quarto ob maiorem accumulationem phlegmatis, quam ob permixtionem cholerae, vel melancholiae. ait Ras. quando phlegmatica in omni inter. resoluitur, brevis erit ob phlegmatis paucitatem, & subtilitatem, & pororum aperitionem: & si cum hac fuerit sudor erit securitas maior. dixit Gal. ad Glau. cum quotidiana non recte curatur in macronoxia uertitur, & hinc in quartanam.

Signa specialia febris putridae periodicae pure factae a phlegmate naturali sunt, ait Gerard. haec febris libenter inuadit cum oscitationibus, & alicibus cum quodam stupore & paucitate siri, rubore, & linore faciei mixtis, & dolore stomachi continuo. incipit cum paucio frigore extremitatum, pulsu occulto, & cum uenit ad statum calor est lentus, occultus, pulsus est semper diuersus. terminatur cum paucio sudore, & urina in principio est remissa, inuadit in horis phlegmatis, frigus est longum & lentum, & calor ait Gilib. gestio est liquida phlegmatica saluae abundantia, & maxime in statu, & in augmento labia liuida, rancus acidus, & fluxus, & torsio in uentre, & Plac. caput graue, urina inquit Ferras. est alba, & spissa cum inaequali, & non pura sublidencia, in augmento, & statu subpallida, vel spissa. Guil. pulsus est paruus, uelox, spissus, & mollis vrina quod plus accedit statu, eo magis subtiliatur, & clara fit.

Signa quotidianae nothae factae a phlegmate dulci sunt ait Gal. 2. de differ. paroxif. in horis sanguinis & mane ait Rog. vel in horis phlegmatis circa media noctem. inuadit primo cum paruo frigore, vel nullo, ut vult Gale. rigore, vel typo, & ut ait Auic. nisi praecesserint plures paroxif. quia est ex materia dulci, & benigna. postea materia fit maligna, ex quibus accidit typus. vnde Beltramus haec febris est quasi continua, & nullus adest typus & calefit gradatim, ac calor fit magnus, inquit Gilib. & Rog. accidentia ait Gilib. sunt caloris, & frig. medice adeo quod accidentia caloris remissiora sunt, quam in tertiana vera, & quotidiana e phlegmate falso. itaque accidit dolor capitis grauius, & praecipue frontis. quandoque stomachi fastidium, & oris dulcedo in principio parox. eruptiones foetide quales ex oris comestis, foetor nimius in-

egestione, inflatio laterum, & nulla sitis, urina & ruffa, vel subruffa distincte liuens in substantia spissa, hæc Gilib. & post magnum calorem descendit cum maiori sudore, ait Rog. hinc elice duo signa huius febris: nullus. s. uel ferè nullus rigor, & nulla vel pauca sitis respectu aliarum febrium.

Signa quotidianæ factæ à phlegmate falso sunt ait Gilib. quod in hac febre est dispositio medica inter tertianam veram, & quotidianam veram, & horamotus eius est inter motum cholerae, & motum phlegmatis. unde hora diei nona incipit parox. in meridie. inuadit igitur ut ait Avicenn. cum horripilatione, & non fit vehemens frigus: nam phlegma falsum est acutum mordicatum ratione cholerae, quæ mordicat sensitiua membra, & mordicando inducit horripilationem. & phlegma falsum, cum sit parum frigidum, parum facit frigus nisi ratione caloris retracti ad intra calor sequitur magnus, unde lingua salua, sitis, pulsus velox, & spissus, capitis grauitas, aurium tintus. hæc Gilib. unde Viar. inquit. cum videris ægrum sitientem, & siccum os habentem, febris est è phlegmate falso, stomachi fastidium ait Ferr. vrina inquit Rog. est ruffa, vel subruffa, vel citrina incensa mediocriter spissa, vel mediocriter, ait Plat. tenuis, & Fer. superius spissa, inferius tenuis propter phlegmatis falsi qualitatem, & non phlegmatis admixtionem. & idem Gilib. Ferrar. quia hæc febris maxime in ætate, & iuuetè fit, creditum est duplicem esse tertianam. sed duplex tertiana notha nullam, aut paruam habet requiem: quia una tertiana 24. horas infestat, & alia similiter: & hæc quotidiana minus durat: nã parox. 12. perseverat horas in summo labore, sex in falsa quiete, & sex in vera inuadit ait Rog. aliquando in horis cholerae, aliquando phlegmatis, aliquando melancholiae, dicunt quidam. sequitur horripilatio, rigor, & tremor plus, quàm in ceteris phlegmaticis, sitis est maior, & siccitas oris, calor maior urina cum aduenit digestio est mediocriter spissa, cum indigestio est tenuis, uel multum spissa, pulsus, maior, velocior, & frequentior, somnus minor, & ut plurimum est cum pruritu & scabie.

Signa quotidianæ factæ à phlegmate vitreo, uel mucillaginoso, ait Plat. sunt qui post tertiam horam noctis inuadunt, & Rog. quædoque in horis phlegmatis quandoque in horis melancholiae infestat. sed frequentius circa mediam nocte inuadit. igitur ait Avicenn. cõ frigidum magno, & vitreo frigus est intensius quia est frigidius acetoso. frigus tamen non incipit subito, imo paulatim in extremitatibus ob grossiorem materiem & deuenit ad frigus

niuis, congelatiuum, & ait Rog. frangituum iuncturatum. & uix calefit, & cum reditu frigoris quod contingit ob diuersitatem materis, quæ mouetur ad putredinem. & Avicenn. forte misceatur in principio frigoris horripilatio. & parua punctio frigus fit ob materiam, quæ cum computruit, & horripilatio propter illam quæ computruit, in statu vniuersali, maius est frigus, & maior rigor ob materiam subtiliatam, unde fortius mouetur ob quem motum trahitur calor ad intra, & sequitur maior concussio, quàm antea. in primis parox. quandoque fit parox. sine frigore, & rigore, vel horripilatione quia materia tunc adeo pigra mouetur, ut non lædit sensitiua membra, ob quam læsionem retrahatur calor, & non in frigidet manifeste. quare febris hæc est pigra, ut ait Ras. in diuis. longi paroxismi, & difficile calefit ob grossiorem, & coagulationem materis, aiunt, quod incipit cum graui, & profundo somno, sequitur, ait Ger. debilis, ac lentus calor, ac nulla sitis, multa uris humiditas, multa salua ob phlegma liquefactum. pulsus in principio debilis, & oculus ob fortem constrictionem arteriarum, in statu debilis, paruus, & gracilis ob paucitatem caloris vrina alba aquosa, & mediocriter tenuis ob materis compactionem, opilationem, & cruditatem. sed postea, ob calorem putredinalem fit ruffa, & spissa. Gilib. ait, qd si globa humi. phleg. fuerit tenuis, in ea significat phl. vitreum non putrefacientem: si lactea, vel glutinosa cum globa in fundo, putrefactum. in egestionibus videntur mucilagines ad modum vitri liquefacti, uel albuginis oui. id addit Gilib. grauedo capitis, & corporis, & indigestio ventris, & lateris, uiscerum inflatio, dolor stomachi, & intestinorum, grauedo tenum, & inferiorum partium dorsu. tandem ait Platea. sentitur dolor circa loca, & magna frigiditas, in quibus continetur materia. unde Ferrar. si phlegma est in intestinis, talis inducit dolor, ac si cerebrum perforaret. ciborum indigestio, & inflatio laterum post cibi assumptionem & sæpe excreantur violenter, & cum magna uis: quandoque album, & clarum, quandoque spissum, & rotundum quasi cicer, & maxime si materia fuerit in spiritualibus. & quia materia est nimis compacta, febris est nimis longa, & quasi fixa est hydropisis.

Signa quotidianæ factæ à phlegmate acetoso inquit Rog. incipit in horis phlegmatis & quædoq; in horis melancholiae infestatur cum multo frigore, & leno calore, & ad ultimum cum paucio sudore. Plat. in sero incipit inter horas phlegmatis & melancholiae. parua ait Belkra. est sitis, multus appetitus, grauedo capitis, uel frontis, consipatio uentris, dolor in stomacho.

Stomacho; & similitur eius signa signis quar-
tanae. vera cibo assumpto adest indigestio;
tertio; & acetosa eructatio; inflatio post
cibum dolor sinistri hypochondrij; & uni-
versae partis capitis; & ex grossa ventositate
generata ex indigestione. urina subdit Gil-
lib. est pallida; vel subpallida; vel citrina; vel
subcitrina cum subtili substantia; & sine
globo humoris in fundo; & quo magis est
indigesta; eo magis tenuis; deinde phlegma-
te ente digesto ait Fer. fere per totum inspif-
satur; hæc ait; febris non est negligenda;
quia ex ea fit erratica; & quartana ait Gilib.
ubi est dolor; ibi est locus materię; & si ma-
teria est in spiritualibus; sius est maior; uri-
na coloratior; & quædam ampullæ minutæ
in superficie eius sunt. Dixit Serapio. om-
nis quotidiana est longa; & non sine vehe-
menti timore; quia lædit naturam omni die
& ut plurimum os stomachi est læsum; & fa-
cit nauseam quæ prohibet cibi assumptionē;
& paucitatem digestionis. saluior est; in-
quit Auicē. quæ est interpol. magis munda;
ut quæ sit ex phlegmate dulci; & quæ est
absque accidentibus; & multi sudoris Sera-
pio. quæ sit à phlegmate vitreo est multo-
rum mensium; unde periculosa est ait A-
uerro; quæ à phlegmate mucilaginoso;
& quæ ab acetoso; & quæ à salso; quia
est acutior. Auicē. diurna est longior;
& deterior nocturna; quia calor febrilis; &
diei. uniti exsiccant adeo corpus; ut pericu-
lum fiat heclicæ; tum quia contendit eum;
qui aperit poros; & ipsa claudit ob materię
multitudinem; tum demum quia patien-
tes in dicta febre conantur comedere in
nocte.

Curatio quotidiana periodica

pure.

OMnis febris phlegmatica est. difficilis cu-
rationis; quia ait Gilib. cum causa ante-
cedens sit frigida; & humida; est contraria
morbō; qui est calidus; & siccus; atamen
principium curæ est à causa antecedente;
& perficitur diætā; & potione. aer igitur
sit clarus; subtilis ad calidum; & sic-
cum declinans naturaliter; vel arte; gau-
deat æger; quandoque irascatur præser-
tim si à profundo somno corripatur. qui-
es est fugienda; fricatio sit sicca incipien-
do ab inferioribus ante cibum; & si tem-
pus permiserit; per horam ante paroxysm.
& ait Auic. fricatio cum tela aranæ; & oleo
communī; vel alio aperitiuo iuvat à pro-

priate; & Ger. fiat circa nentrem; & latera
fortiter aliquando cum manibus; aliquan-
do cum palmis asperis secundum diversitatem
particularum aliquando cum hac unctione
quæ Recipit. aquæ dulcis. libræ unā. vini vñ.
iiii. aceti vñcias ii. radicū apii vñcias ii. o-
lei chamæ. vñ. ii. bulliant simul; unge ven-
trem; latera; & totum dorsum calida un-
ctione. caue balnea ante signa digestionis
& nisi declinatio incipiat; nam ait Ras. in
diuis. mane mittat in balneum ut sudet in eo
& Haly. sit aqua facta ex decoctione rerum
subtiliantium; fuge somnum longum præ-
sertim diurnum; & in paroxismo usque
ad eius declinationem; & ait Auicē. sit
somnia tantus ad digestionem materię;
quantæ vigiliæ ad resolutionem bonam so-
perfluitarum. fuge cibos unguosos; cru-
dos præsertim ait Auicē. & Serapion. a-
quam frigidam; nec pullos; nec carnes
usque ad declinationem vniuersalem nisi
virtus sit debilis; item lac; mel; pisces;
olera; & omnia frigida; & humida. regi-
men sit magis ait Auicē. subtile in hac quàm
in quartana; quia est à materia ampliori; &
humidior sed nec tantum quantum in chole-
ricis. inquit Ras. 8. con. subtilia regimen ut
que ad septem diem; & si uides eam diminu-
tam ualde procede hac uia; sin minus ingros-
sa; ne uirtus decadat; idem dicendum est in
augumento & statu; qui cū sit subtilioris diæ-
tæ; quàm alia tempora; cibi sine aqua ciceris;
asparagi cum oleo; & sale ait Sera. spinachia
cum aceto; muria; cinnamomo; uinc. pass. cū
zuccharo pistachia; cappares; & ait Isaac pi-
sces saliti; oliuæ conditæ; Alm. acetum; oleū;
& sal; caules; sinapis cum omni cibo compe-
tent. potus in quotidiana pura ait Sera-
pion. scaniabin; aqua mellis; & aqua
zucchari in quotidiana è phlegmate dul-
ci; aut salso aqua hordei; zuchcharū; ac-
etum; limphatum; syrup. acetos. & ui-
num bene limphatum in aqua hordei;
Coque; ait Auerroes masticeam; vel pi-
per; uel radicem feniculi; post septem
diem uictur uinum cum aqua decoctum
sit mastix; mentha; uel anisum; & Isa-
ac si æger sitiat; da aquam calidam; quæ
incidit ob calorem auctualem phlegma;
& cogit descendere ad inferiora; & si-
tim reprimat in quoti. à phlegm. mucil-
agin. aceroso vitreo; usque ad decima-
quarta bibat oximel simpli. deinde com-
positum; uel aquam mellis; in qua de-
cocta sit mentha; post decimum quartum ui-
num subtile; limphatum; maxime cum phle-
gma incipit digeri; ait Guil. bulliat cū p. ullis
tartarū puluerizatū; & cicotiazatum; ait

cum iure morum abstergit enim multum à phlegmate stomachum, & intestina. Dixit Serapio, si hora comedendi post quietem febris, aut ante paroxysmum per tres aut quatuor horas, siue septem, & non minus, quam quatuor ante paroxysmum. & Alman. hora sit quantum possibile est distans à paroxysmo, multos menses. *Absterge*, morum. *Cura* quotidianæ puræ altera vniuersalis est, alia particularis, & hæc habet sex intentiones, materiæ digestionem, & æquationem, euacuationem eius, & resolutionem, membrorum confortationem, & rectificationem materiæ, ne ad nobilia cadat membra, alterationem febris, & accidentium correctionem: unde cura respicit aut morbum, aut causam morbi, aut accidentia. sed in hac febre intentio maior sit ad materiam, quam ad morbum, quia maior est materia, quam calor, ut ait Haly. quare ait Auerro. 7. collige febris à phlegmate dulci, ac naturali si facta fuerit incide humorem subtilia, aperi opilationes plus quam infrigides, & humectes: quia incrudant materiam, & congelant præter has intentiones stude, ne humor putrescat lenias materias communes, minores, eradicet, leni in principio vniuersali, & euacua materias communes, quoniam in hac febre plurimæ reperuntur, & id ait Serapio, cum aqua geleniabin, cum aqua iuleb, & cassia, & ait Auicenna cum geleniabin facto ex zuecero & rosis, quæ soluant, aqua prunorum, & thamarin, & id generis debilitant stomachum, clysteria sunt oportuna, & si nausea afficeret egrum, aliquando confert vomitus lenis, mane & vespere quotidie cum clystere vel cum suppo, exoneret fœces, & si post lenitionem videris vrinam rubeam crassam, & sit æger complexionis sanguineæ, mitte sang. qui est materia contingenter reperta, & ex materijs communibus contingenter repertis est materia quædam subtilis aquosa reperta in gibbis hepatis, & venis gibbo vicinis, quæ leniter per vrinam educenda est, post tres, vel sex dies digere, & digestio, ait Ras. 16. consistit transmutatio phlegmatis in sanguinem, quare ait Auicenna, subtilia, incide, & aperi id est digere primo cum lenibus, deinde cum fortioribus, quare Auerro. da squingibin cum iure cicero, & radice liquiritiæ spicam, & masticem. ad digestionem complendam non est opportunum ait Auicenna quoniam cum materia sit eterogenea scilicet alia grossa, alia subtilis, alia viscosa, alia non, oportet, ut ex ea euacuetur aliquid, & in reliquo digestio fiat. unde Haly. cum signa digestionis

videris, curatua phlegma in hebidomada semel, ait Galen. in libro primo ad Glanconopodes syrupum acetosum, neque valde extinguentia, nisi post tres, vel quatuor dies, ut subtilietur materia à calore febris, nam febris, quæ quotidie affligit, putrefacit phlegma, sed post hos da syrupum acetosum, & ea ait Serapio, quæ prouocant vrinam, oderit geleniabin purum, odigerit enim materias phlegmaticas in stomacho, abstergit, & confortat ipsum, & Auicenna. & cum illo, & sine illo da aquam scni, vel endi, vel apij, & hæc post quatuor diem. unde Recipe aque scni. & apij ana vnc. iij. s. aque endi nunc vnc. iij. mellis rosolani vnc. iij. bulliant per oca bullitione, ut depurentur. & Auicenna hoc tempore da syrupum acetosum cum aqua mellis, vel hyssopi. Fer. oximel simplicum aqua calida, alij oximel cum modico syrupi endiæ, vel Recipe menthiæ sicce & hyssopi ana Manip. passularum, anisorum ana vnc. vnam endiæ, cichoreæ, lupuli capiluen. ana M. med. semper communium stygia vnc. med. fiat decoctio & cum zuecero & geleniabin, & da postea euacua, & post 7. da, ait Auicenna, geleniabin cum confortantibus os stomachi, plus digerunt, sed cum videris digestionem, quod sit in augmento, adiana pan cum folijs feniculi, apij, radice squinant, capiluen & id generis, transacta autem quarta septimana, ait Alman. tradet trochiscos de rosis completos cum aqua cicero, & quoniam eger potest deuenire ob defectum stomachi, & hepatis in hydroperam, unde in sine augmento, da syrupum, qui Recipe corticum rad. apij, scni. petrosi, asparagi, brusci, & eorum seminum, anisorum, passularum ana vnc. j. ameos, danci, carui ana vnc. med. cichoreæ, endiæ capiluen. scolopen. man. j. squinant, calami aromatici, corticum rad. cap. menthiæ sicce, hyssopi sicci, calamenti ana vnc. iij. in horum decoctio fiat syrupus acetosus cum zuecero, & melle, aromatiza cum cinnamomo, & nucem muscata. veniente statim, da syrupum de bisantis, & de eupatorio, vel Recipe scolopend. eupato. calame. hyssopi, menthiæ maioranæ, ana manip. j. corticum radicem cap. ciperi, assari, squinant, calami aromatici ana vnc. med. quinque rad. passul. anethi, ameos, & seminis apij, petroseli, asparagi, brusci ana vnc. vnam fiat elect. & syrupus aromatiza, ut supra, ad euacuationem ait Galen. 12. method. frequens, & paulatina fiat euacuatione, & Isaac, licet non ostendet vrinam digestionem, tamen alia signa eam declarant

rant alia signa sunt inflatio, & gurgulatio intestinorum, stomachi abhominatio: quæ indicant materiam esse subtiliatam, dissolutam, & paratam expulsionem. hæc de digestionem, & euacuationem aggredior, quæ completur per secessum, vomitum, & urinam. vomitus multis placet: quoniam phlegma continetur in stomacho, qui per vomitum facile euacuatur. vnde Serapio. si in hac febre non accidat vomitus non contrin gas, & proprie in principio paroxysmi. si non natura, tu arte prouoca cum raphano infuso in secaniabin, & aqua tepida, vbi decoctum sit anethum, calamentum, & aliquid salis mixtum cum secaniabin, in quo infusus sit raphanus. & Haly. vomitus est vltimum, si stomachus vacuus non sit, comedat cibos salitos prius. & Ras. in diuis. vomitus sit cum syrupo acetoso cum seminibus subtiliantibus, & incidentibus, vel vomitiuis cum semine raphani, rape, attri plicis, anethi, & huius. & subdit Auicem. oportet, vt expellatur septimus dies, quia ante digestionem, agit materiam crudam, & cum sit valde laboriosus, potest debilitare stomachum, & attrahere materias ad ipsum. & ait Auicem. si vomitus sit eis difficilis non prouoces cum forti vomitu. si in principio paroxysmi accedat vomitus, adiua. si in augmento, & statu, adiua etiam, quia breuem reddit futurum paroxysm. dixit Viac. si vomitus eueniat spontaneus in initio morbi, lenitatem, & subtilitatem materię portendit. si non veniat, ne prouoces arte: quia non moueri vomitum in hac febre grossiciem in principio materię, & coagulationem denuntiat, & tarditatem ad digerendum. De euacuatione secessiua ait Ras. in con. laxatio confert, sed non valde in hac febre, tamen quando necessaria sit, incipe à debiliiori, vel saltem à minori dosi: nam per tempus longum materia inciditur, & subtiliatur, & apta redditur expulsionem. vnde tunc non timetur forte solutiuum, & sic procede vsque ad statum, in quo si materia est apta educi à natura in crisi, sine sinibus, vt ere euacuatione eradicatiua. & cum videris inquit Auicem. phlegma iam digestum, scilicet egredi in urinam, dabis omni nocte medicinam de turbith, & parantur pilule dulces cum speciebus scilicet elephanginis si virtus tolerabit, & materię digestio sequetur. sin minus, interpone tempus conueniens, vnde Guil. sumat de tertio in tertium medicamen prædictum aureum vnum. Aliud, quod Recipe turbith optimi vnc. iij. ligni aloës vnc.

j. zuccari albi vnc. iij. misce. & Auicem. ait Almanf. dat pilulas de mastiche, quæ non sunt solutiuæ bis in hebdomada ad stomachi corroboracionem debilitati ob medicamen solutiuum. & hic modus est regularis. tamen quandoque coacti syncopi, vel alij accidentibus exhibemus post lenitionem medicinam solutiuam. quare Asm. præcedens hæc nocumenta dat in principio medicamen de turbith in parua tamen dosi, & sœpe ne sit maior agitatio, quam euacuationis, & quando phlegma aquosum in stomacho continetur, & vijs propinquis, ne misceas zinziber. quando est grossum in stomacho, & vijs propinquis, misce parum zinzib. si phlegma grossum continetur in locis remotis, misce plus zinziber. Auer. septimo collig. recipit syrup. squingibin factum ex decoctione radicum tireos, seminis apij, & liquiritiæ, & dat per hebdomadam vnam. quia præparat humorem, digerit, & habilem reddit expulsionem. & addit agaricum cum medo de turbith, & sine eo. quia euacuat humorem grossum, & aperit opilationes. sed caue colloquunt. Serapio. post 14 dies euacuat assidue cum pilulis de aloës, aut de speciebus alephanginis, aut de eupatorio. idem ait. Recipe hieræ vnc. vij. turbith vnc. x. mirabol. chebuli dram. mez. trochisc. de ros. mino. vnc. iij. eupatorio vnc. med. salis indi vnc. iij. bedeguar, suchaha ana vnc. iij. anisi vnc. iij. confice cum aqua apij bullita, & colata. valet febre phlegmaticæ, & roborat caput, & stomachum, & minoratiuum bonum sit ex cassiæ pulpæ vnc. j. vel plus in decoctione anisi, sceniculi, & liquiritiæ, agarici vnc. vnam. salis gemmæ dram. vnam aut turbith vnc. vnam, zinzib. dram. vnam. Guil. medicamen de turbith. Recipe turbith vnc. x. zinzib. vnc. med. zucca. albi vnc. xv. mastice vnc. j. est fortius quam illud Almanf. quia plus zinziber recipit, quod magis aluit turbith. vnde trahit phlegma grossius & magis à remotis. & Almanf. aliud posuit fortius quod Recipe turbith. vnc. vnam. suc. abinthij quartam vnc. vnam. agarici, hieræ picræ ana vnc. mez. mastic. sextam par. vnc. vnam. confice cum syrupo acetoso mellito conueniunt & pilul. stomachicæ, cum turbith descriptæ in Antidor. silis. & plura habes apud Auicem. si vero ob aliquam causam non potest dari medicamen solutiuum, veni ad prouocantia urinam, & sudorem, & incipe à debili & procede ad fortiora. itaque Ras. in diuis. ait. cum morbus prorogetur,

quando scilicet peruenit ad statum. da trochif. de eupato. & medica. diureticum. vt semen anisi, amcos, & apij. & fac hoc ait Auicen. minorata pluries, aut euacuata materia. item ait Auicen. non facias vnctiones, nec embrocationes, quando morbus est in principio, & humor est in corpore dilatabilis: quoniam mollificant viscera, & humorem fluxibiliorem efficiunt. sed cum apparet digestio, & morbus est in augmento, vel saltem in secunda parte augmenti, hæc vnguentum adiuvant digestionem, & confortant, vnguentum nisi accidentia sint seua, & virtus sit debilis, confricando, vt profundius penetrent. sunt olea subtilia, temperata, & anodina. quidam vngunt spinam, dorsum, & iuncturas ad rigorem prohibendum.

Ad alterationem caloris febrilis in quotidianam, parum aut nihil scribitur: tamen Serapio. ait si necessaria fuerit aqua hordei, coque in ea radices feniculi, & apij, & detur cum secaniabim de melle. & si accescat in stomacho, da aquam mellis decoctam, aut aquam hordei adde parum spicæ, & masticis.

Ad conformationem membrorum principalium, veluti oris stomachi da aromaticum ros. gariof. de ligno aloes, & gradatim ad theriacam, & diatrionpip. deueni. atque præsertim, ait Galen. si hyems, ætas senectutis, complexio frigida, & humida, & vrina alba, & ait Ras. in diuis. nunquam postponas curam stomachi, sed conforta cum olibano, mastice, cipero, & huiusmodi cal. stipticis, odorif. ad extra. ait Serapio. in hora status attende ori stomachi, & Haly. eum conforta cum emplastris constrictiuis. & Viar. cum oleis calidis, vt nardino, masticino, & id generis. & Auic. id facias, in augmento id est post 7. diem, & post lenitionem mucillaginum, & eorum exclusionem per vomitum. & inquit Auicen. mastica mentham, masticem, & anisum: & misce cum geleniabim decoctum anisi, & masti. & post 14. dies vtere trochiscis de ros. thure, masti. & absy. olea sint chame. anethinum, nardinum, costinum, & similia simul mixta, conforta hepar, vt bene sanguifcet, & cer. vt addat spiritus, & calorem: cerebrum, vt virtutem animalem, sensitiuam, & appetitiuam.

Accidentium correctio, si ceciderit appetitus, ait Auicen. da vinum, in quo bullitum sit mellilorum, chamæ. dactili, & absynt. aut fiat ex his emplastrum de foris. si vomitus infester, da ait Serap. syrupum citoniorum, menthæ, granatorum factum cum melle. aut Recip. granorum granatorum vnc. x. thuris albi, masticis ana vnc. v. menthæ vnc. vij.

coque cum lib. ij. aquæ ad consumptionem medietatis. & da omni hora. & Auicen. detur mîna aromatica, & syrup. de mentha.

Si doleat caput, recipiat vaporem decoctionis chamæ. deinde ponat manus, & pedes in dicta aqua bene calida, & stringe crura fortiter, & ne vngas cum oleo: quia opilat vapores, hæc Serapio. & hæc euaporatio si à vapore fiat soda, potest fieri omni hora paroxysmi: si vero ibi esset humor, ne fiat, nisi post minorationem.

Si fluxus ventris fiat, conforta, ait Auicen. ante cum alstringentibus, veluti hepar cum semine cuscute, stomachum cum mastice, & aniso, splenem cum radice apij, scolopendria.

Cum times ait Haly. opilationem, ob quam stomachus, & hepar non digerant, vnde superueniat cachexia, da trochif. absynt. aut lacca cum squingibim, & fugiat aquam copiosam, frigidam, quare Auicen. si facies, & extrema inflantur & cachexia, dentur trochisci de lacca. & viles sunt, qui Recip. nardi, assari ana, confice cum vino decoctionis saluæ, & cum dicto vino accipe. aliquid squing. ait Auic. si palpebræ & pedes sunt inflati, quia perducit ad hydropem, sed ait Alman. 18. con. da prouocantia vrinam cum policaria, & absynt. deinde cum diacur. vel Recip. anisi vnc. iij. solij, absynt. spicæ, amigdal. amararum ana vnc. iij. aloes vnc. iij. succi policariæ vnc. iij. sem. apij vnc. j. fac trochiscos cum sacco anisi, & apij, & dentur cum decoctione seminis eorū vel cum syrupo acetoso.

Si frigus fuerit superfluum, ait Serapio. accipiat æger in toto corpore vaporem aque decoctionis chamæ. mellilo, santu. rorisma, assari, & id generis. deinde vnge cum oleo decocto, & Auicen. post principium vniuersalem da. ante paroxysmum aquam decoctionis sem. anisi, apij, & ozimi gariofil. calidam, & embroca, & vapora. & Rog. pone quandoque manus, & pedes in aqua calida, aut lixiuio, aut vino, aut in balneo calido, aut ait Auicen. frica cum panis incipiendo ab humeris, deinde vnge cum oleo scilicet dulci, vt de chamæ. de anetho, deinde absterge. & da theriacam, vel alia opiata, vt mitridatum trochisc. de ros. magnos cum aqua feniculi semper ante paroxysm. & materia minorata.

Ad remotionem verò paroxysm. laudat Gordo. gentianam ante access. cum vino calido, & sicco quod in hac et in quarta na valde operatur ozimum gariofilatum,

pentaphi. folia eius, ciperus, & cuscute mirè profunt. quidam exhibent vnc. iij. succi apij ante accessionem. Alb. Recip. agarici vnc. mez. succi fumiteræ vnc. mez. & da per tres horas ante: quidam dant frequenter ante accessionem vnc. j. agarici cum syrupo acetoso, & valde vile est vinum decoctionis radicum assari. Ras. 18. con. da tres guttas, vel quatuor sanguinis extracti ex aure asini cum vnc. ij. aquæ per horam. curabitur. Empla. ex mica panis, oleo laurino, & vitello oui affato cum melle, & succo, aut puluere centaureæ minoris posito super stomachum, & umbil. alleviat paroxysmum.

In febre facta à phlegmate salso curam maiorem adhibe hepati, deinde in facta à phlegmate dulci in acetoso stomacho: in mucilla. & vitreo omnibus mutatis.

Quotidiana facta à phlegmate aquoso, curanda est cum victus ratione, & medicina, plus exiccantibus, quam aliz febres. leni cum cassia, melle rosato, aqua hyssopi, menthæ, & capil. vomitus maxime confert, digestio sit gelen. aquæ menthæ & fœn. mino. sit medicina de turbith. postea digere. cum syrupo de quinque radicibus, & geleniabini factus acetosus, & aromaticus, cum decocto cyperi, menthæ, & squinanti. iterum purga cum medicina de turbith. iterum dig. sit syrupus de squinanto, & aqua apij, deinde purga cum pilulis. quæ Recip. agarici, turbith, cheb. ana vnc. j. specierum hieræ vnc. ij. zinzib. nardi, salis gêmæ ana dram. j. in alijs cura ut quotidiana putat.

Facta à phlegmate acetoso, mucillaginoso, & à vitreo, est ferè eadem, tamen accensum postulat medicinas minus aperitiuas, incisivas, & subti. solutiua educant materias grossas, difficilis euacuationis, & erad. unde Auerro. 7. collig. hi humores purgandi sunt post incisionem, & subtiliationem eorum. Viat. in hora accessionis in facta à phlegmate acetoso, quando rigor incipit, incita vomitum cum oximelle, & aqua calida decoct. anethi, & radicum raphani cum cassia in decocto politrivi, carth. sene & anisi dig. Recip. hyssopi, hæræ, mellissæ, capil. ven. ana Maa. j. radic. apij, petroselini, fœnic. endiuicæ buglossæ ana vnc. j. liquiritiæ, florum borag. bugloss. thimi. rad. cap. scolopend. ana vnc. ij. squinanti, menthæ ana vnc. iij. passul. sebestem ana vnc. j. fiat syrupus cum melle, & geleniabini. aromatizetur cum nardo, mace, cinnamomo, & gariofilis. sit medicina de turbith. Viat. in accessione pone pedes, & manus in decocto chamæ, & zuechi mellilo. & id generis, & dentur trochisci de rosis, berbe. & aniso mixtis cum

succo scariolæ, apij, & oximelle per vnam septimanam. oximel. & mellicratum ait const. in principio huius valde confert.

Facta à phlegmate mucillaginoso, & à vitreo, frictio multa valde convenit, sed locis, & temporibus idoneis post plures minorationes, cum vino albo subtili, vel maluatico, & aqua v. radic. vel seminum communium cali. Scrapio. ait si materia est, valde grossa, potius sit secaniabin: si valde, aqua mellis. Avicenn. si est valde frigida, piperis parum, & vinum subtile, sed parum.

Quotidiana continua fit ab eadem causa, à qua periodica, & hæc est aut pura, aut notha. vera fit à phlegmate naturali putrefacto intra venas, notha ab innaturali intra venas similiter putrefacto. notha fit à phlegmate dulci, à salso, ab aceroso, & à vitreo. continua iam altera est latica, alia non latica est occulta, tepens, & uniformis caloris, nec habet typum in principio excrementiarum. ait Ras. 18. con. phlegmatica continua non incipit cum frigore in paroxismo, nec terminatur cum sudore, nec in ea est vomitus. in interpolatis humor est vnus per totum corpus, & extenditur, in continua manet intra venas.

Signa febris phlegmaticæ continuæ non lacticæ, sunt quod in declinatione mitescit valde, in excrementia est quedam infriigidatio circa cutim, & extrema, & maxime circa pedes, nasum, & aures, aut quedam somnolentia, alices, & oscitationes. unde Iudeus simulcus fit somnus. & Gili. mouetur sine typo, & Guil. absque frigore. Iud. vrina vna die est subtilis, alia est grossa, ruffa cum multa residentia. calor est multus, corpus est irroratum, non aridum, multum spiritum. item obliuio, subeth, pulsus continuo inæqualis, & vrina turbida.

Lactica febris est valde similis hecticæ, propter vniuniformitatem caloris, diuturnitatem, & longam afflictionem, corporis extenuationem, & ariditatem inde sequentem, & etiam ad indigestionem. similis est hecticæ: quoniam corpus quotidie magis macrum, & aridum sit hæc Avicenn. sed ait Guil. à medicis sepe hecticæ habetur, sed differt: quia in hecticæ pulsus est subtilis, & strictus, & siccus, & durus, & in lactica lenis, & mollis pernus cum quadam latitudine. hecticæ quasi semper est vnus tenoris, licet post cibum parum inflammetur: lactica

emper magis in principio noctis incipit
nifestare . & circa mediam noctem ma-
gis inflammatur . in hectica urina est qua-
si semper vnus tenoris in substantia . & colo-
re . & est ferè similis vrinæ sanorum . sed olea-
gina in superficie . in lactica fit magis discol-
lorata . grossa . saltem in principio diuida . sed
in augmento . & statu fit ruffa . & spissa .
in hectica cutis est aspera . tenfa . & ari-
da . in lactica mollis absque asperitate ma-
nifesta .

Signa febris phlegmaticæ continuæ . pu-
ra . facta à phlegmate naturali putrefacto
sunt . ait Gilib. vrina ruffa . vel subruffa
per totum spissa . foeculenta . & quasi tur-
batur in superficie liuida . calor enim est con-
tinuus . sed in nocte minor & lentus à prin-
cipio facit modum paroxysmi in horis phleg-
matis sinerypo . cum capitis grauitate . & to-
rius corporis stupore . facies est tumida .
vel subpallida & sitis modica . aut nulla .
oris insipiditas . pulsus latus . mollis . tardus .
& inequalis . scilicet quandoque fortis .
quandoque debilis . & sicut garrulitas est si-
gnum cholerae . & taciturnitas melanco-
licæ . ita stupor phlegmatis . palpebrarum a-
dest oppressio . oculorum turbatio . color
subcineritius in facie . ventris inflatio . nau-
sea . & stomachi debilitas & reliqua signa di-
cta in signis periodicæ . & dixit Ras. 13.
con. continuæ febris phleg. quædam est adu-
rens . & inflammatio . est circa cor . plus
quàm in corpore toto . & id est è phlegmate
salfo .

Signa febris phlegmaticæ continuæ no-
thæ sunt omnino similia signis febris phleg-
maticæ periodicæ nothæ . distincta secun-
dum diuersas eius species . verum in phleg-
matica continua semper calor est additus su-
pra calorem periodicæ sibi proportionalis
in materia . Ras. supra . non cognoscitur ad
quem finem debeat peruenire febris phleg-
matica . & quandoque est paucè quantita-
tis . & in qualitate caloris est periculosa . quia
est lactica .

Curatio febris quotidianæ continuæ est si-
cut cura ait Ras. in diuisi. periodicæ . dixit Gi-
lib. in principio vratur dicta confortante na-
turam . antequàm virtus debilitetur . & bibat
vinum album limphatum . & debile . & si ca-
put est debile . loco vini bibat aquam decoct.
granorum granatorum . vel sebesten . & mel-
lis . in aqua cicerum rubeorum . folia siclae .
cibaria ex folijs feniculi . petro . spinac . car-
nes hedi pulloiani . gallinarum iuuenum cū
lactucis . spinachijs . & huius . conditas . cum
succo agrestis . granatorum . & cum cardam .
Rog. si in 7. debilitatur . da colaturam galli-

na . si in 14. & vrina parum digesta . vinum
mellinum limphatum . in continua cibi sunt
facilis digestionis . subtiliores . minoris quan-
tatis . & pauca repletionis . quam in perio-
dica . Phlebotomia magis in continua com-
petit . quàm in periodica stantibus conditio-
nibus . dixit Gilib. in facta à phlegmate dulci .
& in naturali . quæ non sit lactica . fiat phlebo-
& Fer. incisio sit lata . vt sanguis crassus exeat .
& si status quis sit in venis possit exhalare .
deinde ait Auicem. sit contentus eis . quæ
sunt sicut syrup . acerosus . gelenabin . iulep .
de melle . & aqua mellis . & aqua feniculi .
apij . petros . Guil. dat oximel . aut mel rota-
tum cum aqua radicum . deinde ait Ras. in
diuisi. quando corpus fuerit debile . & febris
tarda tepida . da in potu fortiora in prouoca-
do phlegma . & euacua . cum eis . vt trochis. de
eupatorio . & pil. in quibus est pulpa collo-
qui . & aqua seminum . & radicum diuretica-
rum . & aqua mellis . diaciminum . & diarrien-
pipereon conueniunt . idem ait . sæpe confort-
ta stomachum cum zuccaro rosato . trochis-
cis de rosis & huius .

Febris melancolica.

Febris melancolica . dixit Gordo . facta est
ab humore melancolico naturali . vel innat-
urali putrefacto . & quamquam Alexand.
sentit melancoliam non putrescere . hoc est
ad comparationem aliorum humorum . re-
sistit enim putrefactioni cum substantia ter-
restri . & frigiditate . & siccitate comple-
xionis . hæc dicitur febris quartana . tamen
quidam asseuerant posse fieri phlegmate a-
ceroso . vitreo . & salso absque ipsorum adu-
sione . vel conuersione in melancoliam
sed Fer. ait quod frequentius fit ex salso . &
non debet reponi in numero melancolica-
rum . sed quia mouetur de quarto . in quar-
tum ob conditiones conuenientes cum me-
lancolia . Verum ait Auicem. febris quartanæ
causa est ea . quæ significat melancoliam .
& quæ postea putrescit . sed melancolia alia
est sex sanguinis & dicitur naturalis . alia est
eius adustio . & cinis aliorum humorum .
& dicitur innaturalis . hæc Auicem. vera .
& certa est facta ex naturali . & notha
ex innaturali . quæ est duplex . aut enim
est innaturalis per admissionem alterius hu-
moris cum melancolia non vnita . sed me-
lancolia est tanta . quæ secum trahat ip-
sum . aut per conuersionem alterius hu-
moris . vel ipsius melancoliæ naturalis
in non naturalem . & sic aut sanguine
idest

id est propterea quod sanguis in eam conuer-
sus sit, aut cholerica, aut phlegmatica, aut
melancolica: quia melancolia naturalis
adulta conuersa fit in innaturalem, sed Raf.
18. con. aucto. Simeo. inquit quod non fit
nisi ex aduisione trium humorum, & quod
melancolia naturalis non potest putrefieri,
postquam est vsta, & sicut sunt plures spe-
cies phlegmatis, & cholere, sic plures sunt
generata species melancolie per aduisionem,
ait Gilib. adustum ex sanguine est sal-
sum cum pauca dulcedine, & ad ponticum
trahit adustum phlegmatis subtilis trahit ad
dulcedinem grossi ad acerositatem, & pon-
ticitatem adustum cholera trahit ad amari-
tudinem, adustum melancolie naturalis
subtilius est acre, sicut acetum, & ebullit su-
per terram, fugiunt muscæ ob horribilita-
tem saporis, & odoris eius: spissius est ma-
ioris malitiae, & acridinis, & nimis bullit.
ait Serap. plurimum humoris facientis quar-
tanam est ex aduisione humorum aliorum.
vnde plurimum est notha, & adustum non
intelligitur id quod est incineratum adeo
quod in eo non remanserit humiditas, quæ
facit pabulum febris: sed fit hum. ingrossa-
tum per consumptionem partium subtilium
in quo remanserit humidum, ratione cuius
potest humor adustus ebullire, & pu-
trefieri.

Febrium ait Auerro. septimo collig. quæ
ex humoribus melancolicis fiunt, quedam
super in secunda digestionem, quedam in ter-
tia, adiuvat generationem horum opilatio
pororum, grossities humorum, & difficultas
digestionis quarta tamæra, quam non ve-
ra diuiditur in interpolatam, & in conti-
nuam, quæ ait Galen. de different. & Auic-
cen. fit raro, interpolata plurimum, nam
ait Gera. raro reperitur talis humor in era ua-
sa ob dissimilitudinem suam ad naturam, &
si quid inest, non recipit putref. & a natura
expellitur extra uenas. Raf. 18. con. auct. Gal.
ait febris facta ex melancolia, quæ spargitur
per totum corpus, est quartana pura, inter-
polata, si melancolia est occulta intra uenas
est quartana continua, & quarta vera secun-
dum plurimum fit incipiendo: notha sequi-
tur alias egritudines, & maxime febres: quia
generatur ex reliquijs febrium præceden-
tium, præsertim tertiarum, vt ait Hippo-
crates. 3. progn. euenit, ait Auic. in suc-
cessionem febrium putridarum ob diversita-
tem humorum, ex quibus generantur, & eo-
rum putrefactionem: nam cum adusuntur,
& non euacuantur, multiplicatur melancolia
scilicet innaturalis, deinde cum putrefit,
fit quartana. Raf. 18. con. quæ accidit post

tertianam, est ex aduisione cholere. & quæ
post quotidianam, phlegmatis. & sic in
alijs, dicunt quidam, quæ fit ex melanco-
lia naturali, uel ex naturali vsta, accidit ma-
xime in senectute: quæ ex melancolia, per
aduisionem aliorum humorum, in iuuen-
tute, & maxime in fine eius, quando maior
fit adustio, & notha frequentius accidit:
quia frequentius accidit incinerari humo-
res, & melancoliam adustam multiplicare,
quam naturalem.

Quartana soepe liberat ab epilepsia, mel-
ancolia, & alijs morbis: & est, ait Auic. en.
vt plurimum salua ob longam quietam, sed
salua magis est, quæ non fit ab apostemate
splenis, aut cum ea non est apostema sple-
nis, nec durities, nec opilatio, nec cum apo-
stema hepatis, quoniam vt plurimum per-
ducit ad hydropisim. continua est deterior
interpollata, & deterior est, quia fit ex adu-
sione melancolie naturalis: deinde quæ cho-
lere, deinde quæ phlegmatis, deinde quæ
sanguis, quia ait Auic. cito recipit curatio-
nem, & ea, quæ fit ex aduisione cholere na-
turalis, uel phlegmatis naturalis, dixit Zoar,
difficile curatur, nisi in estate, nam ait Galen.
in commen. 2. progn. hyems adiuvat incli-
nationem humorum ad intra corpus, in val-
de senibus, ait Gilib. non curatur ob virtu-
tis debilitatem: nam ait Hippo. in aphorif.
morbi chronici in valde senibus afferunt
mortem, finitur enim simul morbus, &
vita. & ait Auic. febris melancolica lon-
ga perducit ad hydropem, inquit Guil. quar-
tana, quæ non sequitur aliam febrem, siue
morbum, breuior est, & melius curatur, esti-
ua quartana est breuior, quia melancolia est
minor, subtilioris substantiæ, & calidioris
complexionis. & ait Auic. in quartana
quando non accidit error, non addit supra
annum, quia, inquit Gera. insequitur mo-
tum solis, & quandoque ait Auic. perdu-
rat 12. annos, quia committantur maximi
errores, & const. his melancolia est in fine
grossities ob opilatio.

Quartanæ periodicæ puræ primum est si-
gnum ait Galen. secundo de crisi, qui rigor
fortis non incipit primo die, sed in dies au-
getur, & Alman. incipit cum tremore adeo
vehementi, vt dentes constringere cogat,
& concutere, iuncturæ, atque ossa dolent, ac
si super ea aliquid appensum esset, quod ea
gravaret, & concuteret, quare frigus pro-
fundatur in ossa, & ait Aui. est cum aliquo do-
lore, ac si frangerentur ossa, quoniam ait Viat.
melancolia ob suam grossitatem, & frigidita-
tem super membra sensibilia effluens grauat
fatigat, & frangit ea, & Isaac non frangit

ossa, sed materia sicca, & terrestres ad intra profundatur, & grauat, vnde æger sibi videtur ossa frangi, & remanet ibi diu, quia est terrestres, & grossa, & quidam dicunt, quod est vapor grossus siccus petens musculos profundos, & panniculos tegentes ossa, & causat in eis multam sensationem, ob quam contrahuntur, & æger iudicatur, idem est in ossibus. itaque subdit Auicen. strident dentes: quia læsio fit in musculis mandibularum, & & quandoque tantus est tremor vt lectum tremat. & causa huius tremoris est fortis motus expulsus irritatus à forti frigore, acridine, & acerositate huius humoris. quando autem materia prope digesta est, & frigus, & acredo minuitur, & ponticitas, & crassities, contractio ossium, & stridor dentium remittitur, quæ duo sunt propria signa febrium melancolicarum. ad tremorem totius corporis quandoque sequitur tremor dentium, vt in febre cholericæ, & phlegmaticæ. sed in quartana sequitur ad contractionem mandibularum, & dentium, & contractio fit à contractione mandibularum & relaxatione. rigor fortis est bonum dummodo non fit in principio vniuersali morbi: quoniam tunc ait Ras. significat multitudinem humoris, est bonum signum, quod humor est digestus: quoniam quando est indigestus, parum exit ad musculos, & paruas partes attingit. & quando fit postea lenis, significat quod materia est diminuta, & tunc cognoscit perfecte statum, & declinationem, ait Gilib. in principio accessionis fit prius oscitatio, postea inualefcit, & stridor fit dentium ob nervorum constrictionem, & dolor in profundo membrorum, ac si ossa frangerentur. deinde fit frigus, & tremor ait Ras. 18. con. tarde calefit.

Secundum est lentus calor, vt ait Galen. secundo de differen. ob frigiditatem, & grossiciem humoris. tamen inquit Isaac. disturbat corpus ob materiam laborem facientem. aliquando tamen natura materię dominatur, & æger quiescit: aliquando contra: & tunc affligitur. calor tamen inquit Auicen. cum sit siccus, est maior, quàm febris quotidianæ & magis apparens, & is calor est velut ignis in lignis crassis, & terrestribus, qui non cito inflammatur, nec subito totum corpus amplectitur, aut non intense, imo calor est intra, & horripilatio extra. verum quando totum occupat, est intensa, ait Alman. 18. com.

Tertium ait Serap. paroxif. est 24. horarum, quando est pura. quando mixta est cholerae citrinæ, minuitur, sic Auicen. verum Guil. paroxif. mouetur, vt plurimum hora

octaua diei: quoniam propinquus est motus melancoliæ, quæ quoniam ratione grossici est difficile resoluibilis: durat paroxif. plus alijs.

Quartum ait Gal. suprâ, est sudor in declinatione: quia materia non sic inuiscatur, vt phlegmatica. vnde magis in calore subtiliatur. & Auicen: est multus respectu quotidianæ, sed minus, quàm in alijs. imo ait Ras. 18. con. non est multus: minima enim pars sudoris transit ad musculos.

Quintum ait Gale. primo ad Glauco: pulsus est maior, segnior, & inæqualis, & 2. de crisi, vix sentitur in principio paroxi, & primo ad Glanc. & si post quietem febris, pulsus perseverat tardior, & rarior naturali, febris est quartana, in statu magnus, & plenus ob fortitudinem motus materię naturæ repugnantis.

Sextum ait Gal. 2. de crisi. vrina est subtilis, alba, & aquosa, & hoc in principio ait Serap. sed in declinatione est plurimum nigra ob mundificationem humoris melancolici. est subtilis, ait Isaac, ob siccitatem materię, & grossiciem, quæ opilat vias. sunt vrinæ, inquit Paulus, multarum mutationum: propterea quod species melancoliæ sunt multæ.

Septimum accidentia sunt minora, quàm in tertiana, vnde ad Glaucon: est maior sitis, & Almanfo. minor dolor capitis, & id generis. tamen ait Fer. in augmento, & statu crescunt & præsertim si sit cholera humor melancolicus. Guil. & acerositas in ore: si materia est in stomacho, ait Plat. & accidit cum scotomia, appetitus est fortis, nisi opilata fuerit via splenis ad stomachum, aut splen debilis, grauitas adest totius corporis præcipue crurium, coxarum pigritia, indigestio, laterum infansio, dolor lumborum, & plurimum fit cum vigilijs, inquietudine & timore in somnis, & aliquando post expulsionem caloris, adest frequentia mingenda.

Octauum ait Serapio. corpus per 48. horas remanet mundum, & materia est quasi cinis, & Galen. 2. de differen. nihil remanet fumosi, nec semicombusti, vt in phlegmatica.

Nonum ait Galen. primo ad Glaucon. splen maior, & crassior fit. & Viat. est proprium huius febris, & Auicen. & vt plurimum dolet, & crescit, si, ait Gilib. diu perseverauerit.

Decimum ait Serap. exiccatur valde sterus, quod tendit ad nigrum. Vndecimum inquit Serapio. cutis arefcit, & siccat. Viat. id ob melancoliæ siccitatem.

Quod narrat Serap. color faciei fit viridis, & plumbeus, & vitis nigra in processu, & sulphureus inquit Isaac & Gilb. tunc facies, & pedes, & quandoque hydrops. sed in principio parox. vngues, manus, pedes, & labia fiunt liuida.

Decimum tertium debilitat, ait Auic. visum ob vapores grossos turbidos, petentes nervos visuos, & spiritum offuscantes.

Quartum decimum Zoar. in processu sufficit cum difficultate ob exiccationem partium thoracis, & pectoris.

Decimum quintum antecedit febres indigeste, & male curatz, aut splenis tumor, apostema, complexio melancholica, ætas, negotia, autumnus, & hæc Gal. & Alm.

Rabi ex auctoritate Gal. 2. de crisi ait. signa quartanæ sunt quatuor. primum est subleuatio omnium signorum tertianæ puræ, immo contrarium. sec. ratio per se accedit, sed sequitur alius. ter. pulsus in principio paroxif. est veluti senis. quar. inchoat cum rigore debili, quæ post in qualibet accessione augetur, & in ipso rigore sentitur tantum frigus, quod ossa videantur frangi. Fer. ait digestio materiæ in quarta cognoscitur si sit vrina coloratior, & minus tenuis, vel etiam spissa cum veri frigoris mutatione, cum paroxismo intese prolixo, & anticipante, atque aliorum symptomatum augmento, quæ fiunt per calorem.

De signis quartanæ nothæ.

Ait Gal. 1. ad Glau. signum nothæ est, quod accessiones variantur secundam diuersitatem humorum.

Signa specierum nothæ phlegmaticæ sunt nouæ. primū est, quod antecessit febris phlegmatica longa, in qua phlegma adustum est. sec. Auic. parox. longiores ob viscositatem phlegmatis, & frigus intensius, vel plus durans, & it. reditque ter. ait Auic. sudor est tardior, & minor. quar. Auic. en. vrina est grossior. quin. pulsus est minus durus. sex. accidentia, ut sitis sunt remissiora. sep. si complexio sit phlegmatica, ætas, regio, tempus anni, & id generis.

Signa nothæ à phlegmate falso, sunt ait Plat. oris fædus, pruritus in toto corpore, calor intensior, & frigus minus, quam in aliis phlegmaticis adustis. & dixit raro solent fieri quartanæ ex adustione humorum, sine calefactione hepatis.

Signa nothæ à melancholia factæ ex sanguine adusto sunt quatuor. s. antecessio febrium sang. vrina rubra, & obscura ob adustionem, pulsus plenior, & maior, & fortior, quam in aliis quartanis, quar. complexio, ætas, tempus frig.

Signa sanguineæ factæ per admixtionem sanguinis cum cholera sunt vrina in principio ruffa, spissa & liuida in superficie, frigus parum, vel nullum, calor magnus, inflatio sinistra hypocondrii, cum grauitate, & dolore maxime post cibum, splenis durities, grauitas capitis, & præsertim sinistrae partis. inchoat in horis sanguinis vel melancholicæ.

Signa nothæ ex adustione cholerae sunt, inquit Auic. pulsus uelocior, & frequentior, quàm in aliis quartanis: quia eius calor est intensior. sec. incipit cum horripilatione, & frigore in carne: quia sentitur magis uersus cutem, quam uersus profundum. ter. est cum sudore: quia materia est subtilior. quar. est cum siti, uigiliis, & aliis accidentibus comitantibus calorem. unde uidentur ob inflammationem cordis, & cerebri maniaci aliqui & iracundi. quin. vrina est ruffa, ignea, subtilior. sex. antecedit morbos cholicos. sep. complexio, ætas, anni tempus, &c. Auic. signa nothæ ex adustione melancholicæ naturalis ratio memorata fuit à medicis, quia forte perraro accidit: non enim putrefit, nisi valde raro melancholia naturalis, nisi ob eius siccitatem intensam.

Curatio febris quartanæ puræ.

Omnis febris melancholica est difficilis curationis, licet sit salubris: quia propter compactionem, duriem, & siccitatem suæ materiæ difficulter digeritur. curatio tamen variatur secundum variam materiam, & secundum tempora uniuersalia, uel particularia: secundum materiam ut si febris quartanæ facta sit ex adustione sang. uel cholerae &c. circa dietam caue frigus, morus fortes exiccantes, uigilias, cibos metiam generantes facietes nauseatius: quoniam turbant egrum, & mouebuntur humores uelociter. dixit Haly. non comedant in die accessionis, non moretur diu ad ignem. ait Ras. aggredere egrum cum ense euaginato, uel cum alio terrefactione in hora parox. quoniam repentinus terror frequenter sanauit eas. delitiis utatur, ait Auic. en. quiete, & somno præter solitum. Haly. deambulatio lenis, & frictio confert. balneum, ait Auic. in aqua dulci tepida confert: quia humectat, & excitat humores, sed non sudor. sed Haly. uult in statu s. quoniam materia est digesta. & Serap. quando est pauca. & Almanf. post 40. dies. i. post 40. parox. dixit Ger. super 9. Alm. cap. de melancolia. quidam bonus homo balneabat quotidie quartanarium bis, ut materia mollicata plus expelletur in parox. & sic infra mensem liberabat.

Cibus quartanarii ait Auic. non sit crudus

imo resoluens cruditatem, uel flatum : non grossus, imo subtilis : nō constrictus, imo soluens uērem. sit generatiuus boni sanguinis & hi sint calidi, & humidi, ut oua forbilis, & caro bouina, & quando adest status, ciba cū capparibus, sinapi, almuri, & huius Auic. & Isaac. non des cibos vntuosos. s. de carnibus vsque ad tres septimanas. deinde ciba cū pullis paruis, & post 40. dies cū aliis carnibus, & sit Ras. 18. con. in die accessionis. ait Guil. concede succum hordei, ius cicerū rubeorum ius gallinarum uel caponum cū mica panis, uinum album bene limphatū. & pone super cibos cardamomum puluerizatum, quia sudare facit, materiam digerit, & naturalem conseruat humiditatem. uinum ante 40. dies sit citrinum, odoriferum, limphatum, si nulla fuerit opilatio in hepate, aut splene. si uero fuerit, ea non limphatum in diebus quietis. post quadraginta dies concedit uinum uetus parum limphatū Gordo. in die accessionis ciba p tres horas, & in declinatione cōplera condiantur fercula cum speciebus, quę R. cinnamo. cardamo. masti. ana vnc. 5. galange, nucis mus. macis, gariof. ana vnc. 1. croci vnc. s. dixit quidam gallina repleatur petroselino, uitello oui cum albumine, sanguine porci maris ana ad pondus vnc. vi. bene mixtis coque in pastillo, in furno, & comede, quoniam roborat uirantem, & appetitum excitat, & febrem expellit.

Quò ad pharmaca quatuor serua intentiones. s. digerendi, euacuandi materiam, alterandi calorem febrilem, & roborandi membra principalia, accidentia cum parua, aut nulla sint, non indigent correctione. uerum ait Isaac. in quartana quatuor respice. primum ne des medicinam ualde calidam, ne materia calefiat, & duę generentur febres, altera continua, altera interpollata. sec. nec des frigida ne materia incruetur. tertio diætā non sit admodum subtilis. ne cadat in hecticam, uel phthisim. quartū non confundas corpus cum pharmacis, & praesertim in principio quia materia eliquatur, & sit obediens naturę, & digestio materiae cognoscitur per mitigationem, & abbreviationem. inquit Gord. parox. non per paucos cibos assumptos, unde urina coloratior uideatur. ait Galen. ad Glauconem. primo moderate ducēs in quartana & rege, splenem.

Ad digestionem ait Haly. da quotidie geleniabin cum squing. s. cum aqua cocta, uel borag. uel buglosa. Viar. digere materiam cū diueris debilibus, ut succo scabiosa, & apii, fœnic. decoctis, & collatis cum oximelle arom. & melle ros. & Auic. in die paroxismi

da geleniabin cum syrupo acetoso in aqua calida. & ualet in die, & hora paroxismi bis, uel tertio loco aquę hordei, in estate bibat a quam hordeaceam, ut aperiat. opilationes, & secaniabin sit ex zuczcharo in hyeme ex melle & id ait Auic. sit ante parox. per tres aut quatuor horas aut da syrupū qui R. florum borag. bugl. stica. ana vncs. passul. liqui. ana vnc. 7. anisi, fumos. ana vnc. iiii. hordei mundi vnc. i. cuscuta vnc. s. fiat decoctio, & cum melle ros. colato fiat sy. parum acetosus. ordo est igitur, ut primum detur syrup. acetosus deinde fiat leuis mino. deinde syrup. uiol. deinde mino. postea ueni ad fortiora, ac spleni idonea, ueluti R. scolop. capis, uen. lupul. thimi. timbra ana m. i. cor. rad. apii fen. petros. ana vnc. i. radic. buglos. boraginis ana vnc. s. melissa, sticados, mentha, cuscuta, foliorum, uel fructuum tamari. ana m. s. semip. portul. passul. liqui. ana vnc. s. coque, & fiat syrup. in estate cum syrupo acetoso simp. in hyeme cum oximel. & is conuenit in principio augumenti ac postea iterum minoretur, in fine augumenti da syrupū qui R. rad. apii, fœn. petros. asparagi, brulci, cori. rad. capenula ana vnc. i. cor. medicę tamari. frax. giae strz ana vnc. s. scolop. thimi, timbra, hyssopi calamenti, chamed. chamepit. rad. acori, cuscuta ana m. i. sebesten, liquirit. passul. ana vnc. i. sem. endiuie, portul. ana vnc. ii. fiat syrup. cum oximelle composito, & syrupo de bisant. postea minoretur, & iterum digere, ac minora. circa statum si necesse fuerit. detur idem syrupus, additis epithi. fen. polisp. & aromatiza cum cinamomo, cardamomo, noce muscata, postea da trochis. quia in principio febrium melancholicarum, inquit Isaac. & Ras. 18. cor. non competunt quia ingrossant materiam & Auic. non des in hyeme quartario medi. dige. in forma trochis. sed liquidam quia plures sunt euacuationes, & uis stricte, per quas medicina sicca nō penetrat imo deliccat, & indurat. dat tamen Auic. in fine augumēti & statu trochis. de absynthio, & Gal. 1. ad Glauc. diatriop piper. diaspoliton, uel piper cum aqua. & Scrap. pisces salitos & sinapi ad usum med. non cibi ut subtilient. & sic hoc tempore utere confectionibus calidis, ut theriaca, ut euacuet humores per urinam, uel sudorem. & si non euacuet sed tantum moueret, curreret humor, & misceretur cū aliis bonis, & si staret in uno loco augeret febrem, si in duobus, faceret duas febres melancholicas. dat Gal. there. per duas horas ante accessionem, ut narrat in lib. de Ther. ad Cæsare. Haly dat præter hæc mercuriarum, uerum digesta materia Alm. dat post 40. dies in hyeme Auic. diasulphur, diassa, &

synapi in omnibus tribus diebus Ras. 18. co. da calida semel in septimana ad subtiliandū, & alleuiandū humorem, & Galen. primo. ad Glauc. feceris duplicem quartanam, si dederis ante statum ther. lenitio, ait Ras. in diuis. sit assidua, & da semper aquam sicclæ, & siens infusus in aqua mellis, ius galli ueteris decocti in aqua, & sale, in qua projiciatur parum polipodii, & sorbeat ante cibum. & Gal. ad Glauc. si cibi non emollierint, clysteribus primum utere mollibus, deinde acutioribus. idem affirmat Serap. Haly. & Auic. lenitium bonum R. florum boraginis, buglossæ, uiolearum, sticados, & folia senæ q. s. coque & misce cassiæ q. l. & si materia rapit ad os stomachi, yome. si in uis urinæ, da sco. lopen. & endi. si sudar in declina. da uinum album subtile cum aqua hordei calida.

De Pleb. ait Gal. ad Glauc. non phleb. nisi nimia sanguinis sit copia, quæ sit causa propria febris. & si sanguis niger, & spissus, extrahet: si rubeus, & tenuis, obstrue uena. sit brachii sinistri, quæ mediana est, & Auic. si dominiū est sang. & febris erit ab adusto sang. aut à mixtione melancholiæ cum eo, extrahet. & Ras. 18. con. phleb. fiant una uice post aliam, cum patiens est iuuenis, & corpus repletum iam. n. eradicat uel febrem duplicatā, & Auic. in melancholia, melancholica pura digesta materia, & minorata, & signa sanguinis remanent, & alia concurrunt cōfert phlebotomia ē basilica, idem si in fine quartanæ menstrua, uel hemorrhoides, uel alia sanguinis euacuatio sit occulta, & si signa sanguinis apparent, fac phlebotomiā quæ sit parua, facta de saluatella sinistre, aut ambohus, aut de saphenis Guil. salua. incipiebat in principio, & multi alii sanguis narium ait Auic. si sopitus est fluere hæmor. aut in loco saphenarum, & scarificatio in dictis locis.

De euacuatione ait Auic. in omnibus speciebus februm talium in prin. necessaria est minoratio: ut super residuo melius, ac facilius procedat digestio, ac tandem euacuatio minor R. decoct. florum sticados, borag. buglossæ capillæ. pāssul. anisi, polip. in qua misce vnc. xi. cassiæ, diacath. vnc. 2. & da, redi ad digestionem, ac postea ad minorationem fortius, ut si addas vnc. i. vel vnc. ii. diacath. vel vnc. i. lap. laz. loti, vel reubarb. vnc. i. Haly non minuas in principio morbi cum laxatio, quandiu crudus est humor, sed cum signa digestionis apparent, nō semel, sed multoties euacuabis. ait Gal. ad Glau. cum phar. maco melangogo, si opus fuerit item Guil. nisi materia sit digesta, non dederis pharm. quia subtilem euacuat, & remanet grossam. Ras. 18. con. non moucas in principio cum

medicina forti, nec euacues cum med. forti: sed in principio euacua materiam cum polipodio extracta uirtute eius in iure galli ueteris, & oleo amygd. dulcium.

Vomitum expellit materias communes, & proprias, unde prouoca, si expedit obseruatibus obseruandis, & si non pores pharmaca sint fortiora uomitus prouocatur in die paroxif. & in die interp. si humor ad os stomachi irruat. primum igitur prouoca cum syrupo acetoso, & multa aqua calida: si non poterit, sumat sicclam, synapin, salsa, & huius. deinde uinum cum multa aqua, deinde syrupum acetosum, in quo infusus fuerit raphanus. si uomerit, debilitabitur rigor, & febris, & hoc in principio paroxifmi, ynde ait Auic. in princ. parox. educ. materias communes, in stomacho repertas, post prin. potius proprias. quæ sunt sparæ ad stomachum, uel primas uenas, & hepar. ait Haly. in die accessionis humor est tumultuosus, & calor illum calefacit, unde facile euacuatur. si autē post cibum, sumat quinque horis cibum ante paroxifmum & cum incipit æger oscitare, da uomitū prouocantia. sit ait Auic. leue, si euacues materias communes, si multas, & proprias, forte. & Gal. ad Glau. statu utere uomitu, à cibis sepe, & da helleborum album cum raphano.

Medic. eradic. sit digesta materia, & ait Alman. non semel, sed pluries, & cum fortibus & pharmacis. dies uero sit ante accessionem, sic uult Alm. Aui. & Haly. quia uirtus est magis fortificata à parox. præterito, humor subtilior, & magis nobilis, cum iam inceperit cumulari pro sequenti paroxifmo. Med. autē quæ purgant humorem, & trahunt substantiam eius manifeste, habent gradus. in principio sunt myrab. indi, & chebuli. sed acue ob stipticitatem. deinde polip. postea epith. quæ cum tardē agant, addunt duo chirat scamoneæ, & scr. i. maio. uel loco scamoneæ turbit, deinde lapis laz. caue ab helleboro, nisi optime corrigatur. hæc ex Auic. & Alm. dat sepe per leni. serum cum zucchero & si infundas sollic. sene erit mino. leue & dar apo. zima de epi. & myrab. ind. interdum si fortis est calor, ait Ras. in diuis. euacua cum syrupo acetoso, epith. & sena & cum decoct. mirab. nigrorum, & infusione eorum. & si fortior, cum aqua casei sola, & Haly. post digestionem semel in sept. dar med. quod R. myrab. indorum, chebul. ana vnc. viii. epith. ana vnc. iij. zuccha. ad pondus omnium rere, & bibe cum aqua calida dosin euenientem. Ras. 18. con. purga omni quinto die cum his pil. quæ R. epith. vnc. i. carui, anisi ana vnc. vii. seminis apii, feniculi ana vnc. 3. polypo. vnc. vi.

Nicolai Nicoli liber

vnc. vi. menthæ vnc. i. s. in principio noctis, Gord. R. florū boragi. uiol. ana vnc. i. senæ, thimi. epith. ana vnc. s. myrab. citri, vnc. s. coque in lib. i. aquæ usque ad medietatem, cola, & iterum bulliat colatura, donec remaneat vnc. iiii. in qua pone reubar. vnc. s. & parum bulliat, & cola, & adde esulæ vn. i. Guii. post aliquas accessiones, & mundificationes dar med. quod R. helleb. nigri vnc. s. tere per secte & misce cum vnc. iiii. rob de uino per nocte, & cola in colatura pone tria, uel quatuor grana diag. non ultime trituri, & scr. i. reub. puluerizati & da ante diem per duas, aut tres horas: quia curat quartanam: tamen die sequenti da vnc. s. ther. cum uino puro calido, in aurora.

Vrinam non prouoces ait Auic. in principio cum diuretico forti, sed potes cum debili ad excludendas per urinam materias communes liquidas, si quæ continentur in uis hepatis.

Sudorem moue ait Ras. in diuisi. quando febris antiquatur, & alleuiatur horripilatio cum diatrion pipereon, & cum duobus uasis ante, & retro plenis aqua bullita cū chamæ. sicca & anetho. sudorifica in augmento sint leuia ad euaporandas materias cōes sparsas uersus cutim. & Auic. in principio digestionis usque ad aduentum digestionis completæ per extra non euacues per urinam, uel sudorem. in statu resolue cum fortibus uelut cū troch. quos dicūt quandoque liberare in vna uice. qui R. foliorū ruthe vnc. i. croci vn. iiii. iusquiami albi vnc. i. cassiæ lignæ vnc. ii. sulphuris citrini vnc. iiii. cū aqua fac trochi. vn. i. & da cum mulla uel aceto ante accessionem. idem efficit uinum decoct. serpilli bibi tum calidum ante accessionē & pil. quæ R. peoniæ, gentianæ, castorei, chamedreos, senæ, cap. lact. ana scr. i. da vnc. s. ante accessionē, & theriaca sumpta cum medio ciatho suc ci menthæ, & medio uini albi optimi ante accessionem curat quartanam: tribus uicibus, & crocus, & rasura eboris cum uino bibatur. item Radix cetauræ minoris. item & vnc. i. gentianæ cū uino optimo ante accessionē per quatuor horas. ite uinū decoctionis eius. ite vnc. s. rad. assari cum uino calido sumpta. dixit Auic. in prin. uniuersali. quidā audent dare forte laxatiuū, & exhibent vnc. ii. succi rad. ebulli, uel pluf. & quidam ante paroxysmum per horam curant febrem. sed hic modus curationis non est bonus. imo est error. Ergo Nicolus post primā materiæ minorationem quartanario exhibui uinum decoctionis menthæ cum vnc. ii. theriacæ mixtæ, & vnc. iiii. aquæ uitis. & liberatus est ante octauam accessionem, aliis quoque dedi per

unam horam, uel circā captis à quartana pirra, acēt phleg. post tres uel quatuor bonas minorationes, & liberati sunt item aqua uitis cum gariof. puluerizatis, dixit Gilib. uimor detur ante accessionem myrrha gum. lii hederæ cum succo uel uino decoctionis chamed. aut cū succo ruthe, uel semine ciusi prouocat. n. ap. & destruit melancholiā. Gord. succus calamenti ante accessionē curat quartanam.

Non alteres calorem febrilem, ait Ras. r8. con. nisi materia sit diminuta: quia non est possibile, cū materia est multa. Alm. tñ uult post 40. dies posse alterari; Auic. inquit, & omnes hæ febres indigēt humedatione, sed quādā plus, & quādā minus, quanquam & omnes indigent exsiccatiuis ad incidendā & dissoluendā materiā. Consortia membra, ait Mes. in oībus morbis melācholicis, ueluti cor, hepar, splen, & stōmachū. hepar est cā inflammationis, & adustionis. splen recipit fō ex eius, quod adurit Ras. r8. con. caue ne hepar, & splē apostemeretur. & Haly, ne hepar generet humorē melācholicū. cordi cōpetit in hac febre diamuscū dulce, cōsec. de gemmis, diamarg. & id gene. hepatis, & spleni ait Serap. gelen. in principio.

Ad frigus Auic. quia constringit ossa, dat allia, & mel, & syru. acetos. ē melle implet ci bo nō ad plenū: deinde dat aquā calidā, ut uoma. dixit quidā, unge ante accessionē totā spinā cū oleo de iunipero: qm liberat à quartana, aut cū theriaca misce gariof. & nardū, & in ciatho, cum uino bono, uel oleo super prunas bulliat modicum, & inunge totam spinam ad magnum ignem ante accessionē. quidam coquunt polypodiū, hyp. & epith. ana vnc. iiii. in una quarta uini usque ad consumptionem quintæ partis & quoridie bibant ciathum cali, uel frig. item decoctio feminis scēn. & senē in uino si bibatur quoridie longo usu curat: item nectar, quod R. epith. recentis, follic. senē, florū borag. ana m. s. zinzib. anisi ana vnc. i. fiat nectar cum uino subtili, albo, & adde si placet mel, uel zuccharum.

A proprietate curat quartanam ait Dios. succus plantaginis minoris cum mulla bibitus per duas horas ante accessionem. idē Auic. de radic. plantag. cum uino sumptis; Pli. & Serap. iubent eas esse quatuor. cum uino, & aqua ana vnc. iiii. s. const. qui colligit folia, dicat, pater noster, & coque ea cū quatuor ciathis uini, & aque usque ad tertiam comedat folia, & bibat uinum calidum Pli. quar. folia pentaph. Alber. dat cum uino temperato, & pipere. Serap. ligat uermes in carnibus repertos in corio caprino, alii radicē carbonis

carbonis adligant, collo, vel brachio. o-
culum coturnicis appendit collo. Fidelis dat
succum rassis barb. ante accessionem. alii dant
vnc.ii. hyp. cum vnc.v. vini albi subtilis ante
access. nec bibat ante, vel post paroxysmum
Gui. de Aretio. gallus collo suspensus curat.
18. con. semel hyp. bibitū cum uino. ait Alb.
Fid. millefo. bibitum, inquit quidam detur
ante accessionem ciathus aqua, in qua extin-
ctus fuerit lapis marmoris. qdā, q̄s nouū nō
elaboratum fiat amulus, & nouē diebus igni
accēsus extingatur in succo celidoniae dela-
tus in digito auriculati sinistrae manus curat
quartanam. Fid. sterco hirundi. potum sta-
tim curat. Mundin. affirmat plures curatos
esse coquendo m. i. parietariae, uini albi subti-
lis ad medietatem. comedant & postea herbā
in modum tortelli confectam, & sublare co-
ctam, & uinum bibant totum. id faciant per
tres uel quatuor accessiones, & curantur. Ex
pe. cuiusdam R. membranae, quae sunt intus
in nucibus diuidentia nucleum, coque in ui-
no, & bibe ciathum unum ante accessionem
tribus uicibus. item succi eup. vnc.ii. cū mo-
dico uini bibe per duas, uel tres horas ante.
& quidam, bibe vnc.i. cranei hominis, & cu-
rabis quartanam sanguineam. itē coque qua-
tuor folia, & quatuor radices berbenae in ui-
no, & bibe in quartana. phlegmatica, ait Ma-
cer. Dioscorides inquit da septem cimices
inclusos in toridem fabis, suffumiga agrum
cum stercore gatri. Fidelis suffumige ante accessio-
nem cum oleo, in quo decocta sit rana uiri-
dis. item sterco hominis bibitum. itē oleum
comune, in quo scorpio putrefactus sit, in un-
ctu in plantis pedū, manū, frontem, & tem-
pora, spinā dorsi ante accessionē curat quar-
tanam, tertianā, & quotidianā. item sang. ali-
ni. recens inunctus super spinā. hanc fid. qui-
dam ait, fac in manu dextra quatuor angu-
los. in primo scribe Iason in sec. Giason, in
ter. ter. in quar. gramaton deinde laua manū
cum uino albo, & bibe statim cum incipit pa-
rox. quoniam in tribus accessionibus succel-
sive curatur. alius dixit scribe in uno folio
saluiae Christus natus ē, in sec. Christus mor-
tuus est, & sepultus. in ter. Christus resurre-
xit alleluia. bibe pri. in prima accessione. sec.
in secunda. ter. in tertia. Guil. scribit trochif.
qui conuertunt quar. in ter. quod non lau-
do. hi R. absinthii, cap. costi, uernicis, ameos,
aristol. longe, scord. myrrhā, eupho. ana. u. i.
aloes, bdellii, pirethri, serap. opopo. seminis
cicutae, amomi, acori ana vnc. i. infunde gum-
mi in uino, & alia tere, & fac trochif. ponde-
rantes an. i. & da in aurora in die accessio-
nis. cum aquae raph. & oxim. compositum
unciam unam.

Quartanae nothae curatio.

MAior humectatio conuenit in febribus
quar. nothis factis per adustionem, & minus
in his quae sunt ex admixtione melancholiae
cum sanguine, uel phlegmate. in factis per
adustionem expecta ante purgationes post le-
nitionem, & aperitionem plus, & interpo-
ne plus temporis inter euacuationem, & eu-
acuationem: quoniam materia adusta tardius
& difficilius coquitur. unde Guil. iubet med.
euacuantes materiam adustam esse leues, no
acutas in substantia liquida. dicitur quar. no-
tharum ex sanguine adusto tendatur plus ad
humidum, & minus ad calidum quam in al-
liis. Guil. dat omni quar. nothae quotidie
bis. si in aurora, & ante cenam per duas
horas vnc.ii. s. oxim. squil. cum vnc.iiii. aquae
decoct. hyss. & mellis, & subdit. mundifica se
pe in diebus quietis cū pilulidis, aut stomati-
chis Alchindi, aut de helleboro, & huiusmo-
di. In sanguinea ait Viat. i. die accessionis nō
cibes, & parum aliis diebus, & Gordo. absti-
neat in sanguinea & cholericā a carne, & ui-
no usque ad 20. dies, tunc si materia est dige-
sta, & uirtus fortis abstineat de nec sit euacua-
ta. Ras. 18. con. quar. ex adustione sangui. in
princ. phlebotex. basilica sinistrae manus. &
Viat. deinde da pharmacum sang. subtilians,
& incensionem extinguens, quare digest. sint
sine calef. ut zuc. mel uiol. cum succo scario-
lae, & Aui. euacuatio sit lenis, & debilis, & cū
his, quae mundificant sanguinem, & Viat. in princ.
moue uomitum, cum rigor inceperit, & ma-
teria digesta, phlebotomandus est ex basilica,
uel mediana, ut sanguis grossus exeat.

Quartana cholericā curatur ait Viat. plus
cum refriger. & si uenter sit stipticus cum pri-
nis, manna, uiolis, & huius. & cum clysteri-
bus. materia digeratur cum oxi. & cum ince-
perit digeri, detur sol. cholerae purgans si-
ne labore. Auic. dat my. citr. & uiola. & aquā
casei, quae euacuat materias adustas si paucae
sint quoniam multas non posset: nec si frig.
ubi est stomachus relaxatus, idem ait, hume-
cta, & refrigera. idem affirmat Alm. 18. con.
& Auicē, sedeat in aqua calida, & abluat,
& addit, leni cum uiol. aqua casei, & uirtu-
te poli. aut cum syrupo acetoso, inlep. & cal-
sia. solutio eradicatiua fiat post 20. dies, quia
tunc digestio apparet completa. deinde da quae
subtiliant, & incidunt, ut syrup. acetos. cum
aqua endiuiae, fenic. & similium. Fer. si mor-
bus diuturnus fuerit, & nimia grauitas mē-
brorum, fiat munitio trium, aut quatuor un-
sang. singulis mēsis, ne ex longo febrili ca-
lore sanguis putrefactus sit causa maioris mo-
lestiae

lestia. & si perseverauerit, da prouocantia sudorem, & da opiatas. Rog. dar per dig. oxizac. cum oximelle, & fiat minutio de saluarella in mēsisbus in secūda quadra. Iunē. Gor. digerit cum oxizac. syrup. uiolato & de sumit. & dat medi. que R. florum borag. uiol. li qui. mundā ana vnc. i. coque in sero caprino, & in decocto distempera cor. mirab. nig. & citri. & fricentur in ea lento igne, cola, & da in aurora.

In quartana phlegmatica ait Ras. in diuis. non subtilies regimen, sed da cibos bonos, vt carnes arietū, castratorum iuuenum. sed 18. con. ait, quod in die accessionis nisi uirtus sit debilis ait Viar. Ger. non concedit carnes nisi ad 40. diem, si uirtus potest tolerare deinde cibus facilis digestionis. Alex. prohibe rigorem, quia si fuerit debilis, & febris. digere ait Viar. cum melle rosato. cum succo scariolæ, apii, & feniculi. caue frigida. moue cum clysteribus, & pharmacis phlegmagogis. Aui. dat syrupum acetosum mellitum cū aqua apii, fenic. & similiū. & cum incipit digestio apparere, in lenituum misce uirtutem turbith polipodii, & huiusmodi, & addit epithimum, deinde uirtutem agarici. Vomitus fiat inquit Auic. cum syrupo acetoso mellino de seminibus incisuiis, & subtiliatis, uel vomitiuis, ut attriplicis, anethi, rapē & similiū, & dixit adde uirtutem sinapis ad incidendum, & hellebori albi ad uomen dum, & elleb. in raphano, inquit Viar. incita sudorem, & post cibum assumat. diatrion pipereon, dianisum, & similia, & sæpe theriacā diacostum, & hæc post 40. dies, uel ut uult Hi. periodos.

Quartan. phleg. salso, ait Plat. purga, ut materia exigit in alijs membris: sed acutior sit medicina non in caliditate, sed in purgatione. Gor. digerit cum oximelle compo. & ox. diuretico, & syrupo. de fumo terre ante, & purga cum med. quod R. florum boragi. buglossæ, uiol. poli. anethi, turbith, liqui. paf. sularum, absynthii, agarici, laccæ, eup. ana vnc. s. coque in sero caprino, & in eductione pone cor. mirab. indo emb. ana vnc. i. fricentur in ea lento igne.

Ex frigus per quatuor horas cœpit hominem uehemens ante solis occasum, paruus rigor, nulla punctio, caluit per uiginti horas. sudauit parum. & sudor quasi frigidus per duas horas. calor fuit lentus sine fri sed cū multa grauitate capitis, & totius corporis. urina mediocris substantiæ tendens ad grossiorem, color remissus, flatibus plena, pulsus paruus, & uelox, & spissus. digestio fuit geleniabin cum oximelle comp. & aqua & scolop. cum fuerit cum residentia phleg. euacua

ui cum elec. indo, & diasenā ana vnc. s. cum decocto pass. sticados, scolop. anisi, & fen. po. stea inūge spinam ante accessionem per unā horam cum oleo de costo, de mētha, & de pipere. ab extra corroborauit stomachum, & iteraui digestionem, & pharmacum usq; ad 22. diem deinde cum oximelle composito, & syrupo. de calamento cum aqua per sex dies, postea euacuaui cum turbith, agarico, & polypo. ad 30. dies dedi. mixturam ex diatrion p. arom. garos. & rad. buglossæ conditis. dosis vnc. s. cum uino aroma. & sic usque ad 40. dies. & tunc dig. quod R. v. rad. diure. sicana vnc. ii. pass. sebe. ana vnc. i. dactil. n. x. hy per. cala. puleg. orig. bisso. melissæ, sticados, maior. saluia, florum rorisma. ana m. i. sem. apii, fen. anisi, dauci, ameos, amomi, semis asparagi, brusci, petros. ana vnc. s. rad. cap. aconi, uallet. pen. ana vnc. ii. scolop. tamarisci ana vnc. iiii. florum borag. buglossæ, capil. pollit. adian. ana m. s. bulliant in f. q. aque cum melle, & aceto squillæ fiat. syr. mirabilis in incisione, & subriliatione humorum grossorum.

Quartana continua.

Ras. 18. con. auct. Gal. 2. de crisi. cum uideris symptomata quarra non eradicata, est cōtinua. & in ea non est rigor, nec sudor. Ferat fligit continuo, sed magis de quarto, in quartum. Guil. pulsus est apparentior, quā in interpolata, magis uelox, & spissus, calor est continuus, & siccitas linguæ cum asperitate & forti siti, urina semper rubea, aut ruffa subtilis, uel spiss. Cura ait Aui. est proportionata interpol. sed refrigera plus, ut cū syrupo aceroso. de seminibus calidis moderatē, & gelenia. cum aqua temperatis cum zucharo ros. syr. ros. & phleb. magis conuenit: quia materia est intra uenas. & Aui. sit tua intentio in prouocando secessum cum suppo. cly. uel med. leni. clyst. bonum R. aquæ decoct. siclæ, epith. lib. i. olei uiolati vnc. iiii. mellis vnc. ii. aliās vnc. s.

Febris quintana septi.

Hi. has recenser in lib. epy. sed Gal. in lib. de differ. non uidit nisi quintanam, quæ tardabat inuadere usque ad finem quarti diei, quare uidebatur quinana. hæc quidem febris ait Ras. 18. con. fuit ex phlegmate grosso vel melancholia. & diuersificantur iuxta diuersitatem humorum. idem affirmat Auic. & Haly. & Auice. secundum q. materia est plus, & minus grossior, ac subtilior mouetur citius, ac tardius. Guil. quintanæ materia est phlegma naturale uiscosum, & melancholia ex quibus

quibus fit mixtum causa eius. sex. est phlegma acetosum: sep. est rubeum. oct. est humor cōpositus ex naturali acetoso, & melancholia. nō ex naturali, & melancholia. dec. ex acetoso vitreo, & melancholia, & ait hæc febres sunt de genere quartanæ non verè Galen. in com. Hip. assignat, causam harum febrium esse malum regimen. Auic. quintana est dete-

rior sex. & sex. septi. & c. Cura ait Ras. 18. cō. sicut quartanā. icide magis, & calefac, quam magis elōgatur à quarta. quoniam sunt grossioris materiæ digestio fit maior per tantū, & humecta. ait Ani. vomitus est maxime utilis cū vomitiis fortibus, & euacuatio cu hyeris, ut logodiō. Ruf. & id generis. sudor fiat cum balneo calido, uel stupha sicca.



F I N I S.

Series chartarum.

a-b, A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Vv Xx Yy Zz:

A a a B b b C c c D d d E e e F f f.

Omnes sunt Terniones præter b, & Fff qui sunt Quaterniones.

Venetijs

1575.